

С.Л. Блюмин, И.А. Шуйкова

**Модели и методы
принятия решений
в условиях неопределенности**

**Липецк
2001**

ББК 22.18
УДК 519.816
Б71

Блюмин С.Л., Шуйкова И.А.

Модели и методы принятия решений в условиях неопределенности. –
Липецк: ЛЭГИ, 2001. – 138 с.

Монография посвящена анализу задач принятия решений в условиях неопределенности; рассматриваются типовые методы решения проблемных ситуаций – выбор лучшей альтернативы, ранжирование, групповое упорядочение альтернатив. Излагаются математические основы теории принятия решений, приводятся примеры использования методов для ряда практических задач.

Для специалистов в области исследования операций, поддержки принятия решений, систем искусственного интеллекта, а также для студентов и аспирантов соответствующих специальностей.

Табл. 12. Ил. 25. Библиогр. 124 назв.

ISBN 5-900037-19-3

© С.Л. Блюмин, И.А. Шуйкова, 2001
© Липецкий эколого-гуманитарный институт, 2001

Список используемых сокращений

В	— вероятностная (тип калибровки)
ВС	— взвешенная структура (тип калибровки)
ЗАПРОС	— ЗАмкнутые ПРоцедуры у Опорных Ситуаций (метод принятия решений)
ЗПР	— задача принятия решений
ИР	— инвариантность к растяжению (свойство)
ИС*	— индекс согласованности
ИС	— информационная система
ИС**	— инвариантность к сдвигу (свойство)
ИУС	— информационно-управляющая система
К	— кососимметрическая (тип калибровки)
ЛПР	— лицо, принимающее решение
МАИ	— метод анализа иерархий
н.о.п.	— нечеткое отношение нестрогого предпочтения
ОРКЛАСС	— ОРдинальная КЛАССификация (метод принятия решений)
ОС	— отношение согласованности
ПАРК	— ПАРная Компенсация (метод принятия решений)
ПР	— принятие решений
ПС	— простая структура (тип калибровки)
РГ	— рабочая группа
С	— степенная (тип калибровки)
СППР	— система поддержки принятия решений
Т*	— транспонируемость (свойство)
Т	— турнирная (тип калибровки)
ЭС	— экспертная система
ЭК	— экспертная комиссия

Введение

Проблемы принятия решений, которые в широком плане можно рассматривать как проблемы анализа сложных систем, занимают все большее место в современной науке [69].

В той или иной степени системы поддержки принятия решений присутствуют в любой информационно-управляющей системе. По мере развития предприятия, упорядочения структуры организации и налаживания межкорпоративных связей, проблема разработки и внедрения системы поддержки принятия решений (СППР) становится особенно актуальной.

ИУС промышленного предприятия должна обладать возможностями и MIS (Manager Information System – ориентирована на обеспечение процесса управления необходимой информацией о прошлом, настоящем и будущем управляемой системы), и DSS (Decision Support System – ориентирована на интеллектуальное обеспечение процесса принятия решения и ставит своей целью поддержку данного процесса) систем, так как руководителю предприятия необходима не только конкретная информация для принятия управленческого решения, но и возможность поддержки решения. Возможной реализацией такого подхода является разработка и внедрение в существующую ИУС предприятия СППР как ее подсистемы.

Одним из главных вопросов разработки СППР является выбор математических моделей и методов принятия решений, составляющих основу ее функционирования. Принятие решений в системе управления промышленными предприятиями связано со сложностью системы, распределенностью ее подсистем, неопределенностью текущего состояния, необходимостью учитывать большое число различных факторов и критериев, характеризующих варианты решений. Поэтому при разработке СППР промышленного предприятия возникает проблема выбора адекватных математических методов, позволяющих отражать структуру сложной системы, для которой принимается решение, оперировать субъективными оценками экспертов, принимать во внимание качественный (вербальный) характер оценки специалистами вариантов решения проблемы, учитывать неясность, неточность данных средствами нечеткой логики.

Бурно развивавшаяся в последнее время математическая теория оптимизации создала совокупность методов, помогающих при компьютерной поддержке эффективно принимать решения при фиксированных и известных параметрах, характеризующих исследуемый процесс, а также в том случае, когда параметры – случайные величины. Однако основные трудности возникают в том случае, когда параметры оказываются неопределенными и когда они в то же время сильно влияют на результаты решения. Такие ситуации могут возникать как вследствие недостаточной изученности процессов, для

которых принимается решение, так и из-за участия в управление нескольких лиц, преследующих различные цели.

Приближенные, но в то же время эффективные способы анализа сложных, плохо определенных систем, не поддающихся точному математическому описанию, опираются на использование лингвистических переменных и нечетких алгоритмов. Основные приложения данного подхода относятся к областям экономики, управления производством, искусственному интеллекту, психологии, лингвистики, обработки информации, медицины, биологии.

Компьютеризация общества вызвала быстрое расширение сферы использования количественных методов анализа за счет их применения для анализа экономических, урбанистических, социальных, биологических и других систем. Большинство методов, используемых в настоящее время для анализа гуманистических систем, т.е. систем, в которых участвует человек, представляют собой модификации методов, которые в течение длительного времени создавались для механистических систем. Замечательные успехи, достигнутые с помощью этих методов, позволили объяснить многие природные явления и создавать все более и более совершенные устройства. Но эти же успехи вселили широко распространенное убеждение в том, что теми же методами или подобными им можно сравнительно эффективно исследовать и гуманистические системы. Так, например, успехи, достигнутые с помощью теории управления в конструировании космических навигационных систем высокой точности, стимулировали применение этой теории для анализа экономических и биологических систем. Успехи макроскопического анализа физических систем с помощью моделирования на ЭВМ привели к тому, что эконометрическое моделирование с помощью ЭВМ стали применять для решения задач прогнозирования, экономического планирования и управления производством.

По глубоко укоренившейся традиции научного мышления понимание явления отождествляют с возможностью его количественного анализа. Однако, по своей сути обычные количественные методы анализа систем непригодны для гуманистических систем и вообще любых систем, сравнимых по сложности с гуманистическими системами. В основе этого тезиса лежит то, что можно было бы назвать принципом несовместимости. Суть этого принципа можно выразить примерно так: чем сложнее система, тем менее мы способны дать точные и в то же время имеющие практическое значение суждения о ее поведении. Чем глубже мы анализируем реальную задачу, тем неопределеннее становится ее решение. Для систем, сложность которых превосходит некоторый пороговый уровень, точность и практический смысл становятся почти исключающими друг друга характеристиками. Именно в этом смысле точный количественный анализ поведения гуманистических систем не имеет, по-видимому, большого практического значения в реальных социальных, экономических и других задачах, связанных с участием одного человека или группы людей.

Представленная работа опирается на предпосылку о том, что элементами мышления человека являются не числа, а элементы некоторых нечетких множеств или классов объектов [61-64, 69], для которых переход от «принадлежности к классу» к «непринадлежности» не скачкообразен, а непрерывен. И в самом деле, нечеткость, присущая процессу мышления человека, наводит на мысль о том, что в основе этого процесса лежит не традиционная двузначная или даже многозначная логика, а логика с нечеткой истинностью, нечеткими связями и нечеткими правилами вывода. Именно такая нечеткая логика играет основную роль в том, что может оказаться одной из наиболее важных сторон человеческого мышления – способности оценивать информацию, т.е. выбирать из разнообразия сведений те и только те, которые имеют отношение к анализируемой проблеме.

По своей природе оценка является приближением. Во многих случаях достаточна весьма приближенная характеристизация набора данных, поскольку в большинстве основных задач, решаемых человеком, не требуется высокая точность. Человек использует допустимость такой неточности, кодируя информацию, «достаточную для решения задачи» элементами нечетких множеств, которые лишь приближенно описывают исходные данные. Поток информации, поступающей в мозг через органы зрения, слуха, осязания и др., суживается, таким образом, в тонкую струйку информации, необходимой для решения поставленной задачи с минимальной степенью точности. Способность оперировать нечеткими множествами и вытекающая из нее способность оценивать информацию является одним из наиболее ценных качеств человеческого разума, которое фундаментальным образом отличает человеческий разум от так называемого машинного разума, приписываемого вычислительным машинам.

Традиционные методы анализа систем недостаточно пригодны для анализа гуманистических систем именно потому, что они не в состоянии охватить нечеткость человеческого мышления и поведения. Поэтому для действенного анализа гуманистических систем нужны подходы, для которых точность, строгость и математический формализм не являются чем-то абсолютно необходимым и в которых используется методологическая схема, допускающая нечеткости и частичные истины. В работе, с одной стороны, проводится сравнительный анализ методов принятия решения в условиях неопределенности; с другой стороны, рассматривается возможность создания единого подхода к процессу принятия решений, что позволит специалисту конкретной предметной области не выбирать среди имеющихся методов адекватный для данной ситуации, а пользоваться универсальным алгоритмом, значительно упрощающим процедуру принятия решений.

1. Основные понятия теории принятия решений

1.1. Системы поддержки принятия решений и их место в информационно-управляющих системах

Все процессы функционирования современного промышленного предприятия, от проектирования изделия до его продажи, тесно взаимосвязаны и требуют четкого централизованного управления. Основные решения, принимаемые на уровне руководителя предприятия, невозможно реализовать без развитой информационной инфраструктуры. Качество информационного обеспечения управления – один из важных факторов, определяющих действенность принимаемых управлеченческих решений. Отсутствие слаженной системы информационного обеспечения управления приводит к вероятностному характеру принимаемых управлеченческих решений, дублированию в сборе информации, потерям нужной информации и, как следствие, к невысокой эффективности управления. Создание ИУС предприятия позволяет оптимизировать сложившиеся каналы сбора информации и обеспечить более полное удовлетворение информационных потребностей руководителей и коллектива в целом. Существующие же в настоящее время системно-технические инфраструктуры большинства предприятий обеспечивают в той или иной мере только отдельные виды производственно-хозяйственной, финансово-экономической деятельности и управления; в целом уровень ИУС не соответствует современному уровню информационных технологий и теоретических разработок по данной проблеме.

ИУС представляет собой сложную многоуровневую информационную систему, гарантирующую автоматизированное управление всеми подсистемами управляющей системы и видами деятельности предприятия. Наглядную укрупненную модель ИУС можно представить в виде взаимодействия трех подсистем (рис. 1.1). Программа создания ИУС предусматривает три этапа [84]: совершенствование и развитие существующей системы сбора и обработки информации по критерию максимального и оперативного обеспечения управляющих структур и руководства предприятия всей необходимой и достоверной информацией в необходимые сроки; развитие ИУС в целях автоматизации поддержки принятия управлеченческих решений; построение стратегической информационно-управляющей системы предприятия. Основная цель второго этапа – создание системы поддержки принятия решений как подсистемы ИУС, повышающей качество оперативных, тактических и стратегических решений.




Рис 1.1. Модель информационно-управляющей системы промышленного предприятия

Первый этап можно рассматривать как процесс развития ИС, который в настоящее время уже в какой-то мере реализован большинством предприятий. В то же время, вопросы разработки СППР до сих пор являются одними из наиболее обсуждаемых и актуальных [52, 66, 101, 121], что связано со все более возрастающей ролью квалифицированно принятых решений в процессе оптимального управления, с одной стороны, и недостаточно развитыми, реализованными на сегодняшний день, СППР, с другой стороны.

Создание и внедрение СППР в ИУС предприятия требует поэтапной разработки и развития совокупности всех обеспечивающих подсистем СППР: технического, математического, программного, информационного, организационного обеспечения. В монографии рассматриваются вопросы разработки математического и программного обеспечения как совокупности математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач поддержки принятия решений.

Центральное место в сложной, многогранной и трудоемкой деятельности по организационному управлению промышленным предприятием занимают процессы принятия решений. Цикл управления организацией начинается с этапа *получения* по информационным каналам *задания* от вышестоящего звена, уяснения поставленных задач и оценки возможности их выполнения в соответствии с имеющимися ресурсами и условиями [111]. На втором

этапе производится *декомпозиция общей задачи управления* на задачи подчиненных элементов, т.е. распределяются работы между подразделениями организации согласно их функциональному предназначению и возможностям. Эта деятельность составляет процесс принятия решений на втором этапе цикла управления. Следующий этап начинается с *передачи по информационным каналам организации принятых решений*. Подчиненным звеньям управления передается подробное задание, а вышестоящему звену сообщается обобщенная характеристика принятого решения. Далее следует этап *оперативного управления и контроля*, по результатам которого принимаются решения. Исходя из определенных таким способом этапов, управление промышленным предприятием можно представить как циклический процесс информационного обмена и принятия решений в звеньях иерархии.

Анализ решений в процессе промышленного производства и характера деятельности по их поддержке позволяет выделить 10 основных областей решений, принимаемых на предприятии (объединении) в ходе выпуска изделий [66] – *развитие*: установление количественных и качественных показателей развития предприятия (объединения), выбор капиталовложений, реконструкция и новое строительство, снятие изделия с промышленного производства; *реорганизация*: слияние с другими предприятиями, создание совместных предприятий, изменение внутренней организационной структуры; *управление*: выбор производственной программы, регулирование производства, внедрение новой продукции в производство; *проектирование*: разработка нового изделия, разработка новой ресурсосберегающей технологии производства продукции; *технология*: техническое и технологическое перевооружение производства, технологическая подготовка выпуска нового изделия; *снабжение*: определение круга поставщиков сырья, материалов, комплектующих изделий; *реализация*: выбор перспективных рынков сбыта продукции, определение круга потребителей изделия, заказчиков; *обслуживание*: открытие собственных обслуживающих центров, пересмотр технических условий и требований к изделию; *кадры*: аттестация, обучение, создание благоприятных производственных условий; *социально-бытовые услуги*: жилищное строительство, культурно-просветительные мероприятия, организация работы подведомственных оздоровительных учреждений.

Оказание помощи руководителю во всех перечисленных направлениях функционирования предприятия, осуществляющее систематически, по определенным процедурам, в индивидуальном порядке или в условиях коллективной работы, но каждый раз ориентированное на выработку конкретных и конечных решений сложных неструктурированных проблем, за принятие которых отвечает руководитель, – это основная функция СППР, которая является подсистемой информационно-управляющей системы промышленного предприятия.

СППР – это система, включенная в организационную среду и оказывающая помощь руководителю в получении приемлемых решений неструк-

турированных проблем, включающая в себя следующие этапы: анализ ситуаций и постановка проблем, формирование и выбор вариантов решений, организация выполнения решений, контроль выполнения решений (рис. 1.2).




Рис 1.2. Схема функционирования СППР

Существуют различные типы СППР. В зависимости от уровня процессов управленческих решений – индивидуального, группового, организационного и межорганизационного, – выделяют соответствующие типы СППР. Индивидуальная СППР обслуживает отдельно взятое лицо, принимающее решение – руководителя объединения, предприятия, организации. Возможности такой системы зависят от личных качеств руководителя, его знаний, навыков, опыта. На структуру и конфигурацию системы непосредственное влияние оказывают стили мышления и руководства конкретного лица – пользователя системы. Групповая СППР ориентирована на обслуживание группы лиц, взаимодействующих между собой при решении какой-либо проблемы. Поддержка процесса выработки групповых решений осуществляется за счет устранения коммуникационных барьеров между членами группы, применения количественных методов анализа решений группой лиц,

рациональной организацией самих процедур работы группы. Организационные и межорганизационные СППР применяются при анализе сложных проблем комплексного, междисциплинарного характера, для решения которых нужны знания и опыт в самых разнообразных областях.

В зависимости от типа принимаемых решений подразделяют различные уровни СППР: оперативный, тактический и стратегический.

Оперативный уровень обеспечивает решение многократно повторяющихся задач и операций на коротком временном интервале (неделя, декада, месяц и т.д.). На этом уровне велики как объем выполняемых операций, так и динамика принятия управленческих решений. Оперативные решения, как правило, принимаются при анализе проблем низовых звеньев организации, ее участков, рабочих мест. Тактический уровень обеспечивает решение задач, требующих предварительного анализа информации, подготовленной на первом уровне. Тактические решения принимаются на более длительном промежутке времени (квартал, полугодие и т.д.). На этом уровне объем решаемых задач уменьшается, но возрастает их сложность. Тактические решения характерны для подсистем ИУС. Стратегический уровень обеспечивает выработку решений, направленных на достижение долгосрочных стратегических целей организации. Такой тип решений характеризует длительный временной интервал (годы, несколько лет и т.д.), и сфера действия – весь управляемый объект в целом (предприятие, межорганизационный комплекс и т.д.). Классификация СППР приведена на рис. 1.3.




Рис 1.3. Классификация СППР

1.2. Компьютерная поддержка принятия решений

Поддержки принятия решений существуют длительное время, но с возникновением вычислительной техники появилась информационная технология поддержки принятия решений, главной особенностью которой является

качественно новый метод организации взаимодействия человека и компьютера. Первоначально компьютер рассматривался лишь как средство «машинизации» методов принятия решений, как средство быстрой реализации вычислений. В настоящее время компьютер является партнером человека в принятии решений. СППР создается обычно для определенного класса задач и обеспечивает поддержку ЛПР при анализе проблемы. ЛПР запрашивает необходимые данные, изучает проблемы, получает советы СППР, относящиеся к опыту решения подобных проблем, пробует применить для решения различные методы, знания экспертов [64]. Такой глубокий анализ зависит, прежде всего, от хорошей предварительной подготовки СППР, от ввода в нее нужных данных и знаний, необходимых методов. Этот анализ помогает ЛПР понять проблему, уточнить свои предпочтения и выработать наилучший вариант ее решения. Большинство существующих СППР ориентированы на сравнительно узкий круг задач. В настоящее время СППР развиваются в следующих направлениях:

- объединение СППР с автоматизированными информационными системами и системами связи;
- сближение СППР с экспертными системами и появление «интеллектуальных СППР»;
- совершенствование технологической базы СППР.

В будущем появятся системы, которые смогут подстраиваться под стиль мышления человека, имитировать приемы его работы, которые станут как бы продолжением «Я» руководителя. Но есть некоторые принципиальные границы – СППР сама по себе не может породить качественно новый вариант решения. Однако есть надежда, что такой вариант может возникнуть либо в процессе диалога человека с СППР, либо как догадка, которой способствовал этот диалог.

Выделяются различные виды компьютерной поддержки принятия решений: СППР, экспертные системы, советующие системы и т.д. [64].

Советующие системы [71] предполагают последовательное интерактивное взаимодействие с оператором с целью выявления параметров текущей проблемной ситуации и выдачи поэтапных рекомендаций оператору по решению возникшей проблемы.

Экспертные системы [63, 64, 101] разрабатываются для компьютерного представления и хранения знаний высококвалифицированных экспертов с тем, чтобы ими могли в дальнейшем воспользоваться специалисты с более низкой квалификацией. Экспертные системы направлены на класс задач с повторяющимися решениями, при этом опыт и интуиция эксперта возрастает с годами. Предполагается, что проблемы, подлежащие решению, являются слабо структуризованными. Экспертные системы могут применяться для различных видов деятельности, которые можно сгруппировать по следующим категориям: интерпретация, прогноз, диагностика, проектирование, планирование, наблюдение, отладка, ремонт, обучение, управление. Именно

при решении слабо структурированных проблем человеческая интуиция имеет особую ценность. Догадки эксперта, основанные на его прошлом опыте, на чутЬе, позволяют ему решать проблемы на высоком уровне. В связи с этим и возникла идея о передаче этих умений компьютеру. Диапазон применения ЭС очень широк, но каждая из таких систем может работать только в одной ограниченной области. Попытки расширить предметную область, даже в пределах одной области знаний, в подавляющем большинстве случаев неуспешны.

Компьютерная СППР [64, 66, 101] – это интерактивная автоматизированная система, использующая модели выработки решений, обеспечивающая пользователям эффективный доступ к распределенной базе данных и предоставляющая им разнообразные возможности по отображению информации. В таком понимании система поддержки принятия решений представляет собой совокупность следующих подсистем: комплекса распределенных технических средств; комплекса математических моделей; анализа состояний и выработки решений; базы данных; систем управления моделями, языков моделирования, обработки и отображения информации. В состав СППР входят три главных компонента: база данных, база моделей и программная подсистема (рис. 1.4).




Рис 1.4. Архитектура СППР

Компьютерные СППР, как правило, ориентированы на конкретные математические методы принятия решений [13, 32, 38, 52, 64, 71, 76, 87, 101, 106, 117, 121]. В связи с этим является актуальным анализ математического обеспечения СППР: задач, моделей, методов, схем и т.п. – с тем, чтобы сгруппировать их, наметить пути к упорядоченному, обоснованному исследованию и использованию [8].

1.3. Участники процесса принятия решений

В подготовке и принятии решения участвует целая группа специалистов, отвечающая за тот или иной этап процесса поддержки решения, руко-

водитель, на которого ложится задача окончательного выбора наилучшего варианта, а также ряд заинтересованных лиц. В слабо структурированных задачах принятия решений (ЗПР) сама проблема выбора тесно связана с человеком – ее *владельцем* [64]. Владельцем проблемы является человек, который (по мнению окружающих) должен ее решать и несет ответственность за принятые решения. Эти решения могут оказывать непосредственное воздействие на его благосостояние и общественного положение. Но это далеко не всегда означает, что владелец проблемы является также и *лицом, принимающим решение* (ЛПР). Конечно, ЛПР может быть таковым, но бывают ситуации, когда владелец проблемы является лишь одним из нескольких человек, принимающих участие в ее решении. Он может быть представителем коллективного органа, принимающего решения, члены которого вынуждены идти на компромиссы, чтобы достичь согласия. Третий возможный случай – ЛПР и владелец проблемы – разные люди. Известны примеры, когда руководители стремятся переложить на других принятие решений: глава фирмы полагается на заместителя, подписывает подготовленные другими (и иногда противоречивые) распоряжения. Таким образом, владелец проблемы и ЛПР могут быть как одной, так и разными личностями. Проект решения готовят специалисты, как говорят, «аппарат ЛПР». Если ЛПР доверяет своим помощникам, то может даже не вникать в решение, а просто подписать его. Но ответственность все равно лежит на ЛПР, а не на тех, кто участвовал в подготовке решения.

На принятие решений влияют *активные группы* (в [93, 94] их называют *акторами*) – группы людей, имеющих общие интересы по отношению к проблеме, требующей решения. Так, при принятии решения о постройке АЭС акторами являются: сотрудники министерства энергетики, заинтересованные в приросте электроэнергии; сотрудники строительной организации, осуществляющей постройку; представителя рядовых граждан; представители защитников окружающей среды. В данном случае владельцем проблемы (и иногда ЛПР) являются местные власти, которые должны дать разрешение на постройку АЭС на своей территории.

Разумное ЛПР всегда принимает во внимание интересы активных групп, учитывая их позиции и их критерии при оценке альтернативных вариантов решений.

При практической работе важно четко отделять этап дискуссий, когда рассматриваются различные варианты решения, от этапа принятия решения, после которого надо решение выполнять, а не обсуждать. При рассмотрении вариантов решений важную роль играют *эксперты* – люди, которые профессионально (лучше, чем ЛПР) знают отдельные аспекты рассматриваемой проблемы. По-английски *expert* – это специалист, в русском языке эти два слова имеют несколько различающийся смысл: под экспертом понимают опытного высококвалифицированного специалиста, умеющего использовать всю интуицию для принятия решений [80]. К ним обычно обращаются за

оценками, за прогнозами исходов тех или иных решений. Давая такие оценки, эксперты высказывают свое субъективное мнение. Но если эксперт беспристрастен и является профессионалом в своем деле, его оценки близки к объективным. При принятии сложных (обычно стратегических) решений в их подготовке принимает участие *консультант по принятию решений*. Его роль сводится к разумной организации процесса принятия решений: помочь ЛПР и владельцу проблемы в правильной постановке задачи; выявление ролей и позиций акторов; организация работы с экспертами. Консультант (или аналитик) обычно не дает собственных оценок при принятии решений, он помогает другим уяснить предпочтения, взвесить все «за» и «против» и выработать разумный компромисс.

Часто можно констатировать конфликты между менеджерами одной и той же организации по поводу сфер ответственности – кто за что отвечает, кто какие решения принимает. Поэтому очень важны регламенты, определяющие порядок работы. Недаром любое собрание принято начинать с утверждения председательствующего и повестки заседания, а работу любого предприятия или общественного объединения – с утверждения его устава.

Практически любой решение можно считать индивидуальным (кроме случаев принятия решений жюри и комиссией, в которых выбор осуществляется голосованием без обсуждения). Так как даже в случае коллективного органа, принимающего важные решения, обычно наблюдается стремление членов этого органа объяснить свои позиции, найти общую политику, общее решение. В этом случае такой орган выступает как ЛПР, обладающее определенной политикой.

1.4. Цели и ресурсы

При выполнении различных функций менеджмента возникает необходимость принимать решения [80]. Например, процесс планирования должен завершиться решением об утверждении плана, процесс контроля – решением о порядке ликвидации отклонений или о корректировке плана.

Каждое решение направлено на достижение одной или нескольких целей. Например, при строительстве АЭС желательно выполнить следующие задачи: получить прирост электроэнергии; получить максимальную прибыль от функционирования АЭС. Эти две цели можно достичь одновременно. Однако так бывает не всегда.

Часто встречающаяся формулировка «максимум прибыли при минимуме затрат» внутренне противоречива. Минимум затрат равен 0, когда работа не проводится, но и прибыль тогда тоже равна 0. Если же прибыль велика, то и затраты велики, поскольку и то, и другое связано с объемом производства. Можно либо максимизировать прибыль при фиксированных затратах, либо минимизировать затраты при заданной прибыли.

Каждое решение предполагает использование тех или иных ресурсов. Так, министерство энергетики исходит из существования необходимого ма-

териального и кадрового обеспечения для работы АЭС. Если бы такого обеспечения не было бы, то и дискуссия не имела бы смысла.

В обыденной жизни мы чаще всего принимаем решения, покупая товары и услуги. И тут совершенно ясно, что такое ресурсы – это количество имеющихся денег. Выступая как потребитель, человек должен решить, какие товары ему следует покупать и по какой цене. А выступая как производитель – на что разумно потратить свои усилия. В западных странах теория принятия решений считается разделом экономики. В рамках экономической теории обсуждаются поднятые вопросы о соотношении полезности товара (для потребителя) и отношения полезности к цене. У каждого приобретаемого товара есть своя полезность для потребителя. Закон предельной полезности гласит, что предельная полезность убывает. Иначе говоря, последующие партии товара менее ценные для потребителя чем первые. Если есть необходимость покупки нескольких товаров, то потребитель стремится распределить свои деньги так, чтобы отношение полезности этого товара к общей единице измерения было постоянным. Иначе говоря, если полезность товара больше, то средства, затраченные на него, должны быть больше. Точно так же ведет себя человек при решении задачи о капиталовложении: он вкладывает большие средства в более полезные направления деятельности. Экономисты считают, что такое поведение человека является единственno правильным, и называют человека, осуществляющего таким образом свой выбор, рациональным человеком.

Таким образом, при практической работе над проектом решения важно проанализировать: «Чего мы хотим достичь? Какие ресурсы мы готовы использовать для этого?».

1.5. Альтернативы и критерии

Альтернативами [64] называют варианты принимаемых решений. Под проблемной ситуацией понимают ситуацию, которая имеет не менее двух вариантов решений. В примере со строительством АЭС как минимум можно выделить две альтернативы: разрешение строительства и его запрет. Следовательно, для существования самой задачи принятия решений необходимо иметь хотя бы две альтернативы. Независимыми являются те альтернативы, любые действия с которыми (удаление из рассмотрения, выделение в качестве лучшей и т.п.) не оказывают влияния на качество других альтернатив. При зависимых альтернативах решения по одним из них оказывают влияние на качество других. Примером является групповая зависимость – если решено рассматривать хотя бы одну альтернативу из группы, то надо рассматривать всю группу. Другим типом зависимости является зависимость от альтернатив, исключаемых из рассмотрения. Например, зависимость выбираемых в ресторане блюд от тех, которые включены или исключены из меню. Выделяют также зависимость от несуществующих альтернатив. Так, образ идеальной альтернативы, создаваемой человеком во время выбора, может

оказывать влияние на выбор из реальных альтернатив, особенно если есть надежда на реализуемость идеального варианта.

Задачи принятия решений могут существенно отличаться по числу альтернатив и их наличию на момент выработки политики и принятия решений. Встречаются задачи, когда все альтернативы уже заданы и необходим лишь выбор из этого множества. Так, мы можем искать правило выбора лучших изделий из уже имеющихся, определять наиболее эффективную организацию, лучший университет и т.д. Особенностью этих задач является замкнутое и нерасширяющееся множество альтернатив. Но существует множество задач другого типа, где все альтернативы или их значительная часть не сформированы на момент принятия решений. В таких задачах, как выбор плана развития города, выбор фасона одежды и т.п. основных альтернатив, с рассмотрения которых начинается выбор, сравнительно немного. Но они не являются единственно возможными. Часто на основе этих альтернатив в процессе выбора возникают либо новые альтернативы, либо совокупность требований к недостающим альтернативам. Этот класс задач можно *назвать задачами с конструируемыми альтернативами*. Итак, альтернативы, присутствующие в ЗПР, могут быть следующими:

- независимыми;
- зависимыми;
- заранее заданными;
- появляющимися после выработки правила принятия решения;
- конструируемыми в процессе принятия решений.

Критерии – это способ описания альтернативных вариантов решений, способ выражения различий между ними с точки зрения предпочтений ЛПР. Количество критериев в различных теоретических построениях и разных методах принятия решений обычно превышает единицу. Современные методы принятия решений ориентированы на учет всех отличительных особенностей качеств альтернатив, что существенно приближает формальные схемы к реальному миру. Поэтому в настоящее время многокритериальное описание альтернатив становится все более принятым. Как правило, критерии оценки не заданы на начальном этапе анализа проблемы, а должны быть выявлены в диалоге ЛПР–эксперт.

Критерии могут быть зависимыми и независимыми. Критерии называют *зависимыми*, когда оценка альтернативы по одному из них определяет (детерминировано либо с большой степенью вероятности) оценку по другому критерию. ЗПР и методы их решений зависят от числа критериев. При небольшом количестве критериев (2-5) задача сопоставления двух альтернатив достаточно проста для ЛПР. При большем числе критериев задача становится малообозримой. В этом случае критерии объединяются в группы, которые можно считать независимыми – появляется иерархия критериев.

Таким образом, выявление перечня альтернатив и структуры критериев является необходимым и первым этапом ЗПР.

1.6. Риски и неопределенности

Многие решения принимаются в условиях риска, т.е. при возможной опасности потерь [80]. Связано это с разнообразными неопределенностями, окружающими нас. Иногда прогноз основан на хорошо изученных закономерностях и осуществляется наверняка. Например, методы прогнозирования движения космических аппаратов разработаны настолько, что возможна автоматическая стыковка кораблей. Однако встающие перед менеджером фирмы проблемы прогнозирования обычно не позволяют дать однозначный обоснованный прогноз. Под неопределенностью в [78] понимаются явления, не поддающиеся анализу и измерению со сколь угодно большой точностью.

В [80] приводится классификация различных видов неопределенностей, часть из которых связана с недостаточностью знаний о природных явлениях и процессах, например:

- неопределенности, связанные с недостаточными знаниями о природе (например, нам неизвестен точный объем полезных ископаемых в конкретном месторождении, а потому мы не можем точно предсказать развитие добывающей промышленности и объем налоговых поступлений от ее предприятий);

- неопределенности природных явлений, таких, как погода, влияющая на урожайность, на затраты на отопление, на туризм, на загрузку транспортных путей и др.;

- неопределенности, связанные с осуществлением действующих (неожиданные аварии) и проектируемых (возможные ошибки разработчиков или физическая невозможность осуществления процесса, которую заранее не удалось предсказать) технологических процессов.

Многие возможные неопределенности связаны с ближайшим окружением фирмы, менеджер которой занимается прогнозированием:

- неопределенности, связанные с деятельностью участников экономической жизни (прежде всего партнеров и конкурентов фирмы), в частности, с их деловой активностью, финансовым положением, соблюдением обязательств;

- неопределенности, связанные с социальными и административными факторами в конкретных регионах, в которых фирма имеет деловые интересы.

Большое значение имеют и неопределенности на уровне страны, в частности:

- неопределенность будущей рыночной ситуации в стране, в том числе отсутствие достоверной информации о будущих действиях поставщиков в связи с меняющимися предпочтениями потребителей;

- неопределенности, связанные с колебаниями цен (динамикой инфляции), нормы процента, валютных курсов и других макроэкономических показателей;

- неопределенности, порожденные нестабильностью законодательства и текущей экономической политики (т.е. с деятельностью руководства страны, министерств и ведомств), связанные с политической ситуацией, действиями партий, профсоюзов, экологических и других организаций в масштабе страны.

Часто приходится учитывать и внешнеэкономические неопределенностии, связанные с ситуацией в зарубежных странах и международных организациях, с которыми вы поддерживаете деловые отношения.

Таким образом, менеджеру приходится прогнозировать будущее, принимать решения и действовать, буквально купаясь в океане неопределенностей. Полезно ввести их классификацию на СТЭП-факторы (по первым буквам от слов - социальные, технологические, экономические, политические) и факторы конкурентного окружения. СТЭП-факторы действуют независимо от менеджера, а вот конкуренты отнюдь к нам не безразличны. Возможно, они будут бороться с нами, стремиться к вытеснению нашей фирмы с рынка. Но возможны и переговоры, ведущие к обоюдовыгодной договоренности.

Каждая из перечисленных видов неопределенностей может быть структурирована далее. Так, имеются крупные разработки по анализу неопределенностей при технологических авариях, в частности, на химических производствах и на атомных электростанциях.

Учет рисков и неопределенностей в процессе принятия решений определяет выбор математических методов, позволяющих учитывать данные факторы.

1.7. Экспертное оценивание

Для принятия обоснованных решений необходимо опираться на опыт, знания и интуицию специалистов [80]. После второй мировой войны в рамках теории управления (менеджмента) стала развиваться самостоятельная дисциплина – экспертные оценки.

Методы экспертных оценок – это методы организации работы со специалистами-экспертами и обработки мнений экспертов, выраженных в количественной и/или качественной форме с целью подготовки информации для принятия решений ЛПР. Для проведения работы по методу экспертных оценок создают рабочую группу (РГ), которая и организует по поручению ЛПР деятельность экспертов, объединенных (формально или по существу) в экспертную комиссию (ЭК).

Существует различные методы получения экспертных оценок. В одних с каждым экспертом работают отдельно, он даже не знает, кто еще является экспертом, а потому высказывает свое мнение независимо от авторитетов. В других экспертов собирают вместе для подготовки материалов для ЛПР, при этом эксперты обсуждают проблему друг с другом, учатся друг у друга, и неверные мнения отбрасываются. В одних методах число экспертов фиксировано и таково, чтобы статистические методы проверки согласованности мнений и затем их усреднения позволяли принимать обоснованные решения.

В других – число экспертов растет в процессе проведения экспертизы, например, при использовании метода «снежного кома» (о нем – дальше). Не меньше существует и методов обработки ответов экспертов, в том числе весьма математизированных и компьютеризированных.

Что должна представить экспертная комиссия в результате своей работы – информацию для принятия решения ЛПР или проект самого решения? От ответа на этот методологический вопрос зависит организация работы комиссии.

Если цель экспертного совета – сбор информации для ЛПР, то тогда рабочая группа должна собрать возможно больше относящейся к делу информации, аргументов «за» и «против» определенных вариантов решений. Полезен метод постепенного увеличения числа экспертов: сначала первый эксперт приводит свои соображения по рассматриваемому вопросу; составленный им материал передается второму эксперту, который добавляет свои аргументы; накопленный материал поступает к следующему – третьему – эксперту... Процедура заканчивается, когда иссякает поток новых соображений.

Отметим, что эксперты в рассматриваемом методе только поставляют информацию, аргументы «за» и «против», но не вырабатывают согласованного проекта решения. Более того, наибольшую пользу приносят эксперты с мышлением, отклоняющимся от массового, поскольку именно от них следует ожидать наиболее оригинальных аргументов.

Если цель – подготовка проекта решения для ЛПР, то применяются методы выработки единого мнения экспертов.

Догма согласованности. Считается, что решение может быть принято лишь на основе согласованных мнений экспертов. Поэтому исключают из экспертной группы тех, чье мнение отличается от мнения большинства. При этом отсеиваются как неквалифицированные лица, попавшие в состав экспертной комиссии по недоразумению или по соображениям, не имеющим отношения к их профессиональному уровню, так и наиболее оригинальные мыслители.

Бывает и так, что эксперты делятся на две или более групп, имеющих единые групповые точки зрения.

Мнения диссидентов. С целью искусственно добиться согласованности стараются уменьшить влияние мнений экспертов-диссидентов. Жесткий способ борьбы с диссидентами состоит в их исключении из состава экспертной комиссии. Отбраковка экспертов, как и отбраковка резко выделяющихся результатов наблюдений, приводит к процедурам, имеющим плохие или неизвестные статистические свойства.

Мягкий способ борьбы с диссидентами состоит в применении рабастных (устойчивых) статистических процедур. Простейший пример: если ответ эксперта – действительное число, то резко выделяющееся мнение диссidenta сильно влияет на среднее арифметическое ответов экспертов и не влияет на их медиану. Поэтому разумно в качестве согласованного мнения

рассматривать медиану. Однако при этом игнорируются (не достигают ЛПР) аргументы диссидентов.

Основные стадии экспертного опроса. Как показывает опыт проведения экспертных исследований, целесообразно выделять следующие стадии экспертного опроса:

- 1) формулировка ЛПР цели экспертного опроса;
- 2) подбор ЛПР основного состава РГ, обычно – руководителя и секретаря;
- 3) разработка РГ и утверждение у ЛПР технического задания на проведение экспертного опроса;
- 4) разработка РГ подробного сценария проведения сбора и анализа экспертных мнений (оценок), включая как конкретный вид экспертной информации (слова, условные градации, числа, ранжировки, разбиения или иные виды объектов нечисловой природы) и конкретные методы анализа этой информации;
- 5) подбор экспертов в соответствии с их компетентностью;
- 6) формирование экспертной комиссии (целесообразно заключение договоров с экспертами об условиях их работы и ее оплаты, утверждение ЛПР состава экспертной комиссии);
- 7) проведение сбора экспертной информации;
- 8) анализ экспертной информации;
- 9) при применении процедуры из нескольких турнов – повторение двух предыдущих этапов;
- 10) интерпретация полученных результатов и подготовка заключения для ЛПР;
- 11) официальное окончание деятельности РГ (в том числе подготовка и утверждение научного и финансового отчетов о проведении экспертного исследования, оплата труда экспертов и сотрудников РГ).

Подбор экспертов. Проблема подбора экспертов является одной из наиболее сложных. Очевидно, в качестве экспертов необходимо использовать тех людей, чьи суждения наиболее помогут принятию адекватного решения. Но как выделить, найти, подобрать таких людей? Надо прямо сказать, что нет методов подбора экспертов, наверняка обеспечивающих успех экспертизы. Часто предлагают использовать методы взаимооценки и самооценки компетентности экспертов. С одной стороны, кто лучше может знать возможности эксперта, чем он сам? С другой стороны, при самооценке компетентности скорее оценивается степень самоуверенности эксперта, чем его реальная компетентность. Тем более, что само понятие «компетентность» строго не определено. Можно его уточнять, выделяя составляющие, но при этом усложняется предварительная часть деятельности экспертной комиссии.

При использовании метода взаимооценки, помимо возможности проявления личностных и групповых симпатий и антипатий, играет роль неосведомленность экспертов о возможностях друг друга. В современных условиях

достаточно хорошее знакомство с работами и возможностями друг друга может быть лишь у специалистов, много лет работающих совместно. Однако привлечение таких пар специалистов не очень-то целесообразно, поскольку они слишком похожи друг на друга.

Использование формальных показателей (должность, ученые степень и звание, стаж, число публикаций...), очевидно, может носить вспомогательный характер. Успешность участия в предыдущих экспертизах – хороший критерий для деятельности дегустатора, врача, судьи в спортивных соревнованиях, т.е. таких экспертов, которые участвуют в длинных сериях однотипных экспертиз.

Есть полезный метод «снежного кома», при котором от каждого специалиста, привлекаемого в качестве эксперта, получают несколько фамилий тех, кто может быть экспертом по рассматриваемой тематике. Очевидно, некоторые из этих фамилий встречались ранее в деятельности РГ, а некоторые – новые. Процесс расширения списка останавливается, когда новые фамилии перестают встречаться. В результате получается достаточно обширный список возможных экспертов. Ясно, что если на первом этапе все эксперты были из одного «клана», то и метод «снежного кома» даст, скорее всего, лиц из этого «клана», мнения и аргументы других «кланов» будут упущены.

Необходимо подчеркнуть, что подбор экспертов в конечном счете – функция рабочей группы, и никакие методики подбора не снимают с нее ответственности. Другими словами, именно на рабочей группе лежит ответственность за компетентность экспертов, за их принципиальную способность решить поставленную задачу. Важным является требование к ЛПР об утверждении списка экспертов.

2. Математический аппарат, используемый в методах принятия решений

2.1. Вычисление главного собственного вектора примитивных матриц

Основы метода анализа иерархий базируются на классической теории матриц, изложенной в [9, 33, 60, 93, 94].

Матрицы парных сравнений МАИ представляют собой положительные обратносимметричные неприводимые матрицы, к которым предъявляется требование согласованности.

Квадратные матрицы $A = (a_{ij})$, для которых $a_{ij} > 0$, $i, j = 1, 2, \dots, n$, $a_{ij} = 1/a_{ji}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$, называются *положительными обратносимметричными матрицами*.

Положительные обратносимметричные матрицы $A = (a_{ij})$, для элементов которых выполняется соотношение $a_{ik} = a_{ij}a_{jk}$, $i, j, k = 1, 2, \dots, n$, являются *согласованными*.

Квадратная матрица – *неприводимая*, если она не может быть представлена в виде $\begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ A_2 & A_3 \end{bmatrix}$, где A_1 и A_3 – квадратные матрицы, 0 – нулевая матрица. В противном случае матрицу называют *приводимой*. Заметим, что в некоторых работах такие матрицы называют *неразложимыми* [33].

Пример. Матрица $A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ приводима.

Граф, соответствующий этой матрице, имеет дугу из первой в первую и третью вершины и аналогично – из третьей в первую и третью вершины, но переход во вторую вершину невозможен (рис. 2.1). Из второй вершины можно перейти во все три вершины.




Рис. 2.1. Граф, иллюстрирующий матрицу

Таким образом, первая и третья вершины образуют неприводимую компоненту, а вторая связана с ними.

Заметим, что комплексная матрица A неприводима в том и только в том случае, если ее направленный граф $D(A)$ – сильно связный.

Теорема. Квадратная матрица или неприводима, или не может быть приведена путем перестановок индексов к виду:

$$\begin{bmatrix} A_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & A_k & 0 & \dots & 0 \\ A_{k+1,1} & A_{k+1,2} & \dots & A_{k+1,k} & A_{k+1} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & \dots & A_{mk} & A_{m\ k+1} & \dots & A_m \end{bmatrix}$$

содержащему блок - диагональную матрицу с неприводимыми матрицами A_i на диагонали. При этом, по крайней мере, одна из матриц с двойным индексом в каждой строке, в которой они появляются, нулевая.

МАИ позволяет вычислять приоритеты альтернатив $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$. Приоритетами альтернатив, полученными на основе матрицы их парных сравнений, служат нормализованные значения главного собственного вектора матрицы.

Векторы x , для которых $Ax = \lambda x$ ($x \neq 0$), называются *собственными векторами*, а соответствующие им числа λ – *характеристическими*, или *собственными числами матрицы* A .

Собственные числа матрицы A являются корнями характеристического уравнения матрицы $|A - \lambda I| = 0$, где I – единичная матрица. Как полиномиальное уравнение относительно λ , оно имеет N корней. Каждому собственному значению ставится в соответствие собственный вектор, определенный с точностью до скалярного множителя.

В теореме Фробениуса [33] утверждается, что неприводимая неотрицательная матрица A (в теореме Перрона, что положительная матрица A) всегда имеет действительное положительное простое собственное значение λ_{max} . Причем модули всех других характеристических чисел не превосходят λ_{max} .

Теорема (Перрон -Фробениуса)

Пусть $A \geq 0$ – неприводимая матрица. Тогда:

1. A имеет действительное положительной простое (т.е. некратное) собственное значение λ_{max} , которое по модулю не меньше любого другого собственного значения матрицы A (некоторые из которых могут быть комплексными числами).

-
2. Собственный вектор A , соответствующий собственному значению λ_{max} , имеет положительные компоненты и, по существу (с точностью до постоянного множителя), единственен.
3. Число λ_{max} (иногда называемое конем Перрона матрицы A) удовлетворяет условию

$$\lambda_{max} = \max_{x \geq 0} \min_{1 \leq i \leq n} \frac{(Ax)_i}{x_i} = \min_{x \geq 0} \max_{1 \leq i \leq n} \frac{(Ax)_i}{x_i}; \quad x \geq 0 \text{ — произвольно.}$$

Следствие. Пусть $A \geq 0$ неприводима и пусть $x \geq 0$ произвольно. Тогда корень Перрона удовлетворяет условию

$$\min_{1 \leq i \leq n} \frac{(Ax)_i}{x_i} \leq \lambda_{max} \leq \max_{1 \leq i \leq n} \frac{(Ax)_i}{x_i}.$$

λ_{max} называют *главным собственным значением* (в некоторых источниках *корнем Перрона*) матрицы A , а соответствующий ему собственный вектор w — *главным собственным вектором*.

Таким образом, вычислять приоритеты элементов (находить главный собственный вектор) возможно следующим образом: составляется характеристическое уравнение матрицы A , среди корней данного уравнения выбирается наибольшее, вычисляется соответствующий собственный вектор w , значения вектора нормализуются. Составление и решение такого рода уравнений для каждой матрицы в методе анализа иерархий — достаточно трудоемкий и сложный процесс.

В МАИ предложено использовать другие способы получения главного собственного вектора матрицы, один из которых опирается на следствие к теореме Перрона-Фробениуса, при этом матрицы должны удовлетворять условию примитивности.

Если неприводимая неотрицательная матрица имеет всего h характеристических чисел: $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_h$ с максимальным модулем r ($\lambda_1 = |\lambda_2| = \dots = |\lambda_h| = r$), то такая матрица называется *примитивной* при $h = 1$ (главное собственное значение по модулю является единственным $\lambda_1 = \lambda_{max}$), при $h > 1$ матрица называется *импримитивной* (существуют характеристические корни матрицы, совпадающие по модулю с главным собственным значением). Т. Саати использует в качестве определения примитивной матрицы утверждение теоремы: неприводимая матрица $A \geq 0$ является примитивной в том и только в том случае, когда $\exists m \geq 1$, такое, что $A^m > 0$ (некоторая степень матрицы A положительна).

Основная теорема МАИ формулируется для примитивных матриц.

Теорема. Для примитивной матрицы A $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{A^k e}{\|A^k\|} = cw, \quad \|A^k\| = e^T A^k e,$

где c — постоянная, а w — собственный вектор, соответствующий $\lambda_{max} = \lambda_1$.

Используя следствие теоремы Перрона, получаем менее трудоемкий (при компьютерной поддержке) способ вычисления вектора приоритетов матрицы парных сравнений: матрица возводится в произвольно большие степени, вычисляются суммы элементов строк матрицы-результата, полученные суммы нормализуются. Такой подход предоставляет возможность находить главный собственный вектор матрицы A без использования характеристического уравнения, что намного облегчает процедуру его вычисления. Пример вычисления главного собственного вектора и классическим методом, и с использованием основной теоремы МАИ, рассмотрен нами в работе [20].

2.2. Иерархии и приоритеты

Первым этапом МАИ является построение иерархии, отражающей процесс принятия решений. Иерархии рассматриваются в [93] как специальный тип упорядоченного множества или частный случай графа. Первая интерпретация выбрана в качестве основы формального определения, а вторая — в качестве иллюстрации. Изложим некоторые математические основы иерархий.

Частично упорядоченным множеством называется множество S с бинарным отношением \leq , которое удовлетворяет законам рефлексивности, антисимметричности и транзитивности:

Рефлексивность: для всех x , $x \leq x$.

Антисимметричность: если $x \leq y$ и $y \leq x$, то $x = y$.

Транзитивность: если $x \leq y$ и $y \leq z$, то $x \leq z$.

Для любого отношения $x \leq y$ такого типа можно определить $x < y$, что означает $x \leq y$ и $x \neq y$.

Говорят, что y покрывает (доминирует) x , если $x < y$ и если $x < t < y$ невозможно ни для какого t .

Упорядоченные множества с конечным числом элементов могут быть удобно представлены направленным графом. Каждый элемент системы представлен вершиной так, что дуга направлена от a к b , если $a > b$.

Вполне упорядоченное множество (также называемое цепью) есть упорядоченное множество со следующим дополнительным свойством: если $x, y \in S$, то или $x \leq y$ или $y \leq x$.

Вводится обозначение $x^- = \{y \mid x \text{ покрывает } y\}$ и $x^+ = \{y \mid y \text{ покрывает } x\}$ для любого элемента x в упорядоченном множестве.

Пусть H — конечное частично упорядоченное множество с наибольшим элементом b . H есть *иерархия*, если выполняются следующие условия:

1. Существует разбиение H на подмножества L_k , $k = 1, 2, \dots, h$, где $L_1 = \{b\}$.

2. Из $x \in L_k$ следует, что $x^- \subset L_{k+1}$, $k = 1, \dots, h-1$.

3. Из $x \in L_k$ следует, что $x^+ \subset L_{k-1}$, $k = 2, \dots, h$.

Для каждого $x \in H$ существует весовая функция (сущность ее зависит от явления, для которого строится иерархия)

$$w_x : x^- \rightarrow [0;1], \text{ что } \sum_{y \in x^-} w_x(y) = 1.$$

Множества L_k являются уровнями иерархии, а функция w_x есть функция приоритета элемента одного уровня относительно цели x .

Пример. Рассмотрим иерархию H , построенную для задачи выбора руководителя из трех кандидатов. Элементами множества H в данном случае являются цель задачи и факторы, на нее влияющие, а также кандидаты на должность руководителя.




Рис. 2.2. Иерархия задачи «Выбор руководителя»

$H = \{\text{руководитель}, \text{организационные способности}, \text{профессионализм}, \text{личная активность}, \text{коммуникабельность}, \text{внимание к подчиненным}, \text{авторитет среди подчиненных}, \text{кандидат 1}, \text{кандидат 2}, \text{кандидат 3}\}$.

Для иерархии выполняются все условия определения.

1. Существует разбиение множества H на подмножества L_1, L_2, L_3 ($h = 3$), где $L_1 = \{\text{Руководитель}\}$, $L_2 = \{\text{организационные способности}, \text{профессионализм}, \text{личная активность}, \text{коммуникабельность}, \text{внимание к подчиненным}, \text{авторитет среди подчиненных}\}$, $L_3 = \{\text{кандидат 1}, \text{кандидат 2}, \text{кандидат 3}\}$.

2. Рассмотрим $x = \text{Руководитель} \in L_1$, в этом случае $x^- = L_2$. (аналогичные выводы справедливы и для всех других x).

3. Рассмотрим $x = \text{кандидат 1} \in L_3$, в этом случае $x^+ = L_2$. (аналогичные выводы справедливы и для всех других x).

Определим весовую функцию для элемента $x = \text{Руководитель}$. Эта функция ставит в соответствие качествам руководителя (элементам уровня L_2) значения из отрезка $[0, 1]$ и определяет приоритет этих качеств относи-

тельно цели – «Руководитель». Весовая функция задается субъективно экспертами. К примеру, она может быть такой:

$$\begin{aligned} w_{\text{руководитель}}(\text{орг. способ.}) &= 0,3; \quad w_{\text{руководитель}}(\text{профес.}) = 0,2; \\ w_{\text{руководитель}}(\text{личн. актив.}) &= 0,1; \quad w_{\text{руководитель}}(\text{коммуникабельность}) = 0,1; \\ w_{\text{руководитель}}(\text{внимание к под.}) &= 0,1; \quad w_{\text{руководитель}}(\text{авторитет}) = 0,2. \end{aligned}$$

Условие $\sum_{y \in S} w_x(y) = 1$ выполняется.

Основная задача МАИ заключается в следующем: как определить для любого заданного элемента $x \in L_\alpha$ и подмножества $S \subset L_\beta$ ($\alpha < \beta$) функцию $w_{x,S} : S \rightarrow [0;1]$, чтобы она отражала свойства функций приоритетов w_x на уровнях L_{k+1} , $k = \alpha, \dots, \beta - 1$. В частности, что это за функция $w_{x,L_h} : L_h \rightarrow [0;1]$.

В [93, 94] предлагается следующий метод решения основной задачи. Предположим, что $Y = L_k$, $X = L_{k+1}$. Пусть также существует элемент $z \in L_{k-1}$. Рассмотрим функции приоритетов

$$w_z : Y \rightarrow [0;1], \quad w_{y_j} : X \rightarrow [0;1], \quad j = 1, \dots, n_k,$$

где n_k – количество объектов на k -ом уровне иерархии.

Обозначим $w(x_i)$ функцию приоритета элемента x_i относительно цели z .

В [93] такая функция задается в виде $w(x_i) = \sum_{j=1}^{n_k} w_{y_j}(x_i) w_z(y_j)$, $i = 1, \dots, n_{k+1}$.

То есть, происходит процесс взвешивания показателя влияния элемента y_j на приоритет элемента x_i путем умножения этого показателя на важность элемента y_j относительно z . Если из $w_{y_j}(x_i)$ образовать матрицу B , положив $b_{ij} = w_{y_j}(x_i)$, $W = w(x_i)$, $W' = w_z(y_j)$, то окончательная формула примет вид: $W = BW'$. Такое взвешивание производится для каждого уровня иерархии.

Рассматривая процесс взвешивания на всей иерархии, получаем формулу вектора приоритетов самого низкого уровня относительно цели b : $W = B_h B_{h-1} \dots B W'$, где h – количество уровней в иерархии, W' – приоритет элементов первого уровня иерархии (в большинстве случаев первый уровень состоит из одного элемента – цели процесса принятия решений, в этом случае W' – скаляр).

2.3. Комплекты. Нечеткие множества. Нечеткие отношения

Четкие и нечеткие множества

Любые ситуации, требующие принятия решений, содержат, как правило, большое количество неопределенностей. В этом случае информация, на основе которой принимается решение, может быть выражена нечетко. Нача-

ло развития понятий нечетких множеств связано с именем Л.А. Заде. Современные понятия нечеткой логики представлены в работах А.Н. Мелихова [70, 71], А.Н. Борисова [23, 24, 25, 26], С.А. Орловского [81], Х. Райфа [89], А. Кофмана [56], В.Б. Кузьмина [57, 58], в работах [74, 78, 79, 87].

Множество A – четкое множество, если A – часть некоторого универсального для данной прикладной задачи множества U , характеризующегося условиями:

- все элементы множества четко различимы между собой, в множестве нет нескольких экземпляров некоторых элементов;
- относительно каждого элемента $u \in U$ можно четко определить, принадлежит он данному множеству или нет.

Эти условия позволяют охарактеризовать четкое множество его характеристической функцией, заданной на универсальном множестве U и принимающей значения в множестве $\{0, 1\}$:

$$\chi_A(u) = \begin{cases} 0, & u \notin A, \\ 1, & u \in A \end{cases} \quad u \in U.$$

Отказ от первого условия приводит к более общему, чем множество, понятию *комплекта*, допускающего наличие нескольких экземпляров некоторых элементов. Комплект характеризуется функцией экземплярности, заданной на универсальном множестве U и принимающей значения в множестве неотрицательных целых чисел: $\psi_A(u) \in \{0, 1, 2, \dots\}$ – число экземпляров элемента $u \in U$ в комплекте A .

Отказ от второго условия приводит к более общему, чем множество, понятию *нечеткого множества*, допускающего определение лишь некоторой степени принадлежности элементов такому множеству.

Нечетким подмножеством \tilde{A} множества X называется совокупность пар вида $\tilde{A} = \{<x, \mu_A(x)>\}$, где $x \in X$, а $\mu_A(x)$ – функция принадлежности, ставящая в соответствие множеству X отрезок $[0; 1]$.

X – базовое множество, или базовая шкала. В множество \tilde{A} не включаются элементы, для которых $\mu_A(x) = 0$. Нечеткое множество \emptyset – пустое, если $\mu_{\emptyset}(x) = 0$ для каждого $x \in X$. Нечеткое множество X – универсальное, если $\mu_X(x) = 1$ для каждого $x \in X$.

Функция принадлежности выбирается субъективно, зависит от субъекта, его настроения, цели построения множеств, решаемой задачи и т.д.

Пример.

Пусть X – множество отечественных машин. $X = \{\text{«Волга», «Ока», «Москвич», «Жигули»}\}$. Тогда можно определить нечеткое множество \tilde{A} хоро-

ших машин так: $\tilde{A} = \{(\text{«Волга»}; 1), (\text{«Запорожец»}; 0,4), (\text{«Москвич»}; 0,6), (\text{«Жигули»}; 0,8)\}$.

Пример.

Функция принадлежности четкому множеству $B = \{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$ принимает значение 1, если $0 \leq x \leq 2$ и значение 0 в противном случае. Ее график приведен на рисунке.




Рис. 2.3. График функции принадлежности множеству $B = \{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$

График же функции принадлежности любому нечеткому множеству (за исключением пустого и универсального множеств) будет представлять собой некую кривую. Рассмотрим, например, нечеткое множество $C = \{x \mid \text{«значение } x \text{ близко к } 1\}\}$. График его функции принадлежности может выглядеть так, как например на рис. 2.4.




Рис. 2.4. График функции принадлежности множеству $C = \{x \mid \text{«значение } x \text{ близко к } 1\}\}$

Носителем нечеткого множества \tilde{A} называется подмножество A множества X , содержащее те элементы из X , для которых значения функции принадлежности $\mu_A(x) > 0$. Следует заметить, что носитель нечеткого множества – это множество в обычном смысле.

Пример.

Пусть X – множество натуральных чисел. Тогда его нечеткое подмножество \tilde{M} очень малых чисел может быть таким: $\tilde{M} = \{(1; 1), (2; 0,8), (3; 0,7), (4; 0,6), (5; 0,5), (6; 0,3), (7; 0,1)\}$.

Носителем нечеткого множества \tilde{M} является множество $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Это обычное четкое подмножество множества X .

Нечеткие высказывания и операции над ними

Определение. Нечеткое высказывание – предложение, относительно которого можно судить о степени его истинности или ложности в настоящее время. Степень истинности или ложности $d(\tilde{A})$ принимает значения из $[0; 1]$.

Где 0, 1 – предельные значения степени истинности и совпадают с понятиями «ложи» и «истины» для четких высказываний.

Нечеткие высказывания со степенью истины 0,5 называются *индифферентностью*, поскольку оно истинно в той же мере, что и ложно.

Пример.

«2 – маленькое число» – нечеткое высказывание, степень истинности которого 0,9.

Определение. Отрицанием нечеткого высказывания \tilde{A} является высказывание $\neg \tilde{A}$, степень истинности которого определяется выражением $d(\neg \tilde{A}) = 1 - d(\tilde{A})$. Из этого определения следует, что степень ложности $\neg \tilde{A}$ совпадает со степенью истинности для \tilde{A} .

Определение. Конъюнцией нечетких высказываний \tilde{A} и \tilde{B} , называется нечеткое высказывание $\tilde{A} \& \tilde{B}$, степень истинности которого совпадает со степенью истинности менее истинного высказывания. $d(\tilde{A} \& \tilde{B}) = \min(d(\tilde{A}), d(\tilde{B}))$.

Определение. Дизъюнцией нечетких высказываний \tilde{A} и \tilde{B} , называется нечеткое высказывание $\tilde{A} \vee \tilde{B}$, степень истинности которого совпадает со степенью истинности более истинного высказывания $d(\tilde{A} \vee \tilde{B}) = \max(d(\tilde{A}), d(\tilde{B}))$.

Определение. Импликацией нечетких высказываний \tilde{A} и \tilde{B} , называется нечеткое высказывание $\tilde{A} \rightarrow \tilde{B}$, степень истинности которого $d(\tilde{A} \rightarrow \tilde{B}) = \max(1 - d(\tilde{A}), d(\tilde{B}))$. Истинность импликации не меньше чем степень ложности ее посылки или степень истинности ее следствия.

Пример.

Пусть нечеткое высказывание \tilde{A} имеет степень истинности 0,3; нечеткое высказывание $\tilde{B} = 0,6$. Импликация этих высказываний $\tilde{A} \rightarrow \tilde{B}$ будет иметь степень истинности $d(\tilde{A} \rightarrow \tilde{B}) = \max(0,7; 0,6) = 0,7$.

Степень импликации тем выше, чем меньше степень истинности посылки или больше степень истинности следствия.

Определение. Эквивалентностью нечетких высказываний \tilde{A} и \tilde{B} , называется нечеткое высказывание $\tilde{A} \leftrightarrow \tilde{B}$.

$$d(\tilde{A} \leftrightarrow \tilde{B}) = \min((\max(1 - d(\tilde{A}), d(\tilde{B})), (\max(1 - d(\tilde{B}), d(\tilde{A})))),$$

Истинность эквивалентности совпадает со степенью истинности менее истинной из импликаций $\tilde{A} \rightarrow \tilde{B}$ и $\tilde{B} \rightarrow \tilde{A}$.

Если степень истинности высказываний 0 или 1, то все определения соответствуют логическим операциям над четкими высказываниями.

Определение. Два высказывания \tilde{A} и \tilde{B} называются нечетко близкими, если степень истинности $\tilde{A} \leftrightarrow \tilde{B}$ больше или равна 0,5. В последнем случае будем называть \tilde{A} и \tilde{B} взаимно нечетко индифферентными.

Порядок выполнения операций над нечеткими высказываниями

- Скобки.
- Отрицание.
- Конъюнкция.
- Дизъюнкция.
- Импликация.
- Эквивалентность.

Пример.

Вычислим степень истинности составного нечеткого высказывания

$$\begin{aligned} \tilde{D} &= (\tilde{A} \& \tilde{B} \vee \tilde{A} \& \tilde{C}) \rightarrow (\tilde{A} \& \tilde{C}); \text{ если } \tilde{A} = 0,7; \tilde{B} = 0,4; \tilde{C} = 0,9. \\ \tilde{D} &= \max((1 - d(\tilde{A} \& \tilde{B} \vee \tilde{A} \& \tilde{C})), d(\tilde{A} \& \tilde{C})) = \\ &= \max((1 - \max(d(\tilde{A} \& \tilde{B}), d(\tilde{A} \& \tilde{C}))), d(1 - (\tilde{A} \& \tilde{C}))) = \\ &= \max((1 - \max(\min(d(\tilde{A}), 1 - d(\tilde{B})), \min(1 - d(\tilde{A}), d(\tilde{B})))), \\ &\quad 1 - \min(d(\tilde{A}), d(\tilde{C}))) = \\ &= \max((1 - \max(\min(0,7; 0,6), \min(0,3; 0,4))), 1 - \min(0,7; 0,9)) = \\ &= \max((1 - \max(0,6; 0,3)), 0,3) = \max(0,4; 0,3) = 0,4. \end{aligned}$$

Нечеткие логические формулы и их свойства

Определение. Нечеткая высказывательная переменная \tilde{x}_i – это нечеткое высказывание, степень истинности которого может принимать произвольное значение из отрезка $[0; 1]$.

Определение. Нечеткой логической формулой $\tilde{A}(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3, \dots, \tilde{x}_n)$, $n \geq 1$ называется:

- любая нечеткая высказывательная переменная или константа из $[0; 1]$,
- выражение $\tilde{A}(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3, \dots, \tilde{x}_n)$, полученное из нечетких логических формул $\tilde{A}_1(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3, \dots, \tilde{x}_n)$ и $\tilde{A}_2(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3, \dots, \tilde{x}_n)$ применением к ним любого конечного числа логических операций.

В частности составные нечеткие высказывания также являются нечеткими логическими формулами, если рассмотреть образующие их простые нечеткие высказывания как нечеткие высказывательные переменные.

Определение. Степень равносильности формул $\tilde{A}_1(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3, \dots, \tilde{x}_n)$ и $\tilde{A}_2(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3, \dots, \tilde{x}_n)$ обозначается $\mu(\tilde{A}_1, \tilde{A}_2)$ и определяется $\mu(\tilde{A}_1, \tilde{A}_2) = \&_{\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n} (\tilde{A}_1(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3, \dots, \tilde{x}_n) \leftrightarrow \tilde{A}_2(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3, \dots, \tilde{x}_n))$.

Если степень равносильности нечетких логических формул $\tilde{A}_1(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3, \dots, \tilde{x}_n)$ и $\tilde{A}_2(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3, \dots, \tilde{x}_n)$ на всех определенных наборах степеней истинности высказывательных переменных больше или равна 0,5, то такие формулы будем называть нечетко близкими на этих наборах и обозначать $\tilde{A}_1(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3, \dots, \tilde{x}_n) \approx \tilde{A}_2(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3, \dots, \tilde{x}_n)$.

Если $\mu(\tilde{A}_1, \tilde{A}_2) \leq 0,5$, то формулы не являются нечетко близкими:

$$\tilde{A}_1(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3, \dots, \tilde{x}_n) \not\approx \tilde{A}_2(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3, \dots, \tilde{x}_n).$$

Заметим, что при $\mu(\tilde{A}_1, \tilde{A}_2) = 0,5$ формулы $\tilde{A}_1(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3, \dots, \tilde{x}_n)$ и $\tilde{A}_2(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3, \dots, \tilde{x}_n)$ одновременно являются и не являются нечетко близкими. Их называют взаимно индифферентными и обозначают $\tilde{A}_1(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3, \dots, \tilde{x}_n) \sim \tilde{A}_2(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3, \dots, \tilde{x}_n)$.

Равносильность четких логических формул является частным случаем нечеткой близости.

Если \tilde{A}_1 и \tilde{A}_2 на одних и тех же наборах степеней истинности переменных принимают одни и те же значения степени истинности, то значение степени их равносильности всегда больше или равно 0,5, что является частным случаем нечеткой близости. То есть, нечеткие логические формулы, имеющие на одних и тех же наборах переменных одинаковые степени истинности не равносильны, а имеют некоторую степень равносильности $\geq 0,5$, но всегда ≥ 1 .

Пример.

Определить степень равносильности формул $\tilde{A}_1(\tilde{x}, \tilde{y})$ и $\tilde{A}_2(\tilde{x}, \tilde{y})$, где $\tilde{A}_1(\tilde{x}, \tilde{y}) = \tilde{\chi}_{\tilde{x} \rightarrow \tilde{y}}$, $\tilde{A}_2(\tilde{x}, \tilde{y}) = \tilde{x} \& \neg \tilde{y}$, \tilde{x} принимает значение степени истинности из множества дискретных значений $\{0,8; 0,6; 0,7\}$, а \tilde{y} из $\{0,3; 0,4\}$.

Решение.

$\mu(\tilde{A}_1, \tilde{A}_2) = \&_{\tilde{x}, \tilde{y}} (\tilde{\chi}_{\tilde{x} \rightarrow \tilde{y}} \leftrightarrow (\tilde{x} \& \neg \tilde{y}))$. Выбирая все возможные наборы степеней истинности \tilde{x} и \tilde{y} , запишем

$$\begin{aligned}\mu(\tilde{A}_1, \tilde{A}_2) = & ((\lceil 0,8 \rightarrow 0,3 \rceil \leftrightarrow (0,8 \& \lceil 0,3 \rceil)) \& (\lceil 0,8 \rightarrow 0,4 \rceil \leftrightarrow (0,8 \& \lceil 0,4 \rceil))) \\ & \& (\lceil 0,6 \rightarrow 0,3 \rceil \leftrightarrow (0,6 \& \lceil 0,3 \rceil)) \& (\lceil 0,6 \rightarrow 0,4 \rceil \leftrightarrow (0,6 \& \lceil 0,4 \rceil)) \& (\lceil 0,7 \\ & \rightarrow 0,3 \rceil \leftrightarrow (0,7 \& \lceil 0,3 \rceil)) \& (\lceil 0,7 \rightarrow 0,4 \rceil \leftrightarrow (0,7 \& \lceil 0,4 \rceil)) \& = (0,8 \leftrightarrow 0,7) \& \\ & (0,8 \leftrightarrow 0,6) \& (0,6 \leftrightarrow 0,6) \& (0,6 \leftrightarrow 0,6) \& (0,7 \leftrightarrow 0,7) \& (0,7 \leftrightarrow 0,6) = 0,7 \& \\ & 0,6 \& 0,6 \& 0,6 \& 0,7 \& 0,6 = 0,6.\end{aligned}$$

Откуда следует, формулы \tilde{A}_1, \tilde{A}_2 нечетко близки при заданных наборах степеней истинности.

Если сделать такую же проверку, полагая, что \tilde{x} принимает значение из набора $\{0,2; 0,4\}$, а \tilde{y} из $\{0,6; 0,7; 0,8\}$, то $\mu(\tilde{A}_1, \tilde{A}_2) = 0,2$. И в этом случае формулы не являются нечетко близкими.

Определение. Если при всех определенных значениях степени истинности нечетких переменных $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3, \dots, \tilde{x}_n$, значение степени истинности нечеткой логической формулы $\tilde{A}(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3, \dots, \tilde{x}_n)$ больше или равно 0,5, то формула является нечетко истинной на данных наборах переменных и обозначается через \tilde{I} . Если значение степени истинности меньше или равно 0,5, то такую формулу будем называть нечетко ложной на данных наборах переменных и обозначим \tilde{L} .

Пусть $\tilde{I}_1, \tilde{I}_2, \tilde{L}_1, \tilde{L}_2$ – некоторые нечетко истинные и нечетко ложные формулы на одних и тех же наборах переменных, тогда справедливы следующие соотношения.

$$\tilde{I}_1 \vee \tilde{I}_2 \approx \tilde{I}_1 \approx \tilde{I}_2 \approx \tilde{I}_1 \& \tilde{I}_2,$$

$$\tilde{L}_1 \vee \tilde{L}_2 \approx \tilde{L}_1 \approx \tilde{L}_2 \approx \tilde{L}_1 \& \tilde{L}_2,$$

$$\tilde{I}_1 \& \tilde{I}_2 \approx \tilde{I}_1,$$

$$\tilde{I}_1 \vee \tilde{L}_1 \approx \tilde{I}_1.$$

Если \tilde{A}_1, \tilde{A}_2 – произвольные нечеткие логические формулы, то справедливы соотношения:

$$\tilde{A}_1 \vee \tilde{A}_2 \approx \tilde{A}_2 \vee \tilde{A}_1,$$

$$\tilde{A}_1 \& \tilde{A}_2 \approx \tilde{A}_2 \& \tilde{A}_1,$$

где $\tilde{A}_1, \tilde{A}_2, \tilde{I}_1, \tilde{I}_2, \tilde{L}_1, \tilde{L}_2$ определены на одних и тех же наборах переменных.

Пример.

Приведем простейший пример нечетко истинных и нечетко ложных формул.

$$\tilde{I} = \tilde{x} \& \tilde{\lceil x}$$

$$\tilde{I} = \tilde{x} \vee \tilde{\lceil x} .$$

Это следует из определения операций отрицания, конъюнкции и дизъюнкции, т.к. $\tilde{x} \& \tilde{\lceil x} \leq 0,5$, $\tilde{x} \vee \tilde{\lceil x} \geq 0,5$.

Тождества позволяют определить класс нечетко близких формул, не имеющих аналогов в нечеткой логике.

Соотношения, справедливые для любых наборов значений истинности нечетких переменных.

Пусть $\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}$ – нечеткие логические формулы.

$$\lceil(\lceil \tilde{x}) \approx \tilde{x} ; \quad (1)$$

$$\tilde{x} \& \tilde{x} \approx \tilde{x} ; \quad (2)$$

$$\tilde{x} \vee \tilde{x} \approx \tilde{x}$$

$$\tilde{x} \& \tilde{y} \approx \tilde{y} \& \tilde{x} ; \quad (3)$$

$$\tilde{x} \vee \tilde{y} \approx \tilde{y} \vee \tilde{x}$$

$$\tilde{x} \& (\tilde{y} \& \tilde{z}) \approx (\tilde{x} \& \tilde{y}) \& \tilde{z} \approx \tilde{x} \& \tilde{y} \& \tilde{z} ; \quad (4)$$

$$\tilde{x} \vee (\tilde{y} \vee \tilde{z}) \approx (\tilde{x} \vee \tilde{y}) \vee \tilde{z} \approx \tilde{x} \vee \tilde{y} \vee \tilde{z} ;$$

$$\tilde{x} \& (\tilde{y} \vee \tilde{z}) \approx (\tilde{x} \& \tilde{y}) \vee (\tilde{x} \& \tilde{z}) ; \quad (5)$$

$$\tilde{x} \vee (\tilde{y} \& \tilde{z}) \approx (\tilde{x} \vee \tilde{y}) \& (\tilde{x} \vee \tilde{z}) ;$$

$$\lceil(\tilde{x} \& \tilde{y}) \approx \lceil \tilde{x} \vee \lceil \tilde{y} ; \quad (6)$$

$$\lceil(\tilde{x} \vee \tilde{y}) \approx \lceil \tilde{x} \& \lceil \tilde{y} ;$$

$$\tilde{x} \& (\tilde{x} \vee \tilde{y}) \approx \tilde{x} ; \quad (7)$$

$$\tilde{x} \vee (\tilde{x} \& \tilde{y}) \approx \tilde{x} ;$$

$$(\tilde{x} \vee \tilde{y}) \vee (\tilde{x} \& \tilde{y}) \approx \tilde{x} \vee \tilde{y} ; \quad (8)$$

$$(\tilde{x} \vee \tilde{y}) \& (\tilde{x} \& \tilde{y}) \approx \tilde{x} \& \tilde{y} ; \quad (9)$$

$$\tilde{x} \& \lceil \tilde{x} \approx \tilde{y} \& \lceil \tilde{y} ; \quad (10)$$

$$\tilde{x} \vee \lceil \tilde{x} \vee \tilde{y} \approx \tilde{y} \vee \lceil \tilde{y} \vee \tilde{x} ; \quad (11)$$

$$(\tilde{x} \& \lceil \tilde{x}) \& (\tilde{y} \vee \lceil \tilde{y}) \approx \tilde{x} \& \lceil \tilde{x} ; \quad (12)$$

$$(\tilde{x} \vee \lceil \tilde{x}) \vee (\tilde{y} \& \lceil \tilde{y}) \approx \tilde{x} \vee \lceil \tilde{x} ;$$

$$\tilde{x} \rightarrow \tilde{y} \approx \lceil \tilde{y} \rightarrow \lceil \tilde{x} ; \quad (13)$$

$$\lceil \tilde{x} \rightarrow \tilde{y} \approx \lceil \tilde{y} \rightarrow \tilde{x} \approx \tilde{x} \vee \tilde{y} ; \quad (14)$$

$$\tilde{x} \rightarrow (\tilde{y} \vee \lceil \tilde{y}) \approx (\tilde{x} \& \lceil \tilde{x}) \rightarrow \tilde{y} ; \quad (15)$$

$$(\tilde{x} \& \tilde{x}) \rightarrow (\tilde{y} \vee \tilde{z}) \approx (\tilde{y} \& \tilde{y}) \rightarrow \tilde{x} \vee \tilde{z}. \quad (16)$$

Кроме того, пусть $0, c, 1$ – константы и $0 < c < 1$, тогда

$$\tilde{x} \& 0 \approx 0, \quad \tilde{x} \& 1 \approx \tilde{x}$$

$$\tilde{x} \vee 0 \approx \tilde{x}, \quad \tilde{x} \vee 1 \approx 1$$

$$\tilde{x} \& c \approx \begin{cases} \tilde{x}, & \text{если } \tilde{x} \leq c, \\ c, & \text{если } \tilde{x} \geq c. \end{cases}$$

$$\tilde{x} \vee c \approx \begin{cases} c, & \text{если } \tilde{x} \leq c, \\ \tilde{x}, & \text{если } \tilde{x} \geq c. \end{cases}$$

Для доказательства каждого из выражений необходимо показать, что степень равносильности $\mu(\tilde{A}_1, \tilde{A}_2)$ образующих его формул \tilde{A}_1, \tilde{A}_2 больше или равно 0,5.

Это возможно тогда, когда формулы \tilde{A}_1, \tilde{A}_2 принимают одни и те же значения степени истинности на одинаковых наборах переменных либо имеют степень истинности одновременно меньше или равно 0,5 или больше или равно 0,5 на одинаковых наборах переменных.

Докажем формулу (6) $\neg(\tilde{x} \& \tilde{y}) \approx \neg\tilde{x} \vee \neg\tilde{y}$, обозначим

$$\tilde{A}_1(\tilde{x}, \tilde{y}) = \neg(\tilde{x} \& \tilde{y}), \quad \tilde{A}_2(\tilde{x}, \tilde{y}) = \neg\tilde{x} \vee \neg\tilde{y}.$$

$d(\tilde{A}_1(\tilde{x}, \tilde{y})) = 1 - \min(d(\tilde{x}), d(\tilde{y}))$, $d(\tilde{A}_2(\tilde{x}, \tilde{y})) = \max(1 - d(\tilde{x}), 1 - d(\tilde{y}))$. Если $d(\tilde{x}) < d(\tilde{y})$, тогда $d(\tilde{A}_1(\tilde{x}, \tilde{y})) = 1 - d(\tilde{x})$ и $d(\tilde{A}_2(\tilde{x}, \tilde{y})) = 1 - d(\tilde{x})$, т.е. при всех \tilde{x} степени истинности формул $\tilde{A}_1(\tilde{x}, \tilde{y})$ и $\tilde{A}_2(\tilde{x}, \tilde{y})$ совпадают, откуда следует $\mu(\tilde{A}_1, \tilde{A}_2) \geq 0,5$.

Если $d(\tilde{x}) > d(\tilde{y})$, то $d(\tilde{A}_1(\tilde{x}, \tilde{y})) = 1 - d(\tilde{y})$, $d(\tilde{A}_2(\tilde{x}, \tilde{y})) = 1 - d(\tilde{y})$, откуда следует $\mu(\tilde{A}_1, \tilde{A}_2) \geq 0,5$.

Если $d(\tilde{x}) = d(\tilde{y})$, то $d(\tilde{A}_1(\tilde{x}, \tilde{y})) = 1 - d(\tilde{x})$, $d(\tilde{A}_2(\tilde{x}, \tilde{y})) = 1 - d(\tilde{y})$, откуда следует $\mu(\tilde{A}_1, \tilde{A}_2) \geq 0,5$.

Нечеткие предикаты и кванторы

Определение. Нечеткие логические формулы, которые определены на каком-либо множестве X и принимают свои значения из замкнутого интервала $[0, 1]$ называют нечетким предикатом.

Например, μ_A – функция принадлежности является одноместным нечетким предикатом.

Пример.

$X = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$, тогда нечеткий предикат «быть небольшим числом» принимает следующие значения: $\tilde{A}(1) = 1$, $\tilde{A}(2) = 0,9$, $\tilde{A}(3) = 0,7$, $\tilde{A}(4) = 0,5$, $\tilde{A}(5) = 0,1$, $\tilde{A}(6) = 0$, $\tilde{A}(7) = 0$, $\tilde{A}(8) = 0$, $\tilde{A}(9) = 0$, $\tilde{A}(10) = 0$ и фактически задает нечеткое множество $\tilde{A} = \{(1; 1), (2; 0,9), (3; 0,7), (4; 0,5), (5; 0,1)\}$ в множестве X .

Пусть область определения нечеткого предиката \tilde{A} является множество $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$, тогда для каждого $x \in X$ может быть вычислено значение $\mu_{\tilde{A}}(x)$ предиката $\tilde{A}(x)$.

Определение. Величина $\mu(\tilde{A}) = \mu_A(x_1) \& \mu_A(x_2) \& \mu_A(x_3) \& \dots \& \mu_A(x_n) = \&_{x \in X} \mu_A(x)$ называется степенью общности свойств $\tilde{A}(x)$ для элементов множества X .

Если $\mu(\tilde{A}) \geq 0,5$, то на логическую формулу $\tilde{A}(x)$ может быть навешан квантор нечеткой общности $\tilde{\forall}$, который читается «для всех» или «для любого».

Определение. Величина $v(\tilde{A}) = \mu_A(x_1) \vee \mu_A(x_2) \vee \mu_A(x_3) \vee \dots \vee \mu_A(x_n) = \vee_{x \in X} \mu_A(x)$ называется степенью существования свойства $\tilde{A}(x)$ для элементов множества X .

Если $v(\tilde{A}) \geq 0,5$, то на логическую формулу $\tilde{A}(x)$ может быть навешан квантор нечеткого существования $\tilde{\exists}$, который читается «существует такой» или «имеется такой».

Пусть $\tilde{A}(x)$ – нечеткая логическая формула от одной переменной, принимающей значения из X . Выражение $(\tilde{\forall} x \in X) \tilde{A}(x)$ является нечетко истинной формулой и читается «для любого $x \in X$ степень истинности $\tilde{A}(x)$ больше или равно 0,5».

Операции над нечеткими множествами.

Нечеткое включение и нечеткое равенство множеств

Также как над четкими множествами определяются логические операции включения, равенства, объединения, пересечения, дополнения и т.д., определяются они и над нечеткими множествами, только делается это при помощи функции принадлежности.

Определение. Пусть заданы нечеткие подмножества \tilde{A}, \tilde{B} множества X .

Степень включения $V(\tilde{A}, \tilde{B})$ нечеткого множества \tilde{A} в нечеткое множество

\tilde{B} находится по формуле $V(\tilde{A}, \tilde{B}) = \&_{x \in X} (\mu_A(x) \rightarrow \mu_B(x))$, где $\mu_A(x)$,

$\mu_B(x)$ понимаются как нечеткие высказывательные переменные, \rightarrow – импликация, $\&$ – операция конъюнкции, которая берется по всем $x \in X$.

Если $V(\tilde{A}, \tilde{B}) \geq 0,5$, то \tilde{A} нечетко включается в множество \tilde{B} и обозначается $\tilde{A} \subset \tilde{B}$. Если $V(\tilde{A}, \tilde{B}) \leq 0,5$, то \tilde{A} нечетко не включается в множество \tilde{B} и обозначается $\tilde{A} \not\subset \tilde{B}$. Это понятие является обобщением понятия включения для четких множеств. Действительно, пусть A и B – четкие множества и $A \subseteq B$, отсюда следует $V(A, B) = 1$. Если же $A \not\subseteq B$, то $V(A, B) = 0$.

Пример.

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}.$$

$\tilde{A} = \{(x_1; 0,3), (x_3; 0,6), (x_5; 0,4)\}$, $\tilde{B} = \{(x_1; 0,8), (x_2; 0,5), (x_3; 0,7), (x_5; 0,6)\}$, тогда $V(\tilde{A}, \tilde{B}) = (0 \rightarrow 0,8) \& (0,3 \rightarrow 0,5) \& (0,6 \rightarrow 0,7) \& (0 \rightarrow 0) \& (0,4 \rightarrow 0,6) = 1 \& 0,7 \& 0,7 \& 1 \& 0,6 = 0,6$.

Аналогично можно вычислить $V(\tilde{B}, \tilde{A}) = 0,2$, откуда следует $\tilde{A} \subset \tilde{B}$, но $\tilde{B} \not\subset \tilde{A}$.

Определение. Множество \tilde{A} включается во множество \tilde{B} – $\tilde{A} \subset \tilde{B}$ если $\forall x \in X, \mu_A(x) \leq \mu_B(x)$.

Справедливо следующее утверждение: если нечеткое множество \tilde{A} включается в нечеткое множество \tilde{B} , то выполняется и нечеткое включение $\tilde{A} \subset \tilde{B}$.

Действительно, пусть выполняется $\forall x \in X, \mu_A(x) \leq \mu_B(x)$, докажем, что $V(\tilde{A}, \tilde{B}) \geq 0,5$.

Если

$\mu_A(x) \leq \mu_B(x) \leq 0,5$, то $V(\tilde{A}, \tilde{B}) = (\mu_A(x_1) \rightarrow \mu_B(x_1)) \& (\mu_A(x_2) \rightarrow \mu_B(x_2)) \& \dots$
 $(\mu_A(x_n) \rightarrow \mu_B(x_n)) = (\max(1 - \mu_A(x_1), \mu_B(x_1))) \& (\max(1 - \mu_A(x_2), \mu_B(x_2))) \& \dots$
 $\& (\max(1 - \mu_A(x_n), \mu_B(x_n))) = (1 - \mu_A(x_1)) \& (1 - \mu_A(x_2)) \& \dots \& (1 - \mu_A(x_n))$. Из определения операции конъюнкции следует, что результат будет минимальным из всех $(1 - \mu_A(x_i))$, $i = 1 \dots n$. А поскольку для $\forall x \in X \mu_A(x) \leq 0,5$, то $V(\tilde{A}, \tilde{B}) \geq 0,5$.

Если $0,5 < \mu_A(x) \leq \mu_B(x)$, то $V(\tilde{A}, \tilde{B}) = (\mu_A(x_1) \rightarrow \mu_B(x_1)) \& (\mu_A(x_2) \rightarrow \mu_B(x_2)) \& \dots (\mu_A(x_n) \rightarrow \mu_B(x_n)) = (\max(1 - \mu_A(x_1), \mu_B(x_1))) \& (\max(1 - \mu_A(x_2), \mu_B(x_2))) \& \dots \& (\max(1 - \mu_A(x_n), \mu_B(x_n))) = (\mu_B(x_1)) \& (\mu_B(x_2)) \& \dots \& (\mu_B(x_n))$. Так как для $\forall x \in X \mu_B(x) > 0,5$, то $V(\tilde{A}, \tilde{B}) > 0,5$.

То есть, для любых $V(\tilde{A}, \tilde{B}) \geq 0,5$ для любых значений функций принадлежности $\mu_A(x)$ и $\mu_B(x)$, $\forall x \in X$.

Если же выполняется $V(\tilde{A}, \tilde{B}) \geq 0,5$, то из этого не следует, что $\forall x \in X, \mu_A(x) \leq \mu_B(x)$. Действительно, $V(\tilde{A}, \tilde{B}) = (\mu_A(x_1) \rightarrow \mu_B(x_1)) \& (\mu_A(x_2) \rightarrow \mu_B(x_2)) \& \dots (\mu_A(x_n) \rightarrow \mu_B(x_n)) = (\max(1 - \mu_A(x_1), \mu_B(x_1))) \& (\max(1 - \mu_A(x_2), \mu_B(x_2))) \& \dots \& (\max(1 - \mu_A(x_n), \mu_B(x_n)))$, так как $V(\tilde{A}, \tilde{B}) \geq 0,5$, то по определению операции конъюнкции минимальное, а значит и все остальные значения выражений $\max(1 - \mu_A(x_i), \mu_B(x_i)) \geq 0,5$. Однако заметим, если, например $\mu_A(x_i) = 0,3$, а $\mu_B(x_i) = 0,2$, то $\max(1 - \mu_A(x_i), \mu_B(x_i)) \geq 0,5$, но $\mu_A(x_i) \geq \mu_B(x_i)$. То есть, включение множества \tilde{A} во множество \tilde{B} не гарантирует нечеткого включения, а является лишь достаточным условием нечеткого включения.

Определение. Степень равенства двух нечетких подмножеств \tilde{A}, \tilde{B} множества X определяется как $\mu(\tilde{A}, \tilde{B}) = \&_{x \in X} (\mu_A(x) \leftrightarrow \mu_B(x))$. Если $\mu(\tilde{A}, \tilde{B}) \geq 0,5$, то множества нечетко равны $\tilde{A} \approx \tilde{B}$. Если $\mu(\tilde{A}, \tilde{B}) \leq 0,5$, то множества нечетко не равны $\tilde{A} \neq \tilde{B}$. Если $\mu(\tilde{A}, \tilde{B}) = 0,5$, то множества взаимно индифферентны $\tilde{A} \sim \tilde{B}$.

Понятия нечеткого равенства и неравенства, индифферентности являются обобщением понятий равенства и неравенства для четких множеств. Действительно, пусть A и B – четкие множества, тогда в случае $A = B$, $\mu(A, B) = 1$, если же $A \neq B$ и $\mu(A, B) = 0$.

Пример.

$$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_5\},$$

$$\tilde{A} = \{(x_2; 0,8), (x_3; 0,6), (x_5; 0,1)\},$$

$$\tilde{B} = \{(x_1; 0,3), (x_2; 0,6), (x_3; 0,7), (x_4; 0,2), (x_5; 0,3)\}.$$

$$\mu(\tilde{A}, \tilde{B}) = (0 \leftrightarrow 0,3) \& (0,8 \leftrightarrow 0,6) \& (0,6 \leftrightarrow 0,7) \& (0 \leftrightarrow 0,2) \& (0,1 \leftrightarrow 0,3) = \\ = 0,7 \& 0,6 \& 0,6 \& 0,8 \& 0,7 = 0,6, \text{ откуда следует } \tilde{A} \approx \tilde{B}.$$

Преобразуем степень равенства $\mu(\tilde{A}, \tilde{B}) = \bigwedge_{x \in X} (\mu_A(x) \leftrightarrow \mu_B(x)) =$
 $= \bigwedge_{x \in X} ((\mu_A(x) \rightarrow \mu_B(x)) \& (\mu_B(x) \rightarrow \mu_A(x))),$ в виду коммутативности
 конъюнкции $\mu(\tilde{A}, \tilde{B}) = (\bigwedge_{x \in X} (\mu_A(x) \rightarrow \mu_B(x))) \& (\bigwedge_{x \in X} (\mu_B(x) \rightarrow \mu_A(x))),$
 отсюда следует $\mu(\tilde{A}, \tilde{B}) = V(\tilde{A}, \tilde{B}) \& V(\tilde{B}, \tilde{A}),$ т.е. степень равенства нечетких множеств равна минимальной из степеней их взаимного включения.
 Если $\mu(\tilde{A}, \tilde{B}) \geq 0,5,$ т.е. множества \tilde{A}, \tilde{B} нечетко равны, то $V(\tilde{A}, \tilde{B}) \geq 0,5$
 и $V(\tilde{B}, \tilde{A}) \geq 0,5, \Rightarrow \tilde{A} \subsetneq \tilde{B} \text{ и } \tilde{B} \subsetneq \tilde{A}.$ Отсюда следует метод доказательства нечеткого равенства нечетких множеств, основанный на доказательстве взаимного нечеткого включения.

Определение. Нечеткое множество \tilde{A} равно нечеткому множеству \tilde{B}
 $\tilde{A} = \tilde{B}, \text{ если } \forall x \in X, \mu_B(x) = \mu_A(x).$

Нетрудно заметить, если выполняется равенство множеств $\tilde{A} = \tilde{B},$ то эти множества являются и нечетко равными $\tilde{A} \approx \tilde{B}.$ Действительно, если $\mu_B(x) = \mu_A(x) \forall x \in X,$ то $\mu(\tilde{A}, \tilde{B}) = \bigwedge_{x \in X} (\mu_A(x) \leftrightarrow \mu_B(x)) = V(\tilde{A}, \tilde{B}) \& V(\tilde{B}, \tilde{A}) \geq 0,5.$

Теоретико-множественные операции

Пусть заданы нечеткие подмножества \tilde{A}, \tilde{B} множества $X.$

$$\tilde{A} = \{x, \mu_A(x)\}, \tilde{B} = \{x, \mu_B(x)\}, x \in X.$$

Определение. Объединением нечетких множеств $\tilde{A} \cup \tilde{B}$ является множество $\tilde{A} \cup \tilde{B} = \{x, \mu_{A \cup B}(x)\}, x \in X,$ функция принадлежности элементов к которому определяется как $\mu_{A \cup B}(x) = \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} = \mu_A(x) \vee \mu_B(x)$ (рис. 2.5).




Рис. 2.5. Объединение нечетких множеств

Т.е. $\tilde{A} \cup \tilde{B}$ – это нечеткое множество, такое, что $\tilde{A} \subseteq \tilde{A} \cup \tilde{B}$ и $\tilde{B} \subseteq \tilde{A} \cup \tilde{B}$.

Определение. Пересечением нечетких множеств $A \cap B$ называется множество $\tilde{A} \cap \tilde{B} = \{x, \mu_{A \cap B}(x)\}, x \in X$, функция принадлежности элементов к которому определяется как $\mu_{A \cap B}(x) = \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} = \mu_A(x) \& \mu_B(x)$ (рис. 2.6).




Рис. 2.6. Пересечение нечетких множеств

Т.е. $\tilde{A} \cap \tilde{B}$ – это нечеткое множество, такое, что $\tilde{A} \cap \tilde{B} \subseteq \tilde{A}$ и $\tilde{A} \cap \tilde{B} \subseteq \tilde{B}$.

Определение. Дополнением нечеткого множества \tilde{A} называется множество $\tilde{A}^c = \{x, \mu_{\tilde{A}^c}(x)\}, x \in X$, такое, что $\mu_{\tilde{A}^c}(x) = 1 - \mu_A(x), x \in X$.

Пример.

Рассмотрим нечеткое множество \tilde{B} чисел, гораздо больших нуля. До-

полнением к этому множеству будет являться множество \tilde{A} чисел, гораздо меньших нуля (рис. 2.7.).




Рис. 2.7. Дополнение нечеткого множества

Определение. Разностью нечетких множеств называется множество $\tilde{A} \setminus \tilde{B} = \{x; \mu_{A \setminus B}(x)\}, x \in X$, функция принадлежности элементов к которому определяется как $\mu_{A \setminus B}(x) = \mu_A(x) \& \tilde{\mu}_B(x)$.

Определение. Симметрической разностью $\tilde{A} \Theta \tilde{B}$ называется множество $\tilde{A} \Theta \tilde{B} = \{(x; \mu_{A \Theta B}(x)), \text{ где } \mu_{A \Theta B}(x) = \mu_{A \setminus B}(x) \vee \mu_{B \setminus A}(x)\}$.

Пример.

$$\tilde{A} = \{(x_1; 0,3), (x_3; 0,8), (x_6; 0,4)\}$$

$$\tilde{B} = \{(x_1; 0,9), (x_2; 0,2), (x_3; 0,4), (x_4; 0,5)\}.$$

$$\tilde{A} \vee \tilde{B} = \{(x_1; 0,9), (x_2; 0,2), (x_3; 0,4), (x_4; 0,5), (x_6; 0,4)\}.$$

$$\tilde{A} \wedge \tilde{B} = \{(x_1; 0,3), (x_3; 0,4)\}.$$

$$\tilde{A} = \{(x_1; 0,7), (x_2; 1), (x_3; 0,2), (x_4; 1), (x_5; 1), (x_6; 0,6), (x_7; 1)\}.$$

$$\tilde{A} \setminus \tilde{B} = \{(x_1; 0,1), (x_3; 0,6), (x_6; 0,4)\}.$$

$$\tilde{A} \Theta \tilde{B} = \{(x_1; 0,7), (x_2; 0,2), (x_3; 0,2), (x_4; 0,5), (x_6; 0,6)\}.$$

Определение. Выпуклой комбинацией множеств A_1, A_2, \dots, A_n называется нечеткое множество A с функцией принадлежности

$$\mu_A(x) = \sum \lambda_i \mu_i(x), \text{ где } \lambda_i \geq 0, i=1, 2, 3, \dots, n, \text{ и } \sum \lambda_i = 1.$$

Определение. Множеством уровня α нечеткого множества \tilde{A} в X , называется множество в обычном смысле, составленное из элементов $x \in X$, степени принадлежности которых нечеткому множеству A больше или равны α . $A\alpha = \{x | x \in X, \mu_A(x) \geq \alpha\}$.

Определение. Прямым произведением нечетких множеств \tilde{A} и \tilde{B} называется и через $\tilde{A} \times \tilde{B}$ обозначается нечеткое подмножество $X \times Y$, которое определяется выражением $\tilde{A} \times \tilde{B} = \{\langle (x, y), \mu_{AxB}(x, y) \rangle\}, x \in X, y \in Y$, где $\mu_{AxB}(x, y) = \mu_A(x) \& \mu_B(y)$.

Определение. Композицией нечетких множеств \tilde{A} и \tilde{B} называется множество

$$\tilde{F} \circ \tilde{P} = \{\langle (x, z), \mu_{F \circ P}(x, z) \rangle, (x \times z) \in X \times Z\},$$

$$\mu_{F \circ P}(x, z) = \vee_{y \in Y} (\mu_F(x, y) \& \mu_P(y, z)).$$

Основные свойства нечетких множеств:

1. $\overline{(\overline{\tilde{A}})} \approx \tilde{A}$ инволюция.
2. $\tilde{A} \vee \tilde{A} \approx \tilde{A}$, $\tilde{A} \wedge \tilde{A} \approx \tilde{A}$ идемпотентность.
3. $\tilde{A} \vee \tilde{B} \approx \tilde{B} \vee \tilde{A}$, $\tilde{A} \wedge \tilde{B} \approx \tilde{B} \wedge \tilde{A}$ коммутативность.
4. $\tilde{A} \vee (\tilde{B} \vee \tilde{C}) \approx (\tilde{A} \vee \tilde{B}) \vee \tilde{C} \approx \tilde{A} \vee \tilde{B} \vee \tilde{C}$, $\tilde{A} \wedge (\tilde{B} \wedge \tilde{C}) \approx (\tilde{A} \wedge \tilde{B}) \wedge \tilde{C} \approx \tilde{A} \wedge \tilde{B} \wedge \tilde{C}$ ассоциативность.
5. $\tilde{A} \vee (\tilde{B} \wedge \tilde{C}) \approx (\tilde{A} \vee \tilde{B}) \wedge (\tilde{A} \vee \tilde{C})$, $\tilde{A} \wedge (\tilde{B} \vee \tilde{C}) \approx (\tilde{A} \wedge \tilde{B}) \vee (\tilde{A} \wedge \tilde{C})$ дистрибутивность.
6. $\overline{(\tilde{A} \vee \tilde{B})} \approx \overline{\tilde{A}} \wedge \overline{\tilde{B}}$, $\overline{(\tilde{A} \wedge \tilde{B})} \approx \overline{\tilde{A}} \vee \overline{\tilde{B}}$ законы де Моргана.
7. $\tilde{A} \vee \overline{\tilde{A}} \approx \tilde{B} \vee \overline{\tilde{B}}$, $\tilde{A} \wedge \overline{\tilde{A}} \approx \tilde{B} \wedge \overline{\tilde{B}}$.
8. $\tilde{A} \vee \overline{\tilde{A} \vee \tilde{B}} \approx \tilde{B} \vee \overline{\tilde{B} \vee \tilde{A}}$, $\tilde{A} \wedge \overline{\tilde{A} \wedge \tilde{B}} \approx \tilde{B} \wedge \overline{\tilde{B} \wedge \tilde{A}}$.
9. $(\tilde{A} \vee \overline{\tilde{A}}) \vee (\tilde{B} \wedge \overline{\tilde{B}}) \approx \tilde{A} \vee \overline{\tilde{A}}$, $(\tilde{A} \wedge \overline{\tilde{A}}) \wedge (\tilde{B} \vee \overline{\tilde{B}}) \approx \tilde{B} \vee \overline{\tilde{B}}$.
10. $\tilde{A} \setminus \tilde{B} \approx \tilde{A} \wedge \overline{\tilde{B}}$.
11. $\tilde{A} \Theta \tilde{B} \approx \tilde{B} \Theta \tilde{A}$.

12. $\tilde{A} \Theta (\tilde{B} \Theta \tilde{C}) \approx (\tilde{A} \Theta \tilde{B}) \Theta \tilde{C} \approx \tilde{A} \Theta \tilde{B} \Theta \tilde{C}$.
13. $\tilde{A} \Theta \tilde{B} \approx (\tilde{A} \setminus \tilde{B}) \vee (\tilde{B} \setminus \tilde{A})$.
14. $(\tilde{A} \subsetneq \tilde{B}) \approx (\lceil \tilde{B} \subsetneq \lceil \tilde{A})$.
15. $(\lceil \tilde{A} \subsetneq \tilde{B}) \approx (\lceil \tilde{B} \subsetneq \tilde{A})$.
16. $(\tilde{A} \subsetneq (\tilde{B} \vee \lceil \tilde{B})) \approx ((\tilde{A} \wedge \lceil \tilde{A}) \subsetneq \tilde{B})$.
17. $((\tilde{A} \wedge \lceil \tilde{A}) \subsetneq (\tilde{B} \vee \tilde{C})) \approx ((\tilde{B} \wedge \lceil \tilde{B}) \subsetneq (\tilde{A} \vee \tilde{C}))$.
18. $\tilde{A} \vee \emptyset \approx \tilde{A}, \quad \tilde{A} \wedge \emptyset \approx \emptyset$.
19. $\tilde{A} \vee X \approx X, \quad \tilde{A} \wedge X \approx \tilde{A}$.

Перечисленные выше основные свойства нечетких множеств еще не являются системой аксиом. Строгая же система аксиом, адекватная, в частности, алгебре нечетких множеств была сформулирована за 7 лет до их возникновения. Соответствующая алгебраическая структура определяется на множестве X с двумя системами операций: $\langle X, +, *, \lceil, 0, 1 \rangle$ или $\langle X, \vee, \wedge, \lceil, 0, 1 \rangle$, где $x \wedge y = (x + \lceil y)^*y$, $x \vee y = (x^*\lceil y) + y$ (символы операций выбраны для простоты формулировок, их не следует воспринимать буквально, как соответствующие арифметические или логические операции).

Система аксиом

- | | |
|---|--|
| 1. $x + y = y + x$ | 1'. $x * y = y * x$ |
| 2. $x + (y + z) = (x + y) + z$ | 2'. $x * (y * z) = (x * y) * z$ |
| 3. $x + \lceil x = 1$ | 3'. $x * \lceil x = 0$ |
| 4. $x + 1 = 1$ | 4'. $x * 0 = 0$ |
| 5. $x + 0 = x$ | 5'. $x * 1 = x$ |
| 6. $(x + y) = \lceil x * \lceil y$ | 6'. $(x * y) = \lceil x + \lceil y$ |
| 7. $x = \lceil(\lceil x)$ | |
| 8. $\bar{0} = 1$ | |
| 9. $x \vee y = y \vee x$ | 9'. $x \wedge y = y \wedge x$ |
| 10. $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ | 10'. $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ |
| 11. $x + (y \wedge z) = (x + y) \wedge (x + z)$ | 11'. $x * (y \vee z) = (x^*y) \vee (x^*z)$ |

Эта система аксиом полна. Подалгебра ВХ тех элементов из X , для которых $x + x = x$ (или, что равносильно $x^*x = x$), является булевой алгеброй, в которой $x + y = x \vee y$, $x^*y = x \wedge y$.

Связь с нечеткими множествами становится ясной после рассмотрения класса примеров таких алгебр, образованного множествами S действительных чисел между 0 и 1, удовлетворяющими условиям (двойные ++, -- обоз-

значают обычные арифметические операции):

1. $0 \in S$ и $1 \in S$;
2. Если $x, y \in S$, то $\min(1, x+y) \in S$;
3. Если $x, y \in S$, то $\max(0, x+y - 1) \in S$;
4. Если $x \in S$, то $1 - x \in S$.

Операции в S определяются следующим образом:

$$\begin{aligned} x + y &= \min(1, x+y), x * y = \max(0, x+y - 1), \bar{x} = 1 - x, \\ x \vee y &= \max(x, y), x \wedge y = \min(x, y). \end{aligned}$$

Без труда проверяется, что так определенная структура удовлетворяет приведенным аксиомам, но не аксиомам булевой алгебры. Сформулированным условиям 1-4 удовлетворяют различные конкретные множества, например, $S = \{0, 1\}$; $S = [0, 1]$; $S = \{\text{все рациональные числа между } 0 \text{ и } 1\}$; $S(m) = \{\text{все рациональные числа вида } n/m \text{ для некоторого фиксированного натурального } m \text{ и целых } 0 \leq n \leq m\}$, с операциями $\bar{\cdot}, +, *$.

Нечеткое подмножество A универсального множества U может быть определено функцией принадлежности $\mu_A(x) \in X$, где X удовлетворяет требуемым аксиомам (традиционно $X = S = [0, 1]$); $\mu_U(u) = 1$. Операции над нечеткими множествами определяются в терминах их функций принадлежности и сводятся («поточечно») к операциям над значениями последних, то есть к операциям в X .

Операции $\bar{\cdot}, +, *$ в случае $X = S = [0, 1]$ являются известными в теории нечетких множеств дополнением, граничными суммой и произведением, менее популярными, чем \vee, \wedge , но находящими свое обоснование в новом контексте. Вне этого контекста (в частности, в рамках булевой алгебры) непосредственную связь между операциями \wedge, \vee и $\bar{\cdot}$ над нечеткими множествами установить затруднительно.

Нечеткие соответствия и отношения

В методе принятия решений при нечеткой исходной информации [81] и в качественных методах принятия решений [64] существенно используются понятия соответствий, отношений, нечетких соответствий и отношений, операций над ними.

Нечетким соответствием между множествами X и Y называется и через $\tilde{\Gamma} = (X, Y, \tilde{F})$ обозначается тройка множеств, в которой X, Y – произвольные четкие множества, \tilde{F} – нечеткое множество в $X \times Y$. Подобно названиям элементов четкого соответствия множество X называют областью направления, множество Y – областью прибытия, а \tilde{F} – нечетким графиком нечеткого соответствия.

Назовем носителем нечеткого соответствия $\tilde{\Gamma} = (X, Y, \tilde{F})$ соответствие $\Gamma = (X, Y, F)$, у которого график F является носителем нечеткого графика \tilde{F} .

Нечеткое соответствие может быть задано теоретико-множественно, графически и в матричном виде.

Для теоретико-множественного задания нечеткого соответствия необходимо перечислить элементы множеств X и Y и задать нечеткое множество \tilde{F} в $X \times Y$.

В матричном виде нечеткое соответствие $\tilde{\Gamma} = (X, Y, \tilde{F})$ задается с помощью матрицы инциденций R_{Γ} , строки которой помечены элементами $x_i \in X$ ($i \in I = \{1, 2, \dots, n\}$), столбцы – элементами $y_j \in Y$ ($j \in J = \{1, 2, \dots, m\}$), а на пересечении строки x_i и столбца y_j ставится элемент $r_{ij} = m_F(x_i, y_j)$, где m_F – функция принадлежности элементов из $X \times Y$ нечеткому графику.

Нечеткое соответствие можно задать в виде ориентированного графа с множеством вершин $X \cup Y$, каждой дуге (x_i, y_j) которого приписано значение $m_F(x_i, y_j)$ функции принадлежности.

Пример.

Зададим некоторое нечеткое соответствие $\tilde{\Gamma} = (X, Y, \tilde{F})$, определив X и Y как $X = \{x_1, x_2, \dots, x_5\}$, $Y = \{y_1, y_2, y_3, y_4\}$, $\tilde{F} = \{(x_1, y_2); 0,2\}, \{(x_3, y_1); 1\}, \{(x_3, y_3); 0,4\}, \{(x_4, y_2); 0,3\}, \{(x_5, y_2); 0,7\}, \{(x_5, y_3); 0,8\}, \{(x_5, y_4); 0,8\}$.

Матрица инциденций R_{Γ} и график нечеткого соответствия изображены на рис. 2.8.




Рис. 2.8. Графическое и матричное задание нечеткого соответствия
 $\tilde{\Gamma} = (X, Y, \tilde{F})$

Нечетким отношением на непустом множестве X называется и через $\tilde{\varphi}(X, \tilde{F})$ обозначается пара множеств, в которой \tilde{F} является нечетким подмножеством X^2 .

Множество X называется областью задания, а \tilde{F} -нечетким графиком отношения. Нечеткие отношения можно задавать теоретико-множественно, графически и в матричном виде. В методе принятия решений используется матричное задание нечетких отношений: отношение $\tilde{\varphi}(X, \tilde{F})$ задается с помощью матрицы смежности R_{φ} , на пересечении i -ой строки

и j -го столбца ставится элемент $r_{ij} = \mu_F < x_i, x_j >$, где μ_F – функция принадлежности элементов из X^2 нечеткому графику \tilde{F} .

Свойства нечетких отношений [64, 81].

Рефлексивность. Нечеткое отношение R на множестве X называется рефлексивным, если для любого $x \in X$ выполняется равенство $\mu_R(x, X) = 1$.

Антирефлексивность. Нечеткое отношение R на множестве X называется антирефлексивным, если для любого $x \in X$ выполняется равенство $\mu_R(x, X) = 0$.

Связность. Нечеткое отношение R на множестве X называется связанным, если для любого $x, y \in X$ выполняется неравенство $\mu_R(x, y) > 0$ или $\mu_R(y, x) > 0$.

Симметричность. Нечеткое отношение R на множестве X называется симметричным, если для любого $x, y \in X$ из $\mu_R(x, y) > 0 \Rightarrow \mu_R(y, x) > 0$.

Антисимметричность. Если для любых $x, y \in X$ $\mu_R(x, y) > 0 \Rightarrow \mu_R(y, x) = 0$, то такое отношение будет являться антисимметричным.

Транзитивность. Если для любых $x, y \in X$ функция принадлежности нечеткого отношения R на множестве X удовлетворяет неравенству $\mu_R(x, y) \geq \sup_{z \in X} \min\{\mu_R(x, z), \mu_R(z, y)\}$, то такое отношение называется транзитивным.

Отношение R называется транзитивным, если $\forall y_i, y_j, y_k \in Y$ таких, что $(y_i, y_j) \in R$ и $(y_j, y_k) \in R$, следует $(y_i, y_k) \in R$.

Квазипорядок. Отношение R называют квазипорядком, если оно рефлексивно и транзитивно.

Отношение R называют *отношением строгого предпочтения*, если оно антисимметрично и транзитивно.

Отношение R называют *отношением безразличия*, если оно симметрично и транзитивно.

Для получения матрицы композиции отношений используется максминное произведение соответствующих матриц. Если T и S – нечеткие отношения, то их максминное произведение

$$M = T \circ S = [m_{ki}] [m_{ij}] = \max_i \{ \min_i (m_{ki}, m_{ij}) \}.$$

2.4. Полные алгебраические решетки

Общие свойства решеток рассматриваются в работах Л.А. Скорнякова, С.К. Сагнаевой, М.Ш. Цаленко, Yi-Jia Tan [79, 95, 110, 124].

Частично упорядоченное множество L называется *нижней [верхней] полурешеткой*, если каждое двухэлементное его подмножество имеет точную нижнюю [верхнюю] грань. Если частично упорядоченное множество является нижней и верхней полурешеткой одновременно, то оно называется *решеткой*.

Если L – решетка, то для любых элементов a и b можно ввести операции $ab = \inf\{a, b\}$, $a + b = \sup\{a, b\}$.

Решетка называется *полной*, если в ней существуют объединения и пересечения любых множеств элементов. Всякая конечная решетка полна.

Отображение φ решетки L в решетку L' называется *верхним [нижним] гомоморфизмом*, если $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$ [$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$] для любых $a, b \in L$. Гомоморфизм решетки L в решетку L' определяется как отображение, являющееся верхним и нижним гомоморфизмом одновременно. Взаимно-однозначный гомоморфизм называется *изоморфизмом*. Верхние и нижние гомоморфизмы являются изотонными отображениями.

Непустое подмножество H решетки L называется *подрешеткой*, если из $a, b \in H$ следует $a + b \in H$, $ab \in H$.

Пусть L – решетка. $a, b \in L$. Наибольший элемент $x \in L$, такой, что $ax \leq b$, называется *относительным псевдодополнением* элемента a относительно элемента b в решетке L . Если такой элемент существует, он определяется однозначно заданием a и b и обозначается через $a \uplus b$. Решетка, в которой для любых $a, b \in L$ определена операция $a \uplus b$, называется *решеткой с относительными псевдодополнениями* (или *браузеровой решеткой*).

Наименьший элемент $x \in L$, такой, что $a + x \geq b$, называется *дуальным относительным псевдодополнением* элемента a относительно элемента b . Решетка, в которой для любых $a, b \in L$ определена операция $a \ominus b$, называется *дуальной решеткой с относительными псевдодополнениями* (или *дуальной браузеровой решеткой*).

Решетка L называется *дистрибутивной решеткой*, если в ней выполняются тождества: $x(y + z) = xy + xz$, $x + yz = (x + y)(x + z)$, называемые дистрибутивными законами. Решетка дистрибутивна уже тогда, когда в ней имеет место уже один из указанных законов.

Решетка L называется *бесконечно дистрибутивной* решеткой, если для любого $x \in L$ и любых семейств элементов $\{y_i \mid i \in I\}$, где I – множество индексов элементов, выполняется:

$$x \wedge \left(\bigvee_{i \in I} y_i \right) = \bigvee_{i \in I} (x \wedge y_i), \quad (17)$$

$$x \vee \left(\bigwedge_{i \in I} y_i \right) = \bigwedge_{i \in I} (x \vee y_i). \quad (18)$$

Полная решетка является *брауэровой*, если она бесконечно \cap -дистрибутивна, т.е. выполняется (17). Полная решетка является дуальной брауэровой решеткой, если она бесконечно \cup -дистрибутивна, т.е. выполняется (18). Следовательно, полная решетка L – это брауэрова решетка и дуальная брауэрова решетка, если L – бесконечно дистрибутивна бесконечно \cap -дистрибутивной, а значит, и брауэровой, решетки является любая конечная дистрибутивная решетка, отрезок $[0; 1]$.

Решетка L называется *решеткой с относительными дополнениями*, если для всякого элемента x из любого ее интервала $[a; b]$ найдется такой элемент d , что $c + d = b$ и $cd = a$, при этом $d \in [a; b]$. Решетка L с нулем 0 и единицей 1 называется решеткой с дополнениями, если каждый ее элемент имеет дополнение в интервале $[0; 1]$. Дополнения в интервале $[0; 1]$ называются просто дополнениями.

Булевой решеткой называется дистрибутивная решетка с дополнениями, т.е. дистрибутивная решетка с 0 и 1 . В булевой решетке В каждый элемент x имеет в точности одно дополнение x' , такое, что $x \rightarrow x'$.

3. Модели и методы принятия решений, основанные на парном сравнении альтернатив

При принятии управленческих решений руководитель предприятия должен не только полагаться на свой опыт и интуицию, но и обращаться к хорошо разработанным в настоящее время математическим моделям поддержки принятия решений, позволяющих корректно выбирать наиболее лучшие альтернативы из имеющихся. От того, насколько грамотно, квалифицированно осуществляется поддержка принятия управленческих решений, зависит успешность развития всего предприятия в целом [36, 39, 56, 65, 66, 75, 80, 84, 113].

Многочисленные исследования показывают, что лица, принимающие решения без дополнительной аналитической поддержки, используют упрощенные, а иногда и противоречивые решающие правила [1, 2, 12, 14, 29, 53, 59, 67, 74, 92]. Поддержка принятия решения требуется во всех без исключения областях прикладной деятельности человека [4, 13, 15, 19, 50, 56, 58, 59, 62, 64, 65, 68, 74, 85, 91, 101, 108, 115, 118], что связано с увеличивающимся объемом информации, необходимостью учитывать большое количество противоречивых факторов, объективных и субъективных составляющих при принятии решений.

3.1. Классификация моделей и методов принятия решений

Приведем классификацию моделей и методов принятия решений. Модель задачи принятия решений в [25] представляется в виде: $\langle t, X, R, A, F, G, D \rangle$, где t – постановка задачи (например, выбрать одну наилучшую в некотором смысле альтернативу или упорядочить все множество альтернатив); X – множество допустимых альтернатив; R – множество критериев оценки степени достижения поставленных целей; A – множество шкал измерения по критериям (шкалы наименований, порядковые, интервальные, отношений); F – отображение множества допустимых альтернатив в множество критериальных оценок; G – система предпочтений решающего элемента; D – решающее правило, отражающее систему предпочтений. Классификация моделей задач принятия решений в [25] проводится в соответствии со следующими признаками:

- 1) по виду отображения F – детерминированное, вероятностное или неопределенное, можно выделить соответственно: ЗПР в условиях определенности, ЗПР в условиях риска, ЗПР в условиях неопределенности. Аналогичным образом, по полноте описания исследуемого объекта классифицируются и ЗПР в [80];
- 2) по мощности множества R – одноэлементное множество или состоящее из нескольких критериев, выделяются соответственно: ЗПР со скалярным критерием, ЗПР с векторным критерием (многокритериальные задачи);
- 3) по типу системы G – отражает предпочтения одного лица или коллекти-


ва в целом, выделяются задачи индивидуального ПР, задачи группового ПР.

В [27] под моделью выбора понимается пара (X, R) , состоящая из множества альтернатив X и бинарного отношения R на нем. В [8] при определении модели ПР предполагается, что рассматривается некоторое множество исходных структур предпочтений и исследуется определенная ЗПР, процесс решения которой понимается как оптимальный выбор метода обработки исходной структуры из некоторого базового класса методов. При этом можно считать, что на множестве исходных структур задана модель решения поставленной ЗПР, если указан некий принцип или правило, согласно которому произвольному отношению ставится в соответствие некоторый набор методов. Конкретные модели ориентированы на соответствие тех или иных методов принятия решений определенным базовым структурам.

В [25] приведена классификация методов ПР по таким признакам, как содержание экспертной информации, тип получаемой информации, на основе которой можно определить группу методов ПР в условиях неопределенности (рис. 3.1).

В монографии рассматривается возможность анализа различных вопросов управления методами принятия решений в условиях неопределенности. Это связано с тем, что при исследовании экономических, социальных и других систем, в функционировании которых участвует человек, значительное количество информации может быть получено от людей, имеющих опыт работы с данной системой и знающих ее особенности, от людей, имеющих представление о целях функционирования системы. Эта информация носит субъективный характер, и ее представление в естественном языке содержит неопределенности, которые не имеют аналогов в языке традиционной математики. В этом случае лучше рассматривать задачи оптимального управления с позиций методов, учитывающих неопределенность описания модели исследуемого объекта.

Таким образом, возникающие в процессе управления предприятием проблемы, которые обладают признаками неструктурированных задач ПР, возможно всесторонне проанализировать методами, учитывающими неопределенность [10, 25, 26, 31, 36, 37, 49, 51, 56, 57, 58, 68, 70, 77, 78, 81, 86, 89, 96, 113].



**Рис 3.1. Классификация методов ПР
на основе содержания экспертной информации**

При этом под неопределенностью будем понимать явления, не поддающиеся анализу и измерению со сколь угодно большой точностью [78]. В [80] приводится классификация неопределенностей, в которой, в частности, выделяются «неопределенностяи, связанные с ближайшим окружением фирмы, менеджер которой занимается прогнозированием: неопределенности, связанные с деятельностью участников экономической жизни (прежде

всего партнеров и конкурентов фирмы), в частности, с их деловой активностью, финансовым положением, соблюдением обязательств; неопределенности, связанные с социальными и административными факторами в конкретных регионах, в которых фирма имеет деловые интересы».

3.2. Модели линейного упорядочивания

Используемые в практике модели линейного упорядочивания традиционно разделяются на две большие группы, различающиеся своим подходом к решению задачи упорядочивания объектов [8].

В моделях *первой группы*, использующих *статистические методы*, каждому объекту x_i сопоставляется определенный интегральный показатель π_i , оценивающий итоги его сравнений с остальными объектами, а далее объекты просто упорядочиваются по убыванию значений этого ранжирующего фактора. В моделях *второй группы*, использующих *комбинаторно-логические и теоретико-графовые методы*, оцениваются показатели не отдельных объектов, а всего упорядочивания в целом и выбирается упорядочивание, максимизирующее некоторый функционал качества. Оценок важности при этом не делается. Рассмотрим некоторые модели первой группы.

Пусть задано некоторое фиксированное множество объектов $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, которые сравниваются попарно с точки зрения их предпочтительности, желательности, важности и т.п., а результаты записываются в виде матрицы парных сравнений $A = \|a_{ij}\|_{n \times n}$, отражающей возникающее бинарное отношение предпочтения/безразличия на множестве X . Симметричные элементы матрицы парных сравнений a_{ij} и a_{ji} должны выбираться равными, если соответствующие объекты равноценны или несравнимы ($x_i \sim x_j$); если же $x_i > x_j$, то должно быть $a_{ij} > a_{ji}$. Кроме того, на элементы матрицы A обычно накладываются дополнительные калибровочные ограничения, однозначно связывающие попарно симметричные элементы a_{ij} , a_{ji} . Приведем основные типы калибровок.

1) Простая структура (ПС).

$$\forall i, j, i \neq j \quad a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } x_i > x_j; \\ 0, & \text{если } x_j > x_i; \\ 1/2, & \text{если } x_i \sim x_j. \end{cases} \quad (19)$$

Интерпретация: a_{ij} – индикатор факта превосходства одного объекта над другим или их равноценности (несравнимости).

2) Турнирная калибровка (Т).

$$\forall i, j \quad a_{ij} \geq 0; \quad a_{ij} + a_{ji} = c. \quad (20)$$

Интерпретация: a_{ij} – число очков, набранных игроком x_i во всех встречах с игроком x_j ; число $c = \text{const}$ при этом может интерпретироваться как количество таких встреч. Нередко дополнительно постулируется целочисленность матрицы.

3) Кососимметрическая калибровка (К).

$$\forall i, j \quad a_{ij} + a_{ji} = 0. \quad (21)$$

Интерпретация: объект x_i превосходит в парном сравнении объект x_j на a_{ij} .

4) Степенная калибровка (С).

$$\forall i, j \quad a_{ij} > 0; \quad a_{ij} \cdot a_{ji} = 1. \quad (22)$$

Интерпретация: объект x_i превосходит в парном сравнении объект x_j в a_{ij} раз.

5) Вероятностная калибровка (В).

$$\forall i, j \quad 0 \leq a_{ij} \leq 1; \quad a_{ij} + a_{ji} = 1 \quad (23)$$

Интерпретация: a_{ij} – вероятность превосходства x_i над x_j .

Помимо калибровок (19)-(23) для полноты анализа можно ввести еще и произвольную взвешенную структуру (ВС), в рамках которой предполагается обычно только неотрицательность матрицы A , сами же ее элементы могут интерпретироваться по-разному.

Переход от матрицы A , заданной в некоторой калибровке, к откалиброванной по-иному матрице B возможен не всегда, но лишь при соблюдении некоторых дополнительных содержательных условий и нередко сопряжен с потерей важной информации. Вопрос о возможности перехода к матрице с другой калибровкой и о путях такого перехода всякий раз должен рассматриваться с учетом содержательных особенностей задачи. Схемы и направления подобных переходов приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Реализация преобразований калибровки

Тип перехода	Возможные способы реализации
$BC \rightarrow T$	$b_{ij} = a_{ij} + (\max_{i,j} s_{ij} - s_{ij}) / 2;$ $b_{ij} = (a_{ij} \cdot \max_{i,j} s_{ij}) / s_{ij}; \quad s_{ij} = a_{ij} + a_{ji};$
$T \rightarrow K$	$b_{ij} = a_{ij} - a_{ji}; \quad b_{ij} = (a_{ij} - a_{ji}) / 2;$
$K \rightarrow T$	$b_{ij} = a_{ij} (\operatorname{sign} a_{ij} + 1) / 2 + (\max_{i,j} a_{ij} - a_{ij}) / 2;$ $b_{ij} = c(a_{ij} + \max_{i,j} a_{ij}); \quad c > 0;$
$K \rightarrow C$	$b_{ij} = r^{a_{ij}}; \quad r > 1;$
$C \rightarrow K$	$b_{ij} = \log_r a_{ij}; \quad r > 1;$
$B, T \rightarrow C$	$b_{ij} = a_{ij} / a_{ji};$
$C \rightarrow B, T$	$b_{ij} = a_{ij} / (1 + a_{ji});$
$T \rightarrow B$	$b_{ij} = a_{ij} / (a_{ij} + a_{ji});$
$B \rightarrow T$	$b_{ij} = c \cdot a_{ij}; \quad c > 0;$
$BC, T, B, K, C \rightarrow \Pi C$	$b_{ij} = [\operatorname{sign}(a_{ij} - a_{ji}) + 1] / 2.$

Каждая из моделей линейного упорядочивания требует для матриц парных сравнений определенных калибровочных ограничений.

- 1) *Модели спортивного типа:* $\forall i = \overline{1, n} \quad s_i = \sum_{i \neq j} a_{ij}$.

Такое название исторически укоренилось за целой группой сходных моделей, в которых в качестве ранжирующего фактора используется набранная объектом «сумма очков». Обрабатываемая матрица A может иметь калибровку типа Т, ПС или К.

Название модели ПР	Математическая модель	Положительные характеристики	Недостатки модели
Турнирная модель	Объекты упорядочиваются по убыванию s_i .	Простота получения результата. Выполняются свойства «Инвариантность к сдвигу» (ИС**), «Инвариантность к растяжению» (ИР), «Положительная реакция» (ПР).	Вычисление количественных оценок модель не предполагает.
Модель последовательного вычисления лидеров	В качестве лучшего (лидера) выбирается объект с $\max_i s_i$, вычеркивается i -я строка и i -й столбец, вновь выбирается лидер и т.д.		
Модель последовательной дихотомии	Множество X разбивается на два слоя – слой с большими s_i и слой с меньшими s_i и т.д. делится каждый слой.	Простота получения результата.	Не обладает свойствами «Устойчивость в малом» (УМ), ПР.

- 2) *Модель интегральной степени превосходства* является близкой к моделям спортивного типа; применяется для кососимметрических матриц.

Вводится понятие интегральной степени превосходства

$\tilde{\Phi}(x_i, x_j) = \sum_{t=1}^n \lambda_t (a_{it} - a_{jt})$, оценивающей превосходство x_i над x_j в сравнении с прочими объектами. Когда интегральная степень превосходства задана, ее можно представить в виде $\tilde{\Phi}(x_i, x_j) = f(x_i) - f(x_j)$, при этом $\forall i \quad f(x_i) = \sum_{j=1}^n \lambda_j \tilde{\Phi}(x_i, x_j)$, где f – функция полезности на X , и объекты предлагается упорядочивать по убыванию ее значений.

К недостаткам модели можно отнести введение коэффициентов λ_i – весов объектов, однако таких весов заранее задано быть не может. Модель сводится к турнирной и самостоятельного интереса не имеет.

3) *Модель функции доминируемости* ориентирована на обработку нечетких отношений предпочтения, т.е. $a_{ij} \in [0;1]$. Применяется для калибровок Т, К.

Функция доминируемости $l(x_i) = \max_{j \neq i} a_{ji}$ характеризует максимальную силу, с которой объект x_i доминируется остальными объектами множества X . При $l(x_i) = 0$ – абсолютно не доминируется, при $l(x_i) = 1$ – абсолютно доминируется, при $0 < l(x_i) < 1$ – слабо доминируется. Объекты упорядочиваются по убыванию соответствующих значений функции $m(x_i) = 1 - l(x_i)$. В [81] используются другие способы получения $l(x_i)$.

Возможно использование значений $m(x_i)$ в качестве количественных оценок важности объектов. Модель обладает свойствами УМ, ПР, ИС**, ИР.

4) *Модель Брэдли-Терри* пригодна для простых структур без равноценных элементов и целочисленных турнирных матриц.

Каждому объекту сопоставляется его «сила» π_i , причем предполагается, что вероятность превосходства в парном сравнении $P(x_i > x_j)$ прямо пропорциональна π_i : $P(x_i > x_j) = \pi_i / (\pi_i + \pi_j) = 1 - P(x_j > x_i)$. Для каждой пары (i,j) проводится k независимых актов парных сравнений. Окончательно получается:

$$\left\{ \begin{array}{l} s_i / \pi_i = k \sum_{j=1}^n (\pi_i + \pi_j)^{-1}; i = \overline{1, n}; \\ \sum_{i=1}^n \pi_i = 1. \end{array} \right.$$

Система может быть решена итерационно. После вычисления всех π_i объекты упорядочиваются по их убыванию.

Получаемые компоненты нормализованного вектора π могут служить количественными оценками важности объектов. Выполняются свойства ИС**, ИР.

5) *Модель Бэржса-Брука-Буркова* применяется для обработки простых структур, матриц с турнирной и степенной калибровками.

Каждому объекту x_i ставится в соответствие цепочка так называемых интегрированных сил, в которой сила k -го порядка p_i^k определяется как сумма элементов i -й строки в матрице A^k :

$$\forall i = \overline{1, n} \quad p_i^k = \sum_{j=1}^n a_{ij}^k; \quad \|a_{ij}^k\|_{n \times n} = A^k; \quad k = 1, 2, \dots .$$

При $k \rightarrow \infty$ имеет место $\lim_{k \rightarrow \infty} (p_i^k / \sum_i p_i^k) = \pi_i$, $i = \overline{1, n}$, где нормализованный собственный вектор $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_n)$ матрицы A отвечает максимальному по модулю собственному числу теоремы Перрона-Фробениуса.

Модель обладает свойствами ИР, УМ; T^* (при $a_{ii} = 1$). Получаемые значения компонент собственного вектора могут служить оценкой важности объектов.

6) Стохастическая модель Ушакова предложена для обработки матриц, заданных в степенной и вероятностной калибровках.

Матрица A преобразуется в вероятностную матрицу P , где p_{ij} – вероятность превосходства x_j над x_i .

При калибровке (23) $P = A^T$.

При калибровке (22) $p_{ij} = a_{ji} / (1 + a_{ji})^{-1}$, $i \neq j$.

Строится стохастическая матрица $\tilde{P} = \|\tilde{p}_{ij}\|_{n \times n}$.

$$\tilde{p}_{ii} = 1 - \sum_{i \neq j} \tilde{p}_{ij}, \quad i, j = \overline{1, n}, \quad \tilde{p}_{ij} = p_{ij} / (n - 1), \quad i \neq j;$$

$$p_i = \Delta_{ii} / \sum_{j=1}^n \Delta_{jj}, \quad i = \overline{1, n},$$

где Δ_{ii} – минор получаемый из $\det(E - \tilde{P})$ вычеркиванием i -го столбца и i -той строки.

Упорядочивание x_i производится по p_i .

Обладает свойствами УМ, ПР. Получаемые компоненты финального распределения могут использоваться в качестве количественных оценок важности объектов.

Не обладает свойствами ИС**, ИР.

7) Модель равномерного сглаживания применяется для положительных матриц с калибровкой T или C .

По аксиоме Льюса для калибровки T имеет место: $\forall i, j \pi_i / \pi_j = a_{ij} / a_{ji}$

$$(*) \text{ и при этом } \pi_i = \pi_i / \sum_{j=1}^n \pi_j = \left(\sum_{j=1}^n \pi_j / \pi_i \right)^{-1} = \left(\sum_{j=1}^n b_{ji} \right)^{-1}.$$

Обозначая $\forall i, j z_{ij} = \ln b_{ij}$, получаем $\forall i, j z_{ij} = z_{ik} + z_{kj} = -z_{ki} + z_{kj}$, так что матрица $Z = \|z_{ij}\|_{n \times n}$ может быть восстановлена по любой строке.

В данной модели от исходной матрицы A необходимо перейти к матрице Z и построить n различных матриц $Z^{(1)}, \dots, Z^{(n)}$, полагая, что матрица $Z^{(k)}$, $k = \overline{1, n}$ порождается k -ою строкой матрицы Z по формуле (*).

$\bar{Z} = (1/n) \sum_i Z_i^{(i)}$, причем $\forall i, j z_{ij} = (1/n) \sum_{k=1}^n (z_{ik} + z_{kj})$. Проделав преобразования $\forall i, j \bar{b}_{ij} = \exp \bar{z}_{ij}$, $\bar{a}_{ij} = c \bar{b}_{ij} (1 + \bar{b}_{ij})^{-1}$, в итоге получим $\pi_i = \left(\sum_{j=1}^n \bar{b}_{ji} \right)^{-1}$.

Обладает свойствами ИР, Т, УМ, ПР. Получаемые коэффициенты можно использовать для количественной оценки важности объектов.

Выбор модели упорядочивания с теми свойствами, которые особенно желательны в данном конкретном случае, представляется весьма полезным в системах поддержки принятия решений [8]. Модели типа: модель функции доминируемости, Брэдли-Терри, Бержа-Брука-Буркова, стохастическая модель Ушакова, модель равномерного сглаживания предлагают гораздо более убедительные доводы в пользу соответствующих оптимальных упорядочиваний. Модель Брэдли-Терри пригодна для простых структур и целочисленных турнирных матриц, которые не учитывают неточность, неопределенность в оценках экспертов. Стохастическая модель Ушакова скорее ориентирована на вероятностный класс неопределенностей, в отличие от нее модель Бержа-Брука-Буркова и модель функции доминируемости позволяют учитывать неопределенность явлений, не поддающихся измерению со сколь угодно большой точностью и с учетом нечеткости соответственно. Модель равномерного сглаживания не обладает свойством ИС**, что не позволяет экспертам производить неполные сравнения. В [8] утверждается, что модель Бержа-Брука-Буркова также не обладает свойством ИС**, однако в [93] указан подход к выявлению приоритетов для неполной матрицы на основе данной модели. Таким образом, для линейного упорядочивания в условиях неопределенности предпочтительнее пользоваться моделями функции доминируемости и Бержа-Брука-Буркова. Рассмотрим методы ПР, ориентированные на выделенные модели. Кроме них, в монографии рассматриваются также качественные методы ПР, процедуры сравнения объектов в которых ориентированы на качественные оценки экспертов, что облегчает опрос экспертов, позволяя оперировать терминами, свойственными конкретной предметной области (рис. 3.2).



Рис. 3.2. Классификация моделей и методов принятия решений в условиях неопределенности

Метод анализа иерархий [93, 94]

При принятии управленческих решений и прогнозировании возможных результатов лицо, принимающее решение, обычно сталкивается со сложной системой взаимозависимых компонент (ресурсы, желаемые исходы или цели, лица или группа лиц и т.д.), которую нужно проанализировать [93, 94]. МАИ развивает модель Бержа-Брука-Буркова [8].

Принимая решение, группа экспертов производит декомпозицию сложной проблемы – определяет ее компоненты и отношения между ними. Получается модель реальной действительности, построенная в виде иерархии. Вершина иерархии – общая цель, далее располагаются подцели, затем силы, которые влияют на эти подцели, люди, их цели, политики, стратегии, и, наконец, исходы, являющиеся результатами стратегий. На следующем этапе решения сравниваются уже отдельные компоненты иерархии между собой. В результате может быть выражена относительная степень интенсивности взаимодействия элементов в иерархии. Затем эти суждения выражаются численно. В завершении анализа проблемы МАИ включает процедуры синтеза множественных суждений, получения приоритетности критериев и нахождения альтернативных решений. Таким образом, основные этапы принятия решения с помощью МАИ следующие:

- построение иерархии рассматриваемой проблемы;
- парное сравнение компонент иерархии;
- математическая обработка полученных суждений.

В наиболее элементарном виде иерархия строится с вершины (целей – с точки зрения управления), через промежуточные уровни (критерии, от которых зависят последующие уровни) к самому низкому уровню (который обычно является перечнем альтернатив). Существуют несколько видов иерархий: доминантные, холлархии, китайский ящик и т.д. Наиболее часто применяется первый тип иерархий.

Парные сравнения проводятся в терминах доминирования одного из элементов над другим. Эти суждения затем выражаются в целых числах. Если элемент А доминирует над элементом Б, то ячейка матрицы, соответствующая строке А и столбцу Б, заполняется целым числом, а ячейка, соответствующая строке Б и столбцу А, заполняется обратным к нему числом (дробью). В МАИ предложена шкала относительной важности элементов иерархии (табл. 3.2).

Все матрицы в МАИ должны быть обратно симметричны, т.е. $a_{ij} = 1/a_{ji}$. По главной диагонали матрицы заранее ставятся единицы, т.к. альтернатива равнозначна самой себе. Для заполнения каждой матрицы размером $n \times n$ достаточно произвести только $n(n-1)/2$ суждения.

Составление таких матриц проводится для всех уровней и групп в иерархии. Причем полученные матрицы должны быть согласованы для дос-

тогорного решения. Согласованность проявляется в числовой (кардинальной согласованности $a_{ij} \cdot a_{jk} = a_{ik}$) и транзитивной (порядковой согласованности). Согласованность матрицы можно проверить.

Таблица 3.2

Шкала относительной важности

Интенсивность относительной важности	Определение
1	равная важность
3	умеренное превосходство одного над другим
5	существенное или сильное превосходство
7	значительное превосходство
9	очень сильное превосходство
2, 4, 6, 8	промежуточные решения между двумя соседними суждениями
Обратные величины приведенных выше чисел	если при сравнении одного параметра с другим получено одно из вышеуказанных чисел, то при сравнении второго параметра с первым получим обратную величину

Вычислять вектор приоритета (собственный вектор) для каждой матрицы парных сравнений можно разными способами [94]. В зависимости от выбранного способа в задаче может наблюдаться большая или меньшая погрешность. Наиболее обоснованный результат получается при применении теоремы Перрона-Фробениуса.

На последнем этапе обработки полученные векторы приоритетов синтезируются, начиная со второго уровня вниз. Локальные приоритеты перемножаются на приоритет соответствующего критерия на вышестоящем уровне и суммируются по каждому элементу в соответствии с критериями, на которые воздействует этот элемент (каждый элемент второго уровня умножается на единицу, т.е. на вес единственной цели самого верхнего уровня.) Это дает составной, или глобальный, приоритет того элемента, который затем используется для взвешивания локальных приоритетов элементов, сравниваемых по отношению к нему как к критерию и расположенных уровнем ниже. Процедура продолжается до самого нижнего уровня.

Методы принятия решений при нечеткой исходной информации [81, 8, 48]

В работе С.А. Орловского [81] рассматриваются методы принятия решений, основанные на парных сравнениях альтернатив, которые выражаются в виде нечетких отношений. Методы используются в модели функции

недоминируемости [8]. В работе [48] произведена структуризация данных методов, в результате которой выделим следующие методы теории принятия решений при нечеткой исходной информации:

- методы принятия решений с одним экспертом;
- методы принятия решений с группой экспертов, характеризуемых весовыми коэффициентами;
- методы принятия решений с группой экспертов, характеризуемых нечетким отношением нестрогого предпочтения.

Задача принятия решения с одним экспертом

Задано множество возможных решений или альтернатив $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ и нечеткое отношение нестрогого предпочтения (н.о.п.) R на множестве U с функцией принадлежности $\mu_R(u_i, u_j) \in [0, 1]$ – любое рефлексивное нечеткое отношение на U , так что $\mu_R(u_i, u_i) = 1, u_i \in U$.

Н.о.п. задается обычно ЛПР в результате опроса экспертов, обладающих знаниями или представлениями о содержании или существе задачи, которые не были formalизованы в силу чрезмерной сложности такой formalизации или по другим причинам.

Для любой пары альтернатив $u_i, u_j \in U$ значение $\mu_R(u_i, u_j)$ понимается как степень предпочтения « u_i , не хуже u_j » в записи $u_i \geq u_j$. Равенство $\mu_R(u_i, u_j) = 0$ может означать как то, что $\mu_R(u_j, u_i) > 0$, то есть с положительной степенью выполнено «обратное» предпочтение $u_j \geq u_i$, так и то, что и $\mu_R(u_j, u_i) = 0$, то есть альтернативы u_j и u_i несравнимы. Рефлексивность н.о.п. отражает тот естественный факт, что любая альтернатива не хуже самой себя.

Задача принятия решения заключается в рациональном выборе наиболее предпочтительных альтернатив из множества U , на котором задано нечеткое отношение предпочтения R .

Алгоритм решения задачи

1. Строится нечеткое отношение строгого предпочтения R^S , ассоциированное с R , определяемое функцией принадлежности

$$\mu_R^S(u_i, u_j) = \begin{cases} \mu_R(u_i, u_j) - \mu_R(u_j, u_i), & \mu_R(u_i, u_j) > \mu_R(u_j, u_i), \\ 0, & \mu_R(u_i, u_j) \leq \mu_R(u_j, u_i). \end{cases}$$

Это отношение может быть представлено в виде $R^S = R \setminus R^T$, где R^T – «обратное» отношение (матрица отношений R^T получается транспонированием матрицы отношений R).

2. Строится нечеткое подмножество $U_R^{nd} \subset U$ недоминируемых альтернатив, ассоциированное с R и включающее те альтернативы, которые

не доминируются никакими другими, определяемое функцией принадлежности

$$\mu_R^{nd}(u_i) = \min_{u_j \in U} \{1 - \mu_R^S(u_j, u_i)\} = 1 - \max_{u_j \in U} \{\mu_R^S(u_j, u_i)\}, \quad u_i \in U.$$

Для любой альтернативы $u_j \in U$ значение $\mu_R^{nd}(u_i)$ понимается как степень недоминируемости этой альтернативы, то есть степень, с которой u_i не доминируется ни одной из альтернатив множества U ; $\mu_R^{nd}(u_i) = \alpha$ означает, что никакая альтернатива u_j не может быть лучше u_i со степенью доминирования большей α ; иначе говоря, u_i может доминироваться другими альтернативами, но со степенью не выше $1 - \alpha$. Рациональным естественно считать выбор альтернатив, имеющих по возможности большую степень принадлежности множеству U_R^{nd} .

3. Выбирается та альтернатива u^* , для которой значение $\mu_R^{nd}(u^*)$, максимально:

$$u^* = \arg \max_{u_i \in U} \mu_R^{nd}(u_i).$$

Она и дает решение задачи. Если наибольшую степень недоминируемости имеет не одна, а несколько альтернатив, то ЛПР может либо сам выбрать одну из них, исходя из каких-либо дополнительных соображений, либо расширить круг экспертов при формировании исходных данных задачи и повторить ее решение.

Задача принятия решения с группой экспертов, характеризуемых весовыми коэффициентами

На множестве всевозможных решений (альтернатив) $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ задано несколько н.о.п. Нечеткие отношения нестрогого предпочтения R_k получены в результате опроса каждого эксперта и заполнении матрицы нечеткого отношения нестрогого предпочтения (н.о.п.) R_k , каждый элемент которой есть значение функции принадлежности $\mu_R(u_i, u_j)$, выражающее степень предпочтительности альтернативы u_i по сравнению с u_j . При $\mu_R(u_i, u_j) > 0$ u_i предпочтительнее, чем u_j ; если же $\mu_R(u_i, u_j) = 0$, то либо первая альтернатива хуже второй, либо они несравнимы. Лицо, принимающее решение, по-разному относится к экспертам, что находит отражение в весовых коэффициентах λ_k , (где $0 \leq \lambda_k \leq 1$, $\sum \lambda_k = 1$), соответствующих каждому из них.

Целью данной задачи является упорядочение совокупности альтернатив $U = \{u_1, \dots, u_n\}$.

Алгоритм решения задачи

1. Строится свертка P отношений как пересечение нечетких отношений нестрогого предпочтения экспертов $P = \cap R_k(u_i, u_j) = \min \{\mu_{Rk}(u_i, u_j)\};$

таким образом, получается новое нечеткое отношение нестрогого предпочтения. Далее с н.о.п. ассоциируется отношение строгого предпочтения $P^S = P \setminus P^T$ с функцией принадлежности μ_P^S .

$$\mu_P^S(u_i, u_j) = \begin{cases} \mu_P(u_i, u_j) - \mu_{P^T}(u_i, u_j), & \text{если } \mu_P(u_i, u_j) > \mu_{P^T}(u_i, u_j); \\ 0, & \text{если } \mu_P(u_i, u_j) \leq \mu_{P^T}(u_i, u_j). \end{cases}$$

Далее определяется множество недоминируемых альтернатив U_P^{nd} с функцией принадлежности

$$\mu_P^{nd}(u_i) = 1 - \max_{u_j \in P} \{\mu_P^S(u_j, u_i)\}, \quad u_i \in U.$$

2. Строится выпуклая свертка Q отношений R_k , которая определяется как $Q = \sum \lambda_k R_k$, $\mu_Q(u_i, u_j) = \sum_k \lambda_k \mu_k(u_i, u_j)$. Она является новым н.о.п., с которым ассоциируются его отношение строгого предпочтения Q^S и множество недоминируемых альтернатив U_Q^{nd} . Множества U_P^{nd} и U_Q^{nd} несут дополнюющую друг друга информацию о недоминируемости альтернатив.

3. Рассматривается пересечение полученных множеств U_P^{nd} и U_Q^{nd} : $U^{nd} = U_P^{nd} \cap U_Q^{nd}$ с функцией принадлежности $\mu^{nd}(u_i) = \min\{\mu_P^{nd}(u_i), \mu_Q^{nd}(u_i)\}$.

4. Выбирается та альтернатива u^* , для которой значение $\mu^{nd}(u^*)$ максимально: $u^* = \arg \max \mu^{nd}(u_i), u_i \in U$.

Задача принятия решения с группой экспертов, характеризуемых нечетким отношением нестрогого предпочтения между ними.

Можно рассмотреть задачу принятия решений с группой экспертов, характеризуемых не весовыми коэффициентами, а при помощи еще одного н.о.п. N , заданного на множестве E экспертов с функцией принадлежности $\mu_N(e_k, e_l)$, $e_k, e_l \in E$, значения которой означают степень предпочтения эксперта e_k по сравнению с экспертом e_l .

Алгоритм решения задачи

1. С каждым R_k ассоциируются R_k^S и U_k^{nd} , вводится обозначение $\mu_k^{nd}(u_i) = \mu_N(e_k, u_i)$, $i = 1, \dots, n$, $k = 1, \dots, m$. Тем самым задается нечеткое соответствие Φ между множествами E и U .

2. Строится свертка Γ в виде композиции соответствий $\Gamma = \Phi^T N \Phi$. Причем, результирующее отношение Γ определяется как максминное произведение матриц Φ^T , N , Φ . То есть, получается единое результирующее отношение, полученное с учетом информации об относительной важности н.о.п. R_k . С отношением Γ ассоциируется отношение Γ^S и множество U_Γ^{nd} .

3. Корректируется множество U_{Γ}^{nd} до множества $U_{\Gamma}^{\prime nd}$ с функцией принадлежности $\mu_{\Gamma}^{\prime nd}(u_i) = \min \{ \mu_{\Gamma}^{nd}(u_i), \mu_{\Gamma}(u_i, u_i) \}$.

4. Выбирается та альтернатива, для которой значение функции принадлежности скорректированного нечеткого подмножества $U_{\Gamma}^{\prime nd}$ недоминируемых альтернатив максимально.

Качественные методы принятия решений [61-64]

Качественные методы принятия решений разработаны О.И. Ларичевым и описываются в работе [64]. Методы могут использоваться в моделях линейного упорядочивания объектов на основе их векторов предпочтений. В качественных методах принятия решений используются только такие способы получения информации от экспертов и логические процедуры для построения выводов, которые, согласно данным психологических исследований, соответствуют возможностям человеческой системы переработки информации. Одним из таких способов, который может быть с успехом применен для решения неструктурированных проблем с качественными переменными – планирования научных исследований, конкурсного отбора проектов, проблем личного выбора – является метод упорядочивания многокритериальных альтернатив ЗАПРОС (замкнутые процедуры у опорных ситуаций).

Рассмотрим применение этого метода на примере ранжирования железобетонных изделий, а именно, некоторых видов тротуарных плиток, с точки зрения потребительского спроса. Предположим, что число видов изделий – три: П1 (плитка «Лепесток»), П2 (плитка «Катушка»), П3 (Плитка «Бабочка»). Выделим критерии их оценивания: внешний вид, стоимость, удобность укладки (количество альтернатив и критериев в общем случае может быть произвольным). Критериальное описание альтернативных изделий может быть сведено в таблицу:

Тротуарная плитка	Внешний вид	Стоимость	Удобность укладки
П1	привлекательный внешний вид	дороже, чем хотелось бы	трудна в укладке
П2	отсутствует оригинальность изд.	слишком дорого	оптимальна для укладки
П3	привлекательный внешний вид	слишком дорого	не совсем оптимальна для укладки

В соответствии с критериальными оценками вербальная шкала каждого критерия сопоставляется с базовой (количественной) шкалой, при этом самая высокая оценка критерия условно принимается за единицу, следующая за ней оценивается как 2 и т.д. Например, по критерию «стоимость» базовая шкала может быть представлена в виде:

1	2	3
приемлемая стоимость из- делия	дороже, чем хотелось бы	слишком дорого

Исходя из этих данных, нам нужно сравнить векторы $a_1 = (1, 2, 3)$, $a_2 = (2, 3, 1)$, $a_3 = (1, 3, 2)$, которые соответствуют П1, П2, П3.

1. Сформируем список векторных оценок у первой опорной ситуации L_1 . Опорные ситуации – это векторные оценки, имеющие только лучшие или худшие значения по всем критериям (соответственно первая и вторая опорная ситуация). Список векторных оценок у опорных ситуаций – подмножество векторных оценок, имеющих по всем критериям, кроме одного, те же значения, что и у данной опорной ситуации. $L_1 = \{211, 311, 121, 131, 112, 113\}$.

2. Сравним полученные векторные оценки первой опорной ситуации между собой. Для этого составим матрицу парных сравнений $A_{n \times n} = //\alpha_{ij} //$, где n – количество векторов опорной ситуации, $\alpha_{ij} = \mu(x_i, x_j)$ – степень предпочтения x_i оценки перед x_j . Если $\alpha_{ij} = 1$, то элемент x_i предпочтительнее элемента x_j , $\alpha_{ij} = 2 - x_i$ равноценен x_j , $\alpha_{ij} = 3 - x_j$ предпочтительнее x_i , при $\alpha_{ij} = 0$ элементы в строке и столбце не сравнены.

В исходной матрице в некоторых ячейках уже имеются единицы, поставленные там на основе базовой шкалы (табл. 3.3). Далее в таблице приведена та же матрица, но после того, как было указано, что оценка (211) лучше, чем (121). Заметим, что сравнение (211) с (131) сделано на основе транзитивности ((211) лучше (121), а (121) лучше, чем (131) в исходной матрице). Полностью заполненная экспертами матрица приведена в таблице третьей.

Таблица 3.3

211 311 121 131 112 113						211 311 121 131 112 113						
211 311 121 131 112 113						211 311 121 131 112 113						
211	2	1	0	0	0	211	2	1	1	1	0	
311		2	0	0	0	311		2	0	0	0	
121			2	1	0	121			2	1	0	
131				2	0	131				2	0	
112					2	112					2	
113						113						
	211	311	121	131	112	113	211	311	121	131	112	
211	2	1	1	1	1	1	211	2	1	1	1	1
311		2	1	1	3	1	311	3	2	1	1	1
121			2	1	1	1	121	3	3	2	1	1
131				2	3	1	131	3	3	3	2	1
112					2	1	112	3	1	3	1	2
113						2	113	3	3	3	3	2

По ней становится возможным восстановить все значения элементов (табл. 3.3, четвертая матрица).

3. В соответствии с последней матрицей в табл. 3.3. упорядочим векторные оценки из списка L_1 : (211), (311), (121), (112), (131), (113). Если по некоторым векторам имеются равные оценки, то лицу, принимающему решение, задаются дополнительные вопросы для сравнения спорных оценок опорной ситуации.

4. Используя единую порядковую шкалу (ЕПШ) (211), (311), (121), (112), (131), (113), упорядочим П1, П2, П3 по следующему принципу: первое значение по любому критерию имеет ранг 1, второе значение по первому критерию (211) – ранг 2 и т.д.

Тротуарная плитка	Внешний вид	Стоимость	Удобность укладки	Векторная оценка по ЕПШ	Векторная оценка по возрастанию рангов
П1	1	2	3	147	147
П2	2	3	1	261	126
П3	1	3	2	165	156

5. На основе таблицы сделаем вывод: векторная оценка, описывающая П2, лучше, чем оценки П1 и П3, далее можно предположить, что П1 лучше П3. Мы упорядочили изделия П2, П1, П3 и определили, что наиболее предпочтительным из них является П2. В конце процедуры экспертом необходимо предоставить соответствующие объяснения.

Таким образом, метод ЗАПРОС позволяет ранжировать альтернативы по субъективным вербальным оценкам с учетом значимости критерии, что особенно важно для многокритериальных задач. Кроме предложенного метода, возможно применение и других, соответствующих данному классу задач [64]: ПАРК (ПАРная Компенсация), ОРКЛАСС (ОРдинальная КЛАССификация).

4. Сравнительное исследование методов принятия решений в условиях неопределенности

Модели принятия решений широко используются в информационно-управляющих системах, в интеллектуальных системах обработки информации, в системах искусственного интеллекта. В работах [8, 25, 42, 45, 63, 100] производится классификация различных моделей и методов принятия решений, изложение их основ, намечаются подходы теоретического сравнения, но анализ моделей и методов с точки зрения практических результатов, как правило, не рассматривается. В главе 4 произведем сравнение практических результатов анализа проблемных ситуаций на основе модели функции доминирования (методами ПР при нечеткой исходной информации) и модели Бержа-Брука-Буркова (методом анализа иерархий), модели линейного упорядочивания на основе векторных оценок альтернатив (качественными методами принятия решений) с целью выявления наиболее оптимальных и эффективных подходов каждого из методов к такому анализу.

В разделе 4.1 рассматриваются основные теоретические свойства объектов выделенных моделей. Используя данные свойства, производится вычисление приоритетов объектов, парное сравнение которых осуществляется на основе количественной шкалы и по правилам формирования отношений в МАИ, методом принятия решений на базе нечеткой логики, и наоборот.

Рассматривается вопрос восстановления отношений по вектору приоритетов альтернатив. Такая возможность реализована для вектора недоминируемых альтернатив, по которому, как показано, можно восстановить обратносимметричную матрицу МАИ. Восстановление же нечеткого отношения нестрогого предпочтения по вектору приоритетов МАИ с точностью до постоянной осуществить невозможно.

Как известно, при осуществлении оптимального выбора вначале необходимо выявить факторы, оказывающие влияние на ход исследуемого процесса или его результаты. Некоторые факторы при этом поддаются формализованному представлению (т.е. могут быть выражены количественно), а некоторые нет, и могут быть выражены только при помощи субъективных оценок экспертов. Ввиду этого важной характеристикой методов принятия решений является их возможность учитывать объективную составляющую многоокритериальной проблемы, выраженную в виде количественных характеристик. В разделе 4.2 количественные данные были включены в процессы принятия решений с целью проверки достоверности линейного упорядочивания альтернатив на основе различных моделей принятия решений.

Как отмечается в [91], одним из научных направлений развития МАИ является оценка метода собственного вектора в ряду методов построения по заданной матрице парных сравнений объектов оптимального линейного их упорядочивания. В разделе 4.3 нами было проведено исследование, цель которого заключалась в определении наиболее предпочтительных методов

принятия решений в условиях неопределенности. Сравнение производилось участниками процесса принятия решений по многим критериям, предложенным на основе результатов практического применения методов и теоретического изучения их основ. В качестве средства анализа был выбран МАИ.

4.1. Сравнение результатов ранжирования альтернатив различными методами принятия решений в условиях неопределенности

Модели принятия решений в условиях неопределенности применяются для выбора наиболее оптимальных альтернатив из имеющихся в ситуациях, характеризуемых неточностью, неполнотой информации. Осуществление ранжирования альтернатив в этом случае возможно производить различными прямыми методами. Для ЛПР важно, чтобы результаты применения методов предоставляли одинаковое ранжирование альтернатив. Возможны различные приоритеты альтернатив, определяемые разными методами, но упорядочивание их должно быть одинаковым. Проведем сравнение результатов ранжирования альтернатив МАИ и методом принятия решений при нечеткой исходной информации.

Пусть имеется множество $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ – альтернатив, XxX – бинарное отношение на множестве альтернатив. Требуется для каждой альтернативы определить ее оценку – $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$. В МАИ (в ходе дальнейшего изложения – (1)) $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ – вектор приоритетов, в методах принятия решений при нечеткой исходной информации (способ (2)) $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ – вектор степеней недоминируемости альтернатив. Причем, в (1) $0 < \alpha_i \leq 1$, в (2) $0 \leq \alpha_i \leq 1$.

Бинарное отношение предпочтения альтернатив и в (1), и в (2) задается в виде квадратной матрицы $A_{n \times n} = //\alpha_{ij}//$, где $\alpha_{ij} = \mu(x_i, x_j)$ – степень предпочтения x_i альтернативы перед x_j . Матрицы $A_{n \times n} = //\alpha_{ij}//$, сформированные в каждом способе в соответствии со шкалами (шкалой функции принадлежности (2) или шкалой относительной важности (1)) и правилами формирования отношений в каждом из методов, будут обладать рядом общих и «индивидуальных» свойств.

В способе (2) $A_{n \times n}$ представляет собой нечеткое отношение нестрогого предпочтения альтернатив: $XxX \rightarrow [0; 1]$, т.е. $\alpha_{ij} = \mu(x_i, x_j) \in [0; 1]$ – значения функции принадлежности н.о.п. Матрицы $//\alpha_{ij}//$ неотрицательны, т.к. $0 \leq \alpha_{ij} \leq 1$. $\alpha_{ii} = 1$, где $i = j$, т.е. н.о.п. рефлексивно.

Базовая шкала способа (2) представлена на рис. 4.1. Функция принадлежности $\mu(x_i, x_j)$ обладает следующими свойствами:

- $\mu(x_i, x_j)$ возрастает с возрастанием степени превосходства (силы, интенсивности) оценки превосходства альтернативы;
- $\mu(x_i, x_j) = 1$ означает безусловное превосходство альтернативы x_i над x_j ;
- $\mu(x_i, x_j) = 0$ означает либо полное отсутствие превосходства альтернативы x_i над x_j , либо то, что i -тая альтернатива хуже j -той.




Рис. 4.1. Базовая шкала метода ПР при нечеткой исходной информации

В способе (1) $A_{n \times n}$ представляет собой положительную обратносимметричную матрицу, которую можно считать отношением предпочтения альтернатив. $X \times X \rightarrow [1/9; 9]$, т.е. $\alpha_{ij} = \mu(x_i, x_j) \in [1/9; 9]$ – значения функции принадлежности отношению предпочтения альтернатив, при этом $\mu(x_i, x_j)$ принимает значения в соответствии с базовой шкалой относительной важности, представленной на рис. 4.2.

В (1) // α_{ij} // являются:

- положительными;
- обратносимметричными (если $\alpha_{ij} = a$, то $\alpha_{ji} = 1/a$);
- неприводимыми;
- импримитивными;
- так же, как и в (2), бинарные отношения (1) являются рефлексивными, т.к. $\alpha_{ii} = 1$, где $i = j$.



Рис. 4.2. Базовая шкала МАИ

Функция принадлежности $\mu(x_i, x_j)$ обладает следующими свойствами:

- $\mu(x_i, x_j)$ возрастает с возрастанием надежности оценки превосходства альтернативы;
- $\mu(x_i, x_j) = 1$ означает равную важность альтернатив.

Сравнение результатов ранжирования альтернатив можно произвести несколькими способами.

1). *Соотнесение оценочных шкал.* Чтобы сравнить результаты ранжирования альтернатив $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, полученные в результате применения методов (1) и (2), необходимо вначале сформировать соответствующие этим способам н.о.п. для (2) и матрицу парных сравнений для (1) в соответствии с их базовыми шкалами. Очевидно, что эксперт не сможет заполнить для одной и той же группы альтернатив две матрицы, соответствующие способам (1) и (2), согласованные между собой, так, чтобы элементы матриц удовлетворяли перечисленным выше свойствам. Таким образом, процедуре сравнения результатов (1) и (2) должна предшествовать процедура соотнесения шкал (1) и (2). Процедура соотнесения шкал позволит по каждому «весу» критерия шкалы (1) получить «вес» критерия шкалы (2). Для соотнесения шкал рассматриваемых методов необходимо определить элементы шкал как гомоморфные алгебраические структуры, что будет сделано в главе 5.

2). *Применение алгоритмов (1) и (2) к сформированным бинарным отношениям для одних и тех же альтернатив на основе базовых шкал данных методов.* ЛПР формирует отношения на множестве одних и тех же альтернатив и для метода (1), и для метода (2), субъективно (имеется в виду, что он не ставит целью точное соотнесение оценок методов). Затем к каждому отношению применяется алгоритм (1) и (2).

Рассмотрим возможность применения МАИ к н.о.п. (2), т.е. возможность применить к н.о.п. теорему Перрона-Фробениуса: для примитивной матрицы A $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{A^k e}{\|A^k\|} = cw$, $\|A^k\| = e^T A^k e$, где c – постоянная, а w – собственный вектор, соответствующий $\lambda_{max} = \lambda_1$.

Матрицы н.о.п. $A_{n \times n} = //\alpha_{ij}//$ (2) являются неотрицательными ($\alpha_{ij} \geq 0$), как и матрицы парных сравнений в МАИ (1). Если на компоненты α_{ij} наложить дополнительное условие $\alpha_{ij} \neq 0$ (с точки зрения сравнения альтернатив это означает, что альтернативы не могут быть безразличны по отношению друг к другу), или, иначе, потребовать толерантности н.о.п. (нечеткое отношение толерантно, если оно рефлексивно и симметрично), то матрицы R заведомо удовлетворяют условиям теоремы Перрона-Фробениуса – являются примитивными. В этом случае возможна обработка матриц нечеткого отношения нестрогого предпочтения не только методом (2), но и на основе теоремы Перрона-Фробениуса (методом (1)). Однако, даже самый простой пример убеждает нас в различных результатах применяемых методов. Например, на основе матрицы н.о.п.

1	0,2	0,5
0,3	1	0,9
0,4	0,6	1

с использованием метода (2) получим вектор $\mu_R^{nd} = (0,9; 0,9; 0,7)$, тогда как применив теорему Перрона – $w = (0,268; 0,373; 0,358)$.

Проверим вывод о несовпадении w и μ_R^{nd} в общем случае на выборке случайных н.о.п. при помощи вычислительного эксперимента. Для этого для матриц всех размерностей до 9 создадим по 50 выборок (каждая выборка состоит из 400 матриц) и заполним случайными образом их элементы числами из шкалы $(0; 1]$ так, что $\alpha_{ij} = 1$ при $i = j$. Применим к каждому из полученных отношений алгоритмы (2) и (1) и подсчитаем количество отношений каждой размерности, для которых вектор приоритетов и функция недоминируемости предоставляют одинаковое ранжирование альтернатив (табл. 4.1). Из приведенной таблицы видно, что с увеличением размерности матрицы количество случаев одинакового упорядочивания альтернатив заметно уменьшается.

Таблица 4.1

Результаты соответствия упорядочивания альтернатив методами (1) и (2) по н.о.п.

Размерность матрицы	Средний % одинакового упорядочивания по всем выборкам
$A_{3 \times 3}$	51,90
$A_{4 \times 4}$	20,94
$A_{5 \times 5}$	6,25
$A_{6 \times 6}$	1,59
$A_{7 \times 7}$	0,36
$A_{8 \times 8}$	0,07
$A_{9 \times 9}$	0,01

Рассмотрим возможность применения метода принятия решения при нечеткой исходной информации с одним экспертом к обратносимметричным матрицам метода (1).

Матрицу $A_{n \times n} = //\alpha_{ij}//$, $\alpha_{ij} \in [1/9; 9]$ (1) можем представить в виде н.о.п. (2). Для этого от отношения $A_{n \times n} = //\alpha_{ij}//$ перейдем к отношению $B_{n \times n} = //\beta_{ij}//$, где $\beta_{ij} = \alpha_{ij} / \max_{i,j} \alpha_{ij}$. Таким образом, мы получаем нечеткое отношение

$$X \times X \rightarrow [0, 1].$$

Утверждение. Деление каждого элемента матрицы (1) на максимальный элемент (умножение на любое положительное число в общем виде) не меняет ее вектора приоритета (главного собственного вектора). Действительно, по теореме Перрона-Фробениуса для примитивной матрицы A

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{A^k e}{\|A^k\|} = cw, \quad \|A^k\| = e^T A^k e, \text{ где } c - \text{ постоянная, а } w - \text{ собственный вектор,}$$

соответствующий $\lambda_{max}(A)$. Получаем

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{B^k e}{\|B^k\|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(mA)^k e}{\|(mA)^k\|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{m^k A^k e}{\|m^k A^k\|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{m^k A^k e}{m^k \|A^k\|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{A^k e}{\|A^k\|} = cw,$$

где $m = \max_{i,j} \alpha_{ij}$.

Отсюда следует, что для одного набора значений вектора приоритетов альтернатив в (1) существует бесконечно много отношений $A_{n \times n}$, отличающихся друг от друга на постоянную.

Аналогичное утверждение можно сформулировать и для н.о.п.

Утверждение. Умножение отношения (2) на $c = const, c > 0$, не меняет его вектор степеней недоминируемости альтернатив.

Действительно, пусть имеется отношение R . Рассмотрим отношение $R' - \mu_{R'} : X \times X \rightarrow [0, m]$, где $\mu_{R'} = m \mu_R$.

При построении нечеткого отношения строгого предпочтения R^s по н.о.п. μ_R –

$$\mu_R^s(x_i, x_j) = \begin{cases} \mu(x_i, x_j) - \mu(x_j, x_i), & \text{если } \mu(x_i, x_j) > \mu(x_j, x_i); \\ 0, & \text{если } \mu(x_i, x_j) \leq \mu(x_j, x_i). \end{cases}$$

При построении нечеткого отношения строгого предпочтения R'_s по н.о.п. $\mu_{R'} -$

$$\mu_{R'}^s(x_i, x_j) = \begin{cases} \mu(x_i, x_j) - \mu(x_j, x_i), & \text{если } \mu(x_i, x_j) > \mu(x_j, x_i); \\ 0, & \text{если } \mu(x_i, x_j) \leq \mu(x_j, x_i). \end{cases}$$

Если $\mu(x_i, x_j) > (\leq) \mu(x_j, x_i)$, то и $m\mu(x_i, x_j) > (\leq) m\mu(x_j, x_i)$, т.е., если $(x_i, x_j) \in R_s$, то и $(x_i, x_j) \in R'_s$.

Вторым этапом в алгоритме (2) формируется множество недоминируемых альтернатив $\mu_R^{nd}(x_i) = 1 - \max_j \{\mu_R^s(x_i, x_j)\}$. Для R'_s сформируем его

следующим образом: $\mu_{R'}^{nd}(x_i) = m - \max_j \{\mu_{R'}^s(x_i, x_j)\}$. Из определения μ_R^{nd} следует, что и для отношения μ_R , и для $\mu_{R'}$ будет произведено одинаковое ранжирование альтернатив. Кроме того, если $\mu_R^{nd}(x_i)$ нормализуется (что в методе (2) в принципе не требуется), то и для μ_R , и для $\mu_{R'}$ векторы степеней недоминируемости альтернатив будут совпадать.

Отсюда следует, что фиксированному нормализованному вектору

$\mu_R^{nd}(x_i)$, $i = 1, \dots, n$ в (2) соответствует бесконечно много н.о.п. $\mu_R: X \times X$, с точностью до постоянной. По данному утверждению, применяя алгоритм (2) к обратносимметричной матрице $A_{n \times n} = //\alpha_{ij}//$, переход к отношению $B_{n \times n} = //\beta_{ij}//$, где $\beta_{ij} = \alpha_{ij} / \max_{i,j} \alpha_{ij}$, в принципе необязателен.

Но применение метода (2) к матрицам (1) не приводит к результату, который получается в МАИ.

Например, для обратносимметричной матрицы

$$\begin{matrix} 1 & 1/3 & 1/6 \\ 3 & 1 & 6 \\ 6 & 1/6 & 1 \end{matrix}$$

по теореме Перрона-Фробениуса будет сформирован вектор приоритетов $(0,095; 0,654; 0,249)$.

Если применить к данной матрице способ (2), то будет получен вектор степеней недоминируемости альтернатив $(0,045; 0,909; 0,045)$, который представляет ранжирование альтернатив, отличное от метода (1).

Аналогично, как и в первом случае, проверим вывод о несовпадении w и μ_R^{nd} на выборке случайных обратносимметричных матриц при помощи вычислительного эксперимента. Для этого для матриц всех размерностей до 9 создадим по 50 выборок (каждая выборка состоит из 400 матриц) и заполним случайными образом их элементы числами из шкалы МАИ так, что $\alpha_{ij} = 1$, при $i = j$ и $\alpha_{ij} = 1/\alpha_{ji}$. Применим к каждому из полученных отношений алгоритмы (2) и (1) и подсчитаем количество отношений каждой размерности, для которых вектор приоритетов и функция недоминируемости предоставляют одинаковое ранжирование альтернатив (табл. 4.2). Из приведенной таблицы видно, что с увеличением размерности матрицы количество случаев одинакового упорядочивания альтернатив заметно уменьшается.

Таблица 4.2

Результаты соответствия упорядочивания альтернатив методами (1) и (2) по обратносимметричной матрице

Размерность матрицы	Средний % одинакового упорядочивания по всем выборкам
$A_{3 \times 3}$	61,12
$A_{4 \times 4}$	29,14
$A_{5 \times 5}$	8,11
$A_{6 \times 6}$	2,51
$A_{7 \times 7}$	0,20
$A_{8 \times 8}$	0,06
$A_{9 \times 9}$	0,00

То есть, отношения сравнения альтернатив при наложении некоторых

дополнительных ограничений удовлетворяют свойствам, необходимым для применения другого метода, но попытки применения этих методов показали несостоятельность такого подхода (рис. 4.3).




Рис. 4.3. Зависимость одинаковых упорядочиваний альтернатив разными методами от размерностей матриц

На основе проведенных рассуждений можно сформулировать следующие свойства рассмотренных моделей линейного упорядочивания:

Свойство 1. Умножение бинарного отношения A на положительную постоянную не изменяет линейного упорядочивания модели.

Свойство 2. Ранжирование альтернатив на основе бинарных отношений одной модели методами других моделей в общем случае различно, причем с увеличением размерности матрицы степень различного ранжирования возрастает.

Свойство 3. Модели линейного упорядочивания допускают вычисление вектора приоритетов по различным бинарным рефлексивным отношениям при наложении на них ряда дополнительных условий.

3). *Восстановление отношения (1) на основе вектора степеней недоминируемости альтернатив, вычисленного для отношения (2).* Рассмотрим н.о.п. $\mu_R: X \times X \rightarrow [0, 1]$ на множестве альтернатив $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Методом (2) получим множество недоминируемых альтернатив $S = \{\langle x_i; \mu_R^{nd}(x_i) \rangle\}$, где $\mu_R^{nd}(x_i)$ представляет собой «вес», или оценку, каждой альтернативы. При этом для дальнейших рассуждений необходимо, чтобы выполнялось условие $\forall x_i, i = 1, \dots, n \mid \mu_S(x_i) \neq 0$ (в противном случае, при получении обратносимметричной матрицы будет выполняться деление на нуль). Потре-

буем, чтобы $\sum_i \mu_s(x_i) = 1$ (нормализуем полученный вектор). Степень принадлежности элементов отношению $A_{n \times n} = //\alpha_{ij} //$ (1) будем определять посредством парных сравнений $\alpha_{ij} = \mu_s(x_i) / \mu_s(x_j)$ (в виду этого условие $\sum_i \mu_s(x_i) = 1$ можно считать избыточным). В результате получим примитивную обратносимметричную матрицу, обладающую свойством рефлексивности ($\alpha_{ij} = 1$, при $i = j$), которая удовлетворяет условиям теоремы Перрона-Фробениуса. Вычислим для данной матрицы вектор приоритетов (w_1, w_2, \dots, w_n) и убедимся в том, что он совпадает с нормализованным вектором степеней недоминируемости альтернатив.

Действительно, пусть дан вектор степеней недоминируемости альтернатив как результат метода (2) $\mu_s = (\mu_s(x_1), \mu_s(x_2), \dots, \mu_s(x_n))$, такой, что $\sum_i \mu_s(x_i) = 1$.

Обозначим через α_{ij} число, соответствующее значимости альтернативы x_i по сравнению с x_j . Матрицу, состоящую из этих чисел, обозначим через $A = (\alpha_{ij})$. В нашем случае $\alpha_{ij} = \mu_s(x_i) / \mu_s(x_j)$, $i, j = 1, \dots, n$.

Поэтому $\alpha_{ji} = \mu_s(x_j) / \mu_s(x_i) = 1 / \alpha_{ij}$. Тогда $\alpha_{ij} \frac{\mu_s(x_j)}{\mu_s(x_i)} = 1$, $i, j = 1, \dots, n$.

Следовательно, $\sum_{j=1}^n \alpha_{ij} \mu_s(x_j) \frac{1}{\mu_s(x_i)} = n$, $i = 1, \dots, n$.

Получаем $\sum_{j=1}^n \alpha_{ij} \mu_s(x_j) = n \mu_s(x_i)$, $i = 1, \dots, n$. Или $A \mu_s = n \mu_s$. То есть,

μ_s – собственный вектор матрицы A с собственным значением n . С другой стороны, по теореме Перрона-Фробениуса (в методе МАИ) по матрице A будет вычислен вектор приоритетов (w_1, w_2, \dots, w_n) , который, как показано, и будет являться вектором степеней недоминируемости альтернатив $\mu_s = (\mu_s(x_1), \mu_s(x_2), \dots, \mu_s(x_n))$.

Например, для ранее рассмотренного н.о.п.

н.о.п.			$\mu_R^{nd} =$	$w =$
1	0,2	0,5	0,9 (0,36)	0,268
0,3	1	0,9	0,9 (0,36)	0,373
0,4	0,6	1	0,7 (0,28)	0,358

соответствующая данным результатам μ_R^{nd} = матрица МАИ будет иметь вид:

			Главный соб. вектор	Вектор приор. w
$0,9/0,9 = 1$	$0,9/0,9 = 1$	$0,9/0,7 \approx 1,29$	1,09	0,360
$0,9/0,9 = 1$	$0,9/0,9 = 1$	$0,9/0,7 = 1,29$	1,09	0,360
$0,7/0,9 \approx 0,78$	$0,7/0,9 \approx 0,78$	$0,7/0,7 = 1$	0,85	0,280

Восстановление по вектору приоритетов (1) н.о.п. (2) с точностью до постоянной невозможно, так как одному w могут соответствовать несколько различных н.о.п.

Таким образом, в разделе 4.1 показано, что применение к произвольному н.о.п. модели функции доминируемости способа обработки данных (1) предоставляет результаты, отличные от тех, которые могут быть получены на основе модели (2). Такой же вывод был сделан и для обратносимметричных матриц (1).

В этом случае представляет интерес вопрос о том, как по вектору приоритетов, полученному при помощи одного из методов, восстановить бинарное отношение, удовлетворяющее условиям другого метода. Нами предложен способ восстановления матрицы (1) по вектору степеней недоминируемости альтернатив (2).

4.2. Применение методов принятия решений для анализа количественных данных

Для сравнения результатов различных методов принятия решений с целью выявления их достоверности и объективности необходимо воспользоваться каждым из них при анализе одной и той же проблемной ситуации. В качестве такой задачи будем рассматривать задачу ранжирования объектов на основе их отношения предпочтения, сформированного ЛПР. Если при этом использовать субъективные оценки экспертов при парных сравнениях объектов, то результаты, зависящие от исходных данных каждого метода, заведомо будут различны, так как в каждом методе используется свой принцип парных сравнений объектов и количественная шкала. Поэтому в роли «эталонной» задачи может выступать только та задача, исходными данными которой являются парные сравнения объектов, основанные на их количественных характеристиках (а не на оценках экспертов).

Такой подход был реализован в [91] для иллюстрации адекватности МАИ реальному линейному упорядочиванию объектов.

В монографии рассматривается линейное упорядочивание объектов при помощи различных моделей принятия решений на основе количественных данных с целью выявления модели и метода, результаты которого наиболее точно соответствуют исходному ранжированию объектов и их количественным характеристикам.

Упорядочивание объектов на основе отношения предпочтения по одному критерию

Пусть имеет множество $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ объектов.

$W = \{w_1, \dots, w_n\}$ – количественные оценки объектов по критерию q .

Необходимо сформировать нечеткие подмножества \tilde{A}_i , соответствующие различному упорядочиванию наиболее предпочтительных по критерию q объектов различными методами ПР.

В качестве реальных объектов и их количественных характеристик рассмотрим фактическую среднегодовую себестоимость основных видов продукции ОАО «КЗ ЖБИ» за 1998 г. (табл. 4.3). На основе моделей принятия решений необходимо в этом случае осуществить ранжирование изделий по возрастанию фактических затрат на их производство.

Таблица 4.3

Среднегодовая фактическая себестоимость ж/б продукции
за 1998 г. по «КЗ ЖБИ»

Название	Среднегод. фактич. себестоим. (млн. руб.)
Сборный железобетон	17489
Стеновые материалы	4042
Керамзит товарный	1132
Бетон товарный	4387
Раствор товарный	1321

Составим отношение предпочтения объектов $A = \|\alpha_{ij}\|, i, j = 1, \dots, 5$.

При этом, если w_i – абсолютная характеристика (вес) i -го объекта, то

$\alpha_{ij} = \frac{w_i}{w_j}$ выражает степень предпочтения i -го объекта перед j -м (табл. 4.4).

Так составленное отношение соответствует логике построения отношений в методе анализа иерархий (1) и в методах принятия решений при нечеткой исходной информации (2) и удовлетворяет степенной калибровке, приемлемой как для модели Бэржа-Брука-Буркова, так и модели функции доминирования. Количественные методы принятия решений позволяют сравнивать объекты лишь по нескольким критериям; сравнение объектов на основе их предпочтения относительно какой-либо одной цели в этих методах не применяется (в этом случае будет получен простейший случай – модель спортивного типа), поэтому на их основе линейное упорядочивание объектов по одному критерию не производилось.

Таблица 4.4

Отношение предпочтения $A = \|\alpha_{ij}\|$, соответствующее табл. 4.3

Продукция	Сб. жел/б	Стен. мат.	Керамзит тов.	Бетон тов.	Раствор тов.
Сб. жел/б	1	17489/4042	17489/1132	17489/4387	17489/1321
Стен. мат.	4042/17489	1	4042/1132	4042/4387	4042/1321
Керамзит тов.	1132/17489	1132/4042	1	1132/4387	1132/1321
Бетон тов.	4387/17489	4387/4042	4387/1132	4387/4387	4387/1321
Раствор тов.	1321/17489	1321/4042	1321/1132	1321/4387	1

Полученное отношение предпочтения является положительной обратносимметричной матрицей, к которой можно применить любой из способов вычисления главного собственного вектора w . В данном примере применялся способ, дающий наиболее точное приближение $y_i = \sqrt[n]{\alpha_{ij}}, j = 1, \dots, n$. Вектор приоритетов получаем нормализацией главного собственного вектора. Матрица $A = \|\alpha_{ij}\|$ и ее вектор приоритетов имеют вид:

1,000	4,327	15,450	3,987	13,239	$y_1 =$	0,616
0,231	1,000	3,571	0,921	3,060	$y_2 =$	0,142
0,065	0,280	1,000	0,258	0,857	$y_3 =$	0,040
0,251	1,085	3,875	1,000	3,321	$y_4 =$	0,155
0,076	0,327	1,167	0,301	1,000	$y_5 =$	0,047

Чтобы сравнить результаты, полученные МАИ, и реальные «веса» объектов, произведем нормализацию исходных количественных данных. Нормализованные количественные характеристики объектов, как убеждаемся, совпадают с вектором приоритетов:

Объект	Количеств. характеристика	Нормализованные количеств. характеристики	Значения вектора приоритетов
Сб. жел/б	17489	0,616	0,616
Стен. мат.	4042	0,142	0,142
Керамзит тов.	1132	0,040	0,040
Бетон тов.	4387	0,155	0,155
Раствор тов.	1321	0,047	0,047

Получим приоритеты объектов методом ПР на базе нечеткой логики.

Исходное бинарное отношение нестрогого предпочтения имеет вид:

$R =$	1,000	4,327	15,450	3,987	13,239
	0,231	1,000	3,571	0,921	3,060
	0,065	0,280	1,000	0,258	0,857
	0,251	1,085	3,875	1,000	3,321
	0,076	0,327	1,167	0,301	1,000

Максимальный элемент отношения $\max_R = 15,450$. В дальнейшем это значение будет использовано как «единица» (наибольшее значение) отношения.

Бинарное отношение строгого предпочтения, ассоциированное с R , $R^S = R \setminus R^T$:

$R^S =$	0,000	4,096	15,385	3,736	13,164
	0,000	0,000	3,291	0,000	2,733
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,164	3,617	0,000	3,020
	0,000	0,000	0,310	0,000	0,000

Множество недоминируемых альтернатив строится в данном случае по правилу $\mu_R^{nd}(u_i) = \max_R - \max_{u_j \in U} \{ \mu_R^S(u_j; u_i) \}$.

Например, $\mu_R^{nd}(u_1) = 15,450 - 0 = 15,450$.

В итоге получим вектор степеней недоминируемости альтернатив

$$\mu_R^{nd} = \{15,450; 11,354; 0,065; 11,714; 2,286\}.$$

Нормализованные значения μ_R^{nd} не совпадают с вектором приоритетов, полученным нормализацией главного собственного вектора матрицы A , но предоставляют такое же ранжирование альтернатив. Несовпадение значений объясняется тем, что МАИ определяет в результате исходный «вес» каждого объекта, а метод (2) – степень недоминируемости. Действительно, фактическая себестоимость сборного железобетона не доминируется никакими другими изделиями со степенью недоминируемости $\mu_R^{nd}(u_1) = 15,450$, которая семантически выражает то, что объект может доминироваться другими, но со степенью доминирования не выше, чем $\max_R - \mu_R^{nd}(u_1) = 0$. Для стеновых

материалов $\mu_R^{nd}(u_2) = 11,354$, т.е. степень доминируемости

$$\mu_R^{nd}(u_2) \leq \max_R - \mu_R^{nd}(u_2) = 4,096$$

(по бинарному отношению нестрогого предпочтения в этом легко убедиться).

Сравним полученные приоритеты (степень недоминируемости в методе (2) можно рассматривать как приоритет объекта, так как на основе вектора степеней недоминируемости делается вывод о ранжировании объектов) (табл. 4.5).

Таблица 4.5

Приоритеты объектов,
полученные разными методами принятия решений

Значения вектора приоритетов, полученных способом (2)	0,378	0,278	0,002	0,287	0,056
Значения вектора приоритетов, полученных способом (1)	0,616	0,142	0,040	0,155	0,047

Полученные нормализованные приоритеты объектов каждого метода можно рассматривать как нечеткие подмножества \tilde{A}_1 и \tilde{A}_2 множества X , соответствующие методам (1) и (2) соответственно, где

$$\tilde{A}_1 = \{ \langle x, y(x) \rangle \}, x \in X, \quad \tilde{A}_2 = \{ \langle x, \mu_R^{nd}(x) \rangle \}, x \in X.$$

Нормализованные количественные характеристики объектов будем интерпретировать как нечеткое подмножество $\tilde{A} = \{ \langle x, w(x) \rangle \}, x \in X$.

В этом случае становится возможным определить степень равенства нечетких подмножеств \tilde{A}_1 и \tilde{A}_2 «эталонному» множеству \tilde{A} . Степень равенства определим различными способами.

Степень равенства двух нечетких подмножеств, рассматриваемая А.Н. Мелиховым [69], определяется по формуле

$$\mu(\tilde{A}_1, \tilde{A}) = \&_{x \in X} (y(x) \leftrightarrow w(x)) = \&_{x \in X} (\max(1 - y(x), w(x)); \max(1 - w(x), y(x))).$$

$$\mu(\tilde{A}_1, \tilde{A}) = (0,616 \leftrightarrow 0,616) \& (0,142 \leftrightarrow 0,142) \&$$

$$\& (0,040 \leftrightarrow 0,040) \& (0,155 \leftrightarrow 0,155) \& (0,047 \leftrightarrow 0,047) =$$

$$= 0,616 \& 0,858 \& 0,96 \& 0,845 \& 0,953 = 0,616.$$

$$\mu(\tilde{A}_2, \tilde{A}) = \&_{x \in X} (\mu_R^{nd}(x) \leftrightarrow w(x)).$$

$$\mu(\tilde{A}_2, \tilde{A}) = (0,378 \leftrightarrow 0,616) \& (0,278 \leftrightarrow 0,142) \&$$

$$\& (0,002 \leftrightarrow 0,040) \& (0,287 \leftrightarrow 0,155) \& (0,056 \leftrightarrow 0,047) =$$

$$= 0,384 \& 0,722 \& 0,960 \& 0,713 \& 0,944 = 0,384.$$

Так как $\mu(\tilde{A}_1, \tilde{A}) \geq 0,5$, то $\tilde{A} \approx \tilde{A}_1$ (сравниваемые множества нечетко равны).

Так как $\mu(\tilde{A}_2, \tilde{A}) \leq 0,5$, то сравниваемые множества нечетко не равны –

$\tilde{A} \approx \tilde{A}_2$. Степень равенства $\mu(\tilde{A}_1, \tilde{A}) > \mu(\tilde{A}_2, \tilde{A})$, что свидетельствует о

предпочтительности результатов метода (1), рассматриваемых как количественные оценки важности объектов.

Хэммингово расстояние.

$$R(\tilde{A}, \tilde{A}_I) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |w(x_i) - y(x_i)|, \quad x_i \in X.$$

В этом случае $R(\tilde{A}, \tilde{A}_I) = 0$.

$$R(\tilde{A}, \tilde{A}_2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |w(x_i) - \mu_R^{nd}(x_i)|, \quad x_i \in X, \quad R(\tilde{A}, \tilde{A}_2) = \frac{1}{5}(0,553) = 0,11.$$

Евклидово расстояние

$$R_E(\tilde{A}, \tilde{A}_I) = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{i=1}^n (w(x_i) - y(x_i))^2}, \quad x_i \in X.$$

При этом $R_E(\tilde{A}, \tilde{A}_I) = 0$.

$$R_E(\tilde{A}, \tilde{A}_2) = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{i=1}^n (w(x_i) - \mu_R^{nd}(x_i))^2}, \quad x_i \in X, \quad R_E(\tilde{A}, \tilde{A}_2) = 0,02.$$

Таким образом, приоритеты, получаемые в МАИ, практически совпадают с «эталонными» значениями объектов по выбранному критерию. Метод (2) дает близкие значения к «эталону», но менее предпочтительные с точки зрения равенства исходным количественным характеристикам.

В отличие от разделе 4.1., результаты двух рассмотренных методов для количественных данных представляют как одинаковое ранжирование альтернатив, так и близость результатов к исходным данным. Такое достоверное упорядочивание методом (2) количественных данных и расхождение его результатов с результатами метода (1) в разделе 4.1. может быть объяснено несогласованностью произвольно выбранных матриц. Чем согласованнее матрица (1), тем ближе будут результаты методов (1) и (2) по ее обработке. Такое утверждение иллюстрирует следующий вычислительный эксперимент: случайным образом формируются 50 выборок по 100 обратносимметричных матриц $A_{4 \times 4}$ каждая (все элементы матрицы – случайные числа, соответствующие шкале МАИ), причем главное собственное значение каждой матрицы отличается от 4 (главного собственного значения полностью согласованной матрицы $A_{4 \times 4}$) на ε . С уменьшением ε процент одинакового упорядочивания альтернатив различными методами возрастает (табл. 4.6, рис. 4.4).

Таблица 4.6

Результаты упорядочивания альтернатив методами (1) и (2)
по обратносимметричным матрицам $A_{4 \times 4}$, для которых $\lambda_{max} - n < \varepsilon$, $n = 4$

ε	0,1	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,009	0,000001
% одинакового упорядочивания	58,2	62,4	63,00	64,8	64,1	68,6	71,3	100



Рис 4.4. Зависимость одинакового упорядочивания альтернатив различными методами по обратносимметричным матрицам от главного собственного значения матрицы

Причем, как показывает анализ случаев неодинакового упорядочивания, все они характеризуются тем, что вектор степеней недоминируемости альтернатив имеет несколько равных значений, в то время как вектор приоритетов таких значений не имеет.

Упорядочивание объектов на основе отношения предпочтения по нескольким критериям

Все рассмотренные методы принятия решений позволяют производить упорядочивание объектов на основе экспертных оценок по некоторым критериям. Произведем сравнение полученных при этом результатов. Для «эталонной» задачи используем задачу, которая может, с одной стороны, решена классическими методами оптимизации, с другой стороны, методами принятия решений в условиях неопределенности.

Рассмотрим планирование производства бетонных смесей различных видов несколькими бетоносмесителями, принадлежащими двум бетоносмесительным узлам одного завода ЖБИ. Информация о плане производства железобетонных изделий и нормах расхода бетонной смеси на железобетонные изделия представлена в следующих таблицах:

*План производства ж/б изделий по формовочному цеху № 1
завода ЖБИ на февраль*

Технологическая линия	Марка ЖБИ	Код	План производства мес., по периодам, шт.		
			1	2	3
Стендовая	СК 2-1А		16	10	12
	СК 2-15Н		15	13	11
	СК 3-3 Г		16	14	13
	СК 6-1		15	12	11
Агрегатно-поточ- ная	СВ 2-59		10	10	10
	СВ 3-6		10	10	10
	СВ 3-8		10	10	10
	СВ 11-6А		10	10	10
	СВ 11-20		10	10	10

*План производства ж/б изделий по формовочному цеху №2
завода ЖБИ на февраль*

Технологическая линия	Марка ЖБИ	Код	План производства мес., по периодам, шт.		
			1	2	3
Стендовая	Н-115		5	6	8
	Н-148		5	2	4
	Н-159		3	3	3
	Н-163		4	3	3

Ведомость норм расхода бетонной смеси на железобетонные изделия

Марка ЖБИ	Бетонная смесь, норма расхода			Марка ЖБИ	Бетонная смесь, норма расхода		
	Л	Р	Т		Л	Р	Т
СК 2-1А	1,3	0,55		СВ 11-6А		0,8	2,1
СК 2-15Н	1,9	0,50		СВ 11-20		0,44	0,9
СК 3-3 Г	1,575	0,55		Н-115	4,12	0,8	
СК 6-1	1,9	0,66		Н-148	3,24	0,72	
СВ 2-59		0,57	0,9	Н-159	5	1,04	
СВ 3-6		0,84	1,67	Н-163	3,3	0,57	
СВ 3-8		0,79	1,35				

Необходимо определить потребность завода в различных видах бетонной смеси на первую декаду месяца.

Результатом обычного расчета будут следующие показатели: стендовая линия цеха № 1 – 103 м³ (легкая бетонная смесь) и 35 м³ (раствор); агрегатно-поточная линия цеха № 1 – 69 м³ (тяжелая бетонная смесь), 34,40 м³ (рас-

твр); стеновая линия цеха № 2 – 65 м³ (легкая бетонная смесь), 13 м³ (раствор). Всего необходимо выпустить легкой бетонной смеси 168 м³, раствора 82,4 м³, тяжелой бетонной смеси – 69 м³.

Применяя МАИ к поставленной задаче, проблему можно представить в виде четырехуровневой иерархии:



На каждом из уровней формируются матрицы парных сравнений объектов по отношению к каждому из объектов вышестоящего уровня, как это делалось для задачи ранжирования объектов по одному критерию.

По каждой из полученных матриц вычисляется вектор приоритетов. Как было показано в первом примере, нормализованный главный собственный вектор каждой из матриц будет состоять из нормализованных количественных значений объектов. Для вычисления обобщенных приоритетов объектов применяется процедура взвешивания, в процессе которой матрица весов видов бетонной смеси относительно изделий умножается на вектор приоритетов изделий: матрица

СК 2-1A	СК 2-15H	СК 3-3Г	СК 6-1	СВ 2-59	СВ 3-6	СВ 3-8	СВ 11-6A	СВ 11-20	СВ 11-H-115	СВ 11-H-148	СВ 11-H-159	СВ 11-H-163
Л 0,703	0,792	1,000	0,742	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,837	0,818	0,828	0,853
Р 0,297	0,208	0,000	0,258	0,388	0,335	0,369	0,276	0,328	0,163	0,182	0,172	0,147
Т 0,000	0,000	0,000	0,000	0,612	0,665	0,631	0,724	0,672	0,000	0,000	0,000	0,000

умножается на вектор-столбец весов изделий

СК 2-1A	СК 2-15H	СК 3-3Г	СК 6-1	СВ 2-59	СВ 3-6	СВ 3-8	СВ 11-6A	СВ 11-20	H-115	H-148	H-159	H-163
0,124	0,116	0,124	0,116	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,039	0,039	0,023	0,031

В результате получим обобщенные (глобальные) веса видов бетонной смеси:

Вид бетонной смеси Приоритет МАИ Нормализованные количеств. оценки

Л	0,467 (1)	0,526 (1)
Р	0,277 (2)	0,258 (2)
Т	0,256 (3)	0,217 (3)

Ранжирование объектов нижнего уровня иерархии оказалось таким же, как и при обычном способе вычисления.

Применяя к вычислению приоритетов объектов метод принятия решений при нечеткой информации, будем рассматривать проблему как задачу с несколькими заданными бинарными отношениями количественного превосходства видов бетонной смеси R_1, \dots, R_{13} по отношению к изделиям и еще одним бинарным отношением N количественного превосходства изделий.

Для каждого отношения R_1, \dots, R_{13} вычисляем функцию принадлежности $\mu_1^{nd}, \dots, \mu_{13}^{nd}$ (которую будем рассматривать как нормализованные исходные количественные значения), по которым формируем матрицу Φ .

Свертку Γ определяем как максминное произведение матриц $\Gamma = \Phi^T N \Phi$.

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 1,00 & 0,39 & 0,72 \\ 0,39 & 0,39 & 0,39 \\ 0,72 & 0,39 & 0,72 \end{pmatrix}.$$

Множество недоминируемых альтернатив U_Γ^{nd} определяется вектором:

$v_\Gamma^{nd} = \{5,39; 5,39; 5,39\}$, а скорректированное множество $\tilde{U}_\Gamma^{nd} = \{1,00; 0,39; 0,72\}$, которое представляет ранжирование альтернатив, не соответствующее действительному.

Можно проанализировать задачу и методом принятия решений при нечеткой исходной информации в случае, когда критерии характеризуются весовыми коэффициентами. Составим отношения количественного превосходства изделий по группам, которые соответствуют используемым материалам. В первую группу включим изделия: СК 2-1А, СК 2-15Н, СК 3-3 Г, СК 6-1, Н-115, Н-148, Н-159, Н-163, для изготовления которых используется легкая бетонная смесь и раствор. Для каждого из них составим отношение количественного превосходства видов используемой бетонной смеси. В качестве весов изделий будем использовать их нормализованные количества: $\lambda_1 = 0,203; \lambda_2 = 0,190; \lambda_3 = 0,203; \lambda_4 = 0,190; \lambda_5 = 0,063; \lambda_6 = 0,063; \lambda_7 = 0,038; \lambda_8 = 0,051$.

Свертки P и Q отношений R_1, \dots, R_8 определяются матрицами:

$$P = \begin{pmatrix} 1,00 & 2,36 \\ 0,17 & 1,00 \end{pmatrix} \quad Q = \begin{pmatrix} 5,39 & 22,34 \\ 1,42 & 5,40 \end{pmatrix}.$$

Множества U_P^{nd}, U_Q^{nd} определяются векторами:

Легкая бет. смесь Раствор

$$v_P^{nd} = \{22,34; 20,14\}$$

$$v_Q^{nd} = \{22,34; 1,42\}$$

Откуда $\mu_{nd} = \{22,335; 1,416\}$.

В вторую группу включим изделия: СВ 2-59, СВ 3-6, СВ 3-8, СВ 11-6, СВ 11-20, для изготовления которых используется тяжелая бетонная смесь

и раствор. В этом случае $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = \lambda_5 = 0,2$. Произведя аналогичные вычисления, как и для первой группы изделий, получим: $\mu_{nd} = \{1,427; 2,625\}$. Обобщая полученные результаты, получим: легкая бетонная смесь – 22,335; раствор – 2,843; тяжелая бетонная смесь – 2,625. После нормализации: легкая бетонная смесь – 0,803; раствор – 0,102; тяжелая бетонная смесь – 0,094.

При таком способе вычисления линейное упорядочивание объектов соответствует реальному.

Применить качественные методы принятия решений для анализа количественных данных не представляется возможным по целому ряду причин.

Например, при использовании в этих целях метода ЗАПРОС задача будет поставлена следующим образом:

Дано: $K = \{q_i\}, i = 1, \dots, Q$ ($Q = 13$) – множество критериев (в данной задаче изделий). $K = \{И1, \dots, И13\}$.

n_q – число оценок по критерию q для каждого объекта (вида бетонной смеси), $n_1 = n_2 = n_3 = 3$.

$X_q = \{x_{iq}\}$ – шкала критерия q . Например $X_1 = \{1,3; 0,55; 0\}$.

$|X_q| = n_q, |X_1| = |X_2| = |X_3| = 3$.

$Y = X_1 \times X_2 \times X_3$ – множество векторных оценок $y_i \in Y$. $N = |Y| = \prod_{q=1}^Q n_q$.

В случае рассмотренной задачи $N = 3^{13}$.

В методе ЗАПРОС ЛПР производит сравнение векторных оценок из опорных ситуаций; такие векторные оценки будут являться подмножеством множества Y . Вначале формируется список оценок у первой опорной ситуации L_1 , состоящий из всевозможных векторных оценок альтернатив, среди которых все, кроме одной, наилучшие. То есть, эксперту необходимо будет сравнивать векторные оценки, что намного психологически труднее, как показывает наш опыт применения данного метода, чем сравнивать непосредственно объекты (при таком сравнении эксперту приходится неявно еще и сравнивать сами критерии).

Кроме того, метод ориентирован на качественные оценки и качественные операции сравнения, которые к формальным количественным критериям могут и не быть правильно применены.

4.3. Оценка предпочтительности методов принятия решений с точки зрения участников процесса принятия решений

Уже сам факт наличия чрезвычайно большого количества методов ПР указывает на значимость правильного выбора метода для решения конкретной задачи ПР. При этом проблема соответствия метода решаемой задаче должна рассматриваться в двух плоскостях:

- с одной стороны, должно быть достигнуто соответствие метода объективным характеристикам решаемой задачи, к которым могут быть отнесены условия выбора (определенность, риск, неопределенность), тип множест-

ва альтернатив (дискретное или непрерывное), количество критериев ПР, тип постановки задачи и т.п.;

– с другой стороны, на выбор метода существенное влияние оказывают субъективные характеристики задачи, обусловленные возможностями и даже привычками совершенно конкретного лица, отвечающего за ПР. К таким характеристикам могут быть отнесены: желание или нежелание ЛПР пользоваться субъективными критериями, имеющими в большинстве случаев порядковые шкалы измерений; временные ограничения ЛПР; его способность давать только качественные оценки или как качественные, так и количественные.

Поэтому представляют интерес мнения экспертов по предпочтительности различных методов ПР. Нами было проведено сравнение рассматриваемых в данной книге методов, осуществленное при помощи МАИ.

К участникам процесса принятия решений относятся: владелец проблемы, лицо, принимающее решение, акторы (или активные группы) – заинтересованные в решении проблемы и влияющие на ее решение лица, эксперты – компетентные специалисты, профессионально владеющие вопросами, связанными с решением проблемы. Если рассматривать перечисленных лиц с точки зрения проведения процедуры принятия решений, то их можно разделить на тех, кто участвует в структуризации информации, характеризующей проблему, и субъективной оценке ее параметров (будем считать, что ими являются эксперты) и тех, кто занимается вопросами обработки полученной информации с целью классификации, упорядочивания или оптимального выбора вариантов (группа специалистов по принятию решений). Так определенные две группы участников процесса принятия решений могут оценить его с разных точек зрения, отражающих специфику их деятельности в решении многокритериальных задач. В проведенном исследовании по выявлению наиболее предпочтительного метода ПР приняли участие и специалисты по принятию решений, и эксперты. В роли специалистов выступали студенты физико-математического факультета, выполнившие курсовые работы по информатике, связанные с разработкой программных продуктов принятия решений. В роли экспертов – члены лаборатории «Мониторинг качества управления педагогическими системами» УМЦ г. Липецка и служащие ОАО «КЗ ЖБИ» г. Курска, принимавшие участие в применении методов принятия решений к анализу деятельности этих структур.

Всем участникам исследования было предложено сформировать критерии оценок прямых методов принятия решений.

Эксперты.


1. Возможность оценивания альтернатив по критериям вербально.
2. Сравнительно небольшое количество требуемых сравнений.
3. Возможность производить неполные парные сравнения в случаях, когда определить наилучший объект из двух затруднительно или невозможно.

Специалисты по принятию решений.

1. Учет структуры системы в процессе принятия решения.
2. Предоставление достоверных результатов.
3. Возможность учитывать нечеткость, неясность, неточность в параметрах, характеризующих объект исследования.
4. Предоставление методом средств, позволяющих проверять согласованность экспертных оценок.
5. Возможность включать в исследование количественные оценки объектов.
6. Метод подтвержден его практическим применением к анализу реальных проблем, теоретические основы метода научно развиваются.

Анализ методов принятия решений с точки зрения сформированных критериев проводился нами с помощью МАИ.

При этом была сформирована четырехуровневая иерархия процесса принятия решения:



Договоримся, что эксперты и специалисты по принятию решений получают равную значимость ($\lambda_1 = 0,5$; $\lambda_2 = 0,5$), так как для определения наиболее предпочтительного метода важна и его адаптированность для практического использования, и его теоретическая обоснованность, и дополнительные услуги, им предоставляемые.

Для подтверждения объективности оценок экспертов приведем известные нам сведения по каждому критерию для рассматриваемых методов.

Возможность оценивания альтернатив по критериям вербально

- (1) Качественная шкала относительной важности иллюстрируется соответствующей вербальной шкалой; эксперты ориентированы на количественные оценки.
- (2) Степень предпочтения $\mu_R(u_i, u_j)$ выражается численно.
- (3) Используется только качественное описание основных факторов и качественное выражение решающих правил для оценки вариантов решений.

Сравнительно небольшое количество требуемых сравнений

- (1) При формировании отношения предпочтения для n объектов требуется $n(n - 1)/2$ сравнений, остальные оценки являются обратносимметричными к полученным и заполняются формально. Шкала дискретна. От количества оценок дискретной шкалы количество сравнений не зависит.
- (2) При формировании отношения предпочтения для n объектов требуется $n(n - 1)$ сравнений. Заранее известными являются только диагональные элементы, в виду рефлексивности отношения. Шкала непрерывна. От выбранного количества оценок шкалы количество сравнений не зависит.
- (3) При сравнении векторных оценок у опорных ситуаций требуется заполнить матрицу парных сравнений A размерности $N \times N$, где $N = \sum_{q=1}^Q (n_q - 1)$, $n_q = m$ – количество оценок по критерию q . В целом, как отмечают авторы метода, число обращений к ЛПР в худшем случае будет равно $C = 0,25Q(Q - 1)m(m - 1)$. (Дополнительные вопросы появляются при нетранзитивности элементов матрицы). Для каждого критерия своя дискретная оценочная шкала. Количество сравнений зависит и от количества критериев, и от количества оценок шкалы по критериям, но не зависит от количества рассматриваемых объектов.

Возможность производить неполные парные сравнения в случаях, когда определить наилучший объект из двух затруднительно или невозможно

- (1) Оценки формируются только в терминах «лучше-хуже». Неполные сравнения непредусмотрены.
- (2) Может быть использована оценка $\mu_R(u_i, u_j) = 0$ в случае, если i -ая альтернатива хуже чем j -ая альтернатива или они несравнимы.
- (3) Словесные оценки «Не знаю», «Затрудняюсь ответить» теоретически предусмотрены, но в приведенных примерах при сравнении векторных оценок используется только трехбалльная шкала, где $o(i, j) = 1$ – i -ый элемент предпочтительнее, $o(i, j) = 3$ – j -ый элемент предпочтительнее, $o(i, j) = 2$ – i -ый элемент и j -ый равнозначны.

Учет структуры системы в процессе принятия решения

- (1) Структуризация проблемы в виде иерархии – один из главных этапов в процессе принятия решения. Иерархия может иметь от двух уровней до любого их количества.
- (2) Возможна структуризация системы в виде двух- и трехуровневой иерархии.
- (3) Структуризация системы возможна только в виде трехуровневой иерархии.

Предоставление достоверных результатов

- (1) Применение метода для анализа количественных данных показало практически полное совпадение результатов с исходными характеристиками объектов в случае двухуровневой иерархии и близость к исходным характеристикам в случае трехуровневой иерархии.
- (2) Метод принятия решений с несколькими экспертами (критериями), характеризуемыми весовыми коэффициентами, предоставляет результаты, соответствующие реальному линейному упорядочиванию объектов.
- (3) Проверить методы не представляется возможным, так как они ориентированы исключительно на качественные оценки объектов.

Возможность учитывать нечеткость, неясность, неточность

в параметрах, характеризующих объект исследования

- (1) Оценки экспертов не могут отражать неточность параметров в виде нечетких чисел.
- (2) Исходными данными являются нечеткие оценки экспертов. Операции введены таким образом, чтобы наиболее корректно перерабатывать нечеткую информацию.
- (3) Неточность данных находит выражение в словесных оценках экспертов.

Предоставление методом средств,

позволяющих проверять согласованность экспертных оценок

- (1) Согласованность проверяется на основе количественных операций. При этом вычисляется ОС (отношение согласованности), по значению которого можно судить о желательности или нежелательности пересмотреть суждения.
- (2) Проверка на согласованность не предусмотрена.
- (3) Имеется возможность выявления возможных ошибок (нарушение транзитивности) в ответах экспертов и исправления их на основе повторного предъявления ЛПР. Согласованность, таким образом, проверяется качественно.

Возможность включать в исследование количественные оценки объектов

- (1) Как показано в разделе 4.2., такая возможность имеется и может быть с успехом использована при необходимости (например, наряду с субъективными оценками изделий по отношению к возможности их освоения для выпуска предприятием, можно включить в качестве оценок реальную себестоимость изделий).
- (2) Метод не предусматривает обработку объективных данных, но, как следует из разделе 4.2., включить количественную составляющую в анализ возможно.
- (3) Количественные оценки могут быть интерпретированы сначала качественно (каждой оценке присваивается определенный балл по качественной шкале), а затем уже производится сравнение векторных оце-

нок. При этом объективные характеристики критериев невозможно учесть ни качественно, ни количественно (сравнивание критериев происходит неявно при сравнении векторных оценок).

Метод подтверждён практическим применением его к анализу реальных проблем, теоретические основы метода научно развиваются

Данная характеристика едва ли не является самой главной, так как именно она зачастую определяет выбор метода ПР в случае, если к математической поддержке принятия решений обращаются впервые. В этом случае владельца проблемы для каждого из возможных методов ПР интересует круг задач и те области прикладной деятельности, которые могут быть наиболее эффективно им проанализированы. Изложим основные сведения о конкретных (уже осуществлявшихся и хорошо зарекомендовавших себя) применениях каждого метода (табл. 4.7). В таблице под качественными методами ПР подразумеваются методы ЗАПРОС, ПАРК и ОРКЛАСС.

Метод ПАРК (ПАРная Компенсация) рассматривается авторами как метод принятия решений в задачах стратегического выбора, позволяющий структурировать проблему выбора и обеспечить требуемый анализ и оценку возможных вариантов альтернатив для решения поставленной задачи. Метод основан на парном сравнении альтернатив: сначала сравниваются две альтернативы, из них выбирается наилучшая, затем выбранная сравнивается со следующей и т.д. Такое сравнение без компьютерной поддержки очень длительно и трудоемко. В этом методе от эксперта требуется осуществлять ранжирование плохих, с точки зрения эксперта, оценок каждого критерия по каждому из двух рассматриваемых объектов. При дальнейшем сравнении предложенных гипотетических вариантов, выбирая один из них как лучший, эксперт неявно вынужден оценивать критерии, т.е. составлять отношение предпочтения критериев, но без дополнительной помощи метода.

Метод ОРКЛАСС (ОРдинальная КЛАССификация) предназначен для классификации рассматриваемых объектов, т.е. определения принадлежности объекта тому или иному классу.

Таблица 4.7

Виды задач ПР в различных предметных областях,
которые были проанализированы сравниваемыми методами ПР

Предметная область – Экономика	
МАИ	1. Перспективы использования синтетического топлива для транспорта [92]. 2. Экономическое планирование развития Судана [91].
Использование нечеткой логики	1. Микроэкономический процесс инвестиций [55].
Качественные методы принятия решений	1. Разработка СППР в кредитной деятельности коммерческого банка, которая осуществляет классификацию потенциальных ссудозаемщиков по их кредитоспособности на основе показателей фин.-эконом. деятельности ссудозаемщика (ОРКЛАСС) [63].
Производство	
МАИ	1. Оптимальный выбор энергоустановки, использующей уголь. 2. Планирование развития фирмы-производителя потребительской продукции.
Использование нечеткой логики	1. Всесторонний анализ деятельности предприятия: составление бюджета, оценка состояния и т.п. [55].
Политика	
МАИ	1. Определение кандидата, наиболее популярного среди избирателей в преддверии выборов [92, 115].
Образование	
МАИ	1. Анализ развития высшего образования США , в ходе которого был определен наиболее вероятный сценарий его развития на период 1985-2000 гг. [91, 92]. 2. Аттестация преподавателей в высшей школе (ЛГТУ). 3. Определение уровня развития коллектива [118].
Качественные методы принятия решений	1. Оценка конкурсных письменных работ по математике (оценивались школьные олимпиадные работы); способ позволил выделять лучшие работы из тех, которые набрали одинаковое количество баллов, учитывая качественные критерии, предъявляемые экспертами к олимп. работам [117]. 2. Оценка НИР [63].
Медицина	
МАИ	1. Оценка эффективности лекарственных средств [91]. 2. Управление мед.обслуживанием [91] (определение факторов, влияющих на сдерживание роста стоим. содержания в больнице).
Использование нечеткой логики	1. Диалоговые системы медицинской диагностики [69]. 2. Принятие решений при оценке функционального состояния человека.
Качественные методы принятия решений	1. Формирование баз знаний для медицинских диагностических систем [62].

Дальнейшее научное развитие методов предполагается в следующих направлениях.

- 1)
 - Учет неопределенностей в суждениях экспертов в виде нечетких чисел.
 - Исследования по непрерывным, а не дискретным шкалам. Экспертные суждения в виде интервальных чисел.
 - Оценка метода собственного вектора в ряду методов построения по заданной матрице парных сравнений объектов оптимального линейного их упорядочивания.
 - Разработка теоретических основ моделирования проблем принятия решений в виде иерархии.
 - Возможность неполного сравнения экспертами объектов, заключающегося в допустимости оценки $\alpha_{ij} = 0$. При таком допущении необходимо модифицировать метод получения главного собственного вектора матрицы.

Известна работа [123] по выполнению теоремы типа Перронна-Фробениуса на бесконечно-дистрибутивных решетках (что позволяет в качестве количественной шкалы при принятии решений использовать произвольную алгебраическую структуру, являющуюся браузеровой решеткой).

- 2) Применение метода автором ограничилось учебными примерами.
- 3) Известна работа [122] по применению методов Орловского для нечеткого выбора. В целом направление, связанное с обработкой нечеткой информации, широко представлено разными авторами, но именно применение с этой целью методов Орловского нам неизвестно.
- 3) Развитие метода связано с использованием шкал, позволяющих оценивать объекты как по качественным, так и по количественным критериям в пределах одной шкалы (часть составляющих вектора оценки – качественные утверждения, часть – количественные).

По оценкам критериев методов принятия решений с точки зрения экспертов было сформировано отношение предпочтения R_i и вычислен вектор приоритетов:

Критерии МПР	Вербальные шкалы	Кол-во сравнений	Неполные сравн.	Вектор приоритетов
Вербальные шкалы	1	2	4	0,5584
Кол-во сравнений	1/2	1	3	0,3196
Неполные сравни.	1/4	1/3	1	0,1220

Из полученных приоритетов становится очевидным, что для экспертов наиболее предпочтительной характеристикой анкет (вопросов) является

ся наличие вербальных шкал, позволяющих давать ответы в словесных оценках.

Специалистами по принятию решений было сформировано аналогичное отношение R_2 , по которому вычислен вектор приоритетов:

Критерии МПР	Структура	Достоверность	Нечеткость	Согласов.	Объект. составл.	Практич. внедр.	Вектор приорит.
Структура	1	1/5	7	1/3	1/4	1/4	0,0731
Достоверность	5	1	7	5	4	5	0,4532
Нечеткость	1/7	1/7	1	1/7	1/3	1/6	0,0311
Согласованность	3	1/5	4	1	1/3	1/3	0,0942
Объект. составл	4	1/4	3	3	1	1/2	0,1508
Практич. внедрение	4	1/5	6	3	2	1	0,1976

Для специалистов по принятию решений, как убеждаемся, наиболее важна достоверность результатов методов, проверенная количественными данными, далее следует практическое апробирование методов и возможность использовать количественную составляющую.

Методы принятия решений с точки зрения сформированных критериев можно достаточно объективно сравнить на основе ранее сделанных характеристик.

Приведем сразу векторы приоритетов методов по отношению к каждой из названных характеристик:

Эксперты			
Критерий	Методы принятия решений		
	(1)	(2)	(3)
Вербальные шкалы	0,1669	0,0634	0,7697
Минимально возможное количество вопросов	0,8000	0,1333	0,0667
Возможность неполных сравнений	0,1085	0,6300	0,2614

Специалисты по принятию решений			
Критерий	Методы принятия решений		
	(1)	(2)	(3)
Отражение структуры системы	0,7838	0,1349	0,0813
Достоверность результатов	0,5470	0,3445	0,1085
Учет неточности в виде нечетких чисел	0,0752	0,7418	0,1830
Проверка на согласованность	0,6939	0,0528	0,2533
Количественная составляющая	0,7504	0,1713	0,0782
Практическая апробация	0,7223	0,0727	0,2050

Обобщенные (глобальные) приоритеты методов принятия решений вычисляются при помощи процедуры иерархического взвешивания, начиная со второго уровня вниз:

$$\begin{aligned} \text{МАИ} = & (0,5584 \times 0,5) \times 0,1669 + (0,3196 \times 0,5) \times 0,8000 + (0,1220 \times 0,5) \times 0,1085 + \\ & + (0,0731 \times 0,5) \times 0,7838 + (0,4532 \times 0,5) \times 0,5470 + (0,0311 \times 0,5) \times 0,0752 + \\ & + (0,0942 \times 0,5) \times 0,6939 + (0,1508 \times 0,5) \times 0,7504 + (0,1976 \times 0,5) \times 0,7223 = 0,4955. \end{aligned}$$

Аналогично вычисляем обобщенные приоритеты других МПР:

- качественные методы принятия решений – 0,3100,
- методы принятия решений на базе нечеткой логики – 0,1945.

Таким образом, с точки зрения участников процесса принятия решений, наиболее предпочтительным для анализа неструктурированных многокритериальных проблем оказывается метод анализа иерархий, вторыми по предпочтительности – качественные методы принятия решений.

5. Комбинированный алгоритм поддержки принятия решений

Современный период развития систем управления производством характеризуется высоким ростом объема информационных потоков, причем наибольший объем информации наблюдается в промышленности, торговле, финансово-банковской деятельности. В промышленности рост объема информации обусловлен увеличением объема производства, усложнением выпускаемой продукции, используемых материалов, технологического оборудования, расширением в результате концентрации и специализации производства внешних и внутренних связей экономических объектов. Только на основе своевременного пополнения, накопления, переработки информационного ресурса, т.е. владения достоверной информацией, возможно рациональное управление любой деятельностью и *эффективное принятие решений*. В таких условиях для квалифицированного выбора оптимальных управляющих решений требуется самая разнообразная информация, в том числе, и экспертно-советующего характера.

В главе 5 рассматриваются аспекты разработки комбинированного алгоритма принятия решений в условиях неопределенности, призванного помочь специалисту в комплексном анализе многофакторной проблемной ситуации различными базовыми методами принятия решений. Такой комбинированный алгоритм обеспечит обоснованность оптимального выбора, позволит специалисту не только полагаться на какой-то один вариант решения (как это часто бывает в поддержке принятия решений), а самому оценить всевозможные варианты, предоставляемые разными методами, и сделать на их основе полновесный грамотный вывод.

При разработке комбинированного алгоритма принятия решений особое внимание уделялось учету специфики управленческих решений, которая проявилась в следующих вопросах:

- как отразить в процессе принятия решений все взаимодействующие элементы системы, для которой принимается решение;
- как составить вопросы экспертам, чтобы ответы можно было формулировать в вербальных, а не количественных категориях, учитывая психологические особенности человека;
- каким образом можно проверить согласованность суждений экспертов;
- какие методы лучше использовать при вычислении приоритетов рассматриваемых объектов.

Известно, что использование любых методов и вычислительных процедур в процессе управления, сколь бы полезны они ни были, как правило, не находит должного применения специалистами, если не осуществлена их компьютерная реализация. В разделе 5.4. описывается СППР "Выбор", предназначенная для анализа и планирования деятельности промышленного предприятия, базовым методом которой является комбинированный алгоритм бинарных отношений.

5.1. Гомоморфизм шкал МАИ и метода принятия решений при нечеткой исходной информации

Базовая шкала метода анализа иерархий (1) может быть формализована в виде множества $S(m)=\{1/n, \dots, 1, n, \dots\}$, где $n=1, \dots, m$. При $m=1$ $S(1)=\{1\}$, при $m=2$ $S(2)=\{1/2, 1, 2\}$ и т.д. В частности, в МАИ $m=9$, $S(m)=\{1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

Базовая шкала метода принятия решений при нечеткой исходной информации (2) представляет собой отрезок действительных чисел $S=[0;1]$.

В качественных методах принятия решений (3) для нумерации оценок на порядковой шкале X_q критерия q используется ряд натуральных чисел. Количественную шкалу, в этом случае, можно формализовать как комплект $Z(m)=\{\text{все целые числа } 0 \leq N \leq M\}$.

Отрезок $[0;1]$, множество $\{1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, комплект (базовые шкалы методов (1), (2), (3)) являются решетками и, в частности, цепями. Во множествах S и $S(m)$ имеют место операции $a + b = \sup_S \{a; b\}$ [$a + b = \sup_{S(m)} \{a; b\}\right], ab = \inf_S \{a; b\}$ [$ab = \inf_{S(m)} \{a; b\}\right]$.

Множество $S(m)$ является дискретным и состоит из $2m-1$ элементов.

Множество S – множество мощности континуум (как непрерывный отрезок действительных чисел).

Решетка является полной, если любое множество ее элементов имеет как точную верхнюю, так и точную нижнюю грани. Отрезок действительных чисел $[0;1]$ является полной решеткой.

Так как всякая конечная решетка полна, то множество $S(m)$ как конечная решетка является полной решеткой.

Для возможности формирования количественных шкал, соответствующих различным методам принятия решений, необходимо установить правило перехода от одной из них к другой. В этом случае эксперту будет достаточно один раз вербально оценить предпочтительность объектов; при этом количественные шкалы, соответствующие каждому из методов принятия решений, будут сформированы автоматически.

Переход между шкалами возможен на основе их гомоморфного отображения друг в друга. Такой гомоморфизм возможно установить несколькими способами. Не каждый гомоморфизм позволяет получать корректные результаты другим методом на основе полученной шкалы. Приведем некоторые из таких случаев.

Установим гомоморфизм решетки S в решетку $S(m)$ и наоборот. Отображение φ решетки L в решетку L' называется *верхним [нижним] гомоморфизмом*, если $\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b)$ [$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$] для любых $a, b \in L$. Гомоморфизм решетки L в решетку L' определяется как отображение, являющееся верхним и нижним гомоморфизмом одновременно.

Определим отображение $\varphi : S(m) \rightarrow S$ таким образом, что

$$\varphi(a) = \begin{cases} \frac{m+1-n}{2m-1}, & \text{если } a < 1, \\ \frac{2m-(m+1-n)}{2m-1}, & \text{если } a \geq 1. \end{cases} \text{ или } \varphi(a) = \begin{cases} \frac{m+1-n}{2m-1}, & \text{если } a < 1, \\ \frac{m+n-1}{2m-1}, & \text{если } a \geq 1. \end{cases}$$

Пример. Пусть $a \in S(m)$, $m=9$, тогда

$$\varphi(1/9) = \frac{9+1-9}{2 \cdot 9 - 1} = \frac{1}{17}, \quad \varphi(1/2) = \frac{9+1-2}{2 \cdot 9 - 1} = \frac{8}{17}, \quad \varphi(1) = \frac{9+1-1}{2 \cdot 9 - 1} = \frac{9}{17},$$

$$\varphi(2) = \frac{9+2-1}{2 \cdot 9 - 1} = \frac{10}{17}, \quad \varphi(9) = \frac{9+9-1}{2 \cdot 9 - 1} = \frac{17}{17} = 1.$$

Докажем, что так определенное отображение $\varphi: S(m) \rightarrow S$ является верхним гомоморфизмом.

$$\text{Пусть } a, b \in S(m), \text{ тогда } \varphi(a) = \begin{cases} \frac{m+1-n}{2m-1}, & \text{если } a < 1, \\ \frac{m+n-1}{2m-1}, & \text{если } a \geq 1. \end{cases}$$

$$\varphi(b) = \begin{cases} \frac{m+1-n'}{2m-1}, & \text{если } a < 1, \\ \frac{m+n'-1}{2m-1}, & \text{если } a \geq 1. \end{cases}, \text{ где } n \text{ и } n' \text{ соответствуют представлению}$$

чисел a и b в виде $1/n$ или n , где $n=1, \dots, m$ (для элемента a), $1/n'$, n' , где $n'=1, \dots, m$ (для элемента b).

Требуется доказать, что $\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b)$.

Действительно, по определению операции $+$ в решетке $S(m)$ $\varphi(a+b) = \varphi(\sup_{S(m)}\{a; b\})$

Пусть $a <= b < 1$ ($a=1/n$, $b=1/n'$, $n >= n'$), тогда $\varphi(a+b) = \varphi(\sup_{S(m)}\{a; b\}) = \varphi(b)$.

$\varphi(a) = \frac{m+1-n}{2m-1}$, $\varphi(b) = \frac{m+1-n'}{2m-1}$. Так как $n >= n'$, то $\varphi(a) <= \varphi(b)$, т.е. $\sup_{S(m)}\{\varphi(a); \varphi(b)\} = \varphi(b) \Rightarrow \varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b)$.

Пусть $1 < a <= b$ ($a=n$, $b=n'$, $n <= n'$), тогда $\varphi(a+b) = \varphi(\sup_{S(m)}\{a; b\}) = \varphi(b)$.

$\varphi(a) = \frac{m+n-1}{2m-1}$, $\varphi(b) = \frac{m+n'-1}{2m-1}$. Так как $n <= n'$, то $\varphi(a) <= \varphi(b)$, т.е.

$\sup_{S(m)}\{\varphi(a); \varphi(b)\} = \varphi(b) \Rightarrow \varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b)$.

Пусть $a <= b$, где $a <= 1$, $b >= 1$ ($a=1/n$, $b=n'$).

В этом случае $\varphi(a+b) = \varphi(\sup_{S(m)}\{a; b\}) = \varphi(b)$,

$$\varphi(a) = \frac{m+1-n}{2m-1}, \quad \varphi(b) = \frac{m+n'-l}{2m-1}, \text{ т.к. } l-n \leq n'-l \text{ при любых } n=1, \dots, m,$$

$n'=1, \dots, m$, то $\varphi(a) \leq \varphi(b)$, т.е. $\sup_s \{\varphi(a); \varphi(b)\} = \varphi(b) \Rightarrow$
 $\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b)$.

То есть отображение $\varphi : S(m) \rightarrow S$ является верхним гомоморфизмом.


Аналогично можно доказать, что для всех a и b выполняется $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$. Таким образом, отображение φ решетки $S(m)$ в решетку S является и верхним, и нижним гомоморфизмом одновременно, т.е. решетка $S(m)$ гомоморфна решетке S .

Определить отображение $\varphi' : S \rightarrow S(m)$ можно различными способами.

Например, отрезок $[0;1]$ разбить на $2m-1$ интервалов, каждому интервалу поставить в соответствие элемент множества $S(m)$ по следующему правилу:

Если $0 \leq x < \frac{l}{2m-1}$, то $x \rightarrow \frac{l}{n}$, если $\frac{l}{2m-1} \leq x < \frac{2}{2m-1}$, то $x \rightarrow \frac{l}{n-1}$ и т.д.

Для множества $S(m)$, где $m=9$, отображение $\varphi' : S \rightarrow S(m)$ представлено на рисунке:



В этом случае отображение $\varphi' : S \rightarrow S(m)$ определим так:

$\forall a$ такого, что $\frac{l}{2m-1}k \leq a < \frac{l}{2m-1}(k+1)$, где $0 \leq k \leq 2m-2$

$$\varphi'(a) = \begin{cases} 1/(m-k), & \text{если } k < m, \\ (k+2-m), & \text{если } k \geq m. \end{cases}$$

Например, в случае $S \rightarrow S(9)$:

при $k=0, a \in [0;1/17] \rightarrow 1/9$;

при $k=8, a \in [8/17; 9/17] \rightarrow 1$.

Договоримся при $k=2m-1$ включать правый конец отрезка в промежуток, тогда при $k=16, a \in [16/17; 1] \rightarrow 9$.

Очевидно, что изотонное отображение $\varphi' : S \rightarrow S(m)$ является гомоморфизмом.

Проверим, действительно ли установленный гомоморфизм шкал позволяет получать одинаковые результаты ранжирования альтернатив при переходе от одной шкалы к другой.

Пример. Обратносимметричная матрица МАИ имеет нормализованный главный собственный вектор $(0,095; 0,654; 0,249)$.

$$\begin{array}{ccc} 1 & 1/3 & 1/6 \\ 3 & 1 & 6 \\ 6 & 1/6 & 1 \end{array}$$

Пользуясь установленным гомоморфизмом $\varphi : S(m) \rightarrow S$, определим для каждого элемента матрицы соответствующий ему элемент в S .

$$\text{Так как } \varphi(a) = \begin{cases} \frac{m+1-n}{2m-1}, & \text{если } a < 1, \\ \frac{m+n-1}{2m-1}, & \text{если } a \geq 1. \end{cases} \text{, то } \varphi(1) = \frac{9+1-1}{17} = \frac{9}{17},$$

$$\varphi(3) = \frac{9+3-1}{17} = \frac{11}{17}, \quad \varphi(1/3) = \frac{9+1-3}{17} = \frac{7}{17}, \quad \varphi(6) = \frac{9+6-1}{17} = \frac{14}{17},$$

$$\varphi(1/6) = \frac{9+1-6}{17} = \frac{4}{17}.$$

В результате преобразований матрица будет иметь вид

$$\begin{pmatrix} 9/17 & 7/17 & 4/17 \\ 11/17 & 9/17 & 14/17 \\ 14/17 & 4/17 & 9/17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,5294 & 0,4118 & 0,2353 \\ 0,6471 & 0,5294 & 0,8235 \\ 0,8235 & 0,2353 & 0,5294 \end{pmatrix}$$

Применяя к полученный матрице метод принятия решений при нечеткой исходной информации, получим вектор степеней недоминируемости альтернатив

$$(0,4118; \quad 1,0000; \quad 0,4118).$$

Нормализуя этот вектор, получим

$$(0,2258; \quad 0,5484; \quad 0,2258)$$

Получаем отличный от исходного результат.

Применим к матрице теорему Перрона-Фробениуса. Получим нормализованный собственный вектор, не совпадающий с исходным.

$$(0,3716; \quad 0,6559; \quad 0,4681)$$

Значит, что при так установленном гомоморфизме матрица теряет свои свойства с точки зрения достоверности имеющейся в ней информации относительно исходных оценок.

Пример. Нестрогое отношение нечеткого предпочтения имеет вид:

$$\begin{array}{ccc} 1 & 0,2 & 0,5 \\ 0,3 & 1 & 0,9 \\ 0,4 & 0,6 & 1 \end{array}$$

Вектор недоминируемых альтернатив, соответствующий н.о.п., $\mu_R^{nd} = (0,9; 0,9; 0,7)$ (или, с учетом нормализации, $(0,36; 0,36; 0,28)$). Преобразуем на основе установленного гомоморфизма матрицу к виду

9	1/6	1
1/4	9	8
1/3	3	9

Применяя к такой матрице теорему Перрона-Фробениуса, получим вектор приоритетов:

$$(0,1958; \quad 0,4483; \quad 0,3558),$$

не совпадающий с вектором степеней недоминируемости альтернатив.

Если произвести вычисление вектора степеней недоминируемости альтернатив по данной матрице, то получим вектор, также не совпадающий с исходным –

$$(0,4958; \quad 0,5042; \quad 0).$$

Таким образом, так установленные гомоморфизмы не позволяют получать одинаковые результаты ранжирования альтернатив при переводе одной количественной шкалы в другую.

В комбинированном алгоритме поддержки принятия решений предлагаются использовать для сравнения объектов качественную шкалу, вербальные оценки которой зависят от конкретного критерия, по которому происходит сравнение. Из двух предложенных объектов u_i, u_j сначала выбирается тот, который, с точки зрения эксперта, имеет большую значимость. Затем оценивается его предпочтительность по вербальной шкале. Шкала ориентирована на 8 дискретных оценок предпочтительности по аналогии со шкалой МАИ и методом принятия решений на базе нечеткой логики. В методах принятия решений при нечеткой исходной информации, хотя С.А.Орловским и предлагается непрерывная шкала $[0;1]$, но фактически в рассмотренных примерах осуществляется прием дискретизации и используются 9 оценок предпочтительности – 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

Пример возможной вербальной шкалы приведен на рис.5.1.

важность равная	слабое превосходство		умеренное		значительное		очень сильное превосходство	полное превосходство
	1	2	1	2	1	2		

Рис 5.1. Вербальная шкала сравнений объектов

Для слабого превосходства, умеренного и значительного указывается степень такого превосходства.

По выбранному значению лексической переменной из вербальной шкалы в соответствие ему ставится оценка МАИ – 1,...,9 соответственно. Если $\mu_R(u_i, u_j) = \alpha$, то $\mu_R(u_j, u_i) = 1/\alpha$.

Гомоморфизм $\varphi : S(m) \rightarrow S$ устанавливается следующим образом:
 $\varphi(a) = a/m$.

В этом случае $\varphi(\max(S(m))) = \varphi(m) = 1$, $\varphi(\min S(m)) = \varphi(1/m) = 1/m^2 > 0$,

то есть $\left[\frac{1}{m}; m \right] \xrightarrow{\varphi} (0; 1]$.

Так определенный гомоморфизм лишен самых существенных недостатков ранее приводившихся отображений – несовпадения результатов ранжирования по отношению предпочтения до гомоморфного отображения и после него одним и тем же способом вычисления вектора приоритетов. Это следует из того, что, умножение матрицы на постоянную не меняет ее нормализованного главного собственного вектора.

При так определенном гомоморфизме обратносимметричная матрица $A = \|\alpha_{ij}\|$ отображается в нечеткое отношение $R(\mu_R)$. Такое нечеткое отношение удовлетворяет методу принятия решений на базе нечеткой логики, хотя и не является рефлексивным.

Рефлексивность в определении С.А.Орловского – $\mu_R(u_i, u_i) = 1$; такому условию полученные нечеткие отношения не удовлетворяют. Но, как следует из метода принятия решения на базе нечеткой логики, $R^S = R \setminus R^T$. В этом случае $\mu_R^S(u_i, u_i) = \mu_R(u_i, u_i) - \mu_R(u_i, u_i) = 0$ при любом $\mu_R(u_i, u_i)$, т.е. полученное отношение является корректным для вычисления по нему вектора недоминируемых альтернатив.

Обратносимметричная матрица при таком отображении станет толерантным нечетким отношением нестрогого предпочтения. Недостатком такого гомоморфизма является лишь невозможность осуществления неполных сравнений, что, впрочем, следует уже из ранее определенной вербальной шкалы.

Следует отметить, что полученное н.о.п. $\frac{1}{m^2}$ -линейное, так как его

функция принадлежности удовлетворяет условию

$$\max\{\mu_R(u_i, u_j), \mu_R(u_j, u_i)\} > 1/m^2 \text{ для любых } u_i, u_j.$$

5.2. Отражение структуры сложной распределенной системы в методах принятия решений для этой системы

Структура процесса принятия решения включает в себя структуру сложной распределенной системы, для которой принимается решение. Под сложной системой понимается иерархически организованная и целенаправленно функционирующая совокупность большого числа информационно связанных и взаимодействующих элементов. Примером сложной системы является система управления производством. От того, насколько полно и

точно будет описана модель системы на определенном уровне ее функционирования, зависит качество принимаемых решений, а значит, и эффективность управления системой. В процессе функционирования сложных систем управления проблема принятия решения реализуется как проблема выбора управления, переводящего систему из заданного состояния в желаемое.

Проблема оптимального выбора в этом случае может быть решена методами принятия решений, позволяющими из имеющихся альтернатив $U=\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ определить наиболее предпочтительные. Одной из проблем функционирования сложных систем является неопределенность ее состояния. Такая неопределенность проявляется в следующем:

- невозможность точно и полно описать текущее состояние системы;
- невозможность точного учета реакций системы на управляющие воздействия;
- необходимость учета большого количества факторов функционирования системы;
- оценка ряда параметров системы носит качественный (вербальный) характер.

В таких условиях принимать решение необходимо более адекватными реальности методами, учитывающими нечеткость в описании проблемы. В этом случае, из имеющихся методов принятия решений наиболее предпочтительными будут методы принятия решений на базе нечеткой логики и методы принятия решений в условиях неопределенности, предоставляющие возможность оперирования субъективными оценками экспертов.

Особенностью организации любых сложных систем управления является иерархичность. Иерархия является некоторой абстракцией структуры системы, предназначенной для изучения функциональных взаимодействий ее компонент и их воздействия на систему в целом. Очевидно, что иерархия структуры сложной системы должна найти отражение в процессе принятия решения. В различных методах принятия решений на базе неопределенности это достигается по-разному.

В МАИ (1) построение многоуровневой иерархии любой сложности является первым этапом процедуры принятия решения. В методе принятия решения при нечеткой исходной информации на множестве альтернатив $U=\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ может быть задано несколько нечетких отношений нестрогого предпочтения (н.о.п.) различных экспертов R_k , $k=1, \dots, m$, где m – количество экспертов. Предпочтительность самих экспертов определяется при помощи еще одного н.о.п. N , заданного на множестве E экспертов с функцией принадлежности $\mu_N(e_k, e_l)$, $e_k, e_l \in E$, значения которой означают степень предпочтения эксперта e_k по сравнению с экспертом e_l . Таким образом, в данном методе неявно присутствует трехуровневая иерархия «цель – эксперты – альтернативы», которую можно рассматривать как иерархию «цель – критерии оценки альтернатив – альтернативы». В качественных методах

принятия решений, в частности, в методе ЗАПРОС, на первом этапе формируются таблица качественных оценок альтернатив по критериям, где O_{ij} – ij -качественная оценка экспертом i -й альтернативы по j -у критерию, где $i=1, \dots, n, j=1, \dots, m$.

Альтернативы	Критерии			
	S_1	S_2	S_m
u_1	O_{11}	O_{12}		O_{1m}
u_2				
			O_{ij}	
u_n	O_{n1}			O_{nm}

Как видим, в методе ЗАПРОС также в неявном виде присутствует трехуровневая иерархия "цель – критерии (эксперты) – альтернативы".

Таким образом, структура сложной системы обязательно находит свое отражение в процессе принятия решения. В методах (2) и (3) используются простейшие иерархии, которые, кроме цели и альтернатив, могут отображать либо критерии, либо экспертов, участвующих в процессе принятия решения. Сложность же системы характеризуется большим числом взаимодействий между многими субъективными и объективными факторами различного типа и степени важности, а также группами людей с различными целями и противоположными интересами. Все названные факторы влияют на возможность или невозможность выбора лучшей альтернативы. Для отражения такой сложности чаще всего необходимо использовать количество уровней, большее трех.

Наиболее распространенными видами иерархий являются доминантные иерархии, вершины которых содержат один элемент – цель процесса принятия решения, а нижележащие уровни включают в себя различные факторы, от которых зависит достижение цели. Доминантные иерархии подразделяются на два типа:

- иерархии прямого процесса, проецирующие существующее состояние на наиболее вероятное будущее;
- иерархии обратного процесса, определяющие политики управления для достижения желаемого будущего.

Иерархия прямого процесса состоит из следующих уровней: цель (фокус иерархии); параметры, характеризующие цель; акторы (действующие силы); цели акторов; возможные альтернативы, из которых выбирается наилучшая.

Иерархия обратного процесса состоит из таких уровней, как сценарий желаемого будущего; проблемы, противодействующие его достижению; акторы; цели акторов; меры, которые необходимо предпринять для решения проблем.

Иерархии прямого и обратного процесса можно использовать и в других методах принятия решений. Рассмотрим это на примере метода принятия решения при нечеткой исходной информации.

Рассмотрим доминантную иерархию H с k уровнями: L_1, \dots, L_k

Каждый i -й уровень включает в себя m_i объектов (см. рис. 5.2).

$L_i = \{a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{i(m_i)}\}$ – i -й уровень иерархии, $i=1, \dots, k$.

Для первого уровня $m_1=1$, $L=\{b\}$.

Иерархию H можно рассматривать как совокупность уровней L_i :

$$H = \bigcup_{i=1}^k L_i = \bigcup_{i=1}^k \bigcup_{j=1}^{m_i} a_{ij} .$$

На втором уровне иерархии задано нечеткое отношение нестрогого предпочтения R_{21} (н.о.п. объектов второго уровня по отношению к первому объекту вышестоящего уровня) на множестве $L_2 = \{a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2m2}\}$ с функцией принадлежности $\mu_{R_{21}}(a_{2i}, a_{2j})$.




Рис 5.2. Доминантная иерархия процесса принятия решения

На каждом i -ом уровне $L_i = \{a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{i(m_i)}\}$ задается столько н.о.п., сколько элементов на вышестоящем уровне — $m_{(i-1)}$, где $i = 2, \dots, k$.

$R_{i1}, R_{i2}, \dots, R_{im(i-1)}$ – н.о.п. объектов i -го уровня по отношению к каждому объекту вышестоящего $i-1$ уровня.

$$R_{ij} = \begin{pmatrix} I & \mu(a_{i1}, a_{i2}) & \cdots & \mu(a_{i1}, a_{im(i)}) \\ \vdots & I & & \vdots \\ & & I & \\ \mu(a_{im(i)}, a_{i1}) & \cdots & & I \end{pmatrix},$$

где $\mu_{R_{ij}}(a_{il}, a_{ir}) \in [0;1]$, $i=2, \dots, k, j=1, \dots, m(i-1), l, r=1, \dots, m(i)$.

Основная цель задачи принятия решений – получение вектора приоритетов элементов нижнего уровня иерархии по отношению к цели – элементу первого уровня. Решение основной задачи возможно несколькими способами.

1 способ. (На основе процедуры взвешивания МАИ).

Для каждого н.о.п. R_{ik} , где $i=2, \dots, h$, $k=1, \dots, m_{(i-1)}$, определяется нечеткое подмножество недоминируемых объектов L_{ik}^{nd} относительно k -го элемента $(i-1)$ уровня.

Каждый объект при этом характеризуется функцией принадлежности

$$\mu_{R_{ik}}^{nd}(a_{ij}) \in [0;1], i=2, \dots, h, k=1, \dots, m_{(i-1)}, j=1, \dots, m_i.$$

$$\mu_{R_{ik}}^{nd}(a_{ij}) = \inf_{y \in L_i} (1 - \mu_{R_{ik}}^s(y, a_{ij})), a_{ij} \in L_i, \text{ или}$$

$$\mu_{R_{ik}}^{nd}(a_{ij}) = 1 - \sup_{y \in L_i} \mu_{R_{ik}}^s(y, a_{ij}), a_{ij} \in L_i.$$

В этом случае иерархия H представлена в виде совокупности нечетких подмножеств, где векторы приоритетов бинарных отношений – функции принадлежности нечетким подмножествам элементов иерархии.

2 уровень $\mu_{211}, \dots, \mu_{21b}, \dots, \mu_{21(m2)}$, где μ_{21i} – приоритет i -го объекта 2-го уровня по отношению к 1-у объекту вышестоящего уровня.

3 уровень $\mu_{311}, \dots, \mu_{31b}, \dots, \mu_{31(m3)}$
 $\mu_{321}, \dots, \mu_{32b}, \dots, \mu_{32(m3)}$
 $\dots \dots$
 $\mu_{3(m2)1}, \dots, \mu_{3(m2)b}, \dots, \mu_{3(m2)(m3)}$

Векторы приоритетов объектов третьего уровня по отношению ко всем объектам второго уровня.

k -уровень $\mu_{k11}, \dots, \mu_{k1b}, \dots, \mu_{k1(mk)}$
 $\mu_{k21}, \dots, \mu_{k2b}, \dots, \mu_{k2(mk)}$
 $\dots \dots$
 $\mu_{k(mk-1)1}, \dots, \mu_{k(mk-1)b}, \dots, \mu_{k(mk-1)(mk)}$

Векторы приоритетов объектов k -уровня по отношению ко всем объектам $(k-1)$ - уровня

Таким образом, связь соседних уровней иерархии $L_{i-1}=X, L_i=Y$ определяется нечетким соответствием $X \circ Y \rightarrow [0;1]$, которое можно представить в виде матрицы функций принадлежности элементов X относительно каждого из объектов $y \in Y$.

$$WY(X) = \begin{vmatrix} \mu_{(i+1)11} & \mu_{(i+1)21} & \dots & \mu_{(i+1)(mi)1} \\ \mu_{(i+1)12} & \mu_{(i+1)22} & \dots & \mu_{(i+1)(mi)2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \mu_{(i+1)1(m_{i+1})} & \mu_{(i+1)2(m_{i+1})} & \dots & \mu_{(i+1)(mi)(m_{i+1})} \end{vmatrix}.$$

Для $L_2 W_b(L_2) = \mu_b(L_2) = \{\mu_{211}, \dots, \mu_{21b}, \dots, \mu_{21(m2)}\}$.

К так определенной иерархии, элементы которой являются нечеткими подмножествами, применима теорема, доказанная в работе [37] и представляющая собой применение иерархического синтеза к матрицам $Wy(x)$: функция принадлежности элементов нижнего k -го уровня иерархии относительно цели b определяется следующим образом:

$$\mu_b(L_k) = B_k * B_{k-1} * \dots * B_3 * \mu_b(L_2).$$

Теорема доказывает справедливость решения МАИ многокритериальных задач с нечетко выраженным альтернативами и критериями с получением функции полезности. При этом функция полезности рассматривается как функция принадлежности глобальной цели на множестве альтернатив.

2 способ. Так как исходными данными в способе принятия решений на базе нечеткой логики являются нечеткие отношения, то к ним корректнее применить алгоритмы свертки нечетких отношений. Как было показано наиболее достоверным из них является алгоритм свертки н.о.п., каждое из которых характеризуется весовыми коэффициентами.

$$\text{На основе н.о.п. } R_{2l} = \begin{vmatrix} 1 & \mu(a_{2l}, a_{22}) & \dots & \mu(a_{2l}, a_{2m(2)}) \\ \vdots & 1 & & \vdots \\ & & 1 & \\ \mu(a_{2m(2)}, a_{2l}) & \dots & & 1 \end{vmatrix} \text{ методом}$$

принятия решений на базе нечеткой логики с одним экспертом сформируем множество недоминируемых альтернатив L^{nd}_{2l} второго уровня по отношению к цели иерархии.

Соответствующий вектор степеней недоминируемости альтернатив $\mu_{R_{2l}}^{nd}(a_{2j}) \in [0;1], j=1, \dots, m(2)$ нормализуем, в результате чего будут получены веса объектов второго уровня относительно цели иерархии: $\{\lambda_1, \dots, \lambda_{m2}\}$.

На третьем уровне иерархии сформированы н.о.п. $R_1, R_2, \dots, R_{(m2)}$ (их количество совпадает с количеством элементов на втором уровне – m_2) предпочтительности объектов третьего уровня по отношению к каждому из элементов второго уровня:

$$R_l = \begin{vmatrix} \mu(u_i, u_i) & \dots & \mu(u_i, u_{(m3)}) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \mu(u_{(m3)}, u_i) & \dots & \mu(u_{(m3)}, u_{(m3)}) \end{vmatrix}, \dots, R_{(m2)} = \begin{vmatrix} \mu(u_i, u_i) & \dots & \mu(u_i, u_{(m3)}) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \mu(u_{(m3)}, u_i) & \dots & \mu(u_{(m3)}, u_{(m3)}) \end{vmatrix}.$$

Строим свертку P н.о.п. $R_1, \dots, R_{(m2)}$ в виде

$$P = \cap R_l(u_i, u_j) = \min\{\mu(u_i, u_j)\}, l=1, \dots, m_2.$$

С полученным н.о.п. ассоциируется $P^S = P \setminus P^T$.

Определяется множество недоминируемых альтернатив U_P^{nd} .

Строится выпуклая свертка $Q = \sum \lambda_l R_l, l=1, \dots, m_2$.

Для свертки определяется множество недоминируемых альтернатив U_Q^{nd} . Рассматриваем пересечение множеств $U_Q^{nd} \cap U_P^{nd}$, $\mu_k^{nd}(u_i) = \min\{\mu_p^{nd}(u_i); \mu_Q^{nd}(u_i)\}$.

Полученный вектор степеней недоминируемости альтернатив нормализуем, в результате чего получим обобщенные веса объектов $\{\lambda_1, \dots, \lambda_{m3}\}$ третьего уровня по отношению к цели первого уровня (при этом уже оказывается учтенным второй промежуточный уровень). Далее к $\{\lambda_1, \dots, \lambda_{m2}\}$ и н.о.п. нижележащего уровня применяем тот же алгоритм, получая обобщенные веса 4-го уровня и т.д. В конечном итоге будет получен вектор степеней недоминируемости альтернатив самого последнего уровня иерархии: $\mu_k^{nd} = \{\mu_k(u_1), \dots, \mu_k(u_{mk})\}$. Вектор глобальных приоритетов рассматриваемых альтернатив $W = \{w_1, \dots, w_{mk}\}$ будет получен нормализацией вектора $\mu_k^{nd} = \{\mu_k(u_1), \dots, \mu_k(u_{mk})\}$. Таким образом, можно сформулировать следующую теорему.

Теорема.

▽ Пусть H – полная иерархия. $L_{i-1}, L_i, L_{i+1} – (i-1)$ -й, i -й, $(i+1)$ -й уровни иерархии соответственно, $i=3, \dots, k-1$.

$W_{(i-1)} = \{\lambda_{(i-1)1}, \dots, \lambda_{(i-1)(m(i-1))}\}$ – вектор приоритетов объектов $(i-1)$ -го уровня относительно цели $L_i = \{b\}$, $i=3, \dots, k-1$. При $i=3$ $W_{(i-1)} = W_2 = \{\lambda_{21}, \dots, \lambda_{2(m2)}\}$ – нормализованные степени недоминируемости альтернатив отношения $\varphi_{R_2} : L_2 \times L_2 \rightarrow [0;1]$.

$\varphi_{R_j} : L_i \times L_i \rightarrow [0;1]$, $i=3, \dots, k-1$, $j=1, \dots, m(i-1)$ – отношения объектов i -го уровня по отношению к j -му объекту $(i-1)$ уровня.

$\varphi_{R_{(i+1)j}} : L_{i+1} \times L_{i+1} \rightarrow [0;1]$, $i=3, \dots, k-1$, $j=1, \dots, m(i)$ – отношения объектов $(i+1)$ -го уровня по отношению к j -му объекту i -го уровня.

Вектор приоритетов $\{\lambda_{(i+1)1}, \dots, \lambda_{(i+1)(m(i+1))}\}$ объектов L_{i+1} уровня относительно цели $\{b\}$ определяется следующим образом:

$$1. \lambda_{ij} = \min\{\mu_{P_i}^{nd}(u_j); \mu_Q^{nd}(u_j)\} / \sum_j \min\{\mu_{P_i}^{nd}(u_j); \mu_Q^{nd}(u_j)\}, j=1, \dots, m(i).$$

$$2. \lambda_{(i+1)j} = \min\{\mu_{P_{i+1}}^{nd}(u_j); \mu_Q^{nd}(u_j)\} / \sum_j \min\{\mu_{P_{i+1}}^{nd}(u_j); \mu_Q^{nd}(u_j)\},$$

$j=1, \dots, m(i+1)$. ▽

Таким образом, в методы принятия решения на базе нечеткой логики в качестве первого этапа целесообразно включать построение иерархии процесса выбора альтернатив. Сравнение объектов на каждом уровне можно проводить любым из методов. Путем дальнейшей нормализации полученных оценок альтернатив каждого уровня, применяя процедуру взвешивания

МАИ или алгоритм "свертки" других методов, можно получить приоритет альтернатив нижнего уровня по отношению к цели первого уровня.

5.3. Выявление несогласованности суждений экспертов

Проверка на согласованность (непротиворечие) ответов экспертов – неотъемлемая часть почти всех методов принятия решений. Ошибки в ответах могут быть как случайными, так и из-за некорректно поставленных вопросов (например, при сравнении очень близких по важности объектов или трудно сравниемых между собой). При сложных иерархиях своевременно выявленная несогласованность оценок экспертов позволит избежать некорректных результатов ранжирования альтернатив, обеспечив высокий уровень достоверности анализа проблемной ситуации.

Согласованность отношения, в общем случае, понимается как численная (кардиальная $a_{ij}a_{jk} = a_{ik}$) и транзитивная (порядковая согласованность). Совершенной согласованности достичь трудно, поэтому существуют различные подходы к оценке степени несогласованности.

В методе анализа иерархий определяется только кардиальная согласованность. Доказывается, что положительная обратносимметрическая матрица согласованна тогда и только тогда, когда $\lambda_{\max} = n$. λ_{\max} вычисляется из равенства $Aw = \lambda_{\max} w$, где w – главный собственный вектор. В [94] предлагается следующий алгоритм для вычисления λ_{\max} : $c = Aw$; $c_i = c_i / w_i$, $i = 1, \dots, n$;

$$\lambda_{\max} \approx \left(\sum_i c_i \right) / n$$

(умножить матрицу A на вектор w , затем полученный вектор поделить на соответствующие компоненты w . Среднее арифметическое полученных значений и даст приблизительно λ_{\max}).

В общем случае $\lambda_{\max} <> n$. Для оценки согласованности вычисляется отклонение от согласованности – ИС* (индекс согласованности). $ИС^* = (\lambda_{\max} - n) / (n - 1)$, где λ_{\max} – главное собственное значение обратносимметрической матрицы. Индекс согласованности, сгенерированный случайным образом, называют случайным индексом (СИ). Отношение ИС*/СИ, где СИ – средний случайный индекс матрицы того же порядка, что и исходная, называют отношением согласованности ОС. Значение ОС, меньшее 10% (в практическом применении допускается значение, не превышающее 20%) считается приемлемым.

В [93, 94] утверждается, что нетранзитивность предпочтений может быть естественным явлением, а не следствием ошибки в суждениях или заблуждениях. В ряде случаев нетранзитивности не удается избежать.

Следует отметить, что отношение согласованности хотя и позволяет выявить противоречивость в суждениях экспертов, но является лишь количественным показателем такой противоречивости. В методе анализа иерар-

хий при ОС>20% рекомендуется пересмотреть суждения. Существенным недостатком МАИ является в этом плане невозможность обратить внимание экспертов на те вопросы, которые вызвали такую несогласованность.

В комбинированном методе принятия решений вычисляется ОС, и если оно неудовлетворительно с точки зрения ЛПР, то предлагается помочь в построении отношения как транзитивно, так и кардинально согласованного.

В [81] отношение R называется транзитивным, если $R \circ R \subseteq R$. В зависимости от введенной операции произведения нечетких отношений выделяется минмаксная транзитивность, максминная, максмультипликативная. Под транзитивностью в методах принятия решений на базе нечеткой логики подразумевается максминная транзитивность. Максминная транзитивность накладывает следующее условие на функцию принадлежности нечеткого отношения R : $\mu_R(x, y) >= \sup_{z \in X} \min\{\mu_R(x, z), \mu_R(z, y)\}$. Как видно, данное усло-

вие равнозначно тому, что каждый элемент нечеткого отношения не меньше соответствующего ему элемента максминного произведения нечеткого отношения самого на себя.

Если рассматривать такое определение на конкретном примере нечет-

кого отношения: $\begin{pmatrix} 1 & 0,33 & 0,25 \\ 0,1 & 1 & 0,77 \\ 0,95 & 0,2 & 1 \end{pmatrix}$, то логика его достаточно очевидна.

Например,

2-й элемент предпочтительнее 1-го со степенью $a_{21}=0,1$.	1-й элемент предпочтительнее 3-го со степенью $a_{13}=0,25$.
---	--

Значит, 2-й элемент должен быть предпочтительнее 3-го хотя бы с наименьшей степенью из $a_{21}=0,1$ и $a_{13}=0,25$, т.е. со степенью, не меньшей, чем 0,1.

2-й элемент предпочтительнее 2-го со степенью $a_{22}=1$.	2-й элемент предпочтительнее 3-го со степенью $a_{23}=0,77$.
---	--

Значит, 2-й элемент должен быть предпочтительнее 3-го хотя бы с наименьшей степенью из $a_{22}=1$ и $a_{23}=0,77$, т.е. со степенью, не меньшей, чем 0,77.

2-й элемент предпочтительнее 3-го со степенью $a_{23}=0,77$.	3-й элемент предпочтительнее 3-го со степенью $a_{33}=1$.
--	---

Значит, 2-й элемент должен быть предпочтительнее 3-го хотя бы с наименьшей степенью из $a_{23}=0,77$ и $a_{33}=1$, т.е. со степенью, не меньшей, чем 0,77.

Так как все перечисленные условия должны выполняться одновременно, то a_{23} должно быть не меньше, чем наибольшее из $\{0,1; 0,77; 0,77\}$, т.е. $a_{23} \geq 0,77$. Такое соотношение выполняется для a_{23} . Аналогичная проверка производится для всех $a_{ij}, i, j = 1, \dots, n$.

Для приведенной матрицы ее максминное произведение A^2 равно

1	0,33	0,33
0,77	1	0,77
0,95	0,33	1

Серым цветом выделены те элементы, которые не меньше им соответствующих в исходной матрице. Таким образом, в этом случае наблюдаем три нарушения транзитивности бинарного отношения.

Но такой способ проверки порядковой согласованности не является приемлемым. Так, бинарное отношение предпочтения, составленное на основе количественных данных, оказалось нетранзитивным согласно рассмотренному определению с шестью нарушениями транзитивности.

В качественных методах принятия решений рассматриваются некоторые подходы к получению транзитивных отношений. Один из них представляет собой процедуру проверки и корректировки ответов эксперта в процессе проведения парных сравнений. После каждого проведенного экспертом сравнения пары объектов проводится распространение полученной информации о сравнении объектов по транзитивности (транзитивное замыкание).

Если эксперту предъявляются объекты $x_i \in X$, $x_j \in X$ и эксперт отвечает, что x_i предпочтительнее x_j , т.е. $(x_i, x_j) \in P$ (связаны отношением предпочтения), тогда для $\forall x_k$ таких, что $(x_j, x_k) \in P$ или $(x_j, x_k) \in I$ (связаны отношением безразличия, т.е. имеют равную важность), следует $(x_i, x_k) \in P$.

Если эксперт отвечает, что x_i равноценна x_j , т.е. $(x_i, x_j) \in I$, тогда для $\forall x_k$ таких, что $(x_j, x_k) \in I$ следует $(x_i, x_k) \in I$, а для $\forall x_k$ таких, что $(x_j, x_k) \in P$ следует $(x_i, x_k) \in P$.

Далее эксперту предъявляется следующая пара объектов, для которых отношение еще не определено. После получения ответа строится транзитивное замыкание и т.д. до тех пор, пока отношение не будет установлено для всех пар объектов из X . При такой процедуре опроса нарушений транзитивности в ответах не возникает.

В качественных методах принятия решений при этом (как следует из приведенных примеров) количественная шкала натуральных чисел состоит всего из трех возможных оценок сравнения альтернатив "лучше", "хуже", "равнозначны". Поэтому в данных методах проверяется только транзитивная согласованность. В комбинированном методе принятия решений будем считать, что $(x_i, x_j) \in P$, если $a_{ij} \in \{2, \dots, 9\}$, если $a_{ij} \in \left\{\frac{1}{9}, \dots, \frac{1}{2}\right\}$, то $(x_j, x_i) \in P$,

если $a_{ij}=1$, то $(x_i, x_j) \in I$. Так определенные отношения предпочтения и безразличия объектов, конечно, не обеспечат кардинальную согласованность отношений с базовой количественной шкалой $S(m)$, но помогут эксперту

избежать порядковых противоречий в оценках. Для обеспечения кардинальной согласованности процедуру проверки транзитивности можно модифицировать таким образом, чтобы одновременно с транзитивностью проверять и численную согласованность, т.е. осуществлять проверку $a_{ij}^*a_{jk}=a_{ik}$.

Приведем пример процедуры помощи эксперту при формировании бинарного отношения сравнения объектов. Для определенности в качестве объектов $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, рассмотрим декоративные стеновые материалы (см. приложение 1-А, изделия 20, 22, 24, 26).

Исходная матрица рефлексивна ($a_{ii}=1$).

Сначала эксперту (например, потребителю) предлагается для сравнения произвольная пара объектов. Например:

1) Какое изделие для вас более предпочтительно. Определите по предложенной шкале степень предпочтения.

Предположим, что эксперт ответил на вопрос следующим образом:

Камень стеновой № 20

Камень облицовочный № 22

Важность равная	слабое превосходство		умеренное		значительное		сильное	очень	полное превосход- ство
	1	2	1	2	1	2			

Такая оценка по количественной шкале $S(m)$ соответствует 4. Т.е. $a_{12}=4$
 $\Rightarrow a_{21}=1/4$. Таким образом, $(x_1, x_2) \in P$.

Для построения транзитивного замыкания необходима еще одна оценка эксперта. Желательно, чтобы такая оценка связывала бы второй объект с каким-либо другим, отношением предпочтения или безразличия $(x_2, x_k) \in P$ или $(x_2, x_k) \in I$.

Таблица 5.1

Исходная матрица сравнений объектов

	Камень № 20	Камень № 22	Камень № 24	Камень № 26
Камень стен. № 20	1	4		
Камень облиц. № 22	1/4	1	5	
Камень облиц. № 24		1/5	1	
Камень облиц. № 26				1

Поэтому следующий вопрос эксперту формируется таким образом, чтобы установить предпочтительность второго объекта по отношению к 3-му или 4-му.

2) Какое из изделий предпочтительнее – x_2 или x_3 .

Затем предлагается оценить степень такого предпочтения, как это было сделано в 1-ом вопросе.

Предположим, эксперт определил $(x_2, x_3) \in P$ и по его ответу $a_{23}=5$ (оценка a_{23} и соответствующая ей a_{32} выделены серым цветом в табл. 3.1.).

В этом случае можно установить транзитивное замыкание: из $(x_1, x_2) \in P$ и $(x_2, x_3) \in P$ следует $(x_1, x_3) \in P$. Причем, для кардинальной согласованности $a_{12} * a_{23}$ должно быть равно a_{13} . Так как $a_{12}=4$, $a_{23}=5$, то a_{13} должно быть равно 20, но так как шкала 9-балльная, то от эксперта для хорошей согласованности следует ожидать оценку хотя бы близкую к 9. Формально распространение информации происходит не должно, так как оно предопределяло бы отсутствие ошибок в ответах эксперта, в связи с чем возникли бы затруднения в оценке предпочтительности. В качественных методах затруднений в количественных оценках при транзитивном замыкании не происходит, так как их всего используется три.

Для избежания формального транзитивного замыкания эксперту предлагается вопрос: какое из изделий предпочтительнее – x_1 или x_3 .

Если полученный ответ совпадает с транзитивным замыканием $(x_1, x_3) \in P$, то считается, что проверка подтвердила правильность полученной от эксперта информации. Если имеется расхождение, то рекомендуется пересмотреть предыдущие ответы или исправить только что полученный.

Приведем дальнейший опрос эксперта с указанием оценки по количественной шкале.

3) Какое из изделий предпочтительнее – x_1 или x_3 . Ответ: x_1 , $a_{13}=6$. (Серым цветом в таблице 3.2. помечены транзитивные тройки оценок). Такая оценка удовлетворяет как транзитивной согласованности, так и кардинальной.

Чтобы определить a_{14} , перебираются все возможные уже включенные в отношение пары объектов, из оценки сравнения которых можно заранее сделать вывод об оценке a_{14} – $(a_{12}; a_{24})$, $(a_{13}; a_{34})$. Как убеждаемся, такие оценки еще полностью не сформированы, т.е. для ответа a_{14} предыдущие ответы еще не определили какое-либо отношение. Поэтому ответ предлагается самостоятельно выбрать самому эксперту.

Таблица 5.2

Заполненное бинарное отношение сравнения альтернатив

	Камень № 20	Камень № 22	Камень № 24	Камень № 26
Камень № 20	1	4	6	7
Камень № 22	1/4	1	5	3
Камень № 24	1/6	1/5	1	3
Камень № 26	1/7	1/3	1/3	1

4) Какое из изделий предпочтительнее – x_1 или x_4 . Ответ: x_1 , $a_{14}=7$.

5) Какое из изделий предпочтительнее – x_2 или x_4 .

Для определения элемента a_{24} необходимо рассмотреть пары элементов a_{21} и a_{14} , a_{23} и a_{34} . Так как элемент a_{34} еще не определен, то учитываем толь-

ко $a_{21}=1/4$ и $a_{14}=7$. По данным значениям транзитивное замыкание осуществить невозможно, но приблизительно, учитывая стремление к кардинальной согласованности, можно определить значение $a_{24}=a_{21} \cdot a_{14}=7/4$, т.е. $1 < a_{24} < 2$.

Предположим, что эксперт ответил $a_{24}=3$; такая оценка близка к той, которая ожидалась.

6) Какое из изделий предпочтительнее – x_3 или x_4 .

Определить элемент a_{34} возможно из комбинаций элементов: $(a_{31}; a_{14})$, $(a_{32}; a_{24})$. Обе комбинации не помогают определить порядковую согласованность, но относительно кардинальной согласованности можно сделать вывод о приблизительном равенстве элемента a_{34} среднему арифметическому $(a_{31} \cdot a_{14} + a_{32} \cdot a_{24})/2 = ((1/6) \cdot 7 + 0,5 \cdot 3)/2 \approx 1,91$.

Ответ эксперта $a_{34}=3$ является приемлемым.

Отношение согласованности данной матрицы равно 12%. Чтобы его уменьшить следует более строго придерживаться советов по формированию согласованного отношения.

Проведем такую процедуру еще раз с целью получения более согласованного отношения.

Пусть $a_{12}=4$, $a_{23}=5$. Тогда a_{13} должно быть близко к 9. Рекомендуется оценка 8, 9. Предположим эксперт не считает нужным определять предпочтительность оценкой 9 и придерживается мнения, что $a_{13}=8$. Далее $a_{14}=9$ заполняется самим экспертом. Для оптимального определения a_{24} установим все возможные комбинации, влияющие на данную оценку: $(a_{21}; a_{14})$, $(a_{23}; a_{34})$. $a_{21} \cdot a_{14}=1/4 \cdot 9 < 2$. Если эксперт предлагает оценку 3, как это было в первый раз, то ему будет рекомендовано оценить $a_{24}=2$. Для определения a_{34} рассмотрим $(a_{31}; a_{14})$, $(a_{32}; a_{24})$. $a_{34}=1/8 \cdot 9 + 1/5 \cdot 2 < 2$. Эксперту рекомендуется выбрать оценку 1 или 2. Предположим, что эксперт оценивает преимущество x_3 по сравнению с x_4 оценкой 2. Так заполненная матрица имеет отношение согласованности ОС=9%.

	x_1	x_2	x_3	x_4
x_1	1	4	8	9
x_2	1/4	1	5	2
x_3	1/8	1/5	1	2
x_4	1/9	1/2	1/2	1

Формализуем процедуру построения согласованного отношения с учетом порядковой и транзитивной согласованности и оптимальной организацией заполнения бинарного отношения оценками экспертов.

Требуется сформировать бинарное отношение R такое, что $\mu_R : X \times X \rightarrow S(m)$. $X = \{x_1, \dots, x_n\}$. $a_{ij} = \mu_R(x_i, x_j)$ – оценка предпочтительности объекта x_i по отношению к объекту x_j .

Исходная матрица для построения такого отношения – $A_{n \times n}$ такая, что $a_{ii} = 1, \forall i = 1, \dots, n$.

1. Экспертом сравниваются x_1 и x_2 ; делается вывод о предпочтительно-

сти объектов и формируется оценка a_{12} : $(x_1, x_2) \in P$ ($a_{12} > 1$), или $(x_2, x_1) \in P$ ($a_{12} < 1$), или $(x_1, x_2) \in I$ ($a_{12} = 1$).

2. Аналогично п.1. экспертом сравниваются x_2 и x_3 .

3. Предопределяется оценка a'_{13} .

Если возможно, то выполняется транзитивное замыкание (см. (1), (2)) – делается вывод о том, что $(x_1, x_3) \in P$ или $(x_1, x_3) \in I$.

Определяется оценка a'_{13} согласно требованиям кардинальной согласованности: $a'_{13} = a_{12} * a_{23}$.

4. Экспертом сравниваются x_1 и x_3 ; делается вывод о предпочтительности объектов и формируется оценка a_{13} : $(x_1, x_2) \in P$ ($a_{13} > 1$), или $(x_2, x_1) \in P$ ($a_{13} < 1$), или $(x_1, x_3) \in I$ ($a_{13} = 1$).

При этом сравнивается предпочтительность объектов x_1 и x_3 , построенная на основе транзитивного замыкания и определенная экспертом. Затем сравнивается a'_{13} и a_{13} . В случае нарушения транзитивной или кардинальной согласованности эксперту предъявляется требование пересмотра суждений. При этом, если $a'_{13} > 9$ или $a'_{13} < 1/9$, то эксперту предлагается оценить предпочтительность объекта x_1 относительно x_3 таким образом, чтобы a_{13} было близко к 9 или 1/9 соответственно.

5. Экспертом сравниваются x_3 и x_4 (см. п.1).

6. Если возможно, то выполняется транзитивное замыкание относительно пары (x_2, x_4) и пары (x_1, x_4) . Определяется оценка $a'_{24} = a_{23} * a_{34}$ (см. п.3) и оценка $a'_{14} = (a_{12} * a_{24} + a_{13} * a_{34}) / 2$. И т.д., аналогично п.4.

Схематично последовательность опроса эксперта можно представить на рис. 5.3. Стрелками на схеме указана последовательность предъявления эксперту вопросов парного сравнения. Серым цветом помечены ячейки, оценки в которых формирует эксперт. В других ячейках оценки могут быть сформированы на основе транзитивного замыкания (стрелки с подписью Тр.). Такая последовательность опроса является наиболее оптимальной по количеству возможных проверок ответов экспертов на основе транзитивного замыкания.

	X_1	X_2	X_3	X_4	\dots	X_j	\dots	X_n
X_1	1							
X_2		1						
X_3			1					
X_4				1				
\vdots						1		
X_i							1	
\vdots								
X_n								1

Рис 5.3. Схема последовательности предъявления парных сравнений эксперту

Таким образом, эксперт самостоятельно формирует оценки (они не могут быть предопределены) a_{ij} , где $j = i + 1 \quad \forall i = 1, \dots, n$.

После каждой оценки a_{ij} проводится транзитивное замыкание – распространение информации о предпочтительности объектов на оценки $a_{ls}, l = i - 1, i - 2, \dots, l; s = j$. На основе стремления к кардинальной согласо-

ванности a_{ls} определяется по формуле $a_{ls} = \frac{\sum_{p=l}^n a_{lp} * a_{ps}}{m} \quad p < s, p \neq l$, где m –

количество суммируемых пар оценок (учитываются только те пары a_{lp}, a_{ps} , которые уже сформированы – $a_{lp}, a_{ps} \neq 0$). Условие $p < s$ определено последовательностью опроса эксперта.

Далее информация о предпочтительности и сформированные оценки сравниваются с полученными от эксперта, и при необходимости снова происходит обращение к эксперту для пересмотра оценок.

Алгоритм построения согласованного отношения приведен на рис. 5.4.




Рис 5.4. Алгоритм построения согласованного отношения

5.4. Разработка СППР "Выбор" на основе комбинированного метода бинарных отношений

СППР "Выбор" позволяет на основе информации, получаемой от экспертов и ЛПР, получить количественные характеристики предпочтительности рассматриваемых альтернатив и определить среди них наиболее оптимальные с учетом большого числа критерииев, по которым они сравниваются.

Математическое обеспечение СППР "Выбор"

Выбор наиболее предпочтительных альтернатив на основе комбинированного метода бинарных отношений производится по алгоритму, изображенному на рис.5.5.

Первый этап принятия решения – построение иерархии. Наиболее распространенный вид иерархий в принятии управленческих решений – доминантные. Исходными данными в комбинированном методе принятия решений для такого вида иерархий являются:

- n – количество уровней в иерархии (самый верхний уровень будем считать 1-м);
- $l[i]$ – количество объектов i -го уровня, $i=1, \dots, n$; причем $l[1]=1$ – цель иерархии;
- $nas[i; j]$ – название j -го объекта i -го уровня, $i=1, \dots, n$, $j=1, \dots, l[i]$;
- $a[i; j; k; m]$ – степень предпочтения k -го элемента i -го уровня перед m -м элементом этого же уровня по отношению к j -му элементу вышестоящего уровня, $i=2, \dots, n-1$; $j=1, \dots, l[i-1]$, $k=1, \dots, l[i]$, $m=1, \dots, l[i]$. Из элементов $a[i; j; k; m]$ формируются квадратные матрицы, количество которых на каждом уровне определяется количеством альтернатив на вышестоящем уровне, а количество строк и столбцов – количеством альтернатив на текущем уровне. Всего таких матриц будет сформировано $\sum_{i=1}^{n-1} l[i]$.

Матрицы формируются на основе парных сравнений экспертом объектов каждого уровня иерархии по отношению к каждому объекту вышестоящего уровня. Оценки производятся по вербальной шкале (см. рис. 5.1). Вербальные оценки заменяются количественными на основе шкалы $S(m)$, при этом будут получены обратносимметричные матрицы.

Осуществляется проверка согласованности суждений экспертов (вычисляется ОС), и при неудовлетворительном значении ОС производится, по желанию эксперта пошаговое построение согласованного отношения на основе алгоритма, описанного в разделе 5.2. (см. рис. 5.4.)

По окончательно сформированной обратносимметричной матрице $A_{n \times n}$ происходит формирование нечеткого отношения нестрогого предпочтения на основе гомоморфного отображения решетки $S(m)$ в решетку S , которое описано в разделе 5.1. Процедура происходит без участия эксперта.

Дальнейшая задача заключается в обработке полученных данных двумя методами: МАИ и методом принятия решений на базе нечеткой логики при нескольких н.о.п., характеризуемых весовыми коэффициентами.

Алгоритм обработки н.о.п. приведен в разделе 5.2.

Алгоритм обработки обратносимметричных матриц осуществляется на основе модели Бэржа-Брука-Буркова и метода анализа иерархий, описанных в главе 3.

Результатом комбинированного метода ПР является:

- 1) Вектор обобщенных (глобальных) приоритетов альтернатив самого нижнего n -го уровня, указывающий на степень предпочтения сравниваемых объектов $W = (w_1, \dots, w_{l(n)})$.
- 2) Вектор степеней недоминируемости альтернатив n -го уровня, учитывающий все промежуточные уровни $\mu^{nd}(u_1, \dots, u_{l(n)})$.

Эксперту предлагается самому сравнить результаты упорядочивания и количественные показатели важности рассматриваемых вариантов решений.

Если все бинарные отношения, формируемые экспертом, имели высокий уровень согласованности, то и первым методом, и вторым будет предложена одна и та же альтернатива в качестве наиболее оптимальной.

Если некоторые отношения имели невысокую степень согласованности, то оптимальные альтернативы, рекомендуемые первым и вторым методами, будут различны, и в этом случае эксперту рекомендуется воспользоваться дополнительным методом ПР – ПАРК, алгоритм которого приводится в [63].

Метод ПАРК позволит ЛПР осуществить стратегический выбор одной из двух (или нескольких) альтернатив на основе всестороннего качественного их анализа по любому количеству критериев, определенных ЛПР.




Рис 5.5. Схема комбинированного алгоритма бинарных отношений

Назначение и основные функции СППР "Выбор"

СППР "Выбор" предназначена для решения широкого класса задач, возникающих в процессе планирования и управления промышленным предприятием.

Система позволяет решить, например, следующие задачи:

Анализ рынка сбыта продукции

Осуществляется анализ ценовой ситуации на рынке профильной продукции предприятия, определяется ее влияние на объемы ввоза аналогичной продукции в регионы конкурирующими предприятиями.

Задача включает в себя прогноз поставок продукции предприятия в целевые регионы и доли предприятия на местных рынках, а также прогноз цен на продукты на основе отпускных цен предприятия и действующих тарифов. Кроме того, предусматривается формирование произвольных отчетов по текущим фактическим показателям: поставка продукции в регионы, сравнительная характеристика цен по регионам, динамика изменения отпускных и региональных цен.

Оценка привлекательности покупателей. Рейтинг покупателей

Оценка привлекательности покупателей позволяет более обоснованно составлять текущий и перспективный план поставок профильной продукции. Кроме того, использование характеристик привлекательности покупателей (платежная дисциплина, финансовое положение) повышает достоверность прогнозирования объемов поступления финансовых ресурсов в различных формах (денежные средства, векселя, взаимозачеты и т.д.).

Определение оптимальной производственной программы и ценовой политики

На основе информации, получаемой из задачи "Анализ рынка сбыта", характеристик производственных мощностей и возможных технологических схем, объемов планируемого к переработке сырья на данном этапе, формируются рекомендации по производственной программе и ценовой политике. В качестве целевой установки принимается максимизация доходов предприятия (возможны другие целевые установки).

Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов

На основе задачи можно производить вариантные расчеты характеристик инвестиционных проектов при различных сочетаниях факторов и управляющих воздействий (цены, рынки, налогообложение и т.д.).

Система обеспечивает:

- доступ к данным оперативной отчетности предприятия;
- решение календарно-повторяющихся ЗПР;
- ввод и хранение экспертной информации, описывающей структуру предпочтений лица, принимающего решение;
- решение задач выбора наилучших вариантов на основе комбинированного метода принятия решений, ориентированного на качественную ин-

формацию экспертов;

- возможность дополнения базы моделей и методов методами ПР;
- оформление результатов расчетов в виде набора разнообразных табличных и графических отчетов, программные средства обеспечивают возможность визуального сравнения результатов, полученных при разных сценариях.

Система обладает свойством универсальности – она может быть адаптирована к решению различных задач управления. Условиями такой адаптации являются обеспечение доступа к данным, а также разработка и ввод в систему методов сравнения альтернатив.

Программный продукт "Выбор" работает под управлением операционной системы Windows95.

Программное обеспечение СППР "Выбор"

Программный продукт включает в себя модули, изображенные на рис. рис.5.6.

База данных состоит из базы данных экспертной информации, базы данных конкретных сценариев задач принятия решений, базы данных результатов.

База данных экспертной информации предназначена для хранения ответов экспертов, полученных при анализе проблемных ситуаций управления и планирования деятельности промышленного предприятия. База данных результатов ЗПР позволяет получать комплексные отчеты об упорядочивании альтернатив за прошедшие периоды времени. База данных сценариев конкретных ЗПР хранит необходимый набор критериив и альтернатив для анализа повторяющихся проблемных ситуаций; такая база сценариев позволяет избежать рутинной работы экспертов по анализу календарно-повторяющихся ЗПР. Возможно взаимодействие базы данных СППР "Выбор" с хранилищем данных оперативной отчетности предприятия. Хранилище данных состоит из данных транзакционных систем, основанных на различных СУБД, данных табличных и текстовых процессоров, бухгалтерских, правовых систем.

Модуль интерактивного взаимодействия с пользователем организует работу оператора в диалоговом, советующем режиме. Имеется возможность настройки вербальной шкалы, лингвистические термы которой должны соответствовать специфике решаемой задачи.

Эксперты, отвечающие в процессе диалога на вопросы системы, могут, в силу разных причин, формулировать противоречивые суждения. Помочь экспертам получить согласованные ответы – задача модуля поддержки формирования непротиворечивых суждений.




Рис 5.6. Структура программного обеспечения СППР "Выбор"

Обработку полученной информации осуществляют алгоритмы из базы моделей и методов принятия решений. В базу входят составляющие комбинированного алгоритма: алгоритм получения обратносимметричных матриц и н.о.п. по качественным суждениям экспертов, алгоритм вычисления главного собственного вектора положительной матрицы по теореме Перрона-Фробениуса, алгоритм иерархического синтеза, алгоритм вычисления вектора степеней недоминируемости н.о.п., алгоритм свертки н.о.п. в многоуровневой иерархии, алгоритм метода ПАРК.

Результаты, полученные при анализе проблемной ситуации, формируются в виде отчета, а средствами модуля графической интерпретации результатов представляются в графическом виде и выдаются оператору. Данные отчета поступают в БД результатов ЗПР.

Указания по использованию системы

Основными этапами работы ЛПР с системой являются:

- определение цели работы с системой (решение новой, еще не структурированной задачи, решение типовой задачи, просмотр отчетов по предыдущим ЗПР);
- определение существенных данных (какие именно данные из хранилища использовать при решении данной задачи);

- определение вариантов решений (альтернатив) и критериев сравнения альтернатив;
- задание качественных шкал показателей (для каждой ЗПР могут быть сформированы качественные шкалы в соответствии со спецификой ЗПР);
- выявление предпочтений экспертами альтернатив на множестве критериев в ходе опроса;
- анализ результатов решения и возможный переход к выполнению одного из предыдущих этапов.

Разделение труда между ЛПР и экспертами. Первые два этапа и определение перечня альтернатив ЛПР проводит самостоятельно, при определении критериев сравнения альтернатив возможно обращение за помощью к экспертам. Формирование качественных шкал производится экспертами и ЛПР совместно. Выявление предпочтений экспертов не должно сопровождаться никакими вмешательствами ЛПР. Анализ результатов решения проводится сначала ЛПР, затем возможно обращение к помощи экспертов за обоснованием полученных результатов.

Взаимодействие пользователя с СППР "Выбор" организовано таким образом, чтобы диалог с оператором проходил в наиболее удобной и понятной форме.

Реализованы следующих возможности:

- контроль входной информации на выявление простейших ошибок;
- переход из диалогового режима в пакетный (возможность работы с файловой входной информацией);
- диалоговое взаимодействие для изменения ограничений (снятия или "сдвига" части ограничений);
- работа с различной информацией о сравниваемых объектах (количественной, качественной);
- сохранение промежуточной информации;
- встроенные средства обучения пользователей работе с системой;
- коррекция перечня альтернатив, критериев, изменения шкалирования и т.д.;
- возврат на необходимое число этапов назад, пересмотр прежних оценок, изменение последовательности отдельных этапов решения и т.д.

Система требует предварительного обучения и адаптации пользователя к системе, зависит от знания пользователя характеристик и специфики проектируемого объекта, а также возможностей системы с учетом заложенных в нее алгоритмов оптимизации.

Описание работы программы.

Рассмотрим последовательность действий оператора при работе с СППР "Выбор" с целью анализа ЗПР, которой нет в БД сценариев. Такой задаче соответствует пункт меню Поиск решения → Сравнение альтернатив.

Работа программы организована в виде мастера, помогающего оператору выполнять этапы комбинированного метода принятия решений в условиях неопределенности в нужной последовательности (см.рис.5.7).

Вначале диалога оператору рекомендуется сохранить файл Файл→Сохранить; в процессе диалога осуществлять промежуточные сохранения файла.

Первый этап – построение иерархии процесса принятия решений, на этом этапе пользователь указывает количество уровней в иерархии (1), количество альтернатив на каждом уровне (2), вводит названия объектов каждого уровня иерархии (3). После этого математическое построение иерархии производится автоматически.

Второй этап – формирование суждений экспертов по качественным шкалам. По каждой паре сравниваемых объектов каждого уровня иерархии предлагается определить степень предпочтительности того или иного объекта (4).


Возможно и непосредственное заполнение матриц парных сравнений количественными данными. Матрицы парных сравнений автоматически формируются как рефлексивные отношения, которые удовлетворяют степенной калибровке (5). Предусмотрена коррекция ответов согласно ограничениям шкалы.

После формирования матрицы парных сравнений (как на основе качественных, так и количественных данных) может быть автоматически вычислено отношение согласованности, индекс согласованности, главное собственное значение (6). Высокое отношение согласованности (более 20%) показывает на необходимость пересмотреть суждения. В этом случае возможно воспользоваться помощником построения согласованных суждений.



(1)


(2)




(3)




(4)



(5)



(6)



(7)

Рис 5.7. Пользовательский интерфейс СППР "Выбор"

По окончании диалога с оператором производится вычисление значений приоритетов рассматриваемых альтернатив и их ранжирование (7) методом МАИ и методом принятия решения на базе нечеткой логики. Результаты работы программы могут быть получены также в виде отчета (текстового файла) и в графической форме. При получении различных результатов ранжирования или неоднозначных для пользователя возможно сравнение двух наиболее предпочтительных альтернатив методом ПАРК (парная компенсация альтернатив).

Заключение

Важной составляющей экономической стабильности промышленных предприятий является совершенствование управления, в том числе применение для решения задач управления современных экономико-математических методов и вычислительной техники. Даже передовые предприятия, имеющие наиболее квалифицированный управленческий персонал, в настоящее время без развитой информационно-управляющей системы и всех ее подсистем не в состоянии удовлетворять современным рыночным отношениям.

Разработка и внедрение компьютерной поддержки принятия решений в информационно-управляющие системы промышленных предприятий приводит к необходимости создания математических моделей принятия решений, позволяющих комплексно и всесторонне анализировать проблемные ситуации конкретной предметной области, характерные для сложных производственных систем. Решение проблемы оптимизации процессов управления производством требует разработки моделей, адекватно учитывающих совокупное влияние большого количества факторов на управленческие решения.

Анализ, развитие и разработка моделей принятия решений для ИУС промышленных предприятий позволит более успешно решать проблему управления такими объектами для улучшения их производственных показателей. В монографии были рассмотрены следующие вопросы:

1. Произведено всестороннее сравнительное исследование прямых методов ПР в условиях неопределенности: метода анализа иерархий, методов ПР на базе нечеткой логики, качественных методов принятия решений.

2. Предложен метод вычисления вектора степеней недоминируемости альтернатив сравниваемых объектов в многоуровневой иерархии, базирующийся на операциях обработки нечетких исходных данных с использованием процедур получения свертки нескольких нечетких отношений нестрогого предпочтения, характеризуемых весовыми коэффициентами.

3. Разработана процедура построения согласованного бинарного отношения сравниваемых объектов на основе как кардинальной, так и транзи-

тивной согласованности, задача которой заключается в оказании помощи эксперту при получении противоречивых суждений.

4. Реализована возможность формирования обратносимметричных матриц МАИ и формирование нечетких отношений нестрогого предпочтения по качественным суждениям экспертов о предпочтительности сравниваемых объектов на основе гомоморфизма количественных шкал.

5. На основе проведенного исследования предложен комбинированный алгоритм принятия решений в условиях неопределенности, предназначенный для ИУС промышленного предприятия, отражающий специфику управленческих решений.

6. Произведена программная реализация и практическая апробация компьютерной поддержки принятия решений в условиях неопределенности, базовым методом которой является комбинированный метод принятия решений.

Библиографический список

1. Айзерман М.А., Алескеров Ф.Т. Выбор вариантов (основы теории). – М.: Наука, 1990. – 236 с.
2. Акоф, Рассел Л. Искусство решения проблем. – М.: Мир, 1982. – 220 с.
3. Актуальные задачи теории динамических систем управления: Сб. науч. ст. / АН БССР, Ин-т математики / Под ред. Р. Габасова и др. – Минск: Наука и техника, 1989. – 332 с.
4. Алексеров Ф.Т., Ортешук П. Выборы. Голосование. Партии. – М.: Academia, 1995. – 210 с.
5. Анализ и интерпретация пространственно-распределенных структур: Сб. науч. тр. / АН ССР, Урал. – Свердловск, 1988. – 79 с.
6. Анциферов Е.Г. Методы оптимизации и их приложение. – Новосибирск: Наука, 1990. – 160 с.
7. Батищев Д.И., Шапошников Д.Е. Многокритериальный выбор с учетом индивидуальных предпочтений. – Н.-Новгород, 1994. – 86 с.
8. Белкин А.Р., Левин М.Ш. Принятие решений: комбинаторные модели аппроксимации информации. – М.: Наука, 1990. – 160 с.
9. Беллман Р. Введение в теорию матриц. – М.: Наука, 1969. – 368 с.
10. Беляев Л.С. Решение сложных оптимизационных задач в условиях неопределенности. – Новосибирск: Наука, 1978. – 126 с.
11. Многокритериальная оптимизация: математические аспекты / Б.А. Березовский, Ю.М. Барышников, В.И. Бозенко, Л.М. Кемпнер. – М.: Наука, 1989. – 230 с.
12. Березовский Б.А., Гнедин А.В. Задача наилучшего выбора. – М.: Наука, 1984. – 196 с.
13. Система поддержки принятия стратегических решений АСТРИДА / Д. Беркли, О.И. Ларичев, Е.М. Мошкович, П. Хэмфрис // Проблемы и методы принятия уникальных и повторяющихся решений. – М.: ВНИИСИ, 1990. – С. 9-25.
14. Блейер Д., Поллак Р. Рациональный коллективный выбор // В мире науки. – 1983. – № 10. – С. 57-65.
15. Блюмин С.Л., Шуйкова И.А. Применение методов теории принятия решений к ранжированию показателей уровня развития коллективов // Тез. докл. конгресса ИНПРИМ-98. Новосибирск, 1998 – С. 110 – 111.
16. Блюмин С.Л., Сараев П.В., Шуйкова И.А. Положительные матрицы в задачах принятия решений // Новые технологии в образовании: Тез. докл. I Республ. электронной научн. конф. – Воронеж: ВГПУ, 1999. – С. 44-45.
17. Блюмин С.Л., Шуйкова И.А. Введение в математические методы принятия решений: Учебное пособие. – Липецк: ЛГПУ, 1999. – 104 с.
18. Блюмин С.Л., Шуйкова И.А. Отражение сложной распределенной системы в структуре задач принятия решений для этой системы // Математика. Компьютер. Образование: Тез. докл. VII междунар. конф. – Дубна, 2000. – С. 52.

-
19. Блюмин С.Л., Шуйкова И.А. Оценка уровня развития коллектива с точки зрения задач принятия решений // Образовательные технологии: Межвузовский сб. научн. тр. – Воронеж: ВГПУ, 1998. – С. 77-80.
 20. Блюмин С.Л., Шуйкова И.А. Сравнение различных методик вычисления вектора приоритетов в методе анализа иерархий // Образовательные технологии: Межвузовский сб. научн. тр. – Воронеж: ВГПУ, 1999. – С. 172-176.
 21. Блюмин С.Л., Шуйкова И.А. Сравнение результатов принятия решения различными методами на базе нечеткой логики // Информационные технологии в процессе подготовки современного специалиста: Межвузовский сб. – Липецк: ЛГПИ, 1999. – С. 10-12.
 22. Блюмин С.Л., Шуйкова И.А. Учебная программа спецкурса «Введение в математические методы принятия решений» // Методические проблемы в курсе математики. Выпуск 3. – Липецк: ЛГПИ, 1999. – С. 12-14.
 23. Борисов А.Н. Модели принятия решений на основе лингвистической переменной. – Рига: Зинатне, 1982. – 156 с.
 24. Борисов А.Н. Обработка нечеткой информации в системах принятия решений. – М.: Радио и связь, 1989. – 181 с.
 25. Борисов А.Н., Вилюмс Э.Р., Сукур Л.Я. Диалоговые системы принятия решений на базе мини-ЭВМ: Информационное, математическое и программное обеспечение. – Рига: Зинатне, 1986. – 195 с.
 26. Борисов А.Н., Крумберг О.А., Федоров И.П. Принятие решений на основе нечетких моделей. Примеры моделей. – Рига: Зинатне, 1990. – 184 с.
 27. Вязгин В.А., Федоров В.В. Математические методы автоматизированного проектирования: Учеб. пособие для втузов. – М.: Вышш.шк., 1989. – 184 с.
 28. Вагнер Г. Исследование операций.– М.: Мир, 1972. – Т. 1-3. – 335 с., 488 с., 501 с.
 29. Вилкас Э.Й., Майшинас Е. Решения: теория, информация, моделирование. – М.: Радио и связь, 1981. – 328 с.
 30. Вопросы кибернетики. Экспертные оценки / Под общ. ред. Б.Г. Литвака, Ю.Н. Тюрина. – М.: Наука, 1977. – 198 с.
 31. Вощинин А.П. Оптимизация в условиях неопределенности. – М.: Изд-во МЖ; София: Техника, 1989. – 224 с.
 32. Вычислительные системы и вопросы принятия решений: Сб. ст. / Под ред. Л.Н. Королева. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 213 с.
 33. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. – М.: Наука, 1967. – 576 с.
 34. Гимади Э.Х., Глебов Н.И. Дискретные экстремальные задачи принятия решений: Учеб. пособие. – Новосибирск, НГУ, 1991. – 75 с.
 35. Процедура построения квазипорядка на множестве многокритериальных альтернатив на основе достоверной информации о предпочтениях лица, принимающего решения / Л.С. Гнеденко, О.И. Ларичев, Е.М. Мошкович, Е.М. Фуремс // АиТ. – 1986. – № 9. – С. 104-113.
 36. Гречилов А.А. Как принять наилучшее решение в реальных условиях – М.: Радио и связь, 1991. – 320 с.
 37. Грунина Г.С. Решение многокритериальных задач оптимизации в условиях неопределенности на основе метода анализа иерархий и теории не-

- четких множеств: Дисс. на соискание степени канд. техн. наук. – Москва: Московский государственный университет им. Баумана, 1998. – 155 с.
38. Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи. – М.: Мир, 1982. – 416 с.
39. Деордица Ю.С., Нефедов Ю.М., Исследование операций в планировании и управлении. – Киев: Выща шк., 1991. – 270 с.
40. Доичев А. Системы оптимального управления: Возмущения, приближения и анализ чувствительности. – М.: Мир, 1987. – 156 с.
41. Донской В.И., Башта А.И. Дискретные модели принятия решений при неполной информации. – Симферополь: Таврия, 1992. – 165 с.
42. Доррер М.Г. Интуитивное предсказание нейросетями взаимоотношений в группе // Методы нейроинформатики: Сб. научн. трудов / Под ред. А.Н. Горбаня. – Красноярск, 1998. – С.111-127.
43. Дубов Ю.А., Травкин С.И. Многокритериальные модели формирования и выбора вариантов систем. – М.: Наука, 1986. – 294 с.
44. Дэвид Г. Метод парных сравнений. – М.: Статистика, 1978. – 144 с.
45. Елтаренко Е.А. Оценка и выбор решений по многим критериям. – М.: МИФИ, 1995. – 111 с.
46. Емельянов С.В., Ларичев О.И. Многокритериальные методы принятия решений. – М.: Знание, 1985. – 112 с.
47. Жуковин В.Е. Нечеткие многокритериальные модели принятия решений. – Тбилиси: Мецниереба, 1988. – 69 с.
48. Задачи принятия решений: Метод. указ. и задания к самостоятельной работе / Сост. С.Л. Блюмин, Ю.В. Лубенец. – Липецк: ЛГТУ, 1996. – 26 с.
49. Зайченко Ю.П. Исследование операций: Нечеткая оптимизация. – Киев: Высшая школа, 1991. – 191 с.
50. Проблемы оценки предложений по проведению научных исследований / Ю.А. Зуев, О.И. Ларичев, В.А. Филиппов, Ю.В. Чуев // Вестник АН СССР. – 1980. – № 8. – С. 29–39.
51. Иваненко В.И., Лабковский В.А. Проблема неопределенности в задачах принятия решений / АН УССР, Институт кибернетики им.В.М. Глушкова. – Киев: Наукова думка, 1990. – 132 с.
52. Информационно-вычислительные системы принятия решений / В.В. Хаджинов, В.А. Быков, И.А. Храмова, В.Г. Усачев; АН Украины. Ин-т пробл. регистрации информ. – Киев: Наук.думка, 1993. – 138 с.
53. Каплинский А.И. Моделирование слабоформализованных задач выбора наилучших вариантов систем. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991. – 167 с.
54. Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. – М.: Радио и связь, 1981. – 560 с.
55. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1990. – 544 с.
56. Кофман А., Хил Алуха Х. Введение теории нечетких множеств в управлении предприятиями: Пер. с исп. – Минск: Выш. шк., 1992. – 224 с.

-
57. Кузьмин В.Б. Построение групповых решений в пространстве четких и нечетких бинарных отношений. – М.: Наука, 1982. – 112 с.
 58. Кузьмин В.Б., Травкин С.И. Теория нечетких множеств в задачах управления и принципах устройства нечетких процессоров // АиТ. – 1992. – № 11. – С. 7-36.
 59. Курицкий Б.Я. Оптимальное решение? – это очень важно! – Л.: Машиностроение. Ленинградское отд., 1984. – 126 с.
 60. Ланкастер П. Теория матриц: Пер. с англ. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982. – 272 с.
 61. Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решений. – М.: Наука, 1979. – 200 с.
 62. Ларичев О.И. Объективные модели и субъективные решения. – М.: Наука, 1987. – 141 с.
 63. Ларичев О.И., Меченов А.Н. Выявление экспертных знаний. – М.: Наука, 1989. – 140 с.
 64. Ларичев О.И., Мошкович Е.М. Качественные методы принятия решений. Вербальный анализ решений. – М.: Наука, Физматлит, 1996. – 208 с.
 65. Лебедев Г.Н. Методы принятия оперативных решений в задачах управления и контроля. – М.: Изд-во МАИ, 1992. – 120 с.
 66. Лескин А.А., Мальцев В.Н. Системы поддержки управленческих и проектных решений. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд., 1990. – 167 с.
 67. . Теория выбора и принятие решений / И.М. Макаров, Т.М. Виноградская, А.В. Рубчинский, В.Б. Соколов. – М.: Наука, 1982. – 210 с.
 68. Мамиконов А.Г. Принятие решений и информация. – М.: Наука, 1983. – 183 с.
 69. Математика сегодня: Сб. статей: Пер. с англ. – М.: Знание, 1974. – 64 с.
 70. Мелихов А.Н., Баронец В.Д. Проектирование микропроцессорных средств обработки нечеткой информации. – Ростов н/Д.: Изд. Ростовского ун., 1990. – 128 с.
 71. Мелихов А.Н., Бернштейн Л.С., Коровин С.Я. Ситуационные советующие системы с нечеткой логикой. – М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. – 272 с.
 72. Модели и методы оптимизации надежности сложных систем / В.Л. Волкович, А.Ф. Волошин, В.А. Заславский, И.А. Ушаков; Под ред. В.С. Михалевича. – Киев: Наук. думка, 1992. – 311 с.
 73. Моргунов В.М. Представление и обработка неопределенных и неопределенных знаний средствами нечетких логик // Автоматика и телемеханика. – 1995. – № 5. – С. 114-123.
 74. Мушик Э., Мюллэр П. Методы принятия технических решений: Пер. с нем. – М.: Мир, 1990. – 208 с.
 75. Науман Э. Принять решение – но как? – М.: Мир, 1987. – 198 с.
 76. Нейронные сети на персональном компьютере / А.Н. Горбань, Д.А. Россинев. – Новосибирск: Наука, Сибирская издательская фирма РАН, 1996. – 276 с.
 77. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / Под ред. Д.А. Поспелова. – М.: Наука, 1986. – 311 с.

78. Нечеткие множества и теория возможностей: последние достижения / Под ред. Р. Ягера. – М.: Радио и связь, 1986. – 405 с.
79. Общая алгебра: В 2 т. / О.В. Мельников, В.Н. Ремесленников, В.А. Романков и др.; Под общ. ред. Л.А. Скорнякова. – М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. – Т.1. – 592 с.; – Т. 2. – 480 с.
80. Орлов А.И. Менеджмент. – М.: Знание, 1999. – 79 с.
81. Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации. – М.: Наука, 1981. – 194 с.
82. Плотников В.Н., Зверев В.Ю. Принятие решений в системах управления: В 2 ч. – М.: МГТУ, 1993. – Ч. 1. – 172 с.; – Ч. 2. – 144 с.
83. Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. – М.: Наука, 1982. – 254 с.
84. Подюк В.Г. Единое информационное пространство ОАО «Газпром» как элемент отраслевой интегрированной информационно-управляющей системы // Connekt! Мир связи. – 1998. – № 8. – С. 10-18.
85. Поспелов Г.С., Ириков В.А. Программно-целевое планирование и управление. – М.: Советское радио, 1976. – 440 с.
86. Поспелов Д.А. Логико-лингвистические модели в системах управления. – М.: Энергоатомиздат, 1981. – 231 с.
87. Прикладные нечеткие системы. / Под ред. Т.Тэррано – М.: Мир, 1993. – 368 с.
88. Программное оборудование и вопросы принятия решений / Сб. трудов фак. вычисл. математики и кибернетики МГУ/ Под ред. Л.Н. Королева. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 242 с.
89. Райфа Х. Анализ решений. Введение в проблему выбора в условиях неопределенности. – М.: Наука, 1989. – 408 с.
90. Раскин Л.Г. Анализ сложных систем и элементы теории оптимального управления. – М.: Сов. радио, 1976. – 344 с.
91. Робертс Ф.С. Дискретные модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам. – М.: Наука, 1986. – 494 с.
92. Розен В.В. Цель – оптимальность – решение. Математические модели принятия оптимальных решений. – М.: Радио и связь, 1982. – 168 с.
93. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993. – 320 с.
94. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.
95. Сагнаева С.К., Цаленко М.Ш. Решение систем линейных уравнений с коэффициентами в решетках. – Ч. 1., Ч. 2 // НТИ. – 1992. – № 1. – С. 11-19. – № 2. – С. 15-21.
96. Силов В.Б. Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке. – М.: ИНПРО-РЕС, 1995. – 120 с.
97. Соболь И.М., Статников Р.Б. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями. – М.: Наука, 1981. – 110 с.
98. Сосулин Ю.Г., Фишман М.М. Теория последовательных решений и ее приложение. – М.: Радио и связь, 1985. – 272 с.
99. Таран Ю.Н., Толстых И.А., Шуйкова И.А. Определение приоритетов функционирования системы как фактор эффективного управления // Опыт разработки и внедрения в учебный процесс вуза новых образований.

- тельных технологий: Материалы всерос. науч.-метод. конф. – Липецк: ЛГТУ, 2000. – С. 70-72.
100. Технология системного моделирования / Е.Ф. Аврамчук, А.А. Ва-вилов и др.; Под общ. ред. С.В. Емельянова и др. – М.: Машиностроение; Берлин: Техник, 1988. – 520 с.
101. Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка принятия решений: Научно-практическое издание. Сер. Информатизация России на пороге ХХI века. – М.: СИНТЕГ, 1998. – 376 с.
102. Трахтенгерц Э.А. Методы генерации, оценки и согласования решений в распределенных системах поддержки принятия решений // АиТ. – 1995. – № 4. – С. 3-5.
103. Трахтенгерц Э.А. Построение распределенных систем группового проектирования // АиТ. – 1993. – № 9. – С. 154-174.
104. Трухаев Р.И. Инфлюентный анализ и принятие решений. Детерминированный анализ. – М.: Наука, 1984. – 235 с.
105. Трухаев Р.И., Лернер В.С. Динамические модели процессов принятия решений. – Кишинев: Штица, 1974. – 260 с.
106. Уинстон П. Искусственный интеллект. – М.: Мир, 1980. – 51 с.
107. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений. – М.: Наука, 1978. – 352 с.
108. Проблемы упаковки объектов по контейнерам при наличии многих критериев / Е.М. Фуремс, Г.Н. Васюнин, О.И. Ларичев, Ю.Г. Чернов // Проблемы и методы принятия решений в организационных системах управления. – М.: ВНИИСИ, 1982. – С. 84-91.
109. Фуремс Е.М., Мошкович Е.М. Упорядочивание векторных оценок для задачи формирования «портфеля заказов» // Сб. трудов ВНИИСИ. Вып. 9. – М.: ВНИИСИ, 1984. – С. 84-91.
110. Цаленко М.Ш. Реляционная модель данных с оценками истинности в гейтинговых алгебрах // Программирование. – 1995. – № 2. – С. 3-8.
111. Цыгичко В.Н. Руководителю – о принятии решений. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 272 с.
112. Чумаков В.В., Чумаков И.В. Принятие решений в условиях объективной и субъективной реальности. – М., 1991. – 35 с.
113. Шапиро Д.И. Принятие решений в системах организационного управления. Использование расплывчатых категорий. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 185 с.
114. Шоломов Л.А. Логические методы исследования дискретных моделей выбора. – М.: Наука, 1989. – 287 с.
115. Штойер Р. Многокритериальная оптимизация. Теория, расчет и приложения: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1992. – 504 с.
116. Шуйкова И.А. Анализ проблемных ситуаций методами теории принятия решений // Информационные технологии в процессе подготовки современного специалиста: Межвузовский сб. – Липецк: ЛГПИ, 1998. – С. 148-158.
117. Шуйкова И.А. Некоторые аспекты компьютерной реализации метода анализа иерархий // Новые технологии в образовании: Тез. докл. I Республика. электронной научн. конф. – Воронеж: ВГПУ, 1999. – С. 61-62.

118. Шуйкова И.А. Применение метода упорядочивания многокритериальных альтернатив для ранжирования конкурсных письменных работ // Проблемы преподавания дисциплин естественно-математического цикла: Материалы 2-й регион. научно-практ. конф. – Липецк: ЛГИУУ, 1999. – С. 30-33.
119. Шуйкова И.А. Ранжирование показателей уровня развития коллектива методами теории принятия решений // Современные проблемы информатизации: Тез. докл. III Междунар. электронной науч. конф. – Воронеж: Изд-во ВПУ, 1998. – С. 119-120.
120. Юдин Д.Б. Вычислительные методы принятия решений. – М.: Наука, 1986. – 319 с.
121. Юсупов Н.Ю. Автоматизированные системы принятия решений. – М.: Наука, 1983. – 88 с.
122. Chang C.C. Algebraic analysis of many valued logics // TAMS. – 1958. – № 2. – P. 467-494.
123. Kunal Sengupta. Fuzzy preference and Orlovsky choice procedure // Fuzzy Sets and systems 93. – 1998. – P. 231-234.
124. Yi-Jia Tan. Eigenvalues and eigenvectors for matrices over distributive lattices // Linear Algebra and its Applications 283, 1998. – P. 257-272.

Оглавление

Список используемых сокращений	3
Введение	4
1. Основные понятия теории принятия решений	7
1.1. Системы поддержки принятия решений и их место в информационно-управляющих системах.....	7
1.2. Компьютерная поддержка принятия решений	11
1.3. Участники процесса принятия решений	13
1.4. Цели и ресурсы	15
1.5. Альтернативы и критерии.....	16
1.6. Риски и неопределенности	18
1.7. Экспертное оценивание	19
2. Математический аппарат, используемый в методах принятия решений	23
2.1. Вычисление главного собственного вектора примитивных матриц.	23
2.2. Иерархии и приоритеты.....	26
2.3. Комплекты. Нечеткие множества. Нечеткие отношения.....	28
2.4. Полные алгебраические решетки	47
3. Модели и методы принятия решений, основанные на парном сравнении альтернатив	50
3.1. Классификация моделей и методов принятия решений	50
3.2. Модели линейного упорядочивания.....	53
Метод анализа иерархий	60
Методы принятия решений при нечеткой исходной информации..	61
Качественные методы принятия решений.....	65

4. Сравнительное исследование методов принятия решений	
в условиях неопределенности	68
4.1. Сравнение результатов ранжирования альтернатив различными методами принятия решений в условиях неопределенности.....	69
4.2. Применение методов принятия решений для анализа количественных данных.....	77
4.3. Оценка предпочтительности методов принятия решений с точки зрения участников процесса принятия решений	87
5. Комбинированный алгоритм поддержки принятия решений	97
5.1. Гомоморфизм шкал МАИ и метода принятия решений при нечеткой исходной информации	98
5.2. Отражение структуры сложной распределенной системы в методах принятия решений для этой системы	103
5.3. Выявление несогласованности суждений экспертов	110
5.4. Разработка СППР "Выбор" на основе комбинированного метода бинарных отношений.....	119
Заключение.....	128
Библиографический список	130

ББК 22.18
УДК 519.816

Б71

Блюмин С.Л., Шуйкова И.А.
Модели и методы принятия решений в условиях неопределенности. – Липецк: ЛЭГИ, 2001. – 138 с.

ISBN 5-900037-19-3

Техническое редактирование Н.С. Правильникова

Изд. лиц. № 071412 от 07.03.97.

Подписано в печать 24.01.2001 г.

Электронный вариант. Формат 60x84/16. Гарнитура «Таймс».

Издательство ЛЭГИ. 398 600, Липецк, ул. Интернациональная, 5а.
Ризография ЛЭГИ. 398 600, Липецк, ул. Интернациональная, 5а.
Лиц. ПДЛ № 51-9 от 05.02.97 г.