

А.Ф. Горюнов

**МЕТОДЫ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
в примерах и задачах
том I**

Допущено Учебно-методическим объединением вузов
направления подготовки 140300 «Ядерная физика и технологии»
в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению
«Ядерная физика и технологии»



**МОСКВА
ФИЗМАТЛИТ®
2015**

УДК 517.958(075)

ББК 22.161.1я7

Г 71

Горюнов А. Ф. **Методы математической физики в примерах и задачах.** В 2 т. Т. I. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2015. — 872 с. — ISBN 978-5-9221-1641-1 (Т. I).

Учебное пособие ориентировано на специальности «Прикладная математика и информатика», «Физика», «Механика», «Физика атомного ядра и частиц» и др. Пособие представляет собой сборник задач и примеров по уравнениям математической физики. Темы первого тома: построение математических моделей различных физических процессов, решение задач методом Фурье и методом интегральных преобразований, интегральные уравнения. При решении задач используется аппарат обобщенных функций.

Пособие адресовано студентам, изучающим математическую и теоретическую физику; некоторые разделы могут быть полезны аспирантам, инженерно-техническим и научным работникам, интересующимся данной областью знаний.

Допущено Учебно-методическим объединением вузов направления подготовки 140300 «Ядерная физика и технологии» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Ядерная физика и технологии».

Рецензент:

д.ф.-м.н., проф. Д. Б. Белостоцкий, Московский государственный строительный университет (МГСУ)

ISBN 978-5-9221-1641-1 (Т. I)

ISBN 978-5-9221-1642-8

© ФИЗМАТЛИТ, 2015

© А. Ф. Горюнов, 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
Предисловие к первому тому	8
Обозначения	11
 Глава 1. Модели математической физики	13
Литература к главе 1.	15
1.1. Модели механики	16
1.2. Модели теплопроводности и диффузии	61
1.3. Модели газо- и гидродинамики	95
1.4. Модели электродинамики	123
1.5. Ответы	157
 Глава 2. Метод разделения переменных	234
Литература к главе 2.	235
2.1. Задачи для однородного уравнения с однородными граничными условиями	236
2.2. Задачи для неоднородного уравнения.	297
2.3. Задачи, в которых применяются специальные функции и ортогональные полиномы	349
2.4. Ответы	433
 Глава 3. Метод интегральных преобразований	619
Литература к главе 3.	620
3.1. Преобразование Фурье	620
3.2. Преобразование Лапласа	632
3.3. Преобразование Меллина	658
3.4. Преобразование Ганкеля	681
3.5. Ответы	689

Глава 4. Методы решения интегральных уравнений	738
Литература к главе 4.	739
4.1. Вывод интегральных уравнений.	739
4.2. Решение интегральных уравнений	753
4.3. Ответы	803
Основные формулы.	848
Литература	864

Автор, окончивший Московский инженерно-физический институт пользуется возможностью с великой благодарностью вспомнить о замечательных преподавателях первых лет существования МИФИ. В те нелегкие послевоенные годы молодых людей, среди которых было немало прошедших Великую Отечественную Войну, воспитывали и прививали истинную любовь к знаниям выдающиеся физики И. Е. Тамм, М. А. Леонтович, А. Б. Мигдал, талантливые математики Д. А. Васильков, В. Я. Арсенин, научный руководитель автора В. И. Кондрашов и многие другие.

Их памяти посвящается этот труд

Предисловие

Математическая физика занимается моделированием физических явлений, которое состоит в построении математической модели исследуемого явления и решении полученной задачи. Математическая модель представляет собой набор уравнений (условий), приближенно описывающих свойства изучаемого объекта; построение модели основано на фундаментальных законах природы. Таким образом, математическая физика объединяет математику на этапе решения задачи и физику в процессе формирования математической модели и физического анализа полученного решения. Одна и та же модель может описывать свойства различных объектов физики, экономики, биологии, лингвистики и др. Изучение математической модели дает возможность предсказывать новые эффекты, решать задачи прогнозирования и управления, выбирать оптимальные условия дорогостоящих экспериментов.

Математические методы играют первостепенную роль в естествознании; их развитие не только обогащает математику как науку, но и расширяет границы познания внешнего мира, так как становятся доступными решения более сложных задач. Объектами изучения этого раздела математики являются дифференциальные уравнения в частных производных, интегральные и интегро-дифференциальные уравнения.

Прогресс науки и техники, разработка и внедрение новых технологий, конструирование более совершенных приборов требует от научных работников и инженеров знания различных

областей физики и владения современным математическим аппаратом. Изучение математической физики — многотрудный процесс. Здесь важное значение имеет интуиция. Однако любое предположение должно быть обосновано в рамках логики математических действий. В процессе изучения теории необходимо обратить внимание на те задачи, решение которых безусловно способствует более глубокому осмыслению теоретических положений.

Цель данного пособия — научить формированию достаточно простых математических моделей, владению математическим аппаратом, применяемым для аналитического решения задач и умению критически оценивать эффективность различных методов в конкретной ситуации. Пособие состоит из двух томов и представляет собой сборник задач по математической физике, значительная часть которых имеет физическое содержание. Задачи каждой главы распределены по группам; в начале группы приводится пример, в котором излагается методика решения задач. Задачи расположены по возрастанию сложности. В конце каждой главы помещены ответы к задачам, а в более трудных случаях даны указания или решения. В начале главы указана необходимая литература. В конце каждого тома имеется справочный раздел и более широкий список литературы.

Сборник задач базируется на модернизированных курсах уравнений математической физики, разработанных на кафедре Прикладной математики НИЯУ МИФИ. Основа этих курсов была заложена академиком А. Н. Тихоновым. При написании данного пособия использованы известные сборники задач, учебники, а также другие источники, ссылки на которые приводятся в соответствующих местах текста.

Значительная часть задач настоящего сборника доступна студентам, имеющим физико-математическую подготовку по учебным программам вузов РФ. Для решения ряда задач требуется более высокий уровень знаний физики и математики: здесь автор руководствовался программой подготовки специалистов, которую реализует НИЯУ МИФИ.

Пособие адресовано студентам, изучающим математическую физику, а также инженерам, желающим повысить квалификацию в этой области науки; некоторые главы могут быть полезны аспирантам.

Длительная работа над сборником задач вряд ли была бы успешной без постоянной поддержки коллег. Автор особенно благодарен Н. А. Кудряшову, А. В. Кряневу, С. Г. Артышеву,

В. В. Шестакову; весьма признателен М. Б. Сухареву и В. И. Ростокину, указавшим ряд недостатков, которые были устранены при подготовке к изданию учебного пособия. Автор выражает глубокую благодарность М. А. Чмыхову, П. Н. Рябову, Д. И. Синельщикову, которые доброжелательно и терпеливо помогали автору осваивать работу на компьютере; М. А. Чмыхов явился фактическим и весьма квалифицированным редактором по созданию электронной версии пособия. Нельзя не выразить глубокую признательность студентам факультета ЭТФ и Высшей школы физиков им. Н. Г. Басова НИЯУ МИФИ, труд которых при решении домашних заданий способствовал улучшению качества сборника. Рукопись задачника набрана в издательской системе $\text{\LaTeX}$. Неоценимую помощь в освоении этой системы оказал В. Э. Вольфенгаген, которому автор выражает искреннюю признательность. Автор также сердечно благодарен И. А. Горюновой, внесшей большой вклад в компьютерное оформление рукописи.

Предисловие к первому тому

Первый том содержит четыре главы. В первой главе проводится построение математических моделей различных физических процессов, или постановка задач, т. е. вывод системы условий, которые в рамках данной модели описывают физическое явление. Формирование математической модели основано на фундаментальных законах физики и является необходимым этапом процесса моделирования. Представлены задачи механики, теплопроводности, гидродинамики, фильтрации, нейтронной физики, электродинамики, квантовой механики и др. Для вывода уравнений механики привлекается вариационный метод. В задачах гидродинамики рассматриваются процессы, происходящие в идеальных жидкостях (газах): потенциальное обтекание твердых тел, движение гравитационных волн в жидкости, распространение звука в газе и т. п. В задачах электродинамики формулируются условия для определения тока и потенциала в длинных линиях, плотности тока в тонких проводящих оболочках, электромагнитных полей в проводниках и диэлектриках, электромагнитных волн в идеальных и диэлектрических волноводах (световодах) и др. Даны примеры физических систем, поведение которых описывается квазилинейными и нелинейными уравнениями.

Вторая глава содержит задачи, решение которых осуществляется методом разделения переменных (методом Фурье). Основу метода составляет задача на собственные значения — источник формирования полной ортогональной системы функций (точнее, собственных функций), в виде ряда по которым представлено решение поставленной задачи. Выделена группа физических задач, решение которых сводится к нахождению собственных значений и собственных функций линейных дифференциальных операторов, встречающихся в математической физике. Эти задачи помогают понять физический смысл собственных функций и собственных значений. Сделан акцент на свойстве эрмитовости операторов, благодаря которому можно судить о свойствах собственных значений и собственных функций задачи на собственные значения. С другой стороны, если оператор эрмитов,

значительно сокращается процесс вычисления интегралов при определении коэффициентов ряда Фурье, представляющего собой решение задачи. Важное значение имеет метод выделения частных решений неоднородной задачи, суть которого состоит в переходе к эквивалентной однородной задаче (редукция). Такой способ существенно упрощает технику решения и улучшает сходимость соответствующих рядов. Другой метод редукции основан на применении обобщенных функций, который демонстрируется на задачах этой главы. Конструкция решений ряда задач содержит специальные функции: классические ортогональные многочлены, присоединенные функции Лежандра, сферические, цилиндрические, гипергеометрические функции.

Тема третьей главы — интегральные преобразования. Наряду с задачами, для решения которых применяются преобразования Фурье, Лапласа, Меллина, Ганкеля, предлагаются также упражнения, дающие представление об основных свойствах этих преобразований. Интегральные преобразования находят применения при решении задач в неограниченных областях, задач, недоступных методу Фурье. Таковыми являются задачи Коши для волнового уравнения и уравнения теплопроводности, некоторые краевые задач для уравнения Пуассона. Аппарат интегральных преобразований содержит прямое преобразование, которое каждой функции некоторого класса ставит в соответствие ее образ и обратное преобразование, восстанавливающее прообраз по известному образу. Оно должно быть таким, чтобы оператору дифференцирования по некоторой переменной соответствовал оператор умножения на число в задаче для образа. Это значит, что задача для уравнения в частных производных преобразуется в задачу для обыкновенного дифференциального уравнения или алгебраического уравнения. Такая задача решается достаточно просто и остается применить обратное преобразование. Техника интегральных преобразований базируется на вычислении несобственных интегралов.

В четвертой главе рассмотрены задачи, приводящие к интегральным уравнениям, и даны упражнения, иллюстрирующие различные методы их решения. Наряду с линейными уравнениями представлены задачи для нелинейных интегральных уравнений. В этих случаях речь идет о точных решениях (точным считается любое из возможных решений). Некоторые уравнения определенной структуры (сингулярные, содержащие свертку) могут быть решены с помощью интегральных преобразований. Представлены уравнения, решения которых достигается

применением операторов Коши–Лиувилля (дифференцирование и интегрирование дробного порядка). Интегральные уравнения служат средством изучения свойств решений задач для дифференциальных уравнений. Приложения интегральных уравнений даны в некоторых из последующих глав.

При решении задач используется аппарат обобщенных функций; их применение существенно упрощает технику решения многих задач.

Обозначения

$B(x, r)$ — шар, радиус которого r , центр — в точке $x \in \mathbb{R}^n$

$B_r = B(0, r)$

$\mathbf{e}_l = \mathbf{1}/l$

$\mathbb{C}$ — множество комплексных чисел

$E_i(x) = \int_{-x}^x \frac{e^\xi}{\xi} d\xi$

$\operatorname{erf}(x)$ — интеграл вероятности

$\operatorname{Erf}(x) = 1 - \operatorname{erf}(x)$

$F(\alpha, \beta, \gamma, z)$ — гипергеометрическая функция

$H_n(x)$ — полином Чебышева–Эрмита

$H_\nu^{(1)}(z)$ — функция Ганкеля 1-го рода порядка ν

$H_\nu^{(2)}(z)$ — функция Ганкеля 2-го рода порядка ν

$I_\nu(z)$ — модифицированная функция Бесселя 1-рода порядка ν

$J_\nu(z)$ — функция Бесселя 1-рода порядка ν

$K_\nu(z)$ — модифицированная функция Бесселя 2-рода порядка ν (функция Макдональда)

$L_n^\alpha(x)$ — полином Чебышева–Лагерра

$\mathbb{N}_0$ — множество целых неотрицательных чисел

$\mathbb{N}$ — множество натуральных чисел

$P_n(x)$ — полином Лежандра

$P_n^m(x)$ — присоединенная функция Лежандра

$P_n^{(\alpha, \beta)}(x)$ — полином Якоби

$Q_n(x)$ — функция Лежандра 2-го ранга

$\mathbb{R}^n$ — n -мерное евклидово пространство

$\mathbb{R} = \mathbb{R}^1$

$S(x, r) = \partial B(x, r)$

$S_r = S(0, r)$

$|S_r|$ — площадь сферы S_r

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ — точка пространства $\mathbb{R}^n$

$Y_\nu(z)$ — функция Бесселя 2-рода порядка ν (функция Неймана)

$Y_n^m(\theta, \varphi)$ — фундаментальная сферическая функция

$\mathbb{Z}$ — множество целых чисел

$B(z, \zeta)$ — бета-функция Эйлера

$\Gamma(z)$ — гамма-функция Эйлера

$\gamma(z, a)$ — неполная гамма-функция

$$\eta(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & 0 < x \end{cases}$$

$\delta(x)$ — дельта-функция Дирака

$$\delta_{mn} = \begin{cases} 1, & m = n, \\ 0, & m \neq n, \end{cases} \quad m, n \in \mathbb{N}$$

$\Phi(\alpha, \gamma, z)$ — вырожденная гипергеометрическая функция

Ω — область в $\mathbb{R}^n$

$\overline{\Omega}$ — замыкание Ω

$$\partial\Omega = \overline{\Omega}/\Omega$$

A/B — дополнение множества B до множества A

A^T — транспонированная матрица A

$[a]$ — целая часть вещественного числа a

$$(a, b) = \{x: a < x < b, \in \mathbb{R}\}$$

$$[a, b] = \{x: a \leq x \leq b, \in \mathbb{R}\}$$

$\overline{mn}$, где $m < n$, — множество целых чисел $\{m, m+1, m+2, \dots, n\}$

$\varphi_k(x) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{E} \varphi(x)$ — равномерная сходимость на множестве E

Σ_a — макроскопическое сечение поглощения нейтронов

Σ_f — макроскопическое сечение деления нейтронов

Σ_s — макроскопическое сечение рассеяния нейтронов

Глава 1

МОДЕЛИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Предметом математической физики является разработка методов решения задач, возникающих при изучении явлений природы. Реальные процессы характеризуются величинами, зависящими (в общем случае) от координат и времени. Соотношения между этими величинами, записанные в математических терминах, составляют математическую модель данного процесса. Указанные соотношения являются следствием законов природы и представляют собой дифференциальные, интегральные, интегро-дифференциальные уравнения, а также набор дополнительных условий (граничных, начальных), учитывающих специфические свойства системы. Математическая модель лишь приближенно отражает эволюцию системы, так как невозможно учесть все факторы, определяющие ее поведение. С другой стороны, построение более точных моделей приводит к достаточно сложным задачам, аналитическое решение которых получить не удастся. Поэтому на первом этапе изучения какого-либо процесса используется сравнительно простая модель, в которой не учитываются факторы, мало влияющие на его развитие. В ряде случаев это определяется ограничениями, которые накладываются на систему: малость отклонения величин от их равновесных значений, пренебрежение некоторыми из внешних воздействий и т. п. Как правило, при достаточно жестких ограничениях можно получить линейную модель, для изучения которой существуют различные эффективные методы. Таким образом, формирование математической модели (или постановка задачи) зависит от того, какие аспекты конкретного явления считаются главными, а какие второстепенными. Упрощенная модель является стартовой: после решения соответствующей задачи, анализа развития изучаемого явления и т. п. можно переходить к более сложным моделям.

В математической физике фундаментальную роль играют линейные дифференциальные уравнения в частных производных.

Моделирование многих физических процессов приводит к линейным уравнениям второго порядка

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + cu = f, \quad (1.1)$$

где $u(x)$ — неизвестная функция, коэффициенты $a_{ij}(x)$, $b_i(x)$, $c(x)$ и $f(x)$ — заданные достаточно гладкие функции, аргумент которых $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ — точка n -мерного евклидова пространства $\mathbb{R}^n$. В зависимости от структуры слагаемых, содержащих вторые производные, вводится понятие типа уравнения (1.1). С этой целью группе старших производных при фиксированном $x = x_0$ ставится в соответствие квадратичная форма

$$q = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x_0) \lambda_i \lambda_j,$$

называемая характеристической. Существует невырожденное линейное преобразование $\mu = \mathcal{H} \lambda$ (т. е. матрица $\mathcal{H}$ с определителем $\det \mathcal{H} \neq 0$), где μ и λ — вектор-столбцы, посредством которого форма q преобразуется к виду

$$q = \sum_{i=1}^r \alpha_i \mu_i^2 - \sum_{i=r+1}^{r+s} \alpha_i \mu_i^2, \quad \alpha_i > 0, \quad r + s \leq n. \quad (1.2)$$

Согласно закону инерции квадратичных форм число r положительных и число s отрицательных членов в (1.2) не зависят от выбранного преобразования. Пара чисел (r, s) является инвариантом формы q , следовательно, и уравнения (1.1) (в точке $x = x_0$), и определяет тип уравнения. Так как уравнение (1.1) не изменится при умножении на -1 , то типы (r, s) и (s, r) одинаковы. Коэффициенты a_{ij} формы q зависят от x , поэтому тип уравнения есть функция точки. Уравнение (1.1) принадлежит в точке x_0 :

- гиперболическому типу, если $r + s = n$, $rs \neq 0$,
- параболическому типу, если $r + s < n$,
- эллиптическому типу, если $r = n$, $s = 0$.

Уравнение (1.1) принадлежит данному типу в области Ω , если оно обладает этим свойством в каждой точке области.

Представителем уравнения (1.1) является уравнение колебаний мембраны (волновое уравнение) (см. пример 1.7)

$$u_{tt} = \operatorname{div}(T(x, y) \nabla u) + f, \quad \text{или} \quad u_{tt} - T(u_{xx} + u_{yy}) - (\nabla T \nabla u) = f,$$

его характеристическая форма $q = \lambda_1^2 - T\lambda_2^2 - T\lambda_3^2$ имеет вид (1.2) при любых x, y, t . Так как $r = 1$, $s = 2$, $n = 3$, то волновое уравнение принадлежит гиперболическому типу. Аналогичные рассуждения показывают, что уравнение теплопроводности (см. пример 1.11)

$$u_t = \operatorname{div}(k(x, y, z)\nabla u) + f$$

принадлежит параболическому типу, а уравнение Пуассона (основное уравнение электростатики), в котором ε — диэлектрическая проницаемость среды, u — потенциал, ρ — плотность заряда,

$$\operatorname{div}(\varepsilon(x, y, z)\nabla u) = -4\pi\rho$$

— эллиптическому типу.

При $n = 2$ уравнение (1.1) записывается в виде

$$au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy} = \Phi(x, y, u, u_x, u_y). \quad (1.3)$$

В соответствии с проведенной классификацией тип уравнения (1.3) определяется знаком $\Delta = b^2 - ac$:

$\Delta > 0$ — гиперболический тип,

$\Delta = 0$ — параболический тип,

$\Delta < 0$ — эллиптический тип.

Принята следующая терминология для моделей математической физики (см. [15]).

Нестационарная задача для дифференциального уравнения (или для системы уравнений) с начальными и граничными условиями называется смешанной (или начально-краевой).

Задача для неограниченной системы (движение бесконечной струны или диффузия в бесконечной трубке и т. п.) с начальными условиями (граничных условий нет) называется задачей Коши. В действительности отыскиваются решения, удовлетворяющие определенным условиям на бесконечности (стремление к нулю или ограниченность и т. п.).

Стационарная задача с граничными условиями называется краевой.

Литература к главе 1

1. Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. — М.: МГУ, Наука, 2004.
2. Лейбензон Л. С. Движение природных жидкостей и газов в пористой среде. М.-Л.: ОГИЗ, 1947.

3. Баренблатт Г. И. Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа. — М.: Недра, 1972.
4. Галанин А. Д. Введение в теорию ядерных реакторов на тепловых нейтронах. — М.: Энергоатомиздат, 1990.
5. Тамм И. Е. Основы теории электричества. — М.: Наука, 1989.
6. Адамс М. Введение в теорию оптических волноводов. — М.: Мир, 1984.

1.1. Модели механики

Пример 1.1. Вывод малых продольных колебаний тонкого упругого стержня; постановка конкретной задачи. Стержень представляет собой одномерную механическую систему, т. е. величины, его характеризующие, зависят от одной пространственной координаты x (ось Ox направлена по оси стержня). Стержень достаточно тонок, а колебания столь малы, что поперечные сечения стержня в процессе движения не изменяют форму и остаются перпендикулярными оси Ox .

Упругий стержень ($0 < x < l$), конец $x = 0$ которого закреплен жестко, а конец $x = l$ — упруго (посредством пружинки с коэффициентом упругости k), находится в статическом равновесии; пружинка и стержень не деформированы. Объемная плотность стержня $\rho(x)$, модуль Юнга $E(x)$, площадь поперечного сечения $S(x)$. С момента $t = 0$ на стержень действуют силы, объемная плотность которых $F(x, t)\mathbf{e}_x$ (рис. 1.1). Требуется построить модель малых продольных колебаний стержня.




Рис. 1.1

Решение. Построение модели включает в себя вывод уравнения продольных колебаний стержня, описание движения его концов (граничные, или краевые условия), задание начального состояния стержня (начальные условия).

Вывод уравнения колебаний. Пусть x — начальная координата (при $t = 0$) сечения неподвижного недеформированного стержня, $\xi(x, t)$ — координата этого сечения при $t > 0$. Движение стержня определяет функция $u(x, t) = \xi(x, t) - x$ — величина

отклонения для $t > 0$ сечения, координата которого в начальный момент $t = 0$ равна x (x — координата, или переменная Лагранжа). Для элемента Δx , находящегося в статическом равновесии, применим закон Гука,

$$\frac{\Delta\xi - \Delta x}{\Delta x} = \frac{T(x + \Delta x, t)}{ES},$$

где T — натяжение. При $\Delta x \rightarrow 0$

$$T(x, t) = E(x)S(x) \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} - 1 \right), \text{ т. е. } T(x, t) = E(x)S(x)u_x(x, t).$$

Полученная формула определяет натяжение $T(x, t)$ в момент $t \geq 0$ в том сечении, начальная координата которого x . Условие малости колебаний: $|\Delta\xi - \Delta x| \ll |\Delta x|$ или в дифференциальной форме $|u_x| \ll 1$.

Если элемент Δx движется, то по второму закону Ньютона

$$\rho S \Delta x u_{tt} = T(x + \Delta x, t) - T(x, t) + FS \Delta \xi. \quad (1.4)$$

Так как $T(x + \Delta x, t) - T(x, t) = T_x \Delta x$ (в силу формулы Лагранжа), $\xi_x = 1 + u_x \approx 1$, то при $\Delta x \rightarrow 0$ из соотношения (1.4) следует уравнение продольных колебаний стержня

$$\rho(x)S(x)u_{tt} = \frac{\partial}{\partial x} \left(E(x)S(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + F(x, t)S(x). \quad (1.5)$$

В частном случае однородного цилиндрического стержня (величины ρ, E, S постоянны) уравнение колебаний запишется в виде

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f, \quad a^2 = \frac{E}{\rho}, \quad f = \frac{F}{\rho}.$$

Конструкция уравнения не зависит от начальных условий и способа закрепления торцов стержня.

Постановка задачи. По условию конец $x = 0$ неподвижен, следовательно, отклонение сечения $x = 0$ от положения равновесия $u(0, t) = 0$. Из уравнения движения элемента Δx , примыкающего к концу $x = l$,

$$-ESu_x(l - \Delta x, t) - ku(l, t) + FS \Delta \xi = \rho S \Delta x u_{tt},$$

при $\Delta x \rightarrow 0$ получается граничное условие $u_x(l, t) + hu(l, t) = 0$, в котором $h = \frac{k}{E(l)S(l)}$. Формирование модели завершается заданием начальных условий: начальные смещения сечений

стержня $u(x, 0) = 0$, начальные скорости сечений $u_t(x, 0) = 0$. Итак,

$$\begin{aligned}\rho S u_{tt} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(ES \frac{\partial u}{\partial x} \right) + FS, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) &= 0, \quad u_x(l, t) + hu(l, t) = 0, \\ u(x, 0) &= u_t(x, 0) = 0.\end{aligned}$$

Если начальные условия не нулевые, т.е. в момент $t = 0$ заданы отклонения $u_0(x)$ сечений и их начальные скорости $u_1(x)$, то $u(x, 0) = u_0(x)$, $u_t(x, 0) = u_1(x)$.

Для вывода уравнений движения используется также вариационный метод, основанный на принципе наименьшего действия. Пусть W — кинетическая энергия, U — потенциальная энергия, $L = W - U$ — функция Лагранжа механической системы. Действием называется функционал

$$\Phi = \int_{t_1}^{t_2} L dt,$$

где t_1 и t_2 — моменты времени, характеризующие реальные положения системы. Принцип наименьшего действия состоит в том, что из всех допустимых движений системы в течение времени от t_1 до t_2 реальным будет то, при котором функционал Φ принимает экстремальное значение. В случае стержня кинетическая энергия

$$W = \int_0^l \frac{\rho S u_t^2}{2} dx,$$

а потенциальная энергия складывается из энергии деформации стержня и потенциальной энергии стержня во внешнем силовом поле. Энергия деформации внутреннего элемента Δx определяется работой силы

$$T = \frac{ES(\Delta\xi - \Delta x)}{\Delta x},$$

сообщающей этому элементу удлинение $\Delta\xi - \Delta x$; при этом

$$\frac{ES}{\Delta x} \frac{(\Delta\xi - \Delta x)^2}{2} = \frac{ES}{2} \left(\frac{\Delta\xi}{\Delta x} - 1 \right)^2 \Delta x.$$

Следовательно, потенциальная энергия единицы длины стержня равна

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{ES}{2} \left(\frac{\Delta \xi}{\Delta x} - 1 \right)^2 = \frac{ESu_x^2}{2}.$$

Если внешние силы, в поле которых находится механическая система, совершают работу ΔA , то изменение потенциальной энергии системы $\Delta U = -\Delta A$. Следовательно, работа FSu внешних сил порождает изменение $-FSu$ потенциальной энергии для единицы длины стержня; работа ΔA сил упругости, направленных против смещения, отрицательна и равна $-\frac{ku^2(l, t)}{2}$, так что потенциальная энергия стержня изменится на $-\Delta A$. Таким образом,

$$U = \int_0^l \left(\frac{ESu_x^2}{2} - FSu \right) dx + \frac{ku^2(l, t)}{2}.$$

В результате

$$\Phi(u) = \int_{\Omega} \left(\frac{\rho Su_t^2}{2} - \frac{ESu_x^2}{2} + FSu \right) dx dt - \int_{t_1}^{t_2} \frac{ku^2(l, t)}{2} dt,$$

где $\Omega = \{x, t: 0 < x < l, t_1 < t < t_2\}$. Функции $u(x, t)$, на которых определен функционал, удовлетворяют граничному условию $u(0, t) = 0$ и имеют одинаковые значения при $t = t_1$ и при $t = t_2$. Если функционал достигает экстремума на функции $u(x, t)$, то необходимо равна нулю его вариация,

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\alpha} \Phi(u + \alpha\chi) \Big|_{\alpha} = \\ = \int_{\Omega} (\rho Su_t \chi_t - ESu_x \chi_x + FS\chi) dx dt - \int_{t_1}^{t_2} ku(l, t) \chi(l, t) dt = 0, \end{aligned}$$

где $\chi(x, t_1) = \chi(x, t_2) = 0$, $\chi(0, t) = 0$. После интегрирования по частям необходимое условие экстремума преобразуется к виду

$$\int_{\Omega} [(ESu_x)_x - \rho Su_{tt} + FS] \chi dx dt - \int_{t_1}^{t_2} [(ESu_x + ku) \chi]_{x=l} dt = 0.$$

На более узком классе функций $\chi(x, t)$, удовлетворяющих дополнительному условию $\chi(l, t) = 0$, второй интеграл обращается

в нуль, а из первого по основной лемме вариационного исчисления вытекает уравнение колебаний

$$\rho S u_{tt} = \frac{\partial}{\partial x} E S \frac{\partial u}{\partial x} + F S.$$

Итак, первый интеграл равен нулю на исходном классе функций $\chi(x, t)$, а значит, для этих же функций равен нулю второй интеграл. Тогда по основной лемме вариационного исчисления $E S u_x(l, t) + k u(l, t) = 0$. Остается учесть начальные условия.

1.1. Получить уравнение движения однородного цилиндрического стержня, на боковую поверхность которого действует сила сопротивления, пропорциональная скорости; коэффициент пропорциональности на единицу площади поверхности равен α , площадь и периметр поперечного сечения равны S и P соответственно.

Построить математические модели 1.2–1.11 для определения малых продольных колебаний однородного упругого стержня ($0 < x < l$) с постоянной площадью поперечного сечения (цилиндрический стержень).

1.2. На стержень с жестко закрепленным торцом $x = 0$ действует сила $F(t) \mathbf{e}_x$, приложенная с момента $t = 0$ к свободному торцу $x = l$; начальные условия нулевые.

1.3. Решить предыдущую задачу, если торец $x = 0$: 1) свободен; 2) закреплен упруго посредством пружинки с коэффициентом жесткости k .

1.4. Торец $x = 0$ стержня закреплен жестко, а торец $x = l$ — упруго посредством пружинки с коэффициентом жесткости k . С момента $t = 0$ конец пружинки, не связанный со стержнем, движется по оси Ox по закону $\mu(t)$ относительно своего начального положения. До момента $t = 0$ смещения и скорости сечений равны нулю.

1.5. Решить задачу 1.2, если на торец $x = 0$ действует сила сопротивления, пропорциональная скорости торца (коэффициент пропорциональности равен α).

1.6. Торцы стержня закреплены упруго посредством пружин с коэффициентом жесткости k . Начальные смещения сечений стержня $u_0(x)$, начальные скорости $u_1(x)$.

1.7. Неподвижный стержень со свободными торцами, расположенный на гладкой горизонтальной поверхности, получает импульс $I \mathbf{e}_x$ в результате продольного удара в торец $x = 0$.

1.8. Стержень со свободными торцами находится в статическом равновесии. В момент времени $t = 0$ стержень получает импульс $I\mathbf{e}_x$ в результате продольного удара в торец $x = 0$; с этого момента на торец $x = l$ действует сила сопротивления, пропорциональная скорости торца (коэффициент пропорциональности равен α).

1.9. Правый торец ($x = l$) неподвижного стержня закреплен жестко, а левый — упруго посредством пружинки с коэффициентом жесткости k . Начиная с момента $t = 0$ на торец $x = 0$ действует сила $F(t)\mathbf{e}_x$.

1.10. Стержень расположен на гладкой горизонтальной поверхности. С момента времени $t = 0$ на торцы $x = 0$ и $x = l$ действуют силы $F_1(t)\mathbf{e}_x$ и $F_2(t)\mathbf{e}_x$ соответственно; начальные условия нулевые.

1.11. Вертикальный стержень, верхний конец $x = l$ которого свободен, а нижний закреплен, находится в равновесии под действием силы тяжести ($\mathbf{e}_g = -\mathbf{e}_x$). Стержень получает импульс I в результате продольного удара в торец $x = l$. В качестве переменной Лагранжа взять равновесное положение сечения в поле тяжести.

Построить математические модели 1.12–1.20 малых продольных колебаний однородного упругого стержня ($0 < x < l$).

1.12. Один торец ($x = 0$) конического стержня свободен, а другой начиная с момента времени $t = 0$ движется по оси Ox относительно положения равновесия $x = l$ по закону $\mu(t)$ (рис. 1.2); начальные смещения и скорости сечений стержня равны нулю.

1.13. На свободный торец $x = 0$ конического стержня (рис. 1.2) действует сила сопротивления, пропорциональная скорости торца (коэффициент пропорциональности α), а на другой торец, закрепленный посредством пружинки с коэффициентом жесткости k , начиная с момента времени $t = 0$ действует сила $F(t)\mathbf{e}_x$. Начальные смещения и скорости сечений стержня равны нулю, площадь торца $x = 0$ равна S_0 .

1.14. Конический стержень со свободными торцами (рис. 1.2) получает импульс $I\mathbf{e}_x$ в результате удара в торец $x = 0$, площадь которого S_0 . На торец $x = l$ действует сила сопротивления, пропорциональная скорости торца (коэффициент пропорциональ-




Рис. 1.2

ности на единицу площади равен α). До удара смещения и скорости сечений стержня равны нулю.

1.15. Равномерно заряженный конический стержень (рис. 1.2), объемная плотность заряда которого равна q , внесен в электростатическое поле напряженностью $\mathcal{E}_0 \mathbf{e}_x$. Торцев $x = 0$ закреплен, торцев $x = l$ свободен, начальные условия нулевые; переходные процессы не учитывать

1.16. Торцев $x = l$ клиновидного стержня (рис. 1.3) свободен, а торцев $x = 0$, площадь которого S_0 , закреплен упруго посредством пружинки с коэффициентом жесткости k . Начиная с момента $t = 0$ незакрепленный конец пружинки движется (относительно начального положения) вдоль оси Ox по закону $\mu(t)$; начальные условия нулевые.




Рис. 1.3

1.17. Клиновидный стержень (рис. 1.3) со свободными торцами расположен на гладкой горизонтальной поверхности и находится в состоянии статического равновесия; площадь торца $x = 0$ равна S_0 . С момента времени $t = 0$ на торцев $x = l$ действует сила $F(t)\mathbf{e}_x$.

1.18. Торцев $x = l$ клиновидного стержня (рис. 1.3) закреплен жестко, а торцев $x = 0$, площадь которого S_0 , — упруго посредством пружинки с коэффициентом жесткости k . Стержень находится в поле внешних сил, объемная плотность которых $F(x, t)\mathbf{e}_x$; начальные условия нулевые.

1.19. Тонкий стержень со свободными торцами, боковая поверхность которого получена вращением параболы $y^2 = 2p(l_0 + x)$, $p > 0$, $l_0 > 0$, относительно оси Ox , находится в состоянии

статического равновесия. С момента времени $t = 0$ на торец $x = l$ действует сила $F(t)\mathbf{e}_x$ и на оба торца действует сила сопротивления, пропорциональная их скорости (коэффициент пропорциональности равен α).

1.20. Однородный стержень, боковая поверхность которого получена вращением гиперболы $y^2 = p^2(l_0^2 + x^2)$, $0 < p \ll 1$, $0 < pl_0 \ll 1$, $l < l_0$, около оси Ox , находится в состоянии статического равновесия. Торцы $x = 0$ закреплен упруго посредством пружинки с коэффициентом жесткости k , правый торец $x = l$ свободен. В момент времени $t = 0$ стержень получает импульс $-I\mathbf{e}_x$ в результате продольного удара в свободный торец.

Пример 1.2. 1. Клиновидный стержень ($0 < x < l$) (рис. 1.3) с закрепленным торцом $x = 0$, площадь которого S_0 , находится в состоянии статического равновесия под действием постоянной силы $F_0\mathbf{e}_x$, приложенной к свободному торцу $x = l$; объемная плотность внешних сил $F(x, t) = 0$. С момента времени $t = 0$ действие силы F_0 прекращается. *Поставить задачу о движении стержня.*

Функция $u(x, t)$ удовлетворяет однородному уравнению продольных колебаний (1.5)

$$\rho S(x)u_{tt} = E \frac{\partial}{\partial x} \left(S(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right), \quad S(x) = S_0 \frac{l_0 - x}{l_0},$$

граничным и начальным условиям. Поскольку торец $x = 0$ закреплен, а торец $t = l$ с момента $t = 0$ свободен, то $u(0, t) = 0$, $u_x(l, t) = 0$. Начальные скорости сечений стержня равны нулю, а начальные смещения $u(x, 0) = u_0(x)$ необходимо найти. Так как функция $u_0(x)$ описывает состояние стержня до момента времени $t = 0$, то она удовлетворяет стационарному уравнению колебаний (1.5)

$$\frac{d}{dx} \frac{S_0}{l_0} (l_0 - x) \frac{du_0}{dx} = 0$$

и условиям $u_0(0) = 0$, $ES(l)u'_0(l) = F_0$, где $S(l) = \frac{S_0}{l_0}(l_0 - l)$.

Общее решение $u_0(x) = -C \ln(l_0 - x) + C_1$ стационарного уравнения должно удовлетворять граничным условиям, т. е.

$$-C \ln l_0 + C_1 = 0, \quad \frac{ES(l)C}{l_0 - l} = F_0,$$

откуда

$$C = \frac{F_0 l_0}{ES_0}, \quad C_1 = \frac{F_0 l_0 \ln l_0}{ES_0}.$$

Итак, функция $u(x, t)$ является решением системы

$$\begin{aligned}(l_0 - x)u_t &= a^2 \frac{\partial}{\partial x}(l_0 - x) \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(0, t) &= 0, \quad u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) &= \frac{F_0 l_0}{ES_0} \ln \frac{l_0}{l_0 - x}, \quad u_t(x, 0) = 0.\end{aligned}$$

2. Стержень ($0 < x < l$) с характеристиками $\rho(x)$, $E(x)$, $S(x)$ находится в состоянии статического равновесия под действием постоянных сил $-F_0 \mathbf{e}_x$ и $F_0 \mathbf{e}_x$, приложенных к свободным торцам $x = 0$ и $x = l$ соответственно. В момент времени $t = 0$ действие сил прекращаются. Требуется поставить задачу для определения движения стержня при $t > 0$.

Функция $u(x, t)$ удовлетворяет уравнениям

$$\begin{aligned}\rho S u_{tt} &= \frac{\partial}{\partial x} E S \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u_x(0, t) &= u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) &= u_0(x), \quad u_t(x, 0) = 0,\end{aligned}$$

где $u_0(x)$ — решение стационарной задачи

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} E S \frac{du_0}{dx} &= 0, \quad 0 < x < l, \\ E(0)S(0)u'_0(0) &= E(l)S(l)u'_0(l) = F_0.\end{aligned}$$

Эти условия определяют функцию $u_0(x)$ с точностью до аддитивной постоянной:

$$E S u'_0(x), \quad \text{где } C = F_0,$$

$$u_0(x) = F_0 \int_0^x \frac{dx}{E S} + C_1.$$

Чтобы определить постоянную, надо ввести дополнительное условие для $u_0(x)$. Пусть постоянные силы начинают действовать одновременно с момента времени $t = t_0$. Так как сумма сил, действующих на механическую систему, равна нулю, то количество движения системы сохраняется, следовательно, положение центра тяжести x_c не меняется. Поэтому нужно потребовать, чтобы $u_0(x_c) = 0$. В результате

$$C_1 = -F_0 \int_0^{x_c} \frac{dx}{E S}, \quad \text{так что } u_0(x) = F_0 \int_{x_c}^x \frac{dx}{E S}.$$

Построить модели 1.21–1.31 для определения малых продольных колебаний однородного упругого стержня ($0 < x < l$), пренебрегая деформацией поперечных сечений.

1.21. Стержень, торец $x = l$ которого закреплен, находится в статическом равновесии под действием постоянной силы $F_0 \mathbf{e}_x$, приложенной к свободному торцу $x = 0$. В момент $t = 0$ действие силы прекращается.

1.22. Стержень, торец $x = l$ которого закреплен упруго, находится в статическом равновесии под действием постоянной силы $F_0 \mathbf{e}_x$, приложенной к свободному торцу $x = 0$. В момент $t = 0$ действие силы прекращается.

1.23. Неподвижный стержень расположен на гладкой горизонтальной поверхности. Торец $x = l$ стержня свободен, а другой торец закреплен посредством пружинки с коэффициентом жесткости k , которая находится в сжатом состоянии вследствие уменьшения ее длины на величину u_0 . В момент времени $t = 0$ пружинка освобождается.

1.24. Вертикальный стержень, нижний торец $x = 0$ которого закреплен, а верхний $x = l$ нагружен массой m , находится в статическом равновесии под действием сил тяжести ($\mathbf{g} = -\mathbf{e}_x$). В момент времени $t = 0$ массу убирают. В качестве переменной Лагранжа взять положение равновесия сечения стержня (без массы m) в поле тяжести.

1.25. Стержень в форме усеченного конуса представляет собой часть прямого кругового конуса, высота которого l_0 , а площадь большего основания S_0 (рис. 1.2). Торец $x = l$ жестко закреплен, а торец $x = 0$ свободен. Стержень находится в состоянии равновесия под действием постоянной силы $F_0 \mathbf{e}_x$, приложенной к свободному торцу. В момент времени $t = 0$ действие силы прекращается.

1.26. Клиновидный стержень (рис. 1.3) с закрепленным торцом $x = l$ находится в равновесии под действием постоянной силы $F_0 \mathbf{e}_x$, приложенной к свободному торцу $x = 0$, площадь которого S_0 . В момент времени $t = 0$ действие силы прекращается.

1.27. Стержень имеет форму усеченной пирамиды, высота которой l , а высота полной пирамиды l_0 . Торец $x = 0$, площадь которого S_0 , свободен, а торец $x = l$ закреплен упруго посредством пружинки с коэффициентом жесткости k . К свободному торцу

приложена сила $F_0 \mathbf{e}_x$, под действием которой стержень находится в состоянии статического равновесия. В момент времени $t = 0$ сила перестает действовать.

1.28. Боковая поверхность тонкого стержня получена вращением параболы $y^2 = 2p(l_0 + x)$, где $p > 0$, $l_0 > 0$, $0 < x < l$, относительно оси Ox . Стержень находится в состоянии статического равновесия под действием постоянной силы $F_0 \mathbf{e}_x$, приложенной к торцу $x = l$; торец $x = 0$ жестко закреплен. В момент времени $t = 0$ действие силы прекращается.

1.29. К торцам $x = 0$ и $x = l$ цилиндрического стержня, расположенного на гладкой горизонтальной поверхности, приложены постоянные силы $F_0 \mathbf{e}_x$ и $-F_0 \mathbf{e}_x$ соответственно, под действием которых стержень находится в состоянии статического равновесия. В момент $t = 0$ действие сил прекращается; начальное отклонение сечения, проходящего через центр тяжести, равно нулю.

1.30. Решить предыдущую задачу для однородного стержня, имеющего форму: 1) усеченного клина (рис. 1.3); 2) усеченного конуса (рис. 1.2); 3) части параболоида вращения (задача 1.28).

1.31. Однородный стержень ($-l < x < l$) со свободными торцами, боковая поверхность которого получена вращением гиперболы $y^2 = p^2(l_0^2 + x^2)$, $0 < p \ll 1$, $0 < pl_0 \ll 1$, $l < l_0$ около оси Ox , находится в состоянии статического равновесия под действием постоянных сил $-F_0 \mathbf{e}_x$ и $F_0 \mathbf{e}_x$, приложенных к торцам $x = -l$ и $x = l$ соответственно. В момент времени $t = 0$ действие сил прекращается; начальное отклонение сечения, проходящего через центр тяжести равно нулю.

1.32. Однородный цилиндрический стержень ($0 < x < l$) со свободными торцами получает в момент времени $t = 0$ заданные смещения и скорости вдоль оси Ox . Поставить задачу о движении стержня, применяя вариационный метод.

1.33. В упругом цилиндрическом стержне распространяются продольные (вдоль оси Ox) волны. Пусть $\varepsilon(x, t)$ — деформация (относительное удлинение элемента стержня), $\sigma(x, t)$ — напряжение (σdS — сила, действующая вдоль оси Ox на элемент dS поперечного сечения), $\rho(x)$ — плотность стержня,

x — переменная Лагранжа. Показать, что: 1) функции $\varepsilon(x, t)$ и $\sigma(x, t)$ удовлетворяют системе уравнений

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial \sigma}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial t}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial \varepsilon}{\partial t},$$

где v — скорость элемента стержня; 2) при условии малости колебаний ($|\varepsilon| \ll 1$) из системы получается уравнение колебаний в форме $\rho u_{tt} = (Eu_x)_x$ (пример 1.1); 3) если функции ε и σ связаны соотношением

$$\varepsilon = a(\sigma), \text{ где } a(0) = 0, \quad a'(\sigma) > 0, \quad a''(\sigma) \neq 0, \quad (1.6)$$

то движение стержня описывается нелинейной системой

$$\begin{aligned} \frac{1}{\rho} \frac{\partial \sigma}{\partial x} &= \frac{\partial v}{\partial t}, \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{\partial a(\sigma)}{\partial t}; \end{aligned} \quad (1.7)$$

4) функция $\sigma(x, t)$ является решением нелинейного волнового уравнения

$$\frac{\partial^2 a(\sigma)}{\partial t^2} - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial \sigma}{\partial x} \right) = 0; \quad (1.8)$$

5) при условиях (1.6) функция $\varepsilon(x, t)$ — решение уравнения¹⁾

$$\frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial t^2} - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial b(\varepsilon)}{\partial x} \right) = 0,$$

где $\sigma = b(\varepsilon)$ — обратная функция для $\varepsilon = a(\sigma)$.

1.34. 1. Показать, что в случае однородного стержня функция $u(x, t)$ (см. предыдущую задачу) — решение уравнения

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial x} \sigma \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = 0, \quad (1.9)$$

где $\sigma \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)$ — функция, аргумент которой $\frac{\partial u}{\partial x}$.

2. Пусть

$$h(y) = \frac{1}{\sqrt{\rho}} \int_0^y \sqrt{\sigma'(y)} dy + C. \quad (1.10)$$

¹⁾ Источник задач 1.33—1.39 — книга [54].

Доказать, что гладкое решение одного из уравнений

$$\frac{\partial u}{\partial t} + h \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = 0, \quad (1.11)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} - h \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = 0, \quad (1.12)$$

где $h \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)$ — функция, аргумент которой $\frac{\partial u}{\partial x}$, является решением уравнения (1.9)

1.35. Торец $x = 0$ однородного ($\rho = \rho_0$) полуограниченного стержня ($0 < x < \infty$) движется по закону $\mu(t)$, где $\mu(t)$ — гладкая функция, равная нулю при $t \leq 0$. Поставить задачу о движении стержня при нулевых начальных условиях, используя одно из уравнений (1.11) или (1.12).

1.36. На однородный стержень действует продольная сила, объемная плотность которой $F(t)$. Показать, что: 1) функция $u(x, t)$ есть решение уравнения

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial x} \sigma \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{1}{\rho} F(t); \quad (1.13)$$

2) гладкое решение любого из уравнений

$$\frac{\partial u}{\partial t} + h \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{1}{\rho} \int_0^t F(\tau) d\tau + C_1,$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} - h \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{1}{\rho} \int_0^t F(\tau) d\tau + C_2$$

является решением уравнения (1.13).

1.37. На однородный полубесконечный стержень ($0 < x < \infty$) действует с момента $t = 0$ равномерно распределенная продольная сила с объемной плотностью $F(t)$; торец $x = 0$ движется по закону $\mu(t)$, где $\mu(t)$ — гладкая функция, равная нулю при $t \leq 0$. Поставить задачу о движении стержня при нулевых начальных условиях, используя одно из уравнений п.2) предыдущей задачи.

1.38. Напряжение $\sigma(x, t)$ в одномерных нелинейных упругих средах с памятью является решением (в рамках некоторой модели) задачи для нелинейного интегрального уравнения

$$\sqrt{\rho a'(\sigma)} \frac{\partial \sigma}{\partial t} + \frac{\partial \sigma}{\partial x} - k \int_{-\infty}^t e^{-k(t-\tau)} \frac{\partial \sigma(x, \tau)}{\partial x} d\tau = 0, \quad (1.14)$$

$$k > 0, \quad \sigma(x, t) = 0 \text{ при } x > 0, \quad t \leq 0,$$

$$\sigma(0, t) = \mu(t), \quad \mu(t) \in C^1, \quad \mu(t) \neq 0 \text{ для } t \in (0; t_0).$$

Показать, что: 1) уравнение (1.14) посредством дифференцирования сводится к дифференциальному уравнению

$$\sqrt{\rho a'(\sigma)} \frac{\partial \sigma}{\partial t} + \frac{\partial \sigma}{\partial x} + k \int_0^\sigma \sqrt{\rho a'(\sigma)} d\sigma = 0;$$

2) если ввести функцию

$$w(x, t) = \int_0^\sigma \sqrt{\rho a'(\sigma)} d\sigma \text{ и ей обратную } \sigma = \varphi(w),$$

то получится задача для квазилинейного уравнения

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \varphi'(w) \frac{\partial w}{\partial x} + kw = 0, \quad x > 0,$$

$$w(x, t) = 0 \text{ при } x > 0, \quad t \leq 0,$$

$$w(0, t) = \nu(t), \quad \text{где } \nu(t) = \int_0^{\mu(t)} \sqrt{\rho a'(\sigma)} d\sigma.$$

1.39. При условии малости колебаний функцию $w(x, t)$, введенную в предыдущей задаче, можно представить в виде

$$w(x, t) = A\sigma + B\sigma^2, \quad A > 0.$$

Показать, что в этом случае: 1) уравнение (1.14) сводится к дифференциальному уравнению

$$A \frac{\partial \sigma}{\partial t} + B \frac{\partial \sigma^2}{\partial t} + \frac{\partial \sigma}{\partial x} + C\sigma = 0, \quad C = kA;$$

2) если ввести функцию

$$f(x, t) = 2B\sigma(x, t) e^{-Cx}$$

и перейти к переменным

$$\xi = \frac{1}{C}(1 - e^{-Cx}), \quad \tau = t - Ax,$$

то задача для уравнения (1.14) преобразуется в задачу для квазилинейного уравнения

$$f \frac{\partial f}{\partial \tau} + \frac{\partial f}{\partial \xi}, \quad 0 < \xi < \frac{1}{C},$$

$$f(\xi, \tau) = 0 \quad \text{при} \quad 0 < \xi < \frac{1}{C}, \quad \tau \geq \frac{A}{C} \ln(1 - C\xi),$$

$$f(0, t) = 2B\mu(t).$$

Пример 1.3. Поставить задачу для определения малых поперечных колебаний струны ($0 < x < l$) с закрепленными концами под действием плоской системы поперечных сил, линейная плотность которых $F(x, t) \mathbf{e}_u$ (рис. 1.4); начальные смещения и скорости точек струны заданы.




Рис. 1.4

Струной называется гибкая упругая нить. Пусть в положении равновесия струна занимает промежуток ($0 < x < l$) оси Ox , а ее точки движутся перпендикулярно к оси Ox в плоскости xOu . Функция $u(x, t)$, которую нужно определить, представляет собой величину отклонения от положения равновесия точки x струны в момент времени t . Если $t = t_0$, то $u = u(x, t_0)$ — форма струны в момент времени $t = t_0$, если $x = x_0$, то $u = u(x_0, t)$ — закон движения точки x_0 . Малыми называются колебания, когда $|\alpha| \ll 1$ при любых x и t . Так как $\alpha \approx \operatorname{tg} \alpha = u_x$, то условием малости является неравенство $|u_x| \ll 1$. Вследствие гибкости струны сила взаимодействия между ее элементами сводится к силе натяжения T , которая при любом t направлена по касательной к профилю $u = u(x, t)$ струны. Из свойства упругости струны следует, что изменение силы натяжения, действующей

на элемент Δx , пропорционально изменению длины элемента. Поскольку длина элемента Δx в момент времени t равна

$$\int_x^{x+\Delta x} \sqrt{1+u_x^2} dx \approx \Delta x,$$

то $T(x, t) = T(x)$. По второму закону Ньютона для элемента Δx

$$\rho \Delta x u_{tt} = T \sin \alpha|_{x+\Delta x} - T \sin \alpha|_x + F \Delta x,$$

где ρ — линейная плотность струны. Так как $\sin \alpha \approx \operatorname{tg} \alpha = u_x$, то после деления на Δx и перехода к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$ получается уравнение колебаний струны в виде

$$\rho(x)u_{tt} = \frac{\partial}{\partial x}T(x)\frac{\partial u}{\partial x} + F(x, t). \quad (1.15)$$

Решение определено в области $\Omega = \{x, t: 0 < x < l, 0 < t\}$, на границе которой оно удовлетворяет условиям:

$u(0, t) = u(l, t) = 0$ — краевые (или граничные) условия;

$u(x, 0) = u_0(x)$, $u_t(x, 0) = u_1(x)$ — начальные условия.

Если ρ и T постоянные, то уравнение колебаний запишется в виде

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f, \quad a^2 = \frac{T}{\rho}, \quad f = \frac{F}{\rho}.$$

1.40. Вывести уравнение колебаний струны вариационным методом.

Поставить задачи 1.41–1.56 для определения малых поперечных колебаний однородной струны.

1.41. Начальная форма струны ($-l < x < l$) с закрепленными концами — парабола, координаты вершины которой $x = 0$, $u = h$, начальная скорость струны равна нулю.

1.42. Струна ($0 < x < l$) с закрепленными концами находится в статическом равновесии под действием поперечной силы $F_0 \mathbf{e}_u$, приложенной в точке $x_0 \in (0, l)$; в момент $t = 0$ действие силы прекращается.

1.43. Тяжелая горизонтальная струна ($-l < x < l$) с закрепленными концами находится в равновесии под действием постоянной силы $F_0 \mathbf{e}_u$, $\mathbf{e}_u = \mathbf{e}_g$, приложенной в точке $x = 0$, и силы тяжести; в момент $t = 0$ действие силы F_0 прекращается.

1.44. Струна ($-l < x < l$) с закрепленными концами получает импульс $I \mathbf{e}_u$ в результате удара: 1) молоточком с плоским основанием в форме круга, радиус которого $r_0 < l$, а центр совпадает с серединой струны; 2) в точку $x_0 \in (-l, l)$.

1.45. Конец $x = 0$ струны ($0 < x < l$) закреплен, а другой конец присоединен к кольцу K с пренебрежимо малой массой. Кольцо может двигаться без трения по направляющей Ou (струна со свободным концом). С момента $t = 0$ на кольцо действует сила $F(t) \mathbf{e}_u$; начальные условия нулевые.

1.46. Струна ($0 < x < l$), один конец ($x = 0$) которой закреплен, а другой свободен (см. задачу 1.45), находится в покое на оси Ox . Конец $x = l$ смещают параллельно оси Ou на величину u_0 и после установления равновесия отпускают без начальной скорости.

1.47. Решить предыдущую задачу для струны в поле тяжести, если $\mathbf{e}_u = -\mathbf{g}$.

1.48. Конец $x = 0$ струны ($0 < x < l$) жестко закреплен, а другой конец присоединен к кольцу, которое может перемещаться без трения по направляющей, параллельной оси Ou . В момент времени $t = 0$ кольцо, масса которого M , получает импульс $I \mathbf{e}_u$. До момента $t = 0$ струна была неподвижна и занимала отрезок $[0; l]$ оси Ox .

1.49. Конец $x = 0$ струны ($0 < x < l$) жестко закреплен, а другой конец присоединен к кольцу, масса которого M . Кольцо может перемещаться без трения по направляющей, параллельной оси Ou . Струна находится в статическом равновесии под действием сосредоточенной силы $F_0 \mathbf{e}_u$, приложенной в точке $x_0 \in (0, l)$, и силы тяжести ($\mathbf{e}_g = -\mathbf{e}_u$). В момент времени $t = 0$ действие сосредоточенной силы прекращается.

1.50. Решить предыдущую задачу при условии, что сила $F_0 \mathbf{e}_u$ приложена до момента времени $t = 0$ к кольцу.

1.51. На струну ($l_1 < x < l_2$), плотность которой $\rho(x)$, начиная с момента времени $t = t_0$ действуют постоянные силы $-F_0 \mathbf{e}_u$ и $F_0 \mathbf{e}_u$, приложенные к свободным концам $x = l_1$ и $x = l_2$ соответственно. Показать, что для $\forall t \geq t_0$

$$\int_0^l \rho(x) u(x, t) dx = 0. \quad (1.16)$$

1.52. Однородная струна ($-l < x < l$) находится в состоянии статического равновесия под действием постоянных сил $-F_0 \mathbf{e}_u$ и $F_0 \mathbf{e}_u$, приложенных к свободным концам $x = -l$ и $x = l$ соответственно. В момент времени $t = 0$ действие сил прекращается. Поставить задачу о движении струны при условии, что функция $u_0(x)$ начальных отклонений удовлетворяет уравнению (1.16).

1.53. Струна ($0 < x < l$) с закрепленными концами движется под действием силы $F(t) \mathbf{e}_u$, приложенной с момента $t = 0$ до момента $t = t_0 > 0$ в точке $x_0 \in (0, l)$; начальные условия нулевые.

1.54. Конец полуограниченной струны ($0 < x$) упруго закреплен посредством пружинки с коэффициентом жесткости k и может перемещаться без трения по оси Ou (рис. 1.5). С момента времени $t = 0$ конец пружинки A движется (относительно начального положения) по оси Ou по гармоническому закону с амплитудой u_0 и частотой ω ; начальные условия нулевые.




Рис. 1.5

1.55. На бесконечную струну ($-\infty < x < \infty$) с момента времени $t = 0$ действует поперечная сила $F_0 \mathbf{e}_u$, точка приложения которой перемещается по струне из положения $x = 0$ со скоростью $v \ll a$; начальные условия нулевые.

1.56. Струна ($0 < x < l$) с закрепленными концами находится в среде, при движении в которой возникает сила сопротивления, пропорциональная скорости (коэффициент пропорциональности на единицу длины струны α задан). Начальные смещения и скорости точек струны известны.

1.57. На струну ($0 < x < l$), плотность которой $\rho(x)$, натяжение $T(x)$, действует поперечная упругая сила (коэффициент

упругости на единицу длины $k(x)$), концы $x = 0$ и $x = l$ закреплены посредством пружинок с коэффициентами жесткости k_1 и k_2 соответственно, начальные смещения точек струны $u_0(x)$, начальные скорости $u_1(x)$. Показать, что функция $u(x, t)$ является решением задачи

$$\begin{aligned} \rho(x)u_{tt} &= \frac{\partial}{\partial x}T(x)\frac{\partial u}{\partial x} - k(x)u, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ T(0)u_x(0, t) - k_1u(0, t) &= 0, \\ T(l)u_x(l, t) + k_2u(l, t) &= 0, \\ u(x, 0) &= u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x). \end{aligned} \quad (1.17)$$

Пример 1.4. Упругий круглый вал, радиус которого r_0 , совершает малые крутильные колебания относительно оси Ox , совпадающей с осью вала. Допуская, что в процессе движения поперечные сечения не изменяют форму и не смещаются вдоль оси Ox , вывести уравнение для угла поворота $u(x, t)$ сечения с координатой x . Модуль сдвига материала вала $G(x)$, момент инерции единицы длины вала относительно его оси $K(x)$, полярный момент инерции поперечного сечения вала J .




Рис. 1.6

При малых смещениях параллелепипеда под действием поперечной силы F , равномерно распределенной по сечению, деформация сдвига $\varphi = \frac{F}{GS}$, где G модуль сдвига, характеризующий физические свойства материала, S — площадь поперечного сечения (рис. 1.6, а). При повороте сечения с координатой $x + \Delta x$ на угол Δu относительно сечения с координатой x (рис. 1.6, б) происходит сдвиг параллелепипеда AB на угол $\Delta\varphi = \Delta F/(G\Delta S)$ в новое положение AB_1 . Так как углы малы, то $r\Delta u = \Delta x \Delta\varphi$. Выражение для момента сил, действующих

в сечении с координатой $x + \Delta x$,

$$M = \int_S r dF = \frac{\Delta u}{\Delta x} G \int_S r^2 ds = GJ \frac{\Delta u}{\Delta x},$$

при $\Delta x \rightarrow 0$ преобразуется в $M(x, t) = GJu_x(x, t)$. Условие малости крутильных колебаний: $|r_0 u_x| \ll 1$. Из уравнения вращательного движения для элемента Δx вала

$$K \Delta x u_{tt} = M(x + \Delta x, t) - M(x, t)$$

после деления на Δx и перехода к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$ получается уравнение крутильных колебаний

$$Ku_{tt} = \frac{\partial}{\partial x} GJ \frac{\partial u_x}{\partial x}.$$

Уравнение крутильных колебаний однородного вала будет

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad a^2 = \frac{GJ}{K}.$$

1.58. Вывести уравнение малых крутильных колебаний круглого вала вариационным методом.

1.59. Получить уравнение малых крутильных колебаний круглого вала (радиус r_0): 1) на единицу длины (вдоль оси) которого действует момент сил $M(x, t)\mathbf{e}_x$; 2) на поверхность которого действует сила сопротивления, пропорциональная скорости (коэффициент пропорциональности на единицу площади поверхности равен α).

Поставить задачи 1.60–1.65 для определения малых крутильных колебаний однородного круглого вала, радиус которого r_0 .

1.60. Торец $x = 0$ полуограниченного вала ($0 < x$) совершает гармонические крутильные колебания, амплитуда которых u_0 , частота ω ; начальные условия нулевые.

1.61. Торец $x = 0$ вала ($0 < x < l$) закреплен жестко, а другой торец: 1) свободен; 2) закреплен упруго посредством спиральной пружины с коэффициентом жесткости k ; начальные условия заданы.

1.62. Торец $x = 0$ вала ($0 < x < l$) закреплен упруго посредством спиральной пружины с коэффициентом жесткости k , а на

торец $x = l$ действует момент сил $M(t) \mathbf{e}_x$; начальные смещения и скорости вала равны нулю.

1.63. Торец $x = 0$ полуограниченного вала ($0 < x$) упруго закреплен посредством спиральной пружины с коэффициентом жесткости k . Свободный конец пружины совершает крутильные гармонические колебания относительно оси вала, амплитуда которых u_0 , частота ω ; начальные условия нулевые.

1.64. Вал ($0 < x < l$), торец $x = l$ которого упруго закреплен посредством спиральной пружины с коэффициентом жесткости k , находится в состоянии равновесия под действием постоянного момента сил $M_0 \mathbf{e}_x$, приложенного к торцу $x = 0$. В момент времени $t = 0$ действие сил прекращается.

1.65. Вал ($0 < x < l$) с закрепленными торцами находится в равновесии под действием момента сил $M_0 \mathbf{e}_x$, приложенного в сечении $x_0 \in (0, l)$; в момент $t = 0$ действие сил прекращается.

1.66. На вал ($0 < x < l$) с характеристиками $K(x)$, $G(x)$, J начиная с момента времени $t = t_0$ действуют постоянные моменты сил $-M_0 \mathbf{e}_x$ и $M_0 \mathbf{e}_x$, приложенные к свободным торцам $x = 0$ и $x = l$ соответственно. Показать, что для $\forall t \geq t_0$

$$\int_0^l K(x) u(x, t) dx = 0. \quad (1.18)$$

1.67. Однородный круглый вал находится в состоянии статического равновесия под действием постоянных моментов сил $-M_0 \mathbf{e}_x$

и $M_0 \mathbf{e}_x$, приложенных к свободным торцам $x = 0$ и $x = l$ соответственно. В момент времени $t = 0$ действие сил прекращается. Поставить задачу о движении вала при условии, что функция $u_0(x)$ начальных угловых смещений удовлетворяет уравнению (1.18).




Рис. 1.7

Пример 1.5. Постановка задачи для определения малых поперечных колебаний однородной струны, свободно подвешенной в поле тяжести, точки которой в момент времени $t = 0$ получают скорости $u_1(x)$ при нулевых начальных смещениях (рис. 1.7). Колебания описываются уравнением (1.15),

где $\rho(x) = \rho_0$, натяжение $T(x) = \rho_0 g(l - x)$. Так как конец $x = 0$ струны закреплен, то его смещение $u(0, t) = 0$. Уравнение движения конечного элемента

$$\rho_0 \Delta x u_{tt} = -T(l - \Delta x) u_x(l - \Delta x, t)$$

при $\Delta x \rightarrow 0$

преобразуется в граничное условие $\lim_{x \rightarrow l} T(x) u_x(x, t) = 0$.

Итак,

$$\begin{aligned} u_{tt} &= g \frac{\partial}{\partial x}(l - x) \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \\ u(0, t) &= 0, \quad \lim_{x \rightarrow l} (l - x) u_x = 0, \\ u(x, 0) &= 0, \quad u_t(x, 0) = u_1(x). \end{aligned}$$

Точка $x = l$, в которой коэффициент при u_{xx} обращается в нуль, называется *особой*, так как уравнение может иметь решение, не ограниченное в этой точке. Действительно, из уравнения движения струны, записанного в форме $u_{xx} = \frac{u_{tt} + g u_x}{g(l - x)}$, следует возможность существования решения $u(x, t)$ с неограниченной производной $u_{xx}(x, t)$; но тогда не исключено, что $u_x(x, t)$ и, может быть, $u(x, t)$ не ограничены при $x = l$ (см. задачи 1.75 и 1.71). Полученное граничное условие не исключает такой возможности. В соответствии с физическим смыслом задачи отклонение струны ограничено, т. е. $|u(l, t)| < \infty$, что является другой формой граничного условия при $x = l$.

Поставить задачи 1.68–1.85 для поперечных колебаний струны ($0 < x < l$), подвешенной в поле тяжести за конец $x = 0$, или продольных колебаний (в одномерном приближении) однородного упругого стержня ($0 < x < l$).

1.68. Начиная с момента времени $t = 0$ точка подвеса $x = 0$ однородной струны движется в горизонтальном направлении с постоянным ускорением w_0 .

1.69. Однородная струна находится в равновесии под действием силы $F_0 \mathbf{e}_u$, приложенной в точке $x = l/2$. В момент $t = 0$ действие силы прекращается.

1.70. Однородная струна получает импульс $I \mathbf{e}_u$ в результате поперечного удара в точку $x = l/2$.

1.71. Однородная струна находится в равновесии под действием поперечных сил, линейная плотность которых $\rho_0 \mathbf{e}_u$. В момент времени $t = 0$ действие поперечных сил прекращается.

1.72. Однородная струна вращается около оси Ox с постоянной угловой скоростью ω ; начальные смещения и скорости точек струны заданы.

1.73. Плотность струны $\rho(x)$ — заданная функция x , при этом $\rho(l) \neq 0$. Начальные отклонения и начальные скорости точек струны $u_0(x)$ и $u_1(x)$ соответственно.

1.74. Линейная плотность струны $\rho_0 \left(1 - \frac{x}{l}\right)^\nu$, $\nu > -1$, начальные отклонения и начальные скорости заданы.

1.75. Концу $x = l$ неоднородной струны, линейная плотность которой $\rho_0 \left(1 - \frac{x}{l}\right)^{-\frac{1}{2}}$, сообщают поперечное отклонение u_0 и отпускают без начальной скорости.

1.76. Точке $x = l_1$ струны, линейная плотность которой

$$\rho(x) = \begin{cases} \rho_1, & 0 < x < l_1, \\ \rho_2, & l_1 < x < l, \end{cases}$$

сообщают поперечное отклонение u_0 и после того, как установилось статическое равновесие, отпускают без начальной скорости.

1.77. Стержень имеет форму прямого кругового конуса, высота которого l , и находится в поле тяжести (рис. 1.8, а). Основание




Рис. 1.8

стержня жестко связано с массивной горизонтальной плитой. С момента $t = 0$ плита движется вдоль оси Ox с постоянной скоростью v_0 . В качестве переменной Лагранжа взять положение равновесия сечения в поле тяжести.

1.78. Конический стержень, связанный основанием с горизонтальной плитой (см. предыдущую задачу), свободно падает под действием силы тяжести. В момент $t = 0$ плита мгновенно останавливается, скорость стержня в этот момент равна v_0 .

1.79. Стержень в форме клина, параллельные грани которого — равнобедренные треугольники, прикреплен основанием к горизонтальной плите и находится в состоянии покоя (рис. 1.8, б); ось Ox направлена по оси клина, $\mathbf{e}_x = \mathbf{e}_g$. В момент $t = 0$ стержень отрывается от плиты и свободно падает под действием силы тяжести. В качестве переменной Лагранжа взять равновесное положение сечения недеформированного стержня.

1.80. Стержень в форме клина расположен на горизонтальной поверхности (рис. 1.9). С момента времени $t = 0$ на торец $x = 0$, площадь которого S_0 , действует сила $F(t) \mathbf{e}_x$; силой трения пренебречь.




Рис. 1.9

1.81. Неподвижный недеформированный стержень в форме клина расположен на горизонтальной поверхности (рис. 1.9). Торец $x = 0$, площадь которого S_0 , закреплен посредством пружинки, коэффициент упругости которой k . С момента времени $t = 0$ конец пружинки, не связанный со стержнем, движется относительно начального положения по закону $\mu(t)$. Силой трения пренебречь.

1.82. Основание $x = 0$ стержня, имеющего форму правильной пирамиды, совершает гармонические колебания, амплитуда которых u_0 , частота ω ; начальные условия нулевые.

1.83. Однородный стержень клиновидной формы (рис. 1.10), ширина которого $2d$, получает в момент времени $t = 0$ смещения $u_0(x)$ и скорости $u_1(x)$.




Рис. 1.10

1.84. Однородная струна ($0 < x < l$) вращается в горизонтальной плоскости около точки $x = 0$ с угловой скоростью ω ;

начальные смещения и скорости точек (в направлении оси Ou) струны заданы, сила тяжести отсутствует.

1.85. Решить предыдущую задачу для вращающейся струны, плотность которой $\rho(x)$.

Пример 1.6. Поставить задачу для определения продольных колебаний однородного стержня ($0 < x < l$), торец $x = 0$ которого закреплен, а на свободном торце $x = l$ находится тонкая пластинка, масса которой m ; начальные условия заданы.

Постановка задачи имеет две эквивалентные формы.

1. Задача ставится для неоднородного стержня (масса m — часть стержня) со свободным концом $x = l$:

$$\begin{aligned} [\rho_0 + \frac{m}{S_0}\delta(x-l)]u_{tt} &= E_0 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \quad (1.19) \\ u(0, t) &= u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) &= u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x). \end{aligned}$$

2. Если считать стержень однородным, то граничное условие при $x = l$ представляет собой уравнение движения массы m :

$$\begin{aligned} u_{tt} &= a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t \quad (1.20) \\ u(0, t) &= 0, \quad m u_{tt}(l, t) = -E_0 S_0 u_x(l, t), \\ u(x, 0) &= u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x). \end{aligned}$$

Формальный переход от постановки 1 к постановке 2 можно осуществить на основании правила дифференцирования (10.25). Согласно этому правилу уравнение (1.19) определяет скачок производной в точке $x = l$

$$[u_x]_l = \frac{m}{E_0 S_0} u_{tt}(l, t),$$

откуда следует, что

$$u_x(l-0, t) = -\frac{m}{E_0 S_0} u_{tt}(l-0, t),$$

т.е. граничное условие при $x = l$ в постановке 2. Поскольку обобщенная функция $\delta(x-l) = 0$ при $x < l$, то уравнение (1.19) принимает форму $u_{tt} = a^2 u_{xx}$. Обратный переход достигается введением функции

$$\tilde{u}(x, t) = u(x, t), \quad 0 < x < l, \quad \tilde{u}_x(x, t) = \begin{cases} u_x(x, t), & 0 < x < l, \\ 0, & x = l. \end{cases}$$

Так как

$$[\tilde{u}_x]_l = \tilde{u}_x(l, t) - \tilde{u}_x(l - 0, t) = \frac{m}{E_0 S_0} u_{tt}(l, t), \quad \tilde{u}_{tt} = u_{tt},$$

то согласно формуле (10.25)

$$\tilde{u}_{xx} = \{\tilde{u}_{xx}\} + [u_x]_l \delta(x - l) = u_{xx} + \frac{m}{E_0 S_0} u_{tt}(l, t) \delta(x - l).$$

Подстановка u_{tt} и u_{xx} в уравнение (1.20) преобразует его в уравнение (1.19) для функции $\tilde{u}(x, t)$, которая при $0 < x < l$ совпадает (по определению) с функцией $u(x, t)$.

З а м е ч а н и е. Роль постановки 1 проявляется при решении задачи методом Фурье: коэффициент $\rho_0 + \frac{m}{S_0} \delta(x - l)$ при u_{tt} представляет собой вес, с которым ортогональны собственные функции на отрезке $[0; l]$.

Поставить задачи 1.86–1.93 для описания малых продольных колебаний однородного упругого цилиндрического стержня ($0 < x < l$) с сосредоточенной массой.

1.86. На свободном торце ($x = l$) стержня имеется сосредоточенная масса m , а другой торец жестко закреплен. Стержень движется под действием продольной силы $F(t) \mathbf{e}_x$, приложенной к торцу $x = l$; начальные условия нулевые.

1.87. Вертикальный стержень с закрепленным нижним торцом $x = 0$ находится в состоянии статического равновесия под действием силы тяжести ($\mathbf{g} = -\mathbf{e}_x$). С высоты $l + h$ падает без начальной скорости тело, масса которого m , и после удара (в момент времени $t = 0$) в торец $x = l$ движется вместе со стержнем. В качестве переменной Лагранжа взять положение равновесия сечения в поле тяжести; размерами тела пренебречь.

1.88. Тело, масса которого m , движущееся со скоростью v вдоль оси Ox , ударяет в торец $x = 0$ стержня, покоящегося на гладкой горизонтальной поверхности, и движется вместе со стержнем; размерами тела пренебречь.

1.89. Торец $x = 0$ стержня упруго закреплен посредством пружинки с коэффициентом жесткости k , а свободный торец $x = l$ с сосредоточенной массой m смещен на расстояние u_0 из положения равновесия под действием постоянной продольной силы. В момент $t = 0$ действие силы прекращается.

1.90. Торец $x = l$ с сосредоточенной массой m упруго закреплен посредством пружинки с коэффициентом жесткости k . В момент

времени $t = 0$ стержень получает импульс $I\mathbf{e}_x$ в результате удара в свободный торец $x = 0$.

1.91. В сечении $x = x_0 \in (0; l)$ стержня имеется тонкая пластинка, масса которой m ; торец $x = 0$ закреплен, торец $x = l$ движется вдоль оси Ox по закону $\mu(t)$, начальные смещения и скорости сечений стержня равны нулю.

1.92. В сечении $x = x_0 \in (0; l)$ стержня имеется тонкая пластинка, масса которой m ; торец $x = 0$ закреплен, а к свободному торцу $x = l$ приложена постоянная сила $F_0\mathbf{e}_x$, под действием которой стержень находится в состоянии статического равновесия. В момент времени $t = 0$ действие силы прекращается.

1.93. Решить задачу 1.29 для однородного стержня с сосредоточенной массой m в сечении $x = x_0 \in [0; l]$.

Поставить задачи 1.94–1.104 для малых поперечных колебаний однородной струны с сосредоточенной массой m .

1.94. В точке $x = 0$ струны ($-l < x < l$) с закрепленными концами имеется шарик. В момент времени $t = 0$ в результате удара шарик получает импульс $I\mathbf{e}_u$; до удара смещения и скорости этой механической системы были равны нулю.

1.95. Струна ($0 < x < l$), конец $x = 0$ которой закреплен, а конец $x = l$ свободен, с сосредоточенной массой в точке $x_0 \in (0; l)$ получает в момент времени $t = 0$ импульс $I\mathbf{e}_u$ в результате удара в точку x_0 . До удара смещения и скорости этой механической системы были равны нулю.

1.96. Решить предыдущую задачу для струны с упруго закрепленным концом $x = l$.

1.97. Струна ($0 < x < l$) с закрепленными концами с сосредоточенной массой в точке $x_0 \in (0; l)$ находится в равновесии под действием постоянной силы $F_0\mathbf{e}_u$, приложенной в точке x_0 . В момент времени $t = 0$ действие силы прекращается.

1.98. Решить предыдущую задачу, если конец $x = l$: 1) свободен; 2) закреплен упруго.

1.99. Тяжелая однородная струна ($-l < x < l$) с закрепленными концами расположена на горизонтальной подставке в поле тяжести ($\mathbf{e}_g = -\mathbf{e}_u$). В точке $x = 0$ струны находится шарик. В момент времени $t = 0$ подставку убирают.

1.100. Струна ($0 < x < l$) с шариком на конце $x = l$ подвешена в поле тяжести в точке $x = 0$. Шарик смещают в горизонтальном направлении на расстояние u_0 и отпускают без начальной скорости.

1.101. Струна ($0 < x < l$) с шариком на конце $x = l$ подвешена в поле тяжести в точке $x = 0$. В момент времени $t = 0$ в результате удара шарик получает импульс $I \mathbf{e}_u$.

1.102. Струна ($0 < x < l$) с шариком на конце $x = l$ вращается с угловой скоростью ω в горизонтальной плоскости около точки $x = 0$; начальные условия заданы.

1.103. Конец $x = 0$ струны ($0 < x < l$) закреплен, а конец $x = l$ соединен с кольцом (сосредоточенная масса), которое может свободно перемещаться только в направлении оси Ou . Масса кольца m , натяжение струны T_0 , ее плотность ρ_0 , струна расположена на оси Ox и находится в состоянии статического равновесия, силы тяжести отсутствуют. Кольцо смещают на расстояние h и после установления равновесия отпускают без начальной скорости.

1.104. Решить предыдущую задачу для струны, находящейся в поле тяжести ($\mathbf{e}_g = -\mathbf{e}_x$).

Сформировать математические модели 1.105–1.111 для определения малых крутильных колебаний однородного круглого вала ($0 < x < l$).

1.105. На свободном торце $x = 0$ вала имеется диск с осевым моментом инерции K_0 . С момента времени $t = 0$ торец $x = l$ совершает крутильные гармонические колебания с амплитудой u_0 и частотой ω ; начальные условия нулевые.

1.106. Торец $x = 0$ вала закреплен, а на свободном торце имеется диск с осевым моментом инерции K_0 . Вал находится в равновесии под действием постоянного момента сил $M_0 \mathbf{e}_x$, приложенного к диску. В момент $t = 0$ действие сил прекращается.

1.107. Торец $x = l$ вала закреплен посредством спиральной пружины с коэффициентом упругости k , а на свободном торце имеется диск с осевым моментом инерции K_0 . Вал находится в равновесии под действием постоянного момента сил $M_0 \mathbf{e}_x$, приложенного в сечении $x_0 \in (0; l)$. В момент $t = 0$ действие сил прекращается.

1.108. На торцах $x = 0$ и $x = l$ вала имеются диски с осевыми моментами инерции K_1 и K_2 соответственно. Под действием постоянных моментов сил диск на торце $x = 0$ повернут на угол u_1 , а другой диск — на угол u_2 , при этом вал находится в равновесии. В момент $t = 0$ действие сил прекращается.

1.109. На торце $x = l$ вала имеется диск с осевым моментом инерции K_0 . 1) Торце $x = 0$ закреплен посредством спиральной пружины с коэффициентом упругости k , а к свободному торцу $x = l$ приложен момент сил $M_0 \mathbf{e}_x$; 2) торце $x = l$ закреплен посредством спиральной пружины с коэффициентом упругости k , а на свободный торце $x = 0$ действует момент сил $M_0 \mathbf{e}_x$. Вал находится в равновесии. В момент времени $t = 0$ действие сил прекращается.

1.110. Торце $x = l$ вала закреплен посредством спиральной пружины с коэффициентом упругости k , а торце $x = 0$ свободен; в сечении $x = x_0 \in (0; l)$ имеется тонкий диск с осевым моментом инерции K_0 . Вал приводится в движение моментом сил $M(t) \mathbf{e}_x$, приложенным к торцу $x = 0$.

1.111. Торце $x = 0$ круглого вала закреплен жестко, другой торце $x = l$: 1) также жестко закреплен; 2) свободен; 3) закреплен упруго посредством спиральной пружины с коэффициентом упругости k . В сечении $x = x_0 \in (0; l)$ имеется тонкий диск с осевым моментом инерции K_0 . Вал находится в состоянии статического равновесия под действием постоянного момента сил $M_0 \mathbf{e}_x$, приложенного к диску. В момент $t = 0$ действие сил прекращается.

Построить математические модели механических систем 1.112–1.116, совершающих малые колебания.

1.112. Стержень ($0 < x < l$) с закрепленными концами имеет характеристики ρ_1 , E_1 , S_0 при $0 < x < x_0$ и ρ_2 , E_2 , S_0 при $x_0 < x < l$; начальные условия заданы.

1.113. Решить задачу 1.29 для неоднородного стержня, описанного в предыдущей задаче.

1.114. Неоднородная струна ($0 < x < l$), плотность которой ρ_1 при $0 < x < x_0$ и ρ_2 при $x_0 < x < l$, закреплена в точке $x = l$. Струна движется под действием силы $F(t) \mathbf{e}_u$, приложенной с момента $t = 0$ к свободному концу $x = 0$ (см. задачу 1.45); начальные условия нулевые.

1.115. Неоднородный круглый вал ($0 < x < l$), характеристики которого G_1, J, K_1 при $0 < x < x_0$, и G_2, J, K_2 при $x_0 < x < l$, находится в статическом равновесии. Торце $x = 0$ закреплён, а свободный торец повернут на угол u_0 под действием постоянного момента сил, направленного по оси Ox . В момент времени $t = 0$ действие сил прекращается.

1.116. Решить задачу 1.66 для круглого вала ($0 < x < l$), характеристики которого G_1, J, K_1 при $0 < x < x_0$, и G_2, J, K_2 при $x_0 < x < l$.

1.117. Два стержня, один из которых имеет длину l , а другой полуограничен, расположены на оси Ox . Их площади поперечных сечений, плотности и модули Юнга равны S_1, ρ_1, E_1 и S_2, ρ_2, E_2 соответственно. Первый стержень движется вдоль оси Ox со скоростью $v > 0$, а второй неподвижен и занимает положительную часть оси Ox . Поставить задачу для определения движения стержней в течение времени τ (пока длится соударение).

1.118. Два стержня, длины которых l , площади поперечных сечений S_1 и S_2 , физические характеристики ρ_1, E_1 и ρ_2, E_2 , расположены на оси Ox и движутся вдоль нее с положительными скоростями v_1 и v_2 , где $v_1 > v_2$. Поставить задачу для определения движения стержней в течение времени τ (пока длится соударение).

Пример 1.7. *Получить уравнение малых поперечных колебаний мембраны, которая занимает в положении статического равновесия область Ω плоскости xOy .*

Мембрана представляет собой гибкую упругую пленку, отклонения $u(x, y, t)$ точек которой от положения равновесия происходят в направлении, перпендикулярном плоскости xOy . Из определения мембраны следует, что сила T взаимодействия между соседними элементами, разделенными гладкой линией Γ , лежит в касательной плоскости к поверхности мембраны и направлена по нормали к Γ . Пусть $\rho(x, y)$ — поверхностная плотность мембраны, $T(x, y)$ — натяжение в положении равновесия, $F(x, y, t)$ — внешняя поперечная сила, действующая на единицу площади мембраны. Малыми считаются колебания, при которых нормаль к поверхности мембраны составляет малый угол с осью Ou , т. е. $u_x^2 + u_y^2 \ll 1$. Отсюда следует, что упругая сила натяжения T , изменение которой пропорционально изменению

площади элемента $\Delta S \subset \Omega$ мембраны, не зависит от времени, так как площадь в момент времени t равна

$$\int_{\Delta S} \sqrt{1 + u_x^2 + u_y^2} \, dx \, dy \approx \int_{\Delta S} dx \, dy = \Delta S.$$

Для вывода уравнения колебаний мембраны можно применить вариационный метод. Кинетическая энергия мембраны

$$W = \int_{\Omega} \frac{\rho u_t^2}{2} \, ds.$$

Внутренняя потенциальная энергия элемента $\Delta S \subset \Omega$ равна работе сил натяжения

$$T(\Delta S \sqrt{1 + u_x^2 + u_y^2} - \Delta S) \approx T \frac{u_x^2 + u_y^2}{2} \Delta S,$$

следовательно, потенциальная энергия мембраны

$$U = \int_{\Omega} \left(T \frac{u_x^2 + u_y^2}{2} - Fu \right) \, ds.$$

Функция $u(x, y, t)$, на которой функционал

$$\Phi(u) = \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} \left(\frac{\rho u_t^2}{2} - T \frac{u_x^2 + u_y^2}{2} + Fu \right) \, ds \, dt$$

достигает экстремума, удовлетворяет уравнению Остроградского

$$\rho(x, y) u_{tt} = \operatorname{div}(T(x, y) \nabla u) + F(x, y, t);$$

это и есть уравнение колебаний мембраны.

Если $\rho = \rho_0$, $T = T_0$, то уравнение примет вид

$$u_{tt} = a^2 \Delta u + f, \quad a^2 = \frac{T_0}{\rho_0}, \quad f = \frac{F}{\rho_0}.$$

1.119. Получить граничные условия для мембраны, край которой: 1) перемещается из начального положения вдоль оси Ou по закону $\mu(P, t)$; 2) движется под действием силы, линейная плотность которой $F(P, t)\mathbf{e}_u$; 3) закреплен упруго (коэффициент упругости $k(P, t)$); 4) испытывает сопротивление, пропорциональное скорости (коэффициент пропорциональности $\alpha(P, t)$).

1.120. Вывести уравнение малых поперечных колебаний мембраны на основе второго закона Ньютона (пример 1.3).

Поставить задачи 1.121–1.136 для определения малых колебаний однородной мембраны.

1.121. Мембрана со свободным краем (см. задачу 1.45) занимает ограниченную область Ω с кусочно-гладкой границей $\partial\Omega$ на плоскости xOy . На мембрану действует сила, распределенная по краю с линейной плотностью $F(x, y, t)\mathbf{e}_u$; начальные условия нулевые.

1.122. Мембрана с упруго закрепленным краем (см. задачу 1.54) занимает ограниченную область Ω с кусочно-гладкой границей $\partial\Omega$ на плоскости xOy . Начальные отклонения $u_0(x, y)$ и скорости $u_1(x, y)$ точек мембраны заданы.

1.123. На единицу площади мембраны ($0 < x < l_1$, $0 < y < l_2$), две стороны ($x = 0$, $x = l_1$) которой закреплены, а две другие свободны (см. задачу 1.45), действует сила $F_0 \sin \omega t \mathbf{e}_u$; начальные условия нулевые.

1.124. На прямоугольную мембрану ($-l_1 < x < l_1$, $-l_2 < y < l_2$) с закрепленным краем действует поперечная сила, распределенная с линейной плотностью $F(x, t) \mathbf{e}_u$ вдоль линии $y = 0$; начальные смещения и скорости точек мембраны равны нулю.

1.125. На прямоугольную мембрану ($0 < x < l_1$, $0 < y < l_2$) с закрепленным краем действует поперечная сила $F(t) \mathbf{e}_u$, равномерно распределенная вдоль диагонали $y = \frac{l_2}{l_1}x$; начальные смещения и скорости точек мембраны равны нулю.

1.126. На круглую мембрану ($r = \sqrt{x^2 + y^2} < r_0$) с закрепленным краем действует сила $F_0 \mathbf{e}_u$, равномерно распределенная по диаметру ($y = 0$); начальные условия нулевые.

1.127. На круглую мембрану ($r = \sqrt{x^2 + y^2} < r_0$) с закрепленным краем действует сила $F_0 \mathbf{e}_u$, равномерно распределенная по окружности, радиус которой $r_1 < r_0$; начальные смещения и скорости точек мембраны равны нулю.

1.128. Круглая мембрана ($r = \sqrt{x^2 + y^2} < r_0$) с закрепленным краем получает импульс $I \mathbf{e}_u$ в результате удара молоточком, основание которого — круг ($r = \sqrt{x^2 + y^2} < r_1 < r_0$); смещения и скорости точек мембраны до удара равны нулю.

1.129. Круглая мембрана, радиус которой r_0 , закреплена по краю. В момент времени $t = 0$ мембрана получает импульс $I\mathbf{e}_u$ в результате удара в точку $(r_1 < r_0, \varphi_1)$; смещения и скорости точек мембраны до удара равны нулю.

1.130. Гибкая упругая пленка натянута на жесткое однородное кольцо (рис. 1.11, а); масса кольца m , его радиус r_0 , натяжение пленки T_0 , ее плотность ρ_0 . Пленка расположена в плоскости xOy , кольцо не закреплено и может свободно перемещаться только в направлении оси Ou , сил тяжести нет. В момент $t = 0$ кольцо получает импульс $I\mathbf{e}_u$, равномерно распределенный по длине кольца.




Рис. 1.11

1.131. Внешний край $r = r_2$ кольцевой мембраны $r_1 < r < r_2$ закреплён, а внутренний натянут на жесткое однородное кольцо, которое может свободно перемещаться только в направлении оси Ou (рис. 1.11, б); масса кольца m , его радиус r_1 , натяжение пленки T_0 , ее плотность ρ_0 . Мембрана расположена в плоскости xOy и находится в состоянии статического равновесия, сил тяжести нет. Кольцо смещают на расстояние h и после установления равновесия отпускают без начальной скорости.

1.132. На круглую мембрану с закрепленным краем наклеен однородный жесткий диск, центр которого совпадает с центром мембраны (рис. 1.11, в); радиус мембраны r_2 , ее плотность ρ_0 , натяжение T_0 , масса диска m , его радиус $r_1 < r_0$. Мембрана расположена в плоскости xOy и находится в состоянии статического равновесия, сил тяжести нет. В момент времени $t = 0$ диск получает импульс $I\mathbf{e}_u$, равномерно распределенный по поверхности.

1.133. На мембрану с диском (задача 1.132) с момента времени $t = 0$ действует сила $F(t)\mathbf{e}_u$, приложенная к диску в его центре.

1.134. Мембрана с диском (задача 1.132) находится в равновесии под действием силы $F_0 \mathbf{e}_u$, приложенной к диску в его центре. В момент $t = 0$ действие силы прекращается.

1.135. Мембрана с диском (задача 1.132) находится в поле тяжести ($\mathbf{e}_u = \mathbf{e}_g$) и расположена в плоскости xOy на горизонтальной подставке. В момент времени $t = 0$ подставку убирают.

1.136. Мембрана с диском (задача 1.132) находится в равновесии под действием сил тяжести ($\mathbf{e}_u = -\mathbf{e}_g$) и силы $F_0 \mathbf{e}_u$, приложенной к диску в его центре. В момент $t = 0$ действие силы прекращается.

1.137. Вывести уравнение малых колебаний мембраны, на которую действуют: 1) упругие силы, пропорциональные отклонению точек мембраны от положения равновесия (коэффициент упругости $k(x, y)$); 2) силы сопротивления, пропорциональные скорости точек мембраны (коэффициент пропорциональности $\alpha(x, y)$).

Поставить задачи 1.138–1.144 для описания равновесной формы мембраны.

1.138. Прямоугольная мембрана ($|x| < l_1$, $|y| < l_2$), две стороны которой ($x = \pm l_1$) закреплены упруго (коэффициент упругости k), а две другие — жестко, находится в состоянии статического равновесия под действием поперечной силы, приложенной вдоль линии $x = 0$ с линейной плотностью $p(y) \mathbf{e}_u$.

1.139. Прямоугольная мембрана ($0 < x < l_1$, $0 < y < l_2$) с закрепленным краем находится в поле тяжести; плоскость мембраны перпендикулярна ускорению свободного падения ($\mathbf{e}_u = \mathbf{e}_g$), масса единицы площади мембраны

$$\rho = \begin{cases} \rho_1, & 0 < x < x_0, \\ \rho_2, & x_0 < x < l_1. \end{cases}$$

1.140. На круглую мембрану ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$) с закрепленным краем действует поперечная сила, распределенная вдоль окружности ($r = r_1 < r_0$) с линейной плотностью $p(\varphi) = p_0 \sin \varphi \mathbf{e}_u$.

1.141. Мембрана в форме полукруга ($r < r_0$, $0 \leq \varphi \leq \pi$) закреплена по краю; вдоль линии $\{r, \varphi: r < r_0, \varphi = \pi/2\}$ действует сила, линейная плотность которой $p(y) \mathbf{e}_u$.

1.142. Мембрана имеет форму полукруга ($r < r_0$, $0 \leq \varphi \leq \pi$). Часть ее границы $\{r, \varphi: r = r_0, 0 < \varphi < \pi\}$ закреплена, а остальная

часть свободна. На свободную часть действует равномерно распределенная сила $F_0 \mathbf{e}_u$.

1.143. Треугольная мембрана ($0 < x < l$, $0 < y < l - x$) с закрепленным краем находится в состоянии статического равновесия под действием силы, поверхностная плотность которой постоянна и равна $p \mathbf{e}_u$.

1.144. Две стороны ($x = 0$ и $y = 0$) треугольной мембраны (см. задачу 1.143) закреплены, а на третью (свободную) сторону (см. задачу 1.45) действует сила, линейная плотность которой $p \mathbf{e}_u$.

1.145. Гибкая упругая пленка натянута на кольцо, радиус которого r_0 . Кольцо изгибают так, что каждая точка получает отклонение $f(\varphi)$ в направлении $\mathbf{e}_u$. Поставить задачу для определения равновесной формы пленки.

1.146. Решить предыдущую задачу для кольца в поле тяжести; $\mathbf{e}_u = -\mathbf{e}_g$, деформированное кольцо неподвижно.

Пример 1.8. Вывод уравнения малых поперечных колебаний тонкого упругого стержня с прямоугольным поперечным сечением, площадь которого зависит от x (рис. 1.12).




Рис. 1.12

При малых углах α (рис. 1.12) точки стержня перемещаются в плоскостях, параллельных плоскости xOz (ось Ox направлена по оси недеформированного стержня), поперечные сечения поворачиваются без изменения формы, длина элемента Δx оси остается

постоянной. Пусть уравнение $u = u(x, t)$ задает форму оси в момент времени $t \geq 0$, тогда угол между сечениями x и $x + \Delta x$

$$\Delta\varphi = \alpha(x, t) - \alpha(x + \Delta x, t) \approx \operatorname{tg} \alpha|_x - \operatorname{tg} \alpha|_{x+\Delta x} = -u_{xx} \Delta x.$$

Удлинение элемента Δx нити (стержня), отстоящей на расстоянии ζ от оси, равно $\zeta \Delta\varphi$ и обусловлено упругой силой (закон Гука)

$$\frac{E \Delta S \zeta \Delta\varphi}{\Delta x}, \quad (1.21)$$

работа которой

$$E \frac{\Delta S}{\Delta x} \frac{(\zeta \Delta\varphi)^2}{2} = \frac{E \Delta S \zeta^2 u_{xx}^2}{2} \Delta x.$$

Потенциальная энергия деформации элемента Δx стержня

$$\frac{E u_{xx}^2}{2} \int_S \zeta^2 ds \Delta x = \frac{E J}{2} u_{xx}^2 \Delta x,$$

где J — момент поперечного сечения относительно оси Oy . Приведенный вывод верен при $|\alpha| \ll 1$, $|\zeta \Delta\varphi| \ll \Delta x$, т. е. $|u_x| \ll 1$, $l_2 |u_{xx}| \ll 1$. Если $F(x, t)$ — объемная плотность внешних сил, направленных по оси Oz , то действие

$$\Phi(u) = \int_{t_1}^{t_2} \int_0^l \left(\frac{\rho S u_t^2}{2} - \frac{E J u_{xx}^2}{2} + F S u \right) dx dt. \quad (1.22)$$

Необходимым условием экстремума функционала $\Phi(u)$ является уравнение Остроградского [92],

$$S(x) \rho(x) u_{tt} + \frac{\partial^2}{\partial x^2} E(x) J(x) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = S(x) F(x, t), \quad (1.23)$$

которому должна удовлетворять функция $u(x, t)$. Так как длина стержня $l \gg l_2$ (тонкий стержень), то функция $u(x, t)$ определяет форму стержня в процессе колебаний. Уравнение поперечных колебаний однородного цилиндрического стержня с прямоугольным поперечным сечением запишется в виде

$$u_{tt} + a^2 u_{xxxx} = f, \quad a^2 = \frac{E J}{\rho S}, \quad f = \frac{F}{\rho}.$$

Построить модели поперечных колебаний цилиндрических стержней ($0 < x < l$) и ($-l < x < l$) в задачах 1.147–1.156 и 1.157, 1.158 соответственно.

1.147. На стержень с жестко закрепленным торцом $x = 0$ действуют: 1) сосредоточенная сила $F(t) \mathbf{e}_z$, приложенная

к свободному торцу $x = l$; 2) сосредоточенный момент сил $M(t)\mathbf{e}_y$, приложенный к шарнирно закрепленному торцу $x = l$. В начальный момент времени стержень находился в состоянии покоя и равновесия.

1.148. Торцы стержня жестко закреплены, начальные условия заданы.

1.149. Торец $x = 0$ стержня закреплен жестко, а торец $x = l$: 1) свободен; 2) закреплен шарнирно (нет сопротивления изгибу). Начальные условия заданы.

1.150. На стержень, торцы которого жестко закреплены, действует сосредоточенная поперечная сила $F_0(t)\eta(t)$, приложенная в сечении $x = x_0 \in (0; l)$ и направленная по оси Oz ; начальные условия нулевые.

1.151. На стержень с шарнирно закрепленными торцами действует сосредоточенный момент сил $M_0(t)\eta(t)\mathbf{e}_y$, приложенный в сечении $x = x_0 \in (0; l)$; начальные условия нулевые.

1.152. Стержень с жестко закрепленным торцом $x = l$ находится в статическом равновесии под действием постоянной силы $F_0\mathbf{e}_z$, приложенной к свободному торцу $x = 0$. С момента времени $t = 0$ действие силы прекращается.

1.153. Стержень с жестко закрепленным торцом $x = l$ находится в состоянии статического равновесия под действием постоянного момента сил $M_0\mathbf{e}_y$, приложенного к свободному торцу $x = 0$. С момента $t = 0$ действие сил прекращается.

1.154. Стержень, торцы которого шарнирно закреплены, находится в состоянии статического равновесия под действием постоянного момента сил $M_0\mathbf{e}_y$, приложенного к торцу $x = 0$. С момента времени $t = 0$ действие сил прекращается.

1.155. В сечении $x = x_0 \in (0; l)$ стержня с жестко закрепленными торцами имеется тонкая пластинка, масса которой m ; начальные условия заданы.

1.156. Стержень, торец $x = 0$ которого жестко закреплен, а торец $x = l$ свободен, находится в поле тяжести и поддерживается в горизонтальном положении плоской подставкой. В момент $t = 0$ подставку убирают.

1.157. Стержень находится в статическом равновесии под действием постоянной силы $F_0\mathbf{e}_z$, приложенной в сечении $x = 0$.

Торцы стержня закреплены: 1) жестко; 2) шарнирно. С момента времени $t = 0$ действие силы прекращается.

1.158. Стержень находится в статическом равновесии под действием постоянного момента сил $M_0 \mathbf{e}_y$, приложенного к сечению $x = 0$. Торцы стержня закреплены: 1) жестко; 2) шарнирно. С момента времени $t = 0$ действие сил прекращается.

В задачах 1.159–1.166 построить модели поперечных колебаний стержня ($0 < x < l$) с прямоугольным поперечным сечением (рис. 1.12).

1.159. Стержень (рис. 1.13), торец $x = 0$ которого закреплен, а на свободный торец $x = l$ действует сила $F_0 \mathbf{e}_z$, находится в равновесии. С момента $t = 0$ действие силы прекращается.




Рис. 1.13

1.160. Торец $x = 0$ стержня клиновидной формы (рис. 1.13) жестко закреплен, а другой торец свободен. Стержень находится в состоянии статического равновесии под действием внешнего поля сил, объемная плотность которых постоянна и равна $p_0 \mathbf{e}_z$. В момент времени $t = 0$ действие сил прекращается.

1.161. Неподвижный недеформированный стержень (рис. 1.13), торцы которого закреплены шарнирно, получает импульс $I \mathbf{e}_z$ в результате поперечного удара в сечение $x_0 \in (0; l)$.

1.162. Стержень клиновидной формы (рис. 1.3), торцы которого шарнирно закреплены, находится в состоянии статического равновесия под действием постоянного момента сил $M_0 \mathbf{e}_y$, приложенного к торцу $x = 0$; С момента $t = 0$ действие сил прекращается.

1.163. Призматический стержень (рис. 1.3), торец $x = 0$ которого закреплен, а на свободный торец $x = l$ действует момент сил $M_0 \mathbf{e}_y$, находится в равновесии. С момента $t = 0$ действие сил прекращается.

1.164. Торец $x = 0$ призматического стержня (рис. 1.3) закреплен, а на свободном торце имеется тонкая пластинка, масса которой M . В момент времени $t = 0$ стержень получает импульс $I \mathbf{e}_z$ в результате поперечного удара в пластинку.

1.165. Стержень имеет форму усеченной пирамиды (рис. 1.14); торец $x = 0$ закреплен, а торец $x = l$ свободен, начальные условия заданы.

1.166. Стержень, имеющий форму усеченной пирамиды (рис. 1.14), находится в равновесии при следующих условиях: торец $x = 0$ закреплен, а на свободный торец $x = l$ действует: 1) сила $F_0 \mathbf{e}_z$; 2) момент сил $M_0 \mathbf{e}_y$. В момент $t = 0$ действие сил прекращается.




Рис. 1.14

1.167. Однородный упругий стержень ($0 < x < l$) с прямоугольным поперечным сечением изогнут в плоскости xOz (рис. 1.12, а). Получить уравнение равновесия стержня в форме

$$J(x)E(x)u_{xx} = -M(x),$$

где $M(x)$ — момент сил, действующих на часть $[0, x]$ стержня (положительным считается момент, направленный по $\mathbf{e}_y$).

1.168. Малые колебания тонкой упругой пластинки, занимающей в положении равновесия область Ω на плоскости xOy , описываются уравнением (см. [48])

$$u_{tt} + a^2 \Delta^2 u = \frac{F}{\rho h},$$

где $a^2 = D/\rho h$, $D = Eh^3/12(1 - \sigma^2)$, ρ — плотность, σ — коэффициент Пуассона, E — модуль Юнга материала пластинки, h — ее толщина, F — поперечная сила, действующая на единицу площади пластинки. Если край $\partial\Omega$ пластинки жестко закреплен, то

$$u|_{\partial\Omega} = \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\partial\Omega} = 0.$$

Поставить задачу для определения поперечных колебаний пластинки с жестко закрепленным краем, если в результате удара в точку $(x_0, y_0) \in \Omega$ пластинка получает импульс $I \mathbf{e}_u$. До удара смещения и скорости точек пластинки равны нулю.

1.169. Поставить задачу для определения равновесной формы прямоугольной пластинки ($|x| < l_1$, $|y| < l_2$) с закрепленным краем, на единицу площади которой действует сила $F(x, y) \mathbf{e}_u$.

1.170. Условия на границе круглой, свободно опертой пластинки (аналог шарнирного закрепления) имеют вид (см. [48])

$$u|_{r=r_0} = 0, \quad \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{\sigma}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right) \Big|_{r=r_0} = 0.$$

Поставить задачу для определения колебаний пластинки, свободно опертой по краю, под действием поперечной силы $F_0(t)$, приложенной в центре пластинки, при нулевых начальных условиях.

1.171. На единицу площади свободно опертой прямоугольной пластинки ($|x| < l_1$, $|y| < l_2$) действует сила $F(x, y) \mathbf{e}_u$. Поставить задачу для определения равновесной формы пластинки.

Пример 1.9. Вывод дифференциальных уравнений Буссинеска и Кортевега–де-Фриза (КдФ). В одномерных колебательных системах, которые моделируются линейными дифференциальными уравнениями

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, \quad u_{tt} + a^2 u_{xxxx} = 0,$$

могут распространяться волны вида

$$u_1(x, t) = A_1 e^{i(kx - \omega t)}, \quad u_2(x, t) = A_2 e^{i(kx + \omega t)}.$$

Действительно, подстановка $u_1(x, t)$ в первое уравнение превращает его в тождество, если $\omega = ka$. Отсюда следует, что скорость волны $\frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k}$, равная в данном случае a , не зависит от ее длины $\lambda = 2\pi/k$. Поэтому волновой пакет, составленный из волн разной длины, перемещается без изменения формы. Аналогичный анализ второго уравнения показывает, что $u_2(x, t)$ — его решение при $\omega = k^2 a$, а скорость распространения волны $\omega/k = ka$ зависит от ее длины. Это явление называется дисперсией. При движении волнового пакета в среде с дисперсией происходит его расплывание. В обоих случаях скорость волны не зависит от ее амплитуды.

Волновой оператор $\partial^2/\partial t^2 - a^2 \partial^2/\partial x^2$ раскладывается на множители $(\partial/\partial t + a \partial/\partial x)(\partial/\partial t - a \partial/\partial x)$. Каждый из них определяет линейное дифференциальное уравнение первого порядка; решениями уравнений при условии $\omega = ka$ являются

соответственно функции $u_1(x, t)$ и $u_2(x, t)$. В частности, уравнение $u_t + a u_x = 0$ описывает волны без дисперсии, распространяющиеся только в одном направлении с постоянной скоростью a . В реальных средах скорость a зависит от u . Нелинейное уравнение $u_t + u u_x = 0$, моделирующее такую зависимость, описывает волны, скорость которых растет с амплитудой. При движении волнового пакета, сформированного из волн с различными амплитудами, возрастает крутизна его передней части (рис. 8.7, т. 2). В результате решение становится неоднозначным и теряет физический смысл. Подобная деформация волнового пакета ослабляется дисперсией. Эти факторы — рост крутизны и ее уменьшение из-за расплывания — проявляются в том, что в нелинейных диспергирующих средах могут распространяться уединенные волны постоянной формы (солитоны).

Моделью подобной среды может служить одномерная решетка с жестко закрепленными концами $x_0 = 0$, $x_N = Nl$, в узлах $x_j = jl$, $j = 1, 2, \dots, N - 1$ которой расположены точечные частицы, связанные одна с другой и с неподвижными концами решетки одинаковыми пружинками. Отклонение $q_j(t)$ от положения равновесия j -й частицы удовлетворяет уравнению

$$q_j'' = f(q_{j+1} - q_j) - f(q_j - q_{j-1}),$$

где $f(q)$ — сила пружинки. При $l \ll L = Nl$, где величина L фиксирована, можно перейти к непрерывным смещениям $q(x, t)$, полагая $q_j(t) = q(jl, t)$, тогда

$$q_{tt}(x, t) = f(q(x + l, t) - q(x, t)) - f(q(x, t) - q(x - l, t)). \quad (1.24)$$

Если f и q — достаточно гладкие функции, то к правой части уравнения (1.24) применима формула Тейлора и оно преобразуется к виду

$$q_{tt} = f'(0)q_{xx}l^2 + f''(0)q_xq_{xx}l^3 + \left(f'''(0)q_x^2q_{xx} + \frac{1}{12}f'(0)q_{xxxx}\right)l^4 + o(l^4), \quad l \rightarrow 0.$$

Колебания решетки, в которой каждая пружинка действует на частицу с силой $f(q) = \alpha q + \beta q^2$, описываются с точностью до членов с l^4 уравнением

$$q_{tt} = l^2 \left(\alpha q_{xx} + 2\beta l q_x q_{xx} + \frac{\alpha l^2}{12} q_{xxxx} \right).$$

Для функции $p = q/l^s$ оно принимает вид

$$p_{tt} = l^2 \left(\alpha p_{xx} + 2\beta l^{s+1} p_x p_{xx} + \frac{\alpha l^2}{12} p_{xxx} \right),$$

из которого следует, что нелинейный и дисперсионный члены имеют одинаковый порядок по l при $s = 1$. В этом случае для функции $u = p_x$ получается уравнение Буссинеска

$$u_{tt} = l^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(\alpha u + \beta l^2 u^2 + \frac{\alpha l^2}{12} u_{xx} \right). \quad (1.25)$$

Оно сводится к волновому уравнению, если пренебречь членами с l^4 . Следовательно, уравнение Буссинеска описывает волны в нелинейной диспергирующей среде, распространяющиеся как в положительном, так и в отрицательном направлении оси Ox .

Уравнение для волн, распространяющихся только в одном направлении, является следствием уравнения (1.25). Вывод основан на применении теории возмущений, согласно которой решение отыскивается в форме ряда по малому параметру ε :

$$u = u_0 + \varepsilon u_1 + \varepsilon^2 u_2 + \dots$$

Если $u(\infty, t) \neq 0$, то $u_0 \neq 0$ (иначе $u \equiv 0$ при $\varepsilon = 0$); локализованная волна ($u(\infty, t) = 0$) трактуется как возмущение, так что

$$u = \varepsilon u_1 + \varepsilon^2 u_2 + \dots \quad (1.26)$$

Для сравнения различных величин необходимо определить их порядок относительно ε . Это осуществляется с помощью масштабных преобразований. Для построения соответствующих формул используется дисперсионное соотношение $\omega = \omega(k)$ линейизованного уравнения (1.25)

$$u_{tt} = l^2 \alpha \left(u_{xx} + \frac{l^2}{12} u_{xxx} \right).$$

Оно имеет решение вида $u = \exp(i(kx - \omega t))$ при условии

$$\omega^2 = \alpha l^2 k^2 \left(1 - \frac{l^2 k^2}{12} \right).$$

Для малых k дисперсионное соотношение запишется в форме

$$\omega = \sqrt{\alpha} l k \left(1 - \frac{l^2 k^2}{24} \right).$$

Пусть $k = \varepsilon^\mu \kappa$, где μ — неизвестная величина, а κ — новое волновое число, удовлетворяющее условию $\kappa = O(1)$ при $\varepsilon \rightarrow 0$. Тогда фаза

$$i(kx - \omega t) = i\kappa\varepsilon^\mu(x - \sqrt{\alpha}lt) + i\frac{\sqrt{\alpha}l^3\kappa^3}{24}\varepsilon^{3\mu}t.$$

Масштабные преобразования определяются формулами

$$\xi = \varepsilon^\mu(x - at), \quad \tau = \varepsilon^{3\mu}t,$$

где $a = \sqrt{\alpha}l$. Переход к переменным ξ , τ и подстановка функции u в виде (1.26) в уравнение (1.25) приводит к следующему результату (индекс 1 у функции u опущен):

$$-2a\varepsilon^{4\mu+1}u_{\xi\tau} + \varepsilon^{6\mu+1}u_{\tau\tau}2\beta l^4\varepsilon^{2\mu+2}(uu_\xi)_\xi + \frac{\alpha l^4}{12}\varepsilon^{4\mu+1}u_{\xi\xi\xi\xi} + \dots = 0.$$

Нелинейный и дисперсионный члены имеют одинаковый порядок по ε при $\mu = 1/2$. После интегрирования по ξ получается уравнение КдФ

$$u_\tau + \frac{\beta l^3}{\sqrt{\alpha}}uu_\xi + \frac{\sqrt{\alpha}l^3}{24}u_{\xi\xi\xi} = 0. \quad (1.27)$$

1.172. Показать, что уравнение Буссинеска (1.25) преобразуется к виду

$$u_{tt} = \frac{\partial^2}{\partial x^2}(u + u^2 + u_{xx}). \quad (1.28)$$

1.173. Уравнение КдФ записывают в следующем (каноническом) виде:

$$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0. \quad (1.29)$$

Привести уравнение (1.27) к виду (1.29).

1.174. Для изменения длины пружинки в одномерной решетке (см. пример (1.9.)) на величину q необходимо приложить силу $f(q) = \alpha q + \beta q^3$. Показать, что волны, распространяющиеся вдоль решетки (в положительном направлении оси Ox), описываются модифицированным уравнением КдФ (мКдФ)

$$u_\tau + \frac{3\beta l^3}{\sqrt{\alpha}}u^2u_\xi + \frac{\sqrt{\alpha}l^3}{24}u_{\xi\xi\xi} = 0$$

и привести его к каноническому виду

$$u_t + 6u^2u_x + u_{xxx} = 0. \quad (1.30)$$

1.175. Решетка состоит из одинаковых частиц (масса каждой m), расположенных в точках $x_j = jl$, $j \in Z$, оси Ox . Каждая частица

взаимодействует только с двумя соседними, потенциал взаимодействия $U = U(q_j - q_{j-1})$, где q_j — отклонение j -й частицы от положения равновесия. Цепочкой Тоды называется решетка с потенциалом

$$U(q) = \frac{a}{b} e^{-bq} + aq, \quad ab > 0.$$

Показать, что: 1) $U(q)$ — потенциал поля сил притяжения; 2) в переменных

$$\tau = \sqrt{\frac{ab}{m}} t, \quad 1 + u_j = e^{-br_j}, \quad r_j = q_j - q_{j-1}$$

движение цепочки описывается уравнениями

$$\frac{d^2}{d\tau^2} \ln(1 + u_j) = u_{j-1} - 2u_j + u_{j+1}, \quad j \in \mathbb{Z}.$$

1.176. Точки подвеса $x_n = nl$, $n \in \mathbb{Z}$, одинаковых маятников расположены на горизонтальной оси Ox и соединены одна с другой идентичными спиральными пружинками, постоянная кручения которых k (для поворота пружинки на угол θ необходим момент сил $k\theta$). Каждый маятник представляет собой жесткий невесомый стержень, длина которого d , с точечной массой m на свободном конце; маятники колеблются в плоскостях, перпендикулярных оси Ox . Показать, что в случае непрерывной модели угол $\theta(t, x)$ удовлетворяет уравнению $\sin$ -Гордона (СГ),

$$\theta_{tt} = \frac{K}{md^2} \theta_{xx} - \frac{g}{d} \sin \theta,$$

где $K = kl^2$, и привести его к каноническому виду

$$u_{xt} = \sin u. \quad (1.31)$$

Пример 1.10. Частица, масса которой m , находится в одномерной потенциальной яме

$$U(x) = \begin{cases} 0, & |x| < l, \\ \infty, & |x| > l. \end{cases} \quad (1.32)$$

Поставить задачу для определения волновой функции частицы, если волновая функция начального состояния задана.

В квантовой механике движение частицы описывается комплекснозначной функцией $\Psi(x, t)$, которая называется волновой функцией (см. [46]); $|\Psi(x, t)|^2 dx$ есть вероятность обнаружить

частицу на интервале $(x, x + dx)$ в момент времени t . Функция $\Psi(x, t)$ удовлетворяет уравнению Шредингера,

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \mathcal{H}\Psi,$$

где $\mathcal{H} = p^2/(2m) + U(x)$ — оператор энергии (гамильтониан), $p = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ — оператор импульса, m — масса частицы. Так как в области, где $U(x) = \infty$, частица не может находиться, то волновая функция равна нулю при $x = \pm l$ для любого t . Итак,

$$\begin{aligned}\Psi_t &= \frac{i\hbar}{2m} \Psi_{xx}, \quad |x| < l, \quad 0 < t, \\ \Psi(-l, t) &= \Psi(l, t) = 0, \\ \Psi(x, 0) &= \Psi_0(x), \quad \|\Psi\|^2 = \int_{-l}^l |\Psi|^2 dx = 1.\end{aligned}$$

Поставить задачи для описания движения частицы, волновая функция начального состояния которой известна, в случаях 1.177–1.181.

1.177. Частица, масса которой m , совершает линейные гармонические колебания с частотой ω в поле упругих сил (линейный гармонический осциллятор).

1.178. Частица, масса которой m , находится в поле с потенциальной энергией

$$U(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0, \\ 0, & 0 < x < l, \\ U_0, & l < x. \end{cases}$$

1.179. Твердое тело с моментом инерции I вращается около неподвижной оси (плоский ротор).

1.180. Твердое тело с моментом инерции I вращается около неподвижной точки (пространственный ротор).

1.181. Частица, масса которой m , находится в сферической потенциальной яме

$$U(r) = \begin{cases} 0, & r < r_0, \\ \infty, & r_0 < r. \end{cases}$$

1.182. Частица, масса которой m , находится в двумерной, аксиально симметричной потенциальной яме

$$U(r) = \begin{cases} 0, & r \in (r_1, r_2), \\ \infty, & r \notin [r_1, r_2]. \end{cases}$$

Поставить задачу для определения волновых функций и уровней энергии стационарных состояний частицы.

1.183. Решить предыдущую задачу для сферически симметричной трехмерной потенциальной ямы $U(r) = -U_0 e^{-\frac{r}{a}}$.

1.2. Модели теплопроводности и диффузии

Пример 1.11. Поставить задачу для определения температуры $u(\mathbf{r}, t)$ изотропного тела, занимающего в R^3 область Ω с кусочно-гладкой границей S , если внутри действуют тепловые источники, мощность которых в единице объема $F(\mathbf{r}, t)$, а на границе происходит теплообмен с внешней средой по закону Ньютона. Заданы: температура $\mu(\mathbf{r}, t)$ внешней среды, коэффициент теплообмена на единицу площади поверхности, равный $\alpha(\mathbf{r})$, начальная температура тела $u_0(\mathbf{r})$, его физические характеристики — плотность массы $\rho(\mathbf{r})$, коэффициент теплопроводности $k(\mathbf{r})$, удельная теплоемкость (т. е. теплоемкость единицы массы) $C(\mathbf{r})$.

Пусть $w(\mathbf{r}, t) \in C^1$ — объемная плотность, $\mathbf{q}(\mathbf{r}, t) \in C^1$ — плотность потока, $Q(\mathbf{r}, t) \in C$ — плотность источников некоторой физической величины $W(x, t)$. Уравнение баланса — изменение величины $W(x, t)$ в объеме Ω с гладкой границей S за время Δt , обусловленное потоком и действием источников, — запишется в виде

$$\int_{\Omega} (w|_{t+\Delta t} - w|_t) d\mathbf{r} = -\Delta t \int_S (\mathbf{q} \mathbf{n}) ds + \Delta t \int_{\Delta \Omega} Q d\mathbf{r}, \quad (1.33)$$

где $\mathbf{n}$ — внешняя нормаль к S . В результате применения формулы Лагранжа к левой части, формулы Остроградского к интегралу по S и перехода к пределу (после сокращения на Δt) при $\Delta t \rightarrow 0$ соотношение (1.33) принимает форму

$$\int_{\Delta \Omega} (w_t + \operatorname{div} \mathbf{q} - Q) dx = 0.$$

Отсюда в силу произвольности Ω и непрерывности подынтегральной функции вытекает уравнение

$$w_t + \operatorname{div} \mathbf{q} = Q, \quad (1.34)$$

выражающее закон сохранения величины W .

Процесс распространения тепла регулируется законом сохранения тепловой энергии W , плотность которой $w = \rho C u$,

а плотность теплового потока $\mathbf{q} = -k \nabla u$ (закон Фурье). В этом случае уравнение (1.34) преобразуется к виду

$$\rho(\mathbf{r}) C(\mathbf{r}) u_t = \operatorname{div} (k(\mathbf{r}) \nabla u) + F(\mathbf{r}, t)$$

и называется уравнением теплопроводности.

Теплообмен по закону Ньютона означает, что плотность потока тепла через поверхность S пропорциональна разности температур тела и внешней среды:

$$-k \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_S = \alpha (u - \mu)|_S.$$

Таким образом, функция $u(\mathbf{r}, t)$ является решением задачи

$$\begin{aligned} \rho C u_t &= \operatorname{div} (k \nabla u) + F, \quad (x, y, z) \in \Omega, \quad 0 < t, \\ \left(\frac{\partial u}{\partial n} + h(u - \mu) \right) \Big|_S &= 0, \quad h = \frac{\alpha}{k}, \\ u(x, y, z, 0) &= u_0(x, y, z). \end{aligned}$$

В случае постоянных ρ , k , C уравнение теплопроводности записывается в виде

$$u_t = a^2 \Delta u + f, \quad a^2 = \frac{k}{\rho C}, \quad f = \frac{F}{\rho C}.$$

1.184. Вывести в одномерном приближении уравнение теплопроводности для стержня, площадь поперечного сечения которого $S(x)$, объемная плотность $\rho(x)$, удельная теплоемкость $C(x)$, коэффициент теплопроводности $k(x)$; в стержне действуют источники тепла, плотность мощность которых $F(x, t)$, через его боковую поверхность происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой $\mu(x, t)$, коэффициент теплообмена, отнесенный к единице площади, равен $\alpha(x)$, площадь участка боковой поверхности единичной длины (вдоль оси) $\sigma(x)$.

Поставить задачи 1.185–1.193 для определения температуры однородного стержня ($0 < x < l$) с теплоизолированной боковой поверхностью.

1.185. На концах стержня происходит теплообмен по закону Ньютона с внешней средой, температура которой равна нулю, начальная температура стержня $u_0(x)$.

1.186. Стержень имеет нулевую температуру. С момента $t = 0$ на конце $x = l$ происходит теплообмен по закону Ньютона

со средой, температура которой $\mu(t)$, а конец $x = 0$ поддерживается при нулевой температуре.

1.187. Конец $x = l$ стержня имеет температуру $\mu(t)$, на торце $x = 0$ подается тепловой поток, плотность которого $q(t) \mathbf{e}_x$, начальная температура стержня равна нулю.

1.188. Стержень находится при нулевой температуре. С момента времени $t = 0$ в сечении $x = x_0 \in (0; l)$ действует источник тепла мощности $Q(t)$, концы стержня поддерживаются при нулевой температуре.

1.189. В сечении $x = x_0 \in (0; l)$ стержня, концы которого $x = 0$ и $x = l$ поддерживаются при постоянных температурах μ_1 и μ_2 соответственно, действует источник тепла постоянной мощности Q_0 столь долго, что в стержне устанавливается стационарный тепловой режим. В момент $t = 0$ источник отключается.

1.190. Конец $x = 0$ стержня поддерживается при нулевой температуре, а на другом конце имеется тонкая пластинка, поверхность которой (кроме части, контактирующей со стержнем) теплоизолирована. Начальная температура стержня равна нулю, пластинки — u_0 . Теплоемкость пластинки C_0 , а ее теплопроводность много больше теплопроводности стержня.

1.191. В стержне устанавливается стационарная температура в результате длительного нагревания тепловым потоком, плотность которого $\mathbf{q} = -q_0 \mathbf{e}_x$, поступающим через торец $x = l$, и теплообмена по закону Ньютона на торце $x = 0$ со средой, температура которой μ_0 . В момент $t = 0$ торец $x = l$ покрывают теплоизоляцией.

1.192. В сечении $x = x_0 \in (0; l)$ стержня имеется сосредоточенная теплоемкость C_0 ; торец $x = 0$ поддерживается при постоянной температуре μ , а через торец $x = l$ поступает тепловой поток, плотность которого $\mathbf{q} = -q_0 \mathbf{e}_x$, столь долго, что в стержне устанавливается стационарный тепловой режим. В момент времени $t = 0$ торец $x = l$ теплоизолируют. Поставить задачу теплопроводности.

1.193. Через торцы $x = 0$ и $x = l$ цилиндрического стержня с некоторого момента времени проходит тепловой поток $Q \mathbf{e}_x$, плотность которого постоянна (по времени и по поперечному сечению). После установления стационарного теплового режи-

ма торцы стержня теплоизолируют. Физические характеристики стержня:

1) $k(x) = k_0$, $\rho(x) = \rho_0$, $C(x) = C_0$;

2) $k(x) = \begin{cases} k_1, & x \in \Delta_1, \\ k_2, & x \in \Delta_2, \end{cases} \quad \rho(x) = \begin{cases} \rho_1, & x \in \Delta_1, \\ \rho_2, & x \in \Delta_2, \end{cases} \quad C(x) = \begin{cases} C_1, & x \in \Delta_1, \\ C_2, & x \in \Delta_2. \end{cases}$

$\Delta_1 = (0; x_0)$, $\Delta_2 = (x_0; l)$, площадь поперечного сечения S_0 .

1.194. Решить предыдущую задачу для однородного стержня, имеющего форму: 1) усеченного клина (рис. 1.3); 2) усеченного конуса (рис. 1.2); 3) части параболоида вращения (задача 1.28).

1.195. Решить задачу 1.193, п. 1 для стержня с сосредоточенной теплоемкостью C_0 в сечении $x = x_0 \in [0; l]$.

1.196. Полубесконечный стержень ($0 < x$) из горючего материала находится при нулевой температуре; боковая поверхность стержня теплоизолирована. В момент времени $t = 0$ торец стержня поджигают. Фронт горения имеет температуру μ_0 и распространяется со скоростью v_0 . Поставить задачу теплопроводности.

Поставить в одномерном приближении задачи теплопроводности 1.197–1.207.

1.197. Через боковую поверхность стержня ($0 < x < l$) происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой равна нулю, торцы стержня теплоизолированы, начальная температура $u_0(x)$.

1.198. Через боковую поверхность стержня ($0 < x < l$) и торец $x = l$ происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой $\mu(x, t)$; торец $x = 0$ поддерживается при нулевой температуре, начальная температура равна нулю.

1.199. Стержень ($0 < x < l$) с теплоизолированной боковой поверхностью составлен из двух различных однородных стержней с характеристиками ρ_1, k_1, C_1, S_0 при $0 < x < x_0$ и ρ_2, k_2, C_2, S_0 при $x_0 < x < l$; конец $x = 0$ теплоизолирован, конец $x = l$ имеет заданную температуру $\mu(t)$, начальная температура $u_0(x)$.

1.200. Вдоль однородного стержня ($-\infty < x < \infty$) с теплоизолированной поверхностью движется по закону $x(t) = v_0 t$ точечный источник тепла мощности $Q(t)$, вся тепловая энергия которого поступает в стержень; при $t = 0$ температура стержня равна нулю.

1.201. Однородный усеченный конус (рис. 1.2), боковая поверхность которого теплоизолирована, имеет температуру $u_0(x)$. С момента $t = 0$ через основания $x = 0$ и $x = l$ проходят тепловые потоки, плотности которых $q_1(t) \mathbf{e}_x$ и $q_2(t) \mathbf{e}_x$ соответственно.

1.202. Основание $x = 0$ усеченного конуса (рис. 1.2) с теплоизолированной боковой поверхностью имеет температуру μ_0 , а через основание $x = l$ поступает тепловой поток, плотность которого $\mathbf{q} = -q_0 \mathbf{e}_x$, столь длительное время, что в конусе устанавливается стационарная температура. В момент времени $t = 0$ основание $x = l$ покрывают теплоизоляцией.

1.203. Через торец $x = 0$ клиновидного стержня (см. рис. 1.3) с теплоизолированной боковой поверхностью происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой $\mu_1(t)$; торец $x = l$ имеет температуру $\mu_2(t)$, а начальная температура равна $u_0(x)$.

1.204. Боковая поверхность клиновидного стержня (см. рис. 1.3) теплоизолирована, торцы поддерживаются при нулевой температуре. В результате действия тепловых источников, мощность которых в единице объема Q_0 , в стержне устанавливается стационарное распределение температуры. В момент $t = 0$ действие источников прекращается.

1.205. Боковая поверхность прямого кругового конуса, высота которого l , теплоизолирована, основание поддерживается при температуре μ_0 , начальная температура $u_0(x)$.

1.206. Основание прямого кругового конуса, высота которого равна l , поддерживается при нулевой температуре, а через боковую поверхность происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой μ_0 , столь длительное время, что в конусе устанавливается стационарное распределение температуры. В момент $t = 0$ боковую поверхность конуса покрывают теплоизоляцией. Радиус основания конуса r_0 , коэффициент теплообмена на единицу площади равен α .

1.207. Боковая поверхность тонкого стержня ($0 < x < l$) получена в результате вращения параболы $y^2 = 2p(x + l_0)$, где $p > 0$, $l_0 > 0$, около оси Ox . Через всю поверхность стержня происходит теплообмен по закону Ньютона (коэффициент теплообмена на единицу площади поверхности равен α) со средой, температура которой u_1 , начальная температура стержня $u_0(x)$.

Сформулировать математические модели теплопроводности для однородных тел 1.208–1.217.

1.208. На оси длинного бруса с прямоугольным поперечным сечением ($|x| < l_1$, $|y| < l_2$) находится тонкий проводник постоянного тока, с единицы длины которого выделяется тепловая мощность Q . Ток включают в момент времени $t = 0$ и выключают через время t_0 . Поверхность бруса поддерживается при нулевой температуре, его начальная температура равна нулю.

1.209. Через поверхность длинного цилиндра ($r < r_0$) происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой $\mu(\varphi, t)$; начальная температура цилиндра равна нулю.

1.210. Длинная труба ($r_1 < r < r_2$) имеет температуру u_0 . С момента времени $t = 0$ на ее внешнюю поверхность поступает радиальный тепловой поток, плотность которого $\mathbf{q} = -q(t) \mathbf{e}_r$, а внутренняя поверхность поддерживается при температуре μ_0 .

1.211. Внутренняя поверхность однородной металлической трубы ($r_1 < r < r_2$) теплоизолирована, а на внешней происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой равна нулю. Труба нагревается постоянным током, при прохождении которого в единице объема выделяется тепловая мощность Q . После того как в трубе установилась стационарная температура, источник тока отключается.

1.212. Начальная температура длинной трубы ($r_1 < r < r_2$) равна u_0 , ее внешняя поверхность поддерживается при нулевой температуре, а область $r < r_1$ заполнена материалом, теплопроводность которого много больше теплопроводности трубы; а теплоемкость единицы длины (вдоль оси трубы) равна C_0 .

1.213. Через внутреннюю и внешнюю поверхности сферического слоя ($r_1 < r < r_2$) проходит радиальный тепловой поток $Q(t)$, равномерно распределенный по каждой из поверхностей. Начальная температура слоя равна нулю.

1.214. В точке $(r_1, \theta_1, \varphi_1)$ шара, радиус которого r_0 , в результате взрыва мгновенно выделилось Q единиц тепла; на поверхности шара происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой равна нулю, начальная температура шара равна нулю.

1.215. В результате камуфлетного (без выброса во внешнюю среду) подземного взрыва образуется сферическая полость, радиус

которой r_0 , заполненная газом. При больших температурах скорость теплообмена в газе много больше скорости обмена теплом между газом и окружающей средой. В полости происходит тепловыделение, обусловленное фазовыми превращениями и химическими реакциями, мощность которого в единице объема $Q(t)$. Начальная температура газа u_0 ($u_0 < u_k$, где u_k — температура плавления вещества вне полости), внешней среды — $u_1(r)$, физические характеристики газа ρ_0 , C_0 , внешней среды — ρ , C , k .

1.216. В газе происходит высоковольтный разряд, сопровождающийся мгновенным выделением количества тепла Q , равномерно распределенного по объему цилиндра, высота которого $2l$, радиус r_0 ; начальная температура газа равна нулю.

1.217. Газ, температура которого равна нулю, движется с постоянной скоростью v . В результате высоковольтного разряда в направлении, перпендикулярном скорости, возникает искра в форме тонкого цилиндра, высота которого $2l$, и мгновенно выделяется равномерно по цилиндру количество тепла Q .

1.218. Через сферический слой ($r_1 < r < r_2$) проходит стационарный тепловой поток, обусловленный действием изотропного теплового источника постоянной мощности Q , расположенного в центре ($r = 0$) слоя. В момент времени $t = 0$ источник отключают, а поверхности слоя теплоизолируют. Поставить задачу для определения плотности теплового потока в слое.

Поставить задачи 1.219–1.222 для определения стационарной температуры в однородных телах.

1.219. В параллелепипед ($0 < x < l_1$, $0 < y < l_2$, $0 < z < l_3$) через грань $x = 0$ входит постоянный тепловой поток Q , а через грань $z = 0$ такой же поток выходит; оба потока равномерно распределены по соответствующим граням, остальная поверхность теплоизолирована.

1.220. Длинный цилиндр (радиус r_0) облучается плоскопараллельным тепловым потоком, плотность которого q_0 , направленным перпендикулярно к оси цилиндра; через поверхность цилиндра происходит теплообмен по закону Ньютона с окружающей средой, температура которой равна нулю.

1.221. В неограниченной среде находится шар ($r < r_0$) с теплоизолированной поверхностью, вне шара на расстоянии d от центра расположен точечный источник тепла постоянной мощности Q (внешняя задача для шара).

1.222. В центре однородного шара $B(r_0)$ находится точечный источник тепла, мощность которого Q_0 , плотность теплового потока через поверхность шара $\mathbf{q} = f(\theta, \varphi)\mathbf{e}_r$. При постановке задачи указать условия ее разрешимости.

1.223. Согласно закону Фурье при выделении в точке $M(\mathbf{r})$ некоторого количества тепла в точке $M'(\mathbf{r} + \Delta\mathbf{r})$ сразу возникает тепловой поток, плотность которого $q \approx -k \frac{\Delta u}{\Delta r}$, т. е. тепловая энергия распространяется мгновенно. Для многих твердых тел, в которых теплообмен происходит достаточно быстро, такая модель согласуется с опытом. Но она неприменима к разреженным средам, в которых передача энергии осуществляется посредством соударения частиц и происходит медленнее, чем в твердых телах. Модель теплопроводности в разреженных средах должна учитывать конечность скорости распространения тепла; в этом случае применяют следующий закон теплопередачи:

$$\mathbf{q} = -k\nabla u - t_r \frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t} \quad (1.35)$$

где t_r — время релаксации потока, равное по порядку величины времени свободного пробега частиц.

Применяя соотношение (1.35), получить уравнение для температуры $u(\mathbf{r}, t)$, называемое гиперболическим уравнением теплопроводности в однородной среде (C, ρ, k, t_r — константы). Рассмотреть предельные случаи: 1) $|\frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t}| \ll |\mathbf{q}|$; 2) $|\frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t}| \gg |\mathbf{q}|$ и найти скорость распространения тепла во втором случае.

Пример 1.12. 1. В среде с коэффициентом диффузии $D(\mathbf{r})$, занимающей область $\Omega \in \mathbb{R}^3$, $S = \partial\Omega$, диффундирует вещество, концентрация которого $u(\mathbf{r}, t)$, и действуют источники, выделяющие в единице объема в единицу времени массу $Q(\mathbf{r}, t)$ вещества. Поставить задачу для определения концентрации при $t > 0$, если начальная концентрация равна $u_0(\mathbf{r})$ и выполняется одно из следующих граничных условий:

- 1) концентрация на границе равна $\mu(P, t)$, $P \in S$;
- 2) плотность потока вещества через границу равна $\mathbf{q}(P, t)$, $P \in S$;
- 3) плотность потока вещества через границу пропорциональна разности концентраций по разные стороны S , коэффициент пропорциональности на единицу площади поверхности равен $\alpha(\mathbf{r})$ (полупроницаемая поверхность); концентрация вещества вне Ω в точках S равна $\nu(P, t)$, $P \in S$.

2. Получить уравнение диффузии газа в трубке с полупроницаемой боковой поверхностью.

3. В сечении $x = 0$ трубки ($-l < x < l$) с полупроницаемыми концами (коэффициент пропорциональности одинаков) действует источник, выделяющий в единицу времени равномерно по сечению массу Q_0 газа. Процесс диффузии стационарен. В момент $t = 0$ действие источника прекращается. Поставить задачу для определения концентрации газа в трубке.

Решения. 1. Концентрация $u(\mathbf{r}, t)$ — это масса диффундирующего вещества в единице объема среды. Уравнение для функции $u(\mathbf{r}, t)$ — следствие закона сохранения массы; оно получается из (1.34) при $w(\mathbf{r}, t) = u(\mathbf{r}, t)$:

$$u_t = \operatorname{div} \mathbf{q} + Q,$$

в котором функции $u(\mathbf{r}, t)$ и $\mathbf{q}(\mathbf{r}, t)$ связаны соотношением

$$\mathbf{q} = -D \nabla u \quad (\text{закон Фика}).$$

Уравнение диффузии приобретает форму

$$u_t = \operatorname{div}(D \nabla u) + Q.$$

Для постановки задачи надо указать дополнительные условия — начальное $u(\mathbf{r}, t) = u_0(\mathbf{r})$ и одно из граничных условий:

$$1) u(P, t) = \mu(P, t), \quad P \in S;$$

$$2) -k \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_S = (\mathbf{q}(P, t), \mathbf{n}_P), \quad P \in S, \quad \mathbf{n}_P — \text{внешняя нормаль};$$

$$3) -k \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_S = \alpha(u(P, t) - \nu(P, t)), \quad P \in S, \quad \mathbf{n}_P — \text{внешняя нормаль}.$$

Два последние условия ставятся на кусочно-гладкой границе. Следует обратить внимание на знак разности в третьем, последнем, условии: если $u(P, t) > \nu(P, t)$, то плотность потока должна быть положительна, т. е. направлена по внешней нормали.

2. Соотношение, выражающее закон сохранения массы газа в элементе объема $S \Delta x$ трубки

$$\begin{aligned} u(x, t + \Delta t) S \Delta x - u(x, t) S \Delta x = \\ = -D u_x(x, t) \Delta t + D u_x(x + \Delta x, t) \Delta t + \alpha P \Delta x (\mu(x, t) - u(x, t)) \Delta t, \end{aligned}$$

где S — площадь, P — периметр поперечного сечения трубки, после деления на произведение $\Delta x \Delta t$ и перехода к пределу

при $\Delta x \rightarrow 0$, $\Delta t \rightarrow 0$ преобразуется в уравнение диффузии

$$u_t = Du_{xx} - \frac{\alpha P}{S}(u - \mu).$$

3. Концентрация $u(x, t)$ газа в трубке является решением задачи

$$\begin{aligned} u_t &= Du_{xx}, \quad -l < x < l, \quad 0 < t, \\ u_x(-l, t) - hu(-l, t) &= 0, \\ u_x(l, t) + hu(l, t) &= 0, \\ u(x, 0) &= u_0(x), \end{aligned}$$

где $h = \alpha/D$, а функция $u_0(x)$ удовлетворяет уравнениям

$$\begin{aligned} u_0''(x) + \frac{Q_0}{DS}\delta(x), \quad -l < x < l, \\ u_0'(-l) - hu_0(-l) &= 0, \\ u_0'(l) + hu_0(l) &= 0. \end{aligned}$$

Для решения этой задачи следует перейти к эквивалентной форме

$$\begin{aligned} u_0''(x) &= 0, \quad -l < x < 0, \quad 0 < x < l, \\ u_0'(-l) - hu_0(-l) &= 0, \quad u_0'(l) + hu_0(l) = 0, \\ u_0(-0) - u_0(+0) &= 0, \quad -DSu_0'(-0) + DSu_0'(+0) = Q_0. \end{aligned}$$

Два последние уравнения (условия «сшивки» решений при $x < 0$ и $x > 0$) выражают непрерывность функции $u_0(x)$ и точке $x = 0$ и закон сохранения массы газа в элементе $(-\Delta x; \Delta x)$ трубки,

$$-DSu_0'(-\Delta x) + DSu_0'(\Delta x) = Q_0,$$

при $\Delta x \rightarrow 0$. Этот же результат следует из формулы обобщенного дифференцирования (10.15).

Решение уравнения $u_0''(x) = 0$ стационарной задачи при $x \neq 0$

$$u_0(x) = \begin{cases} ax + b, & -l < x < 0, \\ cx + l, & 0 < x < l, \end{cases}$$

должно удовлетворять граничным условиям и условиям «сшивки». Для определения коэффициентов a, b, c, d получается линейная

система уравнений

$$\begin{cases} a - h(-al + b) = 0, \\ c + h(cl + d) = 0, \\ b - d = 0, \\ -a + c = \frac{Q_0}{SD}, \end{cases}$$

решение которой

$$a = -c = -\frac{Q_0}{2SD}, \quad b = d = -\frac{Q_0}{2SD} \frac{1+p}{h}, \quad p = hl.$$

Таким образом,

$$u_0(x) = \frac{Q_0}{2SD} \left(|x| - \frac{1+p}{h} \right).$$

З а м е ч а н и е 1. Получить функцию $u_0(x)$ можно проще, если заметить, что функция $u(x, t)$ — четная по x : $u(-x, t) = u(x, t)$ при любом $t \geq 0$.

З а м е ч а н и е 2. В ходе решения задачи методом Фурье возникают интегралы, содержащие функцию $u_0(x)$. Для их вычисления достаточно располагать формой задачи для $u_0(x)$ с $\delta(x)$. Переход к эквивалентной постановке с последующим определением явного вида функции $u_0(x)$ не обязателен (см. пример 2.3).

Поставить задачи 1.224–1.233 для определения концентрации газа в процессе диффузии.

1.224. Начальная концентрация газа в трубке ($0 < x < l$) равна $u_0(x)$, конец $x = l$ закрыт полупроницаемой перегородкой (поток газа через перегородку пропорционален разности концентраций по обе ее стороны), концентрация на конце $x = 0$ равна $\mu(t)$, а вне трубки ее можно считать равной нулю.

1.225. В тонкую трубку ($0 < x < l$) через конец $x = l$ поступает неустойчивый газ (распад газа пропорционален концентрации, коэффициент пропорциональности β), плотность потока которого $q(t)$, а конец $x = 0$ закрыт непроницаемой перегородкой; начальная концентрация газа равна нулю.

1.226. Начальная концентрация неустойчивого газа (см. задачу 1.225), диффундирующего в трубке ($0 < x < l$), равна u_0 ; конец $x = l$ закрыт, а на конце $x = 0$ имеется полупроницаемая перегородка; концентрация газа вне трубки равна нулю.

1.227. Неограниченная трубка $(-\infty < x < \infty)$ с газом движется с постоянной скоростью v в положительном направлении оси Ox ; в момент $t = 0$ концентрация газа равна $u_0(x)$.

1.228. В неограниченном цилиндре, радиус которого r_0 , происходит диффузия молекул газа; число молекул увеличивается (вследствие химической реакции) пропорционально концентрации. Начальная концентрация газа u_0 , его концентрация на поверхности цилиндра равна нулю.

1.229. Через сферический слой $(r_1 < r < r_2)$ проходит поток частиц, обусловленный действием изотропного источника. Источник помещен в центре $(r = 0)$, его мощность равна Q . После того, как в слое установилась стационарная концентрация, его поверхности покрывают непроницаемой для частиц оболочкой и отключают источник.

1.230. Сферический слой $(r_1 < r < r_2)$ окружен газом, концентрация которого μ_0 . В точке $(r_0, \theta_0, \varphi_0)$ слоя действует изотропный источник того же газа, мощность которого $Q(t)$. Начальная концентрация газа в слое равна нулю, внутренняя поверхность непроницаема для газа, а внешняя является полупроницаемой перегородкой.

1.231. Из шара, радиус которого r_0 , во внешнюю среду диффундирует неустойчивый газ (распад газа пропорционален концентрации, коэффициент пропорциональности α задан); плотность потока газа через границу шара $q(\theta, \varphi, t) \mathbf{e}_r$, начальная концентрация газа вне шара равна нулю (внешняя задача для шара).

1.232. В шаре $(r < r_0)$ с полупроницаемой поверхностью действуют источники газа, диффузия которого во внешней среде сопровождается распадом, пропорциональным концентрации (коэффициент пропорциональности α задан). Начальная концентрация газа вне шара равна нулю, концентрация в шаре при $t > 0$ равна $u_0(t)$ (внешняя задача для шара).

1.233. В пространстве действует линейный источник неустойчивого газа, распад которого пропорционален концентрации (коэффициент пропорциональности α задан); мощность источника на единицу длины Q_0 , коэффициент диффузии D .

1.234. Максимальная концентрация c вещества в кристаллическом теле (металле) называется *предельной растворимостью*. Процесс твердотельной диффузии через границу раздела двух тел описывается одной из моделей: 1) отношение concentra-

ций u_1 и u_2 в любой момент времени равно отношению предельных растворимостей c_1 и c_2 ; 2) диффузионный поток через границу пропорционален разности отношений u_1/c_1 и u_2/c_2 (аналог полупроницаемой перегородки). Поставить задачу диффузии для неоднородного слоя ($-l_1 < x < l_2$), состоящего из двух различных однородных слоев ($-l_1 < x < 0$) и ($0 < x < l_2$) с характеристиками D_1 , c_1 и D_2 , c_2 соответственно, если границы $x = -l_1$ и $x = l_2$ непроницаемы для частиц; начальная концентрация равна u_1 при $x \in (-l_1, 0)$, u_2 при $x \in (0, l_2)$, $u_1 \ll c_1$, $u_2 \ll c_2$.

1.235. Пусть $u(x, t) \in C^1$ — объемная плотность, $q \in C^1$ — плотность потока некоторой физической величины, $x \in \mathbb{R}$, t — время, источников нет.

1. Доказать, что если $q = Q(u)$, то $u(x, t)$ удовлетворяет квазилинейному уравнению

$$u_t + c(u) u_x = 0, \quad c(u) = Q'(u). \quad (1.36)$$

2. Существуют процессы, в которых с ростом плотности по x ($u_x > 0$) уменьшается скорость u_t , а следовательно, и плотность потока (движение автомашин по шоссе). Эта ситуация моделируется зависимостью $q = Q(u) - \nu u_x$, $\nu > 0$. Доказать, что если $Q(u)$ — квадратный трехчлен, то $c = Q'$ — решение уравнения Бюргера

$$c_t + c c_x = \nu c_{xx}, \quad \nu > 0. \quad (1.37)$$

1.236. По длинной трубе течет газ, плотность потока которого $q = Q(u)$, где $u(x, t)$ — плотность газа. Из-за пористости стенки трубы в каждую единицу времени через единицу площади часть газа, пропорциональная плотности (коэффициент пропорциональности β), выходит наружу. Пренебрегая трением газа, поставить задачу для определения его плотности при $t > 0$, если начальная плотность $u_0(x)$.

Пример 1.13. Уравнение диффузии тепловых нейтронов в размножающей среде. Среда называется размножающей, если в ней происходит реакция деления, т.е. захват нейтрона ядром с последующим делением составного ядра и испусканием нескольких нейтронов (размножение). Наряду с размножением происходит убыль нейтронов — поглощение ядрами, вылет за пределы среды (утечка). Захват нейтронов с последующим делением и поглощение нейтронов зависят от свойств среды и от энергии нейтронов. Утечка определяется формой и размерами

области Ω , занятой средой. Если область Ω достаточно велика, то утечкой можно пренебречь (утечка пропорциональна площади поверхности, т.е. квадрату длины, а число актов деления пропорционально объему, т.е. кубу длины).

Для бесконечной однородной среды вводится коэффициент размножения k_∞ , равный отношению плотности нейтронов в новом поколении к их плотности в предыдущем поколении. Если $k_\infty = 1$, то в среде идет самоподдерживающаяся цепная реакция, при этом плотность нейтронов не зависит от времени; такое состояние называется *критическим*. Устройство, в котором осуществляется управляемая цепная реакция, называется *ядерным реактором*. Реальный реактор имеет конечный объем, поэтому (из-за утечки) критическое состояние возможно при $k_\infty > 1$.

Примером размножающей среды может служить природный уран, состоящий из двух изотопов: ^{238}U (99,3 %) и ^{235}U (0,7 %). В такой среде невозможно осуществить самоподдерживающуюся цепную реакцию, так как сколь угодно большой объем природного урана не является критическим. Это связано с тем, что быстрые нейтроны (средняя энергия 2 МэВ), возникающие при делении ^{235}U , теряют энергию из-за неупругих столкновений и она становится ниже порога E деления ядра ^{238}U (только 10 % нейтронов вызывают деление этого изотопа). При последующем замедлении нейтрон попадает в область резонансного поглощения ядром ^{238}U . В этой области энергий сечение неупругого рассеяния мало, а потери энергии при упругих столкновениях незначительны (из-за большой массы ядер). Поэтому нейтрон проводит достаточно много времени в указанной области, что повышает вероятность резонансного поглощения. В итоге лишь небольшая часть нейтронов достигает тепловой энергии, где высока вероятность захвата ядром ^{235}U с последующим делением и испусканием вторичных нейтронов. Оказывается, что для природного урана $k_\infty \approx 0,25$.

Чтобы увеличить долю тепловых нейтронов, в уран вводят замедлитель — материал с небольшим массовым числом и низким сечением поглощения нейтронов (тяжелая вода, графит и др.). В результате упругих столкновений с ядрами замедлителя нейтрон сравнительно быстро теряет энергию. Вероятность резонансного поглощения уменьшается, и нейтрон попадает в тепловую область. Посредством введения замедлителя удастся создать критическую систему, называемую *реактором на тепловых нейтронах*. Область, в которой происходит процесс деления,

называется *активной зоной* реактора; она содержит ядерное горючее и замедлитель. Реактор, в котором делящееся вещество и замедлитель представляют собой однородную среду, называется *гомогенным*. В целях защиты от излучения, а также для возвращения части нейтронов в активную зону реактор окружают оболочкой из замедлителя — отражателем.

Нейтрон не имеет заряда и взаимодействует с ядром посредством столкновений. Столкновение происходит при попадании нейтрона в область σ влияния ядра, которая называется *микроскопическим сечением* столкновений и имеет размерность площади. Каждое столкновение сопровождается либо рассеянием (сечение σ_s), либо захватом нейтрона ядром (сечение σ_c), либо захватом с последующим делением ядра (сечение σ_f), так что результирующее сечение $\sigma = \sigma_s + \sigma_c + \sigma_f$. Сумма сечений $\sigma_a = \sigma_c + \sigma_f$ называется *полным сечением* поглощения. Суммарное сечение столкновений в прямом цилиндре с основанием ΔS и высотой Δl для нейтрона, попавшего в цилиндр через основание в направлении, параллельном оси, равно $N\Delta V\sigma$, где N — число ядер в единице объема, $\Delta V = \Delta S\Delta l$. Вероятность столкновения на единице длины пути нейтрона равна

$$\frac{1}{\Delta l} \frac{N\Delta V\sigma}{\Delta S} = N\sigma = \Sigma.$$

Величина Σ называется *макроскопическим сечением* столкновений и имеет размерность обратной длины. Сечение столкновений $\Sigma = \Sigma_s + \Sigma_c + \Sigma_f$, где $\Sigma_s = \sigma_s N$, $\Sigma_c = \sigma_c N$, $\Sigma_f = \sigma_f N$ — макроскопические сечения рассеяния, захвата и захвата с последующим делением ядра соответственно, $\Sigma_a = \Sigma_c + \Sigma_f$ — полное макроскопическое сечение поглощения.

Пусть нейтрон проходит без столкновений путь x с вероятностью $P(x)$, тогда вероятность $P(x + \Delta x)$ пройти без столкновений путь $x + \Delta x$ равна произведению вероятностей $P(x)$ и $1 - \Sigma\Delta x$, т. е. $P(x + \Delta x) = P(x)(1 - \Sigma\Delta x)$, или $\Delta P = -P\Sigma\Delta x$. Таким образом, функция $P(x)$ — решение задачи Коши

$$\begin{aligned} P'(x) + \Sigma P(x) &= 0, \quad 0 < x \\ P(0) &= 1, \end{aligned}$$

откуда

$$P(x) = e^{-\Sigma x}. \quad (1.38)$$

Средняя длина свободного пробега нейтрона

$$\lambda = \int_0^{\infty} x e^{-\Sigma x} \Sigma dx = \frac{1}{\Sigma},$$

среднее время между двумя последовательными соударениями нейтрона, движущегося со скоростью v , равно $\tau = \lambda/v$. Величина $\lambda_s = 1/\Sigma_s$ называется *средней длиной рассеяния*, а величина $\lambda_a = 1/\Sigma_a$ — *средней длиной поглощения*.

При изучении движения нейтронов их распределяют по энергетическим группам, в каждой из которых разброс нейтронов по скоростям невелик. Приход нейтронов в группу и их уход из нее трактуется как действие источников. Вывод уравнения диффузии тепловых нейтронов проводится в предположении, что они образуют одну группу, т. е. обладают одинаковой (по абсолютной величине) скоростью v (односкоростное приближение). Основными характеристиками нейтронного поля являются: функция распределения $n(\mathbf{r}, t, \mathbf{l})$ — концентрация нейтронов с заданным направлением скорости $\mathbf{v} = v\mathbf{l}$ и плотность $n(\mathbf{r}, t)$ — число нейтронов в единице объема. Если известна функция распределения, то

$$n(\mathbf{r}, t) = \int_{\mathbf{l}} n(\mathbf{r}, t, \mathbf{l}) d\mathbf{l}.$$

Вводится также функция $\Phi(\mathbf{r}, t) = vn(\mathbf{r}, t)$, называемая *плотностью потока* нейтронов, и функция $j_n(\mathbf{r}, t) = (\mathbf{j}, \mathbf{n})$ — число нейтронов, пересекающих за единицу времени единичную площадку с нормалью $\mathbf{n}$ в направлении нормали, — называемая *плотностью тока* нейтронов.

В элементарном объеме $d\mathbf{r} = dx dy dz$ с координатой $\mathbf{r}(x, y, z)$ имеется $n(\mathbf{r}, t, \mathbf{l})d\mathbf{r}$ нейтронов, направление скорости которых $\mathbf{l}$. Следовательно, число столкновений в элементе объема $d\mathbf{r}$ за время dt будет равно $n(\mathbf{r}, t, \mathbf{l}) d\mathbf{r} v dt \Sigma$, а полное их число

$$dN = \int_{\mathbf{l}} n(\mathbf{r}, t, \mathbf{l}) d\mathbf{l} d\mathbf{r} v dt \Sigma = vn(\mathbf{r}, t) \Sigma d\mathbf{r} dt,$$

или

$$dN = \Sigma \Phi(\mathbf{r}, t) d\mathbf{r} dt. \quad (1.39)$$

Если плотность потока нейтронов в бесконечной однородной размножающей среде не зависит от координат, то коэффициент

размножения

$$k_{\infty} = \frac{\nu \Sigma_f \varphi}{\Sigma_a}, \quad (1.40)$$

где ν — среднее число быстрых нейтронов, рождающихся при одном акте деления, а φ — вероятность того, что быстрый нейтрон избежит в процессе замедления резонансного поглощения. Действительно, число тепловых нейтронов нового поколения, которые появляются в единице объема в единицу времени, равно $\nu \Sigma_f \varphi \Phi(t)$, где $\Phi(t)$ — плотность потока тепловых нейтронов предыдущего поколения. Отношение этого числа к числу $\Sigma_a \Phi(t)$ поглощенных нейтронов (в единице объема за единицу времени) и есть коэффициент размножения k_{∞} .

При выводе уравнения диффузии на нейтронное поле накладываются следующие ограничения (диффузионное приближение). 1. Скорость нейтрона велика по сравнению со скоростью ядер, так что ядра считаются неподвижными. 2. Концентрация нейтронов мала по сравнению с концентрацией ядер, поэтому столкновения между нейтронами не учитываются. 3. Число столкновений, приводящих к поглощению нейтронов, много меньше числа столкновений, сопровождающихся рассеянием (за одно и то же время): $\Sigma_a \ll \Sigma_s$. 4. Рассеяние нейтронов является упругим (в результате рассеяния абсолютная скорость нейтрона не меняется) и изотропным (любое направление скорости нейтрона после рассеяния равновероятно). 5. Нейтронное поле мало меняется за время $\tau = \lambda/v$ между двумя последовательными соударениями при фиксированном $\mathbf{r}$.

Ниже рассматривается диффузия нейтронов в однородной, изотропной, неограниченной размножающей среде, в которой отсутствуют «внешние» источники, т.е. источники, действие которых не зависит от поля нейтронов. Уравнение диффузии представляет собой запись баланса числа нейтронов и имеет вид (1.34), где $w = n = \frac{\Phi}{v}$, $Q \rightarrow Q(\mathbf{r}, t) - \Sigma_a \Phi$, $Q(\mathbf{r}, t)$ — плотность источников тепловых нейтронов, т.е. $Q(\mathbf{r}, t) d\mathbf{r} dt$ есть число нейтронов, появившихся в элементе объема $d\mathbf{r}$ за время dt в результате замедления до тепловых энергий, $\Sigma_a \Phi$ — число нейтронов, поглощенных в единицу времени в единице объема (отрицательные источники):

$$1/v \cdot \Phi_t + \operatorname{div} \mathbf{j} = Q(\mathbf{r}, t) - \Sigma_a \Phi. \quad (1.41)$$




Рис. 1.15

Чтобы завершить вывод, предстоит установить зависимость между функциями Φ и $\mathbf{j}$ — закон Фурье в теории теплопроводности, закон Нернста в теории диффузии. Для этого нужно подсчитать поток нейтронов, пересекающих площадку ΔS , расположенную в пространстве произвольным образом. Эту площадку без ограничения общности можно поместить в начале координат в координатной плоскости xOy ; тогда орт $\mathbf{e}_z$ будет нормальным вектором к ΔS (рис. 1.15).

В этом случае односторонняя плотность тока j_- формируется теми нейтронами, скорость $\mathbf{v}$ которых составляет тупой угол с осью Oz , т.е. нейтронами, поступающими из точек с неотрицательной координатой z . Каждый нейтрон, пересекающий площадку ΔS , попадает в нее после столкновения с ядром (иначе путь, проходимый нейтроном без столкновений, был бы бесконечно большим). В течение времени от t до $t + \Delta t$ площадки ΔS могут достичь те нейтроны, которые оказались в элементе объема ΔV в промежуток времени от $t - r/v$ до $t + \Delta t - r/v$. Число столкновений за время Δt (см. (1.39)) $\Delta n = \Sigma_s \Phi(\mathbf{r}, t - r/v) \Delta V \Delta t$. В силу изотропности рассеяния в телесный угол $\Delta\Omega = \Delta S \cos \theta / r^2$ попадет $\Delta n \Delta\Omega / (4\pi)$ нейтронов, а площадку ΔS пересекут с учетом соотношения (1.38) число нейтронов, равное $\Delta n \frac{\Delta\Omega}{4\pi} \exp(-\Sigma_s r)$. Таким образом, односторонняя плотность тока

$$\begin{aligned}
 j_- &= \frac{1}{\Delta S \Delta t} \int_{(z>0)} dn \frac{\Delta\Omega}{4\pi} e^{-\Sigma_s r} = \\
 &= \frac{\Sigma_s}{8\pi} \int_0^\infty e^{-\Sigma_s r} dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\theta d\theta \int_0^{2\pi} \Phi\left(\mathbf{r}, t - \frac{r}{v}\right) d\varphi,
 \end{aligned}$$

где по условию 3 диффузионного приближения $\Sigma = \Sigma_s + \Sigma_a \approx \Sigma_s$. Так как экспонента убывает с ростом r и должно выполняться условие 5 диффузионного приближения, то основной вклад в интеграл вносит окрестность точки $r = 0$. Замена функции Φ приближенным выражением

$$\Phi(\mathbf{r}, t - r/v) = \Phi(\mathbf{r}, t) = \Phi(0, t) + (\mathbf{r} \nabla \Phi(0, t)) \quad (1.42)$$

и интегрирование приводят к следующему выражению для односторонней плотности тока нейтронов в отрицательном направлении оси Oz :

$$j_- = \frac{1}{4} \Phi(0, t) + \frac{1}{6\Sigma_s} \Phi_z(0, t). \quad (1.43)$$

Плотность тока в положительном направлении оси Oz подсчитывается аналогично: она определяется выражением

$$j_+ = \frac{1}{4} \Phi(0, t) - \frac{1}{6\Sigma_s} \Phi_z(0, t). \quad (1.44)$$

Плотность тока через единичную площадку с нормалью $\mathbf{e}_z$ в направлении нормали

$$j_z = j_+ - j_- = -\frac{1}{3\Sigma} \Phi_z(0, t). \quad (1.45)$$

В общем случае плотность тока нейтронов через единичную площадку с нормалью $\mathbf{n}$ в направлении нормали

$$j_n = -D \frac{\partial \Phi}{\partial n}, \quad D = \frac{1}{3\Sigma_s}$$

Вектор

$$\mathbf{j} = -D \nabla \Phi \quad (1.46)$$

называется *векторным током* нейтронов, величина D — коэффициентом диффузии. Уравнение (1.41) приобретает окончательный вид

$$\frac{1}{v} \Phi_t = D \Delta \Phi - \Sigma_a \Phi + Q \quad (1.47)$$

и называется *односкоростным* уравнением диффузии нейтронов.

Уравнение стационарной диффузии:

$$\Delta \Phi - \frac{\Phi}{L^2} + \frac{Q}{D} = 0, \quad \frac{1}{L^2} = \frac{\Sigma_a}{D}.$$

З а м е ч а н и я. 1. Условие 5 диффузионного приближения не выполняется в областях, где функция Φ достаточно быстро меняется на длине свободного пробега нейтрона. В таких областях уравнение диффузии не дает правильного описания нейтронного

поля. Нарушение условия 5 происходит в окрестности концентрированного источника нейтронов (например, точечного), вблизи границы раздела двух сред с различными физическими свойствами (одна из них может быть вакуумом), около сильных поглотителей, а также в сильно поглощающих средах, для которых Σ_a порядка или больше Σ_s (см. условие 3 диффузионного приближения). Отсюда, в частности, вытекает требование: размеры среды, в которой происходит диффузия, должны быть велики по сравнению с длиной свободного пробега нейтрона.

2. Плотность нейтронов не зависит от направления скорости каждого из них; это свойство сохранится при наличии источников, если источники изотропны. Протяженный источник будет изотропным, если каждый достаточно малый его элемент представляет собой изотропный точечный источник.

3. Если вместо (1.42) применить разложение до членов второго порядка, то выражения (1.43) и (1.44) для односторонних плотностей тока j_- и j_+ изменятся, но в них появятся одни и те же слагаемые, а это значит, что выражение (1.47) для плотности тока j_z останется тем же. Таким образом, формула (1.45) и, следовательно, уравнение диффузии (1.47), полученные с помощью разложения (1.42) до членов второго порядка, имеют бóльшую точность, чем формулы (1.43) и (1.44).

4. Граничное условие для выпуклой области Ω , граничащей с вакуумом, ставится следующим образом: односторонняя плотность тока через поверхность $S = \partial\Omega$ в направлении внутренней нормали к S равна нулю (вакуум не возвращает нейтроны). В одномерном случае, где Ω — слой ($|x| < x_0$), граничное условие $j_-(x_0, t) = 0$, или

$$\frac{1}{\Phi} \frac{\partial \Phi}{\partial x} \Big|_{x=x_0} = -\frac{3}{2\lambda_s}, \quad (1.48)$$

имеет следующий геометрический смысл: касательная к графику функции $\Phi(x, t)$ в точке с абсциссой $x = x_0$ (при любом фиксированном t) пересекает ось Ox в точке $x = x_0 + \delta$, где $\delta = \frac{2}{3}\lambda_s$. При $\delta \ll 1$ условие (1.48) заменяют более простым $\Phi(\tilde{x}_0, t) = 0$, где $\tilde{x}_0 = x_0 + \delta$ — экстраполированная граница. Из уточненного решения задачи с привлечением кинетического уравнения следует, что плотность нейтронов вне плоской границы определяется уравнением диффузии при условии $\Phi(\tilde{x}_0, t) = 0$, в котором величина $\tilde{x}_0 = x_0 + 0,71\lambda_s$. В задачах для выпуклой области Ω

с кусочно-гладкой границей $S = \partial\Omega$ ставится условие

$$\Phi|_{\tilde{S}} = 0, \quad (1.49)$$

где экстраполированная граница $\tilde{S}$ получается смещением точек S в направлении внешней нормали на величину $\delta = 0,71\lambda_s$.

В цилиндрическом реакторе ($r_0 < r < r_1$) с центральным регулирующим стержнем ($r < r_0$), полностью поглощающим нейтроны, внутренний экстраполированный радиус $\tilde{r}_0 = r_0 - \varepsilon$. Так как $\Phi(\tilde{r}_0) \approx \Phi(r_0) - \varepsilon\Phi'(r_0)$, то на экстраполированной границе

$$\Phi(r_0) - \varepsilon\Phi'(r_0) = 0. \quad (1.50)$$

Об экстраполированной неплоской границе см. [58], гл. 5, § 5.1 д.

Сформулировать модели нестационарной диффузии для определения плотности потока нейтронов в неразмножающей поглощающей среде ($\Sigma_c \ll \Sigma_s$) при условиях 1.237–1.242.

1.237. В пространстве действуют источники тепловых нейтронов, мощность которых в единице объема $F(\mathbf{r}, t)$. Начальная концентрация нейтронов $u_0(\mathbf{r})$.

1.238. Слой ($|x| < l$) граничит с вакуумом, плотность потока нейтронов из вакуума равна нулю; начальная концентрация нейтронов $u_0(x)$.

1.239. Длинный цилиндр, экстраполированный радиус которого $\tilde{r}_0$, помещен в вакуум. На оси цилиндра находится линейный изотропный источник тепловых нейтронов, мощность единицы длины которого q_0 ; начальная концентрация нейтронов равна нулю.

1.240. В однородном полупространстве ($z > 0$), граничащем с вакуумом ($z < 0$), действует изотропный точечный источник тепловых нейтронов, мощность которого Q , координаты $(0, 0, z_0)$. Нейтроны из вакуума не возвращаются, их начальная концентрация равна нулю.

1.241. Начальная концентрация нейтронов в шаре, радиус которого r_0 , равна $u_0(\mathbf{r})$. В процессе диффузии происходит поглощение нейтронов. Шар находится в вакууме; нейтроны из вакуума не возвращаются.

1.242. Бесконечный цилиндр, радиус которого r_0 , коэффициент диффузии D_1 , сечение поглощения Σ_{c1} , находится в среде,

коэффициент диффузии которой D_2 , сечение поглощения Σ_{c2} . Начальная концентрация нейтронов вне цилиндра равна нулю, концентрация в цилиндре — $u_0(\mathbf{r})$, где $\mathbf{r} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y$.

Поставить задачи 1.243–1.248 стационарной диффузии для определения плотности потока нейтронов в неразмножающей поглощающей среде ($\Sigma_c \ll \Sigma_s$). Величина

$L = \sqrt{\frac{D}{\Sigma_c}}$ — **длина диффузии (см. ответ к задаче 1.243).**

1.243. В пространстве действует плоский изотропный источник нейтронов, с единицы площади которого в единицу времени выделяется Q_0 тепловых нейтронов.

1.244. Внутри слоя ($0 < x < \tilde{l}$), где $\tilde{l}$ — экстраполированная граница с вакуумом, через поверхность $x = 0$ поступают тепловые нейтроны; число нейтронов, проходящих через единицу площади за единицу времени равно q_0 .

1.245. В однородном пространстве действует линейный изотропный источник тепловых нейтронов, мощность единицы длины которого q_0 .

1.246. В центр шара экстраполированного радиуса $\tilde{r}_0$ помещен точечный изотропный источник тепловых нейтронов, мощность которого Q_0 . Шар находится в вакууме.

1.247. Сечения рассеяния и поглощения нейтронов в неограниченной среде равны, соответственно,

$$\Sigma_s = \begin{cases} \Sigma_{s1}, & z < 0, \\ \Sigma_{s2}, & z > 0, \end{cases} \quad \Sigma_c = \begin{cases} \Sigma_{c1}, & z < 0, \\ \Sigma_{c2}, & z > 0. \end{cases}$$

В точке $(0, 0, z_0 > 0)$ действует изотропный источник тепловых нейтронов, мощность которого Q_0 .

1.248. Однородная среда занимает ограниченную выпуклую область Ω и находится в вакууме. В среде действуют изотропные источники тепловых нейтронов, мощность которых в единице объема $F(\mathbf{r})$. Вне области Ω источников нет, нейтроны из вакуума не возвращаются.

1.249. Для изучения свойств облучаемых материалов соответствующие образцы помещают в экспериментальный ядерный реактор в область с высокой плотностью нейтронов. Образец представляет собой однородный поглотитель, занимающий область Ω с кусочно-гладкой границей S . Поставить в диффузионном

приближении задачу для определения плотности потока нейтронов $\Phi(\mathbf{r})$ в образце при следующих предположениях относительно нейтронного поля: 1) вне образца изотропно (плотность потока нейтронов Φ_0); 2) мало меняется вблизи образца.

1.250. Гомогенный реактор на тепловых нейтронах занимает достаточно большую область Ω (можно пренебречь утечкой) и находится в критическом состоянии. При делении ядер тепловыми нейтронами с энергией E_τ рождаются быстрые нейтроны с энергией $E_0 > E_\tau$. Пусть E_r — энергия нейтрона, при которой происходит его резонансное поглощение, $w(\mathbf{r}, \mathbf{r}', E_1, E_2)$ — плотность вероятности того, что нейтрон переместится из точки $\mathbf{r}$ в точку $\mathbf{r}'$, изменив энергию со значения E_1 до $E_2 < E_1$, где

$$\int_{\mathbf{R}^3} w(\mathbf{r}, \mathbf{r}', E_1, E_2) d\mathbf{r}' = 1.$$

Пренебрегая делением, вызванным замедляющимися нейтронами, показать, что уравнение диффузии (1.47) преобразуется к виду

$$D\Delta\Phi(\mathbf{r}) - \Sigma_a\Phi(\mathbf{r}) + k_\infty\Sigma_a \int_{\Omega} w(\mathbf{r}', \mathbf{r}, E_0, E_\tau)\Phi(\mathbf{r}') d\mathbf{r}' = 0. \quad (1.51)$$

1.251. Пусть выполнены условия предыдущей задачи, при этом размер реактора $R \gg L$ и $R \gg \sqrt{\tau}$, где L — длина диффузии (см. ответ к задаче 1.243), $\sqrt{\tau} = \sqrt{\overline{r^2}}/6$ — длина замедления,

$$\overline{r^2} = \overline{|\mathbf{r}' - \mathbf{r}''|^2} = \int_{\mathbf{R}^3} |\mathbf{r}' - \mathbf{r}''|^2 w(\mathbf{r}', \mathbf{r}'', E_0, E_\tau) d\mathbf{r}''$$

— средний квадрат перемещения нейтрона в процессе замедления. Показать, что уравнение диффузии (1.51) можно привести к виду

$$\Delta\Phi + \alpha^2\Phi = 0, \quad \alpha^2 = \frac{k_\infty - 1}{L^2 + k_\infty\tau}, \quad k_\infty - 1 \ll 1. \quad (1.52)$$

Величина

$$\alpha^2 = \frac{k_\infty - 1}{L^2 + k_\infty\tau} \approx \frac{k_\infty - 1}{M^2}$$

называется материальным параметром, $M = \sqrt{L^2 + \tau}$ — длина миграции, характеризующая среднее расстояние между точками рождения и поглощения нейтрона.

Поставить задачи 1.252–1.257 для вычисления критического размера гомогенного реактора на тепловых нейтронах.

1.252. Реактор занимает односвязную выпуклую область Ω с кусочно-гладкой границей S и находится в вакууме. Граничное условие поставить в двух формах: 1) для плотности потока на экстраполированной границе; 2) для односторонней плотности тока нейтронов на S .

1.253. Цилиндрический реактор ($r_1 < r < r_2$), внутреннюю часть ($r < r_1$) которого заполняет сильный поглотитель («черное» тело), помещен в вакуум. Поставить условие для плотности потока нейтронов на экстраполированной границе, применив (1.49).

1.254. Сферический реактор ($r_1 < r < r_2$) с полостью ($r < r_1$) находится в вакууме. Постановку сделать при условии, что нейтроны из вакуума не возвращаются.

1.255. Реактор в форме параллелепипеда ($|x| < l_1$, $|y| < l_2$, $|z| < l_3$) имеет два торцевых отражателя ($|x| < l_1$, $|y| < l_2$, $l_3 < |z| < l$). Сечения поглощения и рассеяния равны, соответственно, Σ_a^C и Σ_s^C в активной зоне и Σ_c^R и Σ_s^R в отражателе. Поставить условие для плотности потока нейтронов на внешней экстраполированной границе системы в предположении, что экстраполированные длины $\tilde{l}_1$ и $\tilde{l}_2$ для реактора и отражателя одинаковы.

1.256. Сферический реактор ($r < r_0$) окружен отражателем в форме сферического слоя ($r_0 < r < r_1$). Сечения поглощения и рассеяния равны, соответственно, Σ_a^C и Σ_s^C в активной зоне и Σ_c^R и Σ_s^R в отражателе. Поставить условие для плотности потока нейтронов на экстраполированной границе системы.

1.257. Цилиндрический реактор ($r < r_0$, $|z| < h$), имеет два торцевых отражателя ($r < r_0$, $-H < z < -h$) и ($r < r_0$, $h < z < H$). Сечения поглощения и рассеяния равны, соответственно, Σ_a^C и Σ_s^C в активной зоне и Σ_c^R и Σ_s^R в отражателе. Поставить условие для плотности потока нейтронов на внешней экстраполированной границе системы.

Пример 1.14. *Диффузионно-возрастное уравнение Ферми.*

Рождающиеся в результате деления быстрые нейтроны (средняя энергия 2 МэВ) замедляются при рассеянии на ядрах среды (замедлителя) и достигают тепловой области. В этой области разброс нейтронов по скоростям невелик, и их движение рассматривается в рамках диффузионной теории. Так как в процессе замедления энергия нейтронов меняется в широком диапазоне (от 10 МэВ до долей электронвольта), то диффузионное приближение, строго говоря, неприменимо. Однако если замедлитель состоит из тяжелых ядер, то потеря энергии при одном столкновении невелика и нейтрон испытывает достаточно много столкновений при небольшом изменении скорости. В связи с этим в каждом малом интервале энергии для описания движения нейтронов можно применить диффузионное приближение.

Скорость замедляющихся нейтронов много больше скорости ядер, а энергия нейтронов значительно превосходит энергию связи ядер (в молекулах, кристаллах). Поэтому можно считать, что нейтроны взаимодействуют со свободными неподвижными ядрами. Длина волны нейтрона с энергией порядка (и меньше) 1 МэВ много больше радиуса действия ядерных сил; при этом условии упругое рассеяние нейтрона на свободных ядрах в системе центра инерции изотропно.

Пусть скорости нейтрона и ядра до и после столкновения равны: $\mathbf{v}_0$, $\mathbf{V}_0 = \mathbf{0}$ и $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{V}_1$ в лабораторной системе координат; $\mathbf{w}_0$, $\mathbf{W}_0 = -\mathbf{v}_c$ и $\mathbf{w}_1$, $\mathbf{W}_1$ в системе центра инерции, скорость которой $\mathbf{v}_c = \mathbf{v}_0/(1+A)$, где A — отношение масс ядра и нейтрона. При упругом рассеянии в системе центра инерции абсолютная величина скорости нейтрона и ядра не изменяется. Это следует из законов сохранения количества движения и энергии

$$\begin{aligned}\mathbf{w}_0 + A\mathbf{W}_0 &= \mathbf{0}, & \mathbf{w}_1 + A\mathbf{W}_1 &= \mathbf{0}, \\ \frac{\mathbf{w}_0^2}{2} + \frac{A\mathbf{W}_0^2}{2} &= \frac{\mathbf{w}_1^2}{2} + \frac{A\mathbf{W}_1^2}{2}.\end{aligned}$$

Действительно, подстановка $\mathbf{w}_i = -A\mathbf{W}_i$, $i = 0, 1$, в третье уравнение приводит к соотношению

$$\frac{1+A^2}{2}\mathbf{W}_0 = \frac{1+A^2}{2}\mathbf{W}_1,$$

откуда $|\mathbf{W}_0| = |\mathbf{W}_1| = |\mathbf{v}_c|$, $|\mathbf{w}_0| = |\mathbf{w}_1|$. Угол рассеяния β в системе центра инерции образован векторами $\mathbf{w}_1$ и $\mathbf{v}_c$.

Поэтому из $\mathbf{v}_1 = \mathbf{w}_1 + \mathbf{v}_c$ следует, что $v_1^2 = w_1^2 + v_c^2 + 2w_1v_c \cos \beta$. Но $|\mathbf{w}_1| = A|\mathbf{W}_1| = A|\mathbf{v}_c|$, поэтому

$$v_1^2 = \frac{1 + A^2 + 2A \cos \beta}{1 + A^2} v_0^2.$$

Следовательно, отношение энергий E_1 после и E_0 до столкновения

$$\frac{E_1}{E_0} = \frac{1}{2} [1 + \varepsilon_0 + (1 - \varepsilon_0) \cos \beta], \quad \varepsilon_0 = \left(\frac{A - 1}{A + 1} \right)^2. \quad (1.53)$$

В силу изотропности рассеяния значения $\beta \in [0, \pi]$ равновероятны. Но тогда (согласно формуле (1.53)) нейтрон с энергией E после соударения может с одинаковой вероятностью приобрести энергию E' в интервале $[\varepsilon_0 E, E]$. Плотность вероятности случайной величины E'

$$w(E, E') = \begin{cases} \frac{1}{1 - \varepsilon_0} E, & E' \in [\varepsilon_0 E, E], \\ 0, & E' \notin [\varepsilon_0 E, E]. \end{cases} \quad (1.54)$$

В теории замедления энергия нейтрона измеряется в логарифмической шкале. Мерой энергии служит летаргия — логарифм отношения энергий,

$$u = \ln \frac{E_0}{E}, \quad (1.55)$$

где E_0 — произвольная величина (например, средняя энергия нейтронов деления). Для обозначения функций, зависящих от разных аргументов, $f(E) = f(E(u)) = f(u)$, будет применяться упрощенная запись: $f(E) = f(u)$. Вероятность того, что нейтрон с летаргией u приобретет после соударения летаргию u' в интервале du'

$$w(u, u') du' = w(E, E') dE',$$

где $w(E, E')$ имеет вид (1.54). Следовательно,

$$w(u, u') = \begin{cases} \frac{e^{-(u'-u)}}{1 - \varepsilon_0}, & u' \in \left[u, u + \ln \frac{1}{\varepsilon_0} \right], \\ 0, & u' \notin \left[u, u + \ln \frac{1}{\varepsilon_0} \right]. \end{cases} \quad (1.56)$$

Среднее приращение летаргии нейтрона за одно соударение

$$\xi = \int_u^{u + \ln \frac{1}{\varepsilon_0}} \frac{(u' - u) e^{-(u' - u)}}{1 - \varepsilon_0} du' = 1 + \frac{\varepsilon_0 \ln \varepsilon_0}{1 - \varepsilon_0}.$$

Для описания распределения замедляющихся нейтронов по энергиям вводится функция $q(u)$ — число нейтронов в единице объема, пересекающих в единицу времени уровень летаргии u (в направлении возрастания летаргии). Эта функция называется *плотностью замедления* и представляет собой плотность потока нейтронов в пространстве летаргии.

Ниже рассматриваются две задачи, относящиеся к основным в теории замедления.

Задача 1. В однородном неограниченном замедлителе действуют источники быстрых нейтронов с летаргией $u = 0$, мощность которых в единице объема Q_0 . Замедлитель состоит из тяжелых ядер, не поглощающих нейтроны ($\Sigma_a = 0$), процесс замедления стационарен. Нужно установить соотношение, связывающее плотность потока нейтронов и плотность замедления, а также получить распределение нейтронов по энергиям.

После соударения нейтрон с летаргией u приобретет летаргию $u' \in \left[u, u + \ln \frac{1}{\varepsilon_0}\right]$ в интервале du' с вероятностью $w(u, u')du'$, где $w(u, u')$ имеет вид (1.56). Следовательно, летаргия нейтрона может принять значение u' , если до соударения она имела значение $u \in [u' - \ln \frac{1}{\varepsilon_0}, u']$. Число нейтронов с летаргией u в интервале du , испытавших соударения (в единице объема за единицу времени), равно $\Phi(u)\Sigma_s(u)du$; из них в интервал du' попадет $\Phi(u)\Sigma_s(u)dw(u, u')du'$ нейтронов, а полное их число

$$dN^+ = du' \int_{u' - \ln \frac{1}{\varepsilon_0}}^{u'} \Phi(u)\Sigma_s(u) \frac{e^{-(u'-u)}}{1 - \varepsilon_0} du.$$

С другой стороны, из интервала du' уйдет

$$dN^- = \Phi(u')\Sigma_s(u')du'$$

нейтронов. Так как процесс замедления нейтронов стационарен, нет их поглощения и отсутствуют источники с летаргией $u > 0$ (энергии $E = E_0$ соответствует летаргия $u = 0$), то $dN^+ = dN^-$, т. е.

$$\Phi(u')\Sigma_s(u') = \int_{u' - \ln \frac{1}{\varepsilon_0}}^{u'} \Phi(u)\Sigma_s(u) \frac{e^{-(u'-u)}}{1 - \varepsilon_0} du. \quad (1.57)$$

Решение этого уравнения (см. задачу 4.325)

$$\Phi(u')\Sigma_s(u') = C. \quad (1.58)$$

Плотность замедления $q(u')$ равна числу нейтронов (в единице объема), пересекающих (за единицу времени) уровень летаргии u' , т. е. числу нейтронов, летаргия которых попадает в промежуток $[u', u + \ln \frac{1}{\varepsilon_0}]$. Вероятность того, что случайная величина с распределением (1.56) попадет в указанный интервал, равна

$$\int_{u'}^{u + \ln \frac{1}{\varepsilon_0}} \frac{e^{-(u''-u)}}{1 - \varepsilon_0} du'' = \frac{e^{-(u'-u)} - \varepsilon_0}{1 - \varepsilon_0}.$$

Следовательно, плотность замедления

$$\begin{aligned} q(u') &= \int_{u' - \ln \frac{1}{\varepsilon_0}}^{u'} \Phi(u)\Sigma(u) \frac{e^{-(u'-u)} - \varepsilon_0}{1 - \varepsilon_0} du = \\ &= \int_{u' - \ln \frac{1}{\varepsilon_0}}^{u'} C \frac{e^{-u'+u} - \varepsilon_0}{1 - \varepsilon_0} du = C \frac{1 - \varepsilon_0 + \varepsilon_0 \ln \varepsilon_0}{1 - \varepsilon_0} = C\xi. \end{aligned} \quad (1.59)$$

Сравнение (1.58) и (1.59) приводит к соотношению

$$q(u) = \xi \Sigma_s(u) \Phi(u). \quad (1.60)$$

При замедлении нет потери нейтронов, поэтому из интервала $(E, E + dE)$ выходит ровно столько нейтронов, сколько входит, т. е. $q(E + dE) = q(E)$. Таким образом,

$$\begin{aligned} \frac{dq}{dE} &= 0, \quad E_0 < E, \\ q(E_0) &= Q_0, \end{aligned}$$

откуда $q(E) = Q_0$. Соотношение (1.60) принимает форму

$$\Phi(E) = \frac{Q_0}{\xi \Sigma_s(E) E} \quad (1.61)$$

и описывает распределение нейтронов по энергиям (спектр Ферми).

Формулы (1.60) и (1.61) получены при условии непрерывности процесса замедления для летаргии $u \geq \ln(1/\varepsilon_0)$ (нижний предел $u' - \ln(1/\varepsilon_0)$ в интеграле уравнения (1.57) неотрицателен) или для энергии $E \leq \varepsilon_0 E_0$. Поскольку максимальная доля энер-

гии, теряемая нейтронов при столкновении (она равна $1 - \varepsilon_0$), уменьшается с ростом A , то для тяжелых замедлителей формулы (1.60) и (1.61) являются хорошим приближением и применимы вплоть до $u = 0$ или $E = E_0$ (см. [58]).

Задача 2. В однородном замедлителе, который занимает область Ω , действуют источники, испускающие в единицу объема за единицу времени $F(\mathbf{r}, u)$ нейтронов с летаргией u . Нужно получить уравнение, описывающее стационарный процесс замедления нейтронов при условии, что замедлитель состоит из тяжелых ядер, не поглощающих нейтроны, а размеры области Ω велики по сравнению с длиной диффузии.

Вывод уравнения (его называют *возрастным*, или *уравнением замедления*) основан на следующих допущениях.

1. Нейтроны с летаргией в интервале $(u, u + du)$ принадлежат односкоростной группе, до выхода из которой каждый из них достаточно много раз сталкивается с ядрами. Для такой группы справедливо диффузионное приближение, т. е. плотность тока $\mathbf{j}(\mathbf{r}, u)$ пропорциональна градиенту плотности потока $\Phi(\mathbf{r}, u)$ нейтронов (см. (1.46)):

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}, u) = -D\nabla\Phi(\mathbf{r}, u). \quad (1.62)$$

2. Плотность нейтронов — медленно меняющаяся функция (по крайней мере, на длине свободного пробега нейтрона), поэтому в окрестности точки $\mathbf{r}$ для плотности замедления $q(\mathbf{r}, u)$ и плотности потока $\Phi(\mathbf{r}, u)$ нейтронов используют соотношение (1.60):

$$q(\mathbf{r}, u) = \xi\Sigma_s(u)\Phi(\mathbf{r}, u). \quad (1.63)$$

Уравнение замедления представляет собой запись баланса нейтронов в четырехмерном пространстве переменных $\mathbf{r}$ и u :

$$\begin{aligned} & \int_{\Delta\Omega} (q(\mathbf{r}, u) - q(\mathbf{r}, u + du)) d\mathbf{r} + \\ & + \int_{\Delta\Omega} F(\mathbf{r}, u) d\mathbf{r} du = - \int_{\Delta S} (\mathbf{j}(\mathbf{r}, u), \mathbf{n}) dS du, \end{aligned} \quad (1.64)$$

где область $\Delta\Omega$ с кусочно-гладкой границей принадлежит Ω , $\mathbf{n}$ — внешняя нормаль к ΔS , плотность тока $\mathbf{j}$ имеет вид (1.62). Отсюда нетрудно извлечь уравнение замедления в дифференциальной форме (см. пример 1.11):

$$-\frac{\partial q}{\partial u} + F = -D\Delta\Phi,$$

где Φ выражается через q посредством (1.63). Следовательно, плотность замедления $q(\mathbf{r}, u)$ удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial q}{\partial u} = \frac{D}{\xi \Sigma_s} \Delta q + F(\mathbf{r}, u).$$

После введения новой переменной τ , заданной в дифференциальной форме,

$$d\tau = \frac{D(u)}{\xi \Sigma_s(u)} du, \quad \tau(0) = 0, \quad (1.65)$$

и применения соотношения $F(\mathbf{r}, u)du = F(\mathbf{r}, \tau)d\tau$ возрастное уравнение (без учета поглощения) приобретает окончательный вид

$$\frac{\partial q}{\partial \tau} = \Delta q + F(\mathbf{r}, \tau).$$

Величина

$$\tau(u) = \int_0^u \frac{D(u') du'}{\xi \Sigma_s(u')} \quad (1.66)$$

имеет размерность квадрата длины и называется *возрастом нейтронов*.

Поставить задачи 1.259–1.266 для определения стационарной плотности замедления нейтронов без учета поглощения.

1.258. В однородном неограниченном замедлителе действуют источники, выделяющие в единицу времени в единице объема $F(\mathbf{r})$ быстрых нейтронов с летаргией $u = 0$.

1.259. В однородном неограниченном замедлителе действует плоский изотропный источник, испускающий в единицу времени с единицы площади Q_0 быстрых нейтронов с летаргией $u = 0$.

1.260. В однородном бесконечном замедлителе действуют изотропные плоские источники нейтронов, образующие решетку. Координаты источников $x_k = kd$, $k \in \mathbb{Z}$; каждый источник испускает с единицы площади за единицу времени Q_0 быстрых нейтронов с летаргией $u = 0$.

1.261. В однородном неограниченном замедлителе действует линейный источник, испускающий в единицу времени с единицы длины Q_0 быстрых нейтронов с летаргией $u = 0$.

1.262. Замедлитель занимает полупространство и граничит с вакуумом. В замедлителе на расстоянии d от экстраполированной границы $x = 0$, параллельно ей расположен линейный изотропный источник, испускающий в единицу времени с единицы длины q_0 быстрых нейтронов с летаргией $u = 0$.

1.263. В однородном неограниченном замедлителе действует изотропный точечный источник, испускающий в единицу времени Q_0 быстрых нейтронов с летаргией $u = 0$.

1.264. Шар, радиус которого r_0 , с характеристиками ξ_1, Σ_{s1} находится в среде с характеристиками ξ_2, Σ_{s2} . В центре действует изотропный точечный источник, испускающий в единицу времени Q_0 быстрых нейтронов с летаргией $u = 0$.

1.265. В бесконечном однородном замедлителе действует изотропный сферический источник (сфера радиуса r'), с единицы площади которого в единицу времени испускается Q_0/S' быстрых нейтронов с летаргией $u = 0$, где S' — площадь источника.

1.266. В бесконечном однородном замедлителе находится шар, радиус которого r_0 . В шаре в результате деления рождается (равномерно по объему) Q_0 быстрых нейтронов в единицу времени с летаргией $u = 0$, замедлением которых в шаре можно пренебречь.

1.267. Поставить задачу для определения плотности потока тепловых нейтронов в непоглощающем замедлителе, в котором действует точечный изотропный источник, испускающий Q_0 быстрых нейтронов в единицу времени с летаргией $u = 0$.

1.268. В однородном замедлителе с поглощением ($\Sigma_c \ll \Sigma_s$) действуют изотропные источники, испускающие в единицу объема за единицу времени Q_0 быстрых нейтронов с летаргией $u = 0$.

1) Получить возрастное уравнение с учетом поглощения нейтронов, применяя соотношение (1.63) в форме

$$q(\mathbf{r}, u) = \xi \Sigma(u) \Phi(\mathbf{r}, u), \quad \Sigma(u) = \Sigma_s + \Sigma_c(u).$$

2) Используя модель бесконечного замедлителя, найти вероятность $\varphi(u)$ того, что нейтрон избежит резонансного поглощения и окажется в состоянии с летаргией $u > 0$.

1.269. В поглощающем замедлителе содержится область $\Omega = \{x, y, z: x^2 + y^2 + z^2 < r_0^2\}$, в которой равномерно по объему

генерируется в единицу времени Q_0 быстрых нейтронов с летаргией $u = 0$. Поставить задачу для плотности замедления.

1.270. В однородном замедлителе с поглощением ($\Sigma_c \ll \Sigma_s$), занимающем полупространство ($z > 0$), действует изотропный точечный источник, испускающий в единицу времени Q_0 быстрых нейтронов с летаргией $u = 0$. Источник расположен на расстоянии z_0 от границы $z = 0$ с вакуумом. Поставить задачу для определения плотности замедления нейтронов при условии, что нейтроны из вакуума не возвращаются.

1.271. Гомогенный реактор на тепловых нейтронах занимает область Ω (слой, шар, цилиндр и т. п.). Поставить в диффузионно-возрастном приближении задачу для определения критических размеров реактора, если:

1) пространственное распределение нейтронов одинаково для всех летаргий, а распределение по энергиям одинаково в любых точках;

2) плотность потока нейтронов $\Phi(\mathbf{r}, u)$ принимает на экстраполированной границе одни и те же значения при любой летаргии;

3) делением ядер быстрыми нейтронами можно пренебречь.

1.272. Решить предыдущую задачу с учетом деления ядер быстрыми нейтронами; сечения рассеяния Σ_s^T , поглощения Σ_c^T , деления Σ_f^T в тепловой области и сечения $\Sigma_s(u)$, $\Sigma_c(u)$, $\Sigma_f(u)$ для $u \in [0, u_T]$ заданы.

1.273. В твердом теле, занимающем область Ω , движутся нейтроны. Так как нейтроны не имеют заряда, то они взаимодействуют с ядрами посредством столкновений. При этом происходит либо рассеяние, либо поглощение, либо захват нейтрона ядром с последующим делением ядра и испусканием вторичных нейтронов. Одна из моделей, в рамках которой изучается движение нейтронов, базируется на следующих предположениях:

1) концентрация нейтронов мала по сравнению с концентрацией ядер, так что можно не учитывать столкновения нейтронов между собой;

2) кинетическая энергия нейтронов много больше kT , где T — абсолютная температура среды, т. е. можно пренебречь тепловым движением ядер, кристаллическими эффектами и считать ядра свободными;

3) скорости всех нейтронов одинаковы по абсолютной величине: $\mathbf{v} = v\mathbf{l}$, где $\mathbf{l}$ — единичный вектор;

4) деление ядра после захвата нейтрона сопровождается испусканием без запаздывания ($\nu \geq 1$) вторичных нейтронов.

Пусть в момент времени t нейтрон находится в точке с координатой $\mathbf{r}$ и имеет скорость $v\mathbf{l}$. Совокупность точек $(\mathbf{r}, \mathbf{l})$ образует 5-ти мерное фазовое пространство. Плотность нейтронов $n(\mathbf{r}, \mathbf{l}, t)$ в этом пространстве в момент времени t называется функцией распределения нейтронов, т.е. $n d\mathbf{r} d\mathbf{l}$ — количество нейтронов в момент времени t в элементе объема $d\mathbf{r}$, скорости которых принадлежат интервалу $v d\mathbf{l}$. Пусть далее $w_s(\mathbf{l}', \mathbf{l}) d\mathbf{l}$ — вероятность того, что нейтрон со скоростью $v\mathbf{l}'$ приобретет после рассеяния скорость $v\mathbf{l}$ в интервале $v d\mathbf{l}$, $w_f(\mathbf{l}', \mathbf{l}) d\mathbf{l}$ — вероятность испускания вторичного нейтрона со скоростью $v\mathbf{l}$ в интервале $v d\mathbf{l}$ в результате деления ядра, вызванного захватом нейтрона, скорость которого $v\mathbf{l}'$, Σ_s , Σ_c , Σ_f — соответственно сечения рассеяния, поглощения, захвата нейтрона с последующим делением составного ядра, $F(\mathbf{r}, \mathbf{l}, t)$ — плотность источников нейтронов.

Показать, что функция $\Phi(\mathbf{r}, \mathbf{l}, t) = \nu n(\mathbf{r}, \mathbf{l}, t)$ удовлетворяет интегро-дифференциальному уравнению

$$\frac{1}{v} \frac{\partial \Phi}{\partial t} + (\mathbf{l} \nabla \Phi) + \Sigma \Phi = \int_{\mathbf{l}'} g(\mathbf{r}, \mathbf{l}', \mathbf{l}) \Phi(\mathbf{r}, \mathbf{l}', t) d\mathbf{l}' + \frac{1}{v} F, \quad (1.67)$$

где

$$g(\mathbf{r}, \mathbf{l}', \mathbf{l}) = \Sigma_s w_s(\mathbf{l}', \mathbf{l}) + \nu \Sigma_f w_f(\mathbf{l}', \mathbf{l}), \quad \Sigma = \Sigma_s + \Sigma_c + \Sigma_f,$$

которое называется односкоростным кинетическим уравнением Больцмана или уравнением переноса нейтронов.

1.274. Поставить задачу для определения функции $\Phi(\mathbf{r}, \mathbf{l}, t)$, удовлетворяющей кинетическому уравнению (1.67) в выпуклой области Ω с кусочно-гладкой границей S при $t > 0$, если начальное распределение нейтронов $\Phi_0(\mathbf{r}, \mathbf{l})$, а вне Ω нет источников нейтронов.

1.275. Плоскость $z = 0$ является общей границей двух однородных сред с различными физическими свойствами (индекс 1 соответствует отрицательным $z < 0$, индекс 2 положительным). В точке с координатами $x = y = 0$, $z = d > 0$ находится изотропный источник, испускающий в единицу времени Q_0 нейтронов, абсолютная величина скорости которых v . Поставить стационарную задачу для определения функции $\Phi(\mathbf{r}, \mathbf{l})$.

1.276. Показать, что если нейтроны после рассеяния и вторичные нейтроны после деления ядра равномерно распределены по направлениям, то уравнение переноса (1.67) принимает вид

$$\frac{1}{v} \frac{\partial \Phi}{\partial t} + (\mathbf{I} \nabla \Phi) + \Sigma \Phi = \frac{\beta}{4\pi} \int_{\mathbf{l}'} \Phi(\mathbf{r}, \mathbf{l}', t) d\mathbf{l}' + F, \quad (1.68)$$

где $\beta = \Sigma_s + \nu \Sigma_f$.

1.277. В диффузионном приближении плотность тока $\mathbf{j}(\mathbf{r}, t)$ и плотность потока $\Phi(\mathbf{r}, t)$ нейтронов в среде с коэффициентом диффузии D связаны соотношением $\mathbf{j} = -D \nabla \Phi$ (пример 1.13.) Получить в этом приближении уравнение диффузии из кинетического уравнения (1.68).

1.278. Распределение нейтронов $\Phi(\mathbf{r}, \mathbf{l}, t)$ в слое ($|z| < l$) зависит от переменных z , $\mu = \cos \theta$, где θ — угол между векторами $\mathbf{e}_z$ и $\mathbf{l}$, и от t ; при этом выполнены условия задачи 1.276. В слое действуют источники, испускающие $F(z, \mu, t)$ нейтронов в единице объема за единицу времени. Поставить задачу для определения функции $\Phi(\mathbf{r}, \mathbf{l}, t)$ при $t > 0$, если начальное распределение нейтронов $\Phi_0(z, \mu)$. Слой граничит с вакуумом, вне слоя источников нейтронов нет.




Рис. 1.16

1.279. Нейтронное поле $\Phi(\mathbf{r}, \mathbf{l})$ и плотность источников $F(\mathbf{r}, \mathbf{l})$ в бесконечном цилиндре (с осью Oz), радиус которого r_0 , не зависят от времени и обладают аксиальной симметрией относительно аргумента $\mathbf{r}$; при этом выполнены условия задачи 1.276. Вектор $\mathbf{l}$ задан в сферической системе координат, начало которой находится в точке $M(\mathbf{r})$; угол θ отсчитывается от оси Oz , φ — угол между проекциями векторов $\mathbf{l}$ и $\mathbf{r}$ на плоскость xOy

(рис. 1.16, а). Поставить задачу для определения функции $\Phi(\mathbf{r}, \mathbf{l})$, если цилиндр граничит с вакуумом

1.280. Распределение нейтронов $\Phi(\mathbf{r}, \mathbf{l})$ в шаре не зависит от времени и обладает сферической симметрией относительно аргумента $\mathbf{r}$; при этом выполнены условия задачи 1.276. Вектор $\mathbf{l}$ задан в сферической системе координат, начало которой находится в точке $M(\mathbf{r})$, угол θ отсчитывается от направления $\mathbf{e}_r$ (рис. 1.16, б). В шаре действуют источники нейтронов, плотность которых $F(r, \theta)$. Поставить задачу для определения нейтронного поля, если шар граничит с вакуумом.

1.281. В однородной среде, занимающей область Ω с кусочно-гладкой границей S , движутся нейтроны, скорости которых могут иметь любые значения. Сечения рассеяния, поглощения и захвата нейтрона с последующим делением ядра равны, соответственно, $\Sigma_s(v)$, $\Sigma_c(v)$, $\Sigma_f(v)$, где $v = |\mathbf{v}|$. Вероятность того, что нейтрон со скоростью $\mathbf{v}' = v'\mathbf{l}'$ после рассеяния приобретет скорость $\mathbf{v} = v\mathbf{l}$ в интервале $d\mathbf{v} = dv d\mathbf{l}$ равна $w_s(\mathbf{v}' \rightarrow \mathbf{v}) dv$; вероятность испускания вторичного нейтрона со скоростью $\mathbf{v}$ в интервале $d\mathbf{v}$ в результате деления, вызванного захватом нейтрона, скорость которого $\mathbf{v}'$, равна $w_f(\mathbf{v}' \rightarrow \mathbf{v}) dv$, $\nu(\mathbf{v}')$ — среднее число вторичных нейтронов. В среде действуют источники нейтронов, плотность которых $F(\mathbf{r}, v, \mathbf{l}, t)$. Нейтронное поле описывается функцией $\Phi(\mathbf{r}, v, \mathbf{l}, t) = vn(\mathbf{r}, v, \mathbf{l}, t)$, где $n(\mathbf{r}, v, \mathbf{l}, t)$ — функция распределения нейтронов, т.е. плотность нейтронов в фазовом пространстве переменных $\mathbf{r}, \mathbf{v}, t$. Вывести уравнение переноса нейтронов и получить условие: 1) на границе S раздела двух сред с различными физическими свойствами; 2) на границе с вакуумом.

1.3. Модели газо- и гидродинамики

Пример 1.15. Система уравнений газодинамики для идеального газа в одномерном случае. Акустическое приближение. Газ (или жидкость) называется *идеальным*, если можно пренебречь теплообменом между внутренними элементами газа (локально адиабатический процесс) и вязкостью. Пусть газ заполняет трубку с площадью поперечного сечения S (рис. 1.17), где $\xi = \xi(x, t)$ — координата тонкого слоя газа (при $t > 0$), который в положении равновесия (в начальный момент времени $t = 0$) имел координату x ; $u(x, t)$ — отклонение



Рис. 1.17

слоя с равновесной координатой x в момент $t > 0$ (x — переменная Лагранжа, см. пример 1.1); $P(x, t)$ — давление газа, $\rho(x, t)$ — его плотность. Так как уравнение состояния связывает три термодинамические величины, то любая из них — функция ρ и P . Итак, нужно получить три уравнения для трех неизвестных функций u , ρ , P . Закон сохранения массы $\rho_0 \Delta x = \rho \Delta \xi$ при $\Delta x \rightarrow 0$ принимает форму уравнения непрерывности $\rho_0 = \rho \xi_x$. В газе без вязкости внутренние силы сводятся к силам давления, следовательно, уравнение второго закона Ньютона для элемента Δx газа запишется в виде

$$\rho_0 S \Delta x u_{tt} = [-P(x + \Delta x, t) + P(x, t)] S.$$

Отсюда после применения формулы Лагранжа к правой части, деления на Δx и перехода к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$ получается уравнение движения Эйлера: $\rho_0 u_{tt} = -P_x$. Третьим является уравнение адиабаты. Так как $u(x, t) = \xi(x, t) - x$, то система уравнений газодинамики будет иметь вид

$$\begin{aligned} \rho_0 &= \rho(1 + u_x), \\ \rho_0 u_{tt} + P_x &= 0, \\ P &= P_0 \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^\gamma, \quad \gamma = \frac{C_P}{C_V}. \end{aligned} \tag{1.69}$$

Акустическим называется приближение, при котором величины $s = (\rho - \rho_0)/\rho_0$ (уплотнение, или конденсация газа) и u_x достаточно малы: $|s| \ll 1$, $|u_x| \ll 1$. В этом приближении система (1.69) линеаризуется:

$$s + u_x = 0, \tag{1.70}$$

$$\rho_0 u_{tt} + p_x = 0, \tag{1.71}$$

$$p = P_0 \gamma s, \tag{1.72}$$

где $p = P - P_0$, и называется *системой уравнений акустики*. Из этой системы следует, что функция $u(x, t)$ (а также ρ и s) удовлетворяют волновому уравнению

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad a^2 = \frac{P_0 \gamma}{\rho_0}.$$

Функции ρ , s , u можно выразить через потенциал скоростей $\psi(x, t)$, который определяется соотношением

$$u_t = \psi_x. \quad (1.73)$$

Комбинация уравнений (1.71), (1.72)

$$\frac{\partial}{\partial x}(\rho_0 \psi_t + \gamma P_0 s) = 0$$

преобразуется (интегрированием по x) в соотношение

$$\rho_0 \psi_t + \gamma P_0 s = f(t), \quad (1.74)$$

где $f(t)$ — произвольная функция. Так как потенциал скоростей определен с точностью до слагаемого, градиент которого равен нулю, то замена

$$\psi \rightarrow \psi + \int_0^t f(\tau) d\tau + C,$$

где C — произвольная постоянная, превращает (1.74) в

$$s = -\frac{1}{a^2} \psi_t. \quad (1.75)$$

Результатом исключения функций s и u из уравнений (1.70), (1.73), (1.75) является уравнение для потенциала скоростей

$$\psi_{tt} = a^2 \psi_{xx}.$$

Далее следует пример постановки задачи для идеального газа в акустическом приближении. В цилиндрической трубке ($0 < x < l$) с закрытыми концами находится идеальный газ, давление которого P_0 плотность ρ_0 . В момент $t = 0$ конец $x = l$ открывают. Поставить задачу для потенциала скоростей, если вне трубки находится тот же газ под давлением $P_0 + \Delta P$, $|\Delta P| \ll P_0$.

Решение. На закрытом конце $u_t(0, t) = 0$ и в силу (1.73) $\psi_x(0, t) = 0$. Равенство давлений $P_0 + p = P_0 + \Delta P$ внутри и вне трубки на открытом конце влечет соотношения $\Delta P = p(l, t) = \gamma P_0 s(l, t) = \frac{-\gamma P_0}{a^2} \psi_t(l, t)$, откуда $\psi(l, t) = -\frac{1}{\rho_0} \Delta P t + C_1$. Так как $s(x, 0) = 0$, то $\psi_t(x, 0) = 0$. Из равенства $u_t(x, 0) = 0$ следует, что $\psi_x(x, 0) = 0$, т. е. $\psi(x, 0) = C_2$. Так как $\psi(x, t)$ — непрерывная функция, то $C_1 = \psi(l, 0) = C_2$. Потенциал $\psi(x, t)$ определен с точностью до аддитивной постоянной, что дает право

выбрать $C_2 = 0$. Условия, которым удовлетворяет $\psi(x, t)$, формируют задачу

$$\begin{aligned}\psi_{tt} &= a^2 \psi_{xx}, & 0 < x < l, & \quad 0 < t, \\ \psi_x(0, t) &= 0, & \psi(l, t) &= -\frac{1}{\rho_0} \Delta P t, \\ \psi(x, 0) &= \psi_t(x, 0) = 0.\end{aligned}$$

Идеальный газ заполняет трубку и внешнее пространство. Равновесные давление и плотность газа в трубке P_0 и ρ_0 соответственно, площадь ее поперечного сечения S_0 . Поставить в акустическом приближении задачи 1.283–1.293 для определения указанной в условиях функции.

1.282. Конец $x = l$ трубки ($0 < x < l$) с газом закрыт, а конец $x = 0$ открыт. Поставить задачу для отклонения $u(x, t)$; начальные условия заданы, давление вне трубки P_0 .

1.283. Конец $x = l$ трубки ($0 < x < l$) с газом закрыт, а на конце $x = 0$ находится легкий перемещающийся без трения поршень. В момент $t = 0$ в результате продольного удара по поршню газ получает импульс $I \mathbf{e}_x$. Поставить задачу для отклонения $u(x, t)$, если внешнее давление P_0 .

1.284. Конец $x = l$ трубки открыт, а на конце $x = 0$ находится подвижная перегородка. С момента времени $t = 0$ перегородка движется по закону $u_0 \sin \omega t$. Поставить задачу для скорости газа, если внешнее давление P_0 .

1.285. Конец $x = 0$ трубки закрыт, а на конце $x = l$ находится неподвижная перегородка. В момент времени $t = 0$ перегородку убирают. Поставить задачу для уплотнения, если внешнее давление постоянно и равно P_1 .

1.286. На конце $x = 0$ трубки ($0 < x < l$) с газом находится подвижная перегородка. Конец $x = l$ закрыт поршнем (его масса равна m), который закреплен посредством пружинки с коэффициентом жесткости k и перемещается без трения. С момента $t = 0$ перегородка начинает двигаться со скоростью $v_0 \sin \omega t$. Поставить задачу для уплотнения $s(x, t)$, если внешнее давление P_0 .

1.287. В сечении $x = 0$ трубки ($-l < x < l$) с газом, концы которой закрыты, находится легкий, перемещающийся без трения поршень. Поршень медленно (изотермически) смещают

на величину Δx ($|\Delta x|/l = \alpha \ll 1$) и в момент $t = 0$ отпускают без начальной скорости. Пренебрегая толщиной поршня, поставить задачу для давления.

1.288. Конец $x = 0$ трубки ($0 < x < l$) закрыт поршнем, который закреплен посредством пружинки с коэффициентом жесткости k и перемещается без трения, масса поршня m . На конце $x = l$ задано давление $P_0 + p_0(t)$, $p_0(0) = 0$. До момента $t = 0$ газ находился в равновесном состоянии. Поставить задачу для давления.

1.289. Концы трубки ($0 < x < l$) закрыты. С момента времени $t = 0$ в сечении $x = x_0 \in (0, l)$ действует источник того же газа, мощность которого $Q(t)$. Поставить задачу для потенциала скоростей.

1.290. Часть ($x > 0$) неограниченной трубки ($-\infty < x < \infty$) заполнена газом. В сечении $x = 0$ находится поршень. С момента времени $t = 0$ поршень начинает двигаться с постоянной скоростью $v_0 \mathbf{e}_x$. Поставить задачи для определения: 1) потенциала скоростей газа; 2) давления в газе.

1.291. Конец полуограниченной трубки ($x > 0$) закрыт перегородкой. В момент времени $t = 0$ перегородку убирают. Поставить задачи для определения: 1) потенциала скоростей газа; 2) давления в газе, если внешнее давление постоянно и равно P_1 .

1.292. В сечении ($x = 0$) неограниченной трубки ($-\infty < x < \infty$) имеется неподвижная перегородка. Равновесные давления равны, соответственно, P_{10} при $x < 0$ и P_{20} при $x > 0$. В момент времени $t = 0$ перегородку убирают. Поставить задачи для определения: 1) потенциала скоростей газа; 2) давления в газе.

1.293. В неограниченной трубке ($-\infty < x < \infty$), площадь поперечного сечения которой S_1 при $x < 0$, S_2 при $x > 0$, распространяется звуковая волна $p = f(x - at)$ ($p = P - P_0$, P — давление в газе). Поставить задачу для определения давления.

1.294. Тело, движущееся в газе, возбуждает в нем звуковые волны, т.е. является источником звука. Тело, совершающее гармонические колебательные или пульсационные движения по гармоническому закону, служит примером гармонического источника звука. Слой, граничные плоскости которого движутся в противофазе, а также неограниченный цилиндр или сфера, радиус которых зависит только от времени, представляют собой изотропные источники в одно-, двух- и трехмерном пространствах соответственно.

В идеальном газе с момента времени $t = 0$ действует плоский изотропный источник звука (точечный источник в одномерном пространстве); отклонение давления от равновесного в точке, где находится источник, равно $p_0 \sin \omega t$. Поставить в акустическом приближении задачу для определения давления в газе, если равновесные давление и плотность равны P_0 и ρ_0 соответственно.

Пример 1.16. *Вывод системы уравнений гидродинамики идеальной жидкости (газа) в трехмерном пространстве.* Состояние движущейся жидкости описывают следующие (достаточно гладкие) функции: $\mathbf{V}(\mathbf{r}, t)$ — скорость, $P(\mathbf{r}, t)$ — давление, $\rho(\mathbf{r}, t)$ — плотность; здесь $\mathbf{r}$ — координата фиксированной точки (координата Эйлера), t — время. Систему уравнений для определения $\mathbf{V}$, P , ρ формируют уравнение состояния, закон сохранения массы и уравнение движения. Уравнение состояния представляет собой зависимость между какими-либо тремя термодинамическими величинами. Так как теплообмен между элементами жидкости отсутствует (локально адиабатический процесс), то уравнение состояния, связывающее давление, плотность и удельную энтропию, которая является постоянной, сводится к соотношению $\Phi(P, \rho) = 0$. Например, для идеального газа это соотношение является уравнением адиабаты. Закон сохранения массы (1.34), где $w = \rho$, $\mathbf{q} = \rho \mathbf{V}$, $Q = 0$, принимает форму уравнения непрерывности (или неразрывности) $\rho_t + \operatorname{div} \rho \mathbf{V} = 0$. Внутренними силами невязкой жидкости являются силы давления. На элемент $\Delta S \subset S$ действует сила $-P \mathbf{n} ds$ ($\mathbf{n}$ — внешняя нормаль), а на весь объем Ω — сила

$$-\int_S P \mathbf{n} ds = -\int_{\Omega} \nabla P d\mathbf{r};$$

преобразование интеграла по поверхности S в интеграл по Ω основано на формуле Остроградского. Пусть $\mathbf{F}(\mathbf{r}, t)$ — объемная плотность сил, действующих на жидкость. Уравнение движения элемента жидкости, объем которого Ω ,

$$\int_{\Omega} \rho \frac{d\mathbf{V}}{dt} d\mathbf{r} = -\int_{\Omega} \nabla P d\mathbf{r} + \int_{\Omega} \mathbf{F} d\mathbf{r}$$

преобразуется, в виду произвольности Ω и непрерывности подинтегральных функций, в уравнение Эйлера,

$$\rho \frac{d\mathbf{V}}{dt} = -\nabla P + \mathbf{F}.$$

Частица жидкости перемещается вдоль траектории $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ со скоростью $\mathbf{V} = \dot{\mathbf{r}}$, поэтому

$$\frac{d\mathbf{V}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} + (\mathbf{V} \nabla) \dot{\mathbf{r}} = \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} + (\mathbf{V} \nabla) \mathbf{V}.$$

Вывод системы уравнений гидродинамики завершен:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \rho \mathbf{V} = 0, \quad (1.76)$$

$$\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} + (\mathbf{V} \nabla) \mathbf{V} + \frac{1}{\rho} \nabla P = \frac{1}{\rho} \mathbf{F}, \quad (1.77)$$

$$\Phi(\rho, P) = 0.$$

1.295. Вывести систему уравнений акустики

$$\frac{\partial s}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{V} = 0, \quad (1.78)$$

$$\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} + a^2 \nabla s = 0, \quad (1.79)$$

$$p = P_0 \gamma s$$

где $s = (\rho - \rho_0)/\rho_0$ (уплотнение, или конденсация газа), $p = P - P_0$ при условии $|s| \ll 1, |\mathbf{V}| \ll a$, где $s = (\rho - \rho_0)/\rho_0$ (уплотнение, или конденсация газа), $p = P - P_0$, $\mathbf{V}$ — скорость элемента газа, a — скорость звука в газе.

1.296. Показать, что давление p (а также функции ρ и s) удовлетворяют волновому уравнению

$$p_{tt} = a^2 \Delta p, \quad a^2 = \frac{P_0 \gamma}{\rho_0}, \quad (1.80)$$

а скорость $\mathbf{V}$ — уравнению

$$\mathbf{V}_{tt} = a^2 \Delta \mathbf{V} + a^2 \operatorname{rot}(\operatorname{rot} \mathbf{V}(\mathbf{r}, 0)).$$

1.297. Пусть в момент $t = 0$ поле скоростей газа потенциально, т. е. $\mathbf{V} = \nabla \psi$ (ψ — потенциал скоростей). Доказать, что в акустическом приближении: 1) движение газа остается потенциальным при любом $t > 0$; 2) $s = -\frac{1}{a^2} \psi_t$; 3) функции $s, \psi, \mathbf{V}$ удовлетворяют однородному волновому уравнению (1.80).

1.298. Трубка ($0 < x < l$) с закрытыми концами заполнена идеальным газом, давление которого P_0 , плотность ρ_0 . Давление такого же газа вне трубки P_1 , а плотность ρ_1 . В момент $t = 0$ конец $x = l$ открывают. Поставить в акустическом приближении задачу для давления в трубке, если внешнее давление остается равным P_1 .

1.299. Конец $x = l$ трубки ($0 < x < l$) открыт, а конец $x = 0$ закрыт поршнем; давление и плотность идеального газа, заполняющего трубку равны P_0 и ρ_0 соответственно. С момента времени $t = 0$ поршень движется по закону $\mu(t)$. Поставить в акустическом приближении задачу для давления газа в трубке, если ее диаметр мал по сравнению с длиной волны в газе, а площадь поперечного сечения $S(x)$ мало меняется на расстоянии порядка диаметра: $(\sqrt{S})_x \ll 1$.

Построить математические модели 1.300–1.304 для потенциала скоростей идеального газа в акустическом приближении; равновесное давление газа P_0 , плотность ρ_0 .

1.300. Сферический сосуд, радиус которого равен r_0 , заполнен газом. С момента времени $t = 0$ радиус сферы меняется по закону $r(t) = r_0(1 + \alpha(\theta, \varphi) \sin \omega t)$, где $|\alpha| \ll 1$, $r_0|\alpha\omega| \ll 1$.

1.301. Сфера, радиус которой r_0 , заполнена газом. С момента времени $t = 0$ сфера движется со скоростью $\mathbf{V} = V_0 \sin \omega t \mathbf{e}_z$.

1.302. Длинный полый цилиндр (радиус r_0), заполненный газом, движется со скоростью $V_0 \mathbf{k}$, где $\mathbf{k}$ — постоянный единичный вектор, перпендикулярный оси цилиндра. В момент времени $t = 0$ цилиндр мгновенно останавливается.

1.303. В полом цилиндре ($r < r_0$, $0 < \varphi \leq 2\pi$, $0 < z < l$) находится газ. С момента времени $t = 0$ основание $z = 0$ цилиндра начинает двигаться по закону $z(r, \varphi, t) = l \alpha(r, \varphi) \sin \omega t$, $|\alpha| \ll 1$, $l|\alpha\omega| \ll 1$; остальная поверхность цилиндра неподвижна.

1.304. Непроницаемая сфера, радиус которой r_0 , заполнена идеальным газом. С момента $t = 0$ в центре сферы действует источник того же газа мощности $Q(t)$.

1.305. Идеальный газ заполняет все пространство; его плотность ρ_0 , давление P_0 . В начальный момент времени в газе возникает уплотнение $s_0(\mathbf{r})$ при нулевых начальных скоростях. Поставить задачу для определения функции $s(\mathbf{r}, t)$.

Пример 1.17. Твердое тело с гладкой поверхностью совершает малые гармонические колебания в пространстве, заполненном идеальным газом. Движение тела происходит в некотором фиксированном направлении, амплитуда колебаний мала по сравнению с размерами тела. *Поставить в акустическом приближении задачу для определения установившегося давления в газе.*

Если тело движется по закону $A \cos \omega t = \operatorname{Re} (A e^{i\omega t})$, то зависимость от времени всех величин, характеризующих газ, определяются множителем $e^{i\omega t}$:

$$P(\mathbf{r}, t) = P_0 + \operatorname{Re} (p(\mathbf{r}) e^{i\omega t}), \quad \mathbf{V}(\mathbf{r}, t) = \operatorname{Re} (\mathbf{v}(\mathbf{r}) e^{i\omega t}).$$

Подстановка этих выражений в уравнение (1.80) и во второе уравнение системы (1.78) приводит к уравнению Гельмгольца

$$\Delta p + k^2 p = 0, \quad k = \frac{\omega}{a}, \quad (1.81)$$

и соотношению

$$\nabla p = -i \rho_0 \omega \mathbf{v}. \quad (1.82)$$

В граничном условии

$$\left(\frac{\partial p}{\partial n} + i \rho_0 \omega v_n \right) \Big|_S = 0,$$

вытекающим из (1.82), границу S можно считать неподвижной, так как амплитуда колебаний мала по сравнению с размерами тела.

Среди решений уравнения (1.80) содержатся

$$P_1 = \frac{A_1}{r} e^{i(\omega t - kr)}, \quad P_2 = \frac{A_2}{r} e^{i(\omega t + kr)},$$

что можно проверить подстановкой функций P_1 и P_2 в уравнение. Функция P_1 описывает расходящуюся сферическую волну и удовлетворяет условию

$$\frac{\partial P_1}{\partial r} + ik P_1 = -\frac{P_1}{r}.$$

Таким образом, при $r \rightarrow \infty$

$$P_1 = O\left(\frac{1}{r}\right), \quad \frac{\partial P_1}{\partial r} + ik P_1 = o\left(\frac{1}{r}\right). \quad (1.83)$$

Эти соотношения называются *условиями излучения* и служат для выделения расходящейся волны [87]. В данной задаче сходящаяся волна не может возникнуть. Функция P_2 , описывающая

сходящуюся сферическую волну, не удовлетворяет условию (1.83). Действительно,

$$\frac{\partial P_2}{\partial r} + ikP_2 = -\frac{P_2}{r} + 2ikP_2 = O\left(\frac{1}{r}\right), \quad r \rightarrow \infty.$$

Итак, если тело занимает ограниченную область Ω_1 с гладкой границей S , то давление $P(\mathbf{r}, t) = P_0 + \operatorname{Re}(p(\mathbf{r})e^{i\omega t})$ является решением внешней краевой задачи для уравнения Гельмгольца

$$\begin{aligned} \Delta p + k^2 p &= 0 \quad \text{в области } \Omega = R^3 \setminus \overline{\Omega}_1, \\ \left(\frac{\partial p}{\partial n} + i\rho_0 \omega v_n \right) \Big|_S &= 0, \\ p &= O\left(\frac{1}{r}\right), \quad \frac{\partial p}{\partial r} + ikp = o\left(\frac{1}{r}\right), \quad r \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Поставить в акустическом приближении внешние краевые задачи 1.306–1.310 для определения установившегося давления $P(\mathbf{r}, t) = P_0 + \operatorname{Re}(p(\mathbf{r})e^{i\omega t})$ в идеальном газе.

1.306. Сфера, радиус которой r_0 , совершает малые гармонические колебания вдоль фиксированной оси по закону $A \sin \omega t$.

1.307. Пространство вне сферы заполнено газом; радиус сферы меняется по закону $r_0(1 + \alpha \cos \omega t)$, $|\alpha| \ll 1$.

1.308. Длинный цилиндр, радиус которого r_0 , совершает малые гармонические колебания в направлении постоянного вектора, перпендикулярного оси, по закону $A \cos \omega t$.

1.309. Пространство вне цилиндра заполнено газом; радиус цилиндра меняется по закону $r_0(1 + \alpha \cos \omega t)$, $|\alpha| \ll 1$.

1.310. Плоская звуковая волна $P_0 e^{i(\omega t - kz)}$, где $k = \omega/a$, падает на неподвижный шар, радиус которого r_0 . Поставить в акустическом приближении задачу для определения давления в рассеянной волне; давление и плотность невозмущенного газа P_0 и ρ_0 соответственно.

1.311. Идеальная жидкость заполняет полупространство ($z > 0$) и граничит с воздухом ($z < 0$), давление которого постоянно. Из воздуха на поверхность жидкости падает (перпендикулярно к поверхности) моделированная электромагнитная волна (например, лазерный луч). В жидкости интенсивность луча экспоненциально убывает с ростом величины z :

$$I(z, t) = I_0 f(t) e^{-\alpha z}, \quad z > 0,$$

где $f(t)$ — форма лазерного луча, α — коэффициент поглощения света. Следовательно, основная доля энергии луча поглощается тонким приграничным слоем, толщина которого $\sim 1/\alpha$. Из-за повышения температуры слой расширяется и возбуждает в жидкости звуковую волну. Математическое моделирование этого процесса основано на следующих допущениях (см. [13], гл. VIII, § 1).

1. Ввиду малости отклонений давления и плотности от равновесных значений функции $p' = P - P_0$, $\rho' = \rho - \rho_0$ удовлетворяют линеаризованной системе уравнений гидродинамики (см. уравнения (1.78, 1.79))

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho_0 \operatorname{div} \mathbf{V} = 0, \quad \rho_0 \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} + \nabla p' = 0.$$

Квадрат скорости звука при адиабатическом процессе

$$c_0^2 = \left(\frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_s, \quad s — \text{энтропия},$$

так что приближенные уравнения состояния жидкости $P' = c_0^2 \rho'$. Поскольку процесс не является строго адиабатическим, то в уравнение состояния нужно внести слагаемое, учитывающее термоупругие напряжения:

$$P' = c_0^2 \rho' + c_0^3 \rho_0 \beta T',$$

где β — коэффициент теплового расширения, T' — отклонение температуры от равновесной.

2. Температура T' удовлетворяет уравнению теплопроводности

$$C \rho_0 \frac{\partial T'}{\partial t} = k \Delta T' + \alpha I_0 e^{-\alpha z} f(t).$$

В ряде случаев, включая данный, термодиффузия мало влияет на возбуждение звука, поэтому в уравнении теплопроводности можно пренебречь членом $k \Delta T'$.

Показать, что скорость жидкости $\mathbf{V}(z, t) = V(z, t) \mathbf{e}_z$ удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = c_0^2 \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} + \alpha^2 c_0^3 N f(t) e^{-\alpha z}, \quad z > 0,$$

и граничному условию

$$\left. \frac{\partial V}{\partial z} \right|_{z=0} = \alpha c_0 N f(t), \quad N = \frac{\beta I_0}{\beta c_0 C},$$

где C — удельная теплоемкость жидкости.

1.312. Решить предыдущую задачу, если на поверхности жидкости находится тонкая прозрачная неподвижная пластинка, через которую проходит в жидкость лазерный луч.

Пример 1.18. Поставить задачу о потенциальном обтекании тела, движущегося в идеальной несжимаемой жидкости с постоянной скоростью $\mathbf{V}_0$. Выразить давление на поверхности тела через потенциал скоростей.

В данном случае потенциальность движения сохраняется во времени. Это следует из уравнения (1.77), которое при условии $\operatorname{div} \mathbf{V} = 0$ (см. (1.76)) и $\mathbf{F} = 0$ запишется в форме

$$\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} + \nabla \frac{V^2}{2} + [\omega \mathbf{V}] + \frac{1}{\rho_0} \nabla P = 0, \quad \omega = \operatorname{rot} \mathbf{V}.$$

Применение операции rot ведет к уравнению $\omega_t + \operatorname{rot} [\omega \mathbf{V}] = 0$, т. е. в силу тождества $\operatorname{rot} [\omega \mathbf{V}] = (\mathbf{V} \nabla) \omega - (\omega \nabla) \mathbf{V}$

$$\frac{d\omega}{dt} = (\omega \nabla) \mathbf{V}.$$

В классе функций $\omega \in C^1$ задача Коши для полученного уравнения с начальным условием $\omega(\mathbf{r}, 0) = 0$ имеет единственное решение $\omega(\mathbf{r}, t) = 0$.




Рис. 1.18

Пусть тело занимает в $\mathbb{R}^3$ область Ω_1 с гладкой границей S . Так как $\rho = \rho_0$, $\mathbf{V} = \nabla \psi$, то из (1.76) следует, что $\Delta \psi = 0$. В точках S нормальные составляющие скорости твердого тела и жидкости равны, т. е.

$$\left. \frac{\partial \psi}{\partial n} \right|_S = (\mathbf{V} \mathbf{n})|_S.$$

На бесконечности скорость жидкости равна нулю, следовательно, $\psi(\mathbf{r}) \rightarrow C$ при $r \rightarrow \infty$. Так как потенциал скоростей определен с точностью до аддитивной постоянной, то можно выбрать

$C = 0$. В системе координат, начало которой связано с телом (рис. 1.18),

$$\mathbf{r} = \mathbf{R} + \mathbf{V}_0 t, \quad \psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{R} + \mathbf{V}_0 t) = \Psi(\mathbf{R}, t);$$

поскольку $\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial X}$ и т. д., то Ψ — решение задачи

$$\Delta \Psi = 0, \quad \Omega = \mathbf{R}^3 / \overline{\Omega}_1, \\ \left. \frac{\partial \Psi}{\partial n} \right|_S = V_{0n}, \quad \lim_{R \rightarrow \infty} \Psi = 0.$$

Уравнение и граничные условия не зависят от t , потому функция $\Psi = \Psi(\mathbf{R})$. Физический смысл этого свойства ясен: в системе координат, связанной с телом, течение не зависит от времени. Итак, $\psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r} + \mathbf{V}_0 t) = \Psi(\mathbf{R})$.

В данном случае $\text{rot } \mathbf{V} = 0$, поэтому $(\mathbf{V} \nabla) \mathbf{V} = \frac{1}{2} \nabla V^2$ и уравнение (1.77) при $\mathbf{F} = 0$ преобразуется к виду

$$\nabla \left(\psi_t + \frac{1}{2} V^2 + \frac{P}{\rho_0} \right) = 0,$$

откуда

$$\psi_t + \frac{1}{2} V^2 + \frac{1}{\rho_0} P = f(t).$$

Так как на бесконечности $P = P_0$, $\psi = 0$, $V = 0$, то $f(t) = P/\rho_0$ и

$$P = P_0 - \frac{\rho_0 V^2}{2} - \rho_0 \frac{\partial \psi}{\partial t}.$$

Если задача для Ψ решена, то $\psi_t = \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r} - \mathbf{V}_0 t) = -(\mathbf{V}_0 \nabla \Psi)$ и давление на S

$$P|_S = P_0 - \rho_0 \left(\frac{1}{2} |\nabla \Psi|^2 - (\mathbf{V}_0 \nabla \Psi) \right) \Big|_S.$$

Поставить задачи 1.313–1.319 для потенциала скоростей идеальной несжимаемой жидкости.

1.313. Неподвижный цилиндр, радиус которого r_0 , находится в стационарном плоскопараллельном потоке жидкости, скорость которой на бесконечности $V_0 \mathbf{k}$, где $\mathbf{k}$ — постоянный единичный вектор, перпендикулярный оси цилиндра.

1.314. Цилиндр радиус которого r_0 , движется в жидкости со скоростью $V(t) \mathbf{k}$, где $\mathbf{k}$ — постоянный единичный вектор,

перпендикулярный оси цилиндра. Выразить давление на поверхности цилиндра через потенциал скоростей.

1.315. Шар, радиус которого r_0 , движется в жидкости со скоростью $V(t)\mathbf{k}$, где $\mathbf{k}$ — постоянный единичный вектор. Выразить давление на поверхности шара через потенциал скоростей.

1.316. Радиус шара, находящегося в жидкости, меняется со временем по закону $r_0 = r_0(t)$. Выразить давление на поверхности шара через потенциал скоростей.

1.317. В момент времени $t = 0$ в жидкости возникает сферическая полость, внутри которой — вакуум; радиус полости a .

1.318. Вне твердого неподвижного шара, радиус которого r_0 , на расстоянии d от центра расположен точечный источник жидкости, мощность которого Q_0 , действующий столь долго, что течение можно считать установившимся.

1.319. Линейный источник жидкости, мощность единицы длины которого q_0 , расположен параллельно твердому неподвижному цилиндру ($r < r_0$) на расстоянии $d > r_0$ от его оси. Источник действует достаточно долго, так что движение жидкости можно считать установившимся.

Пример 1.19. Идеальная несжимаемая жидкость со свободной поверхностью заполняет бассейн конечной глубины, внешнее давление на поверхности P_0 . *Поставить задачу о потенциальном движении жидкости под действием силы тяжести.*

Давление и скорость жидкости удовлетворяют уравнениям (1.76), (1.77), в которых $\rho = \rho_0$, $\mathbf{F} = \mathbf{g}$:

$$\operatorname{div} \mathbf{V} = 0, \quad (1.84)$$

$$\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} + (\mathbf{V} \nabla) \mathbf{V} + \nabla \frac{P}{\rho_0} = \mathbf{g}. \quad (1.85)$$

Так как свойство потенциальности движения сохраняется во времени (пример 1.18), то задачу естественно поставить для потенциала скоростей $\psi(\mathbf{r}, t)$. Функция ψ удовлетворяет уравнению Лапласа $\Delta \psi = 0$, а граничные условия на свободной поверхности выражают следующие свойства: 1) внутреннее и внешнее давления на поверхности одинаковы; 2) при движении жидкости ее частицы не пересекают поверхность.

Для реализации первого условия нужно решить уравнение (1.85) относительно P . Поскольку $(\mathbf{V} \nabla) \mathbf{V} = \nabla V^2/2$ (при условии $\operatorname{rot} \mathbf{V} = 0$), то в прямоугольной системе координат,

начало которой находится на поверхности невозмущенной жидкости, а ось Oz направлена по $-\mathbf{g}$, уравнение (1.85) запишется в виде

$$\nabla \left(\frac{\partial \psi}{\partial t} + \frac{1}{2} (\nabla \psi)^2 + \frac{1}{\rho_0} P + g z \right) = 0,$$

откуда

$$P + \rho_0 \left(\psi_t + \frac{1}{2} (\nabla \psi)^2 + g z \right) = (f(t) + C) \rho_0.$$

Если включить $f(t)$ в ψ (пример 1.15), то при $C = P_0/\rho_0$

$$P = P_0 - \rho_0 \left(\psi_t + \frac{1}{2} (\nabla \psi)^2 + g z \right). \quad (1.86)$$

Пусть $z = \zeta(x, y, t)$ — уравнение поверхности жидкости, тогда равенство давлений $P|_{z=\zeta} = P_0$ будет выполнено, если

$$\psi_t + \frac{1}{2} (\nabla \psi)^2 + g z = 0, \quad z = \zeta(x, y, t). \quad (1.87)$$

Второе условие означает, что нормальные компоненты v_n и V_n скоростей точки поверхности и жидкости в этой точке одинаковы. Дифференцирование по t тождества $F(x(t), y(t), z(t), t) = 0$, в котором $F(x, y, z, t) = z - \zeta(x, y, z, t)$, приводит к соотношению $(\mathbf{v} \nabla F) + F_t = 0$. Отсюда в силу $v_n = V_n$ следует второе граничное условие $(\mathbf{V} \nabla F) + F_t = 0$ или

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = \frac{\partial \psi}{\partial z} - (\nabla \psi \nabla \zeta), \quad z = \zeta(x, y, t). \quad (1.88)$$

На дне бассейна нормальная компонента скорости жидкости равна нулю; если поверхность дна задана уравнением $z = -h_0(x, y)$, где $h_0(x, y) \in C^1$, то

$$\frac{\partial \psi}{\partial z} + (\nabla \psi \nabla h_0) = 0, \quad z = -h_0(x, y). \quad (1.89)$$

Совокупность уравнений для потенциала скоростей образуют нелинейную систему

$$\begin{aligned} & \Delta \psi(x, y, z, t) = 0, \\ & (x, y) \in \Omega, \quad -h_0(x, y) < z < \zeta(x, y, t), \\ & \left. \begin{aligned} \psi_t + \frac{1}{2} (\nabla \psi)^2 + g \zeta &= 0, \\ \zeta_t + (\nabla \psi \nabla \zeta) - \psi_z &= 0, \end{aligned} \right\} \quad z = \zeta(x, y, t), \\ & \psi_z + (\nabla \psi \nabla h_0) = 0 \quad \text{при} \quad z = -h_0(x, y). \end{aligned} \quad (1.90)$$

При $t = 0$ должны быть заданы положение $\zeta(x, y, 0) = \zeta_0(x, y)$ свободной поверхности жидкости и скорость $\mathbf{V}(x, y, 0, 0) = \nabla\psi_0(x, y)$ жидкости на поверхности; это приводит к начальным условиям для потенциала

$$\psi = \psi_0(x, y), \quad \psi_t = -\frac{1}{2}(\nabla\psi_0)^2 - g\zeta_0(x, y) \quad \text{при } t = 0 \text{ и } z = \zeta_0(x, y).$$

Необходимо также указать условия на границе области Ω — равенство нормальных компонент скоростей точки границы и жидкости в этой точке:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial n} \right|_{\partial\Omega} = \alpha(M, t), \quad M \in \partial\Omega,$$

где $\alpha(M, t)$ — известная функция.

В отличие от многих задач для уравнения Лапласа, при постановке которых задается одно условие на известной границе, в данном случае ставятся два условия, так как наряду с ψ неизвестно положение поверхности жидкости.

1.320. Твердое тело плавает на поверхности идеальной несжимаемой жидкости (рис. 1.19). Тело занимает область Ω_1 , жидкость — область Ω , S_1 — их общая гладкая граница, S — свободная поверхность жидкости. Вследствие удара в момент




Рис. 1.19

времени $t = 0$, направленного вдоль $\mathbf{e}_g$, тело начинает двигаться поступательно. Поставить задачу для определения поля скоростей жидкости в момент времени $t = +0$, если в этот момент скорость тела $V_0\mathbf{e}_g$. Рассмотреть частные случаи: 1) Ω_1 — ограниченная область в $\mathbb{R}^3$ ($\Omega_1 \cup \Omega \cup S_1$ — полупространство); 2) тело представляет собой длинный цилиндр с поперечным сечением Ω_1 ($\Omega_1 \cup \Omega \cup S_1$ — полуплоскость).

Идеальная несжимаемая жидкость, глубина которой h , находится в состоянии равновесия под действием сил тяжести и постоянного внешнего давления P_0 . Свободная поверхность жидкости — плоскость, перпендикулярная вектору ускорения свободного падения g . В результате внешнего

воздействия на поверхности возникает возмущение, которое под влиянием поля тяжести распространяется по поверхности в виде волн, называемых гравитационными. Поставить задачи 1.321–1.324 для определения движения жидкости в гравитационной волне, если амплитуда колебаний A много меньше длины волны λ (малые колебания), а длина волны мала по сравнению с глубиной жидкости: $A \ll \lambda \ll h$.

1.321. Жидкость заполняет: 1) неограниченный бассейн, глубина которого h_0 ; 2) полупространство $z < 0$.

1.322. Жидкость находится в прямоугольном бассейне со сторонами l_1 и l_2 , глубина которого h_0 .

1.323. Жидкость заполняет прямолинейный, бесконечно глубокий канал. Ось Ox направлена вдоль канала, ширина канала постоянна и равна d . Гравитационные волны обусловлены мгновенным изменением в момент времени $t = 0$ внешнего давления, импульс которого $I(x)$, и начальным отклонением $\zeta(x, 0) = \zeta_0(x)$ свободной поверхности жидкости от равновесного положения; трение жидкости о стенки канала пренебрежимо мало.

1.324. Две несмешивающиеся жидкости граничат по плоскости $z = 0$. Одна из жидкостей имеет плотность ρ_2 и заполняет полупространство $z < 0$, другая, плотность которой $\rho_1 < \rho_2$, представляет собой слой ($0 < z < h$). Рассмотреть случаи, когда поверхность $z = h$: 1) свободна; 2) ограничена неподвижной плоскостью.

1.325. Идеальная несжимаемая жидкость заполняет прямолинейный канал с прямоугольным поперечным сечением; ось Ox направлена вдоль канала, ширина канала постоянна и равна d , поверхность дна задана уравнением $z = -h_0(x)$. Вдоль канала распространяются длинные гравитационные волны малой амплитуды (амплитуда A много меньше глубины канала, а глубина мала по сравнению с длиной волны λ): $A \ll h_0 \ll \lambda$. Начальные и граничные условия зависят только от x , трение о стенки канала пренебрежимо мало. Пусть $z = \zeta(x, t)$ — уравнение поверхности жидкости. Показать, что: 1) функция ζ удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial^2 \zeta}{\partial t^2} = g \frac{\partial}{\partial x} \left(h_0(x) \frac{\partial \zeta}{\partial x} \right);$$

2) вдоль канала постоянной глубины h_0 могут распространяться волны $\zeta_1 = f_1(x - at)$ и $\zeta_2 = f_2(x + at)$ со скоростями a (прямая

волна) и $-a$ (обратная волна) соответственно, сохраняющие форму в процессе движения; f_1 и f_2 — произвольные функции класса C^2 , $a = \sqrt{gh_0}$.

1.326. Вывести уравнение для функции $\zeta(x, t)$ (см. задачу 1.325), если площадь поперечного сечения канала $S_0(x)$, а ширина на уровне свободной поверхности $d(x)$; диаметр поперечного сечения (форма сечения любая) мал по сравнению с длиной волны.

1.327. Идеальная несжимаемая жидкость заполняет бассейн, поверхность дна которого задана уравнением $z = -h_0(x, y)$ (система координат та же, что и в примере 1.19). В жидкости возбуждаются длинные гравитационные волны малой амплитуды A ($A \ll h_0 \ll \lambda$). Пусть $z = \zeta(x, y, t)$ — уравнение поверхности жидкости. Показать, что функция ζ удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial^2 \zeta}{\partial t^2} = g \operatorname{div} (h_0(x, y) \nabla \zeta). \quad (1.91)$$

1.328. В задаче 1.325 рассмотрены волны малой амплитуды. Показать, что для волн произвольной амплитуды (все остальные условия те же) функции $h = h_0 + \zeta$, $u = V_x$ удовлетворяют системе уравнений

$$\begin{aligned} h_t + (u h)_x &= 0, \\ u_t + u u_x + g h_x &= 0, \end{aligned} \quad (1.92)$$

называемых уравнениями *мелкой воды*.

1.329. Показать, что одномерное плоское движение идеального газа описывается системой уравнений

$$\begin{aligned} v_t + v v_x + \frac{2}{\gamma - 1} c c_x &= 0, \\ c_t + \frac{\gamma - 1}{2} c v_x + v c_x &= 0, \end{aligned} \quad (1.93)$$

где $c = \sqrt{\frac{\partial P}{\partial \rho}}$ — скорость звука в газе, v — скорость газа.

1.330. В длинной трубе ($-\infty < x < \infty$) с поршнем находится идеальный газ, давление и плотность которого P_0 и ρ_0 соответственно. С момента времени $t = 0$ поршень движется по закону $x = \mu(t)$, $\mu(0) = 0$, $\mu(t) \in C^1$ ($t \geq 0$). Поставить задачу о движении газа в области $x > \mu(t)$.

1.331. Двумерное стационарное течение идеального газа на бесконечности (вверх по течению) представляет собой однородный

плоскопараллельный поток, скорость газа в котором v_0 , скорость звука c_0 . При потенциальном обтекании заданного двухмерного профиля (9.1) структура потока меняется. Показать, что такое течение описывается системой уравнений

$$(v_x^2 - c^2) \frac{\partial v_x}{\partial x} + 2v_x v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + (v_y^2 - c^2) \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0, \quad (1.94)$$

$$\frac{\partial v_x}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial x} = 0,$$

$$c^2 = c_0^2 - \frac{\gamma - 1}{2}(v^2 - v_0^2). \quad (1.95)$$

1.332. Звезда белый карлик, один из компактных объектов (см. задачу 1.396), представляет собой шар из вырожденного электронного газа. Давление P и плотность ρ газа связаны уравнением

$$P = K\rho^{1+\frac{1}{n}}, \quad n > 0.$$

Состояние звезды устойчиво, если действие гравитационных сил в каждой точке уравновешивается силами давления.

1. Применяя классическую теорию тяготения, получить уравнение равновесия звезды

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(\frac{r^2}{\rho} \frac{dP}{dr} \right) = -4\pi G\rho,$$

где G — гравитационная постоянная.

2. Показать, что в безразмерных переменных

$$\rho = \rho(0)\theta^n, \quad r = a\xi, \quad a = \left[\frac{(n+1)K\rho(0)^{\frac{1}{n}-1}}{4\pi G} \right]^{\frac{1}{2}}$$

функция $\theta(\xi)$ — решение задачи Коши для уравнения Лейна–Эмдена:

$$\begin{cases} \frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} = -\theta^n, & 0 < \xi, \\ \theta(0) = 1, \quad \theta'(0) = 0. \end{cases}$$

Пример 1.20. Вывод системы уравнений Буссинеска. Хотя уравнения (1.90) моделируют идеализированную физическую систему, они представляют собой сложный объект для исследования. Поэтому изучаются различные предельные случаи, поддающиеся анализу. Одно из физически содержательных приближений получается при условии, что длина волны, распространяющейся в слое жидкости постоянной глубины h , велика

по сравнению с глубиной, т.е. $h/\lambda \ll 1$. Для реализации этого приближения удобно перейти к безразмерным переменным

$$\frac{x}{\lambda}, \quad \frac{z+h}{h}, \quad \frac{t}{t_0}, \quad \frac{\zeta}{A}, \quad \frac{\psi}{B}.$$

Здесь A — амплитуда волны, $t_0 = \lambda/a$, $a = \sqrt{gh}$ — скорость распространения волны в линейном приближении (задача 1.325). Из второго уравнения системы (1.90), записанного в новых переменных (они обозначены прежними символами),

$$\frac{B}{t_0} \psi_t + \frac{B^2}{2\lambda^2} \psi_x^2 + \frac{B^2}{2h^2} \psi_z^2 + g A \zeta = 0,$$

следует, что $B = g t_0 A$. Введение безразмерных переменных преобразует систему (1.90) к виду

$$\begin{aligned} \beta \psi_{xx} + \psi_{zz} &= 0, \quad 0 < z < 1 + \alpha \zeta, \\ \psi_t + \frac{\alpha}{2} \psi_x^2 + \frac{\alpha}{2\beta} \psi_z^2 + \zeta &= 0, \\ \zeta_t + \alpha \psi_x \zeta_x - \frac{1}{\beta} \psi_z &= 0 \text{ при } z = 1 + \alpha \zeta, \\ \psi_z|_{z=0} &= 0, \end{aligned} \tag{1.96}$$

где $\alpha = A/h$, $\beta = h^2/\lambda^2$ — безразмерные параметры.

Пусть

$$\psi(x, z, t) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x, t) z^n.$$

Этот ряд будет формальным решением первого уравнения системы (1.96), если

$$\sum_{n=0}^{\infty} \beta \frac{\partial^2 f_n}{\partial x^2} z^n + \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) f_n(x, t) z^{n-2} = 0,$$

откуда

$$(n+1)(n+2) f_{n+2} = -\beta \frac{\partial^2 f_n}{\partial x^2}, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

Из условия $\psi_z|_{z=0} = 0$ следует, что $f_1 = 0$, поэтому $f_{2m+1} = 0$ при $m \in \mathbb{N}_0$; остальные коэффициенты определяются рекуррентной формулой

$$(2m+1)(2m+2) f_{2m+2} = -\beta \frac{\partial^2 f_{2m}}{\partial x^2}, \quad m \in \mathbb{N}_0. \tag{1.97}$$

Если записать n тождеств (1.97) для $m = 0, 1, 2, \dots, n-1$ и каждое продифференцировать по x в зависимости от номера $2(n-m-1)$ раз, то это приведет к следующей системе:

$$\begin{aligned} 1 \cdot 2 \frac{\partial^{2(n-1)} f_2}{\partial^{2(n-1)} x} &= -\beta \frac{\partial^{2n} f_0}{\partial x^{2n}}, \\ 3 \cdot 4 \frac{\partial^{2(n-2)} f_4}{\partial^{2(n-2)} x} &= -\beta \frac{\partial^{2(n-1)} f_2}{\partial x^{2(n-1)}}, \\ &\vdots \\ (2n-1) \cdot 2n f_{2n} &= -\beta \frac{\partial^2 f_{2(n-1)}}{\partial x^2}. \end{aligned}$$

Посредством почленного перемножения этих n тождеств получается соотношение

$$(2n)! f_{2n} = (-1)^n \beta^n \frac{\partial^{2n} f}{\partial x^{2n}}, \quad f = f_0.$$

Таким образом,

$$\psi = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \beta^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} \frac{\partial^{2n} f}{\partial x^{2n}}.$$

Граничные условия на свободной поверхности принимают вид

$$\zeta + f_t + \frac{\alpha}{2} f_x^2 - \frac{\beta}{2} (1 + \alpha \zeta)^2 (f_{xxt} + \alpha f_x f_{xxx} - \alpha f_{xx}^2) + O(\beta^2), \quad (1.98)$$

$$\zeta_t + ((1 + \alpha \zeta) f_x)_x - \frac{\beta(1 + \alpha \zeta)^2}{2} \left[\frac{1}{3} (1 + \alpha \zeta) f_{xxxx} + \alpha \zeta_x f_{xxx} \right] + O(\beta^2). \quad (1.99)$$

Пусть α и β — малые величины одного порядка; если в уравнениях (1.98) сохранить члены первого порядка по β и ввести функцию $u = f_x$, то получится нелинейная система уравнений Буссинеска

$$\begin{aligned} u_t + \alpha u u_x + \zeta_x - \frac{\beta}{2} u_{xxt} &= 0, \\ \zeta_t + [(1 + \alpha \zeta) u]_x - \frac{\beta}{6} u_{xxx} &= 0. \end{aligned} \quad (1.100)$$

Эта система описывает распространение нелинейных волн малой амплитуды на мелкой воде.

1.333. Вывести систему уравнений мелкой воды (1.92) из системы уравнений Буссинеска (1.100).

1.334. Показать, что волны малой амплитуды, распространяющиеся на мелкой воде только в одном направлении, описываются (в размерных переменных) уравнением КдФ

$$\zeta_t + a \left(1 + \frac{3\zeta}{2h}\right) \zeta_x + \frac{1}{6}h^2 a \zeta_{xxx} = 0, \quad (1.101)$$

где h — глубина жидкости, $a = \sqrt{gh}$ — скорость волны в линейном приближении.

Поставить задачи 1.335–1.338 для определения скорости V вязкой несжимаемой жидкости, пренебрегая действием массовых сил. Функция V удовлетворяет уравнению Навье–Стокса

$$\frac{dV}{dt} + \frac{1}{\rho} \nabla P = \nu \Delta V, \quad (1.102)$$

где ν — кинематическая вязкость, скорость жидкости у твердой поверхности равна скорости соответствующей точке поверхности.

1.335. Жидкость заполняет пространство между параллельными плоскостями $x = 0$ и $x = l$. Плоскость $x = 0$ неподвижна, а плоскость $x = l$ движется с момента $t = 0$ с постоянной скоростью $V_0 e_z$. Давление вдоль оси Ox постоянно.

1.336. Стационарный поток жидкости течет в трубе ($0 < z < l$), поперечное сечение которой постоянно (область Ω с кусочно-гладкой границей $\partial\Omega$); давление на концах трубы $P(0) = P_1$ и $P(l) = P_2$, где P_1 и P_2 — постоянные величины.

1.337. Неподвижный полый цилиндр, радиус которого r_0 , высота l , заполнен жидкостью. С момента $t = 0$ цилиндр начинает вращаться около своей оси с постоянной угловой скоростью ω .

1.338. В полубесконечной трубе ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z$) течет стационарный поток жидкости, скорость которой в сечении $z = 0$ постоянна и равна $u_0 e_z$. Считая, что $V_r \ll V_z$, $\frac{\partial^2 V_z}{\partial z^2} \ll \frac{\partial^2 V_z}{\partial r^2}$, линеаризовать систему уравнений гидродинамики, заменив множитель V_z в нелинейных членах уравнений средним по сечению значением скорости V .

Пример 1.21. Движение жидкостей и газов в пористых средах называется *фильтрацией*. В теории фильтрации рассматриваются среды, размер пор в которых достаточно мал. Поэтому среду с заполняющей ее жидкостью или газом считают

сплошной. Количественной характеристикой пористой среды служит коэффициент пористости m — отношение объема пор в выделенном элементе к объему этого элемента.

Фильтрация — медленный процесс, поэтому полагают, что температура среды равна температуре внешнего пространства (изотермическая фильтрация). Следовательно, для описания движения жидкости или газа достаточно задать скорость $\mathbf{V}(\mathbf{r}, t)$, плотность $\rho(\mathbf{r}, t)$ и давление $P(\mathbf{r}, t)$ (см. пример 1.16). Одно из уравнений — уравнение непрерывности — следует из закона сохранения (1.34), где $w = m\rho$, $\mathbf{q} = \rho\mathbf{V}$, $Q = 0$, и имеет вид

$$\frac{\partial(m\rho)}{\partial t} + \operatorname{div} \rho\mathbf{V} = 0. \quad (1.103)$$

Второе уравнение связывает скорость фильтрации V и давление P (внешние силы отсутствуют)

$$\mathbf{V} = -\frac{k}{\mu} \nabla P \quad (1.104)$$

и называется *законом Дарси*. Здесь k — коэффициент проницаемости среды, μ — коэффициент динамической вязкости жидкости. Вывод системы уравнений фильтрации завершается написанием уравнения состояния, которое в изотермическом случае имеет вид $\rho = \rho(P)$.

Если жидкость или газ находятся в поле внешних сил $\mathbf{F}$, то закон Дарси (1.104) неприменим. В этом случае используется уравнение Эйлера (1.77) при следующих допущениях: 1) для учета трения, обусловленного вязкостью, в уравнение (1.77) вводят слагаемое $\mathbf{F}_c$ — силу сопротивления, действующую на единицу объема жидкости, и предполагают, что ее структура не зависит от внешних сил $\mathbf{F}$ (гипотеза Жуковского); 2) фильтрация мало отличается от равномерного движения, так что можно пренебречь инерционным членом $\rho d\mathbf{V}/dt$. Этой модели соответствует уравнение $\nabla P = \mathbf{F} + \mathbf{F}_c$; при $\mathbf{F} = 0$ оно совпадает с (1.104), откуда $\mathbf{F}_c = -\frac{\mu}{k}\mathbf{V}$. Таким образом, скорость фильтрации в поле внешних сил связана с давлением соотношением

$$\mathbf{V} = \frac{k}{\mu}(\mathbf{F} - \nabla P), \quad (1.105)$$

частным случаем которого является закон Дарси (1.104). Подстановка V в форме (1.105) и $\rho = \rho(P)$ в (1.103) приводит

к уравнению фильтрации

$$\frac{\partial(m\rho)}{\partial t} = \operatorname{div} \left(\frac{k\rho}{\mu} \nabla P \right) - \operatorname{div} \left(\frac{k\rho}{\mu} \mathbf{F} \right).$$

В задачах 1.339–1.361 построить модели фильтрации, применяя уравнения состояния газа $P = \rho TR$ и жидкости $\rho = \rho(P)$.

1.339. Получить уравнение фильтрации жидкости в однородной пористой среде с учетом силы тяжести; μ , m , k и температура — постоянные величины.

1.340. Горизонтальный цилиндрический пласт ($0 < x < l$) с непроницаемой боковой поверхностью заполнен жидкостью, начальное давление в которой P_0 . Сечение $x = l$ представляет собой тонкую перегородку, расход жидкости (поток скорости) через единицу площади которой пропорционален разности давлений по обе стороны перегородки (коэффициент пропорциональности α задан). Поставить задачу для определения расхода q жидкости через единицу площади сечения $x = 0$, если давление в этом сечении — заданная функция времени $P_1(t)$, давление за перегородкой — P_0 , внешние силы отсутствуют, μ , m , k и температура — постоянные величины.

1.341. Горизонтальный круговой пласт (толщина H , радиус r_2) с непроницаемой поверхностью заполнен жидкостью, начальное давление в которой P_0 . В центре пласта пробита скважина (радиус $r_1 < r_2$), давление в которой $P_1 < P_0$. Поставить задачу фильтрации, если внешние силы отсутствуют, μ , m , k и температура — постоянные величины.

1.342. Так как реальные жидкости (вода, нефть) сжимаемы, то в процессе фильтрации происходит деформация среды. Она обусловлена изменением давления P и проявляется в изменении объема пор (объем твердых частиц пористой среды остается постоянным). Таким образом, в изотермическом случае величины ρ , μ , m , k зависят только от P . При фильтрации в естественных условиях жидкость является малосжимаемой и достаточно ограничиться уравнением состояния в линейном приближении

$$\rho = \rho_0 \left(1 + \frac{P - P_0}{K_\rho} \right), \quad \frac{|P - P_0|}{K_\rho} \ll 1,$$

где K_ρ — модуль объемного сжатия. Отсюда следует, что

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\rho_0}{K_\rho} \frac{\partial P}{\partial t}.$$

Аналогичные соотношения справедливы и для других величин (см. [5]):

$$\frac{\partial m}{\partial t} = \frac{m_0}{K_m} \frac{\partial P}{\partial t}, \quad \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{k}{\mu} \right) = \frac{k_0}{\mu_0 K_k} \frac{\partial P}{\partial t}, \quad \frac{|P - P_0|}{K_{m,k}} \ll 1.$$

Показать, что если внешние силы отсутствуют, то при сделанных предположениях уравнение фильтрации (оно называется также уравнением *упругого режима*, или *уравнением пьезопроводности*) имеет вид

$$P_t = a^2 \Delta P, \quad a^2 = \frac{k_0}{\mu_0 m_0} \left(\frac{1}{K_m} + \frac{1}{K_\rho} \right)^{-1}.$$

1.343. Горизонтальный цилиндрический пласт ($0 < x < l$) с непроницаемой боковой поверхностью заполнен малосжимаемой жидкостью, начальное давление в которой P_0 , давления в сечениях $x = 0$ и $x = l$ постоянны и равны, соответственно, P_1 и P_0 . Поставить задачу изотермической фильтрации.

1.344. Горизонтальный круговой пласт (толщина H , радиус r_2) с непроницаемыми основаниями заполнен малосжимаемой жидкостью, давление в которой P_0 . Поверхность $r = r_2$ представляет собой тонкую перегородку, расход жидкости (поток скорости) через единицу площади которой пропорционален разности давлений по обе стороны перегородки (коэффициент пропорциональности α задан). После того, как в центре пласта пробурили скважину, радиус которой $r_1 < r_2$, начался процесс изотермической фильтрации. Поставить задачу для расхода жидкости Q через поверхность скважины, если давление в ней $P_1 < P_0$, где P_0 — давление вне пласта.

1.345. Газ движется в пористой среде; μ , m , k и температура — постоянные величины, внешние силы отсутствуют. Получить уравнение фильтрации

$$\frac{\partial P^2}{\partial t} = a^2 P \Delta P^2, \quad a^2 = \frac{k}{\mu m}. \quad (1.106)$$

1.346. Горизонтальный цилиндрический пласт ($0 < x < l$) заполнен газом; μ , m , k и температура — постоянные величины,

внешние силы отсутствуют. Поставить задачу фильтрации, если начальное давление в пласте P_0 , давление в сечении $x = 0$ — заданная функция времени $P_1(t)$, а остальная поверхность непроницаема для газа.

1.347. В центре круглого горизонтального пласта (радиус r_2 , толщина H) с непроницаемыми основаниями пробита скважина, радиус которой $r_1 < r_2$. Пласт заполнен газом, начальное давление которого P_0 . Считая фильтрацию изотермической, поставить задачу для определения расхода Q газа (потока скорости) через поверхность скважины, если давление в ней $P_1 < P_0$, давление на внешней поверхности $r = r_2$ пласта P_0 ; μ , m , k — постоянные величины.

1.348. Горизонтальный цилиндрический пласт ($0 < x < l$) с непроницаемой боковой поверхностью заполнен газом. Поставить задачу для определения плотности потока q газа через поперечное сечение пласта в процессе стационарной фильтрации, если давления при $x = 0$ и $x = l$ равны, соответственно, P_1 и P_2 ; μ , m , k и температура T — постоянные величины.

1.349. Горизонтальный пласт с непроницаемыми основаниями, имеющий форму плоской линзы, радиус которой r_2 , заполнен газом. В центре линзы пробита скважина, радиус которой $r_1 < r_2$. Внешняя поверхность $r = r_2$ пласта представляет собой тонкую перегородку, расход газа (поток скорости) через единицу площади перегородки пропорционален разности давлений по обе ее стороны (коэффициент пропорциональности α задан). Поставить задачу для определения плотности потока q газа через поверхность скважины в процессе стационарной фильтрации, если давление в скважине P_1 , давление вне пласта $P_2 > P_1$; μ , m , k и температура T — постоянные величины.

1.350. Горизонтальный пористый пласт находится на непроницаемом основании (водоупоре). Часть пласта (по высоте) заполнена жидкостью, на свободную поверхность которой действует постоянное внешнее давление P_0 . Из-за оттока жидкости (через стенки скважин и дренажных галерей) ее уровень понижается и возникает фильтрация под действием сил тяжести (безнапорная фильтрация). В системе координат, ось Oz которой направлена вертикально вверх, уравнение основания пласта $z = -H_0(x, y)$, уравнение свободной поверхности $z = \zeta(x, y, t)$. Движение жидкости рассматривается в рамках следующей модели: 1) давление меняется мало, поэтому пористая среда не деформируема

(m, k — константы), а жидкость несжимаема; 2) вертикальная компонента скорости много меньше ее горизонтальной компоненты, так что полное давление равно гидростатическому. Вывести уравнение безнапорной фильтрации (уравнение Буссинеска):

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = a^2 \operatorname{div}[(\zeta + H_0) \nabla \zeta], \quad a^2 = \frac{2\rho g}{\mu m}.$$

1.351. Поставить задачу безнапорной фильтрации (см. предыдущую задачу) в тонком вертикальном пористом пласте ($0 < x < l$) с непроницаемым основанием $z = 0$, если начальная высота жидкости h_0 , ее уровень в сечении $x = 0$ меняется со временем по закону $h_1(t)$, $h_1(0) = h_0$; уровень в сечении $x = l$ при любом $t > 0$ равен h_0 .

1.352. Поставить задачу (см. задачу 1.350) безнапорной фильтрации в тонком пористом пласте ($r_1 < r < r_2$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z < h_0$) с непроницаемым основанием $z = 0$, если начальная высота жидкости h_0 , ее уровень в скважине — заданная функция времени $h_1(t)$; $h_1(0) = h_0$, уровень на внешней границе $r = r_2$ при любом $t > 0$ равен h_0 .

1.353. Тонкий вертикальный пористый пласт ($0 < x < l$) с непроницаемым основанием $z = 0$ граничит со скважиной по плоскости $x = 0$. Поставить задачу для определения формы свободной поверхности жидкости в процессе установившейся безнапорной фильтрации (см. задачу 1.350), если уровень жидкости в скважине равен H , а ее расход (поток скорости, направленный к скважине) через вертикальную полосу единичной ширины сечения $x = 0$ равен q .

1.354. Тонкий горизонтальный пласт с непроницаемым основанием $z = 0$ ограничен вертикальными цилиндрическими поверхностями $r = r_1$ (поверхность скважины) и $r = r_2 > r_1$. Поставить задачу для вычисления формы свободной поверхности жидкости в процессе установившейся безнапорной фильтрации (см. задачу 1.350), если уровень жидкости у поверхности $r = r_1$ равен H , а ее расход (поток скорости, направленный к скважине) через эту поверхность равен Q .

1.355. Горизонтальный цилиндрический пласт ($0 < x < l$) с непроницаемой боковой поверхностью заполнен: в момент времени $t = 0$ нефтью на участке ($0 < x < L_0$) и водой — на участке ($L_0 < x < l$). Сечение $x = 0$ граничит со скважиной, давление в которой P_1 , давление в сечении $x = l$ равно $P_2 > P_1$.

В процессе фильтрации, обусловленной разностью давлений, происходит вытеснение нефти в скважину. Считая обе жидкости несжимаемыми, поставить задачу для определения координаты границы $L(t)$ между водой и нефтью. Характеристики нефти μ_1 , k_1 , воды — μ_2 , k_2 ; коэффициент пористости пласта m и температура — постоянные величины.

1.356. Однородный горизонтальный пласт с непроницаемыми основаниями имеет форму плоской линзы, радиус которой r_2 . В центре линзы пробита скважина, радиус которой $r_1 < r_2$. В момент времени $t = 0$ часть линзы ($r_1 < r < R_0$) заполнена нефтью, остальная часть — водой. В процессе фильтрации, обусловленной разностью давлений P_1 в скважине и $P_2 > P_1$ на внешней поверхности $r = r_2$ пласта, нефть вытесняется в скважину. Считая обе жидкости несжимаемыми, поставить задачу для расчета радиуса $R(t)$ поверхности раздела воды и нефти. Характеристики нефти μ_1 , k_1 , воды — μ_2 , k_2 ; коэффициент пористости m и температура — постоянные величины.

1.357. Горизонтальный пористый пласт с непроницаемыми основаниями имеет форму плоской линзы, радиус которой r_2 . В центре пласта пробита скважина, радиус которой $r_1 < r_2$. В момент времени $t = 0$ часть пласта ($r_1 < r < R_0$) заполнена газом, остальная часть — водой, давление в пласте P_0 . В процессе фильтрации, обусловленной разностью давлений P_0 на внешней поверхности $r = r_2$ пласта и $P_1 < P_0$ в скважине, газ вытесняется в скважину. Считая воду несжимаемой, поставить задачу фильтрации. Характеристики газа μ_1 , k_1 , воды μ_2 , k_2 ; коэффициент пористости m и температура — постоянные величины, величины давлений P_1 и P_2 не зависят от времени.

1.358. При движении газа в пористой среде с достаточно мелкими порами (например, в угольном пласте) происходит конденсация молекул на поверхности раздела двух фаз — сорбция (см. [36]). Масса M газа, адсорбированного в единице объема, зависит от давления и описывается эмпирической формулой Ленгмюра

$$M = \frac{abP}{1 + aP},$$

где a и b — постоянные. Вывести уравнение изотермической фильтрации в недеформируемой среде

$$\Delta P^2 = \frac{\mu}{k} \left[m + \frac{abRT}{(1 + aP)^2} \right] \frac{1}{P} \frac{\partial P^2}{\partial t}, \quad (1.107)$$

где T — температура, R — газовая постоянная.

1.359. В цилиндрическом угольном пласте ($0 < x$) с непроницаемой боковой поверхностью движется газ. Поставить (в одномерном приближении) задачу изотермической фильтрации с учетом сорбции газа (см. предыдущую задачу), если начальное давление в пласте P_0 , давление во внешней среде в любой момент времени $t > 0$ постоянно и равно P_1 .

1.360. В горизонтальном угольном пласте ($0 < x$, $0 < y$, $|z| < H$) с непроницаемыми основаниями $z = \pm H$ движется газ. Поставить задачу изотермической фильтрации с учетом сорбции газа (см. задачу 1.358), если начальное давление в пласте P_0 , давление во внешней среде при любом $t > 0$ постоянно и равно P_1 .

1.361. Горизонтальный угольный пласт ($0 < |z| < H$) с непроницаемыми основаниями $z = \pm H$ заполнен газом, начальное давление которого P_0 , давление вне пласта при $t > 0$ равно P_1 , где P_0 и P_1 — постоянные величины. В процессе выработки угля граница $y = 0$ пласта перемещается параллельно оси Ox с постоянной скоростью V_0 . Поставить задачу изотермической фильтрации с учетом сорбции газа (см. задачу 1.358).

1.4. Модели электродинамики

Пример 1.22. 1. Вывод системы уравнений для тока и потенциала линии, единица длины которой обладает активным сопротивлением R , самоиндукцией (или индуктивностью) L , емкостью C (относительно земли), утечкой G (количество заряда, стекающего на землю с единицы длины линии в единицу времени, пропорционально разности потенциалов между линией и землей, G — коэффициент пропорциональности). Свойства линии зависят от параметров R, L, C, G . Различают несколько типов линий: кабель ($L = G = 0$), линия без потерь ($R = G = 0$), линия без искажений ($RC = LG$); в последнем случае волны распространяются вдоль линии без изменения формы.

2. Постановка задачи для потенциала и тока в линии ($0 < x < l$) без искажения, к концу $x = 0$ которой в момент $t = 0$ подключается батарея с э.д.с. $E(t)$, а конец $x = l$ заземлен (рис. 1.20); начальный ток и начальный потенциал заданы.

Решение п. 1. Сила переменного тока частоты ν , а также потенциал зависят от x . Это связано с конечностью скорости c распространения электромагнитного поля: изменение тока в точке $x = 0$ достигает точки $x = l$ не мгновенно, а через время $\tau = l/c$. Если τ много меньше характерного времени,




Рис. 1.20

в течение которого меняется поле, т.е. времени порядка $1/\nu$, то можно пренебречь зависимостью от x (поле распространяется с бесконечной скоростью) и применить теорию квазистационарных токов. Если условие квазистационарности не выполнено, то закон Ома не применим. Например, в случае периодического поля существуют различные точки x_1 и x_2 , потенциал которых в данный момент времени одинаков при ненулевом токе. В реальных линиях условие квазистационарности $l\nu \ll c$ не выполняется (длинные линии, широкий спектр частот). Поэтому рассматривают столь малый элемент линии, на котором поле квазистационарно, и полученные уравнения применяют ко всей линии. Условия правомерности такого подхода имеются в [86].

Вывод системы уравнений для тока $i(x, t)$ и потенциала $u(x, t)$ линии основан на законе Ома для элемента Δx при условии квазистационарности и законе сохранения заряда. Уравнение закона Ома

$$u|_x - u|_{x+\Delta x} = iR\Delta x + i_t L\Delta x$$

и уравнение закона сохранения заряда

$$(i|_x - i|_{x+\Delta x})\Delta t = (u|_{t+\Delta t} - u|_t)C\Delta x + G\Delta x\Delta t$$

после деления на Δx , Δt и перехода к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$, $\Delta t \rightarrow 0$ составляют систему телеграфных уравнений

$$\begin{aligned} u_x + i_t L + i R &= 0, \\ i_x + u_t C + u G &= 0. \end{aligned}$$

Уместно заметить, что второе уравнение следует из соотношения (1.34), в котором $w = Cu$, $q = i$, $Q = -Gu$.

Решение п.2. Краевые условия в точке $x_0 = 0$ или $x_0 = l$ выражают закон Ома для участка Δx цепи, примыкающего к x_0 , и закон сохранения заряда для элемента Δx . Если в точке x_0

имеется батарея с э.д.с. $E(t)$, сопротивление R_0 , индуктивность L_0 , конденсатор C_0 , включенные последовательно, то граничные условия имеют вид

$$\begin{aligned} i(x_0 - 0, t) &= i(x_0 + 0, t), \\ u(x_0 - 0, t) - u(x_0 + 0, t) + E(t) &= \\ &= i(x_0, t)R_0 + i_t(x_0, t)L_0 + \frac{q(t)}{C_0}, \quad (1.108) \\ q(t) &= q_0 + \int_0^t i(x_0, \tau) d\tau, \end{aligned}$$

q_0 — начальный заряд конденсатора; э.д.с. $E(t)$ берется со знаком плюс, если обусловленный ею ток течет в положительном направлении оси Ox .

Согласно условию, если $x_0 = 0$, то $R_0 = L_0 = 1/C_0 = 0$, $u(-0, t) = 0$, а $u(+0, t) = u(0, t)$, поэтому $u(0, t) = E(t)$; если $x_0 = l$, то $u(l, t) = 0$. Таким образом, $i(x, t)$ и $u(x, t)$ являются решением задачи

$$\begin{cases} u_x + i_t L + i R = 0, \\ i_x + u_t C + u G = 0, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) = E(t), \quad u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = u_0(x), \quad i(x, 0) = i_0(x). \end{cases}$$

Чтобы поставить задачу для потенциала, нужно исключить ток из уравнений, а также из граничных и начальных условий. Потенциал удовлетворяет уравнению

$$LCu_{tt} = u_{xx} - (RC + LG)u_t - RGu.$$

Задача для потенциала запишется в виде

$$\begin{aligned} u_{tt} &= a^2 u_{xx} - 2\beta u_t - \beta^2 u, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) &= E(t), \quad u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) &= u_0(x), \quad u_t(x, 0) = -\beta u_0(x) - \frac{1}{C} i'_0(x), \end{aligned}$$

где $a^2 = \frac{1}{LC}$, $\beta = \frac{R}{L}$. Аналогично ставится задача для тока:

$$\begin{aligned} i_{tt} &= a^2 i_{xx} - 2\beta i_t - \beta^2 i, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ i_x(0, t) &= -GE(t) - CE'(t), \quad i_x(l, t) = 0, \\ i(x, 0) &= i_0(x), \quad i_t(x, 0) = -\beta i_0(x) - \frac{1}{L} u'_0(x), \end{aligned}$$

где $E'(t)$ — обобщенная производная (см. задачу 1.370).

Поставить задачи 1.362–1.370 для определения потенциала в линии ($0 < x < l$) при нулевых начальных условиях и задачу 1.371.

1.362. Конец ($x = l$) линии с параметрами L, C ($R = G = 0$) заземлен через конденсатор C_0 , а к другому концу подключается батарея с э.д.с. $E(t)$.

1.363. Один конец ($x = l$) линии с параметрами L, C ($R = G = 0$) заземлен, а к другому концу подключается через индуктивность L_0 батарея с э.д.с. $E(t)$.

1.364. Конец $x = 0$ линии с параметрами L, C ($R = G = 0$) заземлен, а на другом конце находится конденсатор C_0 с зарядом q_0 . В момент времени $t = 0$ конец $x = 0$ изолируют, а конденсатор заземляют.

1.365. Конец $x = 0$ линии с параметрами L, C ($R = G = 0$) заземлен, а к концу $x = l$ в момент времени $t = 0$ подключается через конденсатор C_0 батарея с постоянной э.д.с. E_0 .

1.366. Конец $x = l$ линии с параметрами R, C ($L = G = 0$) заземлен через сопротивление R_0 , а к другому концу в момент времени $t = 0$ подключена батарея с э.д.с. $E(t)$.

1.367. Конец $x = 0$ линии с параметрами R, C ($L = G = 0$) заземлен через сопротивление R_1 , а к другому концу подключается через сопротивление R_2 батарея с э.д.с. $E(t)$.

1.368. Конец $x = 0$ линии без утечки подключается к батарее с э.д.с. $E(t)$, а другой конец заземляется через сосредоточенное сопротивление R_0 .

1.369. В точку $x_0 \in (0; l)$ линии с пренебрежимо малой индуктивностью помещают заряд q_0 ; концы линии заземлены.

1.370. Конец $x = l$ линии без искажения ($RC = LG$) заземлен через сопротивление R_0 , а к другому концу подключается через индуктивность L_0 батарея с эдс $E(t)$. Рассмотреть частный случай $E(t) = E_0$.

1.371. Бесконечная линия ($-\infty < x < \infty$) составлена из двух различных частей; параметры линии $L(x) = G(x) = 0$,

$$R(x) = \begin{cases} R_1, & x < 0, \\ R_2, & 0 < x, \end{cases} \quad C(x) = \begin{cases} C_1, & x < 0, \\ C_2, & 0 < x. \end{cases}$$

В момент времени $t = 0$ потенциал равен $u_0(x)$.

1.372. Конец полуограниченной линии ($0 < x$) заземлен через конденсатор, емкость которого C_0 , начальный заряд q_0 . Поставить задачу для определения заряда $q(t)$ конденсатора, если параметры линии: 1) L, C ($R = G = 0$); 2) R, C ($L = G = 0$).

Поставить задачи 1.373–1.378 для определения тока в линии.

1.373. Концы $x = 0$ и $x = l$ линии с пренебрежимо малой индуктивностью ($L = 0$) изолированы, потенциал линии постоянен и равен u_0 . В момент времени $t = 0$ конец $x = l$ заземляют.

1.374. Конец $x = 0$ линии с параметрами R, C, G ($L = 0$) заземлен через конденсатор C_0 , а к концу $x = l$ в момент времени $t = 0$ подключается через сосредоточенное сопротивление R_0 батарея с постоянной э.д.с. E_0 .

1.375. Конец $x = 0$ линии без утечки ($G = 0$) заземлен, а к концу $x = l$ в момент $t = 0$ подключается батарея с э.д.с. $E(t)$ через: 1) сосредоточенное сопротивление R_0 ; 2) сосредоточенную индуктивность L_0 ; 3) конденсатор C_0 . Рассмотреть случаи: 1) $E(t) = E_0 \sin \omega t$; 2) $E(t) = E_0$, где E_0 — постоянная величина.

1.376. Конец $x = 0$ линии с параметрами R, C ($L = G = 0$) заземлен, а к концу $x = l$ в момент времени $t = 0$ подключается через сопротивление R_0 батарея с постоянной э.д.с. E_0 .

1.377. К концу $x = 0$ линии ($0 < x < l$) с параметрами R, L, C, G подключается через сопротивление R_0 батарея с э.д.с. $E(t)$, а другой конец заземляется через конденсатор C_0 .

1.378. Бесконечная линия ($-\infty < x < \infty$) составлена из двух различных частей; параметры линии $R(x) = G(x) = 0$,

$$L(x) = \begin{cases} L_1, & x < 0, \\ L_2, & 0 < x, \end{cases} \quad C(x) = \begin{cases} C_1, & x < 0, \\ C_2, & 0 < x. \end{cases}$$

Начальные ток и потенциал, соответственно, равны $i_0(x)$ и $u_0(x)$.

1.379. Концы $x_0 = 0$, $x_N = Nl$ линии заземлены, а к точкам с координатами $x_j = jl$, где $j = 1, 2, \dots, N-1$, подключаются конденсаторы переменной емкости $C(u) = C(1 - \alpha u^n)$, $\alpha > 0$, $n > 0$ (рис. 1.21); каждый из участков (x_j, x_{j+1}) , $j = 0, 1, \dots, N-1$, обладает индуктивностью L_0 , которую можно считать сосредоточенной, а остальные параметры равны нулю.

Показать, что в приближении непрерывной модели (т.е. линии с непрерывно распределенными параметрами L, C) волны,

распространяющиеся только в одном направлении, описываются уравнением КдФ, если емкость конденсатора линейно зависит от напряжения, или мКдФ, если эта зависимость квадратична.




Рис. 1.21

Пример 1.23. Однородный шар, радиус которого r_0 , магнитная проницаемость μ , внесен в однородное магнитное поле $\mathbf{H}_0$. Поставить задачу для определения результирующего магнитного поля в пространстве.

Электромагнитное поле в однородной изотропной среде с проводимостью σ , диэлектрической проницаемостью ε и магнитной проницаемостью μ описывается системой уравнений Максвелла,

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \mathbf{H} &= \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}, \\ \operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \operatorname{div} \mathbf{B} &= 0, \\ \operatorname{div} \mathbf{D} &= 4\pi\rho, \end{aligned} \quad (1.109)$$

к которым присоединяются уравнения, характеризующие свойства среды,

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}. \quad (1.110)$$

Так как $\mathbf{E} = 0$, $\mathbf{j} = 0$, а $\mathbf{H}$ не зависит от времени (магнитостатика), то уравнения (1.109), (1.110) сводятся к системе

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \mathbf{H} &= 0, \\ \operatorname{div} (\mu \mathbf{H}) &= 0. \end{aligned}$$

Из условия потенциальности поля вытекает существование скалярного потенциала $u(\mathbf{r})$, так что $\mathbf{H} = -\nabla u$. Следовательно, функция u удовлетворяет уравнению

$$\operatorname{div} (\mu \nabla u) = 0.$$

На границе S раздела двух сред это уравнение неприменимо, так как функция μ разрывна на S . Роль уравнения выполняют условия "сшивки" функции $u(\mathbf{r})$ и ее нормальных производных, которые вытекают из граничных условий для векторов $\mathbf{H}$ и $\mathbf{B}$: тангенциальная составляющая вектора $\mathbf{H}$ и нормальная составляющая вектора $\mathbf{B}$ непрерывны на границе S . Отсюда следует, что на S потенциал непрерывен, иначе поле $\mathbf{H} = -\nabla u$ было бы неограниченным (это условие эквивалентно непрерывности тангенциальной составляющей магнитного поля $\mathbf{H}$ на границе раздела двух сред). Непрерывность нормальной составляющей магнитной индукции $\mathbf{B}$ на границе приводит к непрерывности функции $(\mathbf{B}\mathbf{n}) = (-\mu\nabla u\mathbf{n}) = -\mu \frac{\partial u}{\partial n}$ на S . На больших расстояниях влияние шара мало, поэтому

$$\mathbf{H}_0 \approx -\nabla u \implies \frac{\partial u}{\partial z} \approx -H_0 \implies u \approx -H_0 z = -H_0 r \cos \theta$$

(константа интегрирования $C = 0$). Таким образом, потенциал является решением задачи

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r < r_0, \quad r_0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$u|_{r_0-0} = u|_{r_0+0}, \quad \mu_0 \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r_0-0} = \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r_0+0},$$

$$|u| < \infty, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{u}{r} = H_0 \cos \theta.$$

Поставить задачи 1.380–1.400 для определения электро- или магнитостатического поля.

1.380. В пространстве с диэлектрической проницаемостью

$$\varepsilon(x, y, z) = \begin{cases} \varepsilon_1, & 0 < z, \\ \varepsilon_2, & z < 0, \end{cases}$$

расположен точечный заряд Q в точке $M(0, 0, h)$, где $h > 0$. Рассмотреть частный случай $h = 0$.

1.381. В пространстве с диэлектрической проницаемостью

$$\varepsilon(x, y, z) = \begin{cases} \varepsilon_1, & 0 < y, \\ \varepsilon_2, & y < 0, \end{cases}$$

находится нить с зарядом q на единицу длины; нить параллельна оси Oz и пересекает плоскость xOy в точке P с координатами $x = 0, y = h > 0$. Рассмотреть частный случай $h = 0$.

1.382. Сферический слой ($r_1 < r < r_2$), диэлектрическая проницаемость которого постоянна и равна ε , находится в однородном электрическом поле $\mathbf{E}_0$.

1.383. Однородная труба ($r_1 < r < r_2$) из магнетика с магнитной проницаемостью μ внесена в однородное магнитное поле $\mathbf{H}_0$, перпендикулярное к оси трубы.

1.384. Однородный шар, радиус которого r_0 , равномерно заряжен; плотность заряда ρ , диэлектрическая проницаемость ε .

1.385. На сфере, радиус которой r_0 , расположен заряд, плотность которого равна $\sigma(\theta, \varphi)$.

1.386. Шар равномерно поляризован, радиус шара r_0 , поляризация (дипольный момент единицы объема) $\mathbf{P}$ — постоянный вектор.

1.387. Точечный заряд Q расположен на расстоянии d от центра шара, радиус которого $r_0 < d$, диэлектрическая проницаемость ε .

1.388. Тонкое кольцо, радиус которого r_0 , равномерно заряжено; заряд кольца Q .

1.389. Радиус тонкого проводящего диска r_0 , заряд Q .

1.390. Бесконечная равномерно заряженная нить с зарядом q на единицу длины расположена на расстоянии d от центра проводящего заземленного шара, радиус которого $r_0 < d$.

1.391. Внутри проводящей заземленной сферы, радиус которой r_0 , на расстоянии d от центра расположен точечный электрический диполь, момент которого $p\mathbf{e}_r$.

1.392. Вне проводящего заземленного шара, радиус которого r_0 , на расстоянии d от центра расположен точечный электрический диполь с моментом p , перпендикулярным к радиусу.

1.393. Проводящая плоскость $y = 0$ заземлена. Равномерно заряженная бесконечная нить, дипольный момент единицы длины которой: 1) $\mathbf{p} = p\mathbf{e}_y$; 2) $\mathbf{p} = p\mathbf{e}_x$, перпендикулярна к плоскости xOy и пересекает ее в точке P с координатами $x = 0$, $y = h$.

1.394. Поставить задачу для определения магнитного поля $\mathbf{H}$ и магнитной индукции $\mathbf{B}$ равномерно намагниченного ферромагнитного шара, радиус которого r_0 , намагниченность (магнитный момент единицы объема) $\mathbf{M}$.

1.395. Равномерно намагниченный шар, радиус которого r_0 , диэлектрическая проницаемость ε , намагниченность $\mathbf{M}$, вращается с постоянной угловой скоростью ω ($\omega r_0 \ll c$) около диаметра, параллельного вектору $\mathbf{M}$. Используя решение задачи 2.878, поставить задачу для определения электрического поля шара.

1.396. Конечным продуктом эволюции звезд является (в зависимости от массы звезды) один из трех компактных объектов: *белый карлик, нейтронная звезда, черная дыра*. Эти космические объекты израсходовали ядерное горючее, что привело к уменьшению радиуса, так как давление гравитационных сил не уравнивается термодинамическим давлением.

Нейтронная звезда состоит, в основном, из нейтронов, образовавшихся в процессе сжатия в результате обратного β -распада. Давление гравитационных сил уравнивается давлением нейтронного газа. Наиболее простая модель нейтронной звезды — идеально проводящий намагниченный шар, радиус которого r_0 , намагниченность $\mathbf{M}$, вращающийся с постоянной угловой скоростью ω ($\omega r_0 \ll c$) около диаметра, параллельного вектору намагниченности. Поставить задачу для определения электрического поля звезды.

1.397. На расстоянии d от центра однородного шара (радиус шара $r_0 < d$, магнитная проницаемость μ_0) расположен точечный виток с током, магнитный момент которого $M \mathbf{e}_r$.

1.398. На поверхности полого цилиндра ($r < r_0$) расположены электрические диполи, плотность момента которых $p(\varphi) \mathbf{e}_r$.

1.399. Полый заземленный цилиндрический проводник, поперечным сечением (плоскостью xOy) которого является ограниченная односвязная область Ω с кусочно-гладкой границей $\partial\Omega$, расположен в поле бесконечной нити, параллельной оси цилиндра; заряд единицы длины нити q_0 ; нить пересекает плоскость xOy в точке $P(x_0, y_0)$. Рассмотреть следующие случаи: 1) $P \in \Omega$; 2) $P \in \overline{\Omega}$.

1.400. Поперечное сечение (плоскостью xOy) цилиндрического (незаземленного) проводника — односвязная ограниченная область Ω с кусочно-гладкой границей $\partial\Omega$. Вне цилиндра параллельно его оси расположена бесконечная нить; заряд единицы длины цилиндра q , линейная плотность заряда нити q_0 , нить пересекает плоскость xOy в точке $P(x_0, y_0)$.

1.401. На оси Oz прямоугольной системы координат $Oxyz$ расположены точечные диполи $p \mathbf{e}_z$ и $-p \mathbf{e}_z$, с координатами $(0; 0; 0)$

и $(0; 0; l)$ соответственно. Предельное положение этой системы зарядов при $l \rightarrow 0$ и постоянстве произведения $4\pi l = D$ называется *точечным квадруполем*. Поставить задачу для определения электрического поля квадруполья.

Поставить задачи 1.402–1.407 для плотности заряда на проводнике, решение которых сводится к определению потенциала $u(\mathbf{r})$ электрического поля $\mathbf{E} = -\nabla u$ и применению формулы $\sigma = \frac{E_n|_S}{4\pi}$, где S — поверхность проводника.

1.402. Проводящий заземленный шар, радиус которого r_0 , помещен в однородное электростатическое поле $\mathbf{E}$.

1.403. Проводящий (незаземленный) шар, радиус которого r_0 , заряд Q_0 , помещен в поле точечного заряда Q , расположенного на расстоянии $d > r_0$ от центра шара.

1.404. Внутри полого проводящего заземленного цилиндра, радиус которого r_0 , находится равномерно заряженная нить; нить параллельна оси цилиндра и отстоит от нее на расстоянии d ; линейная плотность заряда нити q .

1.405. Вне проводящего незаземленного цилиндра, радиус которого r_0 , находится равномерно заряженная нить с линейной плотностью заряда q ; нить параллельна оси и отстоит от нее на расстоянии d .

1.406. Вне проводящего цилиндра, радиус которого r_0 , заряд единицы длины (вдоль оси) q_0 , находится равномерно заряженная нить с линейной плотностью заряда q ; нить параллельна оси и отстоит от нее на расстоянии d .

1.407. На расстоянии d от заземленной проводящей плоскости находится точечный диполь, момент p которого перпендикулярен к плоскости и направлен от нее.

Пример 1.24. Прямой ток $\mathbf{J} = J\mathbf{e}_z$ параллелен оси однородного круглого цилиндра ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $-\infty < z < \infty$) с магнитной проницаемостью μ и расположен на расстоянии $d > r_0$ от оси. *Поставить задачу для определения магнитного поля.*

Так как поле $\mathbf{H}$ не зависит от времени, а поле $\mathbf{E} = 0$ в области, где нет токов, то уравнения (1.109), (1.110) преобразуются к виду

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \mathbf{H} &= \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}, \\ \operatorname{div}(\mu \mathbf{H}) &= 0. \end{aligned} \quad (1.111)$$

В электродинамике вводится векторный потенциал $\mathbf{A}$ посредством соотношения $\mathbf{B} = \text{rot } \mathbf{A}$. Второе уравнение системы (1.111) становится тождеством, а первое принимает вид

$$\text{rot} \left(\frac{1}{\mu} \text{rot } \mathbf{A} \right) = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}. \quad (1.112)$$

Если $\mathbf{A}$ — решение уравнения (1.112), то $\mathbf{A} + \nabla f$, где f — произвольная функция класса C^1 , также решение этого уравнения. Из множества решений выбирают такое, что $\text{div } \mathbf{A} = 0$. Так как $\text{rot rot } \mathbf{A} = \nabla \text{div } \mathbf{A} - \Delta \mathbf{A} = -\Delta \mathbf{A}$, то в среде с постоянной магнитной проницаемостью уравнение (1.112) приводится к виду

$$\Delta \mathbf{A} = -\frac{4\pi\mu}{c} \mathbf{j}. \quad (1.113)$$

В прямоугольной системе координат, ось Oz которой направлена по оси цилиндра, вектор плотности тока параллелен оси Oz , т. е. $\mathbf{j} = j \mathbf{e}_z$, а функции j и μ не зависят от z . Исходя из этого решение уравнения (1.113) естественно отыскивать на множестве векторов, коллинеарных вектору $\mathbf{j}$, т. е. в виде $\mathbf{A} = A \mathbf{e}_z$ ¹⁾, тогда

$$\Delta A = -\frac{4\pi\mu}{c} j. \quad (1.114)$$

Если $\mu(x, y)$ — кусочно-постоянная функция, то в каждой однородной части среды функция $A(x, y)$ удовлетворяет уравнению (1.114). На поверхности S раздела двух сред, где S — кусочно-гладкая поверхность, это уравнение неприменимо, так как в (1.112) μ — разрывная функция. Эквивалентом уравнения для $A(x, y)$ служат граничные условия на S для $\mathbf{H}$ и $\mathbf{B}$: непрерывность тангенциальной составляющей H_τ и нормальной составляющей B_n . На поверхности S функция $A(x, y)$ должна быть непрерывной (иначе была бы неограничена индукция $\mathbf{B} = \text{rot } \mathbf{A}$). Из непрерывности на S тангенциальной составляющей H_τ следует непрерывность функции $\frac{1}{\mu} \frac{\partial A}{\partial n}$, где $\mathbf{n}$ — нормаль к S . В самом деле, вектор $\mathbf{H}$ перпендикулярен к оси Oz и $\text{rot } \mathbf{A} = \text{rot}(A \mathbf{e}_z) = [\nabla A \mathbf{e}_z]$, следовательно, вектор τ перпендикулярен к векторам $\mathbf{e}_z$ и $\mathbf{n}$, поэтому на поверхности S

$$H_\tau = (\mathbf{H} \tau) = \frac{1}{\mu} ([\nabla A \mathbf{e}_z] \tau) = \frac{1}{\mu} ([\mathbf{e}_z \tau] \nabla A) = \frac{1}{\mu} (\mathbf{n} \nabla A) = \frac{1}{\mu} \frac{\partial A}{\partial n}.$$

¹⁾ Если такое решение существует, то в силу единственности других решений нет.

Остается заметить, что на больших расстояниях от оси Oz влияние цилиндра мало, поэтому поле $\mathbf{H}$ определяется током, плотность которого $j = J\delta(\mathbf{r} - \mathbf{d})$, так что $A = O(\ln r)$ (см. (10.15)). Задача для определения $A(x, y)$ является двумерной и ставится следующим образом:

$$\begin{aligned} \Delta A &= 0, & \Delta A &= -\frac{4\pi J}{c} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{d}), \\ 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi & & r_0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ |A| < \infty, & & A &= O(\ln r), \quad r \rightarrow \infty, \\ A|_{r_0-0} &= A|_{r_0+0}, \\ \frac{1}{\mu} \frac{\partial A}{\partial r} \Big|_{r_0-0} &= \frac{\partial A}{\partial r} \Big|_{r_0+0}. \end{aligned}$$

1.408. Получить уравнение для векторного потенциала $\mathbf{A}$ (см. пример 1.24), если магнитная проницаемость среды $\mu(x, y)$ — функция класса C^1 , плотность тока $\mathbf{j} = j(x, y)\mathbf{e}_z$.

1.409. Показать, что силовые линии двумерного поля $\mathbf{B}(x, y)$ в однородной среде определяются уравнением $A(x, y) = C$.

Поставить задачи 1.410–1.429 для определения векторного потенциала.

1.410. По поверхности ($r = r_0, 0 \leq \varphi < 2\pi, -\infty < z < \infty$) цилиндра течет ток, линейная плотность которого $\mathbf{i} = i(\varphi)\mathbf{e}_z$, где $i(\varphi) \in C$.

1.411. На поверхности ($r = r_0, 0 \leq \varphi < 2\pi, -\infty < z < \infty$) цилиндра находится прямой ток $\mathbf{J} = J\mathbf{e}_z$, расположенный в плоскости $\varphi = 0$; магнитная проницаемость цилиндра μ , внешней среды — $\mu = 1$.

1.412. По поверхности ($r = r_0, 0 \leq \varphi < 2\pi, -\infty < z < \infty$) цилиндра течет ток, линейная плотность которого $\mathbf{i} = i(z)\mathbf{e}_\varphi$, где $i(z) \in C$.

1.413. Цилиндр ($r < r_0, 0 \leq \varphi < 2\pi, -\infty < z < \infty$) равномерно заряжен по объему; плотность заряда равна ρ . Цилиндр вращается около оси Oz с постоянной угловой скоростью $\omega\mathbf{e}_z$.

1.414. Круглый виток с током J плотно надет на бесконечный цилиндр, радиус которого r_0 , магнитная проницаемость μ .

1.415. Бесконечный цилиндр (радиус r_0 , магнитная проницаемость μ_1) находится в среде с магнитной проницаемостью μ_2 .

Параллельно оси цилиндра на расстоянии $d < r_0$ от нее расположен ток J .

1.416. Решить предыдущую задачу для полого цилиндра, магнитная проницаемость которого $\mu = 1$, а магнитная проницаемость внешней среды $\mu_2 = \infty$.

1.417. В среде с магнитной проницаемостью $\mu \gg 1$ имеется цилиндрическая полость (радиус полости r_0 , $\mu = 1$). Внутри полости параллельно оси расположены два прямых тока J и $-J$, координаты которых $\mathbf{r}_1$ и $\mathbf{r}_2$ ($\mathbf{r}_1 \neq \mathbf{r}_2$).

1.418. Неограниченный цилиндр, радиус которого r_0 , магнитная проницаемость $\mu \gg 1$, находится в среде с магнитной проницаемостью $\mu = 1$. Параллельно оси цилиндра на расстоянии $d > r_0$ от нее расположен прямой ток J .

1.419. Однородный магнетик с магнитной проницаемостью μ занимает полупространство ($z < 0$) и граничит со средой, магнитная проницаемость которой $\mu = 1$. На плоскости ($z = 0$) находится круглый виток с током J ; радиус витка r_0 , координаты его центра $x = y = 0$.

1.420. Однородный магнетик с магнитной проницаемостью μ заполняет полупространство ($y < 0$). Параллельно границе магнетика (вне его) расположен ток $\mathbf{J} = J\mathbf{e}_z$, проходящий через точку с координатами $x = 0, y = h$.

1.421. В среде с магнитной проницаемостью μ имеется воздушный зазор ($-\infty < x, z < \infty, -h < y < h$), внутри которого вдоль оси Oz течет ток $\mathbf{J} = J\mathbf{e}_z$.

1.422. В среде с магнитной проницаемостью $\mu \gg 1$ имеется полость в форме двугранного угла ($0 < r, 0 < \varphi < \alpha$); внутри угла параллельно ребру расположен прямой ток J , координаты которого $r = r_0, \varphi = \varphi_0$.

1.423. В среде с магнитной проницаемостью μ находится виток с током J , радиус которого r_0 .

1.424. В среде с магнитной проницаемостью μ имеется сферическая полость (радиус полости r_0 , магнитная проницаемость $\mu = 1$). Внутри полости расположен круглый виток с током J ; радиус витка $r_1 < r_0$, его центр совпадает с центром полости.

1.425. Железный шар, радиус которого r_0 , магнитная проницаемость $\mu \gg 1$, и виток с током J , радиус которого $r_1 > r_0$, расположены так, что их центры совпадают.

1.426. По сфере ($r = r_0$, $0 < \theta < \pi$, $0 \leq \varphi < 2\pi$) течет ток, линейная плотность которого $\mathbf{i} = i(\theta) \mathbf{e}_\varphi$.

1.427. Равномерно заряженная непроводящая сфера (радиус r_0 , плотность заряда σ) вращается около диаметра с постоянной угловой скоростью ω .

1.428. Равномерно заряженный непроводящий шар (радиус r_0 , объемная плотность заряда ρ) вращается около диаметра с постоянной угловой скоростью ω .

1.429. На поверхности шара, радиус которого r_0 , магнитная проницаемость μ , находится виток с током J , радиус которого $r_1 < r_0$.

Поставить задачи 1.430–1.432 для определения магнитного поля $\mathbf{H}$.

1.430. На плоской границе ($y = 0$) раздела двух сред с магнитными проницаемостями μ (при $y < 0$) и $\mu = 1$ (при $y > 0$) находится прямой ток $\mathbf{J} = J\mathbf{e}_z$, расположенный в плоскости $x = 0$.

1.431. В среде с магнитной проницаемостью $\mu \gg 1$ имеется воздушный зазор, ограниченный плоскостями $y = 0$ и $y = h$. В плоскости yOz параллельно оси Oz расположен прямой ток $J\mathbf{e}_z$, расстояние которого от оси равно y_0 , где $0 < y_0 < h$. Поставить задачу также и для векторного потенциала.

1.432. Соленоид представляет собой бесконечно длинный полый цилиндр, на котором плотно намотан (по спирали) тонкий провод; поперечное сечение цилиндра — односвязная ограниченная область Ω с кусочно-гладкой границей $S = \partial\Omega$; число витков на единицу длины цилиндра N , ток в соленоиде J . Рассмотреть случай: Ω — круг радиуса r_0 .

Пример 1.25. Постоянный ток J втекает в однородный шар $\{x, y, z: x^2 + y^2 + z^2 = r_0^2\}$, проводимость которого σ , через точку поверхности с координатами $x = y = 0$, $z = -r_0$ и вытекает через диаметрально противоположную точку. *Поставить задачу для определения плотности тока в шаре.*

Необходимые уравнения

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = 0, \quad \mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$$

имеются в системе (1.109), (1.110); их надо дополнить уравнением закона сохранения заряда (уравнением непрерывности)

$$\operatorname{div} \mathbf{j} = Q, \quad (1.115)$$

где Q — объемная плотность источников заряда (см.(1.34)). Так как электрическое поле потенциально, то

$$\mathbf{E} = -\nabla u, \quad \mathbf{j} = -\sigma \nabla u.$$

Из (1.115) следует, что потенциал u удовлетворяет уравнению

$$\operatorname{div} \sigma \nabla u = -Q,$$

а соотношение

$$(\mathbf{j} \mathbf{n})|_S = -\sigma(\nabla u \mathbf{n})|_S$$

представляет собой граничное условие на поверхности шара. Итак, для определения плотности тока нужно найти потенциал, который (в данном случае $Q = 0$) является решением задачи

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ |u|_{r=0} < \infty, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=r_0} = -\frac{J}{2\pi r_0^2 \sigma} \left[\frac{\delta(\theta)}{\sin \theta} - \frac{\delta(\theta - \pi)}{\sin \theta} \right].$$

Поставить задачи 1.433–1.448 для определения плотности постоянного тока.

1.433. Однородный шар, радиус которого r_0 , проводимость σ_1 , помещен в среду с проводимостью σ_2 . На расстоянии $d > r_0$ от центра шара находится точечный источник тока J .

1.434. Однородный цилиндр, радиус которого r_0 , проводимость σ_1 , помещен в среду с проводимостью σ_2 . Параллельно оси цилиндра на расстоянии $d < r_0$ от нее находится линейный источник тока, с единицы длины которого поступает ток J .

1.435. В однородном неограниченном цилиндре, радиус которого r_0 , проводимость σ , течет постоянный ток. Источники тока расположены на оси цилиндра, с единицы длины которой в единицу времени выделяется заряд J , плотность тока через поверхность цилиндра $\mathbf{j} = f(\varphi) \mathbf{e}_r$. При постановке задачи указать условия ее разрешимости.

1.436. В полуограниченной пластинке, ширина которой $2H$, толщина $2d$ ($0 < x, -H < y < H, -d < z < d$), течет постоянный

ток J . Ток втекает через линию $y = 0$ на торце $x = 0$ и распределен вдоль нее равномерно.

1.437. В однородном изотропном слое ($0 < y < H$) находится бесконечная нить, с единицы длины которой в единицу времени стекает заряд J . Нить расположена в плоскости yOz параллельно оси Oz и отстоит от оси на расстояние y_0 , где $0 < y_0 < H$.

1.438. Через пластинку ($|x| < l_1, |y| < l_2, 0 < z < h$) протекает ток J . Ток втекает через образующую ($x = -l_1, y = 0$), вытекает через образующую ($x = l_1, y = 0$) и распределен вдоль них равномерно.

1.439. Через круглую пластинку ($r < r_0, 0 \leq \varphi < 2\pi, 0 < z < h$) протекает ток J , линейная плотность которого на входе (образующая $r = r_0, \varphi = \pi$) и на выходе (образующая $r = r_0, \varphi = 0$) постоянна.

1.440. В треугольную пластинку ($0 < x < l, 0 < y < l - x$) втекает через грань $\{x, y: 0 < x < l, x + y = l\}$ ток, плотность которого постоянна и равна j ; грани $x = 0$ и $y = 0$ поддерживаются при постоянном потенциале u_0 .

1.441. Через пластинку ($r < r_0, 0 \leq \varphi < \pi, |z| < h$) пропускают ток J , линейная плотность которого (по толщине пластинки) на входе (образующая $r = 0$) и выходе (образующая $r = 0, \varphi = \pi/2$) постоянна.

1.442. Неограниченная проводящая пластинка, толщина которой d , имеет форму клина с углом $\alpha \in (0; 2\pi)$. Через пластинку протекает постоянный ток J . Ток втекает и вытекает через отрезки прямых, параллельных ребру клина на расстояниях a и b от ребра и равномерно распределен вдоль них (рис. 1.22, а). Проводимость материала пластинки σ .

1.443. Решить предыдущую задачу, если контактные линии расположены на одной и той же грани (рис. 1.22, б.)

1.444. По тонкому проводящему диску ($r < r_0, 0 \leq \varphi < 2\pi$) течет ток J , втекающий и вытекающий соответственно через точки с координатами $r = r_1, \varphi = 0$ и $r = r_1, \varphi = \pi$, где $0 < r_1 < r_0$.

1.445. В сплошной цилиндр ($r < r_0, 0 \leq \varphi < 2\pi, |z| < l$) втекает ток J через центр основания $z = -l$ и вытекает через центр другого основания $z = l$.




Рис. 1.22

1.446. В сплошной цилиндр ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $-\infty < z < \infty$) втекает ток J через точку с координатами $(r_0, 0, 0)$ и вытекает через точку с координатами $(r_0, 0, \pi)$.

1.447. В однородном шаре, радиус которого r_0 , течет ток J . Токовые контакты находятся в точках с координатами $r = r_0$, $\theta = \pi/2$, $\varphi = 0$ (точка входа) и $r = r_0$, $\theta = 0$ (точка выхода).

1.448. Ток J втекает в полушар ($r < r_0$, $0 < \theta < \pi/2$, $0 \leq \varphi < 2\pi$) через центр основания и вытекает через точку $P(r = r_0, \theta = 0)$.

1.449. Два электрода: катод $\{x, y, z: -\infty < x, y < \infty, z = 0\}$ и анод $\{x, y, z: -\infty < x, y < \infty, z = l > 0\}$, расположены в вакууме; их потенциалы 0 и u_0 соответственно. При нагревании катода происходит эмиссия электронов, скорость которых можно считать равной нулю. Под действием электрического поля возникает термоионный ток. При условии стационарности тока показать, что его плотность j определяется решением задачи

$$u''(z) = 2\pi \sqrt{\frac{2m}{eu(z)}}, \quad 0 < z < l,$$

$$u(0) = 0, \quad u(l) = u_0.$$

где $u(z)$ — потенциал электрического поля в точке $z \in (0; l)$, m и e — масса и абсолютная величина заряда электрона.

Пример 1.26. Поставить задачу для определения стационарной плотности тока $\mathbf{i}(P)$ на гладкой однородной поверхности S_0 , проводимость которой σ , и на которой действуют источники: в единицу времени на единицу площади поверхности поступает $q(P)$ единиц заряда, P — точка поверхности S_0 . Плотность $\mathbf{i}$ поверхностных токов равна количеству заряда, протекающего в единицу времени через единицу длины линии (принадлежащей S_0), перпендикулярной к току.

Сначала ставится задача для слоя, ограниченного поверхностями S_0 и $S_{0\delta}$. Поверхность $S_{0\delta}$ получается смещением точек

поверхности S_0 на расстояние δ в направлении внешней нормали $\mathbf{n}$. В слое имеются источники, в результате действия которых в единицу объема слоя за единицу времени поступает Q единиц заряда. Затем осуществляется усреднение объемных величин по толщине слоя и переход к пределу при $\delta \rightarrow 0$:

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{1}{\delta} \int_0^\delta Q(P, \xi) d\xi = q(P). \quad (1.116)$$

Необходимые уравнения имеются в системе (1.109), (1.110):

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = 0, \quad \mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}.$$

К ним надо присоединить уравнение непрерывности (закон сохранения заряда) $\operatorname{div} \mathbf{j} = Q$, которое следует из (1.34). Ввиду потенциальности поля $\mathbf{E}$

$$\mathbf{E} = -\nabla U, \quad \mathbf{j} = -\sigma \nabla U,$$

следовательно,

$$\operatorname{div}(-\sigma \nabla U) = Q.$$

Таким образом, потенциал U электрического поля в слое является решением задачи

$$\begin{aligned} \sigma \Delta U &= -Q, \\ \frac{\partial U}{\partial n} \Big|_{S_0} &= \frac{\partial U}{\partial n} \Big|_{S_{0\delta}} = 0. \end{aligned} \quad (1.117)$$

Применение процедуры перехода к пределу (1.116) требует определенной подготовки. Пусть Ω — часть слоя, ограниченная поверхностями S , S_δ , Σ (рис. 1.23). При интегрировании по объему уравнения (1.117) объемный интеграл в левой части преобразуется с помощью формулы Остроградского, где $L = \partial S$:

$$\int_{\Omega} \Delta U \, d\mathbf{r} = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial U}{\partial n} \, ds = \int_{\Sigma} \frac{\partial U}{\partial n} \, ds = \int_L dl \frac{\partial}{\partial n} \int_0^\delta U(P, \xi) \, d\xi.$$

Следовательно,

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{1}{\delta} \int_{\Omega} \Delta U \, d\mathbf{r} = \int_L \frac{\partial u}{\partial n} \, dl = \int_S \Delta u \, ds.$$




Рис. 1.23

Объемный интеграл в правой части уравнения (1.117) преобразуется аналогично:

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{1}{\delta} \left(\frac{1}{\sigma} \int_S ds \int_0^\delta Q(P, \xi) d\xi \right) = -\frac{1}{\sigma} \int_S q ds.$$

Результирующее равенство

$$\int_S \Delta u ds = - \int_S \frac{q}{\sigma} ds$$

является тождеством по S (оно верно для любого элемента поверхности $S \subset S_0$), поэтому (при условии непрерывности подынтегральных функций) из интегрального тождества следует уравнение $\Delta u = -q/\sigma$. Переход к поверхностным величинам в уравнении $\mathbf{j} = -\sigma \nabla U$

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{\Delta \Sigma} (\mathbf{j} \mathbf{n}) dS = \lim_{\delta \rightarrow 0} \left(-\frac{\sigma}{\delta} \int_{\Delta \Sigma} (\nabla U \mathbf{n}) ds \right)$$

приводит к соотношению $\mathbf{i} = -\sigma \nabla u$, которое выполняется на проводящей поверхности S .

Итак, в криволинейных ортогональных координатах q_1, q_2 задача ставится следующим образом:

$$\frac{1}{h_1 h_2} \left[\frac{\partial}{\partial q_1} \left(\frac{h_2}{h_1} \frac{\partial u}{\partial q_1} \right) + \frac{\partial}{\partial q_2} \left(\frac{h_1}{h_2} \frac{\partial u}{\partial q_2} \right) \right] = -\frac{q}{\sigma},$$

$$\mathbf{i} = -\sigma \left(\frac{\mathbf{e}_1}{h_1} \frac{\partial u}{\partial q_1} + \frac{\mathbf{e}_2}{h_2} \frac{\partial u}{\partial q_2} \right),$$

где (q_1, q_2) — координаты точки P на поверхности S , $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ — орты, h_1, h_2 — соответствующие коэффициенты Ламе. Стационарность токов обеспечивается условием

$$\int_S q \, ds = 0.$$

Дать постановку задач 1.450–1.457 для определения плотности постоянного тока на однородной поверхности, проводимость которой σ .

1.450. Ток J течет по полуограниченной цилиндрической поверхности ($r = r_0, 0 \leq \varphi < 2\pi, 0 < z$); ток втекает через точку поверхности с координатами $r = r_0, \varphi = \varphi_0, z = 0$.

1.451. Ток J течет по бесконечно длинной цилиндрической оболочке ($r = r_0, 0 \leq \varphi < 2\pi, -\infty < z < \infty$); ток втекает через точку с координатами $r = r_0, \varphi = 0, z = 0$.

1.452. Ток J течет по бесконечно длинной цилиндрической оболочке ($r = r_0, 0 \leq \varphi < \pi, -\infty < z < \infty$); ток втекает через точку, координаты которой $r = r_0, \varphi = \frac{\pi}{2}, z = 0$.

1.453. Цилиндрическая оболочка ($r = r_0, 0 \leq \varphi < \pi, |z| < l$) расположена на заземленном проводящем основании, которому принадлежат образующие ($r = r_0, \varphi = 0$) и ($r = r_0, \varphi = \pi$); ток J втекает в оболочку через точку, координаты которой $r = r_0, z = 0, \varphi = \varphi_0$.

1.454. Решить предыдущую задачу для неограниченной цилиндрической оболочки ($r = r_0, 0 \leq \varphi < \pi, -\infty < z < \infty$).

1.455. На проводящем заземленном основании ($z = 0$) находится цилиндрическая оболочка ($r < r_0, 0 \leq \varphi < 2\pi, 0 < z < l$); ток J втекает в оболочку через точку ($r = r_0, \varphi = 0, z = l$).

1.456. В точку с координатой $\theta = 0$ сферы, радиус которой r_0 , втекает ток J , а через точку с координатами $\theta = \pi/2, \varphi = 0$ вытекает.

1.457. По полусфере ($r = r_0, 0 < \theta < \pi/2, 0 \leq \varphi < 2\pi$) течет ток J , втекающий через точку с координатой $\theta = 0$ и вытекающий через точку с координатами $\theta = \pi/2, \varphi = 0$.

Пример 1.27. Постановка задачи для определения магнитного поля в проводнике в квазистационарном приближении.

Уравнение для магнитного поля $\mathbf{H}$ в однородной среде, в которой нет свободных зарядов ($\rho = 0$), получается исключением $\mathbf{E}$ из системы (1.109), (1.110). Для этого достаточно применить операцию rot к первому уравнению системы (1.109) и выразить $\mathbf{E}$ через $\mathbf{H}$ с помощью остальных уравнений:

$$\text{rot rot } \mathbf{H} = -\frac{\varepsilon\mu}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} - \frac{4\pi\sigma\mu}{c^2} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}.$$

Так как $\text{rot rot } \mathbf{H} = \nabla \text{div } \mathbf{H} - \Delta \mathbf{H} = -\Delta \mathbf{H}$, то

$$\Delta \mathbf{H} = \frac{\varepsilon\mu}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} + \frac{4\pi\sigma\mu}{c^2} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}. \quad (1.118)$$

Если проводимость среды мала, так что в первом уравнении системы (1.109) можно пренебречь током проводимости $\mathbf{j}$, то уравнение (1.118) становится волновым:

$$\mathbf{H}_{tt} = a^2 \Delta \mathbf{H}, \quad a^2 = \frac{c^2}{\varepsilon\mu}.$$

Если проводимость среды велика и можно пренебречь током смещения $\mathbf{D}_t/(4\pi)$, то процесс распространения поля имеет диффузионный характер:

$$\mathbf{H}_t = a^2 \Delta \mathbf{H}, \quad a^2 = \frac{c^2}{4\pi\sigma\mu}. \quad (1.119)$$

В случае периодического электромагнитного поля с частотой ω , т. е. $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathcal{E}(\mathbf{r}) e^{i\omega t}$, $\mathbf{H}(\mathbf{r}, t) = \mathcal{H}(\mathbf{r}) e^{i\omega t}$, условие малости тока смещения по сравнению с током проводимости принимает вид

$$\frac{1}{4\pi} |\mathbf{D}_t| \sim \frac{\varepsilon\omega}{4\pi} |\mathbf{E}| \ll |\mathbf{j}| = \sigma |\mathbf{E}| \implies \varepsilon\omega \ll \sigma.$$

Для металлов, проводимость которых достаточно велика, это условие выполняется практически для всех частот, применяемых в технике; оно нарушается в инфракрасной области спектра из-за дисперсии (ε и σ зависят от ω), где (по той же причине) неприменимы и уравнения Максвелла.

Поля и токи частоты ω называются квазистационарными в области Ω_l с диаметром l , если $l\omega \ll c$. В этом приближении возмущения электромагнитного поля распространяются в пределах Ω_l мгновенно (см. пример 1.22). Поэтому переменный ток в проводнике с размерами l создает вблизи проводника в каждый момент времени такое же магнитное поле, как и постоянный ток,

плотность которого равна плотности переменного тока в этот момент. Таким образом, в некоторой окрестности проводника можно использовать (в каждый момент времени) уравнение для статического поля $\operatorname{rot} \mathbf{H} = 0$. Это уравнение применяют во всем внешнем пространстве, если задача состоит в определении поля только в проводнике. На поверхности проводника должны быть непрерывны тангенциальная компонента $\mathbf{H}$ и нормальная компонента $\mathbf{B}$.

Бесконечный цилиндрический проводник с прямоугольным поперечным сечением ($|x| < l_1, |y| < l_2$) находится в продольном магнитном поле $\mathbf{H}_0 = \mathcal{H}_0 \exp(i\omega t) \mathbf{e}_z$ ¹⁾. Задача для определения установившегося поля в проводнике в квазистационарном приближении ставится следующим образом.

Установившееся магнитное поле $\mathbf{H} = \mathcal{H} e^{i\omega t} \mathbf{e}_z$ вне проводника удовлетворяет уравнениям

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = 0, \quad \operatorname{div} \mathbf{H} = 0, \quad \mathbf{H}(\infty) = \mathbf{H}_0,$$

т. е.

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial y} = 0, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} \mathcal{H} = \mathcal{H}_0, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2},$$

откуда $\mathcal{H} = \mathcal{H}_0$. Поле в проводнике удовлетворяет уравнению (1.119) и условиям «сшивки» на поверхности:

$$\Delta \mathcal{H} - \frac{4\pi i \mu \sigma \omega}{c^2} \mathcal{H} = 0, \quad -l_1 < x < l_1, \quad -l_2 < y < l_2,$$

$$\mathcal{H}(\pm l_1, y) = \mathcal{H}(x, \pm l_2) = \mathcal{H}_0.$$

1.458. Проводящий слой ($-l < x < l$) находится в продольном магнитном поле $\mathcal{H}_0 \exp(i\omega t)$. Поставить в квазистационарном приближении задачу для определения установившегося магнитного поля в слое.

1.459. Неограниченный проводящий цилиндр, радиус которого r_0 , помещен в продольное магнитное поле $\mathcal{H}_0 \exp(i\omega t)$. Поставить в квазистационарном приближении задачу для определения установившегося магнитного поля и плотности токов Фуко в цилиндре.

¹⁾ В действительности поле имеет вид $\mathcal{H}_0 \cos \omega t$ (или $\mathcal{H}_0 \sin \omega t$); комплексная форма записи удобна при выполнении линейных операций, после завершения которых нужно отделить действительную (или мнимую) часть в полученных выражениях.

Поставить задачи 1.460, 1.461 для определения магнитного поля в однородном проводнике, пренебрегая токами смещения.

1.460. Бесконечный цилиндр, радиус которого r_0 , находится в продольном магнитном поле $\mathbf{H}_0$, которое включается в момент времени $t = 0$ и остается равным $\mathbf{H}_0$ вне цилиндра при $t > 0$.

1.461. Проводник занимает полупространство ($z > 0$). В момент времени $t = 0$ в области $z < 0$ включается магнитное поле $\mathbf{H}_0$, параллельное плоскости $z = 0$, и остается равным $\mathbf{H}_0$ при $z < 0$ и $t > 0$.

Поставить задачи 1.462–1.464 для плотности переменного тока, частота которого ω , в однородном проводнике с характеристиками ϵ , μ , σ при условии $\epsilon\omega \ll \sigma$ (задачи о скин-эффекте).

1.462. В полупространстве ($z > 0$) в направлении оси Ox течет ток, амплитуда которого (на единицу длины оси Oy) J .

1.463. В слое ($|z| < l$) в направлении оси Ox течет ток, амплитуда которого (на единицу длины оси Oy) равна J .

1.464. По цилиндрическому проводнику, радиус которого r_0 , течет ток (вдоль оси), амплитуда тока равна J .

1.465. В полностью ионизованном газе (плазме), который состоит из ионов (заряд Ze , масса m , плотность n) и электронов (заряд $-e$, масса m_e , плотность n_e), распространяются одномерные ионно-акустические волны, т.е. колебания плотности ионов. Электронный газ описывается уравнением состояния $p_e = k_B n_e T_e$, где p_e — давление, k_B — постоянная Больцмана, T_e — температура электронов (мера энергии); уравнение состояния ионов, энергия которых мала, $p = 0$. В предположении отсутствия токов в плазме: 1) показать, что ее состояние описывается системой уравнений

$$\begin{aligned} \frac{\partial n}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(nv) &= 0, \\ \frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{Ze}{m} E, \\ eEn_e + k_B T_e \frac{\partial n_e}{\partial x} &= 0, \\ \frac{\partial E}{\partial x} &= 4\pi e(Zn - n_e), \end{aligned} \tag{1.120}$$

где параметры: v — скорость ионов, E — электрическое поле в плазме; 2) записать систему уравнений (1.120) в безразмерных переменных (они обозначены прежними символами)

$$\frac{x}{L}, \quad t\omega_0, \quad \frac{n}{n_0}, \quad \frac{n_e}{Zn_0}, \quad \frac{k_B T_e}{eL} E, \quad \frac{v}{\omega_0 L}, \quad (1.121)$$

где

$$L = \sqrt{\frac{k_B T_e}{4\pi Z e^2 n_0}}, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{4\pi n_0 Z^2 e^2}{m}}.$$

Здесь L — дебаевская длина для плазмы, ω_0 — ионная плазменная частота, n_0 — равновесная плотность; 3) вывести систему уравнений для ионно-акустических волн в локально нейтральной плазме.

1.466. Ленгмюровскими волнами в двухкомпонентной плазме (задача 1.465) называются колебания электронной составляющей при условии, что скорости ионов пренебрежимо малы. Показать, что одномерные ленгмюровские волны моделируются системой уравнений (индекс e у величин n , T , v опущен)

$$\begin{aligned} \frac{\partial n}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(nv) &= 0, \\ \frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{k_B T}{mn} \frac{\partial n}{\partial x} &= -\frac{e}{m} E, \\ \frac{\partial E}{\partial x} &= 4\pi e(Zn_0 - n) \end{aligned} \quad (1.122)$$

и записать эту систему в безразмерных переменных (1.121).

1.467. Показать, что в двухкомпонентной плазме (задача 1.465) могут распространяться уединенные ионно-акустические волны, которые описываются уравнением КдФ.

1.468. Часть пространства, ограниченная замкнутой, идеально проводящей поверхностью S , называется резонатором. Поставить задачу для определения собственных электромагнитных колебаний в резонаторе.

1.469. Показать, что: 1) произвольное электромагнитное поле

$$\mathbf{E} = (E_1, E_2, E_3), \quad \mathbf{H} = (H_1, H_2, H_3)$$

является суперпозицией полей

$$\begin{aligned} \mathbf{E}^{(1)} &= (E_1^{(1)}, E_2^{(1)}, E_3^{(1)}), \quad \mathbf{H}^{(1)} = (H_1^{(1)}, H_2^{(1)}, 0) \\ \mathbf{E}^{(2)} &= (E_1^{(2)}, E_2^{(2)}, 0), \quad \mathbf{H}^{(2)} = (H_1^{(2)}, H_2^{(2)}, H_3^{(2)}); \end{aligned}$$

2) в ортогональной криволинейной системе координат (q_1, q_2, q_3) с коэффициентами Ламе h_1, h_2, h_3 , где $h_1 = 1$, а отношение h_2/h_3 не зависит от q_1 , компоненты электромагнитного поля

$$\mathbf{E} = e^{i\omega t}(\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \mathcal{E}_3), \quad \mathbf{H} = e^{i\omega t}(0, \mathcal{H}_2, \mathcal{H}_3)$$

(поле электрического типа) выражаются через функцию u по формулам

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_1 &= \frac{\partial^2 u}{\partial q_1^2} + k^2 u, & \mathcal{E}_2 &= \frac{1}{h_2} \frac{\partial^2 u}{\partial q_1 \partial q_2}, & \mathcal{E}_3 &= \frac{1}{h_3} \frac{\partial^2 u}{\partial q_1 \partial q_3}, \\ \mathcal{H}_1 &= 0, & \mathcal{H}_2 &= \frac{ik}{h_3} \frac{\partial u}{\partial q_3}, & \mathcal{H}_3 &= -\frac{ik}{h_2} \frac{\partial u}{\partial q_2}, \end{aligned}$$

где u — решение уравнения

$$\frac{\partial^2 u}{\partial q_1^2} + \frac{1}{h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_2} \left(\frac{h_3}{h_2} \frac{\partial u}{\partial q_2} \right) + \frac{\partial}{\partial q_3} \left(\frac{h_2}{h_3} \frac{\partial u}{\partial q_3} \right) \right] + k^2 u = 0,$$

а компоненты электромагнитного поля

$$\mathbf{E} = e^{i\omega t}(0, \mathcal{E}_2, \mathcal{E}_3), \quad \mathbf{H} = e^{i\omega t}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2, \mathcal{H}_3)$$

(поле магнитного типа) выражаются через функцию v по формулам

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_1 &= 0, & \mathcal{E}_2 &= -\frac{ik}{h_3} \frac{\partial v}{\partial q_3}, & \mathcal{E}_3 &= \frac{ik}{h_2} \frac{\partial v}{\partial q_2}, \\ \mathcal{H}_1 &= \frac{\partial^2 v}{\partial q_1^2} + k^2 v, & \mathcal{H}_2 &= \frac{1}{h_2} \frac{\partial^2 v}{\partial q_1 \partial q_2}, & \mathcal{H}_3 &= \frac{1}{h_3} \frac{\partial^2 v}{\partial q_1 \partial q_3}, \end{aligned}$$

где v удовлетворяет тому же уравнению, что и функция u .

Поставить задачи 1.470–1.472 для определения собственных электромагнитных колебаний в резонаторе, используя функции u и v , введенные в предыдущей задаче.

1.470. Резонатор представляет собой ограниченный цилиндр ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z < l$).

1.471. Резонатор представляет собой цилиндрический сектор

$$(r < r_0, 0 < \varphi < \alpha < 2\pi, 0 < z < l).$$

1.472. Резонатор представляет собой сферу, радиус которой r_0 .

1.473. Внутри полого цилиндрического проводника могут распространяться электромагнитные волны. Подобная система называется *волноводом*. Волна, в которой либо оба вектора $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$,

либо только один из векторов перпендикулярны направлению распространения волны, называется, соответственно, поперечной волной (*ТЕМ*-волной), поперечной электрической волной (*ТЕ*-волной) или поперечной магнитной волной (*ТМ*-волной). Поставить задачи для определения *ТЕ*- и *ТМ*-волн в идеально проводящем волноводе, поперечным сечением которого служит односвязная область Ω , и показать, что *ТЕМ*-волну такой волновод не пропускает.

1.474. Поставить задачу для определения *ТЕ*- и *ТМ*-волн, распространяющихся в пространстве между проводящими плоскостями $x = 0$ и $x = l$.

1.475. Диэлектрический волновод с оптическим диапазоном называется *оптическим волноводом*, или *световодом*. Он состоит из цилиндрического стержня (сердцевины) и оболочки, показатели преломления которых $n_1 = \sqrt{\varepsilon_1}$ и $n_2 = \sqrt{\varepsilon_2} = \text{const} < n_1$ соответственно, а магнитная проницаемость $\mu = 1$. Изменение показателя преломления по поперечному сечению волновода (профиль показателя преломления) определяет волноводы со ступенчатым профилем показателя преломления ($n_1 = \text{const}$) и градиентные волноводы (n_1 непрерывно уменьшается от наибольшего значения на оси до значения n_2 на границе с оболочкой).

Благодаря полному внутреннему отражению на границе с оболочкой в волноводе могут распространяться электромагнитные волны (направляемые моды). Поставить задачу для определения *ТЕ*-мод

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(x, z, t) &= e^{i(\beta z - \omega t)}(0, \mathcal{E}_y(x), 0), \\ \mathbf{H}(x, z, t) &= e^{i(\beta z - \omega t)}(\mathcal{H}_x(x), 0, \mathcal{H}_z(x)) \end{aligned} \quad (1.123)$$

и *ТМ*-мод

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(x, z, t) &= e^{i(\beta z - \omega t)}(\mathcal{E}_x(x), 0, \mathcal{E}_z(x)), \\ \mathbf{H}(x, z, t) &= e^{i(\beta z - \omega t)}(0, \mathcal{H}_y(x), 0) \end{aligned} \quad (1.124)$$

в плоском симметричном волноводе со ступенчатым профилем показателя преломления

$$n(x) = \begin{cases} n_1, & |x| \leq l, \\ n_2, & |x| \geq l. \end{cases}$$

Показать, что: 1) монохроматическая волна, распространяющаяся в направлении Oz , есть суперпозиция *ТЕ*- и *ТМ*-мод;

2) моды, для которых $\beta > kn_1$, плоский симметричный волновод не пропускает.

1.476. Технология изготовления оптических волноводов включает различные физические процессы (например, диффузию, имплантацию ионов); в результате получается волновод с градиентным профилем показателя преломления. Поставить задачу для определения TE - и TM -мод вида (1.123), (1.124) в плоском волноводе, профиль показателя преломления которого

$$n(x) = \begin{cases} n_1(x), & |x| \leq l, \\ n_2 = \text{const}, & |x| \geq l. \end{cases}$$

1.477. Поставить задачу для определения электромагнитного поля в TE - и TM -модах вида (1.123) и (1.124), распространяющихся в плоском волноводе с асимметричным профилем показателя преломления (рис. 1.24).




Рис. 1.24

1.478. В оптике используются круглые стеклянные волноводы, состоящие из сердцевины с показателем преломления n_1 и толстой оболочки, показатель преломления которой $n_2 < n_1$ (ступенчатые оптические волокна). 1. Показать, что любая мода с аксиально симметричным полем, распространяющаяся в ступенчатом волокне, является суперпозицией TE -мод

$$\mathbf{E}(r, z, t) = e^{i(\beta z - \omega t)}(\mathcal{E}_r(r), 0, \mathcal{E}_z(r)),$$

$$\mathbf{H}(r, z, t) = e^{i(\beta z - \omega t)}(0, \mathcal{H}_\varphi(r), 0)$$

и TM -мод

$$\mathbf{E}(r, z, t) = e^{i(\beta z - \omega t)}(0, \mathcal{E}_\varphi(r), 0),$$

$$\mathbf{H}(r, z, t) = e^{i(\beta z - \omega t)}(\mathcal{H}_r(r), 0, \mathcal{H}_z(r)),$$

и поставить задачи для их определения. 2. Доказать, что моды, для которых $\beta < kn_2$ или $\beta > kn_1$, в ступенчатом волокне распространяться не могут.

1.479. 1. Поставить задачу для определения электромагнитного поля волны

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(r, \varphi, z, t) &= \mathcal{E}(r, \varphi) e^{i(\beta z - \omega t)}, \\ \mathbf{H}(r, \varphi, z, t) &= \mathcal{H}(r, \varphi) e^{i(\beta z - \omega t)},\end{aligned}$$

распространяющейся в ступенчатом оптическом волокне, профиль показателя преломления которого

$$n(r) = \begin{cases} n_1, & 0 < r < r_0 \\ n_2, & r_0 < r, \end{cases}$$

где $n_2 < n_1$. 2. Показать на примере волны (1.126), что в ступенчатом волокне не распространяются волны, для которых $\beta < kn_2$ или $\beta > kn_1$.

1.480. При расчете волоконно-оптических линий связи необходимо учитывать распывание сигнала из-за дисперсии, которая обусловлена зависимостью показателя преломления от частоты (частотная дисперсия), зависимостью постоянной распространения моды от частоты (внутримодовая, или волноводная, дисперсия), различием групповых скоростей разных мод (межмодовая дисперсия). Для уменьшения межмодовой дисперсии используют градиентные волокна с α -профилем показателя преломления

$$\begin{aligned}n^2(r) &= \begin{cases} n_1^2(1 - 2\Delta f(r)), & 0 < r < r_0, \\ n_2^2, & r_0 < r, \end{cases} \\ 2\Delta &= \frac{n_1^2 - n_2^2}{n_1^2}, \quad f(r) = \left(\frac{r}{r_0}\right)^\alpha. \end{aligned} \quad (1.125)$$

Показатель степени α выбирают так, чтобы разность оптических путей различных мод была минимальна.

Доказать, что в световоде с α -профилем амплитуды электромагнитного поля волны

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(r, \varphi, z, t) &= \mathcal{E}(r) e^{i(\beta z + m\varphi - \omega t)}, \\ \mathbf{H}(r, \varphi, z, t) &= \mathcal{H}(r) e^{i(\beta z + m\varphi - \omega t)}, \quad m \in \mathbb{N},\end{aligned} \quad (1.126)$$

удовлетворяют при $r < r_0$ уравнениям

$$\mathcal{E}_z'' + \left(\frac{1}{r} + \frac{\beta^2 s^2 f'}{k^2 n^2 b^2} \right) \mathcal{E}_z' + \left(\frac{b^2}{r_0^2} - \frac{m^2}{r^2} \right) \mathcal{E}_z = -i \frac{\beta m s^2 f'}{k n^2 b^2 r} \mathcal{H}_z, \quad (1.127)$$

$$\mathcal{H}_z'' + \left(\frac{1}{r} + \frac{s^2 f'}{b^2} \right) \mathcal{H}_z' + \left(\frac{b^2}{r_0^2} - \frac{m^2}{r^2} \right) \mathcal{H}_z = i \frac{\beta m s^2 f'}{k b^2 r} \mathcal{E}_z, \quad (1.128)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_r &= \frac{r_0^2}{b^2} \left(i \beta \mathcal{E}_z' - \frac{k m}{r} \mathcal{H}_z \right), \\ \mathcal{H}_r &= \frac{r_0^2}{b^2} \left(\frac{k m n^2}{r} \mathcal{E}_z + i \beta \mathcal{H}_z' \right), \\ \mathcal{E}_\varphi &= -\frac{r_0^2}{b^2} \left(\frac{\beta m}{r} \mathcal{E}_z + i k \mathcal{H}_z' \right), \\ \mathcal{H}_\varphi &= \frac{r_0^2}{b^2} \left(i k n^2 \mathcal{E}_z' - \frac{\beta m}{r} \mathcal{H}_z \right), \end{aligned} \quad (1.129)$$

где

$$\begin{aligned} q^2 &= (k^2 n_1^2 - \beta^2) r_0^2, \quad s^2 = k^2 (n_1^2 - n_2^2) r_0^2, \\ b^2 &= q^2 - f s^2, \quad k = \frac{\omega}{c}. \end{aligned} \quad (1.130)$$

1.481. Широкое практическое применение имеют оптические волокна с небольшой (не более 1%) относительной разностью показателей преломления сердцевины и оболочки (слабонаправляющие оптические волокна). Показать, что амплитуды электромагнитного поля волны вида (1.126), распространяющейся в слабонаправляющем оптическом волокне с α -профилем показателя преломления (1.125), определяются при $r < r_0$ выражениями

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_r &= i \psi_j, \quad \mathcal{E}_\varphi = \pm \psi_j, \quad \mathcal{E}_z = -\frac{1}{k n_1} \left(\psi_j' \pm \frac{m \pm 1}{r} \psi_j \right), \\ \mathcal{H}_r &= \mp n_1 \psi_j, \quad \mathcal{H}_\varphi = i n_1 \psi_j, \quad \mathcal{H}_z = \mp \frac{i}{k} \left(\psi_j' \pm \frac{m \pm 1}{r} \psi_j \right), \end{aligned}$$

где $\psi_j(r)$ — решение уравнения

$$\psi_j'' + \frac{1}{r} \psi_j' + \left(\frac{q^2 - s^2 f}{r_0^2} - \frac{(m \pm 1)^2}{r^2} \right) \psi_j = 0, \quad j = 1, 2; \quad (1.131)$$

верхний знак соответствует $j = 1$, нижний — $j = 2$, q , s , k определены выражениями (1.130).

1.482. В слабонаправляющем градиентном волноводе с профилем показателя преломления $n(\mathbf{r})$, $\mathbf{r} = x \mathbf{e}_x + y \mathbf{e}_y$, распространяется волна

$$\mathbf{E} = \mathcal{E}(\mathbf{r})e^{i(\beta z - \omega t)}, \quad \mathbf{H} = \mathcal{H}(\mathbf{r})e^{i(\beta z - \omega t)}. \quad (1.132)$$

Показатель преломления мало меняется на расстояниях порядка длины волны. Доказать, что компоненты

$$\mathcal{E}_\nu = \mathcal{E}_x \mathbf{e}_x + \mathcal{E}_y \mathbf{e}_y, \quad \mathcal{H}_\nu = \mathcal{H}_x \mathbf{e}_x + \mathcal{H}_y \mathbf{e}_y$$

выражаются через $\mathcal{E}_z$ и $\mathcal{H}_z$ посредством формул

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_\nu &= \frac{i}{k^2 n^2 - \beta^2} (\beta \nabla \mathcal{E}_z - k [\mathbf{e}_z \nabla \mathcal{H}_z]), \\ \mathcal{H}_\nu &= \frac{i}{k^2 n^2 - \beta^2} (\beta \nabla \mathcal{H}_z + k n^2 [\mathbf{e}_z \nabla \mathcal{E}_z]), \end{aligned} \quad (1.133)$$

а каждая из компонент $\mathcal{E}_z$ и $\mathcal{H}_z$ является решением уравнения

$$\Delta \psi + (k^2 n^2 - \beta^2) \psi = 0. \quad (1.134)$$

Пример 1.28. Постановка задачи для электромагнитного поля точечного заряда q , движущегося в вакууме со скоростью $v_0 \mathbf{k}$, где $\mathbf{k}$ — постоянный единичный вектор.

Электромагнитное поле точечного заряда описывается системой уравнений (1.109), (1.110):

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}, \quad (1.135)$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}, \quad (1.136)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = 4\pi \rho, \quad (1.137)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{H} = 0. \quad (1.138)$$

Эту систему удастся преобразовать посредством введения потенциалов — векторного $\mathbf{A}$ и скалярного u . Пусть $\mathbf{H} = \operatorname{rot} \mathbf{A}$; в этом случае уравнение (1.138) выполняется тождественно, а из уравнения (1.135), записанного в виде $\operatorname{rot} \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{A}_t \right) = 0$, следует, что $\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{A}_t = -\nabla u$. Введенные таким образом потенциалы определены неоднозначно: замены $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + \nabla f + C_1$ и $u \rightarrow u - \frac{1}{c} f_t + C_2$ не влияют на $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$. Поэтому функции $\mathbf{A}$ и u можно связать дополнительным условием

$$\operatorname{div} \mathbf{A} + \frac{1}{c} u_t = 0,$$

которое выбрано так, чтобы уравнения для потенциалов были наиболее простыми. Эти уравнения получаются подстановкой

$$\mathbf{E} = -\nabla u - \frac{1}{c}\mathbf{A}_t, \quad \mathbf{H} = \text{rot } \mathbf{A} \quad (1.139)$$

в (1.137) и (1.136):

$$u_{tt} = c^2 \Delta u + 4\pi c^2 \rho, \quad \mathbf{A}_{tt} = c^2 \Delta \mathbf{A} + 4\pi c \mathbf{j}.$$

Здесь $\rho = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{v}_0 t)$, $\mathbf{j} = q \mathbf{v}_0 \delta(\mathbf{r} - \mathbf{v}_0 t)$, $\mathbf{A} = A \mathbf{k}$, так что

$$u_{tt} = c^2 \Delta u + 4\pi c^2 q \delta(\mathbf{r} - \mathbf{v}_0 t), \\ \mathbf{A}_{tt} = c^2 \Delta \mathbf{A} + 4\pi c q v_0 \delta(\mathbf{r} - \mathbf{v}_0 t),$$

при этом каждая из функций $A(\mathbf{r}, t)$ и $u(\mathbf{r}, t)$ для любого t должна удовлетворять условиям излучения (1.83).

1.483. Момент точечного электрического диполя меняется по закону $\mathbf{p}_0 f(t) \eta(t)$, $f(0) = 0$; $\mathbf{p}_0$ — постоянный вектор. Поставить задачу для определения электромагнитного поля диполя.

1.484. Момент точечного электрического диполя меняется со временем по закону $\mathbf{p}_0 \exp(i\omega t)$, где $\mathbf{p}_0$ — постоянный вектор. Поставить задачу для определения установившегося электромагнитного поля диполя.

1.485. Поставить задачу для определения установившегося электромагнитного поля точечного магнитного диполя с моментом $\mathbf{M}_0 \exp(i\omega t)$, где $\mathbf{M}_0$ — постоянный вектор.

1.486. Бесконечный цилиндр (радиус r_0 , $\mu = 1$) находится в магнитном поле $\mathbf{H}_0 \exp(i\omega t)$, перпендикулярном оси цилиндра. Поставить в квазистационарном приближении задачу для определения установившегося магнитного поля в цилиндре.

1.487. Шар, радиус которого r_0 , магнитная проницаемость $\mu = 1$, находится в магнитном поле $\mathbf{H}_0 \exp(i\omega t)$. Поставить в квазистационарном приближении задачу для определения установившегося магнитного поля в шаре.

Пример 1.29. *Нелинейное уравнение Шредингера (НУШ).* При воздействии электромагнитного поля $\mathbf{E}$ на изотропный диэлектрик в нем происходит смещение электронов в молекулах (поляризация диэлектрика), в результате чего возникает дипольный момент с объемной плотностью $\mathbf{P} = \alpha \mathbf{E}$. Линейная зависимость между $\mathbf{P}$ и $\mathbf{E}$ моделирует процесс поляризации диэлектрика, в случае когда поле E мало по сравнению с внутримолекулярными

полями; в противном случае коэффициент поляризации α зависит от E . Для небольших полей эту зависимость можно аппроксимировать разложением $\alpha(E) = \alpha_1 + \alpha_2 E + \alpha_3 E^2$. Так как это соотношение должно быть инвариантно относительно преобразования координат $\mathbf{r}' = -\mathbf{r}$ и замены $\mathbf{E} \rightarrow -\mathbf{E}$, то $\alpha_2 = 0$, следовательно,

$$\mathbf{P} = \alpha_1 \mathbf{E} + \alpha_3 E^2 \mathbf{E}. \quad (1.140)$$

В средах с быстро протекающими электронными процессами формула (1.140) верна и для переменного электромагнитного поля, так как поляризация $\mathbf{P}$ в момент времени t определяется полем $\mathbf{E}$ в этот же момент.

Пусть линейно поляризованная монохроматическая волна (вектор $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ направлен по оси Ox , волна распространяется вдоль оси Oz) падает на однородный изотропный диэлектрик. Поле волны описывается системой уравнений (1.109), (1.110) и уравнением $\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}$. Результатом исключения $\mathbf{H}$ является уравнение

$$\text{rot rot } \mathbf{E} + \beta \mathbf{E}_{tt} + \gamma (E^2 \mathbf{E})_{tt} = 0, \quad (1.141)$$

где $\beta = (1 + 4\pi\alpha_1)/c^2$, $\gamma = 4\pi\alpha_3/c^2$. В линейном приближении уравнение (1.141) имеет вид $\Delta \mathbf{E} - \beta \mathbf{E}_{tt} = 0$ и описывает волну

$$\mathbf{E} = \mathbf{e}_x \mathcal{E} e^{i(kz - \omega t)}. \quad (1.142)$$

Если подставить вектор $\mathbf{E}$ (1.142) в приближенное линейное уравнение, то для амплитуды $\mathcal{E}(x, y)$ получится уравнение Гельмгольца, $\Delta \mathcal{E} + (k^2 - \beta) \mathcal{E} = 0$. Такая модель справедлива для малых колебаний и применима к задачам классической оптики (обычные источники света создают поля небольшой интенсивности). Если колебания не слишком малы (например, возбуждаются источниками лазерного излучения), то необходимо учитывать нелинейные эффекты. В этом случае амплитуда $\mathcal{E}$ является функцией переменных x, y, z, t и представляет собой огибающую несущей волны (рис. 1.25).

Для практики интересны процессы в слабо нелинейных системах (прозрачные диэлектрики, плазма), обусловленные распространением волн малой амплитуды, огибающая которых близка к $\mathcal{E}(x, y)$ и является медленно меняющейся функцией переменных z и t (период T_n несущей волны много меньше периода T_o огибающей, или $\lambda_n \ll \lambda_o$). В некоторых задачах нелинейной оптики (например, в задаче о самофокусировке) рассматривается волна, распространяющаяся вдоль оси Oz , поле $E e_x$ которой




Рис. 1.25

не зависит от y и медленно меняется в зависимости от x . В этом случае

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \mathbf{D} &= \operatorname{div} [(1 + 4\pi\alpha_1)\mathbf{E} + 4\pi\alpha_3 E^2 \mathbf{E}] = \\ &= (1 + 4\pi\alpha_1 + 4\pi\alpha_3 E^2) \operatorname{div} \mathbf{E} + 8\pi\alpha_3 (\mathbf{E} \nabla E) \mathbf{E} = 0\end{aligned}$$

и, так как $(\mathbf{E} \nabla E) = 0$, то $\operatorname{div} \mathbf{E} = 0$. Следовательно, уравнение (1.141) преобразуется в

$$\Delta E - \beta E_{tt} = \gamma(E^3)_{tt}. \quad (1.143)$$

При выводе уравнения для огибающей используется метод многомасштабных разложений теории возмущений (см. [62]). Различие в масштабах величин T_H , λ_H и T_0 , λ_0 , а также медленную зависимость от x можно учесть с помощью положительного параметра $\varepsilon \ll 1$, полагая $\mathcal{E} = \mathcal{E}(\varepsilon \mathbf{r}, \varepsilon t)$. Это значит, что аргументами функции $\mathbf{E}$, определенной выражением (1.142), являются величины $\mathbf{r}$, t , $R_1 = \varepsilon \mathbf{r}$, $T_1 = \varepsilon t$, которые следует считать независимыми, так как невозможно отделить ε от $\mathbf{r}$ (или ε от t). В общем случае наряду с $\mathbf{r}$ и t вводятся переменные $\mathbf{R}_n = \varepsilon^n \mathbf{r}$, $T_n = \varepsilon^n t$, $n \in \mathbb{N}$, так что

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t} &\rightarrow \frac{\partial}{\partial t} + \varepsilon \frac{\partial}{\partial T_1} + \varepsilon^2 \frac{\partial}{\partial T_2} + \dots, \\ \frac{\partial}{\partial x} &\rightarrow \frac{\partial}{\partial x} + \varepsilon \frac{\partial}{\partial X_1} + \varepsilon^2 \frac{\partial}{\partial X_2} + \dots\end{aligned}$$

В соответствии с методами теории возмущений решение уравнения (1.143) записывается в виде ряда (пример 1.9)

$$E = \varepsilon E_1 + \varepsilon^2 E_2 + \dots \quad (1.144)$$

После подстановки разложения (1.144) в (1.143) и приравнивания нулю коэффициентов при $\varepsilon, \varepsilon^2, \varepsilon^3, \dots$ получается цепочка уравнений

$$\Delta E_1 - \beta E_{1tt} = 0, \quad (1.145)$$

$$\Delta E_2 - \beta E_{2tt} - 2 \left(\frac{\partial^2 E_1}{\partial x \partial X_1} + \frac{\partial^2 E_1}{\partial z \partial Z_1} - \beta \frac{\partial^2 E_1}{\partial t \partial T_1} \right), \quad (1.146)$$

$$\begin{aligned} \Delta E_3 - \beta E_{3tt} - 2 \left(\frac{\partial^2 E_2}{\partial x \partial X_1} + \frac{\partial^2 E_2}{\partial z \partial Z_1} - \beta \frac{\partial^2 E_2}{\partial t \partial T_1} \right) - \\ - 2 \left(\frac{\partial^2 E_1}{\partial x \partial X_2} + \frac{\partial^2 E_1}{\partial z \partial Z_2} - \beta \frac{\partial^2 E_1}{\partial t \partial T_2} \right) - \\ - \left(\frac{\partial^2 E_1}{\partial X_1^2} + \frac{\partial^2 E_1}{\partial Z_1^2} - \beta \frac{\partial^2 E_1}{\partial T_1^2} \right) + \gamma \frac{\partial^2 E_1}{\partial t^2}. \end{aligned}$$

Уравнение (1.145) представляет собой линейное приближение уравнения (1.143) и имеет решение

$$E_1 = \mathcal{E}(X_1, Z_1, T_1, \dots) e^{i\theta} + \text{с.с.},$$

где $\theta = kz - \omega t + \delta$, $k^2 = \beta \omega^2$, с.с. означает комплексно сопряженное первое слагаемое. Подстановка E_1 в уравнение (1.146) преобразует его к виду

$$\Delta E_2 - \beta \frac{\partial^2 E_2}{\partial n^2} - 2i \left(k \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial Z_1} + \beta \omega \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial T_1} \right) e^{i\theta} + \text{с.с.}$$

Это уравнение имеет возрастающее с ростом θ решение $\theta \exp(i\theta)$, что противоречит физическому смыслу. Поэтому члены в правой части, порождающие такое решение (их называют секулярными), должны быть равны нулю:

$$k \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial Z_1} + \beta \omega \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial T_1} = 0.$$

При этом условии функция $E_2 = E_1$ удовлетворяет уравнению (1.146), а для E_3 получается уравнение

$$\begin{aligned} \Delta E_3 - \beta \frac{\partial^2 E_3}{\partial t^2} - \left(\frac{\partial^2 \mathcal{E}}{\partial X_1^2} + 2ik \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial Z_1} + 2i\beta \omega \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial T_2} + 3\gamma \omega^2 |\mathcal{E}|^2 \mathcal{E} \right) e^{i\theta} - \\ - 9\gamma \omega^2 \mathcal{E}^3 e^{3i\theta} + \text{с.с.} \end{aligned}$$

Условие отсутствия секулярных членов

$$\frac{\partial^2 \mathcal{E}}{\partial X_1^2} + 2i \left(k \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial Z_2} + \beta \omega \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial T_2} \right) + 3\gamma \omega^2 |\mathcal{E}|^2 \mathcal{E} = 0$$

представляет собой НУШ; в переменных $\xi = X_1$, $\eta = Z_2 - T_2/\sqrt{\beta}$, $\tau = T_2$ оно принимает вид

$$2i\beta\omega\frac{\partial\mathcal{E}}{\partial\tau} + \frac{\partial^2\mathcal{E}}{\partial\xi^2} + 3\gamma\omega^2|\mathcal{E}|^2\mathcal{E} = 0. \quad (1.147)$$

Таким образом,

$$\mathbf{E} = \mathbf{e}_x \varepsilon \mathcal{E}(X_1, Z_1, T_1, Z_2, T_2) e^{i\theta} + c.c. + O(\varepsilon^2),$$

где $\mathcal{E}$ — решение НУШ.

1.488. Привести НУШ (1.147) к каноническому виду

$$iu_t + u_{xx} + |u|^2 u = 0. \quad (1.148)$$

1.489. Доказать, что в двухкомпонентной плазме может распространяться одномерная ленгмюровская волна (задача 1.466) с медленно меняющейся огибающей, удовлетворяющей НУШ.

1.490. Показать, что в слабонелинейной системе, которая модулируется уравнениями: 1) КдФ (1.29); 2) мКдФ (1.30), могут распространяться волны с медленно меняющейся амплитудой, удовлетворяющей НУШ.

1.491. Показать, что в нелинейной системе, описываемой уравнением СГ (1.31) при условии $|u| \ll 1$, могут распространяться волны с медленно меняющейся огибающей, которая удовлетворяет НУШ.

1.5. Ответы

1.1. $u_{tt} = a^2 u_{xx} - \beta u_t$, $a^2 = \frac{E}{\rho}$, $\beta = \frac{\alpha P}{\rho S}$.

У к а з а н и е. В уравнении (1.4) второго закона Ньютона заменить слагаемое $FS\Delta\xi$ на $-\alpha P\Delta S$, где $\Delta S = P\Delta\xi$.

1.2. $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $u(0, t) = 0$, $ESu_x(l, t) = F(t)$, $u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$.

1.3. $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 1) $u_x(0, t) = 0$, 2) $ESu_x(0, t) - ku(0, t) = 0$,
 $ESu_x(l, t) = F(t)$, $u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$.

1.4. $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $u(0, t) = 0$, $ESu_x(l, t) + ku(l, t) = k\mu(t)$,
 $u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$.

1.5. $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $ESu_x(0, t) - \alpha u_t(0, t) = 0$,
 $ESu_x(l, t) = F(t)$, $u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$.

$$\begin{aligned} 1.6. \quad & u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & ESu_x(0, t) - ku(0, t) = 0, \quad ESu_x(l, t) + ku(l, t) = 0, \\ & u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.7. \quad & u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \frac{I}{\rho S} \delta(x). \end{aligned}$$

У к а з а н и е. В результате удара сечение $x = 0$, имеющее нулевую массу, получает конечный импульс, поэтому начальную скорость сечений стержня следует представить в виде $u_t(x, 0) = A \delta(x)$; константа A определяется условием $(\rho S, u_t(x, 0)) = I$.

$$\begin{aligned} 1.8. \quad & u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u_x(0, t) = 0, \quad ESu_x(l, t) + \alpha u(l, t) = 0, \\ & u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \frac{I}{\rho S} \delta(x). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.9. \quad & u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & ESu_x(0, t) - ku(0, t) = -F(t), \quad u(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.10. \quad & u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & ESu_x(0, t) = -F_1(t), \quad ESu_x(l, t) = F_2(t), \\ & u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.11. \quad & u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u(0, t) = u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = -\frac{I}{\rho S} \delta(x - l). \end{aligned}$$

Р е ш е н и е (фрагмент). В стационарном поле сил движение стержня определяется уравнением $u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x)$. Равновесное сечение $w(x)$ — решение стационарного уравнения $a^2 w''(x) + f(x) = 0$. Пусть $\xi = x + w(x)$ — новая переменная Лагранжа, а $U(\xi, \tau)$ — отклонение сечения от равновесного положения ξ в момент времени τ ; начало отсчета времени τ выбрано так, что $u(x, \tau)|_{\tau=0} = w(x)$. Так как эйлерова координата какого-либо сечения равна $x + u(x, \tau) = \xi + U(\xi, \tau)$, то $u(x, \tau) = U(\xi, \tau) + w(x)$. В принятом приближении $\xi_x = 1 + w'_0 = 1$, поэтому $u_x = U_\xi \xi_x + w' = U_\xi + w'_0$, $u_{xx} = U_{\xi\xi} + w''_0$ и очевидно $w_{tt} = U_{tt}$. Следовательно, уравнение для $u(x, t)$ преобразуется к виду $U_{tt} = a^2 U_{\xi\xi} + a^2 w''_0 + f(x)$, или $U_{tt} = a^2 U_{\xi\xi}$.

$$\begin{aligned} 1.12. \quad & (l_0 - x)^2 u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[(l_0 - x)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right], \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = \mu(t), \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.13. \quad & (l_0 - x)^2 u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[(l_0 - x)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right], \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & ES_0 u_x(0, t) - \alpha u_t(0, t) = 0, \quad ES_0 \left(\frac{l_0 - l}{l_0} \right)^2 u_x(l, t) + ku(l, t) = F(t), \\ & u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.14. \quad & (l_0 - x)^2 u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[(l_0 - x)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right], \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u_x(0, t) = 0, \quad Eu_x(l, t) + \alpha u_t(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \frac{I}{ES_0} \delta(x). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.15. \quad & (l_0 - x)^2 u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[(l_0 - x)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right] + \frac{q \mathcal{E}_0}{\rho} (l_0 - x)^2, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u(0, t) = u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.16. \quad & (l_0 - x)u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x}(l_0 - x) \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & ES_0 u_x(0, t) - k[u(0, t) - \mu(t)] = 0, \quad u_x(l, t) = 0, \\ & u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.17. \quad & (l_0 - x)u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x}(l_0 - x) \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u_x(0, t) = 0, \quad ES_0 \left(1 - \frac{l}{l_0}\right) u_x(l, t) = F(t), \\ & u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.18. \quad & (l_0 - x)u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x}(l_0 - x) \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{F(x, t)}{\rho}(l_0 - x), \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & ES_0 u_x(0, t) - ku(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, \\ & u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.19. \quad & (l_0 + x)u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x}(l_0 + x) \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & 2\pi plEu_x(0, t) - \alpha u_t(0, t) = 0, \quad 2\pi p(l_0 + l)Eu_x(l, t) + \alpha u_t(l, t) = F(t), \\ & u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.20. \quad & (l_0^2 + x^2)u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x}(l_0^2 + x^2) \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & \pi pl_0^2 Eu_x(0, t) - ku(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, \\ & u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = -\frac{I\delta(x-l)}{\pi \rho p^2(l_0^2 + l^2)}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.21. \quad & u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u_x(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, \\ & u(x, 0) = \frac{F_0}{ES}(l - x), \quad u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

У к а з а н и е. Функция $u(x, 0) = u_0(x)$ — решение стационарной задачи

$$\begin{aligned} u_0'' &= 0, \quad 0 < x < l, \\ ESu_0'(0) &= -F_0, \quad u_0(l) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.22. \quad & u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u_x(0, t) = 0, \quad ESu_x(l, t) + ku(l, t) = 0, \\ & u(x, 0) = \frac{F_0}{ES} \left(l - x + \frac{ES}{k}\right), \quad u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

У к а з а н и е. Функция $u(x, 0) = u_0(x)$ — решение стационарной задачи

$$\begin{aligned} u_0'' &= 0, \quad 0 < x < l, \\ ESu_0'(0) &= -F_0, \quad ESu_0'(l) + ku_0(l) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.23. \quad & u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & ESu_x(0, t) - k[u(0, t) - u_0] = 0, \quad u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.24. \quad & u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u(0, t) = u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = -\frac{mg}{ES}(l - x), \quad u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.25. \quad & (l_0 - x)^2 u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[(l_0 - x)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right], \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u_x(0, t) = u(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = \frac{F_0 l_0^2 (l - x)}{ES_0 (l_0 - l)(l_0 - x)}, \quad u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

У к а з а н и е. Начальные смещения сечений стержня определяются функцией $u_0(x)$, которая является решением стационарной задачи

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(l_0 - x)^2 \frac{du_0}{dx} &= 0, \quad 0 < x < l, \\ u'_0(0) &= -\frac{F_0}{ES_0}, \quad u_0(l) = 0. \end{aligned}$$

1.26. $(l_0 - x)u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x}(l_0 - x) \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u(0, t) = u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = \frac{l_0 F_0}{ES_0} \ln \frac{l_0 - x}{l_0 - l}, \quad u_t(x, 0) = 0.$

У к а з а н и е. Функция $u(x, 0) = u_0(x)$, определяющая начальные смещения сечений стержня, является решением стационарной задачи

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x}(l_0 - x) \frac{\partial u_0}{\partial x} &= 0, \quad 0 < x < l, \\ ES_0 u'(0) &= -F_0, \quad u_0(l) = 0. \end{aligned}$$

1.27. $(l_0 - x)^2 u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x}(l_0 - x)^2 \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u_x(0, t) = 0, \quad ES_0 \left(1 - \frac{l}{l_0}\right)^2 u_x(l, t) + ku(l, t) = 0,$
 $u(x, 0) = \frac{l_0^2 F_0}{ES_0} \left(\frac{1}{l_0 - l} - \frac{1}{l_0 - x}\right) + \frac{F_0}{k}, \quad u_t(x, 0) = 0.$

У к а з а н и е. Функция $u(x, 0) = u_0(x)$ является решением стационарной задачи

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x}(l_0 - x)^2 \frac{\partial u_0}{\partial x} &= 0, \quad 0 < x < l, \\ ES_0 u'_0(0) &= -F_0, \quad ES(l)u'_0(l) + ku_0(l) = 0. \end{aligned}$$

1.28. $(l_0 + x)u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[(l_0 + x) \frac{\partial u}{\partial x} \right], \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u(0, t) = u_x(l, t) = 0,$
 $u(x, 0) = \frac{F_0}{2\pi p E} \ln \left(1 + \frac{x}{l_0}\right), \quad u_t(x, 0) = 0, \quad a^2 = \frac{E}{\rho}.$

У к а з а н и е. Функция $u(x, 0) = u_0(x)$, определяющая начальные смещения сечений стержня, является решением стационарной задачи

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(l_0 + x) \frac{du_0}{dx} &= 0, \quad 0 < x < l, \\ u_0(0) &= 0, \quad u'_0(l) = \frac{F_0}{2\pi p E(l_0 + l)}. \end{aligned}$$

1.29. $u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = \frac{F_0}{ES} \left(\frac{l}{2} - x\right), \quad u_t(x, 0) = 0.$

1.30. $S(x)u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} S(x) \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \quad a^2 = \frac{E_0}{\rho_0},$
 $u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = 0.$

$$1) u_0(x) = \frac{l_0 F_0}{E_0} \ln \frac{l_0 - x}{l_0 - x_c}, \quad x_c = \frac{l}{3} \frac{3l_0 - 2l}{2l_0 - l}, \quad S(x) = \frac{S_0}{l_0} (l_0 - x);$$

$$2) u_0(x) = \frac{l_0^2 F_0}{E_0 S_0} \frac{x_c - x}{(l_0 - x_c)(l_0 - x)}, \quad x_c = \frac{l}{4} \frac{6l_0^2 - 8l_0 l + 3l^2}{3l_0^2 - 3l_0 l + l^2}, \quad S(x) = \frac{S_0}{l_0^2} (l_0 - x)^2;$$

$$3) u_0(x) = \frac{F_0}{2\pi\rho E_0} \ln \frac{l_0 + x_c}{l_0 + x}, \quad x_c = \frac{l}{3} \frac{3l_0 + 2l}{2l_0 + l}, \quad S(x) = 2\pi p(l_0 + x).$$

$$\begin{aligned} 1.31. \quad & (l_0^2 + x^2)u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} (l_0^2 + x^2) \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u_x(-l, t) = u_x(l, t) = 0, \\ & u(x, 0) = \frac{F_0}{\pi p^2 l_0 E} \operatorname{arctg} \frac{x}{l_0}, \quad u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.32. \quad & u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x). \end{aligned}$$

У к а з а н и е. Вариация функционала

$$\Phi(u) = \int_{t_1}^{t_2} \int_0^l \left(\frac{\rho S u_t^2}{2} - \frac{E S u_x^2}{2} \right) dx dt$$

осуществляется на функциях $u + \alpha \chi$, где $\chi(x, t_1) = \chi(x, t_2) = 0$ (в моменты t_1, t_2 система находится в точках реальной траектории); при $x = 0$ и $x = l$ никаких условий для $\chi(x, t)$ не ставится (задача со свободной границей).

1.33. Указания. 1. Уравнение движения внутреннего элемента $\Delta x \Delta S$ стержня: $\rho \Delta x \Delta S v_t = \sigma \Delta S|_{x+\Delta x} - \sigma \Delta S|_x$. Здесь $\varepsilon(x, t) = u_x(x, t)$, скорость элемента стержня $v(x, t) = u_t(x, t)$, где $u(x, t)$ — отклонение от положения равновесия в момент $t > 0$ сечения, равновесная координата (при $t = 0$) которого равна x (пример 2.10). Напряжение $\sigma = E u_x$, где E — модуль Юнга (пример 1.1).

1.34. Решение 2. Нужно проверить, что функция, определенная посредством (1.11) удовлетворяет уравнению (1.9):

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial x} \sigma \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) &= -\frac{\partial}{\partial t} h(u_x) - \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial x} \sigma(u_x) = -h'(u_x) u_{xt} - \frac{1}{\rho} \sigma'(u_x) u_{xx} = \\ &= -h'(u_x) (u_t)_x - \frac{1}{\rho} \sigma'(u_x) u_{xx} = -h'(u_x) (-h(u_x))_x - \frac{1}{\rho} \sigma'(u_x) u_{xx} = \\ &= (h'(u_x))^2 u_{xx} - \frac{1}{\rho} \sigma'(u_x) u_{xx} = \frac{1}{\rho} \sigma'(u_x) u_{xx} - \frac{1}{\rho} \sigma'(u_x) u_{xx} = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.35. \quad & \frac{\partial u}{\partial t} + h \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = 0, \quad 0 < x, \quad 0 < t, \\ & u(0, t) = \mu(t), \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

Решение. Из начальных условий следует, что $u_x(0, 0) = u_t(0, 0) = 0$. В этом случае из (1.11) вытекает, что $h(0) = 0$, а это значит, что в (1.10) постоянная $C = 0$. При малых деформациях (см. пример 1.1) $\sigma(u_x) = E u_x$, и для однородного стержня соотношение (1.10) принимает форму $h(u_x) = a u_x$, где $a = \sqrt{E/\rho}$. В результате уравнение (1.11) становится линейным: $u_t + a u_x = 0$. Этому уравнению удовлетворяет любая гладкая функция $\varphi(x - at)$, представляющая собой прямую волну, т.е. волну, распространяющуюся в положительном направлении оси Ox . Уравнение (1.12) описывает обратную волну. При движении торца возникает только прямая волна, следовательно, функция $u(x, t)$ — решение уравнения (1.11).

$$1.37. \quad \frac{\partial u}{\partial t} + h \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{1}{\rho} \int_0^t F(\tau) d\tau, \quad 0 < x, \quad 0 < t,$$

$$u(0, t) = \mu(t), \quad h(y) = \frac{1}{\sqrt{\rho}} \int_0^y \sqrt{\sigma'(\eta)} d\eta,$$

$$u(0, t) = u_t(0, t) = 0.$$

1.40. У к а з а н и е. Внутренняя потенциальная энергия элемента Δx струны пропорциональна удлинению $\sqrt{1 + u_x^2} \Delta x - \Delta x$ этого элемента; потенциальная энергия единицы длины струны равна

$$\frac{T(x) \left(\sqrt{1 + u_x^2} \Delta x - \Delta x \right)}{\Delta x} \approx \frac{1}{2} T(x) u_x^2(x, t),$$

а кинетическая энергия $\rho u_t^2/2$. Соответствующий функционал

$$\Phi(u) = \int_{t_1}^{t_2} \int_0^l \left(\frac{\rho u_t^2}{2} - \frac{T u_x^2}{2} \right) dx dt.$$

$$1.41. \quad u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad -l < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u(-l, t) = u(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = h \left(1 - \frac{x^2}{l^2} \right), \quad u_t(x, 0) = 0.$$

$$1.42. \quad u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u(0, t) = u(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = \frac{F_0}{T} \begin{cases} \left(1 - \frac{x_0}{l} \right) x, & 0 \leq x \leq x_0, \\ \left(1 - \frac{x}{l} \right) x_0, & x_0 \leq x \leq l, \end{cases} \quad u_t(x, 0) = 0.$$

У к а з а н и е. Функция $u_0(x)$, описывающая начальные отклонения точек струны от положения равновесия, является решением задачи

$$u_0''(x) + \frac{F_0}{T} \delta(x - x_0) = 0, \quad 0 < x < l, \\ u_0(0) = u_0(l) = 0,$$

эквивалентная форме которой (см. (10.16))

$$u_0''(x) = 0, \quad 0 < x < x_0, \quad x_0 < x < l, \\ u_0(0) = u_0(l) = 0, \\ u_0(x_0 + 0) - u_0(x_0 - 0) = 0, \\ T u'(x_0 + 0) - T u'(x_0 - 0) = -F_0.$$

$$1.43. \quad u_{tt} = a^2 u_{xx} + g, \quad -l < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u(-l, t) = u(l, t) = 0,$$

$$u|_{t=0} = \frac{\rho g}{2T} (l^2 - x^2) + \frac{F_0}{2T} (l - |x|), \quad u_t|_{t=0} = 0.$$

У к а з а н и е. Функция $u(x, 0) = u_0(x)$, описывающая начальные отклонения, является решением стационарной задачи

$$u_0''(x) = -\frac{\rho g}{T}, \quad -l < x < 0, \quad 0 < x < l, \\ u_0(-l) = u_0(l) = 0, \\ u_0(+0) - u_0(-0) = 0, \\ T u'(+0) - T u'(-0) = -F_0.$$

$$1.44. \quad u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad -l < x < l, \quad 0 < t, \quad u(-l, t) = u(l, t) = 0,$$

$$1) \quad u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \frac{I}{2\rho r_0} \eta(r_0 - |x|);$$

$$2) \quad u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \frac{I}{\rho} \delta(x - x_0).$$

$$1.45. \quad u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = \frac{F(t)}{T}, \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$$

$$1.46. \quad u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u(0, t) = u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = u_0 \frac{x}{l}, \quad u_t(x, 0) = 0.$$

$$1.47. \quad u_{tt} = a^2 u_{xx} - g, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u(0, t) = u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = \frac{u_0 x}{l} - \frac{gx(x-l)}{2T}, \quad u_t(x, 0) = 0.$$

$$1.48. \quad u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u(0, t) = 0, \quad -Tu_x(l, t) = Mu_{tt}(l, t),$$

$$u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < l, \\ \frac{I}{M}, & x = l. \end{cases}$$

$$1.49. \quad u_{tt} = a^2 u_{xx} - g, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u(0, t) = 0, \quad Tu_x(l, t) + Mu_{tt}(l, t) = -Mg,$$

$$u(x, 0) = \begin{cases} \frac{\rho g x^2}{2T} - \frac{mgx}{T} + \frac{F_0 x}{T}, & 0 \leq x \leq x_0, \\ \frac{\rho g x^2}{2T} - \frac{mgx}{T} + \frac{F_0 x_0}{T}, & x_0 \leq x \leq l, \end{cases}$$

где m — суммарная масса струны и кольца, $u_t(x, 0) = 0$.

У к а з а н и е. Функция $u(x, 0) = u_0(x)$, описывающая начальные отклонения, является решением стационарной задачи

$$u_0'' = \frac{\rho g}{T} - \frac{F_0}{T} \delta(x - x_0), \quad 0 < x < l,$$

$$u_0 = 0, \quad u_0'(l) = -\frac{Mg}{T},$$

эквивалентная форма которой (см. (10.15))

$$u_0''(x) = \frac{\rho g}{T}, \quad 0 < x < x_0, \quad x_0 < x < l,$$

$$u_0(0) = 0, \quad u_0'(l) = -\frac{Mg}{T},$$

$$u_0(x_0 + 0) - u_0(x_0 - 0) = 0,$$

$$Tu'(x_0 + 0) - Tu'(x_0 - 0) = -F_0.$$

Последние два условия выражают непрерывность струны и статическое равновесие точки $x = x_0$.

$$1.50. \quad u_{tt} = a^2 u_{xx} - g, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u(0, t) = 0, \quad Tu_x(l, t) + Mu_{tt}(l, t) = -Mg,$$

$$u(x, 0) = \frac{gx^2}{2a^2} + \frac{F_0 - (m + m_0)g}{T} x, \quad u_t(x, 0) = 0.$$

1.51. У к а з а н и е. См. решение задачи 1.66.

1.52. $u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad -l < x < l, \quad 0 < t,$
 $u_x(-l, t) = u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = \frac{F_0}{T_0} x, \quad u_t(x, 0) = 0.$

1.53. $u_{tt} = a^2 u_{xx} + \frac{F(t)}{\rho} \eta(t_0 - t) \cdot \delta(x - x_0), \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$

1.54. $u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x, \quad 0 < t,$
 $(u_x - h u)|_{x=0} = -h u_0 \sin \omega t, \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, \quad h = \frac{k}{T}.$

1.55. Задача имеет две (эквивалентные) постановки:

1) $u_{tt} = a^2 u_{xx} + \frac{F_0}{\rho} \delta(x - vt), \quad 2) \quad u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $-\infty < x < \infty, \quad 0 < t, \quad u(vt + 0, t) - u(vt - 0, t) = 0,$
 $u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0; \quad u_x(vt + 0, t) - u_x(vt - 0, t) = -\frac{F_0}{\rho(a^2 - v^2)}.$




Рис. 1.26

У к а з а н и е. Условия «сшивки» (т. е. граничные условия в точке приложения силы) в постановке 2 можно получить либо из дифференциального уравнения в постановке 1 после перехода к переменным $\xi = x - vt$, $\tau = t$ и применения формулы (10.15) обобщенного дифференцирования, либо с помощью 2-го закона Ньютона (изменение количества движения равно импульсу действующей силы) для элемента струны $\Delta x = x_2 - x_1$, где $x_1 = vt_1$, $x_2 = vt_2$ (рис. 1.26),

$$\rho u_{1t} \Delta x - \rho u_{2t} \Delta x = T_0 u_{2x} \Delta t - T_0 u_{1x} \Delta t + F_0 \Delta t.$$

1.56. $u_{tt} = a^2 u_{xx} - \alpha u_t, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x).$

1.58. У к а з а н и е. Потенциальная энергия сдвига параллелепипеда AB

$$\frac{\Delta F \Delta \varphi \Delta x}{2} = G \frac{\Delta x}{2} \left(\frac{\Delta u}{\Delta x} \right)^2 r^2 \Delta S.$$

1.59. 1) $Ku_{tt} = JGu_{xx} + M(x, t);$ 2) $Ku_{tt} = JGu_{xx} - 2\pi r_0^2 \alpha u_t.$

1.60. $u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u(0, t) = u_0 \sin \omega t, \quad |u(x, t)| < \infty, \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$

1.61. $u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 1) $u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0;$
 2) $u(0, t) = 0, \quad GJu_x(l, t) + ku(l, t) = 0,$
 $u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x).$

1.62. $u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $GJu_x(0, t) - ku(0, t) = 0, \quad GJu_x(l, t) = M(t), \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$

$$1.63. \quad u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x, \quad 0 < t, \\ GJu_x(0, t) - ku(0, t) = -ku_0 \sin \omega t, \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$$

$$1.64. \quad u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u_x(0, t) = 0, \quad GJu_x(l, t) + ku(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = \frac{M_0}{k} \left(1 + \frac{kl}{GJ} \right) - \frac{M_0 x}{GJ}, \quad u_t(x, 0) = 0.$$

$$1.65. \quad u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = \frac{M_0}{GJl} \begin{cases} (l - x_0)x, & 0 \leq x \leq x_0, \\ x_0(l - x), & x_0 \leq x \leq l, \end{cases} \\ u_t(x, 0) = 0.$$

У к а з а н и е. Функция $u(x, 0) = u_0(x)$ — решение задачи

$$u''_0 = 0, \quad 0 < x < x_0, \quad x_0 < x < l, \\ u_0(0) = u_0(l) = 0,$$

$$u_0(x_0 + 0) - u_0(x_0 - 0) = 0, \quad u'_0(x_0 + 0) - u'_0(x_0 - 0) = -\frac{M_0}{GJ}.$$

1.66. Р е ш е н и е. Функция $u(x, t)$ удовлетворяет уравнениям

$$Ku_{tt} = \frac{\partial}{\partial x} GJ \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = 0,$$

где $u_0(x)$ — решение стационарной задачи

$$\frac{d}{dx} GJ \frac{du}{dx} = 0, \quad 0 < x < l, \\ G(0)Ju'_0(0) = G(l)Ju'_0(l) = M_0.$$

Эти условия определяют функцию $u_0(x)$ не однозначно, а с точностью до аддитивной постоянной:

$$G(x)Ju'_0(x), \quad \text{где } C = M_0,$$

$$u_0(x) = \frac{M_0}{J} \int_0^x \frac{dx}{G} + C_1.$$

Чтобы получить однозначное решение надо ввести дополнительное условие для $u_0(x)$. Пусть постоянные моменты сил начинают действовать одновременно с некоторого момента времени $t = t_0$. При любом $t \geq t_0$ состояние вала описывается уравнениями

$$Ku_{tt} = \frac{\partial}{\partial x} GJ \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ G(0)Ju_x(0, t) = G(l)Ju_x(l, t) = M_0, \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$$

В итоге интегрирования по x от 0 до l уравнения движения с учетом граничных условий получаются тождества

$$\int_0^l Ku_{tt} dx = 0 \implies \int_0^l Ku_t dx = C_1.$$

Так как $u_t(x, t_0) = 0$, то $C_1 = 0$. Отсюда после интегрирования по t с учетом начального условия $u(x, t_0) = 0$ следует соотношение

$$\int_0^l K(x)u(x, t_0)dx = 0.$$

В качестве дополнительного условия для $u_0(x)$ можно взять равенство

$$\int_0^l K(x)u_0(x)dx = 0.$$

Это условие соответствует физической теореме: если сумма моментов действующих на механическую систему, равна нулю, то момент количества движения системы сохраняется.

1.67. $u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$

$$u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = \frac{M_0}{GJ} \left(x - \frac{l}{2}\right), \quad u_t(x, 0) = 0.$$

1.68. $u_{tt} = g \frac{\partial u}{\partial x} \left[(l-x) \frac{\partial u}{\partial x}\right], \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$

$$u(0, t) = \frac{w_0 t^2}{2}, \quad |u(l, t)| < \infty, \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$$

1.69. $u_{tt} = g \frac{\partial}{\partial x} \left[(l-x) \frac{\partial u}{\partial x}\right], \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$

$$u(0, t) = 0, \quad |u(l, t)| < \infty,$$

$$u(x, 0) = -\frac{F_0}{\rho g} \begin{cases} \ln \left(1 - \frac{x}{l}\right), & 0 \leq x \leq \frac{l}{2}, \\ \ln \frac{1}{2}, & \frac{l}{2} \leq x \leq l, \end{cases}$$

$$u_t(x, 0) = 0.$$

У к а з а н и е. Функция $u(x, 0) = u_0(x)$ — решение задачи

$$\frac{d}{dx} \left(1 - \frac{x}{l}\right) \frac{du_0}{dx} = 0, \quad 0 < x < \frac{l}{2}, \quad \frac{l}{2} < x < l,$$

$$u_0(0) = 0, \quad |u_0(l)| < \infty,$$

$$u_0\left(\frac{l}{2} + 0\right) - u_0\left(\frac{l}{2} - 0\right) = 0, \quad u'_0\left(\frac{l}{2} + 0\right) - u'_0\left(\frac{l}{2} - 0\right) = -\frac{2F_0}{\rho g l}.$$

1.70. $u_{tt} = g \frac{\partial}{\partial x} \left[(l-x) \frac{\partial u}{\partial x}\right], \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$

$$u(0, t) = 0, \quad |u(l, t)| < \infty, \quad u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \frac{I}{\rho} \delta\left(x - \frac{l}{2}\right).$$

1.71. $u_{tt} = g \frac{\partial}{\partial x} (l-x) \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$

$$u(0, t) = 0, \quad |u(l, t)| < \infty, \quad u(x, 0) = \frac{p_0 x}{\rho g}, \quad u_t(x, 0) = 0.$$

У к а з а н и е. Начальное отклонение струны $u(x, 0) = u_0(x)$ — решение стационарной задачи

$$\frac{d}{dx} (l-x) \frac{du_0}{dx} + \frac{p_0}{\rho g} = 0, \quad 0 < x < l,$$

$$u_0(0) = 0, \quad |u_0(l)| < \infty \text{ либо } \lim_{x \rightarrow l} (l-x) u'_0(x) = 0.$$

$$1.72. \quad u_{tt} = g \frac{\partial}{\partial x} \left[(l-x) \frac{\partial u}{\partial x} \right] + \omega^2 u, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) = 0, \quad |u(l, t)| < \infty, \quad u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x).$$

$$1.73. \quad \rho(x) u_{tt} = \frac{\partial}{\partial x} T(x) \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) = 0, \quad |u(l, t)| < \infty, \\ u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x), \quad T(x) = g \int_x^l \rho(\xi) d\xi.$$

$$1.74. \quad \left(1 - \frac{x}{l}\right)^\nu u_{tt} = \frac{gl}{\nu+1} \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(1 - \frac{x}{l}\right)^{\nu+1} \frac{\partial u}{\partial x} \right], \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow l} \left[\left(1 - \frac{x}{l}\right)^{\nu+1} \frac{\partial u}{\partial x} \right] = 0, \\ u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x).$$

$$1.75. \quad u_{tt} = 2gl \sqrt{1 - \frac{x}{l}} \frac{\partial}{\partial x} \left[\sqrt{1 - \frac{x}{l}} \frac{\partial u}{\partial x} \right], \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow l} \sqrt{1 - \frac{x}{l}} u_x(x, t) = 0, \\ u(x, 0) = u_0 \left(1 - \sqrt{1 - \frac{x}{l}}\right), \quad u_t(x, 0) = 0.$$

У к а з а н и е. Функция $u(x, 0) = u_0(x)$ — решение задачи

$$\frac{d}{dx} \left[\sqrt{1 - \frac{x}{l}} \frac{du_0}{dx} \right] = 0, \quad 0 < x < l, \\ u_0(0) = 0, \quad u_0(l) = u_0.$$

$$1.76. \quad \rho(x) u_{tt} = \frac{\partial}{\partial x} T(x) \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l_1, \quad l_1 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) = 0, \quad |u(l, t)| < \infty, \\ u(l_1 + 0, t) = u(l_1 - 0, t), \quad u_x(l_1 + 0, t) = u_x(l_1 - 0, t), \\ u_t(x, 0) = 0, \quad u(x, 0) = u_0 \begin{cases} \frac{\ln \left(1 - \frac{m_1 x}{m l_1}\right)}{\ln \frac{m_2}{m}}, & 0 \leq x \leq l_1 \\ 1, & l_1 \leq x \leq l, \end{cases} \\ T(x) = g \begin{cases} m - \rho_1 x, & 0 \leq x \leq l_1, \quad m = m_1 + m_2, \quad m_1 = \rho_1 l_1, \\ (l-x) \rho_2, & l_1 \leq x \leq l, \quad m_2 = \rho_2 l_2, \quad l_2 = l - l_1. \end{cases}$$

$$1.77. \quad (l-x)^2 u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[(l-x)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right], \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) = v_0 t, \quad |u(l, t)| < \infty, \quad u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0.$$

$$1.78. \quad (l-x)^2 u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[(l-x)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right] - (l-x)^2 g, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) = 0, \quad |u(l, t)| < \infty, \quad u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ -v_0, & 0 < x \leq l. \end{cases}$$

$$1.79. \quad (l-x) u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[(l-x) \frac{\partial u}{\partial x} \right] + (l-x) g, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u_x(0, t) = 0, \quad |u(l, t)| < \infty, \quad u(x, 0) = \frac{g \rho l}{2E} x \left(1 - \frac{x}{2l}\right), \quad u_t(x, 0) = 0.$$

У к а з а н и е. Функция $u(x, 0) = u_0(x)$ — решение задачи

$$a^2 \frac{d}{dx} (l-x) \frac{du_0}{dx} + (l-x) g = 0, \quad 0 < x < l, \\ u_0(0) = 0, \quad |u_0(l)| < \infty.$$

- 1.80.** $(l-x)u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[(l-x) \frac{\partial u}{\partial x} \right], \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $ES_0 u_x(0, t) = -F(t), \quad |u(l, t)| < \infty, \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$
- 1.81.** $(l-x)u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[(l-x) \frac{\partial u}{\partial x} \right], \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $ES_0 u_x(0, t) - ku(0, t) = -k\mu(t), \quad |u(l, t)| < \infty,$
 $u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$
- 1.82.** $(l-x)^2 u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} (l-x)^2 \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u(0, t) = u_0 \sin \omega t, \quad |u(l, t)| < \infty, \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$
- 1.83.** $\left(1 - \frac{|x|}{l}\right) u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left(1 - \frac{|x|}{l}\right) \frac{\partial u}{\partial x}, \quad x \in (-l; 0) \cup (0; l), \quad t > 0,$
 $|u| < \infty, \quad u(-0, t) = u(+0, t), \quad u_x(-0, t) = u_x(+0, t),$
 $u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x).$
- 1.84.** $u_{tt} = \frac{\omega^2}{2} \frac{\partial}{\partial x} \left[(l^2 - x^2) \frac{\partial u}{\partial x} \right], \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u(0, t) = 0, \quad |u(l, t)| < \infty, \quad u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x).$
- 1.85.** $\rho(x) u_{tt} = \omega^2 \frac{\partial}{\partial x} T(x) \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \quad T(x) = \int_x^l \rho(x) x dx,$
 $u(0, t) = 0, \quad |u(l, t)| < \infty, \quad u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x).$
- 1.86.** $u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u(0, t) = 0, \quad ESu_x(l, t) + mu_{tt}(l, t) = F(t), \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$
- 1.87.** $u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u(0, t) = 0, \quad ESu_x(l, t) + mu_{tt}(l, t) = -mg,$
 $u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < l, \\ -\sqrt{2gh}, & x = l. \end{cases}$
- 1.88.** $u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $ESu_x(0, t) - mu_{tt}(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0,$
 $u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \begin{cases} v, & x = 0, \\ 0, & 0 < x \leq l. \end{cases}$
- 1.89.** $u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $ESu_x(0, t) - ku(0, t) = 0, \quad ESu_x(l, t) + mu_{tt}(l, t) = 0,$
 $u(x, 0) = u_0 \frac{kx + ES}{kl + ES}, \quad u_t(x, 0) = 0.$

У к а з а н и е. Функция $u(x, 0) = u_0(x)$ — решение задачи

$$u_0''(x) = 0, \quad 0 < x < l, \\ ESu_0'(0) - ku(0) = 0, \quad u_0(l) = u_0.$$

- 1.90.** $u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u_x(0, t) = 0, \quad ESu_x(l, t) + ku(l, t) = -mu_{tt}(l, t)$
 $u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \frac{I}{\rho S} \delta(x).$

- 1.91.** $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, $0 < x < x_0$, $x_0 < l$, $0 < t$,
 $u(0, t) = 0$, $u(l, t) = \mu(t)$,
 $u(x_0 + 0, t) - u(x_0 - 0, t) = 0$, $u_x(x_0 + 0, t) - u_x(x_0 - 0, t) = \frac{m}{ES} u_{tt}(x_0, t)$,
 $u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$.
- 1.92.** $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, $0 < x < x_0$, $x_0 < l$, $0 < t$,
 $u(0, t) = 0$, $u_x(l, t) = 0$,
 $u(x_0 + 0, t) - u(x_0 - 0, t) = 0$, $u_x(x_0 + 0, t) - u_x(x_0 - 0, t) = \frac{m}{ES} u_{tt}(x_0, t)$,
 $u(x, 0) = \frac{F_0 x}{ES}$, $u_t(x, 0) = 0$.
- 1.93.** $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, $0 < x < x_0$, $0 < t$, $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, $x_0 < x < l$, $0 < t$,
 $u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0$, $u(x, 0) = u_0(x)$, $u_t(x, 0) = 0$,
 $u(x-0, t) = u(x+0, t)$, $-ESu_x(x-0, t) + ESu_x(x+0, t) = mu_{tt}(x_0, t)$,
если $x_c = \frac{\rho l^2 S + 2mx_0}{2(\rho l S + m)} < x_0$, или $\rho_2(l - x)^2 < \rho_1 x_0^2$, то
 $u_0(x) = \frac{F_0}{S} \begin{cases} \frac{x - x_c}{E_1}, & 0 \leq x \leq x_0, \\ \frac{x - x_c}{E_2}, & x_0 \leq x \leq l; \end{cases}$
если $x_c > x_0$, то $u_0(x) = \frac{F_0}{S} \begin{cases} \frac{x - x_c}{E_1} + \frac{x_0 - x_c}{E_2}, & 0 \leq x \leq x_0, \\ \frac{x - x_c}{E_2}, & x_0 \leq x \leq l. \end{cases}$
- 1.94.** $\rho(x) u_{tt} = T u_{xx}$, $-l < x < l$, $0 < t$, $\rho(x) = \rho_0 + m \delta(x)$,
 $u(-l, t) = u(l, t) = 0$,
 $u(x, 0) = 0$, $\rho(x) u_t(x, 0) = I \delta(x)$,
- 1.95.** $\rho(x) u_{tt} = T u_{xx}$, $0 < x < l$, $0 < t$, $\rho(x) = \rho_0 + m \delta(x)$,
 $u(0, t) = u_x(l, t) = 0$,
 $u(x, 0) = 0$, $\rho(x) u_t(x, 0) = I \delta(x - x_0)$,
- Эквивалентная постановка:
 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, $0 < x < x_0$, $x_0 < x < l$, $0 < t$,
 $u(0, t) = u_x(l, t) = 0$,
 $u(x_0 + 0, t) - u(x_0 - 0, t) = 0$, $T u_x(x_0 + 0, t) - T u_x(x_0 - 0, t) = m u_{tt}(x_0, t)$,
 $u(x, 0) = 0$, $u_t(x, 0) = \begin{cases} 0, & 0 < x < x_0, \ x_0 < x < l, \\ \frac{I}{m}, & x = x_0. \end{cases}$
- 1.96.** $\rho(x) u_{tt} = T u_{xx}$, $0 < x < l$, $0 < t$, $\rho(x) = \rho_0 + m \delta(x)$,
 $u(0, t) = 0$, $u_x(l, t) + h u(l, t) = 0$, $h = \frac{k}{T}$,
 $u(x, 0) = 0$, $\rho(x) u_t(x, 0) = I \delta(x - x_0)$,
- 1.97.** $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, $0 < x < x_0$, $x_0 < x < l$, $0 < t$,
 $u(0, t) = u_x(l, t) = 0$,
 $u(x_0 + 0, t) - u(x_0 - 0, t) = 0$, $T u_x(x_0 + 0, t) - T u_x(x_0 - 0, t) = m u_{tt}(x_0, t)$,
 $u(x, 0) = \frac{F_0}{lT} \begin{cases} x(l - x_0), & 0 < x < x_0, \\ x_0(l - x), & x_0 < x < l, \end{cases}$
 $u_t(x, 0) = 0$.

- 1.98.** $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, $0 < x < x_0$, $x_0 < x < l$, $0 < t$,
 $u(0, t) = 0$, $u(x_0 + 0, t) - u(x_0 - 0, t) = 0$,
 $Tu_x(x_0 + 0, t) - Tu_x(x_0 - 0, t) = mu_{tt}(x_0, t)$,
 $1) u_x(l, t) = 0$, $u(x, 0) = \frac{F_0}{T} \begin{cases} x, & 0 < x < x_0, \\ x_0, & x_0 < x < l, \end{cases}$
 $u_t(x, 0) = 0$;
 $2) Tu_x(l, t) + ku(l, t) = 0$,
 $u(x, 0) = \frac{F_0}{T} \begin{cases} \frac{k(l - x_0) + T}{kl + T} x, & 0 < x < x_0, \\ \frac{k(l - x) + T}{kl + T} x_0, & x_0 < x < l, \end{cases}$
 $u_t(x, 0) = 0$.
- 1.99.** $u_{tt} = a^2 u_{xx} - g$, $-l < x < 0$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $u(-l, t) = u(l, t) = 0$,
 $u(+0, t) = u(-0, t)$, $T_0 u_x(+0, t) - T_0 u_x(-0, t) - mg = mu_{tt}(0, t)$,
 $u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$.
- 1.100.** $u_{tt} = gl \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(\frac{M}{m_0} - \frac{x}{l} \right) \frac{\partial u}{\partial x} \right]$, $0 < x < l$, $0 < t$, $m_0 = \rho_0 l$, $M = m_0 + m$,
 $u(0, t) = 0$, $gu_x(l, t) + u_{tt}(l, t) = 0$,
 $u(x, 0) = u_0 \frac{\ln(1 - \frac{m_0 x}{Ml})}{\ln \frac{m}{M}}$, $u_t(x, 0) = 0$.
- У к а з а н и е. Функция $u(x, 0) = u_0(x)$ — решение задачи
- $$\frac{d}{dx} \left[\left(\frac{M}{m_0} - \frac{x}{l} \right) \frac{du_0}{dx} \right] = 0, \quad 0 < x < l,$$
- $$u_0(0) = 0, \quad u_0(l) = u_0.$$
- 1.101.** $u_{tt} = gl \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(\frac{M}{m_0} - \frac{x}{l} \right) \frac{\partial u}{\partial x} \right]$, $0 < x < l$, $0 < t$, $m_0 = \rho_0 l$, $M = m_0 + m$,
 $u(0, t) = 0$, $gu_x(l, t) + u_{tt}(l, t) = 0$,
 $u(x, 0) = 0$, $u_t(x, 0) = \begin{cases} 0, & 0 < x < l, \\ \frac{I}{m}, & x = l. \end{cases}$
- 1.102.** $u_{tt} = \frac{\omega^2 l^2}{2} \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(1 + 2 \frac{m}{m_0} - \left(\frac{x}{l} \right)^2 \right) \frac{\partial u}{\partial x} \right]$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $u(0, t) = 0$, $u_{tt}(l, t) + l\omega^2 u_x(l, t) = 0$,
 $u(x, 0) = u_0(x)$, $u_t(x, 0) = u_1(x)$, $m_0 = \rho_0 l$.
- 1.103.** $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $u(0, t) = 0$, $T_0 u_x(l, t) + mu_{tt}(l, t) = 0$,
 $u(x, 0) = u_0 \frac{x}{l}$, $u_t(x, 0) = 0$.
- 1.104.** $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $u(0, t) = 0$, $T_0 u_x(l, t) + mu_{tt}(l, t) = -mg$,
 $u(x, 0) = \left[\frac{h}{l} + \frac{g(l - x)}{2a^2} \right] x$, $u_t(x, 0) = 0$.
- 1.105.** $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $K_0 u_{tt}(0, t) = GJu_x(0, t)$, $u(l, t) = u_0 \sin \omega t$, $u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$.

$$\mathbf{1.106.} \quad u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) = 0, \quad K_0 u_{tt}(l, t) + G J u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = \frac{M}{GJ} x, \quad u_t(x, 0) = 0.$$

$$\mathbf{1.107.} \quad u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ J G u_x(0, t) + K_0 u_{tt}(0, t) = 0, \quad G J u_x(l, t) + k u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = \frac{M_0}{k G J} \begin{cases} k(l - x_0) + J G, & 0 < x < x_0, \\ k(l - x) + J G, & x_0 < x < l, \end{cases} \\ u_t(x, 0) = 0.$$

У к а з а н и е. Функция $u(x, 0) = u_0(x)$ — решение стационарной задачи

$$u_0'' = 0, \quad 0 < x < x_0, \quad x_0 < x < l, \\ u_0'(0) = 0, \quad J G u_0'(l) + k u_0(l) = 0, \\ u_0(x_0 + 0) - u_0(x_0 - 0) = 0, \quad J G u_0'(x_0 + 0) - J G u_0'(x_0 - 0) = -M_0.$$

$$\mathbf{1.108.} \quad u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ J G u_x(0, t) + K_1 u_{tt}(0, t) = 0, \quad J G u_x(l, t) - K_2 u_{tt}(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = \frac{u_1(l - x)}{l} + \frac{u_2 x}{l}, \quad u_t(x, 0) = 0.$$

$$\mathbf{1.109.} \quad 1) u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ J G u_x(0, t) - k u(0, t) = 0, \quad K_0 u_{tt}(l, t) + G J u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = \frac{M_0 x}{GJ} + \frac{M_0}{k}, \quad u_t(x, 0) = 0; \\ 2) u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u_x(0, t) = 0, \quad G J u_x(l, t) + k u(l, t) = -K_0 u_{tt}(l, t), \\ u(x, 0) = \frac{M_0(l - x)}{GJ} + \frac{M_0}{k}, \quad u_t(x, 0) = 0;$$

$$\mathbf{1.110.} \quad u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < x_0, \quad x_0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u_x(0, t) = -\frac{M(t)}{GJ}, \quad u_x(l, t) + \frac{K}{GJ} u(l, t) = 0, \\ u(x_0 + 0, t) - u(x_0 - 0, t) = 0, \\ u_x(x_0 + 0, t) - u_x(x_0 - 0, t) = \frac{K_0}{GJ} u_{tt}(x_0, t), \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$$

$$\mathbf{1.111.} \quad u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < x_0, \quad x_0 < x < l, \quad 0 < t, \quad x(0, t) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, \\ u(x_0 + 0, t) - u(x_0 - 0, t) = 0, \\ u_x(x_0 + 0, t) - u_x(x_0 - 0, t) = \frac{K_0}{GJ} u_{tt}(x_0, t), \\ 1) u(l, t) = 0, \quad u_0(x, 0) = \frac{M_0}{l G J} \begin{cases} (l - x_0)x, & 0 \leq x \leq x_0, \\ (l - x)x_0, & x_0 \leq x \leq l; \end{cases} \\ 2) u_x(l, t) = 0, \quad u_0(x, 0) = \frac{M_0}{GJ} \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq x_0, \\ x_0, & x_0 \leq x \leq l; \end{cases} \\ 3) G J u_x(l, t) + k u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = \frac{M_0}{GJ} \begin{cases} \left(\frac{kx}{GJ + kl} - 1 \right) x_0, & 0 \leq x \leq x_0, \\ \left(\frac{kx_0}{GJ + kl} - 1 \right) x, & x_0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

1.112. Задачу можно поставить в двух (эквивалентных) формах.

Постановка 1

$$\rho(x)u_{tt} = \frac{\partial}{\partial x} E(x) \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x),$$

$$\rho(x) = \begin{cases} \rho_1, & 0 < x < x_0, \\ \rho_2, & x_0 < x < l, \end{cases} \quad E(x) = \begin{cases} E_1, & 0 < x < x_0, \\ E_2, & x_0 < x < l. \end{cases}$$

Постановка 2

$$u_{tt} = \frac{E_1}{\rho_1} u_{xx}, \quad u_{tt} = \frac{E_2}{\rho_2} u_{xx},$$

$$0 < x < x_0, \quad 0 < t, \quad x_0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0,$$

$$u(x_0 + 0, t) = u(x_0 - 0, t), \quad E_2 u_x(x_0 + 0, t) = E_1 u_x(x_0 - 0, t),$$

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x).$$

Замечание. Решение задачи методом разделения переменных (глава 2) основано на построении системы собственных функций, которые формируют ряд, представляющий функцию $u(x, t)$; для отыскания собственных функций используется постановка в форме 2. Постановка в форме 1 выявляет неочевидное свойство собственных функций: они ортогональны на промежутке $(0; l)$ с весом $\rho(x)$.

1.113. $u_{tt} = a_1^2 u_{xx}$, $0 < x < x_0$, $0 < t$, $u_{tt} = a_2^2 u_{xx}$, $x_0 < x < l$, $0 < t$,

$$u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0,$$

$$u(x-0, t) = u(x+0, t), \quad E_1 u_x(x-0, t) = E_2 u_x(x+0, t),$$

$$u(x, 0) = \begin{cases} \frac{F_0(x_c - x)}{E_1 S}, & 0 < x < x_0, \\ \frac{F_0(x_0 - x)}{E_2 S} + \frac{F_0(x_c - x_0)}{E_1 S}, & x_0 < x < l, \end{cases}$$

$$u_t(x, 0) = 0, \quad a_i^2 = \frac{E_i}{\rho_i}, \quad i = 1, 2, \quad x_c = \frac{l}{2} \frac{\rho_1 x_0^2 + \rho_2 (l^2 - x_0^2)}{\rho_1 x_0 + \rho_2 (l - x_0)}.$$

1.114. $u_{tt} = a_1^2 u_{xx}$, $u_{tt} = a_2^2 u_{xx}$, $a_i^2 = \frac{T}{\rho_i}$, $i = 1, 2$,

$$0 < x < x_0, \quad 0 < t, \quad x_0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$T u_x(0, t) = -F(t), \quad u(l, t) = 0,$$

$$u(x_0 + 0, t) = u(x_0 - 0, t), \quad u_x(x_0 + 0, t) = u_x(x_0 - 0, t),$$

$$u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$$

1.115. $u_{tt} = a_1^2 u_{xx}$, $u_{tt} = a_2^2 u_{xx}$, $a_i^2 = \frac{G_i J}{K_i}$, $i = 1, 2$,

$$0 < x < x_0, \quad 0 < t, \quad x_0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0,$$

$$u(x_0 + 0, t) = u(x_0 - 0, t), \quad G_2 u_x(x_0 + 0, t) = G_1 u_x(x_0 - 0, t).$$

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = 0,$$

где начальные отклонения сечений вала определяются выражением:

$$u_0(x) = \begin{cases} u_0 \frac{G_2 x}{G_1(l - x_0) + G_2 x_0}, & 0 \leq x \leq x_0, \\ u_0 \frac{G_2 x_0 + G_1(x - x_0)}{G_1(l - x_0) + G_2 x_0}, & x_0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

У к а з а н и е. Начальная функция $u_0(x)$ — решение задачи

$$\begin{aligned} u'_0 &= 0, \quad 0 < x < x_0, \quad x_0 < l, \\ u_0(0) &= 0, \quad u_0(l) = u_0, \\ u_0(x_0 + 0) &= u_0(x_0 - 0), \quad G_2 u'_0(x_0 + 0) = G_1 u'_0(x_0 - 0). \end{aligned}$$

1.116. $u_{tt} = a_1^2 u_{xx}, \quad u_{tt} = a_2^2 u_{xx}, \quad a_i^2 = \frac{G_i J}{K_i}, \quad i = 1, 2,$
 $0 < x < x_0, \quad 0 < t, \quad x_0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u(x_0 + 0, t) = u(x_0 - 0, t), \quad G_2 u_x(x_0 + 0, t) = G_1 u_x(x_0 - 0, t),$
 $u(x, 0) = \frac{M_0}{J} \begin{cases} \frac{x - x_0}{G_1} - p, \\ \frac{x - x_0}{G_2} - p, \end{cases}$
 $u_t(x, 0) = 0, \quad p = \frac{K_2 G_1 (l - x_0)^2 - K_1 G_2 x_0^2}{2 G_1 G_2 [K_1 x_0 + K_2 (l - x_0)]}.$

1.117. $u_{1tt} = a_1^2 u_{1xx}, \quad u_{2tt} = a_2^2 u_{2xx},$
 $-l < x < 0, \quad 0 < t < \tau, \quad 0 < x, \quad 0 < t < \tau,$
 $u_{1x}(-l, t) = 0, \quad |u_2(x, t)| < \infty,$
 $u_1(x, 0) = 0, \quad u_{1t}(x, 0) = v, \quad u_2(x, 0) = u_{2t}(x, 0) = 0,$
 $u_1(0, t) = u_2(0, t), \quad E_1 S_1 u_{1x}(0, t) = E_2 S_2 u_{2x}(0, t),$
 $u_{1x}(0, t) < 0, \quad 0 < t < \tau, \quad u_{1x}(0, \tau) = 0.$

1.118. $u_{1tt} = a_1^2 u_{1xx}, \quad u_{2tt} = a_2^2 u_{2xx},$
 $-l_1 < x < 0, \quad 0 < t < \tau, \quad 0 < x < l_2, \quad 0 < t < \tau,$
 $u_{1x}(-l_1, t) = 0, \quad u_{2x}(l_2, t) = 0,$
 $u_1(x, 0) = 0, \quad u_{1t}(x, 0) = v_1, \quad u_2(x, 0) = 0, \quad u_{2t}(x, 0) = v_2,$
 $u_1(0, t) = u_2(0, t), \quad E_1 S_1 u_{1x}(0, t) = E_2 S_2 u_{2x}(0, t),$
 $u_{1x}(0, t) < 0, \quad 0 < t < \tau, \quad u_{1x}(0, \tau) = 0.$

1.119. 1. $u(P, t) = \mu(P, t);$
 2. $T(P) \frac{\partial u(P, t)}{\partial n} = F(P, t);$
 3. $-T(P) \frac{\partial u(P, t)}{\partial n} = k(P) u(P, t);$
 4. $-T(P) \frac{\partial u(P, t)}{\partial n} = \alpha(P) u(P, t); \quad P \in \partial \Omega.$

1.120. Р е ш е н и е. На рис.1.27 изображен элемент S' поверхности мембраны в момент времени $t > 0$; $L' = \partial S'$ — кусочно-гладкий контур, $\mathbf{l}'$ и $\mathbf{n}'$ — векторы в касательной плоскости к S' в точке P' , $\mathbf{l}'$ — касательный вектор к контуру L' , вектор $\mathbf{n}'$ перпендикулярен к вектору $\mathbf{l}'$, $\mathbf{N}$ — нормальный вектор к поверхности S' в точке P' , γ — угол между вектором $\mathbf{N}$ и осью Oz ; геометрический объект без штриха — проекция на плоскость xOy геометрического объекта со штрихом. Любой вектор в плоскости, касательной к S' , составляет с плоскостью xOy угол, косинус которого мало отличается от единицы, поэтому скалярное произведение

$$\mathbf{l}' \mathbf{n}' = l'_x n'_x + l'_y n'_y + l'_z n'_z = l_x n_x + l_y n_y = \mathbf{ln},$$




Рис. 1.27

т.е. векторы $\mathbf{l}$ и $\mathbf{n}$ взаимно перпендикулярны. Согласно геометрическому смыслу производной $\operatorname{tg} \gamma = \lim_{\Delta n \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta n} = \frac{\partial u}{\partial n}$, следовательно, проекция силы натяжения на ось Ou равна $T \frac{\partial u}{\partial n}$. Теперь имеются все данные, чтобы написать уравнение движения элемента S

$$\int_S \rho u_{tt} dS = \int_L T \frac{\partial u}{\partial n} dl + \int_S F ds.$$

В результате применения формулы Остроградского уравнение приобретает вид

$$\int_S (\rho u_{tt} - \operatorname{div}(T \nabla u)) - F dS = 0.$$

Полученное равенство является тождеством относительно S , из которого следует (при условии непрерывности подынтегральной функции) уравнение колебаний мембраны

$$\rho u_{tt} = \operatorname{div}(T \nabla u) + F.$$

- 1.121.** $u_{tt} = a^2 \Delta u$, $(x, y) \in \Omega$, $0 < t$,
 $T \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\partial \Omega} = F$, $u(x, y, 0) = u_t(x, y, 0) = 0$.
- 1.122.** $u_{tt} = a^2 \Delta u$, $(x, y) \in \Omega$, $0 < t$,
 $\left(T \frac{\partial u}{\partial n} + ku \right) \Big|_{\partial \Omega} = 0$, $u(x, y, 0) = u_0(x, y)$, $u_t(x, y, 0) = u_1(x, y)$.
- 1.123.** $u_{tt} = a^2 \Delta u + \frac{F_0}{\rho} \sin \omega t$, $0 < x < l_1$, $0 < y < l_2$, $0 < t$,
 $u(0, y, t) = u(l_1, y, t) = 0$, $u_y(x, 0, t) = u_y(x, l_2, t) = 0$,
 $u(x, y, 0) = u_t(x, y, 0) = 0$.
- 1.124.** $u_{tt} = a^2 \Delta u + \frac{F(x, t)}{\rho} \delta(y)$, $|x| < l_1$, $|y| < l_2$, $0 < t$,
 $u(\pm l_1, y, t) = u(x, \pm l_2, t) = 0$,
 $u(x, y, 0) = u_t(x, y, 0) = 0$.

- 1.125.** $u_{tt} = a^2 \Delta u + \frac{F(t)}{\rho l_1} \delta\left(y - \frac{l_2}{l_1} x\right), \quad 0 < x < l_1, \quad 0 < y < l_2, \quad 0 < t,$
 $u(0, y, t) = u(l_1, y, t) = u(x, 0, t) = u(x, l_2, t) = 0,$
 $u(x, y, 0) = u_t(x, y, 0) = 0.$
- 1.126.** $u_{tt} = a^2 \Delta u + \frac{F_0}{2\rho r_0 r} \cdot [\delta(\varphi) + \delta(\varphi - \pi)], \quad 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t,$
 $|u| < \infty, \quad u(r_0, \varphi, 0) = 0, \quad u(r, \varphi, 0) = u_t(r, \varphi, 0) = 0.$
- 1.127.** $u_{tt} = a^2 \Delta u + \frac{p_0}{\rho} \frac{\delta(r - r_1)}{2\pi r}, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t,$
 $|u| < \infty, \quad u(r_0, t) = 0, \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$
- 1.128.** $u_{tt} = a^2 \Delta u, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t,$
 $|u| < \infty, \quad u(r_0, t) = 0, \quad u(r, 0) = 0, \quad u_t(r, 0) = \frac{I}{\pi \rho r_1^2} \eta(r_1 - r).$
- 1.129.** $u_{tt} = a^2 \Delta u, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t,$
 $|u| < \infty, \quad u(r_0, \varphi, t) = 0, \quad u(r, \varphi, 0) = 0,$
 $u_t(r, \varphi, 0) = \frac{I}{\rho} \frac{\delta(r - r_1)}{r} \cdot \delta(\varphi - \varphi_1).$
- 1.130.** $u_{tt} = a^2 \Delta u, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t,$
 $|u| < \infty, \quad -2\pi r_0 T_0 u_r(r_0, t) = m u_{tt}(r_0, t),$
 $u(r, 0) = 0, \quad u_t(r, 0) = \begin{cases} \frac{I}{m}, & r = r_0, \\ 0, & 0 \leq r < r_0. \end{cases}$
- 1.131.** $u_{tt} = a^2 \Delta u, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t,$
 $2\pi r_0 T_0 u_r(r_1, t) = m u_{tt}(r_1, t), \quad u(r_2, t) = 0,$
 $u(r, 0) = h \frac{\ln \frac{r}{r_2}}{\ln \frac{r_1}{r_2}}, \quad u_t(r, 0) = 0.$
- 1.132.** $u_{tt} = a^2 \Delta u, \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t,$
 $2\pi r_1 T_0 u_r(r_1, t) = M u_{tt}(r_1, t), \quad u(r_2, t) = 0, \quad M = m + m_1, \quad m_1 = \pi r_1^2 \rho_0,$
 $u(r, 0) = 0, \quad u_t(r, 0) = \begin{cases} \frac{I}{M}, & r = r_1, \\ 0, & r_1 < r < r_2. \end{cases}$
- 1.133.** $u_{tt} = a^2 \Delta u, \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t,$
 $2\pi r_1 T_0 u_r(r_1, t) + F(t) = m u_{tt}(r_1, t), \quad u(r_2, t) = 0,$
 $u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0;$
 обозначения те же, что и в ответе к задаче 1.132.
- 1.134.** $u_{tt} = a^2 \Delta u, \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t,$
 $2\pi r_1 T_0 u_r(r_1, t) = m u_{tt}(r_1, t), \quad u(r_2, t) = 0,$
 $u(r, 0) = \frac{F_0}{2\pi T_0} \ln \frac{r_2}{r}, \quad u_t(r, 0) = 0,$
 $u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0;$
 обозначения те же, что и в ответе к задаче 1.132.
- 1.135.** $u_{tt} = a^2 \Delta u - g, \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t,$
 $2\pi r_1 T_0 u_r(r_1, t) - M g = M u_{tt}(r_1, t), \quad u(r_2, t) = 0,$
 $u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0;$
 обозначения те же, что и в ответе к задаче 1.132.

- 1.136.** $u_{tt} = a^2 \Delta u - g$, $r_1 < r < r_2$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < t$,
 $2\pi r_1 T_0 u_r(r_1, t) - Mg = Mu_{tt}(r_1, t)$, $u(r_2, t) = 0$,
 $u(r, 0) = \frac{g(r^2 - r_2^2)}{4a^2} + \frac{mg + F_0}{2\pi T_0} \ln \frac{r}{r_1}$, $u_t(r, 0) = 0$;
 обозначения те же, что и в ответе к задаче 1.132.
- 1.137.** 1. $\rho u_{tt} = \operatorname{div}(T \nabla u) - ku$; 2. $\rho u_{tt} = \operatorname{div}(T \nabla u) - \alpha u_t$.
- 1.138.** $\Delta u + \frac{p(y)}{T_0} \delta(x) = 0$, $-l_1 < x < l_1$, $-l_2 < y < l_2$,
 $u(x, -l_2) = u(x, l_2) = 0$,
 $u_x(-l_1, y) - \frac{k}{T_0} u(-l_1, y) = 0$, $u_x(l_1, y) + \frac{k}{T_0} u(l_1, y) = 0$.
- 1.139.** $\Delta u + g = 0$, $0 < x < x_0$, $x_0 < x < l_1$, $0 < y < l_2$,
 $u(0, y) = u(l_1, y) = u(x, 0) = u(x, l_2) = 0$,
 $u(x_0 + 0, y) = u(x_0 - 0, y)$, $u_x(x_0 + 0, y) = u_x(x_0 - 0, y)$.
- 1.140.** $\Delta u = -\frac{p_0}{T_0} \frac{\delta(r - r_1)}{r_1} \cdot \sin \varphi$, $0 < r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$,
 $|u| < \infty$, $u(r_0, \varphi) = 0$, $u(r, \varphi + 2\pi) = u(r, \varphi)$.
- 1.141.** $\Delta u = -\frac{p(r)}{T_0 r} \cdot \delta(\varphi - \frac{\pi}{2})$, $0 < r < r_0$, $0 < \varphi < \pi$,
 $|u| < \infty$, $u(r_0, \varphi) = 0$, $u(r, 0) = u(r, \pi) = 0$.
- 1.142.** $\Delta u(r, \varphi) = 0$, $0 < r < r_0$, $0 < \varphi < \pi$,
 $u(r_0, \varphi) = 0$, $|u(r, \varphi)| < \infty$, $\left. \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right|_{\varphi=0} = -\frac{F_0 r}{2r_0}$, $\left. \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right|_{\varphi=\pi} = \frac{F_0 r}{2r_0}$.
- 1.143.** $\Delta u = -\frac{p}{T}$, $0 < x < l$, $0 < y < l - x$,
 $u(0, y) = u(x, 0) = u(x, l - x) = 0$.
- 1.144.** $\Delta u = 0$, $0 < x < l$, $0 < y < l - x$,
 $u(0, y) = u(x, 0) = 0$, $u_x(x, l - x) + u_y(x, l - x) = p\sqrt{2}$.
- 1.145.** В полярных координатах
 $\Delta u = 0$, $r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $|u(r, \varphi)| < \infty$, $u(r_0, \varphi) = f(\varphi)$.
- 1.146.** В полярных координатах
 $\Delta u = \frac{\rho g}{T}$, $r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $|u(r, \varphi)| < \infty$, $u(r_0, \varphi) = f(\varphi)$.
- 1.147.** $\rho S u_{tt} + \frac{\partial^2}{\partial x^2} E J \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $u(0, t) = u_x(0, t) = 0$, $u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$,
 1) $u_{xx}(l, t) = 0$, $u_{xxx}(l, t) = -\frac{F(t)}{EJ(l)}$;
 2) $u(l, t) = 0$, $u_{xx}(l, t) = \frac{M(t)}{EJ(l)}$.

У к а з а н и е. Действие — это сумма функционала (1.22) и одного из слагаемых

$$\int_{t_1}^{t_2} F(t)u(l, t) dt \quad \text{или} \quad \int_{t_1}^{t_2} M(t)u_x(l, t) dt.$$

После преобразований (см. пример 2.10) получаются соотношения

$$1) \int_{t_1}^{t_2} [-EJ(l)u_{xx}(l, t)\xi_x(l, t) + \left(\frac{\partial(EJu_{xx})}{\partial x} \Big|_{x=l} + F(t) \right) \xi(l, t)] dt = 0$$

либо

$$2) \int_{t_1}^{t_2} [-EJ(l)u_{xx}(l, t) + M(t)] \xi_x(l, t) dt = 0,$$

из которых следуют граничные условия.

$$\begin{aligned} \mathbf{1.148.} \quad & u_{tt} + a^2 u_{xxxx} = 0, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u(0, t) = u_x(0, t) = u(l, t) = u_x(l, t) = 0, \\ & u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.149.} \quad & u_{tt} + a^2 u_{xxxx} = 0, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & 1) u(0, t) = u_x(0, t) = u_{xx}(l, t) = u_{xxx}(l, t) = 0; \\ & 2) u(0, t) = u_x(0, t) = u(l, t) = u_{xx}(l, t) = 0, \\ & u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.150.} \quad & u_{tt} + a^2 u_{xxxx} = \frac{F_0(t)}{\rho S} \delta(x - x_0), \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u(0, t) = u_x(0, t) = u(l, t) = u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.151.} \quad & u_{tt} + a^2 u_{xxxx} = \frac{M_0(t)}{\rho S} \delta'(x - x_0), \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u(0, t) = u_{xx}(0, t) = u(l, t) = u_{xx}(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.152.} \quad & u_{tt} + a^2 u_{xxxx} = 0, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u_{xx}(0, t) = u_{xxx}(0, t) = u(l, t) = u_x(l, t) = 0, \\ & u(x, 0) = \frac{F_0}{6EJ} (2l + x)(l - x)^2, \quad u_t(x, 0) = 0, \\ & a^2 = \frac{EJ}{\rho l^2 S}, \quad S = 4l_1 l_2, \quad J = \frac{4l_1 l_2^3}{3}. \end{aligned}$$

У к а з а н и е. Функция $u(x, 0) = u_0(x)$ является решением следующей стационарной задачи:

$$\begin{aligned} u_0^{IV} &= 0, \quad 0 < x < l, \\ u_0''(0) &= 0, \quad u_0'''(0) = \frac{F_0}{JE}, \quad u_0(l) = u_0'(l) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.153.} \quad & u_{tt} + a^2 u_{xxxx} = 0, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u_{xx}(0, t) = u_{xxx}(0, t) = u(l, t) = u_x(l, t) = 0, \\ & u(x, 0) = -\frac{M_0(l - x)^2}{2EJ}, \quad u_t(x, 0) = 0, \\ & a^2 = \frac{EJ}{\rho S}, \quad S = 4l_1 l_2, \quad J = \frac{4l_1 l_2^3}{3}. \end{aligned}$$

У к а з а н и е. Функция $u(x, 0) = u_0(x)$ — решение задачи

$$\begin{aligned} u_0^{IV} &= 0, \quad 0 < x < l, \\ u_0''(0) &= -\frac{M_0}{EJ}, \quad u_0'''(0) = 0, \quad u_0(l) = u_0'(l) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{1.154.} \quad & u_{tt} + a^2 u_{xxxx} = 0, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\
 & u(0, t) = u_{xx}(0, t) = u(l, t) = u_{xx}(l, t) = 0, \\
 & u(x, 0) = \frac{M_0}{6lEJ} x(l-x)(2l-x), \quad u_t(x, 0) = 0, \\
 & a^2 = \frac{EJ}{\rho S}, \quad S = 4l_1 l_2, \quad J = \frac{4l_1 l_2^3}{3}.
 \end{aligned}$$

У к а з а н и е. Функция $u(x, 0) = u_0(x)$, описывающая начальные отклонения, является решением стационарной задачи

$$\begin{aligned}
 u_0^{IV} &= 0, \quad 0 < x < l, \\
 u_0(0) &= 0, \quad u_0''(0) = -\frac{M_0}{JE}, \quad u_0(l) = u_0''(l) = 0.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{1.155.} \quad & u_{tt} + a^2 u_{xxxx} = 0, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\
 & u(0, t) = u_x(0, t) = u(l, t) = u_x(l, t) = 0, \\
 & u(x_0 + 0, t) - u(x_0 - 0, t) = 0, \\
 & u_x(x_0 + 0, t) - u_x(x_0 - 0, t) = 0, \\
 & u_{xx}(x_0 + 0, t) - u_{xx}(x_0 - 0, t) = 0, \\
 & u_{xxx}(x_0 + 0, t) - u_{xxx}(x_0 - 0, t) = -\frac{m}{EJ} u_{tt}(x_0, t), \\
 & u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x), \quad a^2 = \frac{EJ}{\rho S}, \quad S = 4l_1 l_2, \quad J = \frac{4l_1 l_2^3}{3}.
 \end{aligned}$$

Р е ш е н и е (фрагмент). На элемент Δx стержня (рис. 1.28) действуют силы натяжения (вдоль оси Ox) и перерезывающие силы (перпендикулярно к Ox). Если элемент Δx находится в равновесии, то моменты этих сил относительно точки O , взятой на оси, равны

$$\Delta M = F \Delta x.$$




Рис. 1.28

Момент считается положительным, если он направлен по $\mathbf{e}_y$. Момент сил натяжения (1.21) в сечении $x + \Delta x$

$$M(x + \Delta x) = \int_S \frac{E\zeta^2 d\varphi dS}{\Delta x} = -JE u_{xx}|_{x+\Delta x}.$$

Следовательно,

$$\Delta M = M|_{x+\Delta x} - M|_x = -\frac{\partial}{\partial x} JE \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x.$$

Стало быть,

$$F(x, t) = \frac{\partial M}{\partial x} = -\frac{\partial}{\partial x} JE \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{1.156.} \quad & u_{tt} + a^2 u_{xxxx} = g, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\
 & u(0, t) = u_x(0, t) = u_{xx}(l, t) = u_{xxx}(l, t) = 0, \\
 & u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.
 \end{aligned}$$

$$1.157. \quad u_{tt} + a^2 u_{xxxx} = 0, \quad -l < x < l, \quad 0 < t.$$

$$1) \quad u(-l, t) = u_x(-l, t) = u(l, t) = u_x(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = \frac{F_0(l - |x|)^2(l + 2|x|)}{24EJ}, \quad u_t(x, 0) = 0.$$

$$2) \quad u(-l, t) = u_{xx}(-l, t) = u(l, t) = u_{xx}(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = \frac{F_0 x(l - |x|)(2l^2 l + 2|x| + x^2)}{12EJ}, \quad u_t(x, 0) = 0, \quad J = \frac{4l_1 l_2^3}{3}.$$

$$1.158. \quad u_{tt} + a^2 u_{xxxx} = 0, \quad -l < x < l, \quad 0 < t.$$

$$1) \quad u(-l, t) = u_x(-l, t) = u(l, t) = u_x(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = \frac{M_0 x(l - |x|)^2}{8EJ}, \quad u_t(x, 0) = 0.$$

$$2) \quad u(-l, t) = u_{xx}(-l, t) = u(l, t) = u_{xx}(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = \frac{M_0 x(l - |x|)(|x| - 2l)}{12EJ}, \quad u_t(x, 0) = 0, \quad J = \frac{4l_1 l_2^3}{3}.$$

$$1.159. \quad (l_0 - x)u_{tt} + a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}(l_0 - x) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u(0, t) = u_x(0, t) = u_{xx}(l, t) = u_{xxx}(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = \frac{F_0 l_0(l - l_0)}{EJ_0} \left[\frac{x^2}{2(l - l_0)} - x - (l_0 - x) \ln \left(1 - \frac{x}{l_0} \right) \right], \quad u_t(x, 0) = 0,$$

$$a^2 = \frac{EJ_0}{\rho S_0}, \quad S_0 = 4l_1 l_2, \quad J_0 = \frac{4l_1 l_2^3}{3}.$$

$$1.160. \quad (l_0 - x)u_{tt} + a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}(l_0 - x) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{p_0(l_0 - x)}{\rho}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u(0, t) = u_x(0, t) = u_{xx}(l, t) = u_{xxx}(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = \frac{Ax^2}{12} + \frac{A(l_0 - l)^2}{2} \left[\ln \left(1 - \frac{x}{l_0} \right) + \frac{(l_0 - l)x^2}{3(l_0 - x)l_0^2} + \frac{x}{l_0} \right],$$

$$u_t(x, 0) = 0, \quad A = \frac{p_0 S_0}{EJ_0}, \quad a^2 = \frac{EJ_0}{\rho S_0}, \quad S_0 = 4l_1 l_2, \quad J_0 = \frac{4l_1 l_2^3}{3}.$$

У к а з а н и е. Функция $u(x, 0) = u_0(x)$ — решение задачи

$$\frac{d^2}{dx^2}(l_0 - x) \frac{d^2 u_0}{dx^2} = \frac{p_0 S_0}{EJ_0}(l_0 - x), \quad 0 < x < l,$$

$$u_0(0) = u'_0(0) = 0, \quad u''_0(l) = u'''_0(l) = 0.$$

$$1.161. \quad (l_0 - x)u_{tt} + a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}(l_0 - x) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u(0, t) = u_{xx}(0, t) = u(l, t) = u_{xx}(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \frac{Il_0 \delta(x - x_0)}{\rho S_0(l - l_0)}, \quad S_0 = 4l_1 l_2.$$

$$1.162. \quad (l_0 - x)u_{tt} + \frac{a^2}{l_0^2} \frac{\partial^2}{\partial x^2}(l_0 - x)^3 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u(0, t) = u_{xx}(0, t) = u(l, t) = u_{xx}(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = \frac{l_0^3 M_0}{l EJ_0} \left[\ln \left(1 - \frac{x}{l_0} \right) - \frac{x}{l} \ln \left(1 - \frac{l}{l_0} \right) - \frac{x(l - x)}{2(l_0 - l)(l_0 - x)} \right],$$

$$u_t(x, 0) = 0, \quad a^2 = \frac{EJ_0}{\rho S_0}, \quad S_0 = 4l_1 l_2, \quad J_0 = \frac{4l_1 l_2^3}{3}.$$

У к а з а н и е. Функция $u(x, 0) = u_0(x)$ — решение задачи

$$\frac{d^2}{dx^2}(l_0 - x)^3 \frac{d^2 u_0}{dx^2} = 0, \quad 0 < x < l, \\ u_0(0) = u_0''(0) = 0, \quad u_0(l) = 0, \quad u_0'(l) = \frac{M_0}{J(l)E}.$$

1.163. $(l_0 - x)u_{tt} + \frac{a^2}{l_0^2} \frac{\partial^2}{\partial x^2}(l_0 - x)^3 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u(0, t) = u_x(0, t) = u_{xx}(l, t) = u_{xxx}(l, t) = 0,$
 $u(x, 0) = \frac{3M_0 l_0^3}{EJ_0(l_0 - l)} \left[\frac{x}{3l_0} \frac{(l + 2l_0)x - 3l_0^2}{l_0(l_0 - l)} - \ln \left(1 - \frac{x}{l_0} \right) \right], \quad u_t(x, 0) = 0,$
 $a^2 = \frac{EJ_0}{\rho S_0}, \quad S_0 = 4l_1 l_2, \quad J_0 = \frac{4l_1 l_2^3}{3}.$

1.164. $(l_0 - x)u_{tt} + \frac{a^2}{l_0^2} \frac{\partial^2}{\partial x^2}(l_0 - x)^3 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u(0, t) = u_x(0, t) = u_{xx}(l, t) = 0, \quad ES(l)u_{xxx}(l, t) + Mu_{tt}(l, t) = 0,$
 $u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \begin{cases} 0, & 0 < x < l, \\ \frac{I}{M}, & x = l, \end{cases}$
 $S(l) = 4l_1 l_2 \left(\frac{l_0 - l}{l_0} \right).$

1.165. $(l_0 - x)^2 u_{tt} + \frac{a^2}{l_0^2} \frac{\partial^2}{\partial x^2}(l_0 - x)^4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u(0, t) = u_x(0, t) = u_{xx}(l, t) = u_{xxx}(l, t) = 0,$
 $u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x),$
 $a^2 = \frac{EJ_0}{\rho S_0}, \quad S_0 = 4l_1 l_2, \quad J_0 = \frac{4l_1 l_2^3}{3}.$

1.166. $(l_0 - x)^2 u_{tt} + \frac{a^2}{l_0^2} \frac{\partial^2}{\partial x^2}(l_0 - x)^4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u(0, t) = u_x(0, t) = u_{xx}(l, t) = u_{xxx}(l, t) = 0,$
 1) $u(x, 0) = \frac{l_0 F_0 x^2 [(3l_0 l - (l_0 + 2l)x)]}{6EJ_0(l_0 - x)^2}, \quad u_t(x, 0) = 0,$
 2) $u(x, 0) = \frac{l_0 M_0 x^2 [l_0(l_0 + 3l) - 2(l_0 + l)x]}{2EJ_0(l_0 - l)(l_0 - x)^2}, \quad u_t(x, 0) = 0,$
 $a^2 = \frac{EJ_0}{\rho S_0}, \quad S_0 = 4l_1 l_2, \quad J_0 = \frac{4l_1 l_2^3}{3}.$

У к а з а н и е к 1). Функция $u(x, 0) = u_0(x)$, описывающая начальные отклонения, является решением стационарной задачи

$$\frac{d^2}{dx^2}(l_0 - x)^4 \frac{d^2 u_0}{dx^2} = 0, \quad 0 < x < l, \\ u_0(0) = u_0'(0) = 0, \quad u_0''(l) = 0, \quad u_0'''(l) = -\frac{F_0}{6EJ_0}.$$

1.167. Р е ш е н и е. Момент $M(x)$ равен моменту сил (1.21):

$$-\int_S E u_{xx} \zeta^2 ds = -J E u_{xx}.$$

$$1.168. \quad u_{tt} + a^2 \Delta^2 u = 0, \quad (x, y) \in \Omega, \quad 0 < t,$$

$$u|_{\partial\Omega} = \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\partial\Omega} = 0,$$

$$u(x, y, 0) = 0, \quad u_t(x, y, 0) = \frac{I}{\rho h} \delta(x - x_0) \cdot \delta(y - y_0).$$

$$1.169. \quad \Delta^2 u = \frac{F(x, y)}{D}, \quad |x| < l_1, \quad |y| < l_2,$$

$$u(\pm l_1, y) = u_x(\pm l_1, y) = u(x, \pm l_2) = u_y(x, \pm l_2) = 0.$$

$$1.170. \quad u_{tt} + a^2 \Delta^2 u = \frac{F(t)}{2\pi\rho h} \cdot \frac{\delta(r)}{r}, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t,$$

$$|u| < \infty, \quad u|_{r=r_0} = 0, \quad \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{\sigma}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right) \Big|_{r=r_0} = 0,$$

$$u|_{t=0} = u_t|_{t=0} = 0.$$

$$1.171. \quad \Delta^2 u = \frac{F(x, y)}{D}, \quad |x| < l_1, \quad |y| < l_2,$$

$$u(\pm l_1, y) = u_{xx}(\pm l_1, y) = u(x, \pm l_2) = u_{yy}(x, \pm l_2) = 0.$$

$$1.176. \quad \text{У к а з а н и е. В уравнение движения } n\text{-го маятника}$$

$$m d^2 \theta_n'' = k(\theta_{n+1} - 2\theta_n + \theta_{n-1}) - mgd \sin \theta_n$$

ввести непрерывную по n функцию $\theta(x, t)$, полагая $\theta_n(t) = \theta(nl, t)$, и устремить l к нулю при постоянном значении $kl^2 = K$.

$$1.177. \quad i\hbar \Psi_t = -\frac{\hbar^2}{2m} \Psi_{xx} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} \Psi, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t,$$

$$\Psi(x, 0) = \Psi_0(x), \quad \|\Psi\| = 1.$$

$$1.178. \quad i\hbar \Psi_t = -\frac{\hbar^2}{2m} \Psi_{xx}, \quad i\hbar \Psi_t = -\frac{\hbar^2}{2m} \Psi_{xx} + U_0,$$

$$0 < x < l, \quad 0 < t, \quad l < x, \quad 0 < t,$$

$$\Psi(0, t) = 0, \quad \Psi(l - 0, t) = \Psi(l + 0, t), \quad \Psi_x(l - 0, t) = \Psi_x(l + 0, t),$$

$$\Psi(x, 0) = \Psi_0(x), \quad \|\Psi\| = 1.$$

$$1.179. \quad \Psi_t = \frac{i\hbar}{2I} \Psi_{\varphi\varphi}, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t,$$

$$\Psi(\varphi + 2\pi) = \Psi(\varphi), \quad \Psi(\varphi, 0) = \Psi_0(\varphi), \quad \|\Psi\| = 1.$$

$$1.180. \quad \Psi_t = \frac{i\hbar}{2I} \Delta_\omega \Psi, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t,$$

$$\Psi \in C(S_1), \quad \Psi(\theta, \varphi, 0) = \Psi_0(\theta, \varphi), \quad \|\Psi\|^2 = \int_{S_1} |\Psi(\theta, \varphi, t)|^2 ds = 1,$$

Δ_ω — угловая часть оператора Лапласа.

У к а з а н и е. Оператор Гамильтона $\mathcal{H} = \frac{\mathcal{L}^2}{2I}$, где $\mathcal{L}^2 = -\hbar^2 \Delta_\omega$ — оператор квадрата момента.

$$1.181. \quad \Psi_t = \frac{i\hbar}{2m} \left(\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial \Psi}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \Delta_\omega \Psi \right),$$

$$0 < r < r_0, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t,$$

$$|\Psi| < \infty, \quad \Psi(r, \theta, \varphi + 2\pi, t) = \Psi(r, \theta, \varphi, t), \quad \Psi(r_0, \theta, \varphi, t) = 0,$$

$$\Psi(r, \theta, \varphi, 0) = \Psi_0(r, \theta, \varphi), \quad \|\Psi\|^2 = \int_B |\Psi|^2 d\mathbf{r} = 1, \quad B — шар радиуса r_0 .$$

$$1.182. \quad \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial \psi}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} = 0, \quad r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$\psi(r_1, \varphi) = \psi(r_2, \varphi) = 0, \quad \psi(r, \varphi + 2\pi) = \psi(r, \varphi), \quad \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{r_1}^{r_2} \psi^2 r dr = 1.$$

$$1.183. \quad \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \Delta_\omega \psi + U_0 e^{-\frac{r}{a}} \psi + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi = 0,$$

$$0 < r < \infty, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$|\psi| < \infty, \quad \psi(r, \theta, \varphi + 2\pi) = \psi(r, \theta, \varphi), \quad \int_{\mathbb{R}^3} \psi^2 d\mathbf{r} = 1,$$

Δ_ω — угловая часть оператора Лапласа.

$$1.184. \quad C\rho S u_t = \frac{\partial}{\partial x} kS \frac{\partial u}{\partial x} - \alpha \sigma(u - \mu) + FS.$$

У к а з а н и е. Уравнение теплового баланса для элемента Δx стержня:

$$C(x)\rho(x)S(x)\Delta x(u|_{t+\Delta t} - u|_t) = (q(x, t)S(x) - q(x + \Delta x, t)S(x + \Delta x))\Delta t - \\ - \alpha(x)\sigma(x)(u - \mu(x, t))\Delta x \Delta t + F(x, t)S(x)\Delta x \Delta t.$$

$$1.185. \quad u_t = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u_x(0, t) - hu(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) + hu(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = u_0(x).$$

У к а з а н и е. Задача является частным случаем задачи, рассмотренной в примере 1.11: Ω — слой ($0 < x < l$), температура зависит от переменных x и t . Другой подход состоит в написании уравнений теплового баланса для внутреннего элемента стержня и для элементов, примыкающих к концам (см. указание к решению предыдущей задачи).

$$1.186. \quad u_t = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) + hu(l, t) = h\mu(t), \quad u(x, 0) = 0, \quad h = \alpha/k.$$

$$1.187. \quad u_t = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$-ku_x(0, t) = q(t), \quad u(l, t) = \mu(t), \quad u(x, 0) = 0.$$

$$1.188. \quad u_t = a^2 u_{xx} + \frac{Q(t)}{\rho CS} \cdot \delta(x - x_0), \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = 0.$$

$$1.189. \quad u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u(0, t) = \mu_1, \quad u(l, t) = \mu_2,$$

$$u(x, 0) = \begin{cases} \mu_1 + \left(\mu_2 - \mu_1 + \frac{Q_0(l - x_0)}{kS} \right) \frac{x}{l}, & 0 \leq x \leq x_0, \\ \mu_2 + \left(\mu_1 - \mu_2 + \frac{Q_0 x_0}{kS} \right) \frac{l - x}{l}, & x_0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

У к а з а н и е. Для определения начальной температуры $u(x, 0) = u_0(x)$ нужно решить задачу

$$u_0'' = 0, \quad 0 < x < x_0, \quad x_0 < x < l,$$

$$u_0(0) = \mu_1, \quad u_0(l) = \mu_2,$$

$$u_0(x_0 + 0) - u_0(x_0 - 0) = 0, \quad u_0'(x_0 + 0) - u_0'(x_0 - 0) = -\frac{Q_0}{kS}.$$

$$1.190. \quad C(x)u_t = kS u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u(0, t) = u(l, t) = 0,$$

$$C(x)u_x(x, 0) = u_0 C_0 \delta(x), \quad C(x) = \rho CS + C_0 \delta(x).$$

Эквивалентная форма постановки задачи:

$$\begin{aligned} u_t &= a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) &= 0, \quad -kS u_x(l, t) = C_0 u_t(l, t), \\ u(x, 0) &= \begin{cases} 0, & 0 < x < l, \\ u_0, & x = l. \end{cases} \end{aligned}$$

1.191. $u_t = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u_x(0, t) - hu(0, t) = -h\mu_0, \quad u_x(l, t) = 0,$
 $u(x, 0) = \mu_0 + \frac{q}{kh}(1 + hx).$

1.192. $u_t = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < x_0, \quad x_0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u(0, t) = \mu, \quad u_x(l, t) = 0,$
 $u(x_0 - 0) = u(x_0 + 0), \quad -kS u_x(x_0 - 0) + kS u_x(x_0 + 0) = C_0 u_t(x_0, t),$
 $u(x, 0) = \mu + \frac{q}{k}x.$

1.193. 1) $u_t = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = A_1 - \frac{Q}{kS_0}x.$
 2) $u_t = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < x_0, \quad 0 < t, \quad u_t = a^2 u_{xx}, \quad x_0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u_x(0, t) = u_x(l, t)$
 $u(x-0, t) = u(x+0, t), \quad k_1 u_x(x-0, t) = k_2 u_x(x+0, t),$
 $u(x, 0) = \begin{cases} \frac{Q}{k_1 S_0}(x_0 - x) + A_2, & 0 < x < x_0, \\ \frac{Q}{k_2 S_0}(x_0 - x) + A_2, & x_0 < x < l, \end{cases}$
 A_1, A_2 — произвольные постоянные.

У к а з а н и е. Температура теплового поля, заданного потоком, определена с точностью до аддитивной постоянной.

1.194. $S(x)u_t = a^2 \frac{\partial}{\partial x} S(x) \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \quad a^2 = \frac{k}{C\rho},$
 $u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = u_0(x).$
 1) $u_0(x) = A_1 - \frac{Ql_0}{kS_0} \ln\left(1 - \frac{x}{l_0}\right), \quad S(x) = \frac{S_0}{l_0}(l_0 - x);$
 2) $u_0(x) = A_2 - \frac{Ql^2}{kS_0(l_0 - x)}, \quad S(x) = \frac{S_0}{l_0^2}(l_0 - x)^2;$
 3) $u_0(x) = A_3 - \frac{Q}{2\pi 2kp} \ln\left(1 + \frac{x}{l_0}\right), \quad S(x) = 2\pi p(l_0 + x),$
 где A_1, A_2, A_3 — произвольные постоянные.

1.195. $u_t = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < x_0, \quad 0 < t, \quad u_t = a^2 u_{xx}, \quad x_0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0,$
 $u(x-0, t) = u(x+0, t), \quad -kS_0 u_x(x-0, t) + kS_0 u_x(x+0, t) = C_0 u_t(x_0, t),$
 $u(x, 0) = A - \frac{Qx}{kS_0},$
 A — произвольная постоянная.

1.196. $u_t = a^2 u_{xx}, \quad v_0 t < x, \quad 0 < t,$
 $u(v_0 t, t) = \mu(t), \quad u(x, 0) = 0, \quad |u(x, t)| < \infty.$

- 1.197.** $C\rho S u_t = \frac{\partial}{\partial x} \left(kS \frac{\partial u}{\partial x} \right) - \alpha P u, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = u_0(x).$
- 1.198.** $u_t = a^2 u_{xx} - h(u - \mu), \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) + hu(l, t) = h\mu(l, t), \quad u(x, 0) = 0.$
- 1.199.** $u_t = a_1^2 u_{xx}, \quad 0 < x < x_0, \quad 0 < t, \quad u_t = a_2^2 u_{xx}, \quad x_0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u_x(0, t) = 0, \quad u(l, t) = \mu(t),$
 $u(x_0 - 0, t) = u(x_0 + 0, t), \quad k_1 u_x(x_0 - 0, t) = k_2 u_x(x_0 + 0, t), \quad u(x, 0) = u_0(x).$
- 1.200.** $u_t = a^2 u_{xx} + \frac{Q(t)}{C\rho S} \delta(x - v_0 t), \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t,$
 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} u(x, t) = 0, \quad u(x, 0) = 0.$
- 1.201.** $(l_0 - x)^2 u_t = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[(l_0 - x)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right], \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $-k u_x(0, t) = q_1(t), \quad -k u_x(l, t) = q_2(t), \quad u(x, 0) = u_0(x).$
- 1.202.** $(l_0 - x)^2 u_t = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[(l_0 - x)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right], \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u(0, t) = \mu_0, \quad u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = \mu_0 + \frac{q_0(l_0 - l)^2 x}{k l_0(l_0 - x)}.$
- 1.203.** $(l_0 - x) u_t = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[(l_0 - x) \frac{\partial u}{\partial x} \right], \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u_x(0, t) - h u(0, t) = -h \mu_1(t), \quad u(l, t) = \mu_2(t), \quad u(x, 0) = u_0(x).$
- 1.204.** $(l_0 - x) u_t = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[(l_0 - x) \frac{\partial u}{\partial x} \right], \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = \frac{Q_0}{4k} \left[x(2l_0 - x) - l(2l_0 - l) \frac{\ln \left(1 - \frac{x}{l_0} \right)}{\ln \left(1 - \frac{l}{l_0} \right)} \right].$

Для определения начальной температуры $u(x, 0) = u_0(x)$ нужно решить задачу

$$\frac{d}{dx}(l_0 - x) \frac{du_0}{dx} = -\frac{Q_0}{k}(l_0 - x), \quad 0 < x < l,$$

$$u_0(0) = u_0(l) = 0.$$

- 1.205.** $(l - x)^2 u_t = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[(l - x)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right], \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u(0, t) = \mu_0, \quad |u(l, t)| < \infty, \quad u(x, 0) = u_0.$
- 1.206.** $(l - x)^2 u_t = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[(l - x)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right], \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u(0, t) = 0, \quad |u(l, t)| < \infty, \quad u(x, 0) = \mu_0 \left(1 - \frac{I_1 \left(\beta \sqrt{1 - \frac{x}{l}} \right)}{I_1(\beta) \sqrt{1 - \frac{x}{l}}} \right),$

$$\beta = 2 \sqrt{\frac{2\alpha l \sqrt{l^2 + r_0^2}}{k r_0}}.$$

У к а з а н и е. Функция $u_0(x, 0) = u_0(x)$ удовлетворяет условиям

$$\left(1 - \frac{x}{l} \right) u'' - \frac{2}{l} u' - \frac{\beta^2}{4l^2} (u - \mu) = 0, \quad 0 < x < l,$$

$$u_0(0) = \mu, \quad |u(l)| < \infty.$$

Дифференциальное уравнение преобразуется в модифицированное уравнение Бесселя последовательными заменами: $v = u - \mu$, $\xi = \sqrt{1 - \frac{x}{l}}$ и $w = \frac{v}{\xi}$ (см. (2.53)).

$$\begin{aligned} \mathbf{1.207.} \quad & (l_0 + x)u_t = a^2 \frac{\partial}{\partial x}(l_0 + x) \frac{\partial u}{\partial x} + \beta \sqrt{x + l_0 + p/2} (u_1 - u), \\ & 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u_x(0, t) - hu(0, t) = -hu_1, \quad u_x(l, t) + hu(l, t) = hu_1, \\ & u(x, 0) = u_0(x), \quad a^2 = \frac{k}{C\rho}, \quad \beta = \frac{\sqrt{2}\alpha}{\rho C \sqrt{p}}, \quad h = \frac{\alpha}{k}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.208.} \quad & u_t = a^2 \Delta u + \frac{Q}{C\rho} \delta(x) \cdot \delta(y) \cdot \eta(t_0 - t), \quad |x| < l_1, \quad |y| < l_2, \quad 0 < t, \\ & u(\pm l_1, y, t) = u(x, \pm l_2, t) = 0, \quad u(x, y, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.209.} \quad & u_t = a^2 \Delta u, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t, \\ & |u| < \infty, \quad u_r(r_0, \varphi, t) + hu(r_0, \varphi, t) = h\mu(\varphi, t), \quad u(r, \varphi, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.210.} \quad & u_t = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r}, \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t, \\ & u(r_1, t) = \mu_0, \quad k u_r(r_1, t) = q(t), \quad u(r, 0) = u_0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.211.} \quad & u_t = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r}, \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t, \\ & u_r(r_1, t) = 0, \quad u_r(r_2, t) + h u(r_2, t) = 0, \\ & u(r, 0) = \frac{Q}{2k} \left(\frac{r_2^2 - r^2}{2} + r_1^2 \ln \frac{r}{r_2} + \frac{r_2^2 - r_1^2}{hr_2} \right). \end{aligned}$$

У к а з а н и е. Функция $u(r, 0) = u_0(r)$ — решение задачи

$$\begin{aligned} & \frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{du_0}{dr} + \frac{Q}{k} = 0, \quad r_1 < r < r_2, \\ & u_0'(r_1) = 0, \quad u_0'(r_2) + h u_0(r_2) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.212.} \quad & u_t = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r}, \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t, \\ & 2\pi r_1 k u_r(r_1, t) = C_0 u_t(r_1, t), \quad u(r_2, t) = 0, \quad u(r, 0) = u_0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.213.} \quad & u_t = a^2 \Delta u, \quad r_1 < r < r_2, \quad t > 0, \\ & -4\pi k r_1^2 u_r(r_1) = -4\pi k r_2^2 u_r(r_2) = Q(t), \quad u(r, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.214.} \quad & u_t = a^2 \Delta u + \frac{Q}{C\rho} \frac{\delta(r - r_1)}{r^2} \cdot \frac{\delta(\theta - \theta_1)}{\sin \theta} \cdot \delta(\varphi - \varphi_1) \cdot \delta(t), \\ & 0 < r < r_0, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t, \\ & |u| < \infty, \quad u_r(r_0, \theta, \varphi, t) + hu(r_0, \theta, \varphi, t) = 0, \quad u(r, \theta, \varphi, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.215.} \quad & u_t = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r}, \quad r_0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t, \\ & \frac{3k}{r_0} \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=r_0} + Q(t) = \rho_0 C_0 \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{r=r_0}, \\ & u(r, 0) = \begin{cases} u_0, & r < r_0, \\ u_1(r), & r > r_0. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.216.} \quad & u_t = a^2 \Delta u + \frac{Q}{4\pi r_0 l C\rho} \eta(r_0 - r) \cdot \eta(l - |z|) \cdot \delta(t), \\ & 0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad -\infty < z < \infty, \quad 0 < t, \\ & |u| < \infty \quad \lim_{r \rightarrow \infty} u(\mathbf{r}, t) = 0, \quad u(r, \varphi, z, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$1.217. \quad u_t = a^2 \Delta u - (\mathbf{v} \nabla u) + \frac{Q}{2lC\rho} \frac{\delta(r)}{2\pi r} \cdot \delta(l - |z|) \cdot \delta(t),$$

$$0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad -\infty < z < \infty, \quad 0 < t,$$

$$|u| < \infty, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} u(\mathbf{r}, t) = 0, \quad u(r, \varphi, z, 0) = 0, \quad (\mathbf{v} \mathbf{e}_z) = 0.$$

$$1.218. \quad \mathbf{q} = -k \nabla u, \text{ где } u(r, t) \text{ — решение задачи}$$

$$u_t = a^2 \Delta u, \quad r_1 < r < r_2, \quad t > 0,$$

$$u_r(r_1) = u_r(r_2) = 0, \quad u(r, 0) = \frac{Q}{4\pi r} + C.$$

У к а з а н и е. Начальная температура $u_0(r) = u(r, 0)$ удовлетворяет условиям:

$$\Delta u_0 = 0, \quad r_1 < r < r_2, \quad -4\pi k r_1^2 u_0'(r_1) = -4\pi k r_2^2 u_0'(r_2) = Q.$$

$$1.219. \quad \Delta u(x, y, z) = 0, \quad 0 < x < l_1, \quad 0 < y < l_2, \quad 0 < z < l_3,$$

$$u_x(0, y, z) = -\frac{q}{kl_2 l_3}, \quad u_z(x, y, 0) = \frac{q}{kl_1 l_2},$$

$$u_x(l_1, y, z) = u_y(x, 0, z) = u_y(x, l_2, z) = u_z(x, y, l_3) = 0.$$

$$1.220. \quad \Delta u = 0, \quad 0 < r < r_0, \quad -\pi \leq \varphi < \pi,$$

$$\left(k \frac{\partial u}{\partial r} + \alpha u \right) \Big|_{r=r_0} = q_0 \cos \varphi \cdot \eta \left(\frac{\pi}{2} - |\varphi| \right), \quad |u| < \infty, \quad \mathbf{q} = -q \mathbf{e}_x.$$

$$1.221. \quad \Delta u + \frac{Q}{k} \frac{\delta(r-d)}{2\pi r^2} \cdot \frac{\delta(\theta)}{\sin \theta} = 0, \quad r_0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$u_r(r_0, \theta, \varphi) = 0, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} (r, \theta, \varphi) = 0.$$

$$1.222. \quad \Delta u(\mathbf{r}) = -\frac{Q_0}{k} \delta(\mathbf{r}) \quad \text{в шаре,}$$

$$-k \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=r_0} = f(\theta, \varphi), \quad r_0^2 \int_{S_1} f ds = Q_0 \text{ — условие разрешимости.}$$

$$1.223. \quad \text{Гиперболическое уравнение теплопроводности } u_t + t_r u_{tt} = \frac{k}{C\rho} \Delta u$$

в первом случае становится классическим уравнением теплопроводности $u_t = a^2 \Delta u$, $a^2 = \frac{k}{C\rho}$, во втором случае — волновым уравнением $u_{tt} = V^2 \Delta u$,

где $V = \sqrt{\frac{k}{C\rho t_r}}$ — скорость распространения температуры.

$$1.224. \quad u_t = D u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u(0, t) = \mu(t), \quad u_x(l, t) + h u(l, t) = h \mu_1, \quad u(x, 0) = u_0(x).$$

$$1.225. \quad u_t = D u_{xx} - \beta u, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u_x(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = \frac{q(t)}{D}, \quad u(x, 0) = 0.$$

$$1.226. \quad u_t = D u_{xx} - \beta u, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u_x(0, t) - h u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = u_0, \quad h = \frac{\alpha}{D}.$$

$$1.227. \quad u_t = D u_{xx} - v u_x, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t,$$

$$|u| < \infty, \quad u(x, 0) = u_0(x),$$

$$1.228. \quad u_t = D \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + \alpha u, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t,$$

$$|u| < \infty, \quad u(r_0, t) = 0, \quad u(r, 0) = u_0, \quad \alpha > 0.$$

$$1.229. \quad u_t = D \Delta u, \quad r_1 < r < r_2, \quad t > 0,$$

$$u_r(r_1, t) = u_r(r_2, t) = 0, \quad u(r, 0) = \frac{Q}{4\pi D r}.$$

У к а з а н и е. Начальная концентрация $u_0(r) = u(r, 0)$ является решением стационарной задачи

$$\Delta u_0(r) = 0, \quad r_1 < r < r_2, \\ -4\pi D r_1^2 u'_0(r_1) = -4\pi D r_2^2 u'_0(r_2) = Q.$$

$$\mathbf{1.230.} \quad u_t = D\Delta u + Q(t) \cdot \frac{\delta(r-r_0)}{r^2} \cdot \frac{\delta(\theta-\theta_0)}{\sin\theta} \cdot \delta(\varphi-\varphi_0), \\ r_1 < r < r_2, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t, \\ u_r(r_1, \theta, \varphi, t) = 0, \quad u_r(r_2, \theta, \varphi, t) + hu(r_2, \theta, \varphi, t) = h\mu_0, \\ u(r, \theta, \varphi, 0) = 0.$$

$$\mathbf{1.231.} \quad u_t = D\Delta u - \alpha u, \quad r_0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t, \\ \left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=r_0} = -\frac{q(\theta, \varphi, t)}{D}, \quad |u| < \infty, \quad u|_{t=0} = 0.$$

$$\mathbf{1.232.} \quad u_t = D\Delta u - \alpha u, \quad r_0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t, \\ \left(\frac{\partial u}{\partial r} - hu \right) \Big|_{r=r_0} = -hu_0(t), \quad |u| < \infty, \quad u|_{t=0} = 0.$$

$$\mathbf{1.233.} \quad \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \beta u + Q_0 \frac{\delta(r)}{2\pi r} = 0, \quad |u(\infty)| < \infty, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

$$\mathbf{1.234.} \quad u_t = D_1 u_{xx}, \quad u_t = D_2 u_{xx}, \\ -l_1 < x < 0, \quad 0 < t, \quad 0 < x < l_2, \quad 0 < t, \\ u_x(-l_1, t) = 0, \quad u_x(l_2, t) = 0, \\ u(x, 0) = \begin{cases} u_1, & -l_1 < x < 0, \\ u_2, & 0 < x < l_2; \end{cases} \\ 1) \frac{u(-0, t)}{c_1} = \frac{u(+0, t)}{c_2}, \quad D_1 u_x(-0, t) = D_2 u_x(+0, t); \\ 2) \alpha \left[\frac{u(-0, t)}{c_1} - \frac{u(+0, t)}{c_2} \right] = D_1 u_x(-0, t) = D_2 u_x(+0, t), \quad \alpha > 0.$$

$$\mathbf{1.236.} \quad u_t + Q'(u)u_x + \beta u = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t, \\ u(x, 0) = u_0(x), \quad |u| < \infty.$$

У к а з а н и е. См. вывод уравнения (1.34).

$$\mathbf{1.237.} \quad \frac{1}{v} \Phi_t = D\Delta \Phi - \Sigma_c \Phi + F, \quad -\infty < x, y, z < \infty, \quad 0 < t, \\ \Phi(\mathbf{r}, 0) = v u_0(\mathbf{r}).$$

$$\mathbf{1.238.} \quad \frac{1}{v} \Phi_t = D\Phi_{xx} - \Sigma_c \Phi, \quad -l < x < l, \quad 0 < t, \\ \frac{1}{2} \Phi(-l, t) - D\Phi_x(-l, t) = 0, \quad \frac{1}{2} \Phi(l, t) + D\Phi_x(l, t) = 0, \\ \Phi(x, 0) = v u_0(x).$$

$$\mathbf{1.239.} \quad \frac{1}{v} \Phi_t = \frac{D}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial \Phi}{\partial r} - \Sigma_c \Phi + Q_0 \frac{\delta(r)}{2\pi r}, \quad r < \tilde{r}_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t, \\ \Phi(\tilde{r}_0, t) = 0, \quad \Phi(r, 0) = 0.$$

$$\mathbf{1.240.} \quad \frac{1}{v} \Phi_t = D\Delta \Phi - \Sigma_c \Phi + Q\delta(x) \cdot \delta(y) \cdot \delta(z-z_0), \\ -\infty < x, y < \infty, \quad 0 < z, \quad 0 < t, \\ \frac{1}{2} \Phi(x, y, 0, t) - D\Phi_z(x, y, 0, t) = 0, \quad \Phi(\mathbf{r}, 0) = 0.$$

$$1.241. \quad \frac{1}{v}\Phi_t = D\Delta\Phi - \Sigma_c\Phi, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t, \\ \left(\frac{1}{2}\Phi(\mathbf{r}, t) + D\frac{\partial\Phi(\mathbf{r}, t)}{\partial r}\right)\Big|_{r=r_0} = 0, \quad \Phi(\mathbf{r}, 0) = vu_0(\mathbf{r}), \quad |\Phi| < \infty.$$

$$1.242. \quad \frac{1}{v}\Phi_t = D_1\Delta\Phi - \Sigma_{c1}\Phi, \quad \frac{1}{v}\Phi_t = D_2\Delta\Phi - \Sigma_{c2}\Phi, \\ r < r_0, \quad 0 < t, \quad r_0 < r, \quad 0 < t, \\ \Phi(\mathbf{r}, 0) = vu_0(\mathbf{r}), \quad \Phi(\mathbf{r}, 0) = 0, \\ \Phi|_{r_0-0} = \Phi|_{r_0+0}, \quad D_1\frac{\partial\Phi}{\partial r}\Big|_{r_0-0} = D_2\frac{\partial\Phi}{\partial r}\Big|_{r_0+0}, \quad |\Phi| < \infty.$$

У к а з а н и е. Условия на границе раздела вытекают из непрерывности одно-сторонних плотностей тока нейтронов (закон сохранения нейтронов) на границе раздела двух сред:

$$\left(\frac{1}{2}\Phi - D_1\frac{\partial\Phi}{\partial r}\right)\Big|_{r_0-0} = \left(\frac{1}{2}\Phi - D_2\frac{\partial\Phi}{\partial r}\right)\Big|_{r_0+0}, \\ \left(\frac{1}{2}\Phi + D_1\frac{\partial\Phi}{\partial r}\right)\Big|_{r_0-0} = \left(\frac{1}{2}\Phi + D_2\frac{\partial\Phi}{\partial r}\right)\Big|_{r_0+0}.$$

$$1.243. \quad \Phi'' - \frac{1}{L^2}\Phi = 0, \quad x \neq 0, \\ \Phi(+0) - \Phi(-0) = 0, \\ \Phi'(+0) - \Phi'(-0) = -\frac{q_0}{D}, \quad |\Phi| < \infty.$$

Эквивалентная постановка:

$$\Phi'' - \frac{1}{L^2}\Phi = -\frac{q_0}{D}\delta(x), \quad -\infty < x < \infty, \quad |\Phi| < \infty.$$

Величина $L = \frac{1}{\sqrt{3\Sigma_c\Sigma_s}} = \sqrt{\frac{D}{\Sigma_c}}$ — длина диффузии. Физический смысл L можно уяснить на примере задачи

$$\Phi_{xx} - \frac{1}{L^2}\Phi = 0, \quad 0 < x, \quad |\Phi| < \infty.$$

Плотность потока нейтронов $\Phi = C \exp(-x/L)$. Следовательно, L — длина, на которой плотность потока уменьшается в e раз.

$$1.244. \quad \Delta\Phi - \frac{1}{L^2}\Phi = 0, \quad 0 < x < \tilde{l}, \\ \frac{1}{4}\Phi(0) - \frac{D}{2}\Phi_x(0) = q_0, \quad \Phi(\tilde{l}) = 0.$$

$$1.245. \quad \frac{1}{r}\frac{d}{dr}r^2\frac{d\Phi}{dr} - \frac{1}{L^2}\Phi = 0, \quad 0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ \lim_{r \rightarrow 0} \left(2\pi r D \frac{d\Phi}{dr}\right) = -q_0, \quad |\Phi(\infty)| < \infty.$$

$$1.246. \quad \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}r^2\frac{d\Phi}{dr} - \frac{1}{L^2}\Phi = 0, \quad 0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad < \theta < \pi, \\ \lim_{r \rightarrow 0} \left(4\pi r^2 D \frac{d\Phi}{dr}\right) = -Q_0, \quad \Phi(\tilde{r}_0) = 0.$$

$$1.247. \quad \Delta\Phi - \frac{1}{L_1^2}\Phi = 0, \quad \Delta\Phi - \frac{1}{L_2^2}\Phi = -\frac{Q_0}{D_2}\delta(x) \cdot \delta(y) \cdot \delta(z - z_0), \\ -\infty < x, y < \infty, \quad z < 0, \quad -\infty < x, y < \infty, \quad 0 < z,$$

$$\Phi|_{z=-0} = \Phi|_{z=+0}, \quad D_1 \frac{\partial \Phi}{\partial z} \Big|_{z=-0} = D_2 \frac{\partial \Phi}{\partial z} \Big|_{z=+0},$$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \Phi(\mathbf{r}) = 0,$$

где $D_i = \frac{1}{3\Sigma_{si}}$, $L_i = \frac{1}{\sqrt{\Sigma_{si}\Sigma_{ci}}}$, $i = 1, 2$. См. указание к задаче 1.242.

$$\mathbf{1.248.} \quad \Delta \Phi - \frac{1}{L^2} \Phi = -\frac{F(\mathbf{r})}{D}, \quad (x, y, z) \in \Omega, \quad \left(\frac{1}{2} \Phi + D \frac{\partial \Phi}{\partial n} \right) \Big|_{\partial \Omega} = 0,$$

$\mathbf{n}$ — внешняя нормаль к $\partial \Omega$.

$$\mathbf{1.249.} \quad \Delta \Phi - \frac{1}{L^2} \Phi = 0 \quad \text{в } \Omega, \quad \left(\frac{1}{4} \Phi + \frac{D}{2} \frac{\partial \Phi}{\partial n} \right) \Big|_S = \frac{1}{4} \Phi_0,$$

$\mathbf{n}$ — внешняя нормаль к $\partial \Omega$.

У к а з а н и е. В единицу времени через элементарную площадку $\Delta S \subset S = \partial \Omega$ проходит

$$\frac{\Delta S}{4\pi} \int_0^{2\pi} \Phi_0 \sin \theta \cos \theta d\theta d\varphi$$

нейтронов, скорость которых составляет углы от θ до $\theta + d\theta$ с направлением внутренней нормали к S .

1.250. Р е ш е н и е. В объеме $d\mathbf{r}'$ в единицу времени рождается $\nu \Sigma_f \Phi(\mathbf{r}') d\mathbf{r}'$ быстрых нейтронов. Если бы поглощение отсутствовало, то в тепловую область попало бы

$$\nu \Sigma_f \int_{\Omega} w(\mathbf{r}', \mathbf{r}, E_0, E_\tau) \Phi(\mathbf{r}') d\mathbf{r}'$$

нейтронов. На самом деле их будет меньше на величину

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \left[\int_{\Omega} \nu \Sigma_f \Phi(\mathbf{r}') w(\mathbf{r}', \mathbf{r}'', E_0, E_\tau) d\mathbf{r}' \right] (1 - \varphi) w(\mathbf{r}', \mathbf{r}, E_0, E_\tau) d\mathbf{r}'' = \\ = \nu \Sigma_f (1 - \varphi) \int_{\mathbb{R}^3} \Phi(\mathbf{r}') d\mathbf{r}' \int_{\mathbb{R}^3} w(\mathbf{r}', \mathbf{r}'', E_0, E_\tau) w(\mathbf{r}', \mathbf{r}, E_\tau, E_\tau) d\mathbf{r}'' = \\ = \nu \Sigma_f (1 - \varphi) \int_{\Omega} w(\mathbf{r}', \mathbf{r}, E_0, E_\tau) \Phi(\mathbf{r}') d\mathbf{r}', \end{aligned}$$

где φ — вероятность того, что быстрый нейтрон в процессе замедления избежит резонансного поглощения. В проделанной выкладке равенства не являются точными из-за замены областей интегрирования Ω на $\mathbb{R}^3$ и обратно. Подобная замена мало влияет на результат при достаточно больших размерах реактора.

Таким образом, в единице объема (в точке $\mathbf{r}$) в единицу времени появляется число нейтронов, равное (см.(1.40))

$$\begin{aligned} Q(\mathbf{r}) &= \nu \Sigma_f \int_{\Omega} w(\mathbf{r}', \mathbf{r}, E_0, E_\tau) \Phi(\mathbf{r}') d\mathbf{r}' - \nu \Sigma_f (1 - \varphi) \int_{\Omega} w(\mathbf{r}', \mathbf{r}, E_0, E_\tau) \Phi(\mathbf{r}') d\mathbf{r}' = \\ &= \nu \Sigma_f \varphi \int_{\Omega} w(\mathbf{r}', \mathbf{r}, E_0, E_\tau) \Phi(\mathbf{r}') d\mathbf{r}' = k_{\infty} \Sigma_a \int_{\Omega} w(\mathbf{r}', \mathbf{r}, E_0, E_\tau) \Phi(\mathbf{r}') d\mathbf{r}'. \end{aligned}$$

1.251. Р е ш е н и е. Плотность потока нейтронов $\Phi(\mathbf{r}) > 0$ и монотонно убывает к границе реактора, следовательно, функция $\Phi(\mathbf{r})$ существенно меняется на длине порядка размера реактора R , а функция $w(\mathbf{r}', \mathbf{r}, E_0, E_\tau)$ — на длине порядка $\sqrt{\tau}$. Так как $R \gg \sqrt{\tau}$, то $\Phi(\mathbf{r})$ мало меняется на длине $\sqrt{\tau}$. Кроме того, функция $w(\mathbf{r}', \mathbf{r}, E_0, E_\tau) = w(|\mathbf{r}' - \mathbf{r}|, E_0 - E_\tau)$ достаточно быстро убывает с ростом $|\mathbf{r}' - \mathbf{r}|$. В связи с этим в интеграле, входящем в уравнение (1.51), можно $\Phi(\mathbf{r})$ представить разложением

$$\Phi(\mathbf{r}') = \Phi(\mathbf{r}) + \sum_{i=1}^3 (x_i - x'_i) \frac{\partial \Phi}{\partial x_i} \Big|_{\mathbf{r}} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^3 (x_i - x'_i) (x_j - x'_j) \cdot \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_i \partial x_j} \Big|_{\mathbf{r}}$$

и проинтегрировать по $\mathbb{R}^3$. Тогда

$$\int_{\mathbb{R}^3} w(\mathbf{r}', \mathbf{r}, E_0, E_\tau) d\mathbf{r}' = 1, \quad \int_{\mathbb{R}^3} (x_i - x'_i) w(\mathbf{r}', \mathbf{r}, E_0, E_\tau) d\mathbf{r}' = 0,$$

$$\int_{\mathbb{R}^3} (x_i - x'_i) (x_j - x'_j) w(\mathbf{r}', \mathbf{r}, E_0, E_\tau) d\mathbf{r}' \overline{|x_i - x'_i|^2 \delta_{ij}} = \frac{1}{3} \overline{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2 \frac{r^2}{3}}$$

и уравнение (1.51) примет вид

$$D\Delta\Phi - \Sigma_a\Phi + k_\infty\Sigma_a\Phi + \frac{r^2}{6}k_\infty\Sigma_a\Delta\Phi = 0.$$

Если ввести $\tau = \frac{r^2}{6}$ и вспомнить, что коэффициент диффузии $D = L^2\Sigma_c$, то Φ будет решением уравнения

$$\Delta\Phi + \frac{k_\infty - 1}{L^2 + k_\infty\tau}\Phi = 0.$$

Лапласиан $\Delta\Phi$ равен по порядку величины Φ/R^2 . Сравнение с уравнением (1.52) показывает, что $\alpha \sim 1/R$. Из неравенств $1/\alpha \gg L$, $1/\alpha \gg \sqrt{\tau}$ и из того, что $k_\infty \sim 1$, вытекает оценка $k_\infty - 1 = \alpha\sqrt{l^2 + \tau} \ll 1$.

1.252. $\Delta\Phi(\mathbf{r}) + \alpha^2\Phi(\mathbf{r}) = 0$, $\mathbf{r} = (x, y, z) \in \Omega$;

$$1) \Phi|_{\tilde{S}} = 0, \quad 2) \left(\frac{1}{2}\Phi + D\frac{\partial\Phi}{\partial n} \right) \Big|_S = 0,$$

$$\Phi(\mathbf{r}) > 0, \quad \mathbf{r} = (x, y, z) \in \Omega,$$

$\mathbf{n}$ — внешняя нормаль к S .

1.253. $\frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{d\Phi}{dr} + \alpha^2\Phi = 0$, $\tilde{r}_1 < r < \tilde{r}_2$,

$$\Phi(\tilde{r}_1) = \Phi(\tilde{r}_2) = 0, \quad \tilde{r}_{1,2} = r_{1,2} \pm \delta, \quad \delta = 0,71\lambda_s.$$

1.254. $\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} r^2 \frac{d\Phi}{dr} + \alpha^2\Phi = 0$, $r_1 < r < r_2$,

$$\Phi'(r_1) = 0, \quad \frac{1}{2}\Phi(r_2) + D\Phi'(r_2) = 0,$$

$$\Phi(r) > 0, \quad r_1 < r < r_2.$$

1.255. $\Delta\Phi + \alpha_C^2\Phi = 0$,

$$\Delta\Phi - \frac{1}{L_R^2}\Phi = 0,$$

$$|x| < l_1, \quad |y| < l_2, \quad |z| < l_3,$$

$$|x| < l_1, \quad |y| < l_2, \quad l_3 < |z| < l,$$

$$\Phi(\pm\tilde{l}_1, y, z) = \Phi(x, \pm\tilde{l}_2, z) = 0,$$

$$\Phi(\pm\tilde{l}_1, y, z) = \Phi(x, \pm\tilde{l}_2, z) = 0,$$

$$\Phi(x, y, \pm\tilde{l}) = 0,$$

$$\Phi(x, y, l_3 - 0) = \Phi(x, y, l_3 + 0), \quad \Phi(x, y, -l_3 + 0) = \Phi(x, y, -l_3 - 0),$$

$$D_C \frac{\partial\Phi}{\partial z} \Big|_{z=l_3-0} = D_R \frac{\partial\Phi}{\partial z} \Big|_{z=l_3+0}, \quad D_C \frac{\partial\Phi}{\partial z} \Big|_{z=-l_3+0} = D_R \frac{\partial\Phi}{\partial z} \Big|_{z=-l_3-0},$$

$L_R^2 = \frac{D_R}{\Sigma_c^R}$, $D_R = \frac{1}{3\Sigma_s^R}$, $D_C = \frac{1}{3\Sigma_s^C}$, величина α_C определена в задаче 1.251.

1.256. $\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} r^2 \frac{d\Phi}{dr} + \alpha_C^2\Phi = 0$, $\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} r^2 \frac{d\Phi}{dr} - \frac{1}{L_R^2}\Phi = 0$,

$$0 < r < r_0,$$

$$r_0 < r < \tilde{r}_1,$$

$$|\Phi(0)| < \infty,$$

$$\Phi(\tilde{r}_1) = 0,$$

$$\Phi(r_0 - 0) = \Phi(r_0 + 0), \quad D_C \frac{d\Phi}{dr} \Big|_{r_0-0} = D_R \frac{d\Phi}{dr} \Big|_{r_0+0},$$

$$\Phi(r) > 0, \quad r < \tilde{r}_2.$$

Обозначения те же, что в ответе к предыдущей задаче.

1.257. $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial \Phi}{\partial r} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} + \alpha_C^2 \Phi = 0, \quad \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial \Phi}{\partial r} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} - \frac{1}{L_R^2} \Phi = 0,$
 $0 < r < \tilde{r}_0, \quad |z| < h, \quad 0 < r < \tilde{r}_0, \quad h < |z| < \tilde{H},$
 $\Phi(\tilde{r}_0, z) = 0, \quad \Phi(r, \pm \tilde{H}) = 0,$
 $\Phi(r, h-0) = \Phi(r, h+0), \quad D_C \frac{\partial \Phi}{\partial z} \Big|_{z=h-0} = D_R \frac{\partial \Phi}{\partial z} \Big|_{z=h+0},$
 $|\Phi(r, z)| < \infty, \quad \Phi(r, z) > 0, \quad r < \tilde{r}_0, \quad |z| < \tilde{H}.$
 Обозначения те же, что в задаче 1.255.

1.258. Постановка задачи имеет две равносильные формы:

1) $\frac{\partial q}{\partial \tau} = \Delta q + F(\mathbf{r})\delta(\tau), \quad \mathbf{r} = \{x, y, z\} \in \mathbb{R}^3, \quad 0 < \tau,$
 $q(\mathbf{r}, 0) = 0, \quad |q| < \infty;$
 2) $\frac{\partial q}{\partial \tau} = \Delta q, \quad \mathbf{r} = \{x, y, z\} \in \mathbb{R}^3, \quad 0 < \tau,$
 $q(\mathbf{r}, 0) = F(\mathbf{r}) \quad |q| < \infty.$

1.259. $q_\tau = q_{xx}, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < \tau,$
 $q(x, 0) = Q_0 \delta(x)$

1.260. $\frac{\partial q}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 q}{\partial x^2}, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < \tau,$
 $q(x, 0) = Q_0 \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(x - kd).$

1.261. $\frac{\partial q}{\partial \tau} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial q}{\partial r}, \quad 0 < r, \quad 0 < \tau,$
 $q(r, 0) = Q_0 \frac{\delta(r)}{2\pi r}.$

1.262. $\frac{\partial q}{\partial \tau} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial q}{\partial r}, \quad 0 < x < \infty, \quad -\infty < y < \infty, \quad 0 < \tau,$
 $q(0, y, \tau) = 0, \quad q(x, y, 0) = q_0 \delta(x - d) \cdot \delta(y),$
 $q(x, y, \tau) \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad r = \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow \infty.$

1.263. $\frac{\partial q}{\partial \tau} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial q}{\partial r}, \quad 0 < r < \infty, \quad 0 < \tau,$
 $q(r, \theta, \varphi, 0) = Q_0 \frac{\delta(r)}{4\pi r^2}, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} q(r, \tau) = 0.$

1.264. $\frac{\partial q}{\partial \tau} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial q}{\partial r} + Q_0 \frac{\delta(r)}{4\pi r^2} \cdot \delta(\tau), \quad \frac{\partial q}{\partial \tau} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial q}{\partial r},$
 $0 < r < r_0, \quad 0 < \tau, \quad r_0 < r, \quad 0 < \tau,$
 $\frac{1}{\xi_1 \Sigma_{s1}} q(r_0 - 0, \tau) = \frac{1}{\xi_2 \Sigma_{s2}} q(r_0 + 0, \tau),$
 $\frac{D_1}{\xi_1 \Sigma_{s1}} \frac{\partial q}{\partial r} \Big|_{r=r_0-0} = \frac{D_2}{\xi_2 \Sigma_{s2}} \frac{\partial q}{\partial r} \Big|_{r=r_0+0},$
 $q(r, 0) = 0, \quad |q(r, \tau)| < \infty, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} q(r, \tau) = 0.$

1.265. $\frac{\partial q}{\partial \tau} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial q}{\partial r} + Q_0 \frac{\delta(r - r')}{4\pi r'^2} \cdot \delta(\tau), \quad 0 < r, \quad 0 < \tau,$
 $q(r, 0) = 0, \quad |q(0, \tau)| < \infty, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} q(r, \tau) = 0.$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.266.} \quad \frac{\partial q}{\partial \tau} = 0, \quad r < r_0, \quad \tau > 0, \quad \frac{\partial q}{\partial \tau} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial q}{\partial r}, \quad r > r_0, \quad \tau > 0, \\ q(r, 0) = 0, \quad q(r, 0) = Q_0 \frac{\delta(r - r_0)}{4\pi r_0^2}, \\ q(r, \tau) \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad r \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

1.267. $D\Delta\Phi(\mathbf{r}) - \Sigma_a\Phi(\mathbf{r}) = -q(\mathbf{r}, u_T)$, $\Phi(\mathbf{r}) \rightarrow 0$ при $r \rightarrow \infty$, где плотность замедления $q(\mathbf{r}, u)$ — решение задачи

$$\begin{aligned} \frac{\partial q}{\partial u} = \frac{D(u)}{\xi\Sigma(u)}\Delta q - \frac{\Sigma_a(u)}{\xi\Sigma(u)}q + Q_0\delta(u), \\ q(\mathbf{r}, u) \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad r \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

У к а з а н и е. В стационарном уравнении диффузии (см. задачу 1.237) источником тепловых нейтронов является функция $q(\mathbf{r}, u_T)$.

$$\begin{aligned} \mathbf{1.268.} \quad 1) \quad q(\mathbf{r}, u) = Q(\mathbf{r}, u) e^{-\int_0^u \frac{\Sigma_a(u') du'}{\xi\Sigma(u')}}, \quad Q(\mathbf{r}, u) — \text{решение уравнения} \\ \frac{\partial Q(\mathbf{r}, \tau)}{\partial \tau} = \Delta Q(\mathbf{r}, \tau) + Q_0\delta(\tau), \end{aligned}$$

где τ и u связаны соотношением (1.66).

$$2) \quad \varphi(u) = e^{-\int_0^u \frac{\Sigma_a(u') du'}{\xi\Sigma(u')}}. \quad (1.149)$$

У к а з а н и я: 1) в уравнение (1.64) ввести слагаемое $\int_{\Delta\Omega} \xi\Sigma_a(u)\Phi(\mathbf{r}, u)d\mathbf{r}du$, учитывающее убыль нейтронов из-за поглощения, в уравнении

$$\frac{\partial q}{\partial u} = \frac{D(u)}{\xi\Sigma(u)}\Delta q - \frac{\Sigma_a(u)}{\xi\Sigma(u)}q + Q_0\delta(u) \quad (1.150)$$

сделать замену $q(\mathbf{r}, u) = p(\mathbf{r}, u)e^{-\int_0^u \frac{\Sigma_a(u') du'}{\xi\Sigma(u')}}$ и перейти к переменной τ посредством соотношения (1.65); 2) в бесконечном замедлителе функция q зависит только от u и из уравнения (1.150) следует

$$\frac{\partial q}{\partial u} + \frac{\Sigma_a(u)}{\xi\Sigma(u)}q = 0, \quad q(0) = Q_0.$$

Отсюда $q(u) = q(0)e^{-\int_0^u \frac{\Sigma_a(u') du'}{\xi\Sigma(u')}}.$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.269.} \quad \frac{\partial q}{\partial \tau} = \Delta q + \frac{Q_0}{V}\eta(r_0 - r)\delta(\tau), \quad 0 < r, \quad 0 < \tau, \quad V = \frac{4\pi r_0^3}{3}, \\ q(r, 0) = 0, \quad q(r, \tau) \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad r \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

1.270. $q(\mathbf{r}, u) = \varphi(u)p(\mathbf{r}, u)$, где функция $p(\mathbf{r}, u)$ — решение задачи

$$\begin{aligned} \frac{\partial p}{\partial \tau} = \Delta p + Q_0\delta(x) \cdot \delta(y) \cdot \delta(z - z_0) \cdot \delta(\tau), \quad -\infty < x, y < \infty, \quad 0 < z, \quad 0 < \tau, \\ \frac{1}{2}p(x, y, 0, \tau) - Dp_z(x, y, 0, \tau) = 0, \\ p(x, y, z, \tau) \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad (x, y, z > 0) \rightarrow \infty, \end{aligned}$$

функция $\varphi(u)$ определена в п.2 ответа к задаче 1.268, $\tau = \tau(u)$ определяется формулой (1.66).

$$\begin{aligned} \mathbf{1.271.} \quad D(u)\Delta\Phi(\mathbf{r}, u) - \Sigma_a(u)\Phi(\mathbf{r}, u) = \frac{\partial q}{\partial u}, \quad M(\mathbf{r}) \in \tilde{\Omega}, \quad 0 \leq u \leq u_T, \\ q(\mathbf{r}, u) = \xi\Sigma(u)\Phi(\mathbf{r}, u), \quad \Sigma(u) = \Sigma_s(u) + \Sigma_a(u), \quad q(\mathbf{r}, 0) = \nu\Sigma_f^T\Phi_T(\mathbf{r}, u), \\ D_T\Delta\Phi_T(\mathbf{r}) - \Sigma_a^T\Phi_T(\mathbf{r}) = -q(\mathbf{r}, u_T), \quad M(\mathbf{r}) \in \tilde{\Omega}, \end{aligned}$$

где $\tilde{\Omega}$ — область с границей $\tilde{S}$; $\Omega \supset \tilde{\Omega}$; $M(\mathbf{r})$ — точка с пространственной координатой $\mathbf{r} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z$; ν — среднее число нейтронов на один акт деления; индексом T помечены значения величин в тепловой области.

1.272. $q(\mathbf{r}, 0) = \nu \left[\Sigma_f^T \Phi_T(\mathbf{r}) + \int_0^u \Sigma_f(u) \Phi(\mathbf{r}, u) du \right]$, остальные уравнения те же, что в ответе к предыдущей задаче.

1.273. Р е ш е н и е. Изменение числа нейтронов в элементе $d\omega = d\mathbf{r} d\mathbf{l}$ фазового пространства за время dt

$$dn = (n|_{t+dt} - n|_t) d\omega = \frac{\partial n}{\partial t} d\omega dt.$$

С другой стороны,

$$dn = dn_{\mathbf{v}} + dn_{\text{ст}} + dn_F, \quad (1.151)$$

где $dn_{\mathbf{v}}$, $dn_{\text{ст}}$, dn_F — изменения числа нейтронов, обусловленные, соответственно, поступательным движением нейтронов, их столкновениями с ядрами, действием источников. Если в момент t в элементе $d\omega$ содержится $n(\mathbf{r}, \mathbf{l}, t) d\omega$ нейтронов, то в момент $t + dt$ в том же элементе их будет столько, сколько было в момент t в элементе с координатами $\mathbf{r} - \mathbf{l}v dt$, т. е.

$$dn_{\mathbf{v}} = (n(\mathbf{r} - \mathbf{l}v dt, \mathbf{l}, t) d\omega - n(\mathbf{r}, \mathbf{l}, t) d\omega = -v(\mathbf{l} \nabla n) d\omega dt.$$

Изменение числа нейтронов вследствие столкновений $dn_{\text{ст}} = dn_{\text{ст}}^- + dn_{\text{ст}}^+$. Число выбывших из элемента $d\omega$ нейтронов $dn_{\text{ст}}^- = -n(\mathbf{r}, \mathbf{l}, t) d\omega \Sigma v dt$. Число прибывших в элемент $d\omega$ нейтронов $dn_{\text{ст}}^+ = dn_s^+ + dn_f^+$, где

$$dn_s^+ = v \Sigma_s \int_{\mathbf{l}'} w_s(\mathbf{l}', \mathbf{l}) \Phi(\mathbf{r}, \mathbf{l}', t) d\mathbf{l}' d\omega dt,$$

$$dn_f^+ = \nu v \Sigma_f \int_{\mathbf{l}'} w_f(\mathbf{l}', \mathbf{l}) \Phi(\mathbf{r}, \mathbf{l}', t) d\mathbf{l}' d\omega dt.$$

Источники изменяют число нейтронов на величину $dn_F = F(\mathbf{r}, \mathbf{l}, t) d\omega dt$. Подстановка выражений для $dn_{\mathbf{v}}$, $dn_{\text{ст}}$, dn_F в соотношение (1.151) приводит к уравнению (1.67).

1.274. Функция $\Phi(\mathbf{r}, \mathbf{l}, t)$ удовлетворяет начальному и граничному условиям: $\Phi(\mathbf{r}, \mathbf{l}, 0) = \Phi_0(\mathbf{r}, \mathbf{l})$ и $(\mathbf{l} \mathbf{n}) \Phi(\mathbf{r}, \mathbf{l}, t)|_{\partial\Omega} = 0$ при $(\mathbf{l} \mathbf{n}) \leq 0$, где $\mathbf{n}$ — внешняя нормаль к $\partial\Omega$.

З а м е ч а н и е. Сокращение множителя $(\mathbf{l} \mathbf{n})$ в граничном условии может привести к ошибке (см. [78]).

1.275. $(\mathbf{l} \nabla \Phi) + \Sigma_1 \Phi = \int_{\mathbf{l}'} g_1(\mathbf{r}, \mathbf{l}', \mathbf{l}) \Phi(\mathbf{r}, \mathbf{l}') d\mathbf{l}', \quad z < 0,$

$$(\mathbf{l} \nabla \Phi) + \Sigma_2 \Phi = \int_{\mathbf{l}'} g_2(\mathbf{r}, \mathbf{l}', \mathbf{l}) \Phi(\mathbf{r}, \mathbf{l}') d\mathbf{l}' + Q_0 \delta(\mathbf{r} - \mathbf{d}), \quad z > 0,$$

$$(\mathbf{l} \mathbf{e}_z) \Phi(x, y, 0, \mathbf{l}) = (\mathbf{l} \mathbf{e}_z) \Phi(x, y, +0, \mathbf{l}), \quad \Phi(\mathbf{r}, \mathbf{l}) \rightarrow 0 \text{ при } r \rightarrow \infty.$$

1.277. $\frac{1}{v} \frac{\partial \Phi}{\partial t} = \text{div}(D \nabla \Phi) + \gamma \Phi + f, \quad \gamma = \nu \Sigma_f - \Sigma_a, \quad f(\mathbf{r}, t) = \int_1 F(\mathbf{r}, \mathbf{l}, t) d\mathbf{l}.$

У к а з а н и е. Проинтегрировать обе части уравнения (1.68) по $\mathbf{l}$ и учесть, что концентрация нейтронов $n(\mathbf{r}, t) = \int_1 n(\mathbf{r}, \mathbf{l}, t) d\mathbf{l}$, а плотность тока нейтронов в направлении $\mathbf{s}$

$$j_s(\mathbf{r}, t) = \int_1 (v \mathbf{l} \mathbf{s}) n(\mathbf{r}, \mathbf{l}, t) d\mathbf{l},$$

$$\int_1 v(\mathbf{l}\nabla n) d\mathbf{l} = \int_1 (\mathbf{l}\nabla\Phi) d\mathbf{l} = \int_1 l_x \frac{\partial\Phi}{\partial x} d\mathbf{l} + \dots = \\ = \frac{\partial}{\partial x} \int_1 (\mathbf{l}e_x)\Phi d\mathbf{l} + \dots = \frac{\partial j_x}{\partial x} + \dots = \operatorname{div} \mathbf{j}.$$

$$\mathbf{1.278.} \quad \frac{1}{v} \frac{\partial\Phi}{\partial t} + \mu \frac{\partial\Phi}{\partial z} + \Sigma\Phi = \frac{\beta}{2} \int_{-1}^1 \Phi(z, \mu', t) d\mu' + F(z, \mu, t), \quad |z| < d; \\ \mu\Phi(-d, \mu, t) = 0, \quad \mu \geq 0, \quad \mu\Phi(d, \mu, t) = 0, \quad \mu \leq 0, \quad \Phi(z, \mu, 0) = \Phi_0(z, \mu).$$

$$\mathbf{1.279.} \quad \sin\theta \left(\cos\varphi \frac{\partial\Phi}{\partial\rho} - \frac{\sin\varphi}{\rho} \frac{\partial\Phi}{\partial\varphi} \right) + \cos\theta \frac{\partial\Phi}{\partial z} + \Sigma\Phi = \\ = \frac{\beta}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_0^\pi \Phi(\rho, z, \theta', \varphi') \sin\theta' d\theta' + F(\rho, z, \theta, \varphi), \\ \sin\theta \cos\varphi \Phi(\rho_0, z, \theta, \varphi) = 0 \quad \text{при} \quad \sin\theta \cos\varphi \leq 0.$$

$$\mathbf{1.280.} \quad \mu \frac{\partial\Phi}{\partial r} - \frac{1-\mu^2}{r^2} \frac{\partial\Phi}{\partial\mu} + \Sigma\Phi = \frac{\beta}{2} \int_{-1}^1 \Phi(r\mu) d\mu + F(r, \mu), \\ \mu\Phi(r, \mu) = 0 \quad \mu \leq 0.$$

$$\mathbf{1.281.} \quad \frac{1}{v} \frac{\partial\Phi}{\partial t} + (\mathbf{l}\nabla\Phi) + \Sigma(v)\Phi = \int_0^\infty \Sigma_s(v') dv' \int_{\mathbf{l}'} w_s(\mathbf{v}' \rightarrow \mathbf{v}) \Phi(\mathbf{r}, v', \mathbf{l}', t) d\mathbf{l}' + \\ + \int_0^\infty \nu(v') \Sigma_f(v') dv' \int_{\mathbf{l}'} w_f(\mathbf{v}' \rightarrow \mathbf{v}) \Phi(\mathbf{r}, v', \mathbf{l}', t) d\mathbf{l}' + F,$$

где $\Sigma(v) = \Sigma_s(v) + \Sigma_c(v) + \Sigma_f(v)$;

1) $(\mathbf{l}\mathbf{n})\Phi(\mathbf{r}_s - 0, v, \mathbf{l}, t) = (\mathbf{l}\mathbf{n})\Phi(\mathbf{r}_s + 0, v, \mathbf{l}, t)$, $\mathbf{n}$ — нормаль к S ;

2) $(\mathbf{l}\mathbf{n})\Phi(\tilde{\mathbf{r}}_s, v, \mathbf{l}, t) = 0 \quad (\mathbf{l}\mathbf{n}) \leq 0$, $\mathbf{n}$ — внешняя нормаль к S .

$$\mathbf{1.282.} \quad u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) = u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x).$$

$$\mathbf{1.283.} \quad u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u_x(0, t) = u(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \frac{I}{\rho_0 S} \delta(x).$$

$$\mathbf{1.284.} \quad v_{tt} = a^2 v_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ v(0, t) = u_0 \omega \cos \omega t, \quad v_x(l, t) = 0, \quad v(x, 0) = v_t(x, 0) = 0.$$

$$\mathbf{1.285.} \quad s_{tt} = a^2 s_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ s_x(0, t) = 0, \quad P_0 \gamma s(l, t) = P_1 - P_0, \quad s(x, 0) = 0, \quad s_t(x, 0) = 0.$$

$$\mathbf{1.286.} \quad s_{tt} = a^2 s_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ s_x(0, t) = -\frac{v_0 \omega}{a^2} \cos \omega t, \quad s_x(l, t) + \frac{p_0 \gamma S_0}{k} s_{xx}(l, t) + \frac{m}{k} s_{xtt}(l, t) = 0, \\ s(x, 0) = s_t(x, 0) = 0.$$

$$\mathbf{1.287.} \quad p_{tt} = a^2 p_{xx}, \quad -l < x < l, \quad 0 < t, \\ p_x(-l, t) = p_x(l, t) = 0, \\ p(x, 0) = \begin{cases} -\alpha P_0, & -l < x < 0, \\ \alpha P_0, & 0 < x < l, \end{cases} \\ p_t(x, 0) = 0.$$

1.288. $P(x, t) = P_0 + p(x, t)$, $p(x, t)$ — решение задачи

$$\begin{aligned} p_{tt} &= a^2 p_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ +kp_x(0, t) + mp_{xtt}(0, t) &= S_0 \rho_0 p_{tt}(0, t), \\ p(l, t) &= p_0(t), \quad p(x, 0) = p_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

1.289. $\psi_{tt} = a^2 \psi_{xx} - \frac{a^2}{\rho_0 S} Q(t) \cdot \delta(x - x_0)$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $\psi_x(0, t) = \psi_x(l, t) = 0$, $\psi(x, 0) = \psi_t(x, 0) = 0$.

У к а з а н и е. В лагранжевых переменных закон сохранения массы (уравнение непрерывности) запишется в виде $\frac{\partial}{\partial t}(\rho S \Delta \xi) = Q \Delta \xi$, где $\xi = x + u$, откуда

$$\frac{\partial}{\partial t}[\rho(1 + u_x)] = \frac{Q}{S}(1 + u_x).$$

1.290. 1) $\psi_{tt} = a^2 \psi_{xx}$, $0 < x$, $0 < t$,
 $\psi_x(0, t) = v_0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \psi_x(x, t) = 0$, $\psi(x, 0) = \psi_t(x, 0) = 0$.

2) $p_{tt} = a^2 p_{xx}$, $0 < x$, $0 < t$,
 $p_x(0, t) = -\rho_0 v_0 \delta(t)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x, t) = 0$, $p(x, 0) = p_t(x, 0) = 0$,
 $p(x, t)$ — отклонение давления от равновесного значения.

1.291. 1) $\psi_{tt} = a^2 \psi_{xx}$, $0 < x$, $0 < t$,
 $\psi(0, t) = -\frac{1}{\rho_0}(P_1 - P_0)t$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \psi_x(x, t) = 0$,
 $\psi(x, 0) = \psi_t(x, 0) = 0$.

2) $p_{tt} = a^2 p_{xx}$, $0 < x$, $0 < t$,
 $p(0, t) = P_1 - P_0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x, t) = 0$, $p(x, 0) = p_t(x, 0) = 0$,
 $p(x, t)$ — отклонение давления от равновесного значения.

1.292. 1) Потенциал скоростей — решение задачи

$$\begin{aligned} \psi_{1tt} &= a_1^2 \psi_{1xx}, & \psi_{2tt} &= a_2^2 \psi_{2xx}, \\ x < 0, \quad 0 < t, & 0 < x, \quad 0 < t, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \psi_{1x}(x, t) &= 0, & \lim_{x \rightarrow +\infty} \psi_{2x}(x, t) &= 0, \\ \psi_1(x, 0) &= \psi_{1t}(x, 0) = 0, & \psi_2(x, 0) &= \psi_{2t}(x, 0) = 0, \\ \psi_{2x}(0, t) &= \psi_{1x}(0, t), & \rho_{20} \psi_2(0, t) &= \rho_{10} \psi_1(0, t) = (P_2 - P_1)t. \end{aligned}$$

2) Давление в газе — решение задачи

$$\begin{aligned} p_{1tt} &= a_1^2 p_{1xx}, & p_{2tt} &= a_2^2 p_{2xx}, \\ x < 0, \quad 0 < t, & 0 < x, \quad 0 < t, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} p_1(x, t) &= 0, & \lim_{x \rightarrow +\infty} p_2(x, t) &= 0, \\ p_1(x, 0) &= p_{1t}(x, 0) = 0, & p_2(x, 0) &= p_{2t}(x, 0) = 0, \\ p_1(0, t) &= p_2(0, t), & \frac{1}{\rho_{10}} p_1(0, t) &= \frac{1}{\rho_{20}} p_2(0, t), \end{aligned}$$

$p_i(x, t) = P_i(x, t) - P_{i0}$, где $i = 1, 2$, — отклонение давления от равновесного значения.

1.293. $p_{tt} = a^2 p_{xx}$, $-\infty < x < \infty$, $0 < t$,
 $p(-0, t) = p(+0, t) = 0$, $S_1 p_x(-0, t) = S_2 p_x(+0, t)$,
 $p(x, 0) = f(x)$, $p_t(x, 0) = -a f'(x)$.

У к а з а н и е. Условия при $x = 0$ выражают непрерывность давления и потока газа.

$$\begin{aligned} 1.294. \quad p_{tt} &= a^2 p_{xx} - a^2 p_0 \sin \omega t \cdot \delta'(x), \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t, \\ \lim_{x \rightarrow \pm \infty} p(x, t) &= 0, \quad p(x, 0) = p_t(x, 0) = 0, \\ p(x, t) &\text{ — отклонение давления от равновесного значения.} \end{aligned}$$

1.295. У к а з а н и е. Если функция f характеризует колебания газа, то за период T на длине волны $\lambda = aT$ (где a — скорость звука) f изменится на Δf . Следовательно,

$$\left| \frac{\partial f}{\partial t} \right| \sim \frac{|\Delta f|}{T}, \quad |\nabla f| \sim \frac{|\Delta f|}{\lambda}, \quad \left| \frac{\nabla f}{f_t} \right| \sim \frac{T}{\lambda} \sim \frac{1}{a},$$

поэтому

$$\frac{|(\mathbf{V} \nabla) \mathbf{V}|}{|\mathbf{V}_t|} \sim \frac{|\mathbf{V}|}{a} \ll 1.$$

Так же оценивается слагаемое $(\mathbf{V} \nabla s)$, входящее в уравнение непрерывности.

$$1.298. \quad P = P_0 + p, \quad \text{где } p(x, t) \text{ — решение задачи}$$

$$\begin{aligned} p_{tt} &= a^2 p_{tt}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ p_x(0, t) &= 0, \quad p(l, t) = P_1 - P_0, \\ p(x, 0) &= p_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$1.299. \quad P = P_0 + p, \quad \text{где } p(x, t) \text{ — решение задачи}$$

$$\begin{aligned} p_{tt} &= a^2 p_{tt}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ p_x(0, t) &= -\rho_0 \mu''(t), \quad p(l, t) = 0, \\ p(x, 0) &= p_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$1.300. \quad \psi_{tt} = a^2 \Delta \psi, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t,$$

$$\begin{aligned} |\psi| &< \infty, \quad \left. \frac{\partial \psi}{\partial r} \right|_{r=r_0} = \alpha(\theta, \varphi) \omega r_0 \cos \omega t, \\ \psi|_{t=0} &= \psi_t|_{t=0} = 0. \end{aligned}$$

$$1.301. \quad \psi_{tt} = a^2 \Delta \psi, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t,$$

$$\begin{aligned} |\psi| &< \infty, \quad \left. \frac{\partial \psi}{\partial r} \right|_{r=r_0} = V_0 \sin \omega t \cos \theta, \\ \psi|_{t=0} &= \psi_t|_{t=0} = 0. \end{aligned}$$

$$1.302. \quad \psi_{tt} = a^2 \Delta \psi, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t,$$

$$\begin{aligned} |\psi| &< \infty, \quad \left. \frac{\partial \psi}{\partial r} \right|_{r=r_0} = 0, \\ \psi|_{t=0} &= v_0 r \cos \varphi, \quad \psi_t|_{t=0} = 0, \quad \mathbf{k} = \mathbf{e}_x. \end{aligned}$$

$$1.303. \quad \psi_{tt} = a^2 \Delta \psi, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < z < l, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t,$$

$$\begin{aligned} \psi_r|_{r=r_0} &= 0, \quad \psi_z|_{z=0} = \alpha(r, \varphi) \omega l \cos \omega t, \quad \psi_z|_{z=l} = 0, \\ |\psi| &< \infty, \quad \psi|_{t=0} = \psi_t|_{t=0} = 0. \end{aligned}$$

$$1.304. \quad \psi_{tt} = a^2 \Delta \psi_{xx} - \frac{a^2}{\rho_0} Q(t) \cdot \frac{\delta(r)}{4\pi r^2},$$

$$\begin{aligned} 0 &< r < r_0, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t, \\ |\psi| &< \infty, \quad \psi_r|_{r=r_0} = 0, \quad \psi|_{t=0} = \psi_t|_{t=0} = 0. \end{aligned}$$

$$1.305. \quad s_{tt} = a^2 \Delta s, \quad 0 < r < \infty, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t,$$

$$|s| < \infty, \quad s(\mathbf{r}, 0) = s_0(\mathbf{r}), \quad s_t(\mathbf{r}, 0) = 0.$$

$$1.306. \Delta p + k^2 p = 0, \quad r_0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$\left. \frac{\partial p}{\partial r} \right|_{r=r_0} = \rho_0 \omega^2 A \cos \theta,$$

$$p = O\left(\frac{1}{r}\right), \quad \frac{\partial p}{\partial r} + ikp = o\left(\frac{1}{r}\right), \quad r \rightarrow \infty.$$

$$1.307. \Delta p + k^2 p = 0, \quad r_0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$\left. \frac{\partial p}{\partial r} \right|_{r=r_0} = \rho_0 \omega^2 \alpha r_0, \quad p = O\left(\frac{1}{r}\right),$$

$$\frac{\partial p}{\partial r} + ikp = o\left(\frac{1}{r}\right), \quad r \rightarrow \infty.$$

$$1.308. \Delta p + k^2 p = 0, \quad r_0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$\left. \frac{\partial p}{\partial r} \right|_{r=r_0} = \rho_0 \omega^2 A \cos \varphi,$$

$$p = O\left(\frac{1}{\sqrt{r}}\right), \quad r \rightarrow \infty, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} \sqrt{r} \left(\frac{\partial p}{\partial r} + ikp \right) = 0.$$

$$1.309. \Delta p + k^2 p = 0, \quad r_0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$\left. \frac{\partial p}{\partial r} \right|_{r=r_0} = \rho_0 \omega^2 \alpha r_0,$$

$$p = O\left(\frac{1}{\sqrt{r}}\right), \quad r \rightarrow \infty, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} \sqrt{r} \left(\frac{\partial p}{\partial r} + ikp \right) = 0.$$

1.310. Результирующее давление $P(\mathbf{r}, t) = \text{Re} [p(\mathbf{r})e^{i\omega t} + P_0 e^{i(\omega t - kr \cos \theta)}]$, давление в рассеянной волне $\text{Re} (p(\mathbf{r})e^{i\omega t})$, где $p(\mathbf{r})$ — решение внешней краевой задачи для уравнения Гельмгольца

$$\Delta p + k^2 p = 0, \quad r_0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$\left. \frac{\partial p}{\partial r} \right|_{r=r_0} = ik \cos \theta e^{-ikr_0 \cos \theta},$$

$$p = O\left(\frac{1}{r}\right), \quad \frac{\partial p}{\partial r} + ikp = o\left(\frac{1}{r}\right), \quad r \rightarrow \infty.$$

1.312. Уравнение то же, что и в задаче 1.311; граничное условие $V|_{z=0} = 0$.

$$1.313. \Delta \psi = 0, \quad r_0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$\left. \frac{\partial \psi}{\partial r} \right|_{r=r_0} = 0, \quad |\psi - V_0 r \cos \varphi| < \infty.$$

1.314. Потенциал скоростей $\psi(\mathbf{r}, t) = \Psi(\mathbf{R}, t)$, где $\mathbf{r} = \mathbf{R} + \mathbf{r}_0(t)$, $\mathbf{r}'_0(t) = \mathbf{V}(t)$, Ψ — решение задачи

$$\Delta \Psi = 0, \quad r_0 < R, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$\left. \frac{\partial \Psi}{\partial R} \right|_{R=r_0} = V(t) \cos \varphi, \quad \lim_{R \rightarrow \infty} \Psi = 0;$$

$$\text{давление } P|_S = P_0 - \rho_0 \left(\frac{1}{2} |\nabla \Psi|^2 - (\mathbf{V}(t) \nabla \Psi) + \frac{\partial \Psi}{\partial t} \right) \Big|_{R=r_0}.$$

1.315. Потенциал скоростей $\psi(\mathbf{r}, t) = \Psi(\mathbf{R}, t)$, где $\mathbf{r} = \mathbf{R} + \mathbf{r}_0(t)$, $\mathbf{r}'_0(t) = \mathbf{V}(t)$, Ψ — решение задачи

$$\Delta \Psi = 0, \quad r_0 < R, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$\left. \frac{\partial \Psi}{\partial R} \right|_{R=r_0} = V(t) \cos \theta, \quad \lim_{R \rightarrow \infty} \Psi = 0;$$

$$\text{давление } P|_S = P_0 - \rho_0 \left(\frac{1}{2} |\nabla \Psi|^2 - (\mathbf{V}(t) \nabla \Psi) + \frac{\partial \Psi}{\partial t} \right) \Big|_{R=r_0}.$$

$$1.316. \quad \Delta\psi = 0, \quad r_0(t) < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$\frac{\partial\psi}{\partial r} \Big|_{r=r_0(t)} = r'_0(t), \quad \lim_{r \rightarrow \infty} \psi = 0,$$

$$P|_S = P_0 - \rho_0 \left(\frac{1}{2} (r'_0)^2 + \frac{\partial\psi}{\partial t} \Big|_{r=r_0(t)} \right).$$

$$1.317. \quad \Delta\psi = 0, \quad r_0(t) < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t,$$

$$\frac{\partial\psi}{\partial r} \Big|_{r=r_0(t)} = r'_0(t), \quad r_0(0) = a, \quad r'_0(0) = 0,$$

$$\frac{\partial\psi}{\partial t} \Big|_{r=r_0(t)} = \frac{P_0}{\rho_0} - \frac{(r'_0(t))^2}{2}, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} \psi = 0.$$

$$1.318. \quad \Delta\psi = \frac{Q_0}{\rho_0} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{d}), \quad r_0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$\frac{\partial\psi}{\partial r} \Big|_{r=r_0} = 0, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} \psi = 0.$$

$$1.319. \quad \Delta\psi = \frac{Q_0}{\rho_0} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{d}), \quad r_0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$\frac{\partial\psi}{\partial r} \Big|_{r=r_0} = 0, \quad \psi = \mathcal{O}(\ln r), \quad r \rightarrow \infty.$$

$$1.320. \quad \mathbf{V} = \nabla\psi, \quad \Delta\psi(M) = 0, \quad M \in \Omega,$$

$$\psi|_S = 0, \quad \frac{\partial\psi}{\partial n} \Big|_{S_1} = (\mathbf{V}_0 \mathbf{n}), \quad \mathbf{n} - \text{внешняя нормаль к } \partial\Omega_1.$$

$$1.321. \quad \Delta\psi = 0, \quad -\infty < x, y < \infty, \quad -h_0 < z < 0,$$

$$(\psi_{tt} + g\psi_z)|_{z=0} = 0, \quad \psi(x, y, 0, 0) = \psi_0(x, y), \quad \psi_t(x, y, 0, 0) = \psi_1(x, y);$$

$$1) \psi_z|_{z=-h_0} = 0; \quad 2) |\psi| < \infty.$$

Решение. Если функция f характеризует колебательное движение с амплитудой A , длиной волны λ , периодом T , то справедливы следующие порядковые оценки (см. указание к задаче 1.295):

$$\frac{\partial f}{\partial t} \sim \frac{\Delta f}{T}, \quad |(\mathbf{V} \nabla f)| \sim \left| \frac{V \Delta f}{\lambda} \right| = \left| \frac{VT}{\lambda} \frac{\Delta f}{T} \right| \sim \frac{A}{\lambda} \left| \frac{\partial f}{\partial t} \right|.$$

Отсюда

$$\frac{df}{dt} \sim \left(1 + \frac{A}{\lambda} \right) \frac{\partial f}{\partial t}. \quad (1.152)$$

При условии $A \ll \lambda$ уравнение (1.85) примет вид

$$\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} + \nabla \frac{P}{\rho_0} + \mathbf{g} = 0. \quad (1.153)$$

Применение операции rot к обеим частям уравнения (1.153) приводит к тождеству $(\text{rot } \mathbf{V})_t = 0$, из которого следует, что $\text{rot } \mathbf{V} = \mathbf{C}$. Так как средняя скорость при колебательном движении равна нулю, то

$$\mathbf{C} = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{C} dt = \frac{1}{T} \int_0^T \text{rot } \mathbf{V} dt = \text{rot} \left(\frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{V} dt \right) = 0.$$

Итак, движение жидкости является потенциальным и уравнение (1.153) в результате подстановки $\mathbf{V} = \nabla\psi$ и интегрирования преобразуется к виду

$$\psi_t + \frac{P}{\rho_0} + gz = f(t).$$

Отсюда после замены $\psi \rightarrow \psi + \int_0^t f(\tau) d\tau - \frac{P}{\rho}$ получается граничное условие для потенциала ψ в виде

$$(\psi_t + gz)|_{z=\zeta} = 0, \quad (1.154)$$

представляющее собой приближенное условие (1.87). Упрощение второго условия (1.88) основано на оценке (1.152), согласно которой

$$\frac{\partial \psi}{\partial z} \Big|_{z=\zeta} = V_z|_{z=\zeta} = \frac{d\zeta}{dt} \approx \frac{\partial \zeta}{\partial t}.$$

Это значит, что слагаемое $(\nabla \psi \nabla \zeta)$ в (1.88) вносит малый вклад, а полученное условие превращается в

$$\frac{\partial \psi}{\partial z} \Big|_{z=\zeta} = \frac{\partial \zeta}{\partial t}. \quad (1.155)$$

Граничные условия (1.154) и (1.155) объединяются в одно посредством дифференцирования (1.154) по t :

$$\frac{\partial}{\partial t}(\psi_t|_{z=\zeta}) + g\psi_z|_{z=\zeta} = 0.$$

Но

$$\frac{\partial}{\partial t}(\psi_t|_{z=\zeta}) = \frac{\partial \psi_t(x, y, \zeta, t)}{\partial t} = \frac{\partial \psi_t}{\partial t} \Big|_{z=\zeta} + \left(\frac{\partial \psi_t}{\partial z} V_z \right) \Big|_{z=\zeta} \approx \psi_{tt}|_{z=\zeta},$$

следовательно, $(\psi_{tt} + g\psi_z)|_{z=\zeta} = 0$. Так как $|\zeta| \ll h$, то в последнем условии можно взять $z = 0$.

1.322. $\Delta \psi = 0, \quad |x| < l_1, \quad |y| < l_2, \quad -h_0 < z < 0, \quad 0 < t,$
 $(\psi_{tt} + g\psi_z)|_{z=0} = 0, \quad \psi_z|_{z=-h_0} = \psi_x|_{x=\pm l_1} = \psi_y|_{y=\pm l_2} = 0,$
 $\psi(x, y, 0, 0) = \psi_0(x, y), \quad \psi_t(x, y, 0, 0) = \psi_1(x, y).$

1.323. $\Delta \psi(x, z, t) = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad z < 0, \quad 0 < t,$
 $(\psi_{tt} + g\psi_z)|_{z=0} = 0, \quad |\psi| < \infty,$
 $\psi(x, 0, 0) = -\frac{1}{\rho} I(x), \quad \psi_t(x, 0, 0) = -g\zeta_0(x).$

У к а з а н и е. Начальные условия для ψ следуют из 1.86:

$$P \Delta t = -\rho_0 \psi_t \Delta t + O(\Delta t) \implies I = -\rho_0(\psi|_{t=+0} - \psi|_{t=-0}).$$

1.324. $\Delta \psi(x, z, t) = 0, \quad -\infty < x, y < \infty, \quad -\infty < z < 0, \quad 0 < z < h, \quad 0 < t,$
 $\psi_z|_{z=+0} = \psi_z|_{z=-0} = \frac{1}{g(\rho_2 - \rho_1)}(\rho_1 \psi_{tt}|_{z=+0} - \rho_2 \psi_{tt}|_{z=-0});$
 1) $(\psi_{tt} + g\psi_z)|_{z=h} = 0;$ 2) $\psi_z|_{z=h} = 0,$
 $\psi(x, y, 0, 0) = \psi_0(x, y), \quad \psi_t(x, y, 0, 0) = \psi_1(x, y).$

1.325. Р е ш е н и е. Скорость жидкости имеет две компоненты $V_x = u, V_z = v$. Из-за малости амплитуды в уравнении (1.77) несущественно слагаемое $(\nabla \nabla) \mathbf{V}$ (см. (1.152)), и уравнение равносильно системе

$$\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} = -g, \quad (1.156)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} = 0. \quad (1.157)$$

В теории длинных гравитационных волн давление жидкости отождествляется с гидростатическим (гидравлическое приближение) $P = P_0 + \rho z(\zeta - z)$, кото-

рое получается интегрированием (1.156) без учета слагаемого v_t . Подстановка $P(x, t)$ в (1.157) дает

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -g \frac{\partial \zeta}{\partial x}. \quad (1.158)$$

В действительности полное давление жидкости отличается от гидростатического на величину $\tilde{p}$, порядок которой, согласно (1.156), $\rho v_t h$. Из (1.84) следует, что $v \sim u_x h$, поэтому $\tilde{p} \sim \rho h^2 u_{xt}$. Таким образом, в уравнении (1.158) не учтено слагаемое $\tilde{p}_x / \rho$, которое нужно сравнить с u_t :

$$\frac{\tilde{p}_x}{\rho u_t} \sim \frac{\rho v_t h}{\rho u_t} \sim h^2 \frac{u_{xt}}{u_t} \sim \frac{h^2}{\lambda^2} \ll 1. \quad (1.159)$$

Второе уравнение для u и ζ получается интегрированием уравнения непрерывности (1.84):

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{-h_0}^{\zeta} \frac{\partial u}{\partial x} dz + \int_{-h_0}^{\zeta} \frac{\partial v}{\partial z} dz = \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \int_{-h_0}^{\zeta} u dz - u(x, \zeta, t) \zeta_x - u(x, -h_0, t) h_{0x} + v(x, \zeta, t) - v(x, -h_0, t). \end{aligned}$$

Отсюда на основании (1.88) и (1.89)

$$\frac{\partial}{\partial x} \int_{-h_0}^{\zeta} u dz + \frac{\partial \zeta}{\partial t} = 0. \quad (1.160)$$

Правая часть уравнения (1.158) не зависит от z , поэтому его решением будет функция x и t . Следовательно, уравнению (1.160) можно придать форму

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + \frac{\partial(hu)}{\partial x} = 0, \quad (1.161)$$

где $h = h_0 + \zeta$. Нелинейное уравнение (1.161),

$$\zeta_t + (h_0 + \zeta)u_x + h_{0x}u + \zeta_x u = 0,$$

при сделанных допущениях сводится к линейному

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + \frac{\partial(h_0 u)}{\partial x} = 0, \quad (1.162)$$

так как $\frac{|\zeta|}{h_0} \sim \frac{A}{h_0} \ll 1$, $\left| \frac{\zeta_x u}{\zeta_t} \right| \sim \frac{T|u|}{\lambda} \sim T|u_x| \sim \frac{T|v|}{h} \sim \frac{A}{h_0} \ll 1$.

Остается исключить $u(x, t)$ из (1.158) и (1.162). Если $h_0 = \text{const}$, то функции $f_1(x - at)$ и $f_2(x + at)$ являются решениями уравнения $\zeta_{tt} = gh_0 \zeta_{xx}$, в чем можно убедиться подстановкой этих функций в уравнение.

1.326.
$$\frac{\partial^2 \zeta}{\partial t^2} = \frac{g}{d(x)} \frac{\partial}{\partial x} \left(S_0(x) \frac{\partial \zeta}{\partial x} \right).$$

У к а з а н и е. Уравнение непрерывности в форме, аналогичной (1.161), следует из закона сохранения массы в слое $(x, x + \Delta x)$

$$(\rho S u|_x - \rho S u|_{x+\Delta x}) \Delta t = (\rho S|_{t+\Delta t} - \rho S|_t) \Delta x,$$

откуда
$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{\partial(Su)}{\partial x} = 0.$$

1.328. У к а з а н и е. Вывод второго уравнения системы (1.92) отличается от вывода уравнения (1.158) тем, что нельзя пренебречь слагаемым $(\mathbf{V}\nabla)\mathbf{V}$, так как амплитуда не мала. Применимость гидравлического приближения основана на оценке (1.159), которая остается справедливой и для отношения полных производных функций v и u по t в силу соотношения (1.152). Вывод первого уравнения дан в решении задачи 1.325 (см. (1.161)).

1.329. У к а з а н и е. В системе уравнений газодинамики (пример 1.16)

$$\begin{aligned}\rho_t + v\rho_x + \rho v_x &= 0, \\ v_t + v v_x + \frac{1}{\rho} p_x &= 0, \\ p &= \frac{k^2}{\gamma} \rho^\gamma, \quad k^2 = \frac{P_0 \gamma}{\rho_0^\gamma}\end{aligned}\tag{1.163}$$

сделать замену

$$c^2 = \frac{\partial P}{\partial \rho} = k^2 \rho^{\gamma-1}.\tag{1.164}$$

1.330. Скорость газа $v(x, t)$ и скорость звука в газе $c(x, t)$ удовлетворяют системе уравнений

$$\begin{aligned}v_t + v u_x + \frac{2}{\gamma-1} c c_x &= 0, \quad \mu(t) < x, \quad 0 < t, \\ c_t + \frac{\gamma-1}{2} c v_x + v c_x &= 0, \\ v(\mu(t), t) &= \mu'(t), \\ v(x, 0) = 0, \quad c(x, 0) &= c_0, \quad c_0^2 = \frac{P_0 \gamma}{\rho_0}.\end{aligned}$$

1.331. Р е ш е н и е. Стационарное течение описывается системой уравнений газодинамики (пример 1.16.):

$$\operatorname{div} \rho \mathbf{v} = 0,\tag{1.165}$$

$$(\mathbf{v} \nabla) \mathbf{v} + \frac{1}{\rho} \nabla P = 0,\tag{1.166}$$

$$P = \frac{k^2}{\gamma} \rho^\gamma, \quad k^2 = \frac{P_0 \gamma}{\rho_0^\gamma}.$$

Пусть $V = \frac{1}{\rho}$ — удельный объем газа. Закон сохранения энергии при адиабатическом процессе $\Delta E + P \Delta V = 0$ можно представить в следующей форме:

$$\frac{1}{\rho} \Delta P = \Delta \left(E + \frac{P}{\rho} \right).\tag{1.167}$$

Так как внутренняя энергия газа $E = C_V T$, уравнение состояния $P = \rho R T$, где $R = C_P - C_V$, то $E + \frac{P}{\rho} = C_V T + \frac{P}{\rho} = C_V \frac{P}{\rho R} + \frac{P}{\rho} = \frac{P}{\rho} \left(\frac{C_V}{C_P - C_V} + 1 \right) \times$
 $\times \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{P}{\rho} = \frac{c^2}{\gamma-1}.$

Уравнение (1.166) приводится к виду

$$\nabla \left(\frac{v^2}{2} + \frac{c^2}{\gamma-1} \right) = 0,$$

откуда

$$\frac{v^2}{2} + \frac{c^2}{\gamma-1} = \frac{v_0^2}{2} + \frac{c_0^2}{\gamma-1}.$$

Второе уравнение системы (1.94) представляет собой записанное в декартовых координатах условие $(\operatorname{rot} \mathbf{v})_z = 0$, а первое получается преобразованием уравнения непрерывности (1.165):

$$v_x \frac{\partial \rho}{\partial x} + \rho \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial \rho}{\partial y} + v_y \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0,$$

которое после умножения на $k^2 \rho^{\gamma-1}$ и введения $c^2 = k^2 \rho^{\gamma-1}$ принимает вид

$$\frac{v_x}{\gamma-1} \frac{\partial c^2}{\partial x} + \frac{v_y}{\gamma-1} \frac{\partial c^2}{\partial y} + c^2 \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} \right) = 0.$$

Вывод завершается подстановкой c^2 из (1.95) и применением второго уравнения системы (1.94).

1.332. У к а з а н и е. Первое уравнение следует из условия равновесия элемента $\Delta S \Delta r$ сферического слоя $(r, r + \Delta r)$, где ΔS — площадь элемента:

$$-P(r + \Delta r) \Delta S + P(r) \Delta S = F \frac{\rho \Delta S \Delta r m(r)}{r^2},$$

где $m(r)$ — масса шара, радиус которого r . Уравнение Лейна–Эмдена получается исключением P из уравнения равновесия. Из соотношения $\rho = \rho(0) \theta^n$ следует первое начальное условие, а второе — из равенства $\frac{dP}{dr} \Big|_{r=0} = 0$ и уравнения состояния электронного газа. Результат численного анализа: равновесие устойчиво, если масса звезды $m \leq M_\odot$, максимальная плотность $\rho = 10^7$ грамм в кубическом см.

1.334. У к а з а н и е. Решение системы (1.100) представить в виде

$$\begin{aligned} u &= \varepsilon u_1 + \varepsilon^2 u_2 + \dots, \\ \zeta &= \varepsilon \zeta_1 + \varepsilon^2 \zeta_2 + \dots \end{aligned}$$

и ввести новые переменные $\xi = \varepsilon^\mu (x - t)$, $\tau \varepsilon^{3\mu} t$; далее действовать так же, как при выводе уравнения КдФ в примере 1.9.

1.335. $\mathbf{V} = V(x, t) \mathbf{e}_z$, $V(x, t)$ — решение задачи

$$\frac{\partial V}{\partial t} = \nu V_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$V(0, t) = 0, \quad V(l, t) = V_0, \quad V(x, 0) = 0.$$

1.336. $\mathbf{V} = V(x, y) \mathbf{e}_z$, $V(x, t)$ — решение задачи

$$\Delta V = -\frac{\nu \rho (P_2 - P_1)}{l}, \quad (x, y) \in \Omega,$$

$$V|_{\partial\Omega} = 0.$$

1.337. $\mathbf{V} = V(r, t) \mathbf{e}_\varphi$, $V(r, t)$ — решение задачи

$$\frac{\partial V}{\partial t} = \nu \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial V}{\partial r} - \frac{V}{r^2} \right), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t,$$

$$|V(r, t)| < \infty, \quad V(r_0, t) = \omega r_0, \quad V(r, 0) = 0.$$

1.338. $V_z(r, z) = u(r, z)$, $u(r, t)$ — решение задачи

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\nu}{u_0} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{2\nu}{r_0 u_0} \left(\frac{\partial u}{\partial r} \right) \Big|_{r=r_0}, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < z,$$

$$u(r, 0) = u_0, \quad u(r_0, z) = 0, \quad |u(r, z)| < \infty.$$

1.339. $\operatorname{div}(\rho \nabla P) = \left(\frac{\mu m}{k} \frac{\partial P}{\partial t} - 2\rho g \frac{\partial P}{\partial z} \right) \frac{d\rho}{dP}$, $\mathbf{e}_z = -\mathbf{e}_g$.

1.340. $q = -\frac{k}{\mu} P_x(0, t)$, где $P(x, t)$ — решение задачи

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left(\rho \frac{\partial P}{\partial x} \right), \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$P(0, t) = P_1(t), \quad P_x(l, t) + hP(l, t) = hP_0,$$

$$P(x, 0) = P_0, \quad a^2 = \frac{k\mu}{m}, \quad h = \frac{\alpha\mu}{k}.$$

1.341. $\frac{\partial \rho}{\partial t} = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \rho \frac{\partial P}{\partial r} \right)$, $r_1 < r < r_2$, $0 < t$,

$$P(r_1, t) = P_1, \quad \frac{\partial P}{\partial r} \Big|_{r=r_2} = 0,$$

$$P(r, 0) = P_0, \quad a^2 = \frac{k\mu}{m}.$$

1.343. $P_t = a^2 P_{xx}$, $0 < x < l$, $0 < t$, $a^2 = \frac{k_0}{\mu_0 m_0} \left(\frac{1}{K_m} + \frac{1}{K_\rho} \right)^{-1}$,
 $P(0, t) = P_1$, $P(l, t) = P_0$, $P(x, 0) = P_0$.

1.344. $Q = 2\pi r_1 H \frac{k_0}{\mu_0} \frac{\partial P}{\partial r} \Big|_{r=r_1}$, где $P(r, t)$ — решение задачи

$$P_t = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \rho \frac{\partial P}{\partial r} \right), \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < t, \quad a^2 = \frac{k_0}{\mu_0 m_0} \left(\frac{1}{K_m} + \frac{1}{K_\rho} \right)^{-1},$$

$$P(r_1, t) = P_1, \quad P_r(r_2, t) + hP(r_2, t) = hP_0, \quad h = \frac{\alpha\mu_0}{k_0},$$

$$P(r, 0) = P_0.$$

1.345. У к а з а н и е. Исключить ρ и $\mathbf{V}$ из системы уравнений

$$m \frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{V} = 0, \quad P = \rho T R, \quad \mathbf{V} = -\frac{k}{\mu} \nabla P.$$

1.346. $P_t = \frac{k}{2\mu m} \frac{\partial^2 P^2}{\partial x^2}$, $0 < x < l$, $0 < t$,

$$P(0, t) = P_1(t), \quad P_x(l, t) = 0, \quad P(x, 0) = P_0.$$

1.347. $Q = 2\pi r_1 H \frac{k}{\mu} \frac{\partial P}{\partial r} \Big|_{r=r_1}$, где $P(r, t)$ — решение задачи

$$P_t = \frac{k}{2\mu m} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial P^2}{\partial r}, \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < t,$$

$$P(r_1, t) = P_1, \quad P(r_2, t) = P_0, \quad P(r, 0) = P_0.$$

1.348. $\mathbf{q} = -\frac{k\mathbf{e}_x}{2\mu RT} \frac{\partial P^2}{\partial x} \Big|_{x=0}$, где $P(x, t)$ — решение краевой задачи

$$\frac{d^2 P^2}{dx^2} = 0, \quad 0 < x < l, \quad P^2(0) = P_1^2, \quad P^2(l) = P_2^2.$$

1.349. $\mathbf{q} = -\frac{k\mathbf{e}_r}{2\mu RT} \frac{\partial P^2}{\partial r} \Big|_{r=r_1}$, где $P(r)$ — решение краевой задачи

$$\frac{d}{dr} r \frac{dP^2}{dr} = 0, \quad r_1 < r < r_2,$$

$$P(r_1) = P_1, \quad P_r(r_2) + hP(r_2) = hP_2, \quad h = \frac{\alpha\mu}{k}.$$

1.350. У к а з а н и е. Уравнение непрерывности и давление имеют вид

$$m \frac{\partial \zeta}{\partial t} + \operatorname{div}(\zeta + H_0) \mathbf{V} = 0, \quad P = \rho g(\zeta - z) + P_0.$$

$$1.351. \quad \frac{\partial \zeta}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 \zeta^2}{\partial x^2}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \quad a^2 = \frac{2\rho g}{\mu m}, \\ \zeta(0, t) = h_1(t), \quad \zeta(l, t) = h_0, \quad \zeta(x, 0) = h_0.$$

$$1.352. \quad \frac{\partial \zeta}{\partial t} = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial \zeta^2}{\partial r}, \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < t, \quad a^2 = \frac{2\rho g}{\mu m}, \\ \zeta(r_1, t) = h_1(t), \quad \zeta(r_2, t) = h_0, \quad \zeta(r, 0) = h_0.$$

$$1.353. \quad \frac{d^2 \zeta^2}{dx^2} = 0, \quad 0 < x < l, \\ \zeta^2(0) = H^2, \quad \left. \frac{\partial \zeta^2}{\partial x} \right|_{x=l} = \frac{2\mu q}{k\rho g}.$$

$$1.354. \quad \frac{d}{dr} r \frac{d\zeta^2}{dr} = 0, \quad r_1 < r < r_2, \\ \zeta^2(r_1) = H^2, \quad \left. \frac{\partial \zeta^2}{\partial r} \right|_{r=r_1} = \frac{\mu Q}{\pi r_1 k\rho g}.$$

1.355. Функция $L(t)$ — решение задачи Коши

$$m \frac{dL}{dt} = -\frac{k_1}{\mu_1} P_x(L-0, t), \quad 0 < t, \\ L(0) = L_0; \\ P(x, t) — \text{решение задачи} \\ P_{xx}(x, t) = 0, \quad 0 < x < L, \quad L < x < l, \\ P(0, t) = P_1, \quad P(l, t) = P_2, \\ P(L-0, t) = P(L+0, t), \quad \frac{k_1}{\mu_1} P_x(L-0, t) = \frac{k_2}{\mu_2} P_x(L+0, t).$$

1.356. Функция $R(t)$ — решение задачи Коши

$$m \frac{dR}{dt} = -\frac{k_1}{\mu_1} \left. \frac{\partial P}{\partial r} \right|_{r=R}, \quad 0 < t, \\ R(0) = R_0, \\ P(r, t) — \text{решение задачи} \\ \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial P}{\partial r} = 0, \quad r_1 < r < R, \quad R < r < r_2, \\ P(r_1, t) = P_1, \quad P(r_2, t) = P_2, \\ P(R-0, t) = P(R+0, t), \quad \frac{k_1}{\mu_1} \left. \frac{\partial P}{\partial r} \right|_{r=R-0} = \frac{k_2}{\mu_2} \left. \frac{\partial P}{\partial r} \right|_{r=R+0}.$$

$$1.357. \quad P_t = \frac{k}{2\mu m} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial P^2}{\partial r}, \quad \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial P^2}{\partial r} = 0, \\ r_1 < r < R, \quad 0 < t, \quad R < r < r_2, \quad 0 < t, \\ P(r_1, t) = P_1, \quad P(r_2, t) = P_0, \\ P(R-0, t) = P(R+0, t), \quad -m \frac{dR}{dt} = \frac{k_1}{\mu_1} \left. \frac{\partial P}{\partial r} \right|_{r=R-0} = \frac{k_2}{\mu_2} \left. \frac{\partial P}{\partial r} \right|_{r=R+0}, \\ R(0) = R_0, \quad P(r, 0) = P_0.$$

$$1.359. \quad \frac{\partial^2 P^2}{\partial x^2} = \frac{2\mu}{k} \left[m + \frac{abRT}{(1+aP)^2} \right] \frac{\partial P}{\partial t}, \quad 0 < x, \quad 0 < t, \\ P(0, t) = P_1, \quad P(x, 0) = P_0, \quad |P(x, t)| < \infty.$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.360.} \quad & \frac{\partial^2 P^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P^2}{\partial y^2} = \frac{2\mu}{k} \left[m + \frac{abRT}{(1+aP)^2} \right] \frac{\partial P}{\partial t}, \quad 0 < x, \quad 0 < y, \quad 0 < t, \\ & P(x, 0, t) = P(0, y, t) = P_1, \\ & P(x, y, 0) = P_0, \quad |P(x, y, t)| < \infty. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.361.} \quad & \frac{\partial^2 P^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P^2}{\partial y^2} = \frac{2\mu}{k} \left[m + \frac{abRT}{(1+aP)^2} \right] \frac{\partial P}{\partial t}, \quad 0 < x, \quad V_0 t < y, \quad 0 < t, \\ & P(x, V_0 t, t) = P(0, y, t) = P_1, \\ & P(x, y, 0) = P_0, \quad |P(x, y, t)| < \infty. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.362.} \quad & u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \quad a^2 = \frac{1}{LC}, \\ & u(0, t) = E(t), \quad u_x(l, t) + LC_0 u_{tt}(l, t) = 0, \\ & u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

У к а з а н и е. Для вывода граничных условий нужно применить соотношение (1.108). Например, при $x_0 = l$ из него следует $u(l, t) = \frac{1}{C_0} \int_0^\tau i(l, \tau) d\tau$.

$$\begin{aligned} \mathbf{1.363.} \quad & u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \quad a^2 = \frac{1}{LC}, \\ & u(0, t) - \frac{L_0}{L} u_x(0, t) = E(t), \quad u(l, t) = 0, \\ & u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

У к а з а н и е. При $x = 0$ из (1.108) следует уравнение $-u(0, t) + E(t) = L_0 i_t(0, t)$, в которое нужно ввести функцию $u(x, t)$ вместо $i(x, t)$, используя систему телеграфных уравнений.

1.364. Постановка задачи имеет две формы:

$$\begin{aligned} 1) \quad & u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u_x(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) + LC_0 u_{tt}(l, t) = 0, \\ & u(x, 0) = \begin{cases} \frac{q_0}{C_0}, & x = l, \\ 0, & 0 \leq x < l, \end{cases} \\ & u_t(x, 0) = 0, \quad a^2 = \frac{1}{LC}; \\ 2) \quad & LC(x) u_{tt} = u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0, \\ & C(x) u(x, 0) = q_0 \delta(x - l), \quad u_t(x, 0) = 0, \quad C(x) = C + C_0 \delta(x - l). \end{aligned}$$

У к а з а н и е. См. пример 1.6.

$$\begin{aligned} \mathbf{1.365.} \quad & u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) + C_0 L u_{tt}(l, t) = -C_0 L E_0 \delta'(t), \\ & u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, \quad a^2 = \frac{1}{LC}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.366.} \quad & u_t = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u(0, t) = E(t), \quad R_0 u_x(l, t) + R u(l, t) = 0, \\ & u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.367.} \quad & u_t = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ & u_x(0, t) - \frac{R}{R_1} u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) + \frac{R}{R_2} u(l, t) = -\frac{E(t)}{R_2}, \\ & u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{1.368.} \quad & u_{tt} = a^2 u_{xx} - \beta u_t, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\
 & u(0, t) = E(t), \quad R_0 u_x(l, t) + Lu_t(l, t) + Ru(l, t) = 0, \\
 & u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, \quad a^2 = \frac{1}{LC}, \quad \beta = \frac{R}{L}.
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{1.369.} \quad u_t = \frac{1}{RC} u_{xx} - \frac{G}{C} u + \frac{q_0}{C} \delta(x - x_0) \cdot \delta(t), \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\
 u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{1.370.} \quad & u_{tt} = a^2 u_{xx} - 2\beta u_t - \beta^2 u, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\
 & L_0 u_{xt}(0, t) - Lu_t(0, t) - Ru(0, t) = -RE(t) - LE'(t), \\
 & R_0 u_x(l, t) + Lu_t(l, t) + Ru(l, t) = 0, \\
 & u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, \quad a^2 = \frac{1}{LC}, \quad \beta = \frac{R}{L},
 \end{aligned}$$

$E'(t)$ — обобщенная производная. В частном случае постоянной э.д.с. правая часть граничного условия при $x = 0$ имеет вид $-RE_0 - LE_0\delta(t)$.

У к а з а н и е. В граничное задачи условие (1.108) при $x_0 = 0$ входит функция $E(t)\eta(t)$.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{1.371.} \quad & u_t = \frac{1}{R_1 C_1} u_{xx}, \quad u_t = \frac{1}{R_2 C_2} u_{xx}, \\
 & x < 0, \quad 0 < t, \quad 0 < x, \quad 0 < t, \\
 & u(-0, t) = u(+0, t), \quad \frac{1}{R_1} u_x(-0, t) = \frac{1}{R_2} u_x(+0, t), \\
 & u(x, 0) = u_0(x).
 \end{aligned}$$

1.372. $q(t) = -C_0 u(0, t)$. 1. Задача для функции $u(x, t)$ может быть поставлена либо в форме

$$\begin{aligned}
 \mathbf{1a)} \quad & u_t = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x, \quad 0 < t, \quad a^2 = \frac{1}{RC}, \\
 & RC_0 u_t(0, t) - u_x(0, t) = 0, \quad |u(x, t)| < \infty, \quad u(x, 0) = \begin{cases} 0, & x > 0, \\ -\frac{q_0}{C_0}, & x = 0, \end{cases}
 \end{aligned}$$

либо в эквивалентной форме

$$\begin{aligned}
 \mathbf{1b)} \quad & \begin{cases} u_x + Ri = 0, \\ i_x + Cu_t = 0, \end{cases} \quad 0 < x, \quad 0 < t, \quad -C_0 u(0, t) = q_0 + \int_0^t i(0, \tau) d\tau, \\
 & |u(x, t)| < \infty, \quad |i(x, t)| < \infty, \quad u(x, 0) = i(x, 0) = 0.
 \end{aligned}$$

З а м е ч а н и е. Эффективным способом решения подобных задач является интегральное преобразование Лапласа. Для применения этого преобразования можно использовать форму 1b постановки задачи и не обязательно исключать одну из неизвестных функций из системы уравнений, как это сделано в 1a: процедура исключения упрощается, если перейти к изображениям. Задачи поставлены в разных формах, в частности, для того, чтобы подчеркнуть этот факт.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.} \quad & \begin{cases} u_x + Li = 0, \\ i_x + Cu_t = 0, \end{cases} \quad 0 < x, \quad 0 < t, \quad -C_0 u(0, t) = q_0 + \int_0^t i(0, \tau) d\tau, \\
 & |u(x, t)| < \infty, \quad |i(x, t)| < \infty, \quad u(x, 0) = i(x, 0) = 0.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{1.373.} \quad & i_t = a^2 i_{xx} - \beta i, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \quad a^2 = \frac{1}{RC}, \quad \beta = \frac{G}{C}, \\
 & i(0, t) = i_x(l, t) = 0, \quad i(x, 0) = -\frac{u_0}{R} \delta(x - l).
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{1.374.} \quad & i_t = a^2 i_{xx} - \beta i, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \quad a^2 = \frac{1}{RC}, \quad \beta = \frac{G}{C}, \\
 & Gi(0, t) + Ci_t(0, t) - C_0 i_{xt}(0, t) = 0, \\
 & GR_0 i(l, t) + CR_0 i_t(l, t) + i_x(l, t) = GE_0 + CE_0 \delta(t), \quad i(x, 0) = 0.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{1.375.} \quad & i_{tt} = a^2 i_{xx} - \beta i_t, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \quad a^2 = \frac{1}{LC}, \quad \beta = \frac{R}{L}, \\
 & i_x(0, t) = 0, \quad i(x, 0) = 0, \\
 & 1) \quad CR_0 i_t(l, t) + i_x(l, t) = C E'(t); \\
 & 2) \quad CL_0 i_{tt}(l, t) + i_x(l, t) = C E'(t); \\
 & 3) \quad Gi(l, t) + Ci_t(l, t) + C_0 i_{tt}(l, t) = GC_0 E'(t) + CC_0 E''(t),
 \end{aligned}$$

где $E'(t)$ — обобщенная производная, которая в частных случаях имеет следующий вид: 1) $E'(t) = E_0 \omega \cos \omega t$; 2) $E'(t) = E_0 \delta(t)$.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{1.376.} \quad & i_{tt} = a^2 i_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \quad a^2 = \frac{1}{LC}, \\
 & i_x(0, t) = 0, \quad i_x(l, t) + CR_0 i_t(l, t) = CE_0 \delta(t), \quad i(x, 0) = 0.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{1.377.} \quad & CLi_{tt} = i_{xx} - (RC + LG)i_t - RGi, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\
 & i_x(0, t) - CR_0 i_t(0, t) - R_0 Gi(0, t) = -GE(t) - CE'(t), \\
 & C_0 i_x(l, t) + Ci(l, t) + G \int_0^t i(l, \tau) d\tau = 0, \\
 & i(x, 0) = i_t(x, 0) = 0;
 \end{aligned}$$

$E'(t)$ — обобщенная производная.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{1.378.} \quad & i_{tt} = \frac{1}{L_1 C_1} i_{xx}, & i_{tt} = \frac{1}{L_2 C_2} i_{xx}, \\
 & x < 0, \quad 0 < t, & 0 < x, \quad 0 < t, \\
 & i(-0, t) = i(+0, t), & \frac{1}{C_1} i_x(-0, t) = \frac{1}{C_2} i_x(+0, t), \\
 & i(x, 0) = i_0(x), & i_t(x, 0) = \begin{cases} -\frac{1}{L_1} u'_0(x), & x < 0, \\ -\frac{1}{L_2} u'_0(x), & 0 < x. \end{cases}
 \end{aligned}$$

1.379. У к а з а н и е. Уравнение для потенциала в случае непрерывной модели

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} [C(u)u] = \frac{l^2}{L_0} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(u + \frac{l^2}{12} u_{xx} \right)$$

после подстановки $u = \varepsilon u_1 + \varepsilon^2 u_2 + \dots$ и замены $\xi = \varepsilon^\mu (x - at)$, $\tau = \varepsilon^3 \mu t$, где $a = 1/\sqrt{L_0 C_0}$, преобразуется к виду

$$2a\varepsilon^{4\mu+1} u_{1\xi\tau} + a^2 \alpha \varepsilon^{2\mu+n+1} (u_1^{n+1})_{\xi\xi} + \frac{a^2 l^2}{12} \varepsilon^{4\mu+1} u_{1\xi\xi\xi\xi} + \dots = 0.$$

В полученном уравнении нелинейный $(a^2 \alpha \varepsilon^{2\mu+n+1} (u_1^{n+1})_{\xi\xi})$ и дисперсионный $(\frac{a^2 l^2}{12} \varepsilon^{4\mu+1} u_{1\xi\xi\xi\xi})$ члены будут иметь одинаковый порядок малости при условии $2\mu + n + 1 = 4\mu + 1$ т.е. если $\mu = n/2$ (см. пример 1.9); этой ситуации соответствует уравнение

$$u_\tau + \frac{a\alpha(n+1)}{2} u^n u_\xi + \frac{al^2}{24} u_{\xi\xi\xi} = 0.$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{1.380.} \quad \Delta u &= -\frac{4\pi Q}{\varepsilon} \delta(x) \cdot \delta(y) \cdot \delta(z-h), & \Delta u &= 0, \\
 -\infty < x, y < 0, \quad z > 0, & & -\infty < x, y < \infty, \quad z < 0, \\
 u|_{z=+0} - u|_{z=-0} &= 0, \quad \varepsilon_1 \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{z=+0} - \varepsilon_2 \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{z=-0} = 0, \\
 u(x, y, z) &\rightarrow 0 \quad \text{при } r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \rightarrow \infty.
 \end{aligned}$$

Частный случай:

$$\begin{aligned}
 \Delta u &= 0, \quad -\infty < x, y < \infty, \quad z < 0, \quad z > 0, \\
 u|_{z=+0} - u|_{z=-0} &= 0, \quad \varepsilon_1 \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{z=+0} - \varepsilon_2 \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{z=-0} = -4\pi Q \delta(x) \cdot \delta(y), \\
 u(x, y, z) &\rightarrow 0 \quad \text{при } r \rightarrow 0.
 \end{aligned}$$

У к а з а н и е. Второе граничное условие, связывающее предельные значения нормальных производных потенциала на поверхности $z = 0$, выражает следующее свойство нормальной составляющей вектора электростатической индукции $\mathbf{D} = \varepsilon \frac{\partial u}{\partial z}$: при переходе через заряженную двухстороннюю поверхность S , полная поверхностная плотность заряда которой $\sigma = \sigma_1 + \sigma_2$, со стороны S_1 , поверхностная плотность заряда которой σ_1 , на сторону S_2 , поверхностная плотность заряда которой σ_2 , нормальная компонента D_n имеет разрыв первого рода $D_{2n} - D_{1n} = 4\pi\sigma$, где $\mathbf{n}$ — нормаль, направленная от S_1 к S_2 .

$$\begin{aligned}
 \mathbf{1.381.} \quad \Delta u &= -\frac{4\pi q}{\varepsilon} \delta(x) \cdot \delta(y-h), & \Delta u &= 0, \\
 -\infty < x, z < +\infty, \quad 0 < y, & & -\infty < x, z < +\infty, \quad y < 0, \\
 u|_{y=+0} - u|_{y=-0} &= 0, \quad \varepsilon_1 \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=+0} - \varepsilon_2 \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=-0} = 0, \\
 u(x, y) &= O(\ln r), \quad r = \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow \infty. \\
 \text{Частный случай:} \\
 \Delta u &= 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad y < 0, \quad y > 0, \\
 u|_{y=+0} - u|_{y=-0} &= 0, \quad \varepsilon_1 \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=+0} - \varepsilon_2 \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=-0} = -4\pi q \delta(x), \\
 u(x, y) &= O(\ln r), \quad r \rightarrow \infty.
 \end{aligned}$$

См. указание к предыдущей задаче.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{1.382.} \quad \Delta u &= 0, \quad 0 < r < r_1, \quad r_1 < r < r_2, \quad r_2 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < \theta < \pi, \\
 u|_{r_1=0} &= u|_{r_1+0}, \quad \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r_1=0} = \varepsilon \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r_1+0}, \\
 u|_{r_2=0} &= u|_{r_2+0}, \quad \varepsilon \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r_2=0} = \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r_2+0}, \\
 |u - E_0 r \cos \theta| &< \infty.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{1.383.} \quad \Delta u &= 0, \quad 0 < r < r_1, \quad r_1 < r < r_2, \quad r_2 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\
 u|_{r_1=0} &= u|_{r_1+0}, \quad \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r_1=0} = \mu \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r_1+0}, \\
 u|_{r_2=0} &= u|_{r_2+0}, \quad \mu \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r_2=0} = \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r_2+0}, \\
 |u - H_0 r \cos \varphi| &< \infty.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{1.384.} \quad \Delta u &= -\frac{4\pi \rho}{\varepsilon} \eta(r_0 - r), \quad 0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\
 u|_{r_0=0} &= u|_{r_0+0}, \quad \varepsilon \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r_0=0} = \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r_0+0}, \quad |u| < \infty, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} u = 0.
 \end{aligned}$$

$$1.385. \Delta u = -4\pi\sigma(\theta, \varphi) \cdot \delta(r - r_0), \quad 0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ |u| < \infty, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} u = 0.$$

1.386. В сферической системе координат, ось Oz которой направлена по вектору $\mathbf{P}$, потенциал $u(\mathbf{r})$ — решение задачи

$$\Delta u = -4\pi P \delta(r - r_0) \cdot \cos \theta, \quad 0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ u(\mathbf{r}) = O(1), \quad \mathbf{r} \rightarrow 0, \quad u(\mathbf{r}) \rightarrow 0, \quad r \rightarrow \infty.$$

У к а з а н и е. Плотность заряда на поверхности шара равна $P \cos \theta$.

$$1.387. \Delta u = -4\pi Q \delta(\mathbf{r} - \mathbf{d}), \quad 0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$u|_{r_0=0} = u|_{r_0+\infty}, \quad \varepsilon \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r_0=0} = \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r_0+\infty}, \quad |u(0)| < \infty, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} u = 0.$$

$$1.388. \Delta u = -\frac{2Q}{r_0^2} \frac{\delta(r - r_0)}{r} \cdot \frac{\delta(\theta - \frac{\pi}{2})}{\sin \theta}, \quad 0 < r, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ |u| < \infty, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} u = 0.$$

1.389. Диск занимает область S в плоскости xOy , его центр совпадает с началом координат, $M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$; потенциал $u(x, y, z)$ — решение задачи

$$\Delta u(M) = 0, \quad M \in S, \\ u(M)|_{M \in S} = C, \quad u(M) \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad M \rightarrow \infty;$$

для определения константы C нужно найти потенциал $u(M)$ (он зависит от C), затем вычислить плотность заряда на диске

$$\sigma = \left(-\frac{1}{4\pi} \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{z=+0} + \frac{1}{4\pi} \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{z=-0} \right) \Big|_{(x,y) \in S}$$

и применить закон сохранения $\int_S \sigma ds = Q$. У к а з а н и е. На сторонах S_1 и S_2 проводящей поверхности S , помещенной в поле $\mathbf{E}$, индуцируется заряд; плотность заряда $\sigma_1 = \frac{E_n}{4\pi}$, где $\mathbf{n}$ — нормаль к S , направленная от S_2 к S_1 и т. д.

$$1.390. \Delta u = -4\pi q \delta(x - d) \cdot \delta(y), \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} > r_0, \\ u(x, y, z)|_{r=r_0} = 0, \\ u(x, y, z) = O(\ln(x^2 + y^2)), \quad x^2 + y^2 \rightarrow \infty.$$

1.391. В сферической системе координат с началом центре сферы, ось Oz которой проходит через диполь, потенциал $u(r, \theta, \varphi)$ — решение задачи

$$\Delta u = 4\pi p \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{d}), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ u(r_0, \theta, \varphi) = 0, \quad |u|_{r=0} < \infty.$$

1.392. В сферической системе координат, начало которой находится в центре шара, а ось Oz проходит через диполь, потенциал $u(r, \theta, \varphi)$ является решением задачи

$$\Delta u = 4\pi p \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{d}), \quad r_0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ u(r_0, \theta, \varphi) = 0, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} u = 0.$$

$$1.393. \quad 1) \Delta u = 4\pi \delta(x) \cdot \delta'(y - h), \quad 2) \Delta u = 4\pi \delta'(x) \cdot \delta(y - h), \\ -\infty < x < \infty, \quad 0 < y, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < y, \\ u(x, 0) = 0, \quad u(x, y) \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad \rightarrow \infty.$$

1.394. В сферической системе, ось Oz которой направлена по $\mathbf{M}$, индукция $\mathbf{B} = \mathbf{H} + 4\pi\mathbf{M}$, $\mathbf{B} = \text{rot } \mathbf{A}$, где $\mathbf{A} = A\mathbf{e}_\varphi$, A — решение задачи
$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial A}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial A}{\partial \theta} - \frac{A}{r^2 \sin^2 \theta} = \frac{4\pi M \delta(r-r_0) \cdot \sin \theta}{r_0},$$
$$A(\mathbf{r}) = O(1), \quad r \rightarrow 0, \quad a \rightarrow 0, \quad r \rightarrow \infty.$$

У к а з а н и е. По поверхности шара течет ток, плотность которого $\mathbf{i} = -[\mathbf{e}_r \mathbf{V}]$.

1.395. $\mathbf{E} = -\nabla u$, где потенциал u — решение следующей задачи (в сферической системе координат, ось Oz которой проходит через центр шара в направлении вектора $\mathbf{M}$):

$$\begin{aligned} \Delta u &= \frac{8\pi(2\varepsilon+1)\omega M}{3\varepsilon c}, \quad r < r_0, & \Delta u &= 0, \quad r > r_0, \\ |u| &< \infty, & u &\rightarrow 0, \quad r \rightarrow \infty, \\ u(r_0-0) &= u(r_0+0), \\ \varepsilon \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r_0-0} &- \frac{4\pi(2\varepsilon+1)r_0\omega M}{3c} \sin^2 \theta = \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r_0+0}. \end{aligned}$$

У к а з а н и е. Магнитное поле во вращающемся шаре отличается от поля в неподвижном шаре на величину порядка $\frac{\omega r_0}{c} \ll 1$, которой можно пренебречь. Зависимость между $\mathbf{D}$ и $\mathbf{E}$ устанавливается формулой Минковского

$$\mathbf{D} + \frac{1}{c}[\mathbf{v}\mathbf{H}] = \varepsilon(\mathbf{E} + \frac{1}{c}[\mathbf{v}\mathbf{B}]),$$

которая при $v = 0$ переходит в $\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}$; потенциал и нормальная компонента $\mathbf{D}$ непрерывны на поверхности шара.

1.396. $\mathbf{E} = -\nabla u$, где потенциал u — решение следующей задачи (в сферической системе координат, ось Oz которой проходит через центр шара в направлении вектора $\mathbf{M}$):

$$\begin{aligned} \Delta u &= \frac{16\pi\omega M}{3c}, \quad r < r_0, & \Delta u &= 0, \quad r > r_0, \\ |u| &< \infty, & u &\rightarrow 0, \quad r \rightarrow \infty, \\ u(r_0-0) &= u(r_0+0), \\ \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r_0-0} &= \frac{8\pi r_0\omega M}{3c} \sin^2 \theta. \end{aligned}$$

1.397. $\Delta u = 4\pi M \frac{\delta'(r-d)}{r^2} \cdot \frac{\delta(\theta - \frac{\pi}{2})}{\sin \theta} \cdot \delta(\varphi), \quad 0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$

$$u|_{r_0-0} = u|_{r_0+0}, \quad \mu_0 \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r_0-0} = \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r_0+0}, \quad |u| < \infty, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} u = 0.$$

1.398. $\Delta u = 4\pi p(\varphi) \cdot \delta'(r-r_0), \quad 0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$
 $|u| < \infty, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} u = 0.$

1.399. 1) $\Delta u(M) = -4\pi q_0 \delta(M, P), \quad M \in \Omega,$
 $u|_{\partial\Omega} = 0;$
 2) $\Delta u(M) = -4\pi q_0 \delta(M, P), \quad M \in R^2/\overline{\Omega},$
 $u|_{\partial\Omega} = 0, \quad |u(\infty)| < \infty.$

У к а з а н и е. См. (10.16).

1.400. $\Delta u(M) = -4\pi q_0 \delta(M, P), \quad M \in R^2/\overline{\Omega},$

$$u|_{\partial\Omega} = C, \quad -\frac{1}{4\pi} \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} dl = q_1,$$

$$u(M) = O(\ln r_M), \quad M \rightarrow \infty.$$

См. указание к задаче 1.403.

$$1.401. \mathbf{E} = -\nabla u, \Delta u = -\pi D \delta(x) \delta(y) \delta''(z), \lim_{r \rightarrow \infty} u(\mathbf{r}) = 0.$$

У к а з а н и е. См. (10.16).

$$1.402. \Delta u = 0, \quad r_0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ u(r_0, \theta, \varphi) = 0, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} (u + E_0 r \cos \theta) = 0.$$

У к а з а н и е. Потенциал результирующего поля равен сумме потенциалов шара и внешнего поля: $u = v - E_0 r \cos \theta$; потенциал v шара стремится к нулю на бесконечности.

$$1.403. \Delta u = -4\pi Q \delta(\mathbf{r} - \mathbf{d}), \quad r_0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ u(r_0, \theta, \varphi) = \frac{Q}{d} + \frac{Q_0}{r_0}, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} u(r, \theta, \varphi) = 0.$$

У к а з а н и е. Для вычисления константы C нужно определить потенциал u (он зависит от C), найти плотность заряда на поверхности шара $\sigma = E_n/(4\pi)$ и записать закон сохранения заряда $\int_S \sigma ds = Q_0$. В данной ситуации можно поступить проще. Так как внутри проводника потенциал $u = C$, то его достаточно найти в какой-либо точке шара, например, в центре; в этом случае потенциал складывается из потенциала заряда на шаре (он равен $\frac{Q_0}{r_0}$) и потенциала точечного заряда (он равен $\frac{Q}{d}$).

$$1.404. \Delta u = -4\pi q \frac{\delta(r-d)}{r} \cdot \delta(\varphi), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ |u|_{r=0} < \infty, \quad u(r_0, \varphi) = 0.$$

$$1.405. \Delta u = -4\pi q \frac{\delta(r-d)}{r} \cdot \delta(\varphi), \quad r_0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ |u|_{r=0} < \infty, \quad u(r_0, \varphi) = 0, \quad u(r, \varphi) = O(1), \quad r \rightarrow \infty.$$

У к а з а н и е. Потенциальная энергия U (на единицу длины вдоль оси) системы минимальна. Если суммарный заряд Q цилиндра и нити не равен нулю, то потенциал $u = 2Q \ln \frac{1}{r} \rightarrow \infty$ при $r \rightarrow \infty$ и $U = \infty$. Минимум U достигается, если линейная плотность заряда, индуцированного на цилиндре, $q_0 = -q$.

$$1.406. \Delta u = -4\pi q \frac{\delta(r-d)}{r} \cdot \delta(\varphi), \quad r_0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ u(r_0, \varphi) = C, \quad u(r, \varphi) = 2(q_0 + q) \ln \frac{1}{r} + O(1), \quad r \rightarrow \infty.$$

У к а з а н и е. Потенциал поверхности проводящего цилиндра постоянен, а на больших расстояниях от оси $\sim 2q_0 \ln \frac{1}{r}$.

$$1.407. \Delta u = 4\pi p \delta(x) \cdot \delta(y) \cdot \delta'(z-d), \quad -\infty < x, y < \infty, \quad 0 < z, \\ u(x, y, 0) = 0, \quad u(x, y, z) = O(1), \quad z \rightarrow \infty.$$

$$1.408. \mathbf{A} = A(x, y) \mathbf{e}_z, \quad A(x, y) \text{ удовлетворяет уравнению}$$

$$\operatorname{div} \left(\frac{1}{\mu} \nabla A \right) = -\frac{4\pi}{c} J.$$

1.410. В цилиндрической системе координат, ось Oz которой направлена по оси цилиндра, векторный потенциал $\mathbf{A} = A(r, \varphi) \mathbf{e}_z$, где функция $A(r, \varphi) -$

решение краевой задачи

$$\begin{aligned}\Delta A &= 0, \quad 0 < r < r_0, \quad r_0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ A|_{r_0+0} - A|_{r_0-0} &= 0, \quad \frac{\partial A}{\partial r}\Big|_{r_0+0} - \frac{\partial A}{\partial r}\Big|_{r_0-0} = -\frac{4\pi}{c}i(\varphi), \\ A(r, \varphi) &= O(1), \quad r \rightarrow 0, \quad A(r, \varphi) = \frac{2J}{c} \ln \frac{1}{r} + O(1), \quad r \rightarrow \infty, \quad J = \int_0^{2\pi} i(\varphi) d\varphi.\end{aligned}$$

У к а з а н и е. Если по гладкой границе S раздела двух сред с магнитными проницаемостями μ_1 и μ_2 течет ток, линейная плотность которого i , то тангенциальная составляющая магнитного поля разрывна на границе, при этом ее предельные значения (по разные стороны S) удовлетворяют на S условию

$$H_{2\tau} - H_{1\tau} = \frac{4\pi i}{c},$$

где вектор $\mathbf{e}_i$, направленный по току, вектор нормали $\mathbf{e}_n$ к поверхности S (он направлен из среды 1 в среду 2) и вектор $\mathbf{e}_\tau$, касательный к S , взаимно ортогональны и образуют правую тройку.

1.411. В полярной системе координат векторный потенциал $\mathbf{A} = A(r, \varphi) \mathbf{e}_z$, где $A(r, \varphi)$ — решение задачи

$$\begin{aligned}\Delta A &= 0, \quad 0 < r < r_0, \quad r_0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ A|_{r_0+0} - A|_{r_0-0} &= 0, \quad \frac{\partial A}{\partial r}\Big|_{r_0+0} - \frac{\partial A}{\partial r}\Big|_{r_0-0} = -\frac{4\pi J}{cr_0}\delta(\varphi), \\ A(r, \varphi) &= O(1), \quad r \rightarrow 0, \quad A(r, \varphi) = \frac{2J}{c} \ln \frac{1}{r} + O(1), \quad r \rightarrow \infty.\end{aligned}$$

См указание к решению предыдущей задачи.

1.412. В цилиндрической системе координат, ось которой направлена по оси цилиндра, векторный потенциал $\mathbf{A} = A(r, z) \mathbf{e}_\varphi$, где скалярная функция $A(r, z)$ — решение задачи

$$\begin{aligned}\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial A}{\partial r} - \frac{A}{r^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial z^2} &= 0, \quad 0 < r < r_0, \quad r_0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad -\infty < z < \infty, \\ A|_{r_0+0} - A|_{r_0-0} &= 0, \quad \frac{\partial A}{\partial r}\Big|_{r_0+0} - \frac{\partial A}{\partial r}\Big|_{r_0-0} = -\frac{4\pi}{c}i(z), \quad |A(r, z)| < \infty.\end{aligned}$$

У к а з а н и е. Так как $\mathbf{e}_\varphi = \mathbf{e}_x \sin \varphi + \mathbf{e}_y \cos \varphi$, то $\frac{d^2 \mathbf{e}_\varphi}{d\varphi^2} = -\mathbf{e}_\varphi$; см. также указание к решению задачи 1.410.

1.413. В полярной системе координат векторный потенциал $\mathbf{A} = A(r) \mathbf{e}_\varphi$, где $A(r)$ — решение задачи

$$\begin{aligned}\frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{dA}{dr} - \frac{A}{r^2} &= -\frac{4\pi}{c} \rho \omega r, \quad 0 < r < r_0, \\ \frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{dA}{dr} - \frac{A}{r^2} &= 0, \quad r_0 < r, \\ A|_{r_0+0} - A|_{r_0-0} &= 0, \quad \frac{dA}{dr}\Big|_{r_0+0} - \frac{dA}{dr}\Big|_{r_0-0} = 0, \quad |A(r)| < \infty.\end{aligned}$$

См. указание к предыдущей задаче.

1.414. В цилиндрической системе координат, ось Oz которой направлена по оси цилиндра, плотность тока $\mathbf{i} = J\delta(z)\mathbf{e}_\varphi$, потенциал $\mathbf{A} = A(r, z) \mathbf{e}_\varphi$,

где скалярная функция $A(r, z)$ — решение задачи

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial A}{\partial r} - \frac{A}{r^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial z^2} = 0, \quad 0 < r < r_0, \quad r_0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad -\infty < z < \infty,$$

$$A|_{r_0+0} - A|_{r_0-0} = 0, \quad \frac{1}{r} \frac{\partial(rA)}{\partial r} \Big|_{r_0+0} - \frac{1}{\mu r} \frac{\partial(rA)}{\partial r} \Big|_{r_0-0} = \frac{4\pi J}{c} \delta(z), \quad |A(r, z)| < \infty,$$

$$A(r, z) = \mathcal{O}(1), \quad r \rightarrow 0, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} A(r, z) = 0.$$

У к а з а н и е. Напряженность магнитного поля $\mathbf{dH}(M)$ в точке M , обусловленная элементарным током $\mathbf{dJ} = i\mathbf{dl}$, расположенным в точке P , определяется законом Био и Савара:

$$\mathbf{dH} = \frac{i}{c} \frac{[\mathbf{dJ} \mathbf{r}_{PM}]}{r_{PM}^3}.$$

Так как

$$\frac{[\mathbf{dJ} \mathbf{r}_{PM}]}{r_{PM}^3} = -[\mathbf{dJ} \nabla_M \frac{1}{r_{PM}}] = [\nabla_M \frac{1}{r_{PM}} \mathbf{dJ}] = \text{rot}_M \frac{\mathbf{dJ}}{r_{PM}},$$

то магнитное поле ограниченного замкнутого контура L с током J запишется в виде

$$\mathbf{H} = \frac{J}{c} \int_L \text{rot} \frac{\mathbf{dl}}{r_{PM}} = \text{rot} \left(\frac{J}{c} \int_L \frac{d\mathbf{l}}{r_{PM}} + \mathbf{A}_0 \right) = \text{rot} \mathbf{A},$$

где $\mathbf{A} = \int_L \frac{d\mathbf{l}}{r_{PM}} + \mathbf{A}_0$, $\mathbf{A}_0$ — постоянный вектор. Так как контур L ограничен то интегральное слагаемое стремится к нулю при $M \rightarrow \infty$, поэтому для постоянных токов в ограниченных областях можно принять $\mathbf{A}_0 = 0$, т.е. в $\mathbb{R}^3$ векторный потенциал ограниченной системы токов равен нулю на бесконечности (аналогично нормирован на бесконечности в трехмерном пространстве скалярный потенциал электростатического поля ограниченной системы зарядов). См. также указания к решению задач 1.410, 1.412.

1.415. В цилиндрической системе координат, ось Oz которой направлена по оси цилиндра, векторный потенциал $\mathbf{A} = A(r, \varphi) \mathbf{e}_z$, где функция $A(r, \varphi)$ — решение задачи

$$\Delta A = -\frac{4\pi J}{c} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{d}), \quad \Delta A = 0,$$

$$0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad r_0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$A|_{r_0-0} = A|_{r_0+0}, \quad \frac{1}{\mu_1} \frac{\partial A}{\partial r} \Big|_{r_0-0} = \frac{1}{\mu_2} \frac{\partial A}{\partial r} \Big|_{r_0+0},$$

$$|A|_{r \neq d} < \infty, \quad A = O(\ln r), \quad r \rightarrow \infty.$$

1.416. В цилиндрической системе координат, ось Oz которой направлена по оси цилиндра, векторный потенциал магнитного поля $\mathbf{A} = A(r, \varphi) \mathbf{e}_z$, где $A(r, \varphi)$ — решение задачи

$$\Delta A = -\frac{4\pi J}{c} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{d}), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$|A|_{r \neq d} < \infty, \quad \frac{\partial A}{\partial r} \Big|_{r=r_0} = -\frac{2J}{cr_0}.$$

Р е ш е н и е (фрагмент). Поле $\mathbf{H}_1$ в полости ограничено; из граничного условия для нормальной компоненты вектора магнитной индукции (непрерывность на границе раздела двух сред) следует, что на замкнутом контуре L (L — поперечное сечение цилиндрической поверхности) выполняется условие $\mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}$. Отсюда вытекает, что при $\mu_2 = \infty$ нормальная составляющая

$H_{2n} = 0$ на L . Это означает, что L — силовая линия магнитного поля $\mathbf{H}_2$. Так как L — окружность, то поле с такой силовой линией эквивалентно полю некоторого тока J_1 , параллельного оси цилиндра и проходящего через центр окружности. Из теоремы Стокса вытекает, что этот ток равен току J , поэтому $H_2(r_0) = \frac{2J}{cr_0}$ и, следовательно, $H_{1\tau}(r_0) = \frac{2J}{cr_0}$.

1.417. В цилиндрической системе координат, ось Oz которой — ось цилиндра, векторный потенциал $\mathbf{A} = A(r, \varphi) \mathbf{e}_z$, где $A(r, \varphi)$ — решение задачи

$$\Delta A = \frac{4\pi J}{c} [\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_2) - \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_1)], \quad 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$\left. \frac{\partial A}{\partial r} \right|_{r=r_0} = 0, \quad |A|_{\mathbf{r} \neq \mathbf{r}_{1,2}} < \infty.$$

У к а з а н и е. Линия L (см. предыдущую задачу) — силовая линия поля $\mathbf{H}_2$, циркуляция вдоль которой равна нулю.

1.418. В цилиндрической системе координат, ось которой направлена по оси цилиндра, ток $\mathbf{J} = J\mathbf{e}_z$, векторный потенциал $\mathbf{A} = A(r, \varphi) \mathbf{e}_z$, где функция $A(r, \varphi)$ — решение задачи:

$$\Delta A = -\frac{4\pi J}{c} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{d}), \quad r_0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$\left. \frac{\partial A}{\partial r} \right|_{r_0=0} = 0, \quad A(r, \varphi) = \mathcal{O}(\ln r), \quad r \rightarrow \infty.$$

У к а з а н и е. Из ограниченности $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ следует, что при $\mu = \infty$ в цилиндре магнитное поле $\mathbf{H} = 0$.

1.419. 1. В цилиндрической системе координат, ось которой проходит через центр витка перпендикулярно к его плоскости, поверхностная плотность тока $\mathbf{i} = J\delta(r - r_0)\mathbf{e}_\varphi$, векторный потенциал $\mathbf{A} = A(r, \theta) \mathbf{e}_\varphi$, где скалярная функция $A(r, \theta)$ — решение краевой задачи

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial A}{\partial r} - \frac{1}{r^2} A + \frac{\partial^2 A}{\partial z^2} = 0, \quad 0 < r < r_0, \quad r_0 < r, \quad 0 < z < \infty,$$

$$A|_{z=-0} - A|_{z=+0} = 0, \quad -\frac{1}{\mu} \left. \frac{\partial A}{\partial z} \right|_{z=-0} + \left. \frac{\partial A}{\partial z} \right|_{z=+0} = \frac{4\pi J}{c} \delta(r - r_0),$$

$$A = \mathcal{O}(1), \quad r \rightarrow 0, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} A = 0.$$

2. В сферической системе координат, ось Oz которой перпендикулярна к плоскости витка и проходит через его центр, потенциал $\mathbf{A} = A(r, \theta) \mathbf{e}_\varphi$, где функция $A(r, \theta)$ — решение задачи

$$\frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial A}{\partial r} + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial A}{\partial \theta} - \frac{A}{\sin^2 \theta} = 0,$$

$$0 < r < r_0, \quad r_0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$A|_{\theta=\frac{\pi}{2}+0} - A|_{\theta=\frac{\pi}{2}-0} = 0, \quad \left. \frac{\partial A}{\partial \theta} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}+0} - \frac{1}{\mu} \left. \frac{\partial A}{\partial \theta} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}-0} = \frac{4\pi J}{c} \delta(r - r_0),$$

$$A(r, \theta) = \mathcal{O}(1), \quad r \rightarrow 0, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} A = 0.$$

См. указания к задачам 1.410, 1.412.

1.420. В прямоугольной системе координат потенциал $\mathbf{A} = A(x, y) \mathbf{e}_z$, где $A(x, y)$ — решение задачи

$$\begin{aligned}\Delta A &= -\frac{4\pi J}{c} \delta(x) \cdot \delta(y-h), & \Delta A &= 0, \\ -\infty < x < 0, & y > 0, & -\infty < x < \infty, & y < 0, \\ A|_{y=-0} &= A|_{y=+0}, & \frac{1}{\mu} \frac{\partial A}{\partial y} \Big|_{y=-0} &= \frac{\partial A}{\partial y} \Big|_{y=+0}, \\ A &= O(\ln r), & r &= \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow \infty.\end{aligned}$$

1.421. В прямоугольной системе координат потенциал $\mathbf{A} = A(x, y) \mathbf{e}_z$, где скалярная функция $A(x, y)$ — решение задачи

$$\begin{aligned}\Delta A &= -\frac{4\pi J}{c} \delta(x) \cdot \delta(y), & \Delta A &= 0, \\ -\infty < x < \infty, & -h < y < h, & \infty < x < \infty, & h < |y|, \\ A(x, h-0) &= A(x, h+0), & A(x, -h+0) &= A(x, -h-0), \\ \frac{\partial A}{\partial y} \Big|_{y=h-0} &= \mu \frac{\partial A}{\partial y} \Big|_{y=h+0}, & \frac{\partial A}{\partial y} \Big|_{y=-h+0} &= \mu \frac{\partial A}{\partial y} \Big|_{y=-h-0}, \\ A(x, y) &= O(\ln r), & r &= \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow \infty.\end{aligned}$$

1.422. В цилиндрической системе координат, ось которой совпадает с ребром двугранного угла, векторный потенциал $\mathbf{A} = A(r, \varphi) \mathbf{e}_z$, где функция $A(r, \varphi)$ — решение задачи

$$\begin{aligned}\Delta A &= -\frac{4\pi J}{c} \frac{\delta(r-r_0)}{r_0} \cdot \delta(\varphi - \varphi_0), & 0 < r, & 0 < \varphi < \alpha, \\ A &= O(1), & r \rightarrow 0, & \frac{\partial A}{\partial \varphi} \Big|_{\varphi=0} = \frac{\partial A}{\partial \varphi} \Big|_{\varphi=\alpha} = 0, & \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{A}{\ln r} = -\frac{4\pi J}{c\alpha}.\end{aligned}$$

См. указание к задаче 1.418.

1.423. В сферической системе координат, центр которой совпадает с центром витка, линейная плотность тока $\mathbf{i} = J \frac{\delta(r-r_0)}{r} \cdot \delta\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)$, векторный потенциал магнитного поля $\mathbf{A} = A(r, \theta) \mathbf{e}_\varphi$, где скалярная функция $A(r, \theta)$ — решение краевой задачи

$$\begin{aligned}\Delta \mathbf{A} &= -\mathbf{e}_\varphi \frac{4\pi J}{c} \frac{\delta(r-r_1)}{r} \cdot \frac{\delta\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)}{\sin \theta}, \\ A &= O(1), & r \rightarrow 0, & \lim_{r \rightarrow \infty} A = 0.\end{aligned}$$

См. указание к задаче 1.412.

1.424. В сферической системе координат, начало которой в центре сферы, а ось Oz перпендикулярна к плоскости витка, магнитное поле определяется векторным потенциалом $\mathbf{A} = A(r, \theta) \mathbf{e}_\varphi$, где скалярная функция $A(r, \theta)$ — решение краевой задачи

$$\begin{aligned}\Delta \mathbf{A} &= -\mathbf{e}_\varphi \frac{4\pi J}{c} \frac{\delta(r-r_1)}{r} \cdot \frac{\delta\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)}{\sin \theta}, & \Delta \mathbf{A} &= 0, \\ 0 < r < r_0, & 0 < \theta < \pi, & 0 \leq \varphi < 2\pi, & r_0 < r, & 0 < \theta < \pi, & 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ A &= O(1), & r \rightarrow 0, & \lim_{r \rightarrow \infty} A = 0, \\ A|_{r_0-0} &= A|_{r_0+0}, & \frac{\partial(rA)}{\partial r} \Big|_{r_0-0} &= \frac{1}{\mu_0} \frac{\partial(rA)}{\partial r} \Big|_{r_0+0}.\end{aligned}$$

См. указание к задаче 1.412.

1.425. В сферических координатах векторный потенциал $\mathbf{A} = A(r, \theta) \mathbf{e}_\varphi$, где функция $A(r, \theta)$ — решение задачи

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial A}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial A}{\partial \theta} - \frac{A}{r^2 \sin^2 \theta} = -\frac{4\pi J}{c} \frac{\delta(r-r_1)}{r} \cdot \delta\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right),$$

$$r_0 < r, \quad 0 < \theta < \pi,$$

$$\left. \frac{\partial(rA)}{\partial r} \right|_{r=r_0} = 0, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} A = 0.$$

См. указание к задаче 1.412.

1.426. В сферических координатах векторный потенциал $\mathbf{A} = A(r, \theta) \mathbf{e}_\varphi$, где функция $A(r, \theta)$ — решение задачи

$$\frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial A}{\partial r} + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial A}{\partial \theta} - \frac{A}{\sin^2 \theta} = 0,$$

$$r_0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$A|_{r=r_0+0} - A|_{r=r_0-0} = 0, \quad \left. \frac{\partial A}{\partial r} \right|_{r=r_0+0} - \left. \frac{\partial A}{\partial r} \right|_{r=r_0-0} = \frac{4\pi r_0 i(\theta)}{c},$$

$$A = O(1), \quad r \rightarrow 0, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} A = 0.$$

См. указание к задаче 1.412.

1.427. В сферической системе координат векторный потенциал $\mathbf{A} = A(r, \theta) \mathbf{e}_\varphi$, где функция $A(r, \theta)$ — решение задачи 1.426, в которой плотность тока $i(\theta) = \sigma \omega r_0 \sin \theta$.

1.428. В сферической системе координат, начало которой находится в центре шара, а ось Oz направлена по оси вращения, вектор $\mathbf{A} = A(r, \theta) \mathbf{e}_\varphi$, где функция $A(r, \theta)$ — решение задачи

$$\frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial A}{\partial r} + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial A}{\partial \theta} - \frac{A}{\sin^2 \theta} = -\frac{4\pi}{c} \rho \omega \sin \theta,$$

$$r < r_0, \quad 0 < \theta < \pi,$$

$$\frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial A}{\partial r} + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial A}{\partial \theta} - \frac{A}{\sin^2 \theta} = 0,$$

$$r_0 < r, \quad 0 < \theta < \pi,$$

$$A|_{r=r_0+0} - A|_{r=r_0-0} = 0, \quad \left. \frac{\partial A}{\partial r} \right|_{r=r_0-0} = \left. \frac{\partial A}{\partial r} \right|_{r=r_0+0},$$

$$A = O(1), \quad r \rightarrow 0, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} A = 0.$$

См. указание к задаче 1.412.

1.429. В сферической системе координат $\mathbf{A} = A(r, \theta) \mathbf{e}_\varphi$, где скалярная функция $A(r, \theta)$ — решение задачи

$$\frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial A}{\partial r} + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial A}{\partial \theta} - \frac{A}{\sin^2 \theta} = 0,$$

$$0 < r < r_0, \quad r_0 < r, \quad 0 < \theta < \pi,$$

$$A|_{r=r_0+0} - A|_{r=r_0-0} = 0, \quad \left. \frac{1}{r} \frac{\partial A}{\partial r} \right|_{r=r_0+0} - \left. \frac{1}{r} \frac{\partial A}{\partial r} \right|_{r=r_0-0} = \frac{4\pi J}{c} \frac{\delta(\theta - \theta_0)}{r_0},$$

$$A = O(1), \quad r \rightarrow 0, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} A = 0.$$

1.430. $\operatorname{rot} \mathbf{H} = 0, \quad \operatorname{div} \mathbf{H} = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad y \neq 0,$

$$H_y|_{y=+0} - H_y|_{y=-0} = 0, \quad H_x|_{y=+0} - H_x|_{y=-0} = -\frac{4\pi J}{c} \delta(x),$$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \mathbf{H}(\mathbf{r}) = 0.$$

См. указания к решению задачи 1.410.

1.431. 1. Магнитное поле $\mathbf{H}(x, y) = H_x(x, y)\mathbf{e}_x + H_y(x, y)\mathbf{e}_y$ равно нулю вне зазора, а в зазоре

$$\begin{aligned} \Delta H_x(x, y) &= -\frac{4\pi J}{c}\delta(x) \cdot \delta'(y - y_0), & \Delta H_y(x, y) &= \frac{4\pi J}{c}\delta'(x) \cdot \delta(y - y_0), \\ -\infty < x < \infty, \quad 0 < y < h, & -\infty < x < \infty, \quad 0 < y < h, \\ H_x(x, 0) = H_x(x, h) &= 0, & \frac{\partial H_y}{\partial y}\Big|_{y=0} &= \frac{\partial H_y}{\partial y}\Big|_{y=h} = 0, \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} H_x(x, y) &= 0, & \lim_{x \rightarrow \pm\infty} H_x(x, y) &= \pm \frac{2\pi J}{ch}. \end{aligned}$$

2. Векторный потенциал $\mathbf{A}(x, y) = A(x, y)\mathbf{e}_z$, где скалярная функция $A(x, y)$ — решение задачи

$$\begin{aligned} \Delta A &= -\frac{4\pi J}{c}\delta(x) \cdot \delta(y - y_0), \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < y < h, \\ \frac{\partial A}{\partial y}\Big|_{y=0} &= \frac{\partial A}{\partial y}\Big|_{y=h} = 0, \quad \lim_{|x| \rightarrow \infty} \frac{A(x, y)}{|x|} = -\frac{2\pi J}{ch}. \end{aligned}$$

У к а з а н и я. 1. Граничные условия для H_y вытекают из уравнения $\operatorname{div} \mathbf{H} = 0$ и из граничных условий для H_x (см. указание к задаче 1.412). При $|x| \rightarrow \infty$ составляющая H_x магнитного поля стремится к нулю, поэтому циркуляция вектора $\mathbf{H}$ по окружности достаточно большого радиуса с центром в начале координат равна $\Gamma = 2hH_y = \frac{4\pi J}{c}$. 2. Уравнение и граничные условия для $A(x, y)$ получены в примере 1.24, поведение на бесконечности следует из соотношения $\frac{\partial A}{\partial y} = -H_y(x, y)$.

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(x, y) &= \begin{cases} \mathbf{H}_1(x, y), & (x, y) \in \Omega, \\ \mathbf{H}_2(x, y), & (x, y) \notin \Omega, \end{cases} \\ \operatorname{rot} \mathbf{H} &= 0, \quad \operatorname{div} \mathbf{H} = 0, \quad (x, y) \notin S, \\ H_{2n}|_S - H_{1n}|_S &= 0, \quad H_{2\tau}|_S - H_{1\tau}|_S = -\frac{4\pi NJ}{c}, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} \mathbf{H}_2(\mathbf{r}) = 0, \end{aligned}$$

$\mathbf{e}_\tau$ и $\mathbf{e}_n$ — единичные векторы, соответственно, касательной и внешней нормали к S ; при этом единичный вектор тока $\mathbf{e}_i$, вектор $\mathbf{e}_n$ и вектор $\mathbf{e}_\tau$ взаимно ортогональны и образуют правую тройку. (См. указание к задаче 1.410). В частном случае круглого соленоида

$$\mathbf{H} = \operatorname{rot} \mathbf{A}, \quad \mathbf{A} = A(r)\mathbf{e}_\varphi,$$

где функция $A(r)$ — решение задачи для обыкновенного дифференциального уравнения

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{dA}{dr} - \frac{A}{r^2} &= -\frac{4\pi NJ}{c}\delta(r - r_0), \\ A(r) &= O(1), \quad r \rightarrow 0, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} A(r) = 0. \end{aligned}$$

1.433. $\mathbf{j} = -\nabla u$, u — решение задачи:

$$\begin{aligned} \Delta u &= 0, & \Delta u &= -\frac{J}{c}\delta(\mathbf{r} - \mathbf{d}), \\ 0 < r < r_0, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, & r_0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ |u| < \infty, & \lim_{r \rightarrow \infty} u &= 0, \\ u|_{r=r_0+0} &= u|_{r=r_0-0}, \quad \sigma_2 \frac{\partial u}{\partial r}\Big|_{r=r_0+0} &= \sigma_1 \frac{\partial u}{\partial r}\Big|_{r=r_0-0}. \end{aligned}$$

У к а з а н и е. Условия на поверхности шара (т.е. при $r = r_0$) выражают непрерывность потенциала $u(\mathbf{r})$ электростатического поля и закон сохранения заряда соответственно.

1.434. $\mathbf{j} = -\nabla u$, u — решение задачи:

$$\begin{aligned} \Delta u &= -\frac{J}{c} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{d}), & \Delta u &= 0, \\ 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, & r_0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ \left| u - \frac{J}{2\pi} \ln \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{d}|} \right| < \infty, \quad |u| < \infty, & u(r, \varphi) = O(\ln r), \quad r \rightarrow \infty, \\ u|_{r=r_0+0} &= u|_{r=r_0-0}, \quad \sigma_2 \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=r_0+0} = \sigma_1 \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=r_0-0}. \end{aligned}$$

1.435. $\mathbf{j} = -\sigma \nabla u$,

$$\begin{aligned} \Delta u(\mathbf{r}) &= -\frac{J}{\sigma} \delta(\mathbf{r}) \quad \text{в цилиндре,} \\ -\frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=r_0} &= -\frac{1}{\sigma} f(\varphi), \quad r_0 \int_0^{2\pi} f ds = J - \text{условие разрешимости.} \end{aligned}$$

1.436. $\mathbf{j}(x, y) = -\sigma \nabla u(x, y)$,

$$\begin{aligned} \Delta u &= 0, \quad 0 < x, \quad -H < y < H, \\ \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=-H} &= \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=H} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = -\frac{J}{\sigma}, \quad u(x, y) = O(\ln x), \quad x \rightarrow +\infty. \end{aligned}$$

1.437. $\mathbf{j}(x, y) = -\sigma \nabla u(x, y)$,

$$\begin{aligned} \Delta u &= -\frac{J}{\sigma} \delta(x) \cdot \delta(y - y_0), \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < y < H, \\ \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=0} &= \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=H} = 0, \quad u(x, y) = O(x), \quad x \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

1.438. $\Delta u = 0$, $|x| < l_1$, $|y| < l_2$,

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=\pm l_1} = -\frac{J}{\sigma h} \delta(y), \quad \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=\pm l_2} = 0.$$

1.439. $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} = 0$, $0 < r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$,

$$|u|_{r=0} < \infty, \quad \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=r_0} = -\frac{J}{\sigma r_0} (\delta(\varphi) - \delta(\varphi - \pi)).$$

1.440. $\mathbf{j} = -\sigma \nabla u$, скалярный потенциал $u(x, y)$ — решение задачи

$$\begin{aligned} \Delta u &= 0, \quad 0 < x < l, \quad 0 < y < l - x, \\ u(0, y) &= u(x, 0) = 0, \quad \frac{\sigma}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) \Big|_{x+y=l} = j_0. \end{aligned}$$

1.441. $\Delta u = -\frac{J}{\pi \sigma} \frac{\delta(r)}{r}$, $0 < r < r_0$, $0 < \varphi < \pi$,

$$\frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=r_0} = -\frac{J}{\sigma r_0} \delta\left(\varphi - \frac{\pi}{2}\right), \quad \frac{\partial u}{\partial \varphi} \Big|_{\varphi=0} = \frac{\partial u}{\partial \varphi} \Big|_{\varphi=\pi} = 0.$$

У к а з а н и е. Уравнение для электростатического потенциала вытекает из системы уравнений

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = 0, \quad \mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}, \quad \operatorname{div} \mathbf{j} = q,$$

где q — объемная плотность источников тока (последнее уравнение есть следствие закона сохранения (1.33)).

$$1.442. \Delta u = 0, \quad 0 < r, \quad 0 < \varphi < \alpha < 2\pi, \\ -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \Big|_{\varphi=0} = \frac{J}{\sigma d} \delta(r-a), \quad -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \Big|_{\varphi=\alpha} = \frac{J}{\sigma d} \delta(r-b), \quad |u| < \infty.$$

$$1.443. \Delta u = 0, \quad 0 < r < 0, \quad 0 < \varphi < \alpha < 2\pi, \\ \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \Big|_{\varphi=0} = -\frac{J}{\sigma d} \delta(r-a) + \frac{J}{\sigma d} \delta(r-b), \quad |u| < \infty.$$

$$1.444. \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = -\frac{J}{\sigma} \frac{\delta(r-r_1)}{r_1} \cdot [\delta(\varphi) - \delta(\varphi - \pi)], \\ 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ |u|_{r=0} < \infty, \quad \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=r_0} = 0.$$

$$1.445. \Delta u = 0, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad |z| < l, \\ |u|_{r=0} < \infty, \quad \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=r_0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{z=\pm l} = -\frac{J}{\sigma} \frac{\delta(r)}{2\pi r}.$$

$$1.446. \Delta u = 0, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad |z| < \infty, \\ |u|_{r=0} < \infty, \quad \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=r_0} = \frac{J}{\sigma r_0} (\delta(\varphi) - \delta(\varphi - \pi)) \cdot \delta(z).$$

$$1.447. \mathbf{j} = -\sigma \nabla u, \\ \Delta u = 0, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ |u|_{r=0} < \infty, \quad \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=r_0} = \frac{J}{\sigma r_0^2} \left[\frac{\delta\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) \cdot \delta(\varphi)}{\sin \theta} - \frac{\delta(\theta)}{2\pi \sin \theta} \right].$$

$$1.448. \Delta u = 0, \quad r < r_0, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=r_0} = -\frac{J}{2\pi r_0^2 \sigma} \frac{\delta(\theta)}{\sin \theta}, \quad \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \Big|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = \frac{J}{2\pi \sigma} \frac{\delta(r)}{r}.$$

1.449. Решение (фрагменты.) Потенциал электрического поля между электродами удовлетворяет уравнению Пуассона,

$$u''(z) = 4\pi en(z),$$

в котором $n(z)$ — концентрация электронов. Согласно закону сохранения энергии электрона

$$\frac{mv^2(z)}{2} = eu(z).$$

Объемная плотность тока $\mathbf{j} = -env(z)\mathbf{e}_z$ связана с объемной плотностью $\rho(z)$ заряда законом сохранения (1.34)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \operatorname{div} \mathbf{j},$$

откуда следует (в силу стационарности), что $\mathbf{j} = j\mathbf{e}_z$, где $j = \text{const}$. Уравнение для потенциала получается исключением величин $\rho(z)$, $n(z)$, $v(z)$ из приведенных уравнений.

$$1.450. \frac{1}{r_0^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < z, \\ \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{z=0} = -\frac{J}{\sigma r_0} \delta(\varphi - \varphi_0), \quad \frac{\partial u}{\partial z} = O(1), \quad z \rightarrow \infty.$$

$$1.451. \frac{1}{r_0^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -\frac{J}{\sigma r_0} \delta(\varphi) \cdot \delta(z), \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad -\infty < z < \infty, \\ u(\varphi, z) = O(z), \quad z \rightarrow \infty.$$

$$\mathbf{1.452.} \quad \frac{1}{r_0^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -\frac{J}{\sigma r_0} \delta(\varphi) \cdot \delta(z), \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad -\infty < z < \infty,$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_{\varphi=0} = \left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_{\varphi=\pi} = 0, \quad u(\varphi, z) = O(z), \quad z \rightarrow \infty.$$

$$\mathbf{1.453.} \quad \frac{1}{r_0^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -\frac{J}{\sigma r_0} \delta(z) \cdot \delta\left(\varphi - \frac{\pi}{2}\right), \quad -l < z < l, \quad 0 < \varphi < \pi,$$

$$u(z, 0) = u(z, \pi) = 0, \quad u_z(\pm l, \varphi) = 0,$$

$$\mathbf{i} = -\sigma \left(\frac{\mathbf{e}_\varphi}{r_0} \frac{\partial u}{\partial \varphi} + \mathbf{e}_z \frac{\partial u}{\partial z} \right). \quad (1.168)$$

$$\mathbf{1.454.} \quad \frac{1}{r_0^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -\frac{J}{\sigma r_0} \delta(z) \cdot \delta\left(\varphi - \frac{\pi}{2}\right), \quad -\infty < z < \infty, \quad 0 < \varphi < \pi,$$

$$u(z, 0) = u(z, \pi) = 0, \quad u(z, \varphi) = O(1), \quad z \rightarrow \infty.$$

Плотность тока выражается формулой (1.168).

$$\mathbf{1.455.} \quad \frac{1}{r_0^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < z < l,$$

$$u|_{z=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_{z=l} = \frac{J}{\sigma r_0} \delta(\varphi).$$

Плотность тока выражается формулой (1.168).

1.456. Плотность тока

$$\mathbf{i} = -\sigma \left(\mathbf{e}_\theta \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{\mathbf{e}_\varphi}{\sin \theta} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right), \quad (1.169)$$

где u — решение задачи

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = -\frac{J}{\sigma} \left[\frac{\delta(\theta)}{\sin \theta} - \frac{\delta(\theta - \frac{\pi}{2})}{\sin \theta} \right] \cdot \frac{\delta(\varphi)}{2\pi},$$

$$0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$\mathbf{1.457.} \quad \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = -\frac{J}{2\pi \sin \theta} \delta(\theta), \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \theta} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = -\frac{J}{\sigma} \delta(\varphi).$$

Плотность тока выражается формулой (1.169).

$$\mathbf{1.458.} \quad \mathbf{H} = (0, 0, H_z), \quad \mathcal{H}_{xx} - 2ip^2 \mathcal{H} = 0, \quad -l < x < l, \quad p^2 = \frac{2\pi\mu\sigma\omega}{c^2},$$

$$H_z(x, t) = \mathcal{H}(x) e^{i\omega t}, \quad \mathcal{H}(-l) = \mathcal{H}(l) = \mathcal{H}_0.$$

$$\mathbf{1.459.} \quad \mathbf{j} = (0, j_\varphi, 0), \quad j_\varphi = \frac{c}{4\pi} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial r} e^{i\omega t}, \quad \mathbf{H} = (0, 0, H_z), \quad H_z(r, t) = \mathcal{H}(r) e^{i\omega t},$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial r} - 2ip^2 \mathcal{H} = 0, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad p^2 = \frac{2\pi\mu\sigma\omega}{c^2},$$

$$|\mathcal{H}| < \infty, \quad \mathcal{H}|_{r=r_0} = \mathcal{H}_0.$$

$$\mathbf{1.460.} \quad \mathbf{H} = H(r, t) \mathbf{e}_z,$$

$$H_t = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial H}{\partial r}, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t,$$

$$|H| < \infty, \quad H(r_0, t) = H_0, \quad H(r, 0) = 0, \quad a^2 = \frac{c^2}{4\pi\sigma\mu}.$$

$$1.461. \mathbf{H} = H(z, t) \mathbf{e}_x,$$

$$H_t = a^2 \frac{\partial^2 H}{\partial z^2}, \quad 0 < z, \quad 0 < t, \quad a^2 = \frac{c^2}{4\pi\sigma\mu},$$

$$|H| < \infty, \quad H(z, 0) = 0, \quad H(0, t) = H_0.$$

$$1.462. j(z, t) = \sigma \mathcal{E}(z) e^{i\omega t},$$

$$\frac{d^2 \mathcal{E}}{dz^2} - 2ip^2 \mathcal{E} = 0, \quad 0 < z,$$

$$\left. \frac{d\mathcal{E}}{dz} \right|_{z=0} = -\frac{2ip^2 J}{\sigma}, \quad |\mathcal{E}(z)| < \infty, \quad p^2 = \frac{2\pi\mu\sigma\omega}{c^2}.$$

Решение. В данном случае $\mathbf{j} = j_0(z) e^{i\omega t}$, $\mathbf{E} = \mathcal{E}(z) e^{i\omega t}$, $\mathbf{H} = \mathcal{H}(z) e^{i\omega t}$. Так как токами смещения можно пренебречь, то (см. (1.109), (1.110))

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \mathcal{E} &= -\frac{i\omega\mu}{c} \mathcal{H}, \\ \operatorname{rot} \mathcal{H} &= \frac{4\pi}{c} j_0, \quad j_0 = \sigma \mathcal{E}. \end{aligned} \quad (1.170)$$

Подстановка $\mathcal{E} = \mathcal{E}(z) \mathbf{e}_x$ в первое уравнение системы (1.170) дает

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}(z) \mathbf{e}_y = \frac{ic}{\mu\omega} \frac{d\mathcal{E}(z)}{dz} \mathbf{e}_y. \quad (1.171)$$

Пусть $\Pi = (y_0 < y < y_0 + 1, 0 < z < \infty)$, где y_0 — любое число. По условию $\int_{\Pi} j_0 ds = J$. Следовательно, $j_0(z) = \mathcal{E}(z)/\sigma \rightarrow 0$ при $z \rightarrow \infty$. Так как $\mathcal{E}(z) \rightarrow 0$ монотонно, то согласно (1.171) $\mathcal{H}(\infty) = 0$. По теореме Стокса

$$\frac{4\pi}{c} \int_{\Pi} (j_0 \mathbf{e}_x) ds = \int_{\Pi} (\operatorname{rot} \mathcal{H} \mathbf{e}_x) ds = \int_{\partial\Pi} \mathcal{H}_l dl = \mathcal{H}(0),$$

что приводит к граничному условию

$$\mathcal{H}(0) = \frac{4\pi}{c} J = \frac{ic}{\mu\omega} \left. \frac{d\mathcal{E}}{dz} \right|_{z=0}.$$

Уравнение для $\mathcal{E}(z)$ есть результат исключения j_0 и $\mathcal{H}$ из системы (1.170).

$$1.463. j(z, t) = \sigma \mathcal{E}(z) e^{i\omega t}, \quad \frac{d^2 \mathcal{E}}{dz^2} - 2ip^2 \mathcal{E} = 0, \quad |z| < l,$$

$$\left. \frac{d\mathcal{E}}{dz} \right|_{z=0} = -\frac{ip^2 J}{\sigma}, \quad p^2 = \frac{2\pi\mu\sigma\omega}{c^2}.$$

$$1.464. j = \sigma \mathcal{E} e^{i\omega t}, \quad \Delta \mathcal{E} - 2p^2 i \mathcal{E} = 0, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$\left. \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial r} \right|_{r=r_0} = i \frac{p^2 J}{\sigma r_0}, \quad |\mathcal{E}| < \infty, \quad p^2 = \frac{2\pi\mu\sigma\omega}{c^2}.$$

$$1.465. 2. \quad \begin{aligned} \frac{\partial n}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(nv) &= 0, \\ \frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} &= E, \\ E + \frac{1}{n_e} \frac{\partial n_e}{\partial x} &= 0, \\ \frac{\partial E}{\partial x} &= n - n_e. \end{aligned} \quad (1.172)$$

3. При $n = n_e$ (в безразмерных переменных) система (1.172) сводится к следующим двум уравнениям:

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(nv) = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{1}{n} \frac{\partial n}{\partial x} = 0. \quad (1.173)$$

У к а з а н и е. Первое уравнение системы (1.172) представляет собой закон сохранения ионов (уравнение непрерывности). Последнее уравнение имеет вид $\operatorname{div} \mathcal{E} = -4\pi\rho$ (уравнение Пуассона). Второе уравнение выражает второй закон Ньютона для ионов; из этого уравнения, а также из аналогичного уравнения для электронов

$$n_e m_e \frac{dv_e}{dt} = -en_e E - \frac{\partial p_e}{\partial x}$$

и из условия равенства нулю плотности тока $j = e(Znv - n_e v_e)$ вытекает (с учетом малости m_e/m) третье уравнение системы.

1.466.

$$\begin{aligned} \frac{\partial n}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(nv) &= 0, \\ \frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{1}{n} \frac{\partial n}{\partial x} &= -E, \\ \frac{\partial E}{\partial x} &= 1 - n. \end{aligned} \quad (1.174)$$

1.467. У к а з а н и е. При $n = 1 + \varphi$, $n_e = 1 + \varphi_e$, $|\varphi| \ll 1$, $|\varphi_e| \ll 1$ из линеаризованной системы (1.172) следует, что φ удовлетворяет уравнению $\varphi_{ttxx} + \varphi_{xx} - \varphi_{tt} = 0$, решением которого является

$$\varphi_0^{i(kx - \omega t)}, \quad \omega = k(1 + k^2)^{-1/2}.$$

Замена переменных $\xi = \varepsilon^\mu(x - t)$, $\tau = \varepsilon^{3\mu}t$ (пример 1.9) преобразует систему (1.172) к виду

$$\begin{aligned} \varepsilon^{3\mu} \frac{\partial n}{\partial \tau} - \varepsilon^\mu \frac{\partial n}{\partial \xi} + \varepsilon^\mu \frac{\partial}{\partial \xi}(nv) &= 0, \\ \varepsilon^{3\mu} \frac{\partial v}{\partial \tau} - \varepsilon^\mu \frac{\partial v}{\partial \xi} + \varepsilon^\mu v \frac{\partial v}{\partial \xi} &= E, \\ n_e E + \varepsilon^\mu \frac{\partial n_e}{\partial \xi} &= 0, \\ \varepsilon^\mu \frac{\partial E}{\partial \xi} &= n - n_e. \end{aligned} \quad (1.175)$$

Решение системы должно удовлетворять условиям

$$n \rightarrow 1, \quad n_e \rightarrow 1, \quad v \rightarrow 0, \quad E \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad |\xi| \rightarrow \infty,$$

поэтому разложения по малому параметру ε , применяемые в теории возмущений, будут иметь вид

$$\begin{aligned} n &= 1 + \varepsilon n_1 + \varepsilon^2 n_2 + \dots, \\ n_e &= 1 + \varepsilon n_{e1} + \varepsilon^2 n_{e2} + \dots, \\ v &= \varepsilon v_1 + \varepsilon^2 v_2 + \dots; \end{aligned}$$

для функции E (в соответствии с третьим уравнением системы (1.175)) получается разложение $E = \varepsilon^\mu(\varepsilon E_1 + \varepsilon^2 E_2 + \dots)$. Подстановка полученных разложений для функций n , n_e , v , E в уравнения системы (1.175) показывает, что $\mu = 1/2$, $n_1 = n_{1e}$ (это вытекает из последнего уравнения); равенство нулю коэффициентов при ε^2 определяет $v_1 = n_1$, $E_1 = -\partial n_1 / \partial \xi$, а равенство нулю коэффициентов при ε^3 приводит к уравнению КдФ

$$\frac{\partial n_1}{\partial \tau} + n_1 \frac{\partial n_1}{\partial \xi} + \frac{1}{2} \frac{\partial^3 n_1}{\partial \xi^3} = 0.$$

1.468. $\mathbf{E} = \mathcal{E} e^{i\omega t}$, $\mathcal{H} = \mathcal{H} e^{i\omega t}$, $\Delta \mathcal{E} + \frac{\omega^2}{c^2} \mathcal{E} = 0$, $\operatorname{div} \mathcal{E} = 0$,

$$\mathcal{H} = \frac{ic}{\omega} \operatorname{rot} \mathcal{E}, \quad \mathcal{E}_\tau|_S = 0.$$

У к а з а н и е. Подстановка $\mathcal{E}(\mathbf{r})e^{i\omega t}$, $\mathcal{H}(\mathbf{r})e^{i\omega t}$ в уравнения (1.109), (1.110) приводит к системе

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \mathcal{H} &= \frac{i\omega}{c} \mathcal{E}, & \operatorname{div} \mathcal{H} &= 0, \\ \operatorname{rot} \mathcal{E} &= -\frac{i\omega}{c} \mathcal{H}, & \operatorname{div} \mathcal{E} &= 0, \end{aligned} \quad (1.176)$$

к которой нужно присоединить граничные условия: на поверхности S резонатора равны нулю тангенциальная составляющая $\mathcal{E}$ и нормальная составляющая $\mathcal{H}$, т. е.

$$\mathcal{E}_\tau|_S = 0, \quad \mathcal{H}_n|_S = 0. \quad (1.177)$$

Остается исключить $\mathcal{H}$ из системы (1.176).

1.469. У к а з а н и е к п.1). Векторы $\mathcal{E}$ и $\mathcal{H}$ удовлетворяют системе уравнений Максвелла. Р е ш е н и е п.2). В координатах (q_1, q_2, q_3) система уравнений $\operatorname{rot} \mathcal{H} = ik\mathcal{E}$, $\operatorname{rot} \mathcal{E} = -ik\mathcal{H}$, где $k = \omega/c$, запишется в виде

$$\frac{1}{h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_2} (h_3 \mathcal{H}_3) - \frac{\partial}{\partial q_3} (h_2 \mathcal{H}_2) \right] = ik \mathcal{E}_1, \quad (1.178)$$

$$\frac{1}{h_1 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_3} (h_1 \mathcal{H}_1) - \frac{\partial}{\partial q_1} (h_3 \mathcal{H}_3) \right] = ik \mathcal{E}_2, \quad (1.179)$$

$$\frac{1}{h_1 h_2} \left[\frac{\partial}{\partial q_1} (h_2 \mathcal{H}_2) - \frac{\partial}{\partial q_2} (h_1 \mathcal{H}_1) \right] = ik \mathcal{E}_3, \quad (1.180)$$

$$\frac{1}{h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_2} (h_3 \mathcal{E}_3) - \frac{\partial}{\partial q_3} (h_2 \mathcal{E}_2) \right] = -ik \mathcal{H}_1, \quad (1.181)$$

$$\frac{1}{h_1 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_3} (h_1 \mathcal{E}_1) - \frac{\partial}{\partial q_1} (h_3 \mathcal{E}_3) \right] = -ik \mathcal{H}_2, \quad (1.182)$$

$$\frac{1}{h_1 h_2} \left[\frac{\partial}{\partial q_1} (h_2 \mathcal{E}_2) - \frac{\partial}{\partial q_2} (h_1 \mathcal{E}_1) \right] = -ik \mathcal{H}_3. \quad (1.183)$$

При $\mathcal{H}_1 = 0$ уравнение (1.181)

$$\frac{\partial}{\partial q_2} (h_3 \mathcal{E}_3) = \frac{\partial}{\partial q_3} (h_2 \mathcal{E}_2)$$

превращается в тождество, если ввести функцию w следующим образом:

$$\mathcal{E}_2 = \frac{1}{h_2} \frac{\partial w}{\partial q_2}, \quad \mathcal{E}_3 = \frac{1}{h_3} \frac{\partial w}{\partial q_3}.$$

Чтобы удовлетворить уравнениям (1.179) и (1.180), которые принимают вид

$$-\frac{\partial}{\partial q_1} (h_3 \mathcal{H}_3) = \frac{ikh_3}{h_2} \frac{\partial w}{\partial q_2}, \quad \frac{\partial}{\partial q_1} (h_2 \mathcal{H}_2) = \frac{ikh_2}{h_3} \frac{\partial w}{\partial q_3},$$

достаточно положить $w = \frac{\partial u}{\partial q_1}$,

$$\mathcal{H}_2 = \frac{ik}{h_3} \frac{\partial u}{\partial q_3}, \quad \mathcal{H}_3 = -\frac{ik}{h_2} \frac{\partial u}{\partial q_2}.$$

При этом

$$\operatorname{div} \mathcal{H} = \frac{1}{h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_2} (h_3 \mathcal{H}_2) + \frac{\partial}{\partial q_3} (h_2 \mathcal{H}_3) \right] = \frac{ik}{h_2 h_3} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial q_2 \partial q_3} - \frac{\partial^2 u}{\partial q_3 \partial q_2} \right) = 0.$$

Из уравнения (1.178) следует, что

$$\mathcal{E}_1 = -\frac{1}{h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_2} \left(\frac{h_3}{h_2} \frac{\partial u}{\partial q_2} \right) + \frac{\partial}{\partial q_3} \left(\frac{h_2}{h_3} \frac{\partial u}{\partial q_3} \right) \right].$$

Такой же результат получается из уравнения $\operatorname{div} \mathcal{E} = 0$. Оставшиеся уравнения (1.182) и (1.183) преобразуются к виду

$$\frac{\partial F}{\partial q_3} = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial q_2} = 0,$$

где

$$F = \frac{\partial^2 u}{\partial q_1^2} + \frac{1}{h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_2} \left(\frac{h_3}{h_2} \frac{\partial u}{\partial q_2} \right) + \frac{\partial}{\partial q_3} \left(\frac{h_2}{h_3} \frac{\partial u}{\partial q_3} \right) \right] + k^2 u.$$

Таким образом, если u — решение уравнения $F = 0$, то $\mathcal{E}$ и $\mathcal{H}$, определенные посредством функции u , удовлетворяют уравнениям (1.182) и (1.183). Введение функции v для поля магнитного типа осуществляется аналогичным образом.

1.470. Поле электрического типа $\mathbf{E} = e^{i\omega t}(\mathcal{E}_r, \mathcal{E}_\varphi, \mathcal{E}_z)$, $\mathbf{H} = e^{i\omega t}(\mathcal{H}_r, \mathcal{H}_\varphi, 0)$:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_r &= \frac{\partial^2 u}{\partial r \partial z}, & \mathcal{E}_\varphi &= \frac{1}{r} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi \partial z}, & \mathcal{E}_z &= \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + k^2 u, \\ \mathcal{H}_r &= \frac{ik}{r} \frac{\partial u}{\partial \varphi}, & \mathcal{H}_\varphi &= -ik \frac{\partial u}{\partial r}, & \mathcal{H}_z &= 0, \end{aligned} \quad (1.184)$$

где u — решение задачи для уравнения Гельмгольца

$$\begin{aligned} \Delta u + k^2 u &= 0, \quad r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < z < l, \\ |u(r, \varphi, z)| &< \infty, \quad u(r, \varphi + 2\pi, z) = u(r, \varphi, z), \\ u(r_0, \varphi, z) &= u_z(r, \varphi, 0) = u_z(r, \varphi, l) = 0. \end{aligned}$$

Поле магнитного типа $\mathbf{E} = e^{i\omega t}(\mathcal{E}_r, \mathcal{E}_\varphi, 0)$, $\mathbf{H} = e^{i\omega t}(\mathcal{H}_r, \mathcal{H}_\varphi, \mathcal{H}_z)$:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_r &= -\frac{ik}{r} \frac{\partial v}{\partial \varphi}, & \mathcal{E}_\varphi &= -ik \frac{\partial v}{\partial r}, & \mathcal{E}_z &= 0, \\ \mathcal{H}_r &= \frac{\partial^2 v}{\partial r \partial z}, & \mathcal{H}_\varphi &= \frac{1}{r} \frac{\partial^2 v}{\partial \varphi \partial z}, & \mathcal{H}_z &= \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} + k^2 v, \end{aligned} \quad (1.185)$$

где v — решение задачи для уравнения Гельмгольца

$$\begin{aligned} \Delta v + k^2 v &= 0, \quad r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < z < l, \\ |v(r, \varphi, z)| &< \infty, \quad v(r, \varphi + 2\pi, z) = v(r, \varphi, z), \\ v_r(r_0, \varphi, z) &= v(r, \varphi, 0) = v(r, \varphi, l) = 0. \end{aligned}$$

1.471. Поле электрического типа $\mathbf{E} = e^{i\omega t}(\mathcal{E}_r, \mathcal{E}_\varphi, \mathcal{E}_z)$, $\mathbf{H} = e^{i\omega t}(\mathcal{H}_r, \mathcal{H}_\varphi, 0)$: компоненты векторов $\mathcal{E}$ и $\mathcal{H}$ выражаются через функцию u по формулам (1.184), u — решение задачи

$$\begin{aligned} \Delta u + k^2 u &= 0, \quad r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < \alpha, \quad 0 < z < l, \\ |u(r, \varphi, z)| &< \infty, \quad u(r_0, \varphi, z) = u_z(r, \varphi, 0) = u_z(r, \varphi, l) = 0, \\ u(r, 0, z) &= u(r, \alpha, z) = 0. \end{aligned}$$

Поле магнитного типа $\mathbf{E} = e^{i\omega t}(\mathcal{E}_r, \mathcal{E}_\varphi, 0)$, $\mathbf{H} = e^{i\omega t}(\mathcal{H}_r, \mathcal{H}_\varphi, \mathcal{H}_z)$: компоненты векторов $\mathcal{E}$ и $\mathcal{H}$ выражаются через функцию v по формулам (1.185), v есть решение задачи

$$\begin{aligned}\Delta v + k^2 v &= 0, \quad r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < \alpha, \quad 0 < z < l, \\ |v(r, \varphi, z)| &< \infty, \quad v_r(r_0, \varphi, z) = v(r, \varphi, 0) = v(r, \varphi, l) = 0, \\ v_\varphi(r, 0, z) &= v_\varphi(r, \alpha, z) = 0.\end{aligned}$$

1.472. Поле электрического типа $\mathbf{E} = e^{i\omega t}(\mathcal{E}_r, \mathcal{E}_\theta, \mathcal{E}_\varphi)$, $\mathbf{H} = e^{i\omega t}(0, \mathcal{H}_\theta, \mathcal{H}_\varphi, 0)$:

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_r &= \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + k^2 u, \quad \mathcal{E}_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial^2 u}{\partial r \partial \theta}, \quad \mathcal{E}_\varphi = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial r \partial \varphi}, \\ \mathcal{H}_r &= 0, \quad \mathcal{H}_\theta = \frac{ik}{r \sin \theta} \frac{\partial u}{\partial \varphi}, \quad \mathcal{H}_\varphi = -\frac{ik}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta},\end{aligned}\tag{1.186}$$

где u — решение задачи

$$\begin{aligned}\Delta u - \frac{2}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + k^2 u &= 0, \quad r < r_0, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ |u(r, \theta, \varphi)| &< \infty, \quad u(r, \theta, \varphi + 2\pi) = u(r, \theta, \varphi), \quad u_r(r_0, \theta, \varphi) = 0.\end{aligned}$$

Поле магнитного типа $\mathbf{E} = e^{i\omega t}(0, \mathcal{E}_\theta, \mathcal{E}_\varphi,)$, $\mathbf{H} = e^{i\omega t}(\mathcal{H}_r, \mathcal{H}_\theta, \mathcal{H}_\varphi)$:

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_r &= 0, \quad \mathcal{E}_\theta = -\frac{ik}{r \sin \theta} \frac{\partial v}{\partial \varphi}, \quad \mathcal{E}_\varphi = \frac{ik}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta}, \\ \mathcal{H}_r &= \frac{\partial^2 v}{\partial r^2} + k^2 v, \quad \mathcal{H}_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial^2 v}{\partial r \partial \theta}, \quad \mathcal{H}_\varphi = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial^2 v}{\partial r \partial \varphi},\end{aligned}\tag{1.187}$$

где v — решение задачи

$$\begin{aligned}\Delta v - \frac{2}{r} \frac{\partial v}{\partial r} + k^2 v &= 0, \quad r < r_0, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ |v(r, \theta, \varphi)| &< \infty, \quad v(r, \theta, \varphi + 2\pi) = v(r, \theta, \varphi), \quad v(r_0, \theta, \varphi) = 0.\end{aligned}$$

1.473. Ось Oz направлена по оси волновода, $L = \partial\Omega$ — кусочно-гладкая линия;

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}) = \mathcal{E}(x, y) e^{i(\beta z - \omega t)}, \quad \mathbf{H}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}) = \mathcal{H}(x, y) e^{i(\beta z - \omega t)}.\tag{1.188}$$

В TM -волне $\mathcal{E}(\mathcal{E}_x, \mathcal{E}_y, \mathcal{E}_z)$, $\mathcal{H} = (\mathcal{H}_x, \mathcal{H}_y, 0)$, компонента $\mathcal{E}_z(x, y)$ — решение задачи

$$\Delta \mathcal{E}_z + \kappa^2 \mathcal{E}_z = 0, \quad (x, y) \in \Omega, \quad \mathcal{E}_z|_L = 0, \quad \kappa^2 = k^2 - p^2, \quad k = \frac{\omega}{c};\tag{1.189}$$

остальные компоненты выражаются через $\mathcal{E}_z$ по формулам

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_x &= \frac{i\beta}{\kappa^2} \frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial x}, \quad \mathcal{E}_y = \frac{i\beta}{\kappa^2} \frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial y}, \\ \mathcal{H}_x &= -\frac{ik}{\kappa^2} \frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial y}, \quad \mathcal{H}_y = \frac{ik}{\kappa^2} \frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial x}.\end{aligned}\tag{1.190}$$

В TE -волне $\mathcal{E} = (\mathcal{E}_x, \mathcal{E}_y, 0)$, $\mathcal{H} = (\mathcal{H}_x, \mathcal{H}_y, \mathcal{H}_z)$, компонента $\mathcal{H}_z$ — решение задачи

$$\begin{aligned}\Delta \mathcal{H}_z + \kappa^2 \mathcal{H}_z &= 0, \quad (x, y) \in \Omega, \\ \frac{\partial \mathcal{H}_z}{\partial n} \Big|_L &= 0, \quad \mathbf{n} — нормаль к L ;\end{aligned}\tag{1.191}$$

остальные компоненты выражаются через $\mathcal{H}_z$ по формулам

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_x &= \frac{ik}{\kappa^2} \frac{\partial \mathcal{H}_z}{\partial y}, \quad \mathcal{E}_y = -\frac{ik}{\kappa^2} \frac{\partial \mathcal{H}_z}{\partial x}, \\ \mathcal{H}_x &= \frac{i\beta}{\kappa^2} \frac{\partial \mathcal{H}_z}{\partial x}, \quad \mathcal{H}_y = \frac{i\beta}{\kappa^2} \frac{\partial \mathcal{H}_z}{\partial y}.\end{aligned}\tag{1.192}$$

Решение. Электромагнитное поле в монохроматической волне (1.188) определяется системой уравнений (1.109), (1.110), которая запишется в виде

$$\begin{aligned} \operatorname{rot}(\mathcal{E} e^{i\beta z}) &= \frac{i\omega}{c} \mathcal{H} e^{i\beta z}, \quad \operatorname{rot}(\mathcal{H} e^{i\beta z}) = \frac{i\omega}{c} \mathcal{E} e^{i\beta z}, \\ \operatorname{div} \mathcal{E} + i\beta \mathcal{E}_z &= 0, \quad \operatorname{div} \mathcal{H} + i\beta \mathcal{H}_z = 0. \end{aligned} \quad (1.193)$$

Результатом исключения $\mathcal{H}$ или $\mathcal{E}$ из системы (1.193) является уравнение $\Delta \mathcal{E} + \kappa^2 \mathcal{E} = 0$ или $\Delta \mathcal{H} + \kappa^2 \mathcal{H} = 0$, а из первой пары уравнений этой системы (верхняя строка), записанных в координатной форме, вытекают соотношения (1.190) и (1.191). В краевой задаче (1.189) ставится граничное условие $\mathcal{E}_z|_L = 0$ (или, что то же самое, $\mathcal{E}_z|_S = 0$) вместо $\mathcal{E}_\tau|_S = 0$ (см. (1.177)). Правомерность такой замены доказывается следующим образом. Согласно формулам (1.190)

$$\mathcal{E} = \mathbf{e}_x \mathcal{E}_x + \mathbf{e}_y \mathcal{E}_y + \mathbf{e}_z \mathcal{E}_z = \frac{i\beta}{\kappa^2} (\mathbf{e}_x \frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial y}) + \mathbf{e}_z \mathcal{E}_z = \frac{i\beta}{\kappa^2} \nabla \mathcal{E}_z + \mathbf{e}_z \mathcal{E}_z,$$

поэтому при условии $\mathcal{E}_z|_S = 0$

$$\mathcal{E}_\tau|_S = (\mathcal{E} \tau)|_S = \frac{i\beta}{\kappa^2} (\nabla \mathcal{E}_z \tau)|_S + (\mathbf{e}_z \tau) \mathcal{E}_z|_S = (\mathbf{e}_z \tau) \mathcal{E}_z|_S = 0.$$

Аналогично устанавливается, что граничное условие в задаче (1.191) приводит к равенству $\mathcal{H}_n|_S = 0$.

В TEM -волне $\mathcal{E}_z = \mathcal{H}_z = 0$, поэтому уравнения (1.193) для $\mathcal{E}(x, y)$ можно записать в виде

$$(\operatorname{rot} \mathcal{E})_z = 0, \quad \operatorname{div} \mathcal{E} = 0;$$

при этом $\mathcal{E}_\tau|_L = 0$. Полученный результат означает, что поле $\mathcal{E}$ потенциально в области Ω , т.е. $\mathcal{E} = -\nabla u$, и L — эквипотенциальная линия поля. Задача Дирихле для потенциала,

$$\begin{aligned} \Delta u(x, y) &= 0, \quad (x, y) \in \Omega, \\ u|_L &= C, \end{aligned}$$

имеет единственное решение $u(x, y) = C$, откуда $\mathbf{E} = \mathbf{H} = 0$.

1.474. TE -волны:

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, \mathbf{z}, \mathbf{t}) = (0, \mathcal{E}_y(x), 0) e^{i(\beta z - \omega t)},$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}, \mathbf{z}, \mathbf{t}) = (\mathcal{H}_x(x), 0, \mathcal{H}_z(x)) e^{i(\beta z - \omega t)},$$

$$\mathcal{E}_y'' + (\beta^2 - k^2) \mathcal{E}_y = 0, \quad 0 < x < l,$$

$$\mathcal{E}_y(0) = \mathcal{E}_y(l) = 0, \quad \mathcal{H}_x = -\frac{\beta}{k} \mathcal{E}_y, \quad \mathcal{H}_z = \frac{i}{k} \mathcal{E}_y'.$$

TM -волны:

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, \mathbf{z}, \mathbf{t}) = (\mathcal{E}_x(x), 0, \mathcal{E}_z(x)) e^{i(\beta z - \omega t)},$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}, \mathbf{z}, \mathbf{t}) = (0, \mathcal{H}_y(x), 0) e^{i(\beta z - \omega t)},$$

$$\mathcal{H}_y'' + (\beta^2 - k^2) \mathcal{H}_y = 0, \quad 0 < x < l,$$

$$\mathcal{H}_y'(0) = \mathcal{H}_y'(l) = 0, \quad \mathcal{E}_x = -\frac{\beta}{k} \mathcal{H}_y, \quad \mathcal{E}_z = \frac{i}{k} \mathcal{H}_y', \quad k = \frac{\omega}{c}.$$

1.475. *TE*-моды:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \mathcal{E}_y}{dx^2} + (k^2 n_1^2 - \beta^2) \mathcal{E}_y &= 0, \quad |x| < l, \quad k = \frac{\omega}{c}, \\ \frac{d^2 \mathcal{E}_y}{dx^2} + (k^2 n_2^2 - \beta^2) \mathcal{E}_y &= 0, \quad |x| > l, \\ \mathcal{E}_y|_{|x|=l+0} &= \mathcal{E}_y|_{|x|=l-0}, \\ \frac{d\mathcal{E}_y}{dx}|_{|x|=l+0} &= \frac{d\mathcal{E}_y}{dx}|_{|x|=l-0}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} |\mathcal{E}_y|^2 dx < \infty, \\ \mathcal{H}_x &= -\frac{\beta}{k} \mathcal{E}_y, \quad \mathcal{H}_z = \frac{i}{k} \frac{d\mathcal{E}_y}{dx}. \end{aligned}$$

TM-моды:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \mathcal{H}_y}{dx^2} + (k^2 n_1^2 - \beta^2) \mathcal{H}_y &= 0, \quad |x| < l, \\ \frac{d^2 \mathcal{H}_y}{dx^2} + (k^2 n_2^2 - \beta^2) \mathcal{H}_y &= 0, \quad |x| > l, \\ \mathcal{H}_y|_{|x|=l+0} &= \mathcal{H}_y|_{|x|=l-0}, \\ \frac{1}{n^2(x)} \frac{d\mathcal{H}_y}{dx} \Big|_{|x|=l+0} &= \frac{1}{n^2(x)} \frac{d\mathcal{H}_y}{dx} \Big|_{|x|=l-0}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} |\mathcal{H}_y|^2 dx < \infty, \\ \mathcal{E}_x &= -\frac{\beta}{kn^2(x)} \mathcal{H}_y, \quad \mathcal{E}_z = \frac{i}{kn^2(x)} \frac{d\mathcal{H}_y}{dx}, \quad n(x) = \begin{cases} n_1, & |x| < l, \\ n_2, & |x| > l. \end{cases} \end{aligned}$$

У к а з а н и я. 1. Система уравнений (1.109), (1.110)

$$\operatorname{rot}(\mathcal{H}e^{i\beta z}) = -\frac{i\omega\varepsilon}{c} \mathcal{E}e^{i\beta z}, \quad \operatorname{rot}(\mathcal{E}e^{i\beta z}) \frac{i\omega}{c} = \mathcal{H}e^{i\beta z}$$

и граничные условия (непрерывность компонент $\mathcal{E}_\tau$ и $\mathcal{H}_\tau$ на границе раздела двух сред) распадаются на две независимые системы для компонент $\mathcal{E}_y$, $\mathcal{H}_x$, $\mathcal{H}_z$, с одной стороны, и $\mathcal{E}_x$, $\mathcal{E}_z$, $\mathcal{H}_y$ — с другой.

2. Если $\beta < kn_2$, то решение уравнения для $\mathcal{E}_z$ в области $x > l$

$$\mathcal{E}_y = A \sin \frac{p_2 x}{l} + B \cos \frac{p_2 x}{l}, \quad p_j = \sqrt{\beta^2 - k^2 n_j^2} l, \quad j = 1, 2,$$

принадлежит $L_2(x > l)$, т. е. $\int_l^\infty \mathcal{E}_x^2 dx < \infty$ лишь в случае $A = B = 0$. Условия на границе $x = l$ выполняются, если $\mathcal{E}_y = 0$ в области $|x| < l$. При $\beta > kn_1$

$$\mathcal{E}_y = \begin{cases} Ae^{-p_2 x}, & l < x, \\ B \operatorname{sh} p_1 x + C \operatorname{ch} p_1 x, & -l < x < l, \\ De^{p_2 x}, & x < -l. \end{cases}$$

Условия на границе ($x = \pm l$) порождают однородную систему линейных алгебраических уравнений относительно A, B, C, D , определитель которой (с точностью до множителя, отличного от нуля)

$$\Delta = (p_1 \operatorname{ch} p_1 + p_2 \operatorname{sh} p_1)(p_1 \operatorname{sh} p_1 + p_2 \operatorname{ch} p_1) e^{-p_2} \neq 0.$$

1.476. *TE*-моды:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \mathcal{E}_y}{dx^2} + (k^2 n_1^2(x) - \beta^2) \mathcal{E}_y &= 0, \quad |x| < l, \\ \frac{d^2 \mathcal{E}_y}{dx^2} + (k^2 n_2^2 - \beta^2) \mathcal{E}_y &= 0, \quad |x| > l, \\ \mathcal{E}_y|_{|x|=l-0} &= \mathcal{E}_y|_{|x|=l+0}, \quad \frac{d\mathcal{E}_y}{dx} \Big|_{|x|=l-0} = \frac{d\mathcal{E}_y}{dx} \Big|_{|x|=l+0}, \\ \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{E}_y^2 dx < \infty, \quad \mathcal{H}_x &= -\frac{\beta}{k} \mathcal{E}_y, \quad \mathcal{H}_z = -\frac{i}{k} \frac{d\mathcal{E}_y}{dx}. \end{aligned} \tag{1.194}$$

ТМ-моды:

$$\begin{aligned}
 n_1^2(x) \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{n_1^2(x)} \frac{d\mathcal{H}_y}{dx} \right) + (k^2 n_1^2(x) - \beta^2) \mathcal{H}_y &= 0, \quad |x| < l, \\
 \frac{d^2 \mathcal{H}_y}{dx^2} + (k^2 n_2^2 - \beta^2) \mathcal{H}_y &= 0, \quad |x| > l, \\
 \mathcal{H}_y|_{|x|=l-0} &= \mathcal{H}_y|_{|x|=l+0}, \quad \frac{1}{n^2(x)} \frac{d\mathcal{H}_y}{dx} \Big|_{|x|=l-0} = \frac{1}{n^2(x)} \frac{d\mathcal{H}_y}{dx} \Big|_{|x|=l+0}, \\
 \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{H}_y^2 dx < \infty, \quad \mathcal{E}_x &= \frac{\beta}{k n^2(x)} \mathcal{H}_y, \quad \mathcal{E}_z = \frac{i}{k n^2(x)} \frac{d\mathcal{H}_y}{dx}.
 \end{aligned} \tag{1.195}$$

1.477. ТЕ-моды:

$$\begin{aligned}
 \frac{d^2 \mathcal{E}_y}{dx^2} + (k^2 n^2(x) - \beta^2) \mathcal{E}_y &= 0, \quad -\infty < x < \infty, \\
 \int_{-\infty}^{\infty} |\mathcal{E}_y|^2 dx < \infty, \quad \mathcal{H}_x &= -\frac{\beta}{k} \mathcal{E}_y, \quad \mathcal{H}_z = -\frac{i}{k} \frac{d\mathcal{E}_y}{dx}.
 \end{aligned}$$

ТМ-моды:

$$\begin{aligned}
 n^2(x) \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{n^2(x)} \frac{d\mathcal{H}_y}{dx} \right) + (k^2 n^2(x) - \beta^2) \mathcal{H}_y &= 0, \quad -\infty < x < \infty, \\
 \int_{-\infty}^{\infty} |\mathcal{H}_y|^2 dx < \infty, \quad \mathcal{E}_x &= \frac{\beta}{k n^2(x)} \mathcal{H}_y, \quad \mathcal{E}_z = \frac{i}{k n^2(x)} \frac{d\mathcal{H}_y}{dx}.
 \end{aligned}$$

1.478. ТМ-моды:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{d\mathcal{E}_z}{dr} + (k^2 n_1 - \beta^2) \mathcal{E}_z &= 0, \quad 0 < r < r_0, \\
 \frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{d\mathcal{E}_z}{dr} + (k^2 n_2^2 - \beta^2) \mathcal{E}_z &= 0, \quad r_0 < r, \\
 |\mathcal{E}_z| < \infty, \quad \mathcal{E}_z(r_0 - 0) &= \mathcal{E}_z(r_0 + 0), \\
 \frac{n_1^2}{k^2 n_1^2 - \beta^2} \mathcal{E}'_z(r_0 - 0) &= \frac{n_2^2}{k^2 n_2^2 - \beta^2} \mathcal{E}'_z(r_0 + 0), \\
 \int_0^{\infty} \mathcal{E}_z^2 r dr < \infty, \quad \mathcal{E}_r &= \frac{i\beta}{k^2 n^2 - \beta^2} \mathcal{E}'_z, \quad \mathcal{H}_\varphi = \frac{ikn^2}{k^2 n^2 - \beta^2} \mathcal{E}'_z.
 \end{aligned}$$

ТЕ-моды:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{d\mathcal{H}_z}{dr} + (k^2 n_1 - \beta^2) \mathcal{H}_z &= 0, \quad 0 < r < r_0, \\
 \frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{d\mathcal{H}_z}{dr} + (k^2 n_2^2 - \beta^2) \mathcal{H}_z &= 0, \quad r_0 < r, \\
 |\mathcal{H}_z| < \infty, \quad \mathcal{H}_z(r_0 - 0) &= \mathcal{H}_z(r_0 + 0), \\
 \frac{1}{k^2 n_1^2 - \beta^2} \mathcal{H}'_z(r_0 - 0) &= \frac{1}{k^2 n_2^2 - \beta^2} \mathcal{H}'_z(r_0 + 0), \\
 \int_0^{\infty} \mathcal{H}_z^2 r dr < \infty, \quad \mathcal{E}_\varphi &= -\frac{ik}{k^2 n^2 - \beta^2} \mathcal{H}', \quad \mathcal{H}_r = -\frac{i\beta}{k^2 n^2 - \beta^2} \mathcal{H}'.
 \end{aligned}$$

Решение 2. Если $\beta < k n_2$, то решение уравнения для $\mathcal{E}_z$ в области $r < r_0$

$$\mathcal{E}_z = A J_0(\sqrt{k^2 n^2 - \beta^2} r) + B Y_0(\sqrt{k^2 n^2 - \beta^2} r)$$

принадлежит L_2 (т.е. $\int_0^\infty \mathcal{E}_z^2 r dr < \infty$) только при $A = B = 0$. Действительно, при $r \rightarrow \infty$ функции J_0 и Y_0 убывают как $1/\sqrt{r}$, так что интеграл расходится. В области $r < r_0$ ограниченное решение имеет вид

$\mathcal{E}_z = C J_0(\sqrt{k^2 n_1^2 - \beta^2} r)$ и удовлетворяет граничному условию при $r = r_0$, если $C = 0$. Пусть $\beta > k n_1$, тогда

$$\mathcal{E}_z = \begin{cases} A I_0\left(\frac{p_1 r}{r_0}\right), & r < r_0, \\ B K_0\left(\frac{p_2 r}{r_0}\right), & r_0 < r, \end{cases}$$

где $p_i = r_0 \sqrt{\beta^2 - k^2 n_i^2}$, $i = 1, 2$. Граничные условия при $r = r_0$ выполняются, если

$$\begin{aligned} A I_0(p_1) - B K_0(p_2) &= 0, \\ A \frac{n_1}{p_1 r_0} I_0'(p_1) - B \frac{n_2}{p_2 r_0} K_0'(p_2) &= 0. \end{aligned}$$

Определитель этой системы $\Delta = \frac{n_2}{p_2 r_0} I_0(p_1) K_1(p_2) + \frac{n_1}{p_1 r_0} I_1(p_1) K_0(p_2) > 0$, поэтому $A = B = 0$.

1.479. $\mathcal{E} = (\mathcal{E}_x, \mathcal{E}_y, \mathcal{E}_z)$, $\mathcal{H} = (\mathcal{H}_x, \mathcal{H}_y, \mathcal{H}_z)$; функции $\mathcal{E}_z$ и $\mathcal{H}_z$ являются решениями двух независимых задач

$$\begin{aligned} \Delta \mathcal{E}_z + (k^2 n_1^2 - \beta^2) \mathcal{E}_z &= 0, \quad \Delta \mathcal{H}_z + (k^2 n_1^2 - \beta^2) \mathcal{H}_z = 0, \\ 0 < r < r_0, \\ \Delta \mathcal{E}_z + (k^2 n_2^2 - \beta^2) \mathcal{E}_z &= 0, \quad \Delta \mathcal{H}_z + (k^2 n_2^2 - \beta^2) \mathcal{H}_z = 0, \\ r_0 < r, \\ \mathcal{E}_z|_{r=r_0-0} &= \mathcal{E}_z|_{r=r_0+0}, \quad \mathcal{E}_\varphi|_{r=r_0-0} = \mathcal{E}_\varphi|_{r=r_0+0}, \\ |\mathcal{E}| < \infty, \quad \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \mathcal{E}^2 r dr d\varphi &< \infty, \\ \mathcal{H}_z|_{r=r_0-0} &= \mathcal{H}_z|_{r=r_0+0}, \quad \mathcal{H}_\varphi|_{r=r_0-0} = \mathcal{H}_\varphi|_{r=r_0+0}, \\ |\mathcal{H}| < \infty, \quad \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \mathcal{H}^2 r dr d\varphi &< \infty; \end{aligned} \quad (1.196)$$

остальные компоненты выражаются через E_z и H_z по формулам

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_r &= \frac{1}{k^2 n^2(r) - \beta^2} \left(i \beta \frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial r} - \frac{k m}{r} \mathcal{H}_z \right), \\ \mathcal{E}_\varphi &= -\frac{1}{k^2 n^2(r) - \beta^2} \left(\frac{\beta m}{r} \mathcal{E}_z + i k \frac{\partial \mathcal{H}_z}{\partial r} \right), \\ \mathcal{H}_r &= \frac{1}{k^2 n^2(r) - \beta^2} \left(\frac{k m n^2(r)}{r} \mathcal{E}_z + i \beta \frac{\partial \mathcal{H}_z}{\partial r} \right), \\ \mathcal{H}_\varphi &= \frac{1}{k^2 n^2(r) - \beta^2} \left(i k n^2(r) \frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial r} - \frac{\beta m}{r} \mathcal{H}_z \right). \end{aligned} \quad (1.197)$$

У к а з а н и е к п. 2. Компоненты $\mathcal{E}_z$ и $\mathcal{H}_z$ удовлетворяют уравнению Бесселя

$$u'' + \frac{1}{r} u' + \left(k^2 n_i^2 - \beta^2 - \frac{m^2}{r^2} \right) u = 0, \quad i = 1, 2.$$

Если $\beta > k n_1$, то ограниченное при $r = 0$, квадратично интегрируемое с весом r , непрерывное при $r = r_0$ решение имеет вид

$$\mathcal{E}_z = A \begin{cases} \frac{I_m\left(\frac{p_1 r}{r_0}\right)}{I_m(p_1)}, & r \leq r_0, \\ \frac{K_m\left(\frac{p_2 r}{r_0}\right)}{K_m(p_2)}, & r_0 < r, \end{cases} \quad \mathcal{H}_z = B \begin{cases} \frac{I_m\left(\frac{p_1 r}{r_0}\right)}{I_m(p_1)}, & r \leq r_0, \\ \frac{K_m\left(\frac{p_2 r}{r_0}\right)}{K_m(p_2)}, & r_0 < r, \end{cases}$$

где $p_j = r_0 \sqrt{\beta^2 - k^2 n_i^2}$, $i = 1, 2$. Требование непрерывности при $r = r_0$ компонент $\mathcal{E}_\varphi$ и $\mathcal{H}_\varphi$ (см. 1.197) приводит к однородной системе линейных алгебраических уравнений относительно A и B

$$\begin{aligned} \beta m \left(\frac{1}{p_1^2} - \frac{1}{p_2^2} \right) A - ik \left(\frac{I'_m(p_1)}{p_1 I_m(p_1)} - \frac{K'_m(p_2)}{p_2 K_m(p_2)} \right) B &= 0, \\ ik \left(\frac{n_1^2 I'_m(p_1)}{p_1 I_m(p_1)} - \frac{n_2^2 K'_m(p_2)}{p_2 K_m(p_2)} \right) A - \beta m \left(\frac{1}{p_1^2} - \frac{1}{p_2^2} \right) B &= 0, \end{aligned}$$

определитель которой (с точностью до множителя, не равного нулю)

$$\Delta = \frac{1}{m^2} \left(\frac{I'_m(p_1)}{p_1 I_m(p_1)} - \frac{K'_m(p_2)}{p_2 K_m(p_2)} \right) \left(\frac{n_1^2 I'_m(p_1)}{p_1 I_m(p_1)} - \frac{n_2^2 K'_m(p_2)}{p_2 K_m(p_2)} \right) - \frac{\beta^2}{k^2} \left(\frac{1}{p_1^2} - \frac{1}{p_2^2} \right)^2.$$

Если $p > 0$, то $p I'_m > m I_m$, $-p K'_m > m K_m$ (это следует из рекуррентных формул), поэтому

$$\Delta > \left(\frac{1}{p_1^2} + \frac{1}{p_2^2} \right) \left(\frac{n_1^2}{p_1^2} + \frac{n_2^2}{p_2^2} \right) - \frac{\beta^2}{k^2} \left(\frac{1}{p_1^2} - \frac{1}{p_2^2} \right)^2 \frac{2(n_1^2 + n_2^2)}{p_1^2 p_2^2} > 0.$$

1.480. У к а з а н и е. В цилиндрических координатах система (1.109) имеет вид

$$\begin{aligned} \frac{m}{r} \mathcal{H}_z - \beta \mathcal{H}_\varphi &= -k n^2(r) \mathcal{E}_r, \\ i \beta \mathcal{E}_r - \frac{\partial \mathcal{E}_z}{\partial r} &= ik \mathcal{H}_\varphi, \\ \frac{m}{r} \mathcal{E}_z - \beta \mathcal{E}_\varphi &= k \mathcal{H}_r, \\ i \beta \mathcal{H}_r - \frac{\partial \mathcal{H}_z}{\partial r} &= -ik n^2(r) \mathcal{E}_\varphi, \\ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \mathcal{H}_\varphi) - \frac{im}{r} \mathcal{H}_r &= -ik n^2(r) \mathcal{E}_z, \\ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \mathcal{E}_\varphi) - \frac{im}{r} \mathcal{E}_r &= ik \mathcal{H}_z. \end{aligned} \quad (1.198)$$

Если первые два уравнения разрешить относительно компонент $\mathcal{E}_r$ и $\mathcal{H}_\varphi$, а вторые два — относительно $\mathcal{E}_\varphi$ и $\mathcal{H}_r$, то получатся соотношения (1.129) для компонент, подстановка которых в последние два уравнения системы (1.198) приводит к уравнениям (1.127), (1.128).

1.481. Р е ш е н и е. Так как $\Delta \ll 1$, $0 \leq q^2/s^2 \leq 1$, то

$$\beta^2 = k^2 n_1^2 - \frac{q^2}{r_0^2} = k^2 n_1^2 (1 - 2\Delta \frac{q^2}{s^2}) \approx k^2 n_1^2,$$

а уравнения (1.127), (1.128) примут вид

$$\mathcal{L} \mathcal{E}_z = -\frac{i}{n_1} \mathcal{H}_z, \quad \mathcal{L} \mathcal{H}_z = i n_1 \mathcal{E}_z, \quad (1.199)$$

где

$$\mathcal{L} = \frac{b^2 r}{m s^2 f'} \left[\frac{d^2}{dr^2} + \left(\frac{1}{r} + \frac{s^2 f'}{b^2} \right) \frac{d}{dr} + \frac{b^2}{r_0^2} - \frac{m^2}{r^2} \right].$$

Из системы (1.199) следует, что каждая из компонент $\mathcal{E}_z$, $\mathcal{H}_z$ является решением уравнения

$$\mathcal{L}^2 u = u. \quad (1.200)$$

Ввиду того, что $\mathcal{L}^2 - I = (\mathcal{L} - I)(\mathcal{L} + I)$, где I — тождественный оператор, линейно независимые решения уравнений

$$\mathcal{L} u = u, \quad \mathcal{L} u = -u \quad (1.201)$$

образуют фундаментальную систему решений уравнения (1.200). Так как точка $r = 0$ является особой для уравнения (1.201), то каждое из них имеет только одно ограниченное решение. Таким образом, $\mathcal{E}_z = u_j$, $j = 1, 2$, где $\mathcal{L}u_1 = u_1$, $\mathcal{L}u_2 = -u_2$, а первое уравнение системы (1.199) определяет компоненту

$$\mathcal{H}_z = in_1 \mathcal{L}\mathcal{E}_z = in_1 \mathcal{L}u_j = \pm in_1 u_j, \quad j = 1, 2.$$

Подстановка $\mathcal{E}_z$ и $\mathcal{H}_z$ в первое из соотношений (1.129) преобразует его к виду

$$\mathcal{E}_r = \frac{ikn_1 r_0^2}{b^2} (u'_j \mp \frac{m}{r} u_j).$$

Если обозначить

$$\psi_j = \frac{kn_1 r_0^2}{b^2} (u'_j \mp \frac{m}{r} u_j), \quad (1.202)$$

где верхний знак соответствует $j = 1$, а нижний — $j = 2$, то $\mathcal{E}_r = i\psi_j$. Аналогично получаются выражения для $\mathcal{E}_\varphi$, $\mathcal{H}_r$, $\mathcal{H}_\varphi$, приведенные в ответе. Функцию u_j можно выразить через ψ_j с помощью последнего (или предпоследнего) соотношения (1.198):

$$\pm \frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r\psi_j) - \frac{im}{r} i\psi_j = ik(\pm in_1 \psi_j),$$

откуда

$$u_j = -\frac{1}{kn_1} \left(\frac{\partial \psi_j}{\partial r} + \frac{1 \pm m}{r} \psi_j \right). \quad (1.203)$$

Условием совместности уравнений (1.202) и (1.203) служит уравнение (1.131). Действительно, подстановка u_j из (1.203) в правую часть уравнения (1.202)

$$\frac{b^2}{kn_1 r_0^2} \psi_j = u'_j \mp \frac{m}{r} u_j,$$

приводит к уравнению для ψ_j

$$\frac{b^2}{kn_1 r_0^2} \psi_j = -\frac{1}{kn_1} \left(\psi_j'' - \frac{1 \pm m}{r} \psi_j' - \frac{1 \pm m}{r^2} \psi_j \right) \mp \frac{m}{r} \left(-\frac{1}{kn_1} \right) \left(\psi_j' + \frac{1 \pm m}{r} \psi_j \right).$$

После сокращения на $(-1)/(kn_1)$ и приведения подобных это уравнение принимает вид

$$\frac{b^2}{r_0^2} \psi_j = -\psi_j'' + \left(\pm \frac{m}{r} - \frac{1 \pm m}{r} \right) \psi_j' + \left(\frac{1 \pm m}{r^2} \pm \frac{m(1 \pm m)}{r^2} \right) \psi_j,$$

или

$$\psi_j'' + \frac{1}{r} \psi_j' + \left(\frac{b^2}{r_0^2} - \frac{(1 \pm m)^2}{r^2} \right) \psi_j = 0,$$

где, согласно (1.130), $b^2 = q^2 - f s^2$.

1.482. У к а з а н и е. Точные уравнения для $\mathcal{E}_z$ и $\mathcal{H}_z$:

$$\begin{aligned} \Delta \mathcal{E}_z + (k^2 n^2 - \beta^2) \mathcal{E}_z + i\beta (\mathcal{E}_\nu \nabla \ln n^2) &= 0, \\ \Delta \mathcal{H}_z + (k^2 n^2 - \beta^2) \mathcal{H}_z + ikn^2 ([\mathcal{E}_\nu \nabla \ln n^2] \mathbf{e}_z) &= 0. \end{aligned}$$

1.483. $u_{tt} = c^2 \Delta u - 2\pi c^2 p_0 f(t) \frac{\partial \delta(\mathbf{r})}{\partial t}$, $-\infty < x, y, z < \infty$, $0 < t$, $\mathbf{l} = \frac{\mathbf{p}_0}{p_0}$,

$$A_{tt} = c^2 \Delta A + 4\pi c p_0 f'(t) \delta(\mathbf{r}), \quad \mathbf{A} = A \mathbf{l},$$

$$u(\mathbf{r}, 0) = \frac{(\mathbf{p} \mathbf{r})}{r^3}, \quad u_t(\mathbf{r}, 0) = 0,$$

$$A(\mathbf{r}, 0) = \dot{A}_t(\mathbf{r}, 0) = 0;$$

при любом фиксированном $t > 0$ функции $A(\mathbf{r}, t)$ и $u(\mathbf{r}, t)$ удовлетворяют условиям излучения (1.83). Векторы $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$ электромагнитного поля определяются формулами (1.139).

$$\begin{aligned} \mathbf{1.484.} \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \mathbf{l} A(\mathbf{r}) e^{i\omega t}, \quad u(\mathbf{r}, t) = v(\mathbf{r}) e^{i\omega t}, \quad \mathbf{l} = \frac{\mathbf{p}_0}{p_0}, \quad k = \frac{\omega}{c}, \quad -\infty < x, y, z < \infty, \\ \Delta A + k^2 A &= -4\pi i k p_0 \delta(\mathbf{r}), \\ \Delta v + k^2 v &= 4\pi p_0 \frac{\partial \delta(\mathbf{r})}{\partial l}; \end{aligned}$$

функции $A(\mathbf{r})$ и $v(\mathbf{r})$ удовлетворяют условиям излучения (1.83). Векторы $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$ определяются формулами (1.139).

1.485. $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = A(\mathbf{r}) e^{i\omega t}$, $u(\mathbf{r}, t) = 0$, функция A удовлетворяет уравнению

$$\Delta A + k^2 A = 4Mc^2 \frac{\delta(r)}{r^3} \cdot \frac{\delta\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)}{\sin \theta} \mathbf{e}_\varphi, \quad -\infty < x, y, z < \infty,$$

и условиям излучения (1.83). Поля $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$ определяются формулами (1.139).

$$\begin{aligned} \mathbf{1.486.} \quad \mathbf{H} &= \text{rot } \mathbf{A}, \quad \mathbf{A} = A(r, \varphi) \mathbf{e}_z, & \mathbf{H} &= -\nabla u + \mathbf{H}_0, \\ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial A}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 A}{\partial \varphi^2} + p^2 A &= 0, & \Delta u &= 0, \\ r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, & & r_0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ |A| < \infty, & & \lim_{r \rightarrow \infty} u &= 0, \\ \mathbf{H}|_{r_0-0} &= \mathbf{H}|_{r_0+0}, \end{aligned}$$

где $p^2 = -\frac{4\pi\mu\sigma\omega}{c^2}$. У к а з а н и е. Векторы $\mathbf{E} e^{i\omega t}$, $\mathbf{H} e^{i\omega t}$ электромагнитного поля в цилиндре удовлетворяют системе уравнений (1.135)–(1.138), в которой плотность тока $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E} \exp(i\omega t)$, плотность свободных зарядов $\rho = 0$, а токами смещения можно пренебречь:

$$\begin{aligned} \text{rot } \mathbf{E} &= -\frac{i\omega}{c} \mathbf{H}, \quad \text{div } \mathbf{H} = 0, \\ \text{rot } \mathbf{H} &= \frac{4\pi\sigma}{c} \mathbf{E}, \quad \text{div } \mathbf{E} = 0. \end{aligned}$$

Магнитное поле в цилиндре представляет собой суперпозицию внешнего магнитного поля и магнитного поля токов $\mathbf{j}$, источником которых является электрическое поле, индуцируемое внешним переменным магнитным полем. Векторный потенциал $\mathbf{A}$ результирующего магнитного поля в цилиндре удовлетворяет уравнению Гельмгольца, $\Delta A + p^2 A = 0$ (см. пример 1.28). Вне цилиндра магнитное поле (в квазистационарном приближении) потенциально. Непрерывность тангенциальной составляющей поля $\mathbf{H}$ и нормальной составляющей поля $\mathbf{B}$ на границе раздела двух сред при $\mu = 1$ эквивалентна непрерывности $\mathbf{H}$.

1.487. Внутри шара магнитное поле $\mathbf{H} = \text{rot } \mathbf{A}$, $\mathbf{A} = A(r, \theta) \mathbf{e}_\varphi$, вне шара поле $\mathbf{H} = -\nabla u + \mathbf{H}_0$; функции $A(r, \theta)$ и $u(r, \theta)$ — решения задач

$$\begin{aligned} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial A}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial A}{\partial \theta} - \frac{A}{r^2 \sin^2 \theta} + p^2 A &= 0, & \Delta u &= 0, \\ r < r_0, & & r_0 < r, \\ |A| < \infty, & & \lim_{r \rightarrow \infty} u &= 0, \end{aligned}$$

где $p^2 = -\frac{4\pi\mu\sigma\omega}{c^2}$, а на поверхности шара выполняется граничное условие

$$\mathbf{H}|_{r_0-0} = \mathbf{H}|_{r_0+0}.$$

У к а з а н и е. Внешнее магнитное поле индуцирует в шаре токи, плотность которых $\mathbf{j} = j(r, \theta) \exp(i\omega t) \mathbf{e}_\varphi$. См. также указание к предыдущей задаче.

1.489. У к а з а н и е. Решение системы (1.175) удовлетворяет условиям

$$n \rightarrow 1, v \rightarrow 0, E \rightarrow 0 \text{ при } |x| \rightarrow \infty.$$

Подстановка разложений

$$\begin{aligned} n &= 1 + \varepsilon n_1 + \varepsilon^2 n_2 + \varepsilon^3 n_3 + \dots, \\ v &= \varepsilon v_1 + \varepsilon^2 v_2 + \varepsilon^3 v_3 + \dots, \\ E &= \varepsilon E_1 + \varepsilon^2 E_2 + \varepsilon^3 E_3 + \dots \end{aligned}$$

и приравнивание нулю коэффициентов при $\varepsilon, \varepsilon^2, \varepsilon^3, \dots$ приводит к цепочке систем уравнений. Первая система (линейное приближение) имеет решение

$$n_1 = \frac{\omega}{k} A e^{i\theta}, \quad v_1 = \frac{\omega}{k} A e^{i\theta}, \quad E_1 = \frac{i}{k} A e^{i\theta}, \quad \theta = kx - \omega t, \quad \omega^2 = k^2 + 1.$$

Решение второй системы при условии

$$\omega \frac{\partial A}{\partial T_1} + k \frac{\partial A}{\partial X_1} = 0,$$

которое выражает отсутствие секулярных членов в уравнении для n_2 , имеет вид

$$\begin{aligned} n_2 &= \frac{2}{3} (1 + 2\omega^2) A^2 e^{i\theta} + c.c., \\ v_2 &+ \frac{\omega}{3k} (4\omega^2 - 1) A_2 e^{i\theta} + \frac{i}{\omega k^2} \frac{\partial A}{\partial X_1} e^{i\theta} + c.c., \\ E_2 &= i \frac{1 + 2\omega^2}{3k} A^2 e^{i\theta} - \frac{1}{k^2} \frac{\partial A}{\partial X_1} e^{i\theta} + c.c.. \end{aligned}$$

Равенство нулю секулярных членов в уравнении для n_3 ,

$$2i \left(\frac{\partial A}{\partial T_2} + \frac{k}{\omega} \frac{\partial A}{\partial X_2} \right) + \frac{1}{\omega^3} \frac{\partial^2 A}{\partial X_1^2} - \frac{1}{3\omega} (8k^4 + 21k^2 + 12) |A|^2 A = 0,$$

после преобразования переменных $\eta = X_2 - \frac{k}{\omega} T_2$, $\tau = T_2$, $\xi = X_1$ принимает форму НУШ:

$$i \frac{\partial A}{\partial \tau} + \frac{1}{2\omega^3} \frac{\partial^2 A}{\partial \xi^2} - \frac{1}{6\omega} (8k^4 + 21k^2 + 12) |A|^2 A = 0.$$

1.490. У к а з а н и е. Подстановка

$$u = \varepsilon u_1 + \varepsilon^2 u_2 + \varepsilon^3 u_3 + \dots$$

порождает последовательность уравнений, из которых следует, что

$$u_1 = A e^{i(kx - \omega t)} + c.c., \quad \omega = -k^3,$$

а функция A при выполнении условия

$$\frac{\partial A}{\partial T_1} - 3k^2 \frac{\partial A}{\partial X_1} = 0$$

удовлетворяет (в переменных $\xi = X_1$, $\eta = T_2 + 3k^2 X_2$, $\tau = T_2$) уравнениям:

$$1) i \frac{\partial A}{\partial \tau} - 3k \frac{\partial^2 A}{\partial \xi^2} - \frac{6}{k} |A|^2 A = 0; \quad 2) i \frac{\partial A}{\partial \tau} - 3k \frac{\partial^2 A}{\partial \xi^2} - 9k |A|^2 A = 0.$$

1.491. У к а з а н и е. Решение уравнения $u_{xt} = u - u^3$ представить в виде разложения $u = \varepsilon u_1 + \varepsilon^2 u_2 + \varepsilon^3 u_3 + \dots$. Из получающейся цепочки уравнений вытекает, что $u_1 = A e^{i(kx - \omega t)}$, $\omega k = 1$.

Глава 2

МЕТОД РАЗДЕЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ

Метод Фурье (или метод разделения переменных), предложенный французским математиком Ж. Фурье в работе «Аналитическая теория тепла» (1822 г.), является эффективным средством аналитического решения линейных задач математической физики для дифференциальных уравнений различных типов. Этот метод применим для смешанных нестационарных задач (т.е. задач с граничными и начальными условиями) в ограниченных областях, а в случае уравнений эллиптического типа — и для некоторого класса неограниченных областей. Метод основан на построении частных решений уравнения, удовлетворяющих однородным граничным условиям, в виде произведения функций, зависящих от разных переменных. Посредством разделения переменных задача для уравнения с частными производными сводится к двум задачам. Одна из них состоит в решении обыкновенного дифференциального уравнения при дополнительных условиях (для нестационарных задач — это задача Коши), другая (задача на собственные значения) заключается в определении собственных функций и собственных значений линейного дифференциального оператора. Для решения второй задачи в n -мерном случае ($n \geq 2$) также используется метод Фурье, применение которого приводит к одномерным задачам на собственные значения. Задача на собственные значения является основной в данном методе, так как служит источником построения полной ортогональной системы функций. Именно с помощью этих функций конструируется ряд Фурье, представляющий собой решение поставленной задачи. Решить задачу на собственные значения значит найти нетривиальные решения дифференциального уравнения на заданном промежутке при определенных условиях на его концах. В большом количестве задач получаются линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Более сложные задачи содержат

уравнения для цилиндрических функций, классических ортогональных многочленов, сферических функций, гипергеометрических функций. Важную роль играет свойство эрмитовости оператора, когда существенно упрощается вычисление коэффициентов Фурье.

Процедура разделения переменных особенно проста при решении нестационарных задач для однородных уравнений с однородными граничными условиями или n -мерных краевых задач (т.е. задач без начальных условий) для однородных уравнений с однородными граничными условиями по $(n - 1)$ переменным. При решении задач с неоднородными уравнениями и неоднородными граничными условиями процесс разделения переменных усложняется. Один из методов решения задачи с неоднородными граничными условиями состоит в преобразовании ее в эквивалентную задачу с однородными граничными условиями. Существуют различные технические приемы подобного преобразования: либо введение вспомогательной функции, удовлетворяющей неоднородным граничным условиям, либо применение обобщенных функций и их производных и т.д. В результате одна и та же задача может иметь различные формы ответа. Следует выделить класс задач для неоднородного уравнения с неоднородными граничными условиями (например, со стационарными неоднородностями), процесс решения которых значительно упрощается и улучшается сходимость рядов, если удастся найти частное решение уравнения, удовлетворяющее данным граничным условиям.

Литература к главе 2

1. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. — М.: МГУ, Наука, 2004.
2. Владимиров В.С., Жаринов В.В. Уравнения математической физики. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.
3. Будак Б.Н., Самарский А.А., Тихонов А.Н. Сборник задач по математической физике. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.
4. Сборник задач по уравнениям математической физики под ред. В.С. Владимирова. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.
5. Никифоров А.Ф., Уваров В.Б. Специальные функции математической физики. — Долгопрудный: Интеллект, 2007. Наука, 1984.

2.1. Задачи для однородного уравнения с однородными граничными условиями

Пример 2.1. Движение струны с упруго закрепленными концами, на которую действуют упругие силы, определяется (с точностью до обозначений) системой уравнений (1.17):

$$\rho(x)u_{tt} = \frac{\partial}{\partial x}k(x)\frac{\partial u}{\partial x} - q(x)u, \quad x \in \Delta = (l_1, l_2), \quad 0 < t, \quad (2.1)$$

$$\begin{aligned} \alpha_1 u_x(l_1, t) - \beta_1 u(l_1, t) &= 0, \\ \alpha_2 u_x(l_2, t) + \beta_2 u(l_2, t) &= 0, \end{aligned} \quad (2.2)$$

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x), \quad (2.3)$$

$$\alpha_i \geq 0, \quad \beta_i \geq 0, \quad \alpha_i + \beta_i > 0, \quad i = 1, 2; \quad (2.4)$$

коэффициенты уравнения удовлетворяют условиям

$$\begin{aligned} \rho(x) \in C(\overline{\Delta}), \quad \rho(x) \geq \delta > 0, \quad k(x) \in C^1(\overline{\Delta}), \quad k(x) \geq \delta > 0, \\ q(x) \in C(\overline{\Delta}), \quad q(x) \geq 0, \end{aligned}$$

а функция $u(x, t) \in C^2(\Delta) \cap C^1(\overline{\Delta}) \cap C^2(t > 0) \cap C^1(t \geq 0)$. Если обозначить

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_1 u &= \alpha_1 u_x(l_1, t) - \beta_1 u(l_1, t), \\ \mathcal{L}_2 u &= \alpha_2 u_x(l_2, t) + \beta_2 u(l_2, t) \end{aligned}$$

и ввести оператор

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial}{\partial x} k \frac{\partial}{\partial x} - q \right), \quad (2.5)$$

область определения $\mathcal{M}_{\mathcal{L}}$ которого — множество функций, принадлежащих классу $C^2(\Delta) \cap C^1(\overline{\Delta})$ и удовлетворяющих граничным условиям $\mathcal{L}_1 u = 0$, $\mathcal{L}_2 u = 0$, то уравнение (2.1) запишется в виде

$$u_{tt} = -\mathcal{L}u. \quad (2.6)$$

З а м е ч а н и е. Если два оператора определены одним и тем же математическим выражением, но их области определения не совпадают, то это разные операторы.

Согласно методу Фурье решение задачи следует отыскивать в форме произведения функций, каждая из которых зависит от одной из переменных: $u(x, t) = X(x)T(t)$. Подстановка $u(x, t)$ в уравнение (2.6) и деление на XT приводит к тождеству двух отношений $T''/T = -\mathcal{L}X/X$, зависящих от разных переменных. Следовательно,

$$\frac{T''}{T} = -\frac{\mathcal{L}X}{X} = -\lambda,$$

где λ — некоторая константа. Таким образом, функции X и T удовлетворяют обыкновенным дифференциальным уравнениям

$$\begin{aligned}\mathcal{L}X &= \lambda X, \\ T'' + \lambda T &= 0.\end{aligned}\tag{2.7}$$

Граничные условия

$$\begin{aligned}[\alpha_1 X'(l_1) - \beta_1 X(l_1)] T(t) &= 0, \\ [\alpha_2 X'(l_2) + \beta_2 X(l_2)] T(t) &= 0\end{aligned}$$

выполняются, если равны нулю коэффициенты при $T(t)$. Совокупность условий, которым удовлетворяет функция $X(x)$, определяет задачу на собственные значения (в одномерном случае она называется задачей Штурма–Лиувилля)

$$\frac{d}{dx} k \frac{dX}{dx} - qX + \lambda \rho X = 0, \quad l_1 < x < l_2, \tag{2.8}$$

$$\begin{aligned}\alpha_1 X'(l_1) - \beta_1 X(l_1) &= 0, \\ \alpha_2 X'(l_2) + \beta_2 X(l_2) &= 0\end{aligned}\tag{2.9}$$

или в другой форме

$$\mathcal{L}X = \lambda X, \quad X \in \mathcal{M}_{\mathcal{L}}. \tag{2.10}$$

Значения параметра λ , при котором задача (2.10) имеет нетривиальные решения, называются собственными значениями оператора $\mathcal{L}$, а соответствующие нетривиальные решения $X(x)$ — собственными функциями оператора.

Так как уравнение (2.8) и граничные условия (2.9) задачи Штурма–Лиувилля являются однородными, то собственная функция определяется с точностью до постоянного множителя. Известно также (см. [15], гл. V, § 22.3), что множество собственных значений оператора $\mathcal{L}$ счетно, не имеет конечных предельных точек, собственные значения неотрицательны, каждому из них (в одномерном случае) соответствует одна собственная функция; собственные функции (их можно выбрать вещественными), принадлежащие разным собственным значениям, ортогональны с весом ρ на промежутке Δ , т. е.

$$(X_m, X_n) = \int_{\Delta} X_m(x) X_n(x) \rho(x) dx = 0, \quad m \neq n.$$

Каждому λ_n соответствует решение уравнения (2.7)

$$T_n(t) = A_n \cos \sqrt{\lambda_n} t + B_n \sin \sqrt{\lambda_n} t$$

и функция $u_n(x, t) = X_n(x) T_n(t)$. Так как $u_n(x, t)$ удовлетворяет уравнению (2.1) и граничным условиям (2.2), то в силу линейности задачи этими свойствами обладает любая линейная комбинация функций $u_n(x, t)$. Поэтому можно предположить, что решение имеет форму ряда по собственным функциям,

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos \sqrt{\lambda_n} t + B_n \sin \sqrt{\lambda_n} t) X_n(x).$$

Для определения коэффициентов A_n и B_n используются начальные условия. При $t = 0$

$$\begin{aligned} u_0(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n X_n(x) &\implies A_n = \frac{(u_0, X_n)}{\|X_n\|^2}, \\ u_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\lambda} B_n X_n(x) &\implies B_n = \frac{(u_1, X_n)}{\sqrt{\lambda} \|X_n\|^2}, \end{aligned} \quad (2.11)$$

где $\|X_n\|^2 = (X_n, X_n)$ — квадрат нормы собственной функции.

Следует отметить, что норма $\|X\|$ любого решения уравнения (2.8) выражается через производные по λ и x функции X . Действительно, пусть X и X_1 — какие-либо решения уравнения (2.8) с параметрами λ и λ_1 соответственно:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} k \frac{dX}{dx} + (\lambda \rho - q) X &= 0, \\ \frac{d}{dx} k \frac{dX_1}{dx} + (\lambda_1 \rho - q) X_1 &= 0. \end{aligned}$$

Если первое уравнение умножить на X_1 , а второе на X и взять разность, то получится тождество

$$\frac{d}{dx} W[X_1, X] = (\lambda_1 - \lambda) X X_1 \rho,$$

где $W[X_1, X]$ — определитель Вронского. Отсюда следует, что

$$\int_{l_1}^{l_2} \rho X^2 dx = \lim_{\lambda_1 \rightarrow \lambda} \left. \frac{k W[X_1, X]}{\lambda_1 - \lambda} \right|_{l_1}^{l_2},$$

или

$$\|X\|^2 = k W \left[\frac{\partial X}{\partial \lambda}, X \right] \Big|_{l_1}^{l_2}. \quad (2.12)$$

В случае свободного движения однородной струны ($0 < x < l$) с закрепленными концами задача (2.1)–(2.3) упрощается:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) &= u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) &= u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x). \end{aligned}$$

Функция $T(t)$ удовлетворяет уравнению $T'' + a^2 \lambda T = 0$, а функция $X(x)$ является решением задачи Штурма–Лиувилля,

$$\begin{aligned} X'' + \lambda X &= 0, \quad 0 < x < l, \\ X(0) &= 0, \quad X(l) = 0. \end{aligned} \quad (2.13)$$

Общее решение $X(x) = A \cos \sqrt{\lambda} x + B \sin \sqrt{\lambda} x$ удовлетворяет граничному условию при $x = 0$, если $A = 0$. Второе граничное условие $\sin \sqrt{\lambda} l = 0$ определяет счетное множество собственных значений $\lambda_n = (\pi n / l)^2$, $n \in \mathbb{N}$. Таким образом,

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos a \sqrt{\lambda_n} t + B_n \sin a \sqrt{\lambda_n} t) X_n(x), \quad (2.14)$$

A_n и B_n выражаются посредством формул (2.11) при $\rho = 1$:

$$A_n = \frac{(u_0, X_n)}{\|X_n\|^2}, \quad B_n = \frac{(u_1, X_n)}{\sqrt{\lambda} \|X_n\|^2}. \quad (2.15)$$

Функцию $u(x, t)$ можно представить так:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{\pi n}{l} x \sin(a \sqrt{\lambda_n} t + \delta_n).$$

Каждый член ряда описывает стоячую волну с узлами $x_k = \frac{lk}{n}$, $k = 1, 2, 3, \dots, n-1$, точка x колеблется с амплитудой $C_n \sin \frac{\pi n}{l} x$ и частотой

$$\omega_n = a \sqrt{\lambda_n} = \frac{\pi}{l} \sqrt{\frac{T}{\rho}} n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Частота ω_n называется собственной частотой, а соответствующее гармоническое колебание — собственным колебанием. Из приведенного анализа следует, что движение свободной струны представляет собой суперпозицию собственных колебаний, поэтому какое бы ни было начальное возмущение струны при ее движении, не может возникнуть гармоническое колебание с частотой, отличной от ω_n .

Так как спектр частот колебательной системы является ее важной физической характеристикой, то задача на собственные значения имеет самостоятельный интерес.

З а м е ч а н и е. Метод Фурье применим к более общей задаче

$$\begin{aligned} u_{tt} &= -\mathcal{L}u + f(x, t), \quad x \in \Delta, \quad 0 < t, \\ \mathcal{L}_1 u &= \mu_1(t), \quad \mathcal{L}_2 u = \mu_2(t), \\ u(x, 0) &= u_0(x), \quad u_t(x, 0) = u_1(x), \end{aligned}$$

решение которой получено в примерах 2.17 и 2.18. Схема метода не зависит от типа линейного уравнения, применима к решению задач в $\mathbb{R}^n$, а также к задачам, решения которых выражаются через специальные функции.

2.1. Одна из задач, возникающих в процессе разделения переменных, связана с оператором

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{\rho(x)} [\operatorname{div}(p(x)\nabla) - q(x)],$$

где $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \Omega$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с кусочно-гладкой границей $\partial\Omega = S$,

$$\begin{aligned} \rho(x) &\in C(\overline{\Omega}) \quad \forall x \in \overline{\Omega}: \rho(x) \geq \delta > 0, \\ p(x) &\in C(\overline{\Omega}) \quad \forall x \in \overline{\Omega}: p(x) \geq \delta > 0, \\ q(x) &\in C(\overline{\Omega}) \quad \forall x \in \overline{\Omega}: q(x) \geq 0. \end{aligned}$$

В одномерном случае подобный оператор был использован в примере 2.1. Установить следующие формулы:

1) если $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$, $v(x) \in C^1 \cap \overline{\Omega}$, то имеет место первая формула Грина

$$\int_{\Omega} \rho v \mathcal{L}u dx = \int_{\Omega} [p(\nabla u \nabla v) + quv] dx - \int_S p v \frac{\partial u}{\partial n} ds; \quad (2.16)$$

2) если $(u, v) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$, то справедлива вторая формула Грина

$$\int_{\Omega} \rho (v \mathcal{L}u - u \mathcal{L}v) dx = \int_S p \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds, \quad (2.17)$$

где $\mathbf{n}$ — внешняя нормаль к S .

2.2. В ограниченной области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ определена функция

$$\rho(x) \in C(\overline{\Omega}), \quad \forall x \in \overline{\Omega}: \rho(x) \geq \delta > 0$$

и комплексные функции $f(x) = f_1(x) + if_2(x)$ такие, что

$$\int_{\Omega} |f|^2 \rho dx < \infty.$$

Множество этих функций обозначается $\tilde{L}_2(\Omega)$ (если левая часть неравенства есть интеграл Римана) или $L_2(\Omega)$ (если интеграл Лебега).

Доказать, что:

- 1) $\tilde{L}_2(\Omega)$ — линейное множество;
- 2) на множестве $\tilde{L}_2(\Omega)$ можно определить скалярное произведение

$$(f, g) = \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} \rho(x) dx;$$

- 3) если каждому элементу f поставлено в соответствие некоторое число $\|f\|$, называемое нормой f , такое что выполнены условия:

а) $\|f\| \geq 0$, $\|f\| = 0$ тогда и только тогда, когда $f = 0$;

б) $\|\alpha f\| = |\alpha| \|f\|$, $\alpha \in C$;

в) $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$ — неравенство треугольника,

то линейное множество становится линейным нормированным пространством.

Доказать, что на множестве $\tilde{L}_2(\Omega)$ можно ввести норму по формуле $\|f\| = \sqrt{(f, f)}$.

2.3. Линейный оператор $\mathcal{L}$ определен на множестве $\mathcal{M}_{\mathcal{L}} \subset \tilde{L}_2(\Omega)$ (см. задачу 2.2). Если $\forall f \in \mathcal{M}_{\mathcal{L}} \implies \mathcal{L}f \in \tilde{L}_2(\Omega)$, то определены скалярные произведения

$(\mathcal{L}f, g)$ — билинейная форма оператора,

$(\mathcal{L}f, f)$ — квадратичная форма оператора.

Линейный оператор $\mathcal{L}$, отображающий $\mathcal{M}_{\mathcal{L}}$ в $\mathcal{L}f \in \tilde{L}_2(\Omega)$, называется *эрмитовым*, если

$$\forall (f, g) \in \mathcal{M}_{\mathcal{L}}: (\mathcal{L}f, g) = (\mathcal{L}g, f).$$

Линейный оператор $\mathcal{L}$ называется *положительным*, если

$$\forall f \in \mathcal{M}_{\mathcal{L}}: (\mathcal{L}f, f) \geq 0.$$

Критерий эрмитовости: линейный оператор эрмитов тогда и только тогда, когда его квадратичная форма вещественна (доказательство в [15], § 1.12).

С л е д с т в и е. Положительный оператор эрмитов. Оператор $\mathcal{L}$, введенный в задаче 2.1, определен на функциях

$$u(x) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega}), \left(\alpha(x)u(x) + \beta(x) \frac{\partial u(x)}{\partial n} \right) \Big|_S = 0, \mathcal{L}u \in \tilde{L}_2(\Omega),$$

где $\alpha(x) \in C(S)$, $\beta(x) \in C(S)$, $\alpha(x) \geq 0$, $\beta(x) \geq 0$, $\alpha(x) + \beta(x) > 0$, $x \in S$, $\mathbf{n}$ — внешняя нормаль к S .

Доказать, что оператор $\mathcal{L}$: 1) эрмитов; 2) положителен.

2.4. Установить следующие свойства собственных функций и собственных значений оператора

$$\mathcal{L}u = \lambda u, u \in \mathcal{M}_{\mathcal{L}},$$

определенного в предыдущей задаче:

- 1) собственные значения неотрицательны;
- 2) собственные функции можно выбрать вещественными;
- 3) $\lambda = 0$ — собственное значение тогда и только тогда, когда $\alpha(x) = q(x) = 0$; при этом $\lambda = 0$ — простое собственное значение, а его собственная функция $u_0 = C$;
- 4) собственные функции, принадлежащие разным собственным значениям, ортогональны.

2.5. Определить частоты и форму собственных колебаний однородной струны ($-l < x < l$) с закрепленными концами.

2.6. Один конец струны, длина которой l , закреплен, а другой свободен (см. задачу 1.45). Найти собственные частоты струны.

2.7. Найти частоты собственных колебаний неоднородной струны ($0 < x < l$) с закрепленными концами, плотность которой:

$$1) \rho(x) = \begin{cases} \rho_0, & 0 < x < l/2, \\ 4\rho_0, & l/2 < x < l; \end{cases} \quad 2) \rho(x) = \begin{cases} \rho_0, & 0 < x < \frac{3}{7}l, \\ 9\rho_0, & \frac{3}{7}l < x < l. \end{cases}$$

2.8. В точке $x = 0$ однородной струны ($-l < x < l$) с закрепленными концами имеется шарик, масса которого m . Определить частоты собственных колебаний и форму стоячих волн струны.

2.9. Струна ($0 < x < l$) с шариком в точке $x = l$ вращается с постоянной угловой скоростью ω в плоскости xOy около оси Oz , проходящей через конец $x = 0$; плотность струны равна

$\rho(x) = \frac{k}{\sqrt{l_0^2 - x^2}}$, $l_0 > l$, масса шарика $m = \frac{k}{l} \sqrt{l_0^2 - l^2}$. Струна

получает смещения и скорости в направлении оси Oz . Найти частоты и амплитуды (с точностью до постоянного множителя) собственных колебаний.

2.10. Струна ($0 < x < l$) с шариком в точке $x = l$ подвешена за конец $x = 0$ в поле тяжести; линейная плотность струны

$\rho(x) = \frac{k}{\sqrt{l_0 - x}}$, $l_0 > l$, масса шарика $m = 2k\sqrt{l_0}$. Найти частоты

собственных колебаний струны.

2.11. Найти частоты продольных колебаний однородного цилиндрического стержня длины l , один конец которого закреплен, а на другом (свободном) имеется сосредоточенная масса m .

2.12. Найти в одномерном приближении частоты продольных колебаний конического стержня (рис.1.2), если: 1) его торцы закреплены; 2) торец $x = 0$ закреплен, а торец $x = l$ свободен.

2.13. Найти в одномерном приближении собственные частоты продольных колебаний упругого стержня ($0 < x < l$), имеющего форму правильной усеченной пирамиды, торец $x = l$ которого свободен, а торец $x = 0$ закреплен посредством пружинки с коэффициентом жесткости k ; площадь торца $x = 0$ равна S_0 , длина неусеченной пирамиды l_0 .

2.14. На однородный цилиндрический стержень с прямоугольным поперечным сечением (рис.1.12, а) действует продольная сила $F\mathbf{e}_x$, приложенная к свободному торцу $x = 0$, а другой торец закреплен. Если сила F меньше некоторой критической величины F_k , то стержень находится в состоянии устойчивого равновесия (относительно достаточно малых поперечных возмущений) и остается прямолинейным. В случае $F > F_k$ прямолинейная форма становится неустойчивой и происходит изгиб стержня. Определить величину критической силы F_k .

2.15. Найти собственные частоты поперечных колебаний упругого стержня ($0 < x < l$) с прямоугольным поперечным сечением (рис.1.12, а), если: 1) его торцы жестко закреплены; 2) торец $x = 0$ жестко закреплен, а торец $x = l$ свободен; 3) оба торца закреплены шарнирно.

2.16. Найти частоты собственных крутильных колебаний однородного упругого вала ($0 < x < l$), торец $x = 0$ которого

закреплен жестко, а торец $x = l$ — упруго посредством спиральной пружины с коэффициентом жесткости k .

2.17. На торце $x = l$ круглого вала ($0 < x < l$) имеется тонкий диск с осевым моментом инерции K_0 . 1) Торец $x = 0$ неподвижен, а торец $x = l$ закреплен посредством спиральной пружинки с коэффициентом упругости k ; 2) торец $x = 0$ свободен, а торец $x = l$ закреплен посредством спиральной пружинки с коэффициентом упругости k ; 3) торец $x = 0$ закреплен посредством спиральной пружинки с коэффициентом упругости k . Найти частоты и амплитуды (с точностью до постоянного множителя) собственных крутильных колебаний вала. Сформулировать свойство ортогональности собственных функций соответствующей задачи на собственные значения.

2.18. Определить частоты собственных крутильных колебаний однородного упругого вала ($-l < x < l$), на каждом конце которого имеется тонкий диск с моментом инерции K .

2.19. Найти в акустическом приближении собственные частоты радиальных колебаний идеального газа в сферическом сосуде, радиус которого равен r_0 .

2.20. Решить следующие задачи на собственные значения:

$$\Delta R + \lambda R = 0, \quad r_1 < r < r_2, \quad \Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r},$$

$$1) R(r_1) = R(r_2) = 0; \quad 2) R(r_1) = R'(r_2) = 0;$$

$$3) R'(r_1) = R(r_2) = 0; \quad 4) R'(r_1) = R'(r_2) = 0,$$

и найти квадрат нормы собственных функций.

2.21. Найти в акустическом приближении собственные частоты радиальных колебаний идеального газа, заполняющего сферический слой ($r_1 < r < r_2$).

2.22. Определить частоты звуковых колебаний идеального газа в трубке ($0 < x < l$) (задача 1.299), имеющей форму усеченного кругового конуса с основаниями $S(0) = S_1$, $S(l) = S_2$, $S_1 < S_2$ (конический рожок).

2.23. Решить предыдущую задачу для трубки, площадь поперечного сечения которой равна $S(x) = S_0 e^{\alpha x}$ (экспоненциальный рожок).

2.24. Сосуд в форме прямоугольного параллелепипеда со сторонами l_1 , l_2 , l_3 заполнен идеальным газом. Найти частоты собственных звуковых колебаний газа.

2.25. Определить собственные частоты колебаний прямоугольной мембраны ($|x| < l_1$, $|y| < l_2$) с закрепленным краем. В случае $l_1 = l_2 = l$ найти узловые линии колебания с частотой: 1) $\pi a\sqrt{5}/(2l)$; 2) $\pi a\sqrt{5}/l$, если начальные скорости равны нулю, а начальные смещения такие, что: а) $u_0(x, y) = u_0(y, x)$; б) $u_0(x, y) = -u_0(y, x)$.

2.26. Определить собственные частоты колебаний квадратной мембраны со стороной l , три стороны которой закреплены, а четвертая свободна.

2.27. Найти собственные частоты электрических колебаний в линии без искажения длины l с заземленными концами.

2.28. Определить собственные частоты электрических колебаний в линии, длина которой l , с параметрами L, C ($R = G = 0$), если один конец линии заземлен непосредственно, а другой — через сосредоточенную: 1) индуктивность L_0 ; 2) емкость C_0 .

2.29. Определить плотность переменного тока в полупространстве (задача 1.462).

2.30. В однородном проводящем слое ($|z| < l$) течет переменный ток J (задача 1.463). Определить плотность тока j и удельное сопротивление ρ проводника при больших частотах ($pl \gg 1$).

2.31. Идеальная несжимаемая жидкость заполняет канал с прямоугольным поперечным сечением; длина канала l , глубина $h \gg l$. В результате внешнего воздействия на поверхность жидкости в ней возникают одномерные (вдоль канала) гравитационные волны малой амплитуды. Определить частоту и форму волн.

2.32. Определить частоты гравитационных волн малой амплитуды в идеальной несжимаемой жидкости, заполняющей прямоугольный бассейн: 1) бесконечной глубины; 2) конечной глубины h ($h \gg \lambda$).

2.33. Полупространство $z < 0$ заполнено идеальной несжимаемой жидкостью. Показать, что на ее поверхности могут распространяться волны малой амплитуды, и найти их скорость.

2.34. Решить предыдущую задачу для неограниченного бассейна, глубина которого h (h много больше длины волны).

2.35. Найти скорость гравитационных волн малой амплитуды, распространяющихся по поверхности раздела двух идеальных несжимаемых жидкостей, одна из которых имеет плотность ρ_1

и заполняет полупространство $z > 0$, а другая заполняет полупространство $z < 0$ и имеет плотность $\rho_2 > \rho_1$.

2.36. Вследствие вращения Земли происходит периодическое изменение уровня воды в водоемах, что приводит к возникновению приливных волн в каналах, сообщающихся с водоемами. Пусть в устье $x = l$ канала ($0 < x < l$), глубина которого $h \ll l$, уровень воды изменяется по закону $\zeta(l, t) = A \cos \omega t$. Считая воду идеальной несжимаемой жидкостью, определить установившиеся колебания воды в канале, если $\omega l \leq \sqrt{gh}$, а амплитуда $A \ll h$.

2.37. Диффузия нейтронов в однородном слое ($|x| < l$) сопровождается их поглощением ($\Sigma_c \ll \Sigma_s$); концентрация нейтронов на граничных плоскостях поддерживается при одном и том же постоянном значении. Найти отношение χ максимальной концентрации к ее среднему (по объему) значению, если процесс диффузии стационарен.

2.38. Стационарная диффузия нейтронов в однородном шаре, радиус которого r_0 , сопровождается их поглощением ($\Sigma_c \ll \Sigma_s$); на поверхности шара поддерживается постоянная концентрация нейтронов. Найти отношение χ максимальной концентрации к ее среднему (по объему) значению.

2.39. Слой ($0 < x < l$) однородного замедлителя, слабо поглощающего нейтроны ($\Sigma_c \ll \Sigma_s$), находится в вакууме. Внутрь слоя в единицу времени через единицу площади поверхности $x = 0$ поступает q_0 нейтронов. Решить задачу стационарной диффузии при условии: 1) для плотности потока $\Phi(x)$ нейтронов на экстраполированной границе $x = \tilde{l}$; 2) для односторонней плотности тока нейтронов на поверхности $x = 0$. Сравнить результаты.

2.40. Шар, радиус которого r_0 , изготовлен из замедлителя, слабо поглощающего нейтроны ($\Sigma_c \ll \Sigma_s$), и находится в вакууме. В центре шара действует точечный изотропный источник нейтронов мощности Q_0 . Решить задачу стационарной диффузии при условии: 1) для плотности потока $\Phi(r)$ нейтронов на экстраполированной границе $r = \tilde{r}_0$; 2) для односторонней плотности тока нейтронов на поверхности $r = r_0$. Сравнить результаты.

2.41. Образец в форме шара помещен в изотропное нейтронное поле Φ_0 . При условиях задачи 1.249 найти плотность потока нейтронов $\Phi(r)$ в шаре и вычислить отношение числа нейтронов,

прошедших образец (без поглощения), к числу нейтронов на поверхности S образца (коэффициент прохождения),

$$\gamma = \frac{4}{\Phi_0 S} \int_S \left(\frac{\Phi}{4} - \frac{D}{2} \frac{\partial \Phi}{\partial n} \right) ds. \quad (2.18)$$

2.42. Слой ($|x| < l$) находится в изотропном нейтронном поле Φ_0 . При условиях задачи 1.249 найти плотность потока нейтронов $\Phi(x)$ в слое и вычислить коэффициент прохождения γ (2.18).

2.43. В тонком цилиндрическом образце ($|x| < l$) с непроницаемой боковой поверхностью происходит диффузия нейтронов с размножением. Определить в диффузионном приближении критическую длину образца, поставив условие: 1) для плотности потока $\Phi(r)$ нейтронов на экстраполированной границе; 2) для односторонней плотности тока нейтронов на торцах образца.

2.44. В среде, занимающей область Ω , происходит диффузия нейтронов с размножением. Найти в диффузионном приближении критический размер области, если она представляет собой: 1) слой; 2) бесконечно длинный брус с квадратным поперечным сечением; 3) куб, поставив условия а) для плотности потока Φ нейтронов на экстраполированной границе и б) для односторонней плотности тока нейтронов на поверхности Ω .

2.45. Найти в диффузионном приближении критический радиус сферического реактора, находящегося в вакууме, поставив условия 1) для плотности потока нейтронов на экстраполированной границе и 2) для односторонней плотности тока нейтронов на поверхности реактора.

2.46. Внутри сферического реактора ($r < r_2$) имеется сферическая полость ($r < r_1 < r_2$). Определить в диффузионном приближении критический радиус r_2 , поставив условие для плотности потока нейтронов на экстраполированной границе.

2.47. Внутри сферического реактора ($r < r_2$) находится сильный поглотитель — «черное» тело в форме шара ($r < r_1 < r_2$). Найти в диффузионном приближении критический радиус r_2 , поставив условие для плотности потока нейтронов на экстраполированной границе реактора.

2.48. Сферический реактор, радиус которого r_0 , окружен отражателем в форме сферического слоя ($r_0 < r < r_1$), где r_1 есть

экстраполированный радиус. Сечения поглощения и рассеяния соответственно равны Σ_a^C и Σ_s^C в активной зоне, Σ_c^R и Σ_s^R в отражателе. Определить в диффузионном приближении критический радиус r_{0k} реактора, поставив условие для плотности потока нейтронов на внешней экстраполированной границе реактора. При условии $D_C = D_R$ рассмотреть случаи: 1) $r_1 = \infty$; 2) $\Sigma_c^R = 0$, и сравнить критический радиус r_{0k} с критическим радиусом r_k «голового» реактора (см. задачу 2.45, п. 1).

2.49. Реактор в форме параллелепипеда ($|x| < l_1$, $|y| < l_2$, $|z| < l_3$) с торцевыми отражателями ($|x| < l_1$, $|y| < l_2$, $l_3 < |z| < d$) находится в критическом состоянии. Получить в диффузионном приближении условие критичности, если сечения поглощения и рассеяния соответственно равны Σ_a^C и Σ_s^C в активной зоне, Σ_c^R и Σ_s^R в отражателе. Условие для плотности потока нейтронов поставить на внешней экстраполированной границе, допуская, что экстраполированные длины $\tilde{l}_1, \tilde{l}_2$ для реактора и отражателя одинаковы.

2.50. Найти в диффузионно-возрастном приближении критические размеры: 1) слоя ($|x| < l$); 2) куба ($|x| < l$, $|y| < l$, $|z| < l$), поставив условие для плотности потока нейтронов на экстраполированной границе; делением быстрыми нейтронами пренебречь.

2.51. Найти в диффузионно-возрастном приближении критический радиус сферического реактора, поставив условие для плотности потока нейтронов на экстраполированной границе; делением быстрыми нейтронами пренебречь.

2.52. Решить задачу 2.50, учитывая деление ядер быстрыми нейтронами.

2.53. Определить критический радиус сферического реактора (см. задачу 2.51) с учетом деления, осуществляемого быстрыми нейтронами.

2.54. Проводящий слой, ограниченный плоскостями $x = \pm l$, находится в продольном однородном магнитном поле. В момент времени $t = 0$ поле отключается. Определить характерное время убывания t_k поля в проводнике.

2.55. Длинный цилиндрический проводник с прямоугольным поперечным сечением ($|x| < l_1$, $|y| < l_2$) находится в продольном однородном магнитном поле. В момент времени $t = 0$ поле отключается. Найти характерное время убывания t_k поля в проводнике.

2.56. Найти частоты собственных колебаний электромагнитного поля в резонаторе, имеющем форму параллелепипеда со сторонами l_1, l_2, l_3 .

2.57. Решить задачу о распространении TE - и TM -волн вида

$$\mathbf{E} = \mathcal{E}(x)e^{i(\beta z - \omega t)}, \quad \mathbf{H} = \mathcal{H}(x)e^{i(\beta z - \omega t)} \quad (2.19)$$

в пространстве между идеально проводящими параллельными плоскостями $x = 0$ и $x = l$. Пропускает ли такой волновод TEM -волну?

2.58. Показать, что в идеально проводящем волноводе с прямоугольным поперечным сечением ($|x| < l_1, |y| < l_2$) могут распространяться TE - и TM -волны. Найти наименьшую частоту (частоту отсечки) волны, которую пропускает волновод.

2.59. Оптический волновод (см. задачу 1.475) состоит из трех различных слоев с показателями преломления $n_1 > n_2 \geq n_3$, соответственно, при $-l < z < 0, z < -l, z > 0$. Решить задачу о распространении TE - и TM -мод вида (2.19). Доказать, что нетривиальное решение существует тогда и только тогда, когда величины β и $k = \omega/c$ удовлетворяют некоторому уравнению, называемому характеристическим. Показать, что это уравнение имеет счетное множество решений $\beta = \varphi_j(k)$, $j \in \mathbb{N}$, каждому из которых соответствует направляемая мода, и построить графики функций $\beta = \varphi_j(k)$. Найти частоту отсечки j -й моды и определить число мод с фиксированной частотой, которые пропускает волновод.

2.60. Найти компоненты электромагнитного поля в TE - и TM -модах вида (2.19), распространяющихся в трехслойном волноводе (см. предыдущую задачу), если средний по времени поток энергии (на единицу длины оси Oy) вдоль оси Oz в направляемой моде равен W_0 .

2.61. Решить задачу о распространении TE - и TM -мод в плоском симметричном световоде (см. задачу 1.475). Определить отношение средних по времени потоков энергии (на единицу длины оси Oy) в направлении оси Oz — потока в сердцевине (W_1) и полного потока (W) для каждой моды ($P_1 = W/W_1$ — коэффициент локализации). Показать, что направляемая мода, частота которой велика по сравнению с частотой отсечки, локализуется в сердцевине волновода.

Пример 2.2. Найти волновые функции и уровни энергии стационарных состояний частицы в потенциальном ящике (1.32). Вычислить среднее значение ее координаты x_{cp} в n -м состоянии.

Задача состоит в определении собственных значений и собственных функций оператора $\mathcal{H}$. В самом деле, подстановка функции $\Psi(\mathbf{r}, \mathbf{t}) = \psi(\mathbf{r})T(t)$ в уравнение Шредингера, $i\hbar\Psi_t = \mathcal{H}\Psi$, приводит к тождеству

$$i\hbar \frac{T'}{T} = \frac{\mathcal{H}\psi}{\psi} = E.$$

Следовательно, уравнение $\mathcal{H}\psi = E\psi$ и условия, которым удовлетворяет функция ψ , представляют собой задачу на собственные значения для оператора $\mathcal{H}$. Пусть числа E_n и функции ψ_n определены, тогда $T_n = A_n \exp(-iE_n t/\hbar)$ и $\Psi_n = \psi_n T_n$. Плотность вероятности $|\Psi_n|^2 = |\psi_n|^2 |T_n|^2 = |\psi_n|^2$ не зависит от времени, то есть волновая функция $\Psi_n(\mathbf{r}, \mathbf{t})$ описывает стационарное состояние с энергией E_n .

В данном случае задача на собственные значения имеет вид (см. пример 1.10)

$$\begin{aligned} \psi'' + k^2\psi &= 0, \quad -l < x < l, \quad k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}, \\ \psi(-l) &= \psi(l) = 0. \end{aligned}$$

Ненулевое решение $\psi(x) = A \sin k(l+x) + B \cos k(l+x)$ должно удовлетворять граничным условиям $\psi(-l) = B = 0$, $\psi(l) = A \sin 2kl = 0$. Так как $A \neq 0$, то $2kl = \pi n$. Таким образом,

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{l}} \sin \frac{\pi n}{2} \left(1 + \frac{x}{l}\right), \quad E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{8ml^2} n^2, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Среднее значение

$$x_{cp} = \int_{-l}^l x |\psi_n|^2 dx = 0.$$

2.62. Определить волновые функции и уровни энергии стационарных состояний частицы, находящейся: 1) в двумерном; 2) в трехмерном потенциальном ящике.

2.63. В точке $x = 0$ потенциальной ямы (1.32) находится полупроницаемая потенциальная перегородка с коэффициентом проницаемости α (предельная форма прямоугольного потен-

циального барьера между точками $x = -\varepsilon$, $x = \varepsilon$ при $\varepsilon \rightarrow 0$, если $2mU\varepsilon/\hbar^2 = \alpha$, где U — высота барьера). Определить уровни энергии и волновые функции стационарных состояний частицы в таком поле.

2.64. Найти уровни энергии связанных состояний частицы в потенциальной яме вида

$$U(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0, \\ 0, & 0 < x < l, \\ U_0, & l < x, \end{cases}$$

где $U_0 > 0$. Показать, что число таких уровней конечно. При каком условии не существует связанных состояний?

2.65. Найти уровни энергии связанных состояний частицы в потенциальной яме вида

$$U(x) = \begin{cases} 0, & |x| < l, \\ U_0, & |x| > l, \end{cases}$$

где $U_0 > 0$. Показать, что число связанных состояний конечно и при любом $U_0 > 0$ имеется связанное состояние. При каком условии в яме существует только один энергетический уровень?

2.66. Пусть $\Delta_1 = (-l_1, 0)$, $\Delta_2 = (0, l_2)$, $\Delta = \Delta_1 \cup \Delta_2$,

$$D(x) = \begin{cases} D_1, & x \in \Delta_1, \\ D_2, & x \in \Delta_2, \end{cases} \quad C(x) = \begin{cases} C_1, & x \in \Delta_1, \\ C_2, & x \in \Delta_2. \end{cases}$$

На линейном множестве $\mathcal{M}_{\mathcal{L}}$ функций $X(x)$, принадлежащих классу $C^2(\Delta_1) \cap C^2(\Delta_2) \cap C^1(\overline{\Delta_1}) \cap C^1(\overline{\Delta_2})$ и таких, что

$$\begin{aligned} X'(-l_1) = X'(l_2) = 0, \\ \frac{1}{C_1}X(-0) = \frac{1}{C_2}X(+0), \quad D_1X'(-0) = D_2X'(+0), \end{aligned} \quad (2.20)$$

задан оператор

$$\mathcal{L} = -\frac{d}{dx}D(x)\frac{d}{dx}.$$

Доказать, что оператор $\mathcal{L}$ обладает простыми собственными значениями $0 = \lambda_0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots$, а его собственные функции ортогональны на Δ с весом $\rho(x) = 1/c(x)$. Найти собственные функции и собственные значения оператора $\mathcal{L}$.

2.67. Решить предыдущую задачу, заменив (2.20) условиями

$$D_1X'(-0) = D_2X'(+0) = \alpha \left(\frac{X(+0)}{C_2} - \frac{X(-0)}{C_1} \right), \quad \alpha > 0.$$

2.68. Идеальная несжимаемая жидкость заполняет полупространство $z < 0$. По поверхности вдоль оси Ox распространяется гравитационная волна, профиль которой не зависит от y , а амплитуда мала по сравнению с длиной. Найти траектории частиц в волне.

2.69. В идеальной несжимаемой жидкости, занимающей все пространство, в момент $t = 0$ мгновенно образуется сферическая полость, радиус которой a . Найти время τ , в течение которого жидкость заполнит полость.

Пример 2.3. Струна ($0 < x < l$) с закрепленными концами находится в статическом равновесии под действием постоянной силы $F_0 \mathbf{e}_u$, приложенной в точке $x_0 \in (0, l)$. В момент времени $t = 0$ действие силы прекращается. *Найти форму струны в момент времени $t > 0$.*

Функция $u(x, t)$ является решением задачи

$$\begin{aligned} u_{tt} &= a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) &= u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) &= u_0(x), \quad u_t(x, 0) = 0, \end{aligned}$$

где $u_0(x)$ удовлетворяет условиям

$$\begin{aligned} u_0'' + \frac{F_0}{T_0} \delta(x - x_0) &= 0, \quad 0 < x < l, \\ u_0(0) &= u_0(l) = 0. \end{aligned}$$

Решение задачи построено в примере 2.1; оно представляет собой ряд (2.14), коэффициенты которого вычисляются по формулам (2.14)

$$A_n = \frac{2}{l} (u_0, X_n), \quad B_n = 0.$$

Для определения A_n не обязательно отыскивать $u_0(x)$ в явном виде; достаточно применить свойство (10.34) оператора $\mathcal{L} = -\frac{d^2}{dx^2}$ и воспользоваться уравнением (2.13):

$$\begin{aligned} A_n &= -\frac{2}{l\lambda_n} (u_0, X_n'') = -\frac{2}{l\lambda_n} (u_0'', X_n(x)) = \\ &= \frac{2}{l\lambda_n} \left(\frac{F_0}{T_0} \delta(x - x_0), X_n(x) \right) = \frac{2F_0 X_n(x_0)}{lT_0 \lambda_n}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$u(x, t) = \frac{2lF_0}{\pi^2 T_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{\pi n x_0}{l} \sin \frac{\pi n x}{l} \cos \frac{\pi n a t}{l}.$$

Решить задачи 2.70–2.100 о движении однородной струны, линейная плотность которой ρ , натяжение T ; коэффициент пропорциональности упругих сил равен k , сил сопротивления — α .

2.70. Начальные условия для струны ($-l < x < l$) с закрепленными концами заданы: 1) скорость равна нулю, отклонение $u_0 \sin \frac{3\pi x}{l} \cos \frac{\pi x}{l}$; 2) отклонение равно нулю, а скорость $v_0 \sin \frac{3\pi x}{l} \cos \frac{\pi x}{l}$.

2.71. Начальная скорость струны ($-l < x < l$) с закрепленными концами равна нулю, а начальное отклонение от равновесного положения: 1) $\frac{h}{l^2}(l^2 - x^2)$; 2) $\frac{4h}{l^2}(l - |x|)$.

2.72. Начальное отклонение струны ($-l < x < l$) с закрепленными концами $h\left(1 - \left|\frac{2|x|}{l} - 1\right|\right) \operatorname{sign} x$, а начальная скорость равна нулю.

2.73. Начальное отклонение струны ($0 < x < l$) с закрепленными концами равно нулю, а начальная скорость равна $\frac{v_0 x(x-l)(x^2 - xl - l^2)}{12l^4}$.

2.74. Начальное отклонение струны ($0 < x < l$), конец $x = 0$ которой закреплен, а конец $x = l$ свободен, равно нулю, а начальная скорость $\frac{v_0 x(x^3 - 4x^2 l + 8l^2)}{12l^4}$.

2.75. Начальное отклонение струны ($-l < x < l$) с закрепленными концами равно нулю, а начальная скорость $\frac{v_0(l - |x|)}{l}$.

2.76. Начальное отклонение струны ($-l < x < l$) со свободными концами равно нулю, а начальная скорость $\frac{v_0 x}{l}$.

2.77. Начальное отклонение неподвижной струны ($0 < x < l$), конец $x = 0$ которой закреплен, а конец $x = l$ свободен, равно $\frac{hx}{l}$.

2.78. Начальное отклонение неподвижной струны ($0 < x < l$) с закрепленными концами имеет форму параболы, координаты вершины которой $x = \frac{h}{2}, u = h$.

2.79. Неподвижная струна ($0 < x < l$), расположенная на оси Ox , получает в момент $t = 0$ импульс $I\mathbf{e}_u$ в результате удара в точку $x = \frac{l}{2}$. 1) Концы струны закреплены; 2) конец $x = 0$ закреплен, конец $x = l$ — свободен; 3) конец $x = 0$ закреплен жестко, конец $x = l$ — упруго; 4) конец $x = 0$ свободен, конец $x = l$ закреплен упруго.

2.80. Неподвижная струна ($-l < x < l$) со свободными концами, расположенная на оси Ox , получает в момент $t = 0$ импульс $I\mathbf{e}_u$ в результате удара в точку $x = 0$.

2.81. Неподвижная струна ($0 < x < l$) со свободными концами, расположенная на оси Ox , получает в момент $t = 0$ импульс $I\mathbf{e}_u$ в результате удара в точку $x \in [0; l]$.

2.82. Неподвижная струна ($-l < x < l$) со свободными концами, расположенная на оси Ox , получает в момент $t = 0$ в результате ударов в точки $x = -\frac{l}{2}$ и $x = \frac{l}{2}$ импульсы $I_1\mathbf{e}_u$ и $I_2\mathbf{e}_u$ соответственно, где: 1) $I_1 = I_2 = I$; 2) $-I_1 = I_2 = I$.

2.83. Струна ($0 < x < l$) с закрепленным концом $x = 0$ находится в статическом равновесии под действием силы $F_0\mathbf{e}_u$, приложенной в точке $x = \frac{l}{2}$. Конец $x = l$: 1) закреплен; 2) свободен. В момент $t = 0$ действие силы прекращается.

2.84. Струна ($0 < x < l$), конец $x = l$ которой упруго закреплен, находится в статическом равновесии под действием силы $F_0\mathbf{e}_u$, приложенной в точке $x = \frac{l}{2}$. Конец $x = 0$: 1) закреплен жестко; 2) свободен. В момент $t = 0$ действие силы прекращается.

2.85. Струна ($0 < x < l$) находится в статическом равновесии под действием силы $F_0\mathbf{e}_u$, приложенной в точке $x = x_0$, при следующих условиях на концах и значениях x_0 : 1) $x = 0$ свободен, $x = l$ закреплен, $x_0 = 0$; 2) $x = 0$ свободен, $x = l$ закреплен упруго, $x_0 = 0$; 3) $x = 0$ закреплен упруго, $x = l$ закреплен жестко, $x_0 = 0$; 4) $x = 0$ закреплен упруго, $x = l$ свободен, $x_0 = l$. В момент $t = 0$ действие силы прекращается.

2.86. Струна ($-l < x < l$) с закрепленными концами находится в статическом равновесии под действием силы $F_0 \mathbf{e}_u$, приложенной в точке $x = 0$. В момент $t = 0$ действие силы прекращается, а концы освобождаются.

2.87. Струна ($-l < x < l$) находится в статическом равновесии под действием поперечной сосредоточенной силы, приложенной в точке $x = 0$, отклонение которой h . В момент $t = 0$ действие силы прекращается. 1) Концы струны закреплены; 2) один конец ($x = -l$) закреплен, а другой свободен.

2.88. Струна ($-l < x < l$) с закрепленными концами находится в статическом равновесии под действием трех сил: $-F_0 \mathbf{e}_u$ в точке $x = -\frac{l}{2}$, $2F_0 \mathbf{e}_u$ в точке $x = 0$, $-F_0 \mathbf{e}_u$ в точке $x = \frac{l}{2}$. В момент $t = 0$ действие сил прекращается.

2.89. Решить предыдущую задачу, если в момент времени $t = 0$ наряду с прекращением действия сил становятся свободными концы струны.

2.90. Струна ($-l < x < l$) со свободными концами находится в статическом равновесии под действием сил $-F_0 \mathbf{e}_u$ и $F_0 \mathbf{e}_u$, приложенных в точках $x = -\frac{l}{2}$ и $x = \frac{l}{2}$ соответственно. В момент $t = 0$ действие сил прекращается; начальное отклонение точки $x = -l$ равно h .

2.91. Струна ($-l < x < l$) со свободными концами находится в статическом равновесии под действием сил $F_0 \mathbf{e}_u$, $F_0 \mathbf{e}_u$ и $-2F_0 \mathbf{e}_u$, приложенных в точках $x = -\frac{l}{2}$, $x = \frac{l}{2}$ и $x = 0$ соответственно. В момент $t = 0$ действие сил прекращается; начальное отклонение точки $x = 0$ равно h .

2.92. Струна ($0 < x < l$) с закрепленным концом $x = 0$ находится в статическом равновесии под действием силы $F_0 \mathbf{e}_u$, равномерно распределенной по струне. Конец $x = l$: 1) закреплен; 2) свободен; 3) закреплен упруго. В момент $t = 0$ действие силы прекращается.

2.93. Струна ($0 < x < l$), конец $x = l$ которой упруго закреплен, а конец $x = 0$ свободен, находится в статическом равновесии под действием силы $F_0 \mathbf{e}_u$, равномерно распределенной по струне. В момент $t = 0$ действие силы прекращается.

2.94. Струна ($0 < x < l$) с закрепленными концами находится в статическом равновесии под действием силы; ее линейная плотность равна $\frac{F_0}{l^3}x(l-x)\mathbf{e}_u$. В момент $t = 0$ действие силы прекращается.

2.95. Струна ($0 < x < l$), конец $x = 0$ которой закреплен, а конец $x = l$ свободен, находится в статическом равновесии под действием силы, линейная плотность которой $\frac{F_0}{l^3}x(2l-x)\mathbf{e}_u$. В момент $t = 0$ действие силы прекращается.

2.96. Струна ($0 < x < l$) с упруго закрепленными концами (посредством одинаковых пружинок): 1) находится в статическом равновесии под действием силы $F_0\mathbf{e}_u$, приложенной в точке $x_0 \in (0; l)$ до момента $t = 0$; 2) получает импульс I в результате удара в точку $x_0 \in (0; l)$.

2.97. На струну ($0 < x < l$) с закрепленными концами действуют силы упругости; начальное отклонение струны $u_0 \sin \frac{\pi x}{l}$, начальная скорость равна нулю.

2.98. На струну ($0 < x < l$), конец $x = 0$ которой закреплен, а конец $x = l$ свободен, действуют силы упругости; начальное отклонение струны $u_0 \cos \frac{\pi x}{2l}$, начальная скорость равна нулю.

2.99. На струну ($0 < x < l$) с закрепленными концами действует сила сопротивления, пропорциональная скорости; начальное отклонение струны равно нулю, начальная скорость $v_0 \sin \frac{2\pi x}{l}$.

2.100. На струну ($0 < x < l$), конец $x = 0$ которой закреплен, а конец $x = l$ свободен, действует сила сопротивления, пропорциональная скорости; начальное отклонение струны равно нулю, начальная скорость $v_0 \cos \frac{3\pi x}{2l}$.

Пример 2.4. Неподвижный недеформированный стержень ($0 < x < l$) со свободными торцами получает в момент $t = 0$ импульс $I\mathbf{e}_x$ в результате продольного удара в торец $x = 0$. Решить задачу о движении стержня, если на его боковую поверхность действует сила сопротивления, пропорциональная скорости; коэффициент пропорциональности на единицу площади поверхности равен α , площадь S и периметр P поперечного сечения суть постоянные величины.

В примере 1.1 и в задаче 1.1 содержатся уравнения, которым удовлетворяет функция $u(x, t)$, описывающая смещения сечений стержня:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= a^2 u_{xx} - \beta u_t, \quad a^2 = \frac{E}{\rho}, \quad \beta = \frac{\alpha P}{\rho S}, \\ u_x(0, t) &= u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) &= 0, \quad u_t(x, 0) = \frac{I}{\rho S} \delta(x). \end{aligned}$$

Основой метода Фурье, изложенного в примере 2.1, является построение решений вида $u(x, t) = X(x)T(t)$, удовлетворяющих граничным условиям. Такие решения существуют, если выполняются тождества, получающиеся подстановкой $u = XT$ в уравнение и в граничные условия:

$$\begin{aligned} \frac{T''(t)}{T(t)} &= a^2 \frac{X''(x)}{X(x)} - \beta \frac{T'(t)}{T(t)}, \\ X'(0)T(t) &= X'(l)T(t) = 0. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что $X(x)$ — решение задачи на собственные значения,

$$\begin{aligned} X'' + \lambda X &= 0, \quad 0 < x < l, \\ X'(0) &= X'(l) = 0, \end{aligned}$$

а $T(t)$ — решение уравнения $T'' + \beta T' + a^2 \lambda T = 0$. В данном случае $\lambda = 0$ — собственное значение, которому соответствует решение $X_0 = A_0 + B_0 x$; граничным условиям удовлетворяет функция $X_0 = A_0$. При $\lambda > 0$ решение $X = A \cos \sqrt{\lambda} x + B \sin \sqrt{\lambda} x$ удовлетворяет граничным условиям, если $B = 0$, $\sqrt{\lambda} = \frac{\pi n}{l}$. Так как собственные функции определены с точностью до произвольного постоянного множителя, то можно считать, что $X_n(x) = \cos \sqrt{\lambda_n} x$, $\lambda_n = \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2$, $n \in \mathbb{N}_0$. Каждому λ_n соответствует решение уравнения для T : если $\lambda = 0$, то $T_0(t) = C_0 t + D_0$, если $\lambda > 0$, то $T_n(t) = C_n e^{k_1 t} + D_n e^{k_2 t}$,

где $k_{1,2} = -\frac{\beta}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\beta}{2}\right)^2 - \left(\frac{a\pi n}{l}\right)^2}$.

Решение задачи выражается рядом с общим членом $X_n T_n$. Пусть $\frac{\beta}{2} < \frac{a\pi}{l}$ (другие случаи в задаче 2.120). Тогда

$$u(x, t) = A_0 + B_0 e^{-\beta t} + e^{-\frac{\beta t}{2}} \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t) X_n(x),$$

где $\omega_n = \sqrt{\left(\frac{a\pi n}{l}\right)^2 - \left(\frac{\beta}{2}\right)^2}$. Начальные условия будут выполнены, если

$$A_0 + B_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n X_n(x) = 0 \implies A_0 + B_0 = 0, A_n = 0,$$

$$-\beta B_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \omega_n B_n X_n(x) = \frac{I\delta(x)}{\rho S} \implies -\beta B_0 l = \frac{I}{\rho S}, B_n \omega_n \frac{l}{2} = \frac{I}{\rho S}.$$

Построение решения завершено:

$$u(x, t) = \frac{I}{\beta m} \left[1 - e^{-\beta t} + 2\beta \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{\pi n x}{l} \sin \omega_n t}{\omega_n} \right],$$

где $m = \rho l S$ — масса стержня.

Решить задачи 2.101–2.121 о движении однородной струны, линейная плотность которой ρ , натяжение T ; коэффициент пропорциональности упругих сил равен k , сил сопротивления — α .

2.101. Начальные отклонения сечений стержня с закрепленными торцами равны нулю, начальные скорости $v_0 \sin^5 \frac{\pi x}{l}$.

2.102. Торце $x = 0$ стержня закреплен, торец $x = l$ свободен; начальные отклонения сечений стержня равны нулю, начальные скорости $v_0 \sin^3 \frac{\pi x}{2l}$.

2.103. Торце $x = 0$ стержня свободен, торец $x = l$ закреплен; начальные отклонения сечений стержня равны $u_0 \cos^3 \frac{5\pi x}{2l}$, начальные скорости равны нулю.

2.104. Торцы стержня свободны; начальные скорости сечений равны нулю, начальные отклонения: 1) $u_0 \cos^2 \frac{3\pi x}{l}$; 2) $u_0 \cos^3 \frac{2\pi x}{l}$.

2.105. Торцы стержня свободны; начальные отклонения сечений равны нулю, начальные скорости: 1) $v_0^2 \sin^2 \frac{3\pi x}{2l}$; 2) $v_0 \cos^4 \frac{3\pi x}{l}$.

2.106. Начальные отклонения сечений стержня с закрепленными торцами $u_0 \frac{u_0 x(l-x)}{l^2}$, а начальные скорости равны нулю.

2.107. Торец $x = 0$ стержня закреплен, а торец $x = l$ свободен; начальные скорости сечений стержня $\frac{v_0 x(2l - x)}{l^2}$, начальные отклонения равны нулю.

2.108. Начальные отклонения сечений стержня с закрепленными торцами: 1) $u_0 \frac{x}{l} \sin \frac{\pi x}{l}$; 2) $u_0 \frac{x}{l} \cos \frac{\pi x}{2}$, а начальные скорости равны нулю.

2.109. Горизонтальная платформа с идеально гладкой поверхностью и расположенный на ней недеформированный стержень движутся вдоль оси Ox с постоянной скоростью v . В момент $t = 0$ платформа мгновенно останавливается. Торцы стержня: 1) свободны; 2) закреплены; 3) $x = 0$ закреплен, $x = l$ свободен; 4) $x = 0$ закреплен жестко, $x = l$ упруго; 5) $x = 0$ свободен, а торец $x = l$ закреплен упруго.

2.110. Стержень получает импульс $I\mathbf{e}_x$ в результате продольного удара в свободный торец $x = 0$; торец $x = l$: 1) закреплен жестко; 2) закреплен упруго. До удара стержень был неподвижен и не деформирован.

2.111. Неподвижный однородный стержень, расположенный на гладкой горизонтальной поверхности, получает импульс I в результате продольного удара в торец $x = 0$.

2.112. Стержень с закрепленным торцом $x = 0$ находится в статическом равновесии под действием продольной силы, приложенной к торцу $x = l$, отклонение которого u_0 . В момент $t = 0$ действие силы прекращается.

2.113. Вертикальный стержень расположен в поле тяжести ($\mathbf{e}_x = -\mathbf{e}_g$) и находится в статическом равновесии; нижний торец $x = 0$ закреплен, а на верхнем имеется груз, вес которого P . В момент $t = 0$ груз снимают. В качестве переменной Лагранжа взять равновесное положение сечения в поле тяжести ненагруженного стержня.

2.114. Стержень, торец $x = 0$ которого упруго закреплен, находится в статическом равновесии под действием силы $F_0 \mathbf{e}_x$, приложенной к свободному торцу $x = l$. В момент $t = 0$ действие силы прекращается.

2.115. Стержень, торец $x = l$ которого упруго закреплен, находится в статическом равновесии под действием силы $F_0 \mathbf{e}_x$,

приложенной к этому же торцу. Торец $x = 0$: 1) закреплен жестко; 2) свободен. В момент $t = 0$ действие силы прекращается.

2.116. Стержень находится в равновесии под действием сил $F_0 \mathbf{e}_x$ и $-F_0 \mathbf{e}_x$, приложенных к торцам $x = 0$ и $x = l$ соответственно; отклонение торца $x = l$ равно u_0 . В момент $t = 0$ действие сил прекращается.

2.117. Стержень находится в равновесии под действием продольных сил, приложенных к торцам $x = 0$ и $x = l$, отклонения которых u_1 и u_2 соответственно. В момент $t = 0$ действие сил прекращается.

2.118. На боковую поверхность стержня с закрепленными торцами действует сила сопротивления, пропорциональная скорости; начальные отклонения сечений $u_0 \sin \frac{2\pi x}{l}$, начальные скорости равны нулю.

2.119. На боковую поверхность стержня, торец $x = 0$ которого закреплен, а торец $x = l$ свободен, действует сила сопротивления, пропорциональная скорости; начальные отклонения сечений $u_0 \cos \frac{\pi x}{2l}$, начальные скорости равны нулю.

2.120. Решить задачу из примера 2.4 при $\frac{\beta}{2} \geq \frac{a\pi}{l}$.

2.121. Торцы стержня закреплены упруго посредством одинаковых пружинок. Сила $F_0 \mathbf{e}_x$ приложена к торцу $x = 0$, стержень находится в равновесии. С момента $t = 0$ действие силы прекращается.

2.122. Однородный цилиндрический стержень ($0 < x < l$), торцы которого закреплены упруго посредством пружинок с коэффициентами жесткости k_1 (при $x = 0$) и k_2 (при $x = l$), получает импульс I в результате продольного удара в торце $x = 0$. Решить задачу о движении стержня, если до удара он не был деформирован и находился в покое.

Пример 2.5. Решить задачу о вращательном движении однородного круглого вала ($0 < x < l$), торец $x = 0$ которого свободен, а торец $x = l$ упруго закреплен посредством спиральной пружины с коэффициентом жесткости k . Вал находится в статическом равновесии под действием момента сил, линейная плотность которого $M_0 \mathbf{e}_x$. Начиная с $t = 0$ действие сил прекращается.

Решение. Условием задачи соответствует следующая модель для угла поворота $u(x, t)$ сечения вала (см. пример 1.4 и задачу 1.59, п. 1):

$$\begin{aligned} u_{tt} &= a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u_x(0, t) &= 0, \quad u_x(l, t) + hu(l, t) = 0, \quad h = \frac{k}{JG}, \\ u(x, 0) &= u_0(x), \quad u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

Начальное смещение сечения — решение стационарной задачи

$$\begin{aligned} u_0''(x) + \frac{M_0}{JG} &= 0, \quad 0 < x < l, \\ u_0'(0) &= 0, \quad u_0'(l) + hu_0(l) = 0, \end{aligned}$$

откуда $u_0(x) = \frac{M_0}{2JG}(l^2 - x^2 + \frac{2l}{h})$.

Как и в примере 2.1, построение решения методом Фурье $u(x, t) = X(x)T(t)$, сводится к уравнению $T'' + a^2\lambda T = 0$ и к задаче на собственные значения

$$\begin{aligned} X'' + \lambda X &= 0, \quad 0 < x < l, \\ X'(0) &= 0, \quad X'(l) + hX(l) = 0. \end{aligned}$$

Общее решение уравнения этой задачи $X = A \cos \sqrt{\lambda}x + B \sin \sqrt{\lambda}x$ удовлетворяет граничным условиям, если $B = 0$, а λ — корень уравнения $-A\sqrt{\lambda} \sin \sqrt{\lambda}l + Ah \cos \sqrt{\lambda}l = 0$. При $A = 1$ собственные функции $X_n(x) = \cos \frac{\mu_n x}{l}$, где $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \sin \mu = p \cos \mu = 0$, $p = hl$. Каждому значению λ соответствует $T_n(t) = C_n e^{-a^2 \lambda_n t}$, так что решение поставленной задачи приобретает форму ряда по собственным функциям:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n X_n(x) e^{-a^2 \lambda_n t}.$$

При $t = 0$

$$u_0(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n X_n(x) \implies C_n = \frac{(u_0, X_n)}{\|X_n\|^2}.$$

Квадрат нормы собственной функции

$$\begin{aligned} \|X_n\|^2 &= \int_0^l \cos^2 \frac{\mu_n x}{l} dx = \frac{1}{2} \int_0^l \left(1 + \cos \frac{2\mu_n x}{l}\right) dx = \frac{1}{2} \left(l + \frac{l \sin 2\mu_n}{2\mu_n}\right) = \\ &= \frac{l}{2} \left(1 + \frac{2 \operatorname{tg} \mu_n}{2\mu_n(1 + \operatorname{tg}^2 \mu_n)}\right) = \frac{l}{2} \left(1 + \frac{p}{\mu_n^2 + p^2}\right) = \frac{l}{2} \frac{\mu_n^2 + p^2 + p}{\mu_n^2 + p^2}. \end{aligned}$$

При вычислении интеграла применено уравнение для μ_n в виде $\operatorname{tg} \mu = \frac{p}{\mu}$. Этот результат следует также из формулы (2.98).

Вычисление интеграла (u_0, X_n) проще выполнить, опираясь на условия, которым удовлетворяют функции X_n и u_0 ; при этом явный вид $u_0(x)$ не понадобится:

$$\begin{aligned} (u_0, X_n) &= -\frac{1}{\lambda_n} \int_0^l u_0 X_n'' dx = -\frac{1}{\lambda_n} \left[(u_0 X_n' - u_0' X_n) \Big|_0^l + \int_0^l u_0'' X_n dx \right] = \\ &= -\frac{1}{\lambda_n} \left[u_0(l) X_n(l) - u_0'(l) X_n(l) - u_0(0) X_n(0) + \right. \\ &\quad \left. + u_0'(0) X_n(0) - \frac{M_0}{JG} \int_0^l \cos \frac{\mu_n x}{l} dx \right] = \\ &= -\frac{1}{\lambda_n} (-h u_0(l) X_n(l) + h u_0(l) X_n(l) - \frac{M_0 l \sin \mu_n}{JG \mu_n}) = \frac{M_0 l^3 \sin \mu_n}{JG \mu_n^3}. \end{aligned}$$

Если учесть, что оператор $-\frac{d^2}{dx^2}$, определенный на функциях $X \in C^2[0; l]$, удовлетворяющих граничным условиям, эрмитов и что функция $u_0(x)$ принадлежит области определения оператора, то вычисление интеграла будет выглядеть так:

$$(u_0, X_n) = -\frac{1}{\lambda_n} (u_0, X_n'') = -\frac{1}{\lambda_n} (u_0'', X_n) = \frac{M_0}{\lambda_n JG} \int_0^l \cos \frac{\mu_n x}{l} dx.$$




Рис. 2.1

Значение $\sin \mu_n$ можно выразить через μ_n , привлекая графическое представление решения уравнения $\operatorname{tg} \mu = \frac{p}{\mu}$ (рис. 2.1). Отсюда вытекает, что

$$\sin \mu_n = \frac{(-1)^{n-1} \operatorname{tg} \mu_n}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \mu_n}} = \frac{(-1)^{n-1} p}{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}}.$$

Решение задачи найдено и имеет форму ряда,

$$u(x, t) = \frac{2pl^2 M_0}{JG} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \cos \frac{\mu_n x}{l} e^{-(\frac{a\mu_n}{l})^2 t}}{\mu_n^3 (\mu_n^2 + p^2 + p)}.$$

З а м е ч а н и е. Так как $\mu_n = O(n)$, $n \rightarrow \infty$, то для общего члена ряда справедлива оценка

$$O\left(\frac{1}{n^4}\right) e^{-(\frac{a\mu_n}{l})^2 t}, \quad n \rightarrow \infty.$$

Решить задачи 2.124–2.138 о вращательном движении однородного круглого вала ($0 < x < l$), радиус которого r_0 . Упругое закрепление торца осуществляется посредством спиральной пружины с коэффициентом упругости k , сила сопротивления, действующая на поверхность вала, пропорциональна скорости, коэффициент пропорциональности на единицу площади поверхности вала равен α .

2.123. Торец $x = 0$ вала закреплен, а торец $x = l$ свободен; начальные скорости сечений равны нулю, начальные смещения $\frac{u_0 x}{l}$.

2.124. Вал, торец $x = 0$ которого закреплен, а торец $x = l$ свободен, находится в статическом состоянии под действием момента сил, линейная плотность которого: 1) $M_0 \mathbf{e}_x$; 2) $M_0 \frac{x}{l} \mathbf{e}_x$. Начиная с $t = 0$ действие сил прекращается.

2.125. Вал с закрепленными торцами находится в равновесии под действием сосредоточенного момента сил, приложенного в сечении $x = x_0 \in (0; l)$, которое оказалось повернутым на угол u_0 . Начиная с $t = 0$ действие сил прекращается.

2.126. Решить предыдущую задачу, если торец $x = 0$ закреплен упруго.

2.127. Вал, торец $x = 0$ которого свободен, а торец $x = l$ закреплен упруго, находится в статическом состоянии под действием

сосредоточенного момента сил $M_0 \mathbf{e}_x$, приложенного к торцу: 1) $x = 0$; 2) $x = l$. Начиная с $t = 0$ действие сил прекращается.

2.128. Вал со свободными торцами находится в равновесии под действием равных и противоположно направленных моментов сил, приложенных к торцам, углы поворота которых u_1 (торец $x = 0$) и u_2 (торец $x = l$). Начиная с $t = 0$ действие сил прекращается.

2.129. Торец $x = 0$ вала свободен, а торец $x = l$ закреплен упруго. Начальные смещения сечений вала равны нулю, а начальные скорости сечений одинаковы и равны v_0 .

2.130. Неподвижный недеформированный вал, торец $x = 0$ которого закреплен, а торец $x = l$ свободен, получает момент количества движения P в результате мгновенного воздействия момента сил на торец $x = l$.

2.131. Решить предыдущую задачу для вала со свободными торцами.

2.132. Неподвижный недеформированный вал получает момент количества движения P в результате мгновенного воздействия момента сил на сечение $x = x_0 \in [0; l]$. Способ закрепления торцов:

- 1) $x = 0$ свободен, $x = l$ закреплен упруго, $x_0 = 0$;
- 2) $x = 0$ закреплен упруго, $x = l$ свободен, $x_0 = 0$;
- 3) $x = 0$ закреплен жестко, $x = l$ упруго, $x_0 = l$;
- 4) торцы закреплены упруго (коэффициенты упругости одинаковы), $x_0 = l$.

2.133. В результате мгновенного воздействия моментов сил на свободные торцы $x = 0$ и $x = l$ неподвижный недеформированный вал получает моменты количества движения P и $-P$ соответственно.

2.134. Вал, торец $x = 0$ которого закреплен жестко, а торец $x = l$ упруго, находится в статическом состоянии под действием момента сил, линейная плотность которого $M_0 \frac{x}{l} \mathbf{e}_x$. Начиная с $t = 0$ действие сил прекращается.

2.135. Торец $x = 0$ вала закреплен, а торец $x = l$ свободен; начальные скорости сечений равны нулю, начальные смещения $\frac{u_0 x}{l}$. На поверхность вала действует сила сопротивления, $\alpha l r_0^2 < \sqrt{JGK}$.

2.136. Начальные смещения сечений вала со свободными торцами $u_0\left(1 - \frac{2x}{l}\right)$, начальные скорости равны нулю. На поверхность вала действует сила сопротивления, $\alpha l r_0^2 = \sqrt{JGK}$.

2.137. Торец $x = 0$ вала свободен, а торец $x = l$ закреплен упруго. Начальные смещения сечений вала равны нулю, а начальные скорости сечений одинаковы и равны v_0 . На поверхность вала действует сила сопротивления, $m - \frac{1}{2} \leq \frac{\alpha l r_0^2}{\sqrt{JGK}} \leq m$, $m \in \mathbb{N}$.

2.138. На поверхность вала со свободными торцами действует сила сопротивления. Начальные смещения $u_0\left(1 - \frac{x}{2l}\right)$, начальные скорости равны нулю. В каком положении вал остановится?

Пример 2.6. В трубке ($0 < x < l$) с идеальным газом имеется жесткая перегородка в сечении $x_0 = \frac{l}{2}$. Конец $x = 0$ закрыт, а на конце $x = l$ помещен легкий, перемещающийся без трения поршень. Давление газа на участке $[0; x_0]$ равно $P_0 + p_0$, вне трубы давление P_0 , плотность ρ_0 . В момент $t = 0$ перегородку убирают. Найти потенциал скоростей газа $\psi(x, t)$.

В примере 1.15 приведен вывод системы уравнений, описывающих состояние газа:

$$\begin{aligned} s + u_x &= 0, & u_t &= \psi_x, & s &= -\frac{1}{a^2}\psi_t, \\ \rho_0 u_{tt} + p_x &= 0, & 0 < x < l, & 0 < t, \\ p &= \gamma P_0 s; \end{aligned}$$

там же получено уравнение для потенциала скоростей.

Вывод граничных условий. На закрытом конце смещение $u(0, t) = 0$, стало быть $\psi_x(0, t) = u_t(0, t) = 0$. В сечении $x = l$ разность давлений по разные стороны равна произведению ускорения поршня на его массу $m = 0$, следовательно,

$$p(l, t) = 0 \implies s(l, t) = 0 \implies \psi(l, t) = C.$$

Вывод начальных условий. При $t = 0$ газ находится в стационарном состоянии, потому

$$u_t(x, 0) = 0 \implies \psi_x(x, 0) = 0 \implies \psi(x, 0) = C_1.$$

При $t = 0$ из граничного условия следует, что $\psi(l, 0) = C$, а из начального условия при $x = l$ явствует, что $\psi(l, 0) = C_1$,

то есть $C = C_1$.

$$\psi_t(x, 0) = -\frac{a^2}{\gamma P_0} p(x, 0) = -\frac{p(x, 0)}{\rho_0} = \begin{cases} -\frac{p_0}{\rho_0}, & 0 < x < x_0, \\ 0, & x_0 < x < l. \end{cases}$$

Функция $\tilde{\psi} = \psi - C$ удовлетворяет однородному граничному условию $\tilde{\psi}(l, t) = 0$ и нулевому начальному условию $\tilde{\psi}(x, 0) = 0$, остальные уравнения те же. Постановка задачи для функции $\psi(x, t)$ завершена:

$$\begin{aligned} \psi(x, t) &= \tilde{\psi}(x, t) + C, \\ \tilde{\psi}_{tt} &= a^2 \tilde{\psi}_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ \tilde{\psi}_x(0, t) &= 0, \quad \tilde{\psi}(l, t) = C, \\ \tilde{\psi}(x, 0) &= C, \quad \tilde{\psi}_t(x, 0) = -\frac{p(x, 0)}{\rho_0}. \end{aligned}$$

Подобная задача решена в примере 2.1. Построение решения вида $\tilde{\psi} = X(x)T(t)$ сводится к решению задачи на собственные значения для $X(x)$ и уравнения для $T(t)$:

$$X'' + \lambda X = 0, \quad 0 < x < l,$$

$$T'' + a^2 \lambda T = 0,$$

$$X' = X(l) = 0.$$

Соответствующие решения:

$$X_n(x) = \cos \sqrt{\lambda_n} x, \quad \lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l} \right]^2,$$

$$T_n(t) = A_n \cos a\sqrt{\lambda_n} t + B_n \sin a\sqrt{\lambda_n} t.$$

Таким образом, функция

$$\tilde{\psi}(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} (A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t) X_n(x), \quad \omega_n = a\sqrt{\lambda_n}.$$

При $t = 0$

$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n X_n(x) = 0, \quad \sum_{n=0}^{\infty} B_n \omega_n X_n(x) = -\frac{p(x, t)}{\rho_0},$$

откуда $A_n = 0$:

$$\begin{aligned} B_n \omega_n \frac{l}{l} &= -\frac{p_0}{\rho_0} \int_0^l \cos \sqrt{\lambda_n} x dx = \\ &= -\frac{p_0}{\rho_0 \sqrt{\lambda_n}} \sin \frac{\sqrt{\lambda_n} l}{2} \implies B_n = -\frac{4\sqrt{2} p_0 l (-1)^{[\frac{n}{2}]} }{\pi^2 \rho_0 a (2n+1)^2}. \end{aligned}$$

Потенциал скоростей

$$\psi(x, t) = C - \frac{4\sqrt{2}p_0l}{\pi^2\rho_0a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{[\frac{n}{2}]} \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \sin \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^2}.$$

Решить задачи 2.139–2.151 о движении идеального газа в трубке ($0 < x < l$) в переменных x, t (x — координата Лагранжа). Давление и плотность газа вне трубки P_0 и ρ_0 соответственно. Поршень в трубке движется без трения и его массой можно пренебречь; упругое закрепление поршня осуществляется посредством пружинки с коэффициентом упругости k , площадь поперечного сечения трубки S .

2.139. Начальное уплотнение неподвижного газа в трубке с закрытыми концами

$$s(x, 0) = \begin{cases} s_0 - \Delta s, & 0 < x < \frac{l}{2}, \\ s_0 + \Delta s, & \frac{l}{2} < x < l. \end{cases}$$

Найти $s(x, t)$.

2.140. Конец $x = l$ трубки закрыт, а конец $x = 0$ открыт. Начальная плотность неподвижного газа

$$\rho(x, 0) = \begin{cases} \rho_0 + \Delta\rho, & 0 < x < \frac{l}{2}, \\ \rho_0, & \frac{l}{2} < x < l. \end{cases}$$

Найти уплотнение $s(x, t)$.

2.141. Конец $x = 0$ трубки закрыт, а на конце $x = l$ имеется поршень; давление и плотность газа P_0 и ρ_0 соответственно. Под действием продольной силы поршень смещен на Δu . После установления равновесия (в момент $t = 0$) действие силы прекращается. Найти отклонение $u(x, t)$.

2.142. В неограниченной трубке с газом выделен участок ($0 < x < l$), ограниченный двумя свободными поршнями. Давление и плотность газа P_0 и ρ_0 соответственно. В момент $t = 0$ выделенная масса газа получает импульс I в результате продольного удара в поршень с координатой $x = 0$. Найти отклонение сечения $x \in [0; l]$ от положения равновесия в момент времени $t > 0$.

2.143. Конец $x = 0$ трубки закрыт, а на конце $x = l$ имеется упруго закрепленный поршень; давление и плотность газа P_0 и ρ_0 соответственно. Под действием продольной силы $F_0 \mathbf{e}_x$ газ переходит в другое равновесное состояние. В момент $t = 0$ действие силы прекращается. Найти отклонение $u(x, t)$.

2.144. Конец $x = l$ трубки закрыт, а на конце $x = 0$ имеется поршень; давление и плотность газа P_0 и ρ_0 соответственно. Газ получает импульс I в результате продольного удара в поршень. Найти отклонение $u(x, t)$.

2.145. Конец $x = 0$ трубки закрыт, а конец $x = l$ открыт. Начальная скорость газа $\frac{v_0 x}{l}$, начальные отклонения сечений равны нулю, давление P_0 , плотность ρ_0 . Найти скорость $v(x, t)$.

2.146. Трубка с закрытым концом $x = 0$ движется со скоростью $v_0 \mathbf{e}_x$. Найти скорость газа после мгновенной остановки трубки, если конец $x = l$: 1) закрыт; 2) открыт.

2.147. Решить предыдущую задачу, если на конце $x = l$ находится упруго закрепленный поршень.

2.148. Давление газа в трубке, концы которой закрыты, равно $P_0 + \Delta p$. Каким будет давление, если конец $x = l$ открыть?

2.149. Давление газа в трубке с закрытыми концами равно $P_0 + \Delta p$. В момент $t = 0$ оба конца открывают. Найти давление.

2.150. Давление и плотность газа в трубке, на каждом конце которой имеется поршень, P_0 и ρ_0 соответственно. Под действием постоянных продольных сил каждый поршень смещается внутрь трубки на $\frac{\alpha l}{2}$, $0 < \alpha \ll 1$; газ переходит в новое состояние равновесия. В момент $t = 0$ действие сил прекращается. Найти давление.

2.151. В трубке с закрытыми концами в сечении $\frac{l}{2}(1 - \alpha)$, $|\alpha| \ll 1$, расположена перегородка, давление и плотность по обе стороны которой P_0 и ρ_0 соответственно. Перегородку перемещают в положение $x = \frac{l}{2}$; газ переходит в новое состояние равновесия. В момент $t = 0$ перегородку убирают. Найти потенциал скоростей.

Пример 2.7. Через боковую поверхность стержня ($0 < x < l$) происходит теплообмен по закону Ньютона с внешней средой,

температура которой постоянна и равна μ_0 ; торец $x = l$ теплоизолирован, температура торца $x = 0$ равна нулю. Стержень находится в стационарном тепловом состоянии. В момент $t = 0$ температура внешней среды становится равной нулю. Решить задачу теплопроводности.

Математическая формулировка условий, которым удовлетворяет температура $u = u(x, t)$, определяет задачу

$$\begin{aligned} u_t &= a^2 u_{xx} - \frac{\alpha P}{\rho C S} u, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) &= u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) &= u_0(x), \end{aligned}$$

где S — площадь, P — периметр поперечного сечения стержня, а $u_0(x)$ — решение стационарной задачи

$$\begin{aligned} u_0''(x) - \frac{\alpha P}{k S} (u_0 - \mu_0), \quad 0 < x < l, \\ u_0(0) &= u_0'(l) = 0. \end{aligned}$$

Поскольку уравнение и граничные условия для функции $u(x, t)$ однородны, то применима схема метода Фурье, изложенная в примере 2.3. Проводится поиск решения уравнения в форме произведения $u(x, t) = X(x)T(t)$, удовлетворяющего также граничным условиям:

$$\begin{aligned} \frac{T'}{T} &= a^2 \frac{X''}{X} - \beta, \quad \beta = \frac{\alpha P}{\rho C S}, \\ X'(0)T(t) &= 0, \quad X'(l)T(t) = 0. \end{aligned}$$

Для функции $X(x)$ получается задача на собственные значения

$$\begin{aligned} X'' + \lambda X &= 0, \\ X(0) &= X'(l) = 0, \end{aligned}$$

решение которой

$$\sqrt{\lambda_n} = \frac{(2n+1)\pi}{2l}, \quad X_n(x) = \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l}, \quad n \in \mathbb{N}_0;$$

функция $T(t)$ при $\lambda = \lambda_n$ удовлетворяет уравнению

$$T_n' + (a^2 \lambda_n + \beta) T_n = 0,$$

решение которого

$$T_n(t) = C_n e^{-(a^2 \lambda_n + \beta)t}.$$

Решение задачи имеет форму ряда по собственным функциям:

$$u(x, t) = \sum_0^{\infty} C_n X_n(x) e^{-(a^2 \lambda_n + \beta)t}.$$

При $t = 0$

$$u_0(x) = \sum_0^{\infty} C_n X_n(x) \implies C_n \|X_n\|^2 = (u_0, X_n), \quad \|X_n\|^2 = \frac{l}{2}.$$

Так как $X_n'' + \lambda_n X_n = 0$, $\lambda_n > 0$, то $X_n = -\frac{1}{\lambda_n} X_n''$. Оператор $-\frac{d^2}{dx^2}$ эрмитов, области определения которого принадлежит также функция $u_0(x)$, поэтому $(u_0, X_n'') = (u_0'', X_n)$. Таким образом, интеграл

$$(u_0, X_n) = -\frac{1}{\lambda_n} (u_0, X_n'') = -\frac{1}{\lambda_n} (u_0'', X_n) = -\frac{1}{\lambda_n} \left(\frac{\alpha P}{kS} (u_0 - \mu_0), X_n \right),$$

откуда

$$(u_0, X_n) \left(1 + \frac{\alpha P}{kS \lambda_n} \right) = \frac{\mu_0 \alpha P}{kS \lambda_n} \int_0^l X_n dx = \frac{\mu_0 \alpha P}{kS \lambda_n \sqrt{\lambda_n}}.$$

Следовательно,

$$C_n = \frac{4\mu_0 \gamma^2}{\pi(2n+1)[(2n+1)^2 + \gamma^2]}, \quad \gamma^2 = \frac{4\alpha P l^2}{\pi^2 kS}.$$

Решение задачи:

$$u(x, t) = \frac{4\mu_0 \gamma^2}{\pi} \sum_0^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} e^{-(a^2 \lambda_n + \beta)t}}{(2n+1)[(2n+1)^2 + \gamma^2]}.$$

В задачах 2.152–2.168 найти температуру однородного цилиндрического стержня ($0 < x < l$) с теплоизолированной боковой поверхностью (если нет уточнений). Площадь и периметр поперечного сечения стержня S и P соответственно, коэффициент теплообмена на единицу площади поверхности равен α . Задачи 2.156–2.168 решать при условии стационарности теплового состояния стержня до момента времени $t = 0$.

2.152. Температура торцов стержня равна нулю, начальная температура $\frac{u_0 x}{l}$.

2.153. Температура торца $x = 0$ равна нулю, а торец $x = l$ теплоизолирован, начальная температура $u_0 \operatorname{sh} cx$.

2.154. Торец $x = 0$ стержня поддерживается при нулевой температуре, а остальная поверхность теплоизолирована; начальная температура равна $u_0 x/x_0$ при $0 < x < x_0$ и u_0 при $x_0 < x < l$.

2.155. Через боковую поверхность стержня с теплоизолированными торцам происходит теплообмен со средой нулевой температуры; начальная температура стержня $u_0 \sin^2 \frac{\pi x}{l}$.

2.156. Торцы $x = 0$ и $x = l$ стержня поддерживаются при температуре $-u_0$ и u_0 соответственно. В момент $t = 0$ температура торцов становится равной нулю.

2.157. Торец $x = l$ стержня поддерживается при температуре u_0 : 1) температура торца $x = 0$ равна нулю; 2) торец $x = 0$ теплоизолирован. В момент $t = 0$ температура торца $x = l$ становится равной нулю.

2.158. Через торец $x = 0$ стержня происходит теплообмен со средой нулевой температуры, а торец $x = l$ поддерживается при температуре u_0 . В момент $t = 0$ температура торца $x = l$ становится равной нулю.

2.159. Через торец $x = l$ стержня происходит теплообмен со средой нулевой температуры, а через торец $x = 0$ в стержень поступает тепловой поток, плотность которого q_0 . В момент $t = 0$ торец $x = 0$ теплоизолируют.

2.160. В сечении $x = x_0 \in (0; l)$ действует источник тепла, мощность которого Q_0 . Торец $x = 0$ поддерживается при нулевой температуре: 1) температура торца $x = l$ равна нулю; 2) торец $x = l$ теплоизолирован; 3) на торце $x = l$ происходит теплообмен со средой нулевой температуры. С момента $t = 0$ действие источника прекращается.

2.161. В сечении $x_0 \in (0, l)$ стержня с теплоизолированной боковой поверхностью и торцом $x = 0$ действует источник тепла постоянной мощности Q_0 : 1) температура торца $x = l$ равна нулю; 2) через торец $x = l$ происходит теплообмен со средой нулевой температуры. С момента $t = 0$ действие источника прекращается.

2.162. На торцах стержня происходит теплообмен (коэффициент теплообмена одинаков) со средой, температура которой равна

нулю; при этом через торец $x = 0$ внутрь стержня поступает тепловой поток плотности q_0 . В момент $t = 0$ торец $x = 0$ теплоизолируют.

2.163. Через боковую поверхность стержня с теплоизолированным торцом $x = 0$ происходит теплообмен со средой нулевой температуры; температура торца $x = l$ постоянна и равна u_0 . В момент $t = 0$ температура торца $x = l$ становится равной нулю.

2.164. Температура торца $x = 0$ равна нулю, через торец $x = l$ внутрь стержня поступает тепловой поток, плотность которого q_0 , на боковой поверхности происходит теплообмен со средой нулевой температуры. В момент $t = 0$ торец $x = l$ теплоизолируют.

2.165. Через боковую поверхность и торец $x = 0$ тонкого стержня ($0 < x < l$) происходит теплообмен по закону Ньютона со средой нулевой температуры, а на торец $x = l$ подается тепловой поток постоянной плотности q_0 столь длительное время, что в стержне устанавливается стационарный тепловой режим. В момент $t = 0$ торец $x = l$ покрывают теплоизоляцией. Решить задачу теплопроводности.

2.166. Через боковую поверхность стержня происходит теплообмен со средой, температура которой $u_0 \cos \frac{\pi x}{2l}$; торец $x = 0$ теплоизолирован, температура торца $x = l$ равна нулю. С момента $t = 0$ температура внешней среды становится равной нулю.

2.167. Через боковую поверхность стержня происходит теплообмен со средой, температура которой $\frac{u_0 x}{l}$, торцы поддерживаются при нулевой температуре. С момента $t = 0$ температура внешней среды становится равной нулю.

2.168. Через боковую поверхность стержня и торец $x = l$ происходит теплообмен со средой, температура которой u_0 ; торцы поддерживаются при нулевой температуре. С момента $t = 0$ температура внешней среды становится равной нулю.

Пример 2.8. Определить концентрацию $u(x, t)$ газа, диффундирующего в трубке ($-l < x < l$), на концах которой поддерживается нулевая концентрация, если начальная концентрация $u_0(x) = u_0(1 - x/l)$.

Р е ш е н и е. Уравнение диффузии и дополнительные условия формируют задачу для $u(x, t)$:

$$\begin{aligned}u_t &= Du_{xx}, & -l < x < l, & \quad 0 < t, \\u(0, t) &= u(l, t) = 0, \\u(x, t) &= u_0(x).\end{aligned}$$

В результате разделения переменных $u(x, t) = X(x)T(t)$ получается уравнение $T' + \lambda T = 0$ и задача Штурма–Лиувилля,

$$\begin{aligned}X'' + \lambda X &= 0, & -l < x < l, \\X(-l) &= X(l) = 0,\end{aligned}$$

собственные значения и собственные функции которой (см. пример 2.2)

$$\lambda_n = \left(\frac{\pi n}{2l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{\pi n}{2} \left(1 + \frac{x}{l}\right), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Так как

$$T_n(t) = C_n e^{-D\lambda_n t},$$

то

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n X_n(x) e^{-D\lambda_n t}.$$

Вследствие ортогональности собственных функций

$$C_n = \frac{(u_0, X_n)}{\|X_n\|^2} = \frac{1}{l}(u_0, X_n).$$

Интеграл (u_0, X_n) можно вычислить непосредственно или с помощью следующего приема. Если заменить функцию $u_0(x)$ на

$$\begin{aligned}\tilde{u}_0(x) &= \begin{cases} u_0(x), & -l < x \leq l, \\ 0, & x = -l, \end{cases} \\ \tilde{u}_0'(x) &\equiv u_0'(x),\end{aligned}$$

то численная величина интеграла останется той же. Следовательно, (см. пример 2.3)

$$\begin{aligned}(u_0, X_n) &= (\tilde{u}_0, X_n) = -\frac{1}{\lambda_n}(\tilde{u}_0, X_n'') = -\frac{1}{\lambda_n}(\tilde{u}_0'', X_n) = \\ &= -\frac{1}{\lambda_n}(2u_0\delta'(x+l), X_n(x)) = \frac{2u_0X_n'(-l)}{\lambda_n} = \frac{2u_0}{\sqrt{\lambda_n}}.\end{aligned}$$

Итак,

$$u(x, t) = \frac{4u_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{\pi n}{2} \left(1 + \frac{x}{l}\right) e^{-(\frac{\pi n}{2l})^2 Dt}.$$

Решить задачи диффузии 2.169–2.184 трубке ($0 < x < l$) с непроницаемой боковой поверхностью (если нет уточнений). Площадь и периметр поперечного сечения стержня S и P соответственно, коэффициент пропорциональности на единицу площади полупроницаемой поверхности равен α . Задачи 2.176–2.183 решать при условии стационарности процесса диффузии до момента времени $t = 0$.

2.169. Концентрация газа на концах трубки равна нулю, начальная концентрация $\frac{u_0 x}{l}$.

2.170. Концентрация газа на конце $x = 0$ трубки равна нулю, конец $x = l$ закрыт, начальная концентрация $u_0 \operatorname{sh} cx$.

2.171. Начальная концентрация частиц в трубке равна нулю при $0 < x < l/2$ и u_0 при $l/2 < x < l$; конец $x = l$ закрыт непроницаемой перегородкой, а концентрация на конце $x = 0$ равна нулю.

2.172. Начальная концентрация частиц в трубке с закрытыми концами равна $u_0 \operatorname{ch} cx$.

2.173. В процессе стационарной диффузии через трубку проходит газ, плотность потока которого $q_0 e_x$, масса газа в трубке m . С момента $t = 0$ концы становятся непроницаемыми для газа.

2.174. Концентрация газа на конце $x = 0$ трубки равна нулю, конец $x = l$ закрыт полупроницаемой перегородкой; начальная концентрация газа в трубке $\frac{u_0 x}{l}$, вне трубки газа нет.

2.175. Конец $x = 0$ трубки закрыт полупроницаемой перегородкой, а конец $x = l$ непроницаем для газа. Начальная концентрация газа в трубке u_0 , вне трубки газа нет.

2.176. В трубке диффундирует неустойчивый газ (распад пропорционален концентрации, коэффициент пропорциональности β), начальная концентрация которого u_0 . Конец $x = 0$ закрыт: 1) концентрация на конце $x = l$ равна нулю; 2) конец $x = l$ закрыт; 3) конец $x = l$ закрыт полупроницаемой перегородкой. Концентрация газа во внешней среде равна нулю.

2.177. В результате химической реакции масса газа в трубке растёт пропорционально концентрации (коэффициент пропорциональности β). 1) На конце $x = l$ концентрация равна нулю; 2) конец $x = l$ закрыт; 3) конец $x = l$ закрыт полупроницаемой перегородкой. Во всех случаях концентрация на конце $x = 0$

равна нулю. Начальная концентрация газа в трубке u_0 , вне трубки газа нет. При каком условии масса $m(t)$ газа в трубке — ограниченная функция времени? Каково при этом предельное значение $m(\infty)$?

2.178. В сечении $x = \frac{l}{2}$ трубки действует источник газа, мощность которого Q_0 . 1) На концах трубки поддерживается нулевая концентрация; 2) конец $x = l$ закрыт, концентрация на конце $x = 0$ равна нулю; 3) конец $x = 0$ закрыт полупроницаемой перегородкой, концентрация на конце $x = l$ равна нулю; 4) конец $x = 0$ закрыт полупроницаемой перегородкой, конец $x = 0$ непроницаем для газа. Вне трубки газа нет. В момент $t = 0$ действие источника прекращается.

2.179. В сечении $x = \frac{l}{4}$ трубки с закрытыми концами действует источник газа, мощность которого Q_0 , а в сечении $x = \frac{3l}{4}$ — поглотитель той же мощности. Масса газа в трубке m . В момент $t = 0$ действие источников прекращается.

2.180. Боковая поверхность и конец $x = 0$ трубки полупроницаемы для газа (коэффициент пропорциональности одинаков), концентрация на конце $x = l$ постоянна и равна u_0 . С момента $t = 0$ концентрация на конце $x = l$ становится равной нулю. Вне трубки газа нет.

2.181. Боковая поверхность трубки полупроницаема для газа, концентрация на концах $x = 0$ и $x = l$ равна нулю и u_0 соответственно. С момента $t = 0$ концентрация на конце $x = l$ становится равной нулю. Вне трубки газа нет.

2.182. Концентрация газа на концах трубки с полупроницаемой боковой поверхностью равна нулю, концентрация газа вне трубки равна u_0 . В момент $t = 0$ трубку помещают в такую же среду, в которой нет газа.

2.183. Концы трубки с полупроницаемой боковой поверхностью закрыты, концентрация газа вне трубки равна $\frac{u_0 x}{l}$. В момент $t = 0$ трубку помещают в такую же среду, в которой нет газа.

2.184. В трубке $(-l < x < l)$ диффундирует газ, начальная концентрация которого $u_1 + (u_2 - u_1)\eta(x)$, а концентрация на концах поддерживается равной нулю.

В задачах 2.185–2.195 найти ток и потенциал линии ($0 < x < l$).

2.185. Концы линии с параметрами R, C ($L = G = 0$) заземлены; начальный ток равен нулю, начальный потенциал $u_0 \sin \frac{3\pi x}{l}$.

2.186. Конец $x = 0$ линии с параметрами R, C ($L = G = 0$) изолирован, конец $x = l$ заземлен; начальный ток равен нулю, начальный потенциал $u_0 \cos \frac{\pi x}{2l}$.

2.187. Дана линия ($0 < x < l$) с параметрами R, C ($G = L = 0$), один конец ($x = l$) которой заземлен непосредственно, а другой через сосредоточенное сопротивление R_0 . Найти потенциал линии при $t > 0$, если начальный ток равен нулю, начальный потенциал $u_0(1 - x/l)$.

2.188. Конец $x = 0$ линии с параметрами R, C ($L = G = 0$) изолирован, а конец $x = l$ заземлен через сосредоточенное сопротивление R_0 ; начальный ток равен нулю, начальный потенциал $\frac{u_0(l-x)}{l}$.

2.189. Конец $x = 0$ линии с параметрами R, C ($L = G = 0$) подключен к батарее с э.д.с. E_0 ; конец $x = l$ заземлен; в линии течет стационарный ток. В момент $t = 0$ батарею отключают, конец $x = 0$ остается заземленным.

2.190. Замкнутая линия с параметрами R, C ($L = G = 0$), конец $x = 0$ которой заземлен через сосредоточенное сопротивление R_0 , а к концу $x = l$ подключена батарея с э.д.с. E_0 , находится в стационарном состоянии. В момент $t = 0$ батарею отключают, оставляя конец $x = 0$ заземленным.

2.191. Концы линии с параметрами R, C, G ($L = 0$) заземлены; начальный ток равен нулю, начальный потенциал $u_0 \sin \frac{2\pi x}{l}$.

2.192. Конец $x = 0$ линии с параметрами R, C ($L = G = 0$) изолирован, конец $x = l$ заземлен; начальный ток равен нулю, начальный потенциал $u_0 \cos \frac{3\pi x}{2l}$.

2.193. К концу $x = 0$ линии с параметрами R, C, G ($L = 0$) подключена батарея с э.д.с. E_0 , конец $x = l$ заземлен через сосредоточенное сопротивление R_0 ; в линии течет стационарный ток. В момент $t = 0$ батарею отключают, а линию замыкают.

2.194. Дана линия ($0 < x < l$) с параметрами R, C, G ($L = 0$), концы которой заземлены. Найти потенциал $u(x, t)$ при $t > 0$, если

$$u(x, 0) = \begin{cases} u_0, & 0 < x < \frac{l}{2}, \\ -u_0, & \frac{l}{2} < x < l. \end{cases}$$

2.195. К концу $x = 0$ замкнутой линии ($0 < x < l$) с параметрами R, C ($L = G = 0$) подключена через сопротивление R_1 батарея с э.д.с. E_0 , а конец $x = l$ заземлен через сосредоточенное сопротивление R_2 ; в линии течет стационарный ток. Найти силу тока после отключения батареи и замыкания линии.

2.196. Определить волновую функцию $\Psi(x, t)$ частицы, находящейся в потенциальной яме (1.32), если:

$$1) \Psi(x, 0) = A \sin \frac{\pi x}{l} \cos \frac{2\pi x}{l}; \quad 2) \Psi(x, 0) = A \sin^3 \frac{2\pi x}{l}.$$

Какова вероятность P_n обнаружить частицу в n -м стационарном состоянии?

2.197. Найти волновую функцию $\Psi(x, t)$ частицы, находящейся в одномерной потенциальной яме (1.32), если:

$$1) \Psi(x, 0) = A(1 - x^2/l^2); \quad 2) \Psi(x, 0) = Ax(1 - x^2/l^2).$$

Определить вероятность $P(E = E_n)$ того, что энергия частицы равна E_n .

Пример 2.9. Один торец ($x = 0$) упругого вала ($0 < x < l$) жестко закреплен, а другой — свободен. На свободном торце находится тонкий диск с осевым моментом инерции K , жестко связанный с валом. Диск поворачивают на небольшой угол u_0 и отпускают без начальной скорости. Решить задачу о крутильных колебаниях вала.

Если считать диск частью вала, то момент инерции на единицу длины равен $K_0 + K\delta(x - l)$. В этом случае задача ставится следующим образом:

$$\begin{aligned} \rho(x)u_{tt} &= a^2u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \quad \rho(x) = 1 + \frac{K}{K_0}\delta(x - l), \\ u(0, t) &= u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) &= u_0\frac{x}{l}, \quad u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

Подстановка $u(x, t) = X(x)T(t)$ в уравнение и в граничные условия приводит к задаче Штурма–Лиувилля,

$$\begin{aligned} X'' + \lambda \rho(x)X &= 0, \quad 0 < x < l, \\ X(0) &= X(l) = 0, \end{aligned} \quad (2.21)$$

и уравнению $T'' + a^2 \lambda T = 0$. Множитель $\rho(x)$ указывает на то, что собственные функции ортогональны на отрезке $[0, l]$ с весом $\rho(x)$. Преобразование задачи (2.21) к эквивалентной (см. пример 1.6)

$$\begin{aligned} X'' + \lambda X &= 0, \quad 0 < x < l, \\ X(0) &= 0, \quad X'(l) - \lambda \frac{K}{K_0} X(l) = 0 \end{aligned}$$

позволяет найти $X(x) = A \sin \sqrt{\lambda} x + B \cos \sqrt{\lambda} x$. Из краевых условий

$$X(0) = B = 0, \quad \sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda} l - \lambda \frac{K}{K_0} \sin \sqrt{\lambda} l = 0$$

вытекает, что собственные значения задачи (2.21) определяются уравнением $\mu \operatorname{tg} \mu = p$, в котором $\mu = l\sqrt{\lambda}$, $p = lK_0/K$. Пусть μ_n , $n \in \mathbb{N}$, — положительные корни уравнения, тогда $\lambda_n = (\mu_n/l)^2$,

$$X_n(x) = \sin \frac{\mu_n}{l} x, \quad T_n(t) = A_n \cos \frac{\mu_n a}{l} t + B_n \sin \frac{\mu_n a}{l} t.$$

Решение запишется в виде

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{\mu_n a}{l} t + B_n \sin \frac{\mu_n a}{l} t \right) X_n(x).$$

При $t = 0$

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n X_n(x) = u_0 \frac{x}{l}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n a}{l} B_n X_n(x) = 0,$$

откуда, согласно формулам (2.11),

$$A_n = \frac{(u_0 \frac{x}{l}, X_n)}{\|X_n\|^2} = (-1)^{n+1} \frac{2pu_0 \sqrt{\mu_n^2 + p^2}}{\mu_n^2 (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad B_n = 0.$$

Следовательно,

$$u(x, t) = 2pu_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \sin \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{a\mu_n t}{l}}{\mu_n^2 (\mu_n^2 + p^2 + p)}.$$

2.198. Торце $x = 0$ круглого вала ($0 < x < l$) закреплен, а другой торце свободен. В сечении $x = l/2$ имеется тонкий диск с моментом инерции K . Вал находится в статическом равновесии под действием момента сил $M_0 \mathbf{e}_x$, приложенного к диску. Решить задачу о крутильных колебаниях вала после прекращения действия момента сил.

2.199. Торце $x = 0$ круглого вала ($0 < x < l$) свободен, а на торце $x = l$ имеется тонкий диск с осевым моментом инерции K_0 . Под действием сил на концах вала торце $x = 0$ повернут на угол $-u_0$, а торце $x = l$ — на угол u_0 . Решить задачу о крутильных колебаниях вала после прекращения действия сил.

2.200. Однородный цилиндрический стержень ($0 < x < l$) с сосредоточенной массой m на торце $x = 0$ находится на гладкой горизонтальной поверхности. В результате продольного удара в торце: 1) $x = 0$, стержень получает импульс I ; 2) $x = l$ стержень получает импульс $-I$. Решить задачу о движении стержня.

2.201. Конец $x = 0$ струны ($0 < x < l$) закреплен, а конец $x = l$ соединен с кольцом (сосредоточенная масса), которое может свободно перемещаться только в направлении оси Ou . Масса кольца m , натяжение струны T_0 , ее плотность ρ_0 , струна расположена на оси Ox и находится в состоянии статического равновесия, силы тяжести отсутствуют. 1) В момент времени $t = 0$ кольцо получает импульс $I \mathbf{e}_u$; 2) кольцо смещают на расстояние h и после установления равновесия отпускают без начальной скорости. Решить задачу о движении струны.

2.202. В точке $x = 0$ струны ($-l < x < l$) с закрепленными концами находится шарик, масса которого m . В момент $t = 0$ шарик получает ударный импульс $I \mathbf{e}_u$. Определить скорость шарика.

2.203. Струна ($-l < x < l$) с шариком в точке $x = 0$ находится в состоянии покоя; концы струны закреплены. Шарик, масса которого m , смещают в направлении оси Ou и отпускают без начальной скорости. Решить задачу о движении струны.

2.204. Струна, рассмотренная в предыдущей задаче, имеет начальный профиль $h \frac{x}{l} \left(1 - \frac{|x|}{l}\right)$ и нулевую начальную скорость. Найти профиль струны при $t > 0$.

2.205. Неоднородная струна ($0 < x < l$) с закрепленными концами, плотность которой

$$\rho(x) = \begin{cases} \rho_1, & 0 < x < x_0, \\ \rho_2, & x_0 < x < l, \end{cases}$$

получает импульс $I \mathbf{e}_u$ в результате поперечного удара в точку $x = x_0$. Решить задачу о движении струны.

2.206. Конец $x = 0$ линии ($0 < x < l$) параметры которой L, C ($R = G = 0$) заземлен, а на конце $x = l$ имеется конденсатор C_0 с зарядом Q_0 . В момент $t = 0$ конденсатор заземляется; найти ток через конденсатор.

2.207. На торце $x = 0$ однородного цилиндрического стержня, длина которого l , имеется тонкая пластинка с теплоемкостью C_0 ; торец $x = l$ поддерживается при нулевой температуре, а остальная поверхность теплоизолирована. Найти температуру стержня при $t > 0$, если при $t = 0$ стержень и пластинка имели температуру u_0 .

2.208. Цилиндрический стержень ($0 < x < l$) с теплоизолированной боковой поверхностью составлен из двух различных однородных стержней ($0 < x < x_0$) и ($x_0 < x < l$), физические характеристики которых ρ_1, C_1, k_1 и ρ_2, C_2, k_2 соответственно. В результате длительного нагревания торца $x = l$ тепловым потоком постоянной плотности $\mathbf{q} = -q_0 \mathbf{e}_u$ в стержне устанавливается стационарный тепловой режим, при этом торец $x = 0$ поддерживается при нулевой температуре. Определить температуру стержня после того, как торец $x = l$ теплоизолируют.

2.209. Конец $x = l$ линии ($0 < x < l$) с параметрами R, C ($L = G = 0$) заземлен, а на конце $x = l$ находится конденсатор C_0 с зарядом Q_0 . В момент $t = 0$ конденсатор заземляется. Как будет изменяться заряд конденсатора?

2.210. Слой с непроницаемыми границами $x = -l_1$ и $x = l_2$ состоит из двух различных однородных слоев ($-l_1 < x < 0$ и $0 < x < l_2$) (см. задачу 1.234, п.1). Определить концентрацию $u(x, t)$ частиц, диффундирующих в слое, если начальная концентрация

$$u(x, 0) = \begin{cases} u_1, & -l_1 < x < 0, \\ u_2, & 0 < x < l_2, \end{cases}$$

а отношение концентраций на границе $x = 0$ пропорционально отношению предельных растворимостей. Найти также установившееся распределение частиц.

2.211. Решить предыдущую задачу в предположении, что поток частиц через границу $x = 0$ пропорционален разности отношений u_1/c_1 , u_2/c_2 (см. задачу 1.234, п.2). Показать, что установившееся распределение частиц будет таким же, как и в предыдущем случае.

Решить задачи 2.212–2.217 о распространении электромагнитного поля в линии конечной длины $0 < x < l$.

2.212. Конец $x = l$ линии с параметрами L, C ($R = G = 0$) заземлен непосредственно, а конец $x = 0$ — через сосредоточенную индуктивность L_0 ; начальный ток равен нулю, начальный потенциал $\frac{u_0(l-x)}{l}$. Найти ток.

2.213. Конец $x = 0$ линии, физические параметры которой L, C, G ($R = 0$), $lG\sqrt{\frac{L}{C}} < \pi$, заземлен непосредственно, а конец $x = l$ — через сосредоточенную индуктивность L_0 ; начальный ток равен нулю, начальный потенциал $\frac{u_0x}{l}$. Найти ток.

2.214. К заземленному концу $x = 0$ линии с параметрами L, C ($R = G = 0$) подключена батарея с э.д.с. E_0 , а конец $x = l$ изолирован; линия находится в стационарном состоянии. В момент $t = 0$ батарея отключается, конец $x = 0$ остается заземленным, конец $x = l$ заземляется через конденсатор C_0 . Найти потенциал.

2.215. Конец $x = 0$ линии с параметрами L, C ($R = G = 0$) изолирован, а к заземленному концу $x = l$ подключена батарея с э.д.с. E_0 ; линия находится в стационарном состоянии. В момент $t = 0$ батарея отключается, конец $x = l$ заземляется через конденсатор C_0 , а конец $x = 0$ остается изолированным. Найти потенциал.

2.216. К заземленному концу $x = 0$ линии с параметрами L, C ($R = G = 0$) подключена батарея с э.д.с. E_0 , а конец $x = l$ заземлен через конденсатор C_0 ; линия находится в стационарном состоянии. В момент $t = 0$ батарея отключается, линия замыкается. Найти потенциал.

2.217. К заземленному концу $x = 0$ линии с параметрами L, C, R ($G = 0$), $\frac{\pi C_0}{4l} < C \leq \left(\frac{\pi}{2lR}\right)^2 L$, подключена батарея с э.д.с. E_0 , а конец $x = l$ заземлен через конденсатор C_0 ; линия находится в стационарном состоянии. В момент $t = 0$ батарея отключается, линия замыкается. Найти потенциал.

Пример 2.10. Начальная температура шара с теплоизолированной поверхностью равна $u_0(r) = u_0(1 - r^2/r_0^2)$, радиус шара r_0 . Решить задачу теплопроводности.

Решение. В данном случае температура зависит от r и t и является решением задачи

$$\begin{aligned} u_t &= a^2 \Delta u, \quad r \in B = \{r : r < r_0\}, \quad t > 0, \\ u_r(r_0, t) &= 0, \quad u(r, 0) = u_0(r), \\ u &\in C^2(B) \cap C^1(\overline{B}) \cap C^1(t > 0) \cap C(t \geq 0). \end{aligned}$$

Пусть $u(r, t) = R(r)T(t)$; из тождества

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{\Delta R}{R} = -\lambda$$

следует, что $T(t)$ удовлетворяет уравнению $T' + a^2 \lambda T = 0$, а $R(r)$ — решение задачи на собственные значения

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} r^2 \frac{dR}{dr} + \lambda r^2 R &= 0, \quad r < r_0, \\ R'(r_0) &= 0, \quad R(r) \in C^2(r < r_0) \cap C^1(r \leq r_0), \end{aligned} \quad (2.22)$$

собственные функции которой ортогональны на отрезке $[0, r_0]$ с весом r^2 . Замена $R = X(r)/r$ преобразует задачу (2.22) к виду

$$\begin{aligned} X'' + \lambda X &= 0, \quad 0 < r < r_0, \\ X(0) &= 0, \quad r_0 X'(r_0) - X(r_0) = 0. \end{aligned}$$

Условие при $r = 0$ для функции $X = rR$ вытекает из ограниченности функции $R(r)$. Если $\lambda = 0$, то $X_0 = Ar + B$; граничные условия выполняются при $B = 0$. Если $\lambda > 0$, то уравнение имеет решение $X = A \sin \sqrt{\lambda} r + B \cos \sqrt{\lambda} r$; граничные условия будут выполнены при $B = 0$, $\sin \sqrt{\lambda} r_0 - r_0 \sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda} r_0 = 0$. Следовательно, $\lambda_n = (\mu_n/r_0)^2$, $n \in \mathbb{N}$, где $\mu_n > 0$ — корень соответствующего уравнения $\operatorname{tg} \mu = \mu$;

$$R_0(r) = r, \quad R_n(r) = \sin \frac{\mu_n}{r_0} r, \quad T_0(t) = C_0, \quad T_n(t) = C_n e^{-(\frac{\mu_n a}{r_0})^2 t}.$$

Квадрат нормы собственных функций

$$\|R_0\| = \frac{r_0^3}{3}, \quad \|R_n\| = \frac{r_0}{2} \frac{\mu_n^2}{1 + \mu_n^2}.$$

Решение представляет собой ряд по собственным функциям

$$u(r, t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n R_n(r) e^{-(\frac{\mu_n a}{r_0})^2 t}.$$

При $t = 0$

$$u_0(r) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n R_n(r),$$

откуда

$$A_n = \frac{(u_0, R_n)}{\|R_n\|} = \frac{\int_0^{r_0} u_0(r) R_n(r) r^2 dr}{\int_0^{r_0} R_n^2(r) r^2 dr}.$$

Для вычисления A_n можно использовать прием, проиллюстрированный в примере 2.8. Пусть $\tilde{u}_0(r) = u_0(r)$ при $0 \leq r \leq r_0$, $\tilde{u}'(r) = u'(r)$ при $0 \leq r < r_0$, $\tilde{u}'(r_0) = 0$; тогда по формуле (10.40)

$$\Delta u_0(r) = -\frac{6u_0}{r_0^2} + \frac{2u_0}{r_0} \delta(r - r_0).$$

На основании свойства (10.44) при $n > 0$

$$(u_0(r), R_n(r)) = -\frac{1}{\lambda_n} (u_0(r), \Delta R_n) = -\frac{1}{\lambda_n} (\Delta u_0(r), R_n(r)),$$

следовательно,

$$A_n = \frac{1}{\lambda_n \|R_n\|^2} \left[\frac{6u_0}{r_0^2} (1, R_n) - 2u_0 r_0 R_n(r_0) \right] - \frac{2u_0 r_0 R_n(r_0)}{\lambda_n \|R_n\|^2}$$

(первое слагаемое равно нулю в силу ортогональности собственных функций). В итоге

$$u(r, t) = \frac{2u_0}{5} + \frac{4u_0 r_0}{r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{1 + \mu_n^2}}{\mu_n^3} \sin \frac{\mu_n}{r_0} r e^{-(\frac{\mu_n a}{r_0})^2 t}.$$

2.218. Найти волновую функцию частицы, находящейся в сферической потенциальной яме

$$u(r) = \begin{cases} 0, & 0 \leq r < r_0, \\ \infty, & r_0 < r, \end{cases}$$

если волновая функция начального состояния $\frac{A}{r} \sin^3 \frac{3\pi r}{r_0}$. Какова вероятность обнаружить частицу в основном состоянии?

2.219. В однородном шаре, радиус которого r_0 , диффундирует неустойчивый газ (распад пропорционален концентрации, коэффициент пропорциональности α), начальная концентрация которого u_0 . Как будет меняться концентрация газа в шаре, если на поверхности шара она равна нулю при любом t ?

2.220. В однородном шаре с полупроницаемой поверхностью происходит диффузия неустойчивого газа (распад пропорционален концентрации, коэффициент пропорциональности α), радиус шара r_0 . Решить задачу диффузии, если начальная концентрация газа в шаре u_0 , а концентрация вне шара при любом t равна нулю.

2.221. Поверхность шара, радиус которого r_0 , поддерживается при нулевой температуре. Решить задачу теплопроводности, если начальная температура равна: 1) $u_0(1 - r/r_0)$; 2) $u_0(1 - r^2/r_0^2)$.

2.222. Через поверхность однородного шара ($r < r_0$) происходит теплообмен по закону Ньютона с внешней средой, температура которой равна нулю. Решить задачу теплопроводности, если начальная температура шара $u_0\left(1 - \frac{r^2}{r_0^2}\right)$.

2.223. Поверхности сферического слоя ($r_1 < r < r_2$) поддерживаются при нулевой температуре, его начальная температура равна: 1) u_0 ; 2) $u_0\left(\frac{r}{r_1} - 1\right)\left(1 - \frac{r}{r_2}\right)$. Решить задачу теплопроводности.

2.224. Температура внутренней поверхности сферического слоя ($r_1 < r < r_2$) равна нулю, внешняя теплоизолирована, начальная температура $u_0(1 - r_1/r)$. Решить задачу теплопроводности.

2.225. Найти температуру сферического слоя ($3 < r < 4$) с теплоизолированными поверхностями, начальная температура которого равна $\frac{A}{r}$.

2.226. Основание прямого кругового конуса, высота которого l , поддерживается при нулевой температуре, боковая поверхность теплоизолирована, начальная температура u_0 . Решить задачу об охлаждении конуса при условии, что изотермические поверхности параллельны основанию (одномерное приближение).

2.227. В усеченном конусе (рис. 1.3) с теплоизолированной боковой поверхностью устанавливается стационарный тепловой

режим; при этом температура оснований $x = 0$ и $x = l$ равна u_0 и нулю соответственно. С момента $t = 0$ температура основания $x = 0$ становится равной нулю. Решить задачу об охлаждении конуса, предполагая, что изотермические поверхности параллельны основаниям (одномерное приближение).

2.228. В процессе стационарной диффузии газа в однородном сферическом слое ($1 < r < 2$) через его поверхности проходит радиальный (в направлении от центра) поток частиц газа Q , равномерно распределенный по каждой из поверхностей. В момент времени $t = 0$ поверхности слоя покрывают непроницаемой для частиц оболочкой. Решить задачу диффузии.

2.229. Решить задачи

$$u_{tt} = a^2 \Delta u, \quad r_1 < r < r_2, \quad t > 0,$$

$$u(r_1, t) = u(r_2, t) = 0:$$

$$1) \quad u(r, 0) = \frac{A(r_2 - r)(r - r_1)}{r}, \quad u_t(r, 0) = 0;$$

$$2) \quad u(r, 0) = 0, \quad u_t(r, 0) = A(r_2 - r)(r - r_1),$$

где Δ — оператор Лапласа в $\mathbb{R}^3$.

2.230. Решить задачу

$$u_{tt} = a^2 \Delta u, \quad r_1 < r < r_2, \quad t > 0,$$

$$u(r_1, t) = u(r_2, t) = u(r, 0) = 0, \quad u_t(r, 0) = A(r - r_1) \left(\frac{r_2^2}{r_1 r} - 1 \right),$$

где Δ — оператор Лапласа в $\mathbb{R}^3$.

2.231. Упругий стержень имеет форму усеченной пирамиды, высота которой l , площади оснований $S(0) = S_1$, $S(l) = S_2$ (рис. 1.4); торец $x = 0$ закреплен, торец $x = l$ свободен. В результате продольного удара в свободный торец стержень получает импульс I . Решить задачу о колебаниях стержня, пренебрегая деформацией поперечных сечений (одномерное приближение).

2.232. Тонкий упругий стержень, представляющий собой половину прямого кругового конуса, высота которого l (конус разрезан по плоскости, проходящей через ось), расположен на гладкой горизонтальной поверхности. В результате продольного удара в основание стержень получает импульс I . Решить задачу о движении стержня при условии, что форма поперечных сечений не изменяется (одномерное приближение).

Пример 2.11. В проводящей прямоугольной пластинке, толщина которой h , течет постоянный ток J (см. задачу 1.438). Определить плотность тока в пластинке.

Решение. Потенциал электростатического поля в пластинке определяется условиями (см. задачу 1.438)

$$\begin{aligned}\Delta u(x, y) &= 0, \quad |x| < l_1, \quad |y| < l_2, \\ u_x(\pm l_1, y) &= -\frac{J}{h\sigma} \delta(y), \quad u_y(x, \pm l_2) = 0.\end{aligned}$$

Пусть $u(x, y) = X(x)Y(y)$, тогда для функции $Y(y)$ можно поставить задачу Штурма–Лиувилля

$$\begin{aligned}Y'' + \lambda Y &= 0, \quad |y| < l_2, \\ Y'(-l_2) &= Y'(l_2) = 0,\end{aligned}\tag{2.23}$$

а функция $X(x)$ — решение уравнения

$$X'' - \lambda X = 0.\tag{2.24}$$

Общее решение уравнения (2.23)

$$Y(y) = \begin{cases} A_0 + B_0 y, & \lambda = 0, \\ A \sin \sqrt{\lambda} (l_2 + y) + B \sin \sqrt{\lambda} (l_2 - y), & \lambda > 0, \end{cases}$$

удовлетворяет граничным условиям при $B_0 = B = 0$, $\sin 2\sqrt{\lambda} l_2 = 0$, откуда

$$\lambda_n = \left(\frac{\pi n}{2l_2}\right)^2, \quad Y_n(y) = \cos \frac{\pi n}{2} \left(1 + \frac{y}{l_2}\right), \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

Каждому λ_n соответствует решение уравнения (2.24)

$$\begin{aligned}X_0(x) &= A_0 + B_0 x, \\ X_n(x) &= A_n \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} x + B_n \operatorname{ch} \sqrt{\lambda_n} x, \quad n \in \mathbb{N}.\end{aligned}$$

Решение задачи имеет вид

$$u(x, y) = A_0 + B_0 x + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} x + B_n \operatorname{ch} \sqrt{\lambda_n} x) Y_n(y).$$

При $x = \mp l_1$

$$-\frac{J}{h\sigma} \delta(y) = B_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{\lambda_n} A_n \operatorname{ch} \sqrt{\lambda_n} l_1 \mp \sqrt{\lambda_n} B_n \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_n} l_1) Y_n(y),$$

следовательно,

$$B_0 = -\frac{J}{2hl_2\sigma}, \quad B_n = -\frac{JY_n(0)}{hl_2\sigma\sqrt{\lambda_n} \operatorname{ch} \sqrt{\lambda_n} l_1}, \quad A_n = 0, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

В результате

$$u(x, y) = A_0 - \frac{J}{h\sigma} \left(\frac{x}{2l_2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sh} \frac{\pi nx}{l_2} \cos \frac{\pi ny}{l_2}}{n \operatorname{ch} \frac{\pi nl_1}{l_2}} \right), \quad \mathbf{j} = -\sigma \nabla u.$$

2.233. Определить потенциал в неограниченной коробке с прямоугольным поперечным сечением ($0 < x < l_1$, $0 < y < l_2$), грани $x = l_1$ и $y = l_2$ которой поддерживаются при потенциалах u_1 и u_2 соответственно, а грани $x = 0$ и $y = 0$ — при нулевом потенциале.

2.234. Найти форму мембраны ($0 < x < l_1$, $0 < y < l_2$), находящейся в статическом равновесии, если сторона $x = 0$ имеет профиль $u_0 \frac{y}{l_2} (1 - \frac{y^2}{l_2^2})$, сторона $x = l_1$ свободна, а стороны $y = 0$ и $y = l_2$ закреплены в положениях $u(x, 0) = 0$ и $u(x, l_2) = 0$.

2.235. Найти стационарную температуру полубесконечной пластинки ($0 < x < \infty$, $|y| < l$, $|z| < h$), через грань $x = 0$ которой поступает тепловой поток плотности: 1) $q(y) = q_0 \sin(2\pi y/l)$; 2) $q(y) = q_0$; грани $y = \pm l$ имеют нулевую температуру, а остальная поверхность теплоизолирована.

2.236. В пластинку ($0 < x < \infty$, $|y| < l$, $|z| < h$) через грань $x = 0$ поступает постоянный тепловой поток Q , сосредоточенный на линии $y = 0$ с постоянной линейной плотностью. Найти стационарное распределение температуры в этой пластинке, если грани $y = \pm l$ поддерживаются при нулевой температуре, а остальная поверхность теплоизолирована.

2.237. Однородный параллелепипед ($|x| < l_1$, $|y| < l_2$, $|z| < l_3$) изготовлен из материала с проводимостью σ . Постоянный ток J втекает через центр грани $z = -l_3$ и вытекает через центр грани $z = l_3$. Определить электростатический потенциал и плотность тока в параллелепипеде.

Пример 2.12. Определить стационарную температуру толстостенной трубы ($r_1 < r < r_2$), внешняя поверхность которой поддерживается при температуре $f(\varphi) = u_0 \cos \varphi$, а внутренняя — теплоизолирована.

Решение. Задачу естественно поставить в полярных координатах:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0, \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=r_1} = 0, \quad u(r_2, \varphi) = u_0 \cos \varphi.$$

Подстановка $u(r, \varphi) = R(r)\Phi(\varphi)$ приводит к тождеству

$$\frac{r \frac{d}{dr} r \frac{dR}{dr}}{R} + \frac{\Phi''}{\Phi} = 0.$$

Функция $\Phi(\varphi)$, являющаяся непрерывной, а поэтому периодической с периодом 2π , удовлетворяет условиям

$$\Phi'' + \lambda \Phi = 0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi),$$

которые определяют задачу на собственные значения. Решение уравнения, $\Phi = A\varphi + B$ при $\lambda = 0$ и $\Phi = A \sin \sqrt{\lambda} \varphi + B \cos \sqrt{\lambda} \varphi$ при $\lambda > 0$, имеет период 2π при $\sqrt{\lambda} = n$, $n \in \mathbb{N}_0$, и только при таких λ . Собственным значениям $\lambda_n = n^2$ соответствуют собственные функции $\Phi_n(\varphi) = a_n \sin n\varphi + b_n \cos n\varphi$. Функция $R(r)$ удовлетворяет уравнению

$$r \frac{d}{dr} r \frac{dR}{dr} - n^2 R = 0,$$

общее решение которого в зависимости от n имеет вид

$$R_0(r) = c_0 + d_0 \ln r, \quad R_n(r) = c_n r^n + d_n r^{-n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Решение задачи выражается рядом по собственным функциям:

$$u(r, \varphi) = A_0 + B_0 \ln r +$$

$$+ \sum_{n=1}^{\infty} [(A_n r^n + B_n r^{-n}) \cos n\varphi + (C_n r^n + D_n r^{-n}) \sin n\varphi], \quad (2.25)$$

коэффициенты которого определяются из граничных условий при $r = r_1$ и $r = r_2$:

$$\frac{B_0}{r_1} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(n A_n r_1^{n-1} - \frac{n B_n}{r_1^{n+1}} \right) \cos n\varphi + \left(n C_n r_1^{n-1} - \frac{n D_n}{r_1^{n+1}} \right) \sin n\varphi = 0,$$

$$A_0 + B_0 \ln r_2 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n r_2^n + \frac{B_n}{r_2^n} \right) \cos n\varphi + \left(C_n r_2^n + \frac{D_n}{r_2^n} \right) \sin n\varphi = f(\varphi).$$

Так как система $1, \cos \varphi, \sin \varphi, \cos 2\varphi, \dots$ является ортогональной на отрезке $[0, 2\pi]$, то при $n = 1$

$$\begin{cases} A_1 - \frac{B_1}{r_1^2} = 0, \\ A_1 r_1 + \frac{B_1}{r_2} = u_0, \end{cases}$$

откуда

$$A_1 = \frac{u_0 r_2}{r_1^2 + r_2^2}, \quad B_1 = \frac{u_0 r_1^2 r_2}{r_1^2 + r_2^2}.$$

Если $n \neq 1$, то соответствующие коэффициенты равны нулю. В итоге

$$u(r, \varphi) = u_0 \frac{r_1 r_2}{r_1^2 + r_2^2} \left(\frac{r}{r_1} + \frac{r_1}{r} \right) \cos \varphi.$$

2.238. Найти равновесную форму пленки, натянутой на изогнутое кольцо (см. задачу 1.146), если $f(\varphi)$ равна: 1) $u_0 \cos^2 \varphi$; 2) $u_0 \sin^3 \varphi$. Внешних сил нет.

2.239. По поверхности ($r = r_0, 0 \leq \varphi < 2\pi, -\infty < z < \infty$) цилиндра течет ток, линейная плотность которого: 1) $i_0 \mathbf{e}_z$; 2) $i_0 \sin^2 \varphi \mathbf{e}_z$. Определить векторный потенциал магнитного поля.

2.240. Полый цилиндр ($r = r_0, 0 \leq \varphi < 2\pi, -\infty < z < \infty$), заряд единицы площади поверхности которого σ_0 , вращается около оси Oz с постоянной угловой скоростью $\omega \mathbf{e}_z$. Определить векторный потенциал магнитного поля.

2.241. Цилиндр ($r < r_0, 0 \leq \varphi < 2\pi, -\infty < z < \infty$), объемная плотность заряда которого ρ_0 , вращается около оси Oz с постоянной угловой скоростью $\omega \mathbf{e}_z$. Определить векторный потенциал магнитного поля.

2.242. Бесконечный проводящий цилиндр, радиус которого r_0 , внесен в однородное электростатическое поле E_0 , перпендикулярное оси цилиндра. Определить плотность заряда, индуцированного на поверхности цилиндра.

2.243. Бесконечный цилиндр, радиус которого r_0 , движется в идеальной несжимаемой жидкости со скоростью $V(t)\mathbf{k}$, где $\mathbf{k}$ — постоянный единичный вектор, перпендикулярный оси цилиндра. Найти давление на поверхности цилиндра, считая течение жидкости потенциальным.

2.244. Найти распределение скоростей в жидкости при условиях задачи 1.320, если Ω_1 — полукруг, радиус которого r_0 , S — полуокружность. Какова скорость жидкости на свободной поверхности?

2.245. На поверхности цилиндра, радиус которого r_0 , происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой $u_0 \sin \varphi$. Определить стационарную температуру цилиндра.

2.246. На цилиндр, радиус которого r_0 , падает перпендикулярно оси плоскопараллельный тепловой поток, плотность которого q_0 . Найти стационарную температуру цилиндра, если через его поверхность происходит теплообмен по закону Ньютона с внешней средой, температура которой равна нулю.

2.247. Бесконечный диэлектрический цилиндр (радиус r_0 , диэлектрическая проницаемость ε) находится в однородном электрическом поле $\mathbf{E}_0$, перпендикулярном оси цилиндра. Определить поле в цилиндре и дипольный момент единицы длины цилиндра.

2.248. Труба ($r_1 < r < r_2$) из железа с магнитной проницаемостью μ внесена в однородное магнитное поле $\mathbf{H}_0$, перпендикулярное оси трубы. Найти магнитное поле в полости $r < r_1$ и магнитный момент единицы длины трубы.

2.249. По поверхности ($r = r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $-\infty < z < \infty$) течет постоянный ток, линейная плотность которого $\mathbf{i} = i(\varphi)\mathbf{e}_z$. Определить векторный потенциал магнитного поля тока в случаях: 1) $i(\varphi) = i_0$; 2) $i(\varphi) = i_0 \sin \varphi$.

2.250. Определить векторный потенциал магнитного поля круглого цилиндрического соленоида, радиус которого r_0 (см. задачу 1.432).

2.251. Внешняя поверхность трубы ($r_1 < r < r_2$) облучается тепловым потоком, плотность которого $q_0 \cos 2\varphi$, а внутренняя поддерживается при температуре u_0 . Определить стационарную температуру трубы.

2.252. Поверхность $r = r_1$ трубы ($r_1 < r < r_2$) имеет температуру $u_0 \sin \varphi$, а поверхность $r = r_2$ излучает тепло во внешнюю среду по закону Ньютона; температура среды равна нулю. Найти стационарную температуру в трубе.

2.253. Поверхность $r = r_1$ трубы ($r_1 < r < r_2$) поддерживается при постоянной температуре u_1 , а через поверхность $r = r_2$

происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой $u_2 \sin \varphi$. Найти стационарную температуру трубы.

2.254. Найти стационарную температуру бруса, поперечным сечением которого является сектор ($r < r_0$, $0 < \varphi < \alpha < 2\pi$), если температура поверхности $r = r_0$ равна $u_0 \sin^2 \frac{\pi\varphi}{\alpha}$, а остальная поверхность теплоизолирована.

2.255. Найти стационарную температуру бруса, поперечным сечением которого является область ($r_1 < r < r_2$, $0 < \varphi < \alpha < 2\pi$), если температура поверхностей $r = r_1$ и $r = r_2$ равна нулю и $u_0 \cos \frac{2\pi\varphi}{\alpha}$ соответственно, а остальная поверхность теплоизолирована. ^{α}

2.256. В тонкую оболочку ($r = r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z < l$), находящуюся на металлическом основании $z = 0$, через точку ($r = r_0$, $\varphi = 0$, $z = l$) втекает ток J . Определить потенциал электростатического поля и плотность тока в оболочке, если ее проводимость σ .

2.257. В тонкой оболочке ($r = r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $|z| < l$) течет ток J , точка входа которого ($r = r_0$, $\varphi = 0$, $z = -l$), а точка выхода ($r = r_0$, $\varphi = \pi$, $z = l$). Определить потенциал электростатического поля и плотность тока в оболочке, если ее проводимость σ .

2.258. Постоянный ток J втекает в цилиндрическую оболочку ($r = r_0$, $z > 0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$) через точку ($r = r_0$, $z = 0$, $\varphi = 0$). Определить плотность тока в оболочке.

2.259. Тонкая оболочка ($r = r_0$, $0 < \varphi < \pi$, $0 < z < \infty$) изготовлена из материала с проводимостью σ . Определить плотность тока в оболочке, если через точку ($r = r_0$, $\varphi = \pi/2$, $z = 0$) втекает ток J .

2.260. Через точку $\theta = 0$ проводящей сферической оболочки (радиус r_0 , проводимость σ) втекает постоянный ток J , а через точку с координатами $\theta = \frac{\pi}{2}$, $\varphi = 0$ вытекает. Определить потенциал электростатического поля и плотность тока в оболочке.

2.261. Найти волновые функции и уровни энергии стационарных состояний плоского ротатора, момент инерции которого I .

2.262. Плоский ротатор, момент инерции которого I , масса m , заряд e , вращается в однородном магнитном поле $\mathbf{H}_0$, параллельном оси вращения. Найти волновые функции и уровни энергии стационарных состояний ротатора.

2.263. Найти волновую функцию $\Psi(\varphi, t)$ плоского ротатора с моментом инерции I , если волновая функция начального состояния: 1) $\Psi(\varphi, 0) = A \cos^2 \varphi$; 2) $\Psi(x, 0) = A(\sin 2\varphi + \cos^2 \varphi)$. Определить также вероятность $P(E = E_n)$.

2.264. Плоский ротатор с моментом инерции I , вращается около оси Oz ; M_z — проекция момента количества движения на ось Oz . Найти вероятность $P(M_z = m\hbar)$ в момент времени $t > 0$, если: 1) $\Psi(\varphi, 0) = A \sin \varphi$; 2) $\Psi(\varphi, 0) = A \sin^n \varphi$, $n \in \mathbb{N}_0$.

2.265. Плоский ротатор находится в однородном магнитном поле $\mathbf{H}_0$, параллельном оси вращения. Определить волновую функцию $\Psi(\varphi, t)$, если начальное состояние $\Psi(\varphi, 0) = A \sin^3 \varphi$. Найти также вероятность $P(E = E_n)$ и вероятность $P(M_z = m\hbar)$.

2.266. Решить задачу Дирихле в круге,

$$\Delta u = F(r, \varphi), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ u(r_0, \varphi) = f(\varphi),$$

если: 1) $F = 0$, $f = u_0 \cos^4 2\varphi$; 2) $F = 0$, $f = u_0 \cos^{2n} \varphi$, $n \in \mathbb{N}_0$; 3) $F = Axy$, $f = 0$; 4) $F = A \sin 2\varphi$, $f = 0$; 5) $F = Ar^k \sin k\varphi$, $f = 0$, $k \in \mathbb{N}$; 6) $F = A(x + y)$, $f = 0$; 7) $F = 0$, $f = Ae^{\sigma x}$.

2.267. Решить задачу Дирихле вне круга

$$\Delta u = F(r, \varphi), \quad r_0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ u(r_0, \varphi) = f(\varphi),$$

если: 1) $F = 0$, $f = u_0 \sin^4 3\varphi$; 2) $F = 0$, $f = u_0 \sin^{2n} \varphi$, $n \in \mathbb{N}$; 3) $F = 0$, $f = u_0(\cos^4 \varphi + \sin^4 \varphi)$; 4) $F = \frac{A \sin^2 \varphi}{r^4}$, $f = 0$; 5) $F = \frac{Axy}{r^6}$, $f = 0$; 6) $F = \frac{A(x^2 y - xy^2)}{r^6}$, $f = 0$; 7) $F = \frac{A \sin k\varphi}{r^{k+1}}$, $f = 0$; 8) $F = 0$, $f = Ae^{\sigma \sin \varphi}$.

2.268. Решить задачу Неймана в круге

$$\Delta u = F(r, \varphi), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ u_r(r_0, \varphi) = f(\varphi),$$

если: 1) $F = 0$, $f = \frac{Ax^2 y}{r_0^3}$; 2) $F = Ar^2 \sin 3\varphi$, $f = 0$; 3) $F = Ar^3 \sin 5\varphi$, $f = 0$; 4) $F = A \cos 2\varphi$, $f = 0$; 5) $F = Ar \ln r \cos \varphi$, $f = 0$; 6) $F = Ar \ln r \cos 3\varphi$, $f = 0$; 7) $F = A + Br^3 \cos 6\varphi$, $f = K \cos^2 \varphi$; 8) $F = 0$, $f = A \cos \frac{\varphi}{2}$.

2.269. Решить задачу Неймана вне круга

$$\Delta u = F(r, \varphi), \quad 0 < r_0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ u_r(r_0, \varphi) = f(\varphi), \quad |u| < \infty,$$

если: 1) $F = 0$, $f = \frac{Axy^2}{r_0^3}$; 2) $F = \frac{A(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^3}$, $f = 0$; 3) $F = \frac{A \ln r}{r^3} \times$
 $\times \cos 2\varphi$, $f = 0$; 4) $F = \frac{A \ln r}{r^3} \sin \varphi$, $f = 0$; 5) $F = \frac{A \ln r}{r^3} \cos 3\varphi$,
 $f = 0$; 6) $F = \frac{A \cos \varphi}{r^4}$, $f = 0$; 7) $F = \frac{A}{r^3}$, $f = B \sin^2 \varphi$; 8) $F = 0$,
 $f = A + B \sin \frac{\varphi}{2}$.

2.270. Решить третью краевую задачу в круге

$$\Delta u = F(r, \varphi), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ u_r(r_0, \varphi) + hu(r_0, \varphi) = f(\varphi), \quad hr_0 = p,$$

если: 1) $F = 0$, $f = Ay^2$; 2) $F = Ax$, $f = 0$; 3) $F = Ar^2 \cos 3\varphi$,
 $f = 0$; 4) $F = Ar^2 \cos 2\varphi$, $f = 0$.

2.271. Решить третью краевую задачу вне круга

$$\Delta u = F(r, \varphi), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ u_r(r_0, \varphi) - hu(r_0, \varphi) = f(\varphi), \quad hr_0 = p,$$

если: 1) $F = 0$, $f = A \cos 2\varphi$; 2) $F = \frac{A \sin 2\varphi}{r^2}$, $f = 0$; 3) $F =$
 $= \frac{A \sin \varphi}{r^3}$, $f = 0$; 4) $F = \frac{A \ln r}{r^3} \cos \varphi$, $f = 0$, $p = 1$.

2.272. Решить краевую задачу в концентрическом кольце

$$\Delta u = F(r, \varphi), \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

если: 1) $u(r_1, \varphi) = u_1 \cos \varphi$, $u(r_2, \varphi) = u_2 \sin 3\varphi$; 2) $u_r(r_1, \varphi) =$
 $= A$, $u(r_2, \varphi) = u_0 \cos 2\varphi$; 3) $u(r_1, \varphi) = u_0$, $u_r(r_2, \varphi) = A \sin^2 \varphi$;
 4) $u_r(r_1, \varphi) = A_1 \cos^2 \varphi$, $u_r(r_2, \varphi) = A_2$; 5) $u(r_1, \varphi) = 0$; $u_r(r_2, \varphi) +$
 $+ hu(r_2, \varphi) = A \sin \varphi$, $hr_2 = p$; 6) $u_r(r_1, \varphi) - hu(r_1, \varphi) = A \cos \varphi$,
 $u_r(r_2, \varphi) = 0$, $hr_1 = p$.

Пример 2.13. Прямоугольная мембрана ($|x| < l_1$, $|y| < l_2$) с закрепленным краем находится в статическом равновесии под действием поперечной силы, приложенной вдоль линии $y = 0$ с линейной плотностью $f_0 \sin \frac{\pi x}{l_1} \mathbf{e}_u$. В момент времени $t = 0$ действие силы прекращается. Решить задачу о колебаниях мембраны.

Решение. Требуется найти функцию $u(x, y, t)$, которая удовлетворяет условиям

$$\begin{aligned} u_{tt} &= a^2 \Delta u, \quad |x| < l_1, \quad |y| < l_2, \quad 0 < t, \\ u|_{\Gamma} &= 0, \quad u(x, y, 0) = u_0(x, y), \quad u_t(x, y, 0) = 0, \end{aligned}$$

где $u_0(x, y)$ — решение стационарной задачи

$$\begin{aligned} \Delta u_0 &= -\frac{f_0}{T_0} \delta(y) \cdot \sin \frac{\pi x}{l_1}, \quad |x| < l_1, \quad |y| < l_2, \\ u_0|_{\Gamma} &= 0, \end{aligned}$$

Γ — контур мембраны. Пусть $u(x, y, t) = v(x, y)T(t)$, тогда $v(x, y)$ — решение задачи на собственные значения

$$\begin{aligned} \Delta v + \lambda v &= 0, \quad |x| < l_1, \quad |y| < l_2, \\ v|_{\Gamma} &= 0, \end{aligned} \quad (2.26)$$

а $T(t)$ удовлетворяет уравнению $T'' + a^2 \lambda T = 0$. К задаче (2.26) также применим метод разделения переменных; после стандартной подстановки $v(x, y) = X(x)Y(y)$ эта задача приобретает форму

$$\begin{aligned} \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} + \lambda &= 0 \\ XY|_{\Gamma} &= 0. \end{aligned}$$

Таким образом, задача (2.26) сводится к двум задачам Штурма–Лиувилля:

$$\begin{aligned} X'' + \alpha X &= 0, \quad |x| < l_1, \quad Y'' + \beta Y = 0 \quad |y| < l_2, \\ X(-l_1) &= X(l_1) = 0, \quad Y(-l_2) = Y(l_2) = 0, \quad \lambda = \alpha + \beta, \end{aligned}$$

решения которых (см. пример 2.2)

$$X_m(x) = \sin \frac{\pi m}{2} \left(1 + \frac{x}{l_1}\right), \quad Y_n(y) = \sin \frac{\pi n}{2} \left(1 + \frac{y}{l_2}\right), \quad m, n \in \mathbb{N}.$$

Следовательно, собственные значения и собственные функции задачи (2.26) имеют вид

$$\lambda_{mn} = \left(\frac{\pi m}{2l_1}\right)^2 + \left(\frac{\pi n}{2l_2}\right)^2, \quad v_{mn}(x, y) = X_m(x)Y_n(y).$$

Каждому λ_{mn} соответствует функция

$$T_{mn}(t) = A_{mn} \sin \omega_{mn} t + B_{mn} \cos \omega_{mn} t, \quad \omega_{mn} = a \sqrt{\lambda_{mn}}.$$

Решение выражается рядом по собственным функциям

$$u(x, y, t) = \sum_{m,n=1}^{\infty} (A_{mn} \sin \omega_{mn} t + B_{mn} \cos \omega_{mn} t) v_{mn}(x, y).$$

Если $t = 0$, то

$$\sum_{m,n=1}^{\infty} B_{mn} v_{mn}(x, y) = u_0(x, y), \quad \sum_{m,n=1}^{\infty} A_{mn} \omega_{mn} v_{mn}(x, y) = 0.$$

Коэффициенты $A_{mn} = 0$, $B_{mn} = \frac{(u_0, v_{mn})}{\|v_{mn}\|^2}$.

Из условий задачи (2.26) для собственных функций следует, что $v_{mn} = -\frac{\lambda_{mn}}{\Delta} v_{mn}$; оператор Δ эрмитов, а функция $u_0(x, y)$ принадлежит его области определения, поэтому

$$\begin{aligned} B_{mn} &= \frac{(u_0, v_{mn})}{\|v_{mn}\|^2} = -\frac{1}{\lambda_{mn}} \frac{(u_0, \Delta v_{mn})}{l_1 l_2} = -\frac{1}{\lambda_{mn}} \frac{(\Delta u_0, v_{mn})}{l_1 l_2} = \\ &= \frac{f_0}{T_0 l_1 l_2 \lambda_{mn}} Y_n(0) \left(\sin \frac{\pi x}{l_1}, X_m \right) = \frac{f_0 Y_n(0) l_1}{T_0 l_1 l_2 \lambda_{mn}} \delta_{m2}. \end{aligned}$$

Отличны от нуля коэффициенты

$$B_{2k+1,2} = \frac{(-1)^{k+1} f_0}{T_0 l_2 \lambda_{2k+1,2}}.$$

В результате

$$u(x, y, t) = \frac{f_0 l_1^2}{\pi^2 l_2 T_0} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{\pi y}{l_2} (k + \frac{1}{2}) \cos \frac{\pi x}{l_1} \sqrt{1 + \frac{l_1^2}{l_2^2} (k + \frac{1}{2})^2} t}{1 + \frac{l_1^2}{l_2^2} (k + \frac{1}{2})^2} \sin \frac{\pi x}{l_1}.$$

2.273. Прямоугольная мембрана ($0 < x < l_1$, $0 < y < l_2$), две стороны которой $x = 0$ и $x = l_1$ закреплены, а две другие свободны, получает импульс $I \mathbf{e}_u$ в результате поперечного удара в точку (x_0, y_0) . Решить задачу о колебаниях мембраны.

2.274. Квадратная мембрана ($|x| < l$, $|y| < l$) с закрепленным краем получает поперечный импульс $I \mathbf{e}_u$ в результате удара молоточком в область ($|x| < l_1$, $|y| < l_1$), где $l_1 < l$. Решить задачу о колебаниях мембраны.

2.275. Прямоугольная мембрана ($|x| < l_1$, $|y| < l_2$) с закрепленным краем находится в равновесии под действием силы $F_0 \mathbf{e}_u$, равномерно распределенной по поверхности мембраны. С момента $t = 0$ сила не действует. Решить задачу о движении мембраны.

2.276. Грани бесконечного бруса с прямоугольным поперечным сечением ($0 < x < l_1$, $0 < y < l_2$) поддерживаются при нулевой температуре. Найти температуру $u(x, y, t)$ бруса при $t > 0$, если

$$u(x, y, 0) = u_0 \frac{xy}{l_1 l_2} \left(1 - \frac{x}{l_1}\right) \left(1 - \frac{y}{l_2}\right).$$

2.277. Найти температуру однородного цилиндрического бруса с прямоугольным поперечным сечением ($0 < x < l_1$, $0 < y < l_2$), грани $x = 0$ и $y = 0$ которого поддерживаются при нулевой температуре, а две другие теплоизолированы; начальная температура $u_0 \frac{xy}{l_1 l_2}$.

2.278. На грань $y = l_2$ неограниченного бруса с прямоугольным поперечным сечением ($0 < x < l_1$, $0 < y < l_2$) длительное время подается тепловой поток, плотность которого $\mathbf{q} = -q_0 \mathbf{e}_u$, а остальная поверхность поддерживается при нулевой температуре. Как будет меняться температура бруса, если грань $y = l_2$ теплоизолировать?

2.279. Грань $z = 0$ однородного куба ($0 < x, y, z < l$) длительное время поддерживается при температуре u_0 , а остальная поверхность — при нулевой температуре. С момента $t = 0$ вся поверхность куба имеет нулевую температуру. Решить задачу об охлаждении куба.

2.280. Цилиндрический стержень ($0 < x < l$) с прямоугольным поперечным сечением (рис. 1.12, а), торец $x = 0$ которого жестко закреплен, находится в равновесии под действием поперечной силы $F_0 \mathbf{e}_z$, приложенной к свободному торцу $x = l$. Как будет двигаться торец $x = l$ после прекращения действия силы?

2.281. Цилиндрический стержень ($-l < x < l$) с прямоугольным поперечным сечением (рис. 1.12, а), торцы которого шарнирно закреплены, находится в равновесии под действием двух равных противоположно направленных поперечных сил, приложенных в точках $x = -l/2$ и $x = l/2$ и создающих момент $M_0 \mathbf{e}_y$. Решить задачу о движении стержня после прекращения действия сил.

2.282. Стержень, описанный в предыдущей задаче, находится в равновесии под действием силы $F_0 \mathbf{e}_z$, приложенной в центральном сечении $x = 0$. Решить задачу о движении стержня после прекращения действия силы.

2.283. Цилиндрический стержень ($0 < x < l$) с прямоугольным поперечным сечением (рис. 1.12, *a*) получает импульс $I \mathbf{e}_z$ в результате поперечного удара в сечение $x_0 \in (0; l)$. Решить задачу о колебаниях стержня при нулевых начальных условиях, если торец $x = 0$ закреплен жестко, а торец $x = l$ — шарнирно.

2.284. Цилиндрический стержень ($0 < x < l$) с прямоугольным поперечным сечением (рис. 1.12, *a*), один торец ($x = 0$) которого закреплен шарнирно, а другой — жестко, находится в статическом равновесии под действием момента $M_0 \mathbf{e}_y$, приложенного в сечении $x = x_0 \in (0; l)$. Решить задачу о движении стержня после прекращения действия момента.

2.285. Цилиндрический стержень ($0 < x < l$) с прямоугольным поперечным сечением (рис. 1.12, *a*), один торец ($x = 0$) которого жестко закреплен, находится в равновесии под действием момента $M_0 \mathbf{e}_y$, приложенного к свободному торцу $x = l$. Решить задачу о движении стержня после прекращения действия момента.

2.2. Задачи для неоднородного уравнения

Пример 2.14. С точки зрения метода разделения переменных предыдущие задачи решались по единой схеме, так как имели одинаковую математическую структуру: они содержали либо однородное нестационарное уравнение с однородными граничными условиями, либо однородное стационарное уравнение с неоднородными граничными условиями по одной переменной. Прежде чем распространить метод Фурье на задачи с произвольными неоднородностями, следует выделить класс задач, которые сводятся к уже рассмотренным. К ним относятся смешанные задачи со стационарными неоднородностями (т. е. не зависящими от времени) и краевые задачи, в которых неоднородности не зависят от одной из переменных. Суть метода состоит в выделении частного решения, удовлетворяющего уравнению и граничным условиям. Следует подчеркнуть, что ряды, входящие в состав решения, полученного таким путем, сравнительно быстро сходятся, так как коэффициенты рядов содержат достаточно высокие отрицательные степени собственных значений. Известно

(см. [43], т. 1), что в одномерном случае собственные значения λ_n растут с ростом n как n^2 . Методику построения решения можно продемонстрировать на следующей задаче:

$$\begin{aligned}u_t &= a^2 u_{xx} + f(x), \quad l_1 < x < l_2, \quad 0 < t, \\ \alpha_1 u_x(l_1, t) - \beta_1 u(l_1, t) &= \mu_1, \\ \alpha_2 u_x(l_2, t) + \beta_2 u(l_2, t) &= \mu_2, \\ u(x, 0) &= u_0(x),\end{aligned}$$

где $\alpha_i, \beta_i, i = 1, 2$, удовлетворяют условиям (2.4), μ_1, μ_2 — константы. Пусть $u(x, t) = v(x, t) + w(x)$, где функция $w(x)$ выбрана так, что

$$a^2 w''(x) + f(x) = 0, \quad l_1 < x < l_2, \quad (2.27)$$

$$\begin{aligned}\alpha_1 w'(l_1) - \beta_1 w(l_1) &= \mu_1, \\ \alpha_2 w'(l_2) + \beta_2 w(l_2) &= \mu_2.\end{aligned} \quad (2.28)$$

Тогда $v(x, t)$ — решение задачи

$$\begin{aligned}v_t &= a^2 v_{xx}, \quad l_1 < x < l_2, \quad 0 < t, \\ \alpha_1 v_x(l_1, t) - \beta_1 v(l_1, t) &= 0, \\ \alpha_2 v_x(l_2, t) + \beta_2 v(l_2, t) &= 0, \\ v(x, 0) &= u_0(x) - w(x),\end{aligned}$$

которая рассмотрена в примере 2.1. С физической точки зрения функция $w(x)$ описывает стационарное состояние, обусловленное источниками $f(x)$ и влиянием граничного режима. Решение уравнения (2.27) имеет вид

$$w(x) = -\frac{1}{a^2} \int_{l_1}^x f(\xi)(\xi - x) d\xi + C_1 x + C_2.$$

Условия (2.28) приводят к системе

$$\begin{cases} (\alpha_1 - \beta_1 l_1) C_1 - \beta_1 C_2 = \mu_1, \\ (\alpha_2 + \beta_2 l_2) C_2 + \beta_2 C_1 = \mu_2 + \frac{\alpha_2}{a^2} \int_{l_1}^{l_2} f(\xi) d\xi + \frac{\beta_2}{a^2} \int_{l_1}^{l_2} f(\xi)(\xi - l_2) d\xi. \end{cases}$$

Если определитель системы $\Delta = \alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1 + \beta_1 \beta_2 (l_2 - l_1)$ не равен нулю, то существует единственное решение (C_1, C_2) ,

которое определяет функцию $w(x)$. Если $\Delta = 0$, что возможно только при $\beta_1 = \beta_2 = 0$, то система совместна при условии

$$\alpha_1 \mu_2 - \alpha_2 \mu_1 + \frac{\alpha_1 \alpha_2}{a^2} \int_{l_1}^{l_2} f(\xi) d\xi = 0, \quad (2.29)$$

следовательно, $w(x)$ также существует. Наконец, при нарушении условия (2.29) функцию $w(x)$ построить нельзя. Физический смысл равенства (2.29) становится ясным, если задаче дать тепловую трактовку:

$$\begin{aligned} u_t &= a^2 u_{xx} + \frac{Q(x)}{c\rho}, \quad l_1 < x < l_2, \quad 0 < t, \\ u_x(l_1, t) &= -\frac{q_1}{k}, \quad u_x(l_2, t) = -\frac{q_2}{k}, \\ u(x, 0) &= u_0(x). \end{aligned} \quad (2.30)$$

Тогда условие (2.29) выражает стационарный тепловой баланс, при нарушении которого стационарного режима нет. Однако и в этом случае можно построить функцию $w(x, t)$, которая удовлетворяет уравнению и снимает неоднородности задачи (2.30). Достаточно это сделать для $Q = 0$. Функция $w(x, t)$ удовлетворяет граничным условиям задачи (2.30), если ее производная имеет вид

$$w_x(x, t) = -\frac{q_1}{k} \frac{l_2 - x}{l_2 - l_1} + \frac{q_2}{k} \frac{l_1 - x}{l_2 - l_1}.$$

Следовательно,

$$w(x, t) = \frac{q_1}{2k} \frac{(l_2 - x)^2}{l_2 - l_1} - \frac{q_2}{2k} \frac{(l_1 - x)^2}{l_2 - l_1} + C(t).$$

Теперь нужно выбрать $C(t)$ так, чтобы $w(x, t)$ удовлетворяла уравнению, т. е.

$$C'(t) = -\frac{(q_2 - q_1)a^2}{k(l_2 - l_1)}.$$

В результате

$$w(x, t) = \frac{q_1}{2k} \frac{(l_2 - x)^2}{l_2 - l_1} - \frac{q_2}{2k} \frac{(l_1 - x)^2}{l_2 - l_1} - \frac{q_2 - q_1}{k(l_2 - l_1)} a^2 t.$$

З а м е ч а н и е. Так как первые производные линейной и квадратичной функций, соответственно, первого и второго порядков суть константы, то в данном случае можно отыскивать частное решение в виде $w(x) = Ax^2 + Bx + Dt$.

Если представить решение суммой $u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$, то для $v(x, t)$ получится задача с однородным уравнением и однородными граничными условиями:

$$v_t = a^2 v_{xx}, \quad l_1 < x < l_2, \quad 0 < t, \\ v_x(l_1, t) = v_x(l_2, t) = 0, \quad v(x, 0) = u_0(x) - w(x).$$

2.286. На струну ($-l < x < l$) с закрепленными концами действует сила, линейная плотность которой $f_0 \cos \frac{\pi x}{2l} \eta(t) \mathbf{e}_u$. Решить задачу о колебаниях струны при нулевых начальных условиях.

2.287. Струна ($-l < x < l$) с закрепленными концами расположена на горизонтальной подставке. В момент $t = 0$ подставку убирают. Определить движение струны под действием силы тяжести.

2.288. Решить предыдущую задачу для струны ($-l < x < l$) с сосредоточенной массой m в точке $x = 0$.

2.289. На струну ($0 < x < l$) с закрепленными концами действует сила, линейная плотность которой $\frac{F_0}{l^3} x(l-x) \mathbf{e}_u$. Решить задачу о движении струны при нулевых начальных условиях.

2.290. На струну ($-l < x < l$) с закрепленными концами действует постоянная сила $F_0 \mathbf{e}_u$, приложенная с момента времени $t = 0$ в точке $x = 0$. Решить задачу о движении струны, если начальные смещения и скорости равны нулю.

2.291. В точке $x = 0$ струны ($-l < x < l$) с закрепленными концами имеется шарик, масса которого m . Решить задачу о движении шарика под действием постоянной силы $F_0 \mathbf{e}_u$, приложенной к шарiku; начальные условия нулевые.

2.292. Однородный цилиндрический стержень ($0 < x < l$) со свободными торцами расположен на гладкой горизонтальной поверхности. С момента времени $t = 0$ торец $x = 0$ движется в положительном направлении оси Ox : 1) с постоянной скоростью v_0 ; 2) с постоянным ускорением w_0 . Решить задачу о движении стержня.

2.293. Тонкая трубка ($0 < x$) с закрытым концом заполнена идеальным газом, давление которого P_0 , плотность ρ_0 . В сечении $x = l > 0$ трубки находится поршень, который начинает

двигаться в положительном направлении оси Ox : 1) с постоянной скоростью v_0 ; 2) с постоянным ускорением w_0 . Определить в акустическом приближении потенциал скоростей газа на участке между $x = 0$ и поршнем.

2.294. Струна с кольцом (см. задачу 2.201) расположена на горизонтальной подставке и занимает отрезок $[0; l]$ оси Ox . В момент времени $t = 0$ подставку убирают. Решить задачу о движении струны под действием сил тяжести, $\mathbf{e}_u = \mathbf{e}_g$.

2.295. Струна с кольцом (см. задачу 2.201) находится в поле тяжести, $\mathbf{e}_u = -\mathbf{e}_g$. С момента $t = 0$ на кольцо действует постоянная сила $F_0 \mathbf{e}_u$. Решить задачу о движении струны при нулевых начальных условиях.

2.296. Струна с кольцом (см. задачу 2.201) находится в поле тяжести ($\mathbf{e}_u = -\mathbf{e}_g$) в состоянии равновесия под действием силы $F \mathbf{e}_u$, приложенной к кольцу. С момента $t = 0$ действие силы прекращается.

2.297. Упругий стержень ($0 < x < l$) с сосредоточенной массой m на торце $x = l$ расположен на гладкой горизонтальной поверхности и находится в состоянии статического равновесия. Решить задачу о движении стержня под действием постоянных сил $F_1 \mathbf{e}_u$ и $F_2 \mathbf{e}_u$, приложенных с момента $t = 0$ к торцам $x = 0$ и $x = l$ соответственно.

2.298. Боковая поверхность стержня ($0 < x < l$) и торец $x = l$ с сосредоточенной теплоемкостью C теплоизолированы, а другой торец $x = 0$ поддерживается при нулевой температуре. Решить задачу теплопроводности, если начальные температуры стержня и теплоемкости равны соответственно: 1) нулю и u_0 ; 2) u_0 и нулю.

2.299. Боковая поверхность стержня ($0 < x < l$) и торец $x = l$ с сосредоточенной теплоемкостью C теплоизолированы, через торец $x = 0$ в стержень поступает тепловой поток, плотность которого постоянна и равна $q \mathbf{e}_x$. Решить задачу теплопроводности, если начальная температура равна нулю.

2.300. Конец $x = l$ линии ($0 < x < l$) с пренебрежимо малой утечкой заземлен, а к концу $x = 0$ в момент времени $t = 0$ подключается батарея с постоянной э.д.с. E_0 . Определить потенциал линии.

2.301. Конец $x = l$ линии ($0 < x < l$) с физическими параметрами L, C ($R = G = 0$) заземлен через сосредоточенную индуктив-

ность L_0 , а к другому концу в момент времени $t = 0$ подключается батарея с постоянной э.д.с. E_0 . Определить потенциал линии.

2.302. В трубке ($0 < x < l$) с открытыми концами находится идеальный газ, давление которого P_0 , плотность ρ_0 . С момента времени $t = 0$ в сечении $x = x_0 \in (0; l)$ действует источник того же газа постоянной мощности Q_0 . Найти потенциал скоростей газа в акустическом приближении.

2.303. Трубка ($0 < x < l$) заполнена идеальным газом. Конец $x = 0$ закрыт, а на конце $x = l$ находится легкий перемещающийся без трения поршень, закрепленный на пружинке с коэффициентом упругости k . Давление и плотность газа в трубке P_0 и ρ_0 соответственно, внешнее давление P_1 . Пружинка находится в недеформированном состоянии под действием силы, приложенной к поршню. В момент времени $t = 0$ действие силы прекращается. Найти в акустическом приближении закон движения поршня.

2.304. Пространство между параллельными плоскостями $x = 0$ и $x = l$ заполнено вязкой несжимаемой жидкостью. С момента времени $t = 0$ плоскость $x = l$ движется со скоростью $V_0 \mathbf{e}_z$, а плоскость $x = 0$ остается неподвижной. Определить скорость жидкости, если давление вдоль оси Ox постоянно.

$$\mathbf{2.305.} \quad u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x), \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u_x(0, t) = u_x(l, t) = u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$$

$$\mathbf{2.306.} \quad e^{\alpha x} u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} e^{\alpha x} \frac{\partial u}{\partial x} + A, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) = u(l, t) = u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$$

$$\mathbf{2.307.} \quad e^{-\alpha x} u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} e^{-\alpha x} \frac{\partial u}{\partial x} + A, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) = u_x(l, t) = u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$$

$$\mathbf{2.308.} \quad e^{\alpha x} u_{tt} a^2 \frac{\partial}{\partial x} e^{\alpha x} \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = A, \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$$

$$\mathbf{2.309.} \quad u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r} + A(r_0^2 - r^2), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u| < \infty, \quad u(r_0, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$$

$$\mathbf{2.310.} \quad u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r}, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = A, \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$$

2.311. $u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r} + Ar, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t,$
 $|u| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$

2.312. $u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r} + Ar^2, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t,$
 $|u| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$

2.313. Найти температуру стержня ($0 < x < l$) с теплоизолированной боковой поверхностью, на конце $x = 0$ которого происходит теплообмен по закону Ньютона со средой нулевой температуры, а на другой конец падает поток тепла плотности $\mathbf{q} = -q_0 \mathbf{e}_x$; начальная температура стержня равна нулю.

2.314. В стержне ($0 < x < l$) с теплоизолированной поверхностью (включая торцы) действуют источники тепла, плотность которых: 1) $Q_0 \cos \frac{\pi x}{l}$; 2) $Q_0 \sin \frac{\pi x}{l}$. Найти температуру стержня при $t > 0$, если при $t = 0$ его температура равна нулю.

2.315. Конец $x = l$ линии ($0 < x < l$) с физическими параметрами R, C ($L = G = 0$) заземлен, а другой конец подключен через сопротивление R_0 к батарее с постоянной э.д.с. E_0 . Определить потенциал линии при нулевых начальных условиях.

2.316. Концы $x = 0$ и $x = l$ линии ($0 < x < l$) с параметрами L, C ($R = G = 0$) заземлены через индуктивности L_1 и L_2 соответственно. В момент времени $t = 0$ к концу $x = 0$ подключают (последовательно с L_1) батарею с э.д.с. E_0 . Найти потенциал линии.

2.317. Через торцы стержня ($0 < x < l$) с теплоизолированной боковой поверхностью происходит теплообмен по закону Ньютона; коэффициенты теплообмена и температура внешней среды равны: α_1 и 0 , при $x = 0$, α_2 и τ_0 при $x = l$. Определить температуру стержня при $t > 0$, если при $t = 0$ она равна нулю.

2.318. Решить задачу

$$u_t = a^2 u_{xx} + f(x), \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u_x(0, t) = u_x(l, t) = u(x, 0) = 0.$$

2.319. Решить задачу

$$e^{-\alpha x} u_t = a^2 \frac{\partial}{\partial x} e^{-\alpha x} \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u_x(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = A, \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$$

2.320. Решить задачу

$$e^{-\alpha x} u_t = a^2 \frac{\partial}{\partial x} e^{-\alpha x} \frac{\partial u}{\partial x} + A, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$$

2.321. Горизонтальный цилиндрический пласт ($0 < x < l$) с непроницаемой боковой поверхностью заполнен малосжимаемой жидкостью, начальное давление в которой P_0 . Сечение $x = 0$ граничит со скважиной, а сечение $x = l$ представляет собой тонкую перемычку, расход жидкости (поток скорости) через единицу площади которой пропорционален разности давления по обе стороны перемычки (коэффициент пропорциональности α задан). Найти расход Q жидкости, поступающей в скважину в процессе изотермической фильтрации, если давление в скважине P_1 , давление за перемычкой $P_0 > P_1$, площадь поперечного сечения пласта S_0 .

2.322. Горизонтальный цилиндрический пласт ($0 < x < l$) с непроницаемой боковой поверхностью заполнен газом. Его сечение $x = l$ представляет собой тонкую перемычку, расход газа (поток скорости) через единицу площади которой пропорционален разности давления по обе стороны перемычки (коэффициент пропорциональности α задан). Определить давление газа в пласте при установившемся фильтрационном режиме, если давление в сечении $x = 0$ равно P_1 , давление за перемычкой равно P_2 ; μ , m , k и температура — постоянные величины.

2.323. Горизонтальный цилиндрический пласт ($0 < x < l$) граничит со скважиной при $x = 0$. Начальное давление газа в пласте P_0 , давление в скважине P_1 , боковая поверхность пласта и сечение $x = l$ непроницаемы для газа. Обычно $P_0 \gg P_1$ и в коэффициенте при лапласиане в уравнении (1.106) полагают $P = P_0$. Решить линеаризованную задачу фильтрации.

2.324. Горизонтальный цилиндрический пласт ($0 < x < l$) с непроницаемой боковой поверхностью заполнен газом, давление которого при $x = 0$ и $x = l$ равно, соответственно, P_1 и P_2 . Определить плотность потока q газа через поперечное сечение пласта при установившемся фильтрационном процессе; μ , m , k и температура T — постоянные величины.

2.325. Тонкий горизонтальный пласт ($0 < x < l$) с непроницаемым основанием $z = 0$ граничит при $x = 0$ со скважиной. Пласт

частично (по высоте) заполнен жидкостью, высота которой в скважине равна H . Определить форму свободной поверхности жидкости в процессе установившейся безнапорной фильтрации, если расход жидкости (поток скорости), поступающей в скважину через вертикальную полосу единичной ширины сечения $x = 0$ равен q .

2.326. Часть горизонтального пористого пласта заполнена нефтью, которая в процессе фильтрации вытесняется водой. При условиях задачи 1.355 определить время t_0 вытеснения всей нефти. В приближении $\frac{\mu_1}{k_1} \gg \frac{\mu_2}{k_2}$ найти функцию $L(t)$.

2.327. Боковая поверхность прямого кругового конуса, высота которого l , теплоизолирована, а через основание происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой u_0 . Определить температуру конуса при $t > 0$, если его начальная температура равна нулю; предполагается, что изотермические поверхности параллельны основанию (одномерное приближение).

2.328. Прямой круговой конус, высота которого l , с теплоизолированной боковой поверхностью имеет нулевую температуру. С момента $t = 0$ в конусе происходит выделение тепла с объемной плотностью Q в единицу времени. Определить в одномерном приближении температуру конуса, если его основание поддерживается при нулевой температуре.

2.329. Начальная температура усеченного конуса (рис. 1.3) равна нулю, основание $x = 0$ поддерживается при температуре u_0 , а остальная поверхность теплоизолирована. Найти температуру конуса при условии, что изотермические поверхности параллельны основаниям (одномерное приближение).

2.330. Упругий стержень (см. задачу 1.27) находится в статическом равновесии под действием силы $F_0 \mathbf{e}_x$, приложенной к свободному торцу $x = l$, а другой торец, площадь которого S_0 , закреплен посредством пружинки с коэффициентом упругости k . Как будет двигаться стержень, когда действие силы прекратится?

2.331. Упругий стержень (см. задачу 1.27) начинает двигаться под действием постоянной продольной силы F_0 , приложенной к свободному торцу $x = l$, а другой торец, площадь которого S_0 , закреплен посредством пружинки с коэффициентом упругости k . Решить задачу о движении стержня при нулевых начальных условиях.

2.332. Шар, начальная температура которого равна нулю, нагревается радиальным тепловым потоком плотности $\mathbf{q} = -q_0 \mathbf{e}_r$, радиус шара r_0 . Решить задачу теплопроводности.

2.333. Найти концентрацию газа, диффундирующего в шаре, радиус которого r_0 , если начальная концентрация равна нулю, а концентрация на поверхности шара при любом t равна u_0 .

2.334. В шаре с полупроницаемой поверхностью диффундирует газ, начальная концентрация которого равна нулю. Решить задачу диффузии, если концентрация газа вне шара при любом t равна u_0 , радиус шара r_0 .

2.335. В сферическом слое ($r_1 < r < r_2$) действуют источники, выделяющие в единицу времени в единице объема постоянное количество тепла Q . Решить задачу теплопроводности, если начальная температура слоя равна нулю, а: 1) его поверхности поддерживаются при нулевой температуре; 2) поверхность $r = r_1$ теплоизолирована, а поверхность $r = r_2$ имеет нулевую температуру; 3) его поверхности теплоизолированы.

2.336. В сферическом слое ($r_1 < r < r_2$) с момента $t = 0$ действуют тепловые источники, плотность мощности которых $\frac{AC\rho}{r}$. Решить задачу теплопроводности для слоя при нулевой начальной температуре, если: 1) его поверхности поддерживаются при нулевой температуре; 2) поверхность $r = r_2$ теплоизолирована, а поверхность $r = r_1$ имеет нулевую температуру; 3) его поверхности $r_1 = 2$ и $r_2 = 3$ теплоизолированы.

2.337. В сферическом слое ($r_1 < r < r_2$) с момента $t = 0$ действуют тепловые источники, плотность мощности которых $AC\rho r$. Решить задачу теплопроводности для слоя при нулевой начальной температуре, если: 1) его поверхности поддерживаются при нулевой температуре; 2) поверхность $r = r_2$ теплоизолирована, а поверхность $r = r_1$ имеет нулевую температуру; 3) его поверхности $r_1 = 2$ и $r_2 = 3$ теплоизолированы.

2.338. Внутренняя поверхность сферического слоя ($r_1 < r < r_2$) поддерживается при постоянной температуре u_1 , а внешняя — при постоянной температуре u_2 . Решить задачу теплопроводности для слоя, если его начальная температура равна нулю.

2.339. В сферическом слое ($r_1 < r < r_2$) диффундирует газ, концентрация которого на внешней поверхности $r = r_2$ равна u_0 ,

а поверхность $r = r_1$ непроницаема для газа. Найти концентрацию газа в слое при $t > 0$, если при $t = 0$ она равна нулю.

2.340. Внешняя поверхность сферического слоя ($1 < r < 2$) поддерживается при нулевой температуре, а через внутреннюю поверхность проходит тепловой поток постоянной плотности $q_0 \mathbf{e}_r$; начальная температура слоя равна нулю. Решить задачу теплопроводности.

2.341. Внешняя поверхность сферического слоя ($1 < r < 2$) теплоизолирована, а через внутреннюю поверхность проходит тепловой поток постоянной плотности $q_0 \mathbf{e}_r$; начальная температура слоя равна нулю. Решить задачу теплопроводности.

2.342. Через поверхности сферического слоя ($1 < r < 2$) проходит постоянный радиальный тепловой поток Q , равномерно распределенный по каждой из поверхностей. Начальная температура слоя равна нулю. Решить задачу теплопроводности.

2.343. Через поверхности сферического слоя ($1 < r < 2$) проходит тепловой поток постоянной плотности $q_0 \mathbf{e}_r$; начальная температура слоя равна нулю. Решить задачу теплопроводности.

2.344. Через сферический слой ($r_1 < r < r_2$) проходит стационарный поток частиц, обусловленный действием изотропного источника постоянной мощности Q , помещенного в центре ($r = 0$) слоя. В момент времени $t = 0$ источник отключают, а поверхности покрывают непроницаемой оболочкой. Найти плотность потока частиц в слое в процессе диффузии.

2.345. $u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r} + A, \quad r_1 < r < r_2, \quad t > 0,$
 1) $u(r_1, t) = u(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0;$
 2) $u(r_1, t) = u_r(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0;$
 3) $u_r(r_1, t) = u_r(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$

2.346. $u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{A}{r}, \quad r_1 < r < r_2, \quad t > 0,$
 1) $u(r_1, t) = u(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0;$
 2) $u_r(r_1, t) = u(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0;$
 3) $u_r(3, t) = u_r(4, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$

2.347. $u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r} + Ar, \quad 1 < r < 2, \quad t > 0,$

1) $u(1, t) = u(2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0;$

2) $u_r(1, t) = u(2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0;$

3) $u_r(1, t) = u_r(2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$

2.348. $u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r}, \quad r_1 < r < r_2, \quad t > 0,$

1) $u(r_1, t) = u_1, \quad u(r_2, t) = u_2, \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0;$

2) $u_r(r_1, t) = 0, \quad u(r_2, t) = u_0, \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0;$

3) $u_r(r_1, t) = A, \quad u(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0;$

4) $u_r(1, t) = A, \quad u_r(2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$

2.349. Прямоугольная мембрана ($|x| < l_1, |y| < l_2$), закрепленная по краю, находится в статическом равновесии под действием постоянной силы $F_0 \mathbf{e}_u$, равномерно распределенной по линии $y = 0$. Определить форму мембраны.

2.350. На прямоугольную мембрану ($|x| < l_1, |y| < l_2$) с закрепленным краем действует сила, приложенная с момента $t = 0$ вдоль линии $x = 0$ с линейной плотностью $\frac{F_0}{l_2} \sin \frac{\pi y}{l_2} \mathbf{e}_u$. Решить задачу о колебаниях мембраны при нулевых начальных условиях.

2.351. Треугольная мембрана ($0 < x < l, 0 < y < l - x$) с закрепленным краем получает импульс $I \mathbf{e}_u$ в результате поперечного удара в точку с координатами $x = y = l/4$ в момент времени $t = 0$. Решить задачу о движении мембраны, если до удара смещения ее точек из положения равновесия и их скорости были равны нулю.

2.352. Решить предыдущую задачу для мембраны, если сторона, являющаяся гипотенузой треугольника, свободна, а две другие стороны закреплены.

В задачах 2.353–2.358 найти стационарную температуру бруса, поперечным сечением которого плоскостью xOy является треугольник с вершинами в т. $O(0, 0), A(0, l_2), B(l_1, 0)$, тепловые потоки $Q, Q_1, Q_2, Q_1 + Q_2$ постоянны, равномерно распределены по соответствующим граням и отнесены к единице длины бруса (вдоль его оси).

2.353. Поток Q входит внутрь бруса через грань OB и выходит через грань AB ; грань OA теплоизолирована.

2.354. Поток Q входит внутрь бруса через грань OB и выходит через грань OA ; грань AB теплоизолирована.

2.355. Через грани OA и OB внутрь бруса поступают потоки Q_1 , Q_2 соответственно, а через грань AB выходит суммарный поток $Q_1 + Q_2$.

2.356. Внутри бруса с двумя одинаковыми гранями ($l_1 = l_2 = l$) через грань AB поступает поток постоянной плотности q_0 , а остальная часть поверхности поддерживается при нулевой температуре. Определить также наибольшее значение температуры бруса.

2.357. Внутри бруса с двумя одинаковыми гранями ($l_1 = l_2 = l$) через грань AB входит поток Q ; грань OA теплоизолирована, а грань AB имеет нулевую температуру.

2.358. Две грани бруса одинаковы ($l_1 = l_2 = l$) и теплоизолированы, а грань AB поддерживается при температуре $u_0 x/l$.

2.359. В треугольную пластинку (треугольник такой же, как в задаче 2.353) с двумя одинаковыми гранями ($l_1 = l_2 = l$) втекает через грань AB ток, плотность которого постоянна и равна j_0 ; грани OA и AB поддерживаются при нулевом потенциале. Найти вектор $\mathbf{j}(x, y)$ плотности тока в пластинке.

2.360. Найти стационарную температуру бруса с прямоугольным поперечным сечением: 1) ($0 < x < l_1$, $0 < y < l_2$); через грань $x = 0$ которого входит поток Q , а через грань $y = 0$ такой же поток выходит; 2) ($0 < x < l_1$, $0 < y < l_2$); через каждую из граней $x = 0$ и $y = 0$ которого входит поток Q , а через грань $x = l_1$ поток $2Q$ выходит; 3) ($|x| < l_1$, $0 < y < l_2$); через каждую из граней $x = \pm l_1$ которого входит поток Q , а через грань $y = l_2$ поток $2Q$ выходит. Все указанные потоки проходят через единицу длины бруса (вдоль оси), равномерно распределены по поверхности грани, а грани, свободные от потоков, теплоизолированы.

2.361. На грани $x = \mp l_1$, $y = \mp l_2$, $z = \mp l_3$ однородного параллелепипеда ($|x| < l_1$, $|y| < l_2$, $|z| < l_3$) падают стационарные тепловые потоки $Q_{\mp 1}$, $Q_{\mp 2}$, $Q_{\mp 3}$, соответственно. Определить стационарную температуру параллелепипеда, если плотность потока через каждую грань постоянна, а суммарный поток, проходящий через параллелепипед, равен нулю.

2.362. Найти стационарную температуру бруса, сечение которого — полукруг ($r < r_0$, $0 < \varphi < \pi$), если поверхность при $r = r_0$

теплоизолирована, кроме линии ($r = r_0$, $\varphi = \frac{\pi}{2}$, $-\infty < z < \infty$), по которой вводится тепловой поток с линейной плотностью Q_0 , а через диаметрально плоскость (с единицы длины бруса) этот поток выводится, причем плотность его постоянна.

2.363. Поперечным сечением цилиндрического бруса является сектор ($r < r_0$, $0 < \varphi < \alpha < 2\pi$). Решить стационарную задачу теплопроводности, если температура граней $\varphi = 0$ и $\varphi = \alpha$ равна нулю и u_0 соответственно, а на остальной поверхности происходит теплообмен по закону Ньютона со средой нулевой температуры.

2.364. Найти стационарную температуру бруса, поперечным сечением которого является сектор ($r < r_0$, $0 < \varphi < \alpha < 2\pi$), если через брус проходит тепловой поток $2Q$ (на единицу длины бруса), равномерно распределенный по поверхности; поток поступает внутрь бруса через поверхность $r = r_0$.

2.365. В цилиндре $\{r, \varphi, z: r < r_0, 0 \leq \varphi < 2\pi, 0 < z < l\}$ действуют тепловые источники, мощность которых в единице объема равна Q_0 , а через поверхность проходит тепловой поток, плотность которого при $z = 0$, $z = l$, $r = r_0$ соответственно равна $-q_1 \mathbf{e}_z$, $q_2 \mathbf{e}_z$, $q_3 \mathbf{e}_r$. Определить стационарную температуру цилиндра.

2.366. Решить предыдущую задачу, если плотность потока через боковую поверхность цилиндра равна $q_3 \cos \varphi \mathbf{e}_r$, а остальные условия те же.

2.367. В тороиде $\{r, \varphi, z: r_1 < r < r_2, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 < z < l\}$ действуют тепловые источники, мощность которых в единице объема равна Q_0 , а через поверхность проходит тепловой поток, плотность которого при $z = 0$, $z = l$, $r = r_1$, $r = r_2$ соответственно равна $-q_1 \mathbf{e}_z$, $q_2 \mathbf{e}_z$, $-q_3 \mathbf{e}_r$, $q_3 \mathbf{e}_r$. Определить стационарную температуру тороида.

2.368. В трубе ($0 < z < l$), поперечное сечение которой — эллипс с полуосями a и b , течет вязкая несжимаемая жидкость; давление на концах трубы $P(0) = P_1$, $P(l) = P_2$. Определить скорость жидкости, если ее течение стационарно.

2.369. Упругий стержень ($-l < x < l$) с прямоугольным поперечным сечением (рис. 1.12) находится в горизонтальном положении. Решить задачу о поперечных колебаниях стержня под

действием силы тяжести; концы стержня закреплены, начальные условия нулевые.

2.370. Горизонтальный недеформируемый пласт с непроницаемыми основаниями имеет форму плоской линзы, радиус которой r_2 ; в центре линзы пробита скважина, радиус которой $r_1 < r_2$. Найти давление газа в пласте при установившейся изотермической фильтрации, если при r_1 и r_2 давление равно P_1 и P_2 соответственно.

2.371. Горизонтальный недеформируемый пласт с непроницаемыми основаниями заполнен газом. Пласт имеет форму плоской линзы, радиус которой r_2 ; в центре пласта пробита скважина, радиус которой $r_1 < r_2$. Внешняя поверхность $r = r_2$ пласта представляет собой тонкую перегородку, расход газа (поток скорости) через единицу площади которой пропорционален разности давления по обе стороны перегородки (коэффициент пропорциональности α задан). Найти плотность потока q газа через поверхность скважины в процессе стационарной изотермической фильтрации, если давление в скважине P_1 , давление вне пласта $P_2 > P_1$.

2.372. Тонкий круговой пласт, радиус которого r_2 , расположен на непроницаемом горизонтальном основании $z = 0$. В центре пласта имеется скважина, радиус которой $r_1 < r_2$. Пласт частично (по высоте) заполнен жидкостью, высота которой в скважине равна H . Определить форму свободной поверхности жидкости при установившейся безнапорной фильтрации, если расход жидкости (поток скорости), поступающей в скважину, равен Q .

2.373. Горизонтальный круговой пласт со скважиной частично заполнен нефтью, которая в процессе фильтрации вытесняется водой. При условиях задачи 1.356 и в приближении $\frac{\mu_1}{k_1} \gg \frac{\mu_2}{k_2}$ определить время t_0 вытеснения всей нефти.

2.374. Гибкая упругая пленка натянута на кольцо, радиус которого r_0 , и находится в поле тяжести ($\mathbf{e}_u = -\mathbf{e}_g$). Кольцо изгибают так, что каждая точка получает отклонение $f(\varphi)$ в направлении $\mathbf{e}_u$ и остается неподвижной (см. задачи 1.145, 1.146). Определить равновесную форму $v = v(r, \varphi)$ пленки, если функция $f(\varphi)$ равна: 1) $u_0 \cos^2 \varphi$; 2) $u_0 \sin^3 \varphi$.

2.375. Упругая круглая пластинка, радиус которой r_0 , закреплена по краю; в центре пластинки приложена сила $F_0 \mathbf{e}_u$. Определить равновесную форму пластинки.

2.376. Решить предыдущую задачу для пластинки, опертой по краю.

Пример 2.15. Метод, рассмотренный в предыдущем примере, основан на выделении частного решения, снимающего неоднородности. Этот метод применим и для некоторых задач с нестационарными неоднородностями, к числу которых относится следующая задача.

На струну ($0 < x < l$), конец $x = 0$ которой закреплен, а конец $x = l$ свободен (см. задачу 1.45), действует сила $F_0 \sin \omega t \mathbf{e}_u$, приложенная в точке $x = x_0 \in (0, l)$. Определить колебания струны при нулевых начальных условиях.

Решение. Задача

$$\begin{aligned} u_{tt} &= a^2 u_{xx} + \frac{F_0}{\rho} \delta(x - x_0) \cdot \sin \omega t, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) &= u_x(l, t) = u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0 \end{aligned}$$

сводится посредством подстановки $u(x, t) = f(x) \sin \omega t + v(x, t)$ к двум более простым. Первое слагаемое (частное решение неоднородного уравнения) описывает вынужденные колебания, второе — свободные колебания струны:

$$\begin{aligned} 1) \quad f'' + \frac{\omega^2}{a^2} f &= -\frac{F_0}{T} \delta(x - x_0), \quad 0 < x < l, \\ f(0) &= f'(l) = 0; \\ 2) \quad v_{tt} &= a^2 v_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ v(0, t) &= v_x(l, t) = 0, \\ v(x, 0) &= 0, \quad v_t(x, 0) = -\omega f(x). \end{aligned}$$

Первая задача имеет следующую (эквивалентную) постановку (см. 10.15):

$$\begin{aligned} f'' + \frac{\omega^2}{a^2} f &= 0, \quad 0 < x < x_0, \quad x_0 < x < l, \\ f(0) &= f'(l) = 0, \\ f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0) &= 0, \\ f'(x_0 + 0) - f'(x_0 - 0) &= -\frac{F_0}{T}. \end{aligned}$$

Решение, удовлетворяющее граничным условиям, имеет вид

$$f(x) = \begin{cases} A \sin \frac{\omega x}{a}, & 0 \leq x \leq x_0, \\ B \cos \frac{\omega(l-x)}{a}, & x_0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

Если $x = x_0$, то

$$\begin{cases} A \sin \frac{\omega x_0}{a} - B \cos \frac{\omega(l-x_0)}{a} = 0, \\ A \cos \frac{\omega x_0}{a} - B \sin \frac{\omega(l-x_0)}{a} = \frac{aF_0}{\omega T}, \end{cases}$$

откуда при условии $\omega l/a \neq (2n+1)\pi/2$

$$A = -\frac{F_0 \cos \frac{\omega(l-x_0)}{a}}{a\omega\rho \cos \frac{\omega l}{a}}, \quad B = -\frac{F_0 \sin \frac{\omega x_0}{a}}{a\omega\rho \cos \frac{\omega l}{a}}.$$

Решение второй задачи имеет форму ряда

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \sin \omega_n t + B_n \cos \omega_n t) X_n(x),$$

где $X_n(x) = \sin \sqrt{\lambda_n} x$, $\omega_n = a\sqrt{\lambda_n}$, $\sqrt{\lambda_n} = \frac{(2n+1)\pi}{2l}$. Согласно начальным условиям

$$\sum_{n=1}^{\infty} B_n X_n(x) = 0, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \omega_n A_n X_n(x) = -\omega f(x);$$

отсюда следует, что

$$A_n = -\frac{2\omega}{l\omega_n}(f, X_n), \quad B_n = 0.$$

Вычисление интеграла проще всего осуществить способом, изложенным в примере 2.3:

$$\begin{aligned} (f, X_n) &= -\frac{1}{\lambda_n}(f, X_n'') = -\frac{1}{\lambda_n}(f'', X_n) = \\ &= -\frac{1}{\lambda_n} \left(-\frac{\omega^2}{a^2} f - \frac{F_0}{T} \delta(x-x_0), X_n \right) = \frac{\omega^2}{a^2 \lambda_n} (f, X_n) + \frac{F_0}{\lambda_n T} X_n(x_0), \end{aligned}$$

откуда

$$(f, X_n) = \frac{F_0 X_n(x_0)}{T \left(\lambda_n - \frac{\omega^2}{a^2} \right)} = \frac{F_0 X_n(x_0)}{\rho (\omega_n^2 - \omega^2)}.$$

Итак, если $\omega \neq \omega_n$, то

$$u(x, t) = f(x) \sin \omega t - \frac{2\omega F_0}{\rho l} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{X_n(x_0) X_n(x) \sin \omega_n t}{\omega_n (\omega_n^2 - \omega^2)},$$

где

$$f(x) = -\frac{F_0}{a\omega\rho\cos\frac{\omega l}{a}} \begin{cases} \cos\frac{\omega(l-x_0)}{a} \sin\frac{\omega x}{a}, & 0 \leq x \leq x_0, \\ \cos\frac{\omega(l-x)}{a} \sin\frac{\omega x_0}{a}, & x_0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

Если $\omega = \omega_{n_0}$, то задача для $f(x)$, записанная в виде

$$\begin{aligned} \mathcal{L}f &= g, & 0 < x < l, \\ f(0) &= f'(l) = 0, \end{aligned}$$

где $\mathcal{L} = -\left(\frac{d^2}{dx^2} + \frac{\omega^2}{a^2}\right)$, $g = -\frac{F_0}{T}\delta(x-x_0)$, не имеет, вообще говоря, решения. Действительно, в данном случае (т. е. при $\omega = \omega_{n_0}$) $\lambda = 0$ — собственное значение, а $X_{n_0}(x) = \sin\frac{(2n_0+1)\pi x}{2l}$ — соответствующая собственная функция оператора $\mathcal{L}$, поэтому функции g и X_{n_0} будут ортогональны, $(g, X_{n_0}) = (\mathcal{L}f, X_{n_0}) = (f, \mathcal{L}X_{n_0}) = 0$. Следовательно, для разрешимости задачи необходимо, чтобы $g(x)$ и $X_{n_0}(x)$ были ортогональны. Если

$$(g, X_{n_0}) = -\frac{F_0}{T}(\delta(x-x_0), X_{n_0}(x)) = -\frac{F_0}{T}X_{n_0}(x_0) = 0,$$

т. е. $\sin\frac{(2n_0+1)\pi x_0}{2l} = 0$, то $x_0 = \frac{2lm}{2n_0+1}$, $0 < m < n_0 + \frac{1}{2}$, (m — целое) и

$$f(x) = \begin{cases} AX_{n_0}(x), & 0 \leq x \leq x_0, \\ BX_{n_0}(x), & x_0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

Для определения констант A и B имеется только одно уравнение $[f']_{x_0} = -F_0/T$ (другое — $[f]_{x_0} = 0$ — выполняется при любых A и B), поэтому константы можно связать каким-либо дополнительным условием, например, потребовать, чтобы было выполнено условие ортогональности $(f, X_{n_0}) = 0$. В результате получается система

$$\begin{cases} A - B = \frac{(-1)^m F_0}{a\omega\rho}, \\ Ax_0 + B(l-x_0) = 0, \end{cases}$$

откуда

$$A = (-1)^m \frac{F_0(l-x_0)}{a\omega\rho l}, \quad B = (-1)^{m+1} \frac{F_0 x_0}{a\omega\rho l}.$$

Решение задачи для $v(x, t)$ строится так же, как и в случае отсутствия резонанса.

Таким образом, если $\omega = \omega_{n_0}$ и $X_{n_0}(x_0) = 0$, то

$$u(x, t) = f(x) \sin \omega t - \frac{2\omega F_0}{\rho l} \sum_{\substack{n=0 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{X_n(x_0) X_n(x) \sin \omega_n t}{\omega_n (\omega_n^2 - \omega^2)},$$

где

$$f(x) = \frac{(-1)^m F_0}{a \omega \rho l} \sin \frac{\omega x}{a} \begin{cases} l - x_0, & 0 \leq x \leq x_0, \\ -x_0, & x_0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

Если же $X_{n_0}(x_0) \neq 0$, то в правую часть уравнения $\mathcal{L}f = g$ можно ввести слагаемое, заведомо не ортогональное функции X_{n_0} , таким образом, чтобы полученная сумма и $X_{n_0}(x)$ были ортогональны. С этой целью следует переписать уравнение исходной задачи в виде

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + \frac{F_0}{\rho} \delta(x - x_0) \cdot \sin \omega t + C_0 X_{n_0}(x) \sin \omega t - C_0 X_{n_0}(x) \sin \omega t$$

и разбить на две, полагая $u(x, t) = U(x, t) + w(x, t)$:

$$1) \quad U_{tt} = a^2 U_{xx} + \frac{F_0}{\rho} \delta(x - x_0) \cdot \sin \omega t + C_0 X_{n_0}(x) \sin \omega t, \\ 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$U(0, t) = U_x(l, t) = U(x, 0) = U_t(x, 0) = 0;$$

$$2) \quad w_{tt} = a^2 w_{xx} - C_0 X_{n_0}(x) \sin \omega t, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ w(0, t) = w_x(l, t) = w(x, 0) = w_t(x, 0) = 0.$$

Для решения первой задачи пригоден тот же способ, что и при отсутствии резонанса. В результате введения новой неизвестной функции $U(x, t) = f(x) \sin \omega t + v(x, t)$ получаются две задачи:

$$1) \quad f'' + \frac{\omega^2}{a^2} f = -\frac{F_0}{T} \delta(x - x_0) - \frac{C_0}{a^2} X_{n_0}(x), \quad 0 < x < l, \\ f(0) = f'(l) = 0;$$

$$2) \quad v_{tt} = a^2 v_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ v(0, t) = v_x(0, t) = 0, \\ v(x, 0) = 0, \quad v_t(x, 0) = -\omega f(x).$$

Задача для $f(x)$ разрешима, если

$$\left(-\frac{F_0}{T} \delta(x - x_0) - \frac{C_0}{a^2} X_{n_0}(x), X_{n_0}(x) \right) = 0,$$

откуда $C_0 = -\frac{2F_0}{\rho l} \sin \frac{\omega}{a} x_0$. Решение, удовлетворяющее граничным условиям, имеет вид

$$f(x) = \begin{cases} A \sin \frac{\omega x}{a} + \frac{C_0}{2a\omega} x \cos \frac{\omega x}{a}, & 0 \leq x \leq x_0, \\ B \sin \frac{\omega x}{a} + \frac{C_0}{2a\omega} (l-x) \cos \frac{\omega x}{a}, & x_0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

Уравнения $[f]_{x_0} = 0$ и $[f']_{x_0} = -F_0/T$ эквивалентны относительно A и B , и к ним можно присоединить условие ортогональности $(f, X_{n_0}) = 0$. В результате получается система

$$\begin{cases} A - B = \frac{F_0}{a\omega\rho} \cos \frac{\omega x_0}{a}, \\ (A - B) \left(x_0 - \frac{a}{2\omega} \sin \frac{2\omega x_0}{a} \right) + Bl = -\frac{F_0}{2\rho\omega^2} \sin \frac{\omega x_0}{a} \cos \frac{2\omega x_0}{a}, \end{cases}$$

решение которой

$$\begin{aligned} A &= \frac{F_0}{a\omega\rho l} \left[\frac{a}{2\omega} \sin \frac{\omega x_0}{a} + (l - x_0) \cos \frac{\omega x_0}{a} \right], \\ B &= \frac{F_0}{a\omega\rho l} \left(\frac{a}{2\omega} \sin \frac{\omega x_0}{a} - x_0 \cos \frac{\omega x_0}{a} \right). \end{aligned}$$

Построение решения задачи для $v(x, t)$ проводится так же, как и в случае $\omega \neq \omega_n$.

Решение последней задачи следует отыскивать в виде произведения $w(x, t) = h(t)X_{n_0}(x)$. Для $h(t)$ получается задача Коши

$$\begin{aligned} h'' + \omega^2 h &= -C_0 \sin \omega t, \quad 0 < t, \\ h(0) &= f'(0) = 0, \end{aligned}$$

решение которой $h(t) = \frac{C_0}{2\omega^2} (\omega t \cos \omega t - \sin \omega t)$.

Таким образом, если $\omega = \omega_{n_0}$, а $X_{n_0}(x_0) \neq 0$, то

$$\begin{aligned} u(x, t) &= f(x) \sin \omega t + \frac{F_0 \sin \frac{\omega x_0}{a}}{\omega^2 \rho l} \sin \frac{\omega x}{a} (\sin \omega t - \omega t \cos \omega t) - \\ &\quad - \frac{2\omega F_0}{\rho l} \sum_{\substack{n=0 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{X_n(x_0) X_n(x) \sin \omega_n t}{\omega_n (\omega_n^2 - \omega^2)}, \end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{F_0}{a\omega\rho l} \left[\left(\frac{a}{2\omega} \sin \frac{\omega x}{a} - x \cos \frac{\omega x}{a} \right) \sin \frac{\omega x_0}{a} + \right. \\ &\quad \left. + (l - x_0) \cos \frac{\omega x_0}{a} \sin \frac{\omega x}{a} \right] \end{aligned}$$

при $0 \leq x \leq x_0$; если $x_0 \leq x \leq l$, то в выражении для $f(x)$ нужно сделать замены $x \rightarrow x_0$, $x_0 \rightarrow x$.

Решить задачи 2.377–2.451, выделяя частное решение уравнения, удовлетворяющее граничным условиям.

2.377. Один конец ($x = -l$) струны ($-l < x < l$) закреплен, а другой свободен (см. задачу 1.45). Решить при нулевых начальных условиях задачу о колебаниях струны под действием силы, линейная плотность которой $\frac{F_0}{l\sqrt{2}} \left(\sin \frac{\pi x}{4l} + \cos \frac{\pi x}{4l} \right) \sin \omega t \mathbf{e}_u$.

2.378. С момента $t = 0$ на однородную струну ($0 < x < l$), конец $x = l$ которой закреплен, а конец $x = 0$ свободен (см. задачу 1.45), действует сила с линейной плотностью $f_0 \sin \omega t \mathbf{e}_u$. Определить движение струны при нулевых начальных условиях.

2.379. На струну ($0 < x < l$) с закрепленными концами действует сила, линейная плотность которой $f_0 \frac{x}{l} \left(1 - \frac{x}{l} \right) \sin \omega t \mathbf{e}_u$. Решить задачу о колебаниях струны при нулевых начальных условиях.

2.380. На струну ($-l < x < l$) с закрепленными концами действует сила, линейная плотность которой $f_0 \sin \frac{\pi n x}{l} \sin \omega t \mathbf{e}_u$, $n \in \mathbb{N}$. Решить задачу о колебаниях струны при нулевых начальных условиях.

2.381. Решить предыдущую задачу для струны с сосредоточенной массой m в точке $x = 0$.

2.382. На струну ($0 < x < l$) с закрепленными концами, натяжение которой T , линейная плотность ρ , действует сила $F_0 \sin \omega t \mathbf{e}_u$, $\omega = \frac{3\pi a}{2l}$, $a = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$, приложенная в точке $x_0 = \frac{2l}{3}$. Решить задачу о поперечных колебаниях струны при нулевых начальных условиях.

2.383. На струну ($0 < x < l$) с закрепленными концами, натяжение которой T , линейная плотность ρ , действует сила $F_0 \sin \omega t \mathbf{e}_u$, $\omega = \frac{2\pi a}{l}$, $a = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$, приложенная в точке: 1) $x_0 = \frac{l}{2}$; 2) $x_0 = \frac{l}{3}$. Решить задачу о поперечных колебаниях струны при нулевых начальных условиях.

2.384. На струну ($0 < x < l$) с закрепленными концами действует сила $F_0 \sin \omega t \mathbf{e}_u$, приложенная в точке $x_0 \in (0, l)$. Решить

задачу о поперечных колебаниях струны при нулевых начальных условиях.

2.385. Один конец ($x = 0$) однородной струны ($0 < x < l$) закреплен, а другой движется (в направлении, перпендикулярном оси Ox) по закону $u_0 \sin \omega t$, где $\omega = \frac{\pi a}{l}$, $a = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$. Решить задачу о колебаниях струны при нулевых начальных условиях.

2.386. Однородный цилиндрический стержень ($0 < x < l$) со свободными торцами расположен на гладкой горизонтальной поверхности. С момента времени $t = 0$ на торец $x = 0$ действует сила $F_0 \sin \omega t \mathbf{e}_x$, где $\omega = \frac{\pi a}{l}$, $a = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$. Решить задачу о движении стержня при нулевых начальных условиях.

2.387. На однородный цилиндрический стержень ($0 < x < l$) с закрепленным левым торцом ($x = 0$) действует продольная сила $F_0 \sin \omega t \mathbf{e}_x$, $\omega = \frac{\pi a}{2l}$, $a = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$, приложенная к торцу $x = l$. Решить задачу о колебаниях стержня при нулевых начальных условиях.

2.388. Однородный цилиндрический стержень ($0 < x < l$) со свободными торцами находится на гладкой горизонтальной поверхности. С момента времени $t = 0$ торец $x = 0$ движется (вдоль оси Ox) по закону $u_0 \sin \omega t$. Решить задачу о движении стержня при нулевых начальных условиях.

2.389. Один конец ($x = 0$) трубки ($0 < x < l$) с идеальным газом закрыт, а на другом находится поршень, движущийся со скоростью $u_0 \sin \omega t$. Определить в акустическом приближении потенциал скоростей газа, если начальные давление и плотность P_0 и ρ_0 соответственно.

2.390. Однородный цилиндрический стержень ($0 < x < l$) со свободными торцами находится на гладкой горизонтальной поверхности. С момента $t = 0$ на торец $x = 0$ действует сила $At^2 \mathbf{e}_x$. Решить задачу о движении стержня при нулевых начальных условиях.

2.391. $u_{tt} = a^2 u_{xx} + At, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u(0, t) = u(l, t) = u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$

2.392. $u_{tt} = a^2 u_{xx} + At, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$
 $u_x(0, t) = u(l, t) = u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$

- 2.393.** $u_{tt} = a^2 u_{xx} + At$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $u(0, t) = 0$, $u_x(l, t) + hu(l, t) = 0$, $u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$.
- 2.394.** $u_{tt} = a^2 u_{xx} + At^2$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $u(0, t) = u(l, t) = u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$.
- 2.395.** $u_{tt} = a^2 u_{xx} + At^2$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $u_x(0, t) = u(l, t) = u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$.
- 2.396.** $u_{tt} = a^2 u_{xx} + Axt$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $u(0, t) = u(l, t) = u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$.
- 2.397.** $u_{tt} = a^2 u_{xx} + Axt$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $u(0, t) = u_x(l, t) = u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$.
- 2.398.** $u_{tt} = a^2 u_{xx} + Axe^{-\alpha t}$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $u(0, t) = u(l, t) = u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$, $\alpha > 0$.
- 2.399.** $u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(t)$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $u_x(0, t) = u_x(l, t) = u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$.
- 2.400.** $u_{tt} = a^2 u_{xx} + Axt$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $u_x(0, t) = u_x(l, t) = u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$.
- 2.401.** $u_{tt} = a^2 u_{xx} + Axt^2$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $u_x(0, t) = u_x(l, t) = u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$.
- 2.402.** $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $u_x(l, t) = Ae^{-\alpha t}$, $\alpha > 0$; $u_x(0, t) = u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$.
- 2.403.** $e^{\alpha x} u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} e^{\alpha x} \frac{\partial u}{\partial x} + A$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $u(0, t) = u(l, t) = u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$.
- 2.404.** $e^{\alpha x} u_{tt} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} e^{\alpha x} \frac{\partial u}{\partial x} + At$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $u(0, t) = u_x(l, t) = u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0$.
- 2.405.** $u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r} + A(r_0 - r)t$, $0 < r < r_0$, $0 < t$,
 $|u| < \infty$, $u(r_0, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0$.
- 2.406.** $u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r} + At^2$, $0 < r < r_0$, $0 < t$,
 $|u| < \infty$, $u(r_0, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0$.

$$\mathbf{2.407.} \quad u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r} + A(r_0^2 - r^2)t^2, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u| < \infty, \quad u(r_0, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$$

$$\mathbf{2.408.} \quad u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r}, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u| < \infty, \quad u(r_0, t) = u_0 \sin \omega t, \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$$

$$\mathbf{2.409.} \quad u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r} + Ae^{-\alpha t}, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0, \quad \alpha \leq 0.$$

$$\mathbf{2.410.} \quad u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r} + Art, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$$

$$\mathbf{2.411.} \quad u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r} + A(r_0 - r)^2 t, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$$

$$\mathbf{2.412.} \quad u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r}, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = At, \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$$

$$\mathbf{2.413.} \quad u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r}, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = At^2, \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0, \quad \alpha > 0.$$

2.414. Торец $x = 0$ цилиндрического стержня ($0 < x < l$) с прямоугольным поперечным сечением (см. рис. 1.12, *a*) закреплен жестко, а торец ($x = l$) — шарнирно. Решить задачу о движении стержня под действием момента сил $M_0 \mathbf{e}_y$, приложенного к торцу $x = l$; начальные условия нулевые.

2.415. Решить предыдущую задачу для стержня, оба торца которого закреплены шарнирно.

2.416. На цилиндрический стержень ($0 < x < l$) с прямоугольным поперечным сечением (см. рис. 1.12, *a*) действует приложенная в сечении $x = x_0 \in (0; l)$ сила $F_0 \eta(t) \mathbf{e}_z$. Решить при нулевых начальных условиях задачу о движении стержня, если его торцы жестко закреплены.

2.417. В сечении $x = x_0 \in (0; l)$ цилиндрического стержня ($0 < x < l$) с прямоугольным поперечным сечением (рис. 1.12, *a*) действуют силы, момент которых $M_0 \eta(t) \mathbf{e}_y$. Решить задачу о движении стержня при нулевых начальных условиях, если левый торец $x = 0$ жестко закреплен, а торец $x = l$ свободен.

2.418. В однородном цилиндрическом стержне ($0 < x < l$) с теплоизолированной боковой поверхностью действуют источники тепла, мощность которых в единице объема $Q_0 \exp(-\alpha t)$, где $\alpha \geq 0$. Решить задачу теплопроводности при нулевом начальном условии, если торцы: 1) поддерживаются при нулевой температуре; 2) теплоизолированы.

2.419. Через боковую поверхность однородного цилиндрического стержня ($0 < x < l$) с теплоизолированными торцами происходит теплообмен по закону Ньютона со средой нулевой температуры (коэффициент теплообмена на единицу длины стержня β задан). Найти температуру стержня при $t > 0$, если при $t = 0$ она равна нулю, а в сечении $x = x_0 \in (0; l)$ действует источник тепла, мощность которого на единицу площади сечения равна $Q_0 e^{-\alpha t}$, $\alpha \geq 0$.

2.420. В сечении $x = x_0$ тонкой трубки ($0 < x < l$) действует источник неустойчивого газа (распад пропорционален концентрации, коэффициент пропорциональности β задан), мощность которого на единицу площади сечения равна $Q_0 e^{-\alpha t}$, $\alpha \geq 0$. Определить концентрацию газа в процессе диффузии, если его начальная концентрация и концентрация на концах трубки при $t \geq 0$ равна нулю.

2.421. Торец $x = 0$ цилиндрического стержня ($0 < x < l$) поддерживается при нулевой температуре. Решить задачу теплопроводности при нулевом начальном условии, если температура торца $x = l$ равна At .

2.422. Через торец $x = l$ внутрь однородного цилиндрического стержня ($0 < x < l$) поступает тепловой поток, плотность которого At , а другой торец поддерживается при нулевой температуре. Решить задачу теплопроводности при нулевом начальном условии.

2.423. Найти концентрацию $u(x, t)$ газа, диффундирующего в трубке ($0 < x < l$) с закрытым концом $x = 0$, если $u(x, 0) = 0$, а на конце $x = l$ концентрация равна At .

2.424. В трубку ($0 < x < l$) с закрытым концом $x = 0$ поступает газ, плотность потока которого на конце $x = l$ равна At . Определить концентрацию газа в трубке в процессе диффузии при $t > 0$, если начальная концентрация равна нулю.

2.425. В трубке ($0 < x < l$) с закрытым концом $x = 0$ диффундирует газ, проникающий через полупроницаемую перегородку

на конце $x = l$ (коэффициент пропорциональности α задан). Определить концентрацию $u(x, t)$ газа в трубке при $t > 0$, если начальная концентрация равна нулю, а концентрация во внешнем пространстве равна At .

2.426. Температура торцов $x = 0$ и $x = l$ однородного цилиндрического стержня ($0 < x < l$) с теплоизолированной боковой поверхностью равна нулю и $u_0 e^{-\alpha t}$ ($\alpha \geq 0$) соответственно. Решить задачу теплопроводности при нулевом начальном условии.

2.427. Определить температуру однородного цилиндрического стержня ($0 < x < l$), боковая поверхность и торец $x = l$ которого теплоизолированы, температура торца $x = 0$ равна $u_0 e^{-\alpha t}$, $\alpha \geq 0$, начальная температура равна нулю.

2.428. Решить задачу теплопроводности для однородного цилиндрического стержня ($0 < x < l$) с теплоизолированной боковой поверхностью, торец $x = l$ которого поддерживается при нулевой температуре, а через торец $x = 0$ поступает тепловой поток плотности $q_0 e^{-\alpha t} \mathbf{e}_x$, $\alpha \geq 0$; начальная температура равна нулю.

2.429. Температура цилиндрического стержня ($0 < x < l$) при $t = 0$ равна нулю. С момента $t = 0$ через торец $x = 0$ проходит тепловой поток, плотность которого $q_0 e^{-\alpha t} \mathbf{e}_x$, $\alpha \geq 0$, а остальная поверхность теплоизолирована. Найти температуру стержня.

2.430. Торец $x = 0$ цилиндрического стержня ($0 < x < l$) поддерживается при нулевой температуре, а через другой торец происходит теплообмен по закону Ньютона с внешней средой, температура которой At . Решить задачу теплопроводности при нулевом начальном условии.

2.431. Трубка ($0 < x < l$) с полупроницаемой боковой поверхностью помещена в среду, концентрация газа в которой у поверхности трубки равна $\frac{u_0 x}{l}$. Концы трубки закрыты, начальная концентрация газа в ней равна нулю. Решить задачу диффузии.

2.432. $u_t = a^2 u_{xx} + At$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $u(0, t) = u(l, t) = u(x, 0) = 0$.

2.433. $u_t = a^2 u_{xx} + At$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $u(0, t) = u_x(l, t) = u(x, 0) = 0$.

2.434. $u_t = a^2 u_{xx} + Axt$, $0 < x < l$, $0 < t$,
 $u(0, t) = u(l, t) = u(x, 0) = 0$.

$$\mathbf{2.435.} \quad u_t = a^2 u_{xx} - hu + At, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u_x(0, t) = u(l, t) = u(x, 0) = 0.$$

$$\mathbf{2.436.} \quad u_t = a^2 u_{xx} + f(t), \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u_x(0, t) = u_x(l, t) = u(x, 0) = 0.$$

$$\mathbf{2.437.} \quad u_t = a^2 u_{xx} + Axt, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u_x(0, t) = u_x(l, t) = u(x, 0) = 0.$$

$$\mathbf{2.438.} \quad u_t = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = At^2, \quad u(x, 0) = 0.$$

$$\mathbf{2.439.} \quad e^{\alpha x} u_t = a^2 \frac{\partial}{\partial x} e^{\alpha x} \frac{\partial u}{\partial x} + At, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u_x(0, t) = u_x(l, t) = u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$$

$$\mathbf{2.440.} \quad e^{\alpha x} u_t = a^2 \frac{\partial}{\partial x} e^{\alpha x} \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = At, \quad u(x, 0) = 0.$$

2.441. Определить температуру однородного шара, радиус которого r_0 , если температура поверхности равна At , а начальная температура равна нулю.

2.442. Решить задачу теплопроводности для шара, радиус которого r_0 , если температура поверхности равна $u_0 e^{-\alpha t}$, $\alpha \geq 0$, а начальная температура равна нулю.

2.443. Внутри однородного шара через его поверхность поступает радиальный тепловой поток; радиус шара r_0 , плотность потока At . Какова температура шара при $t > 0$, если его начальная температура равна нулю?

2.444. Однородный шар нагревается радиальным тепловым потоком; радиус шара r_0 , плотность потока на поверхности шара равна $\mathbf{q} = -q_0 e^{-\alpha t} \mathbf{e}_r$, $\alpha > 0$. Определить температуру шара при $t > 0$, если его начальная температура равна нулю.

2.445. Через поверхность однородного шара происходит теплообмен по закону Ньютона с внешней средой; радиус шара r_0 , температура внешней среды At . Найти температуру шара при $t > 0$, если при $t = 0$ она равна нулю.

2.446. В шаре, радиус которого r_0 , действуют источники, выделяющие в единице объема в единицу времени количество $\frac{A}{r} \sin \frac{\pi n r}{r_0} e^{-\alpha^2 t}$, $\alpha > 0$, $n \in \mathbb{N}$, газа. Решить задачу диффузии,

если концентрация газа на поверхности шара при любом $t \geq 0$ равна нулю, а в начальный момент $t = 0$ газа в шаре не было.

2.447. Решить предыдущую задачу для неустойчивого газа, убыль которого в результате распада пропорциональна концентрации (коэффициент пропорциональности β дан).

2.448. Начальная температура шара, радиус которого r_0 , равна нулю. Шар нагревается в результате действия тепловых источников, мощность которых в единице объема $Q_0(1 - r/r_0)e^{-\alpha t}$, $\alpha \geq 0$. Решить задачу теплопроводности, если поверхность шара поддерживается при нулевой температуре.

2.449.
$$u_t = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r} + At, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t,$$

 $|u| < \infty, \quad u(r_0, t) = u(r, 0) = 0.$

2.450.
$$u_t = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r}, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t,$$

 $|u| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = At^2, \quad u(r, 0) = 0.$

2.451.
$$u_t = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r} + Art, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t,$$

 $|u| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = u(r, 0) = 0.$

Пример 2.16. Решить смешанную задачу для волнового уравнения в сферическом слое ($1 < r < 2$) в $\mathbb{R}^3$:

$$u_{tt} = a^2 \Delta u + At^2, \quad t > 0,$$

$$u(1, t) = u(2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0,$$

выделив частное решение уравнения, удовлетворяющее граничным условиям.

Решение. Новая неизвестная функция $v(r, t) = u(r, t) - f(r)t^2$ удовлетворяет уравнению $v_t + 2f = a^2 \Delta v + (a^2 \Delta f + A)t^2$, следовательно является решением задачи со стационарной неоднородностью

$$v_{tt} = a^2 \Delta v - 2f(r), \quad 1 < r < 2, \quad t > 0,$$

$$v(1, t) = v(2, t) = v(r, 0) = v_t(r, 0) = 0,$$

если

$$\Delta f = -\frac{A}{a^2}, \quad f(1) = f(2) = 0.$$

Решение уравнения для функции $f(r)$:

$$\Delta f = -\frac{A}{a^2} \implies \frac{1}{r^2} \frac{dr^2}{dr} \frac{df}{dr} = -\frac{A}{a^2} \implies f(r) = -\frac{A}{a^2} \left(\frac{r^2}{6} + \frac{C_1}{r} + C_2 \right),$$

удовлетворяющее граничным условиям, можно представить в форме

$$f(r) = \frac{A}{6a^2r}(r-1)(2-r)(r+3).$$

Еще одна замена $w(r, t) = v(r, t) - g(r)$ сводит задачу для $v(r, t)$ к двум задачам:

$$1) \quad w_{tt} = a^2 \Delta w, \quad 1 < r < 2, \quad t > 0,$$

$$w(1, t) = w(2, t) = 0,$$

$$w(r, 0) = -g(r), \quad w_t(r, 0) = 0,$$

$$2) \quad \Delta g = \frac{2f}{a^2}, \quad 1 < r < 2,$$

$$g(1) = g(2) = 0.$$

Отсюда следует (аналогично предыдущему), что

$$g(r) = \frac{A}{180a^4r}(r-1)(2-r)(3r^3 + 9r^2 - 49r + 15).$$

Далее (согласно методу Фурье) $w(r, t) = R(r)T(t)$, откуда

$$\Delta R + \lambda R = 0, \quad 1 < r < 2,$$

$$R(1) = R(2) = 0,$$

$$T'' + a^2 \lambda T = 0, \quad 0 < t.$$

Определение собственных функций и собственных значений оператора $\mathcal{L} = -\Delta$ составляет содержание задачи 2.20:

$$\lambda_n = (\pi n)^2, \quad R_n(r) = \frac{1}{r} \sin \pi n(r-1), \quad \|R_n\|^2 = \frac{1}{2}, \quad n \in \mathbb{N};$$

собственные функции ортогональны на промежутке $[1; 2]$ с весом r^2 . Таким образом,

$$w(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (C_n \cos \omega_n t + D_n \sin \omega_n t) R_n(r), \quad \omega_n = a\pi n.$$

При $t = 0$

$$-g(r) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n R_n(r) \implies C_n = -2(g, R_n),$$

$$0 = \sum_{n=1}^{\infty} D_n \omega_n \cos \omega_n t \implies D_n = 0.$$

Оператор $\mathcal{L} = -\Delta$ суть эрмитов, а функции $f(r)$ и $g(r)$ принадлежат его области определения ($f, g \in C^2[1; 2]$ и удовлетворяют тем же граничным условиям, что и R_n). Следовательно,

$$\begin{aligned}(g, R_n) &= -\frac{1}{\lambda_n}(g, \Delta R_n) = -\frac{1}{\lambda_n}(\Delta g, R_n) = -\frac{2}{a^2 \lambda_n}(f, R_n) = \\&= \frac{2}{a^2 \lambda_n^2}(f, \Delta R_n) = \frac{2}{a^2 \lambda_n^2}(\Delta f, R_n) = -\frac{2A}{a^4 \lambda_n^2}(1, R_n) = \\&= \frac{2A}{a^4 \lambda_n^3}(1, \Delta R_n) = \frac{2A}{a^4 \lambda_n^3} \int_1^2 \frac{d}{dr} r^2 \frac{dR}{dr} dr = \\&= \frac{2A}{a^4 \lambda_n^3} (r^2 R'_n)|_1^2 = \frac{2A}{a^4 \lambda_n^3} (4R'_n(2) - R'_n(1)).\end{aligned}$$

Так как $R'_n(1) = \pi n$, $R'_n(2) = (-1)^n \frac{\pi n}{2}$, то

$$C_n = -\frac{4A}{a^4 \pi^5 n^5} (2(-1)^n - 1) = \frac{4A}{a^4 \pi^5 n^5} (2(-1)^{n+1} + 1).$$

В итоге

$$u(r, t) = f(r)t^2 + g(r) + \frac{4A}{a^4 \pi^5 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1} + 1}{n^5} \sin \pi n(r-1) \cos a \pi n t.$$

З а м е ч а н и е 1. Слагаемое $f(r)t^2 + g(r)$ представляет собой частное решение уравнения, удовлетворяющее граничным условиям.

З а м е ч а н и е 2. Следует обратить внимание на сходимость ряда. Абсолютная величина остатка

$$|r_m| = \left| \sum_{m+1}^{\infty} C_n r R_n \cos \omega_n t \right| \leq 3 \sum_{m+1}^{\infty} \frac{1}{n^5} < 3 \int_m^{\infty} \frac{dx}{x^5} dx = \frac{3}{4} \frac{1}{m^4}.$$

Если $m = 4$, то $|r_5| \leq \frac{3}{4 \cdot 625} = 0,0012$.

Решить смешанные задачи 2.452–2.463 для волнового уравнения в $\mathbb{R}^3$, выделив частное решение уравнения, удовлетворяющее граничным условиям.

2.452. $u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r} + At, \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < t:$

1) $u(r_1, t) = u(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0;$

2) $u(r_1, t) = u_r(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$

- 2.453.** $u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r} + f(t), \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < t,$
 $u_r(r_1, t) = u_r(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$
- 2.454.** $u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{At}{r}, \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < t:$
 1) $u(r_1, t) = u(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0;$
 2) $u(r_1, t) = u_r(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$
- 2.455.** $u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r} + Art, \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < t,$
 1) $u(4, t) = u(5, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0;$
 2) $u_r(1, t) = u(3, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0;$
 3) $u_r(2, t) = u_r(3, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$
- 2.456.** $u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r} + Ae^{-\alpha t}, \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < t,$
 $u(r_1, t) = u(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0, \quad \alpha > 0.$
- 2.457.** $u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r} + A \sin \omega t, \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < t,$
 $u(r_1, t) = u(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$
- 2.458.** $u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r}, \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < t:$
 1) $u(r_1, t) = At, \quad u(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0;$
 2) $u_r(r_1, t) = At, \quad u(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0;$
 3) $u(r_1, t) = At, \quad u_r(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0;$
 4) $u_r(1, t) = At, \quad u_r(2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$
- 2.459.** $u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r}, \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < t,$
 $u(r_1, t) = Ae^{-\alpha t}, \quad u(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0, \quad \alpha > 0.$
- 2.460.** $u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r}, \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < t,$
 $u(r_1, t) = A \sin \omega t, \quad u(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$
- 2.461.** $u_{tt} = a^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{A}{r} \sin \frac{\pi n(r - r_1)}{r_2 - r_1} \sin \omega t,$
 $r_1 < r < r_2, \quad 0 < t, \quad n \in \mathbb{N},$
 $u(r_1, t) = u(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$
- 2.462.** Стороны $x=0$ и $x=2l$ мембраны ($0 < x < 2l, \quad 0 < y < l$) свободны, а остальные две закреплены. Решить при нулевых начальных условиях задачу о колебаниях мембраны, на единицу площади которой действует сила $f_0 \sin \frac{3\pi x}{l} \cos \frac{4\pi y}{l} \sin \omega t \mathbf{e}_u$.

2.463. Сторона $y = 3l$ прямоугольной мембраны ($|x| < l$, $0 < y < 3l$) свободна, а остальные три закреплены. Решить при нулевых начальных условиях задачу о колебаниях мембраны, на единицу площади которой действует сила $f_0 \sin \frac{2\pi x}{l} \cos \frac{3\pi y}{2l} \sin \omega t \mathbf{e}_u$.

Решить смешанные задачи 2.464–2.471 для уравнения теплопроводности в $\mathbb{R}^3$, выделив частное решение уравнения, удовлетворяющее граничным условиям.

2.464. В сферическом слое ($1 < r < 2$) действуют тепловые источники, плотность мощности которых $AC\rho t$. Решить задачу теплопроводности для слоя при нулевой начальной температуре, если: 1) температура поверхностей равна нулю; 2) поверхность $r_2 = 2$ теплоизолирована, а поверхность $r_1 = 1$ поддерживается при нулевой температуре; 3) температура поверхности $r_2 = 2$ равна нулю, а поверхность $r_2 = 1$ теплоизолирована.

2.465. В сферическом слое ($r_1 < r < r_2$) действуют тепловые источники плотность мощности которых $\frac{AC\rho t}{r}$. Решить задачу теплопроводности для слоя при нулевой начальной температуре, если: 1) его поверхности $r_1 = 1$ и $r_2 = 4$ поддерживаются при нулевой температуре; 2) поверхность $r_1 = 2$ теплоизолирована, а поверхность $r_2 = 4$ имеет нулевую температуру; 3) его поверхности $r_1 = 1$ и $r_2 = 2$ теплоизолированы.

2.466. В сферическом слое ($r_1 < r < r_2$) с момента $t = 0$ действуют тепловые источники плотность мощности которых $AC\rho t$. Решить задачу теплопроводности для слоя при нулевой начальной температуре, если: 1) его поверхности $r_1 = 2$ и $r_2 = 3$ поддерживаются при нулевой температуре; 2) поверхность $r_1 = 1$ теплоизолирована, а поверхность $r_2 = 2$ имеет нулевую температуру; 3) его поверхности $r_1 = 1$ и $r_2 = 2$ теплоизолированы.

2.467. В сферическом слое ($r_1 < r < r_2$) действуют источники тепла, плотность мощности которых $\frac{A}{r} \sin \frac{\pi n(r-r_1)}{r_2-r_1} e^{-\alpha^2 t}$, $\alpha > 0$, $n \in \mathbb{N}$. Решить задачу теплопроводности, если поверхности слоя поддерживаются при нулевой температуре, начальная температура равна нулю.

2.468. В сферическом слое ($r_1 < r < r_2$) действуют источники, выделяющие в единицу объема в единицу времени количество $\frac{A}{r} \sin \frac{\pi n(r-r_1)}{r_2-r_1} e^{-\alpha^2 t}$, $\alpha > 0$, $n \in \mathbb{N}$, неустойчивого газа, убыль которого в результате распада пропорциональна концентрации

(коэффициент пропорциональности β дан). Решить задачу диффузии, если концентрация газа на поверхностях $r = r_1$, $r = r_2$ при любом $t \geq 0$ равна нулю, а в начальный момент $t = 0$ газа в слое не было.

2.469. В сферическом слое ($r_1 < r < r_2$) действуют тепловые источники, плотность мощности которых $Ae^{-\alpha t}$, $\alpha > 0$. Поверхности слоя поддерживаются при нулевой температуре, начальная температура равна нулю. Решить задачу теплопроводности.

2.470. Решить задачу теплопроводности для слоя ($r_1 < r < r_2$), начальная температура которого равна нулю, если: 1) его внутренняя поверхность имеет температуру At , а внешняя — нулевую температуру; 2) через внутреннюю поверхность проходит тепловой поток, плотность которого Bte_r , а внешняя поверхность поддерживается при нулевой температуре; 3) температура внутренней поверхности равна At , а внешняя поверхность теплоизолирована; 4) через внутреннюю поверхность ($r = 1$) проходит тепловой поток, плотность которого Bte_r , а внешняя поверхность ($r = 2$) теплоизолирована.

2.471. Внешняя поверхность $r = r_2$ слоя поддерживается при нулевой температуре, а внутренняя поверхность ($r = r_1$) — при температуре $Ae^{-\alpha t}$, $\alpha > 0$. Начальная температура слоя равна нулю.

Пример 2.17. Решение смешанной задачи для неоднородного уравнения с однородными граничными условиями. Если струна, рассмотренная в примере 2.1, находится в поле внешних сил, линейная плотность которых $F(x, t)\mathbf{e}_u$, то ее движение определяется уравнением

$$u_{tt} = -\mathcal{L}u + f(x, t), \quad x \in \Delta, \quad 0 < t, \quad f(x, t) = \frac{F(x, t)}{\rho}, \quad (2.31)$$

и условиями (2.2), (2.3). Метод разделения переменных сводится к следующим операциям:

1) определение собственных функций и собственных значений оператора $\mathcal{L}$ (т. е. решение задачи (2.8), (2.9));

2) разложение решения в ряд по собственным функциям

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) X_n(x), \quad (2.32)$$

в котором $u_n(t)$ — решение задачи Коши,

$$u_n'' + \lambda_n u_n = f_n(t), \quad 0 < t, \quad (2.33)$$

$$u_n(0) = u_{0n}, \quad u_n'(0) = u_{1n}, \quad (2.34)$$

где f_n, u_{0n}, u_{1n} — коэффициенты Фурье функций f, u_0, u_1 соответственно. В самом деле, из уравнения (2.31) вытекает соотношение

$$(u_{tt}, X_n) = -(\mathcal{L}u, X_n) + (f, X_n) \quad (2.35)$$

или, так как $(\mathcal{L}u, X_n) = (u, \mathcal{L}X_n) = \lambda_n(u, X_n)$,

$$(u, X_n)_{tt} + \lambda_n(u, X_n) = (f, X_n),$$

что эквивалентно (2.33); условия (2.34) следуют из начальных данных (2.3). Задача Коши (2.33), (2.34) имеет решение

$$u_n(t) = \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_0^t f_n(\tau) \sin \sqrt{\lambda_n} (t - \tau) d\tau + \\ + u_{0n} \cos \sqrt{\lambda_n} t + \frac{u_{1n}}{\sqrt{\lambda_n}} \sin \sqrt{\lambda_n} t, \quad (2.36)$$

которое завершает построение ряда (2.32).

З а м е ч а н и е. Если $f(x, t) = 0$, то уравнение (2.33) совпадает с уравнением (2.7), а коэффициенты u_{0n}, u_{1n} представляют собой не что иное, как A_n и B_n (см. (2.11)).

Пусть на неподвижную струну ($0 < x < l$), конец $x = 0$ которой закреплен жестко, а конец $x = l$ — упруго посредством пружинки с коэффициентом упругости k , действует с момента $t = 0$ сила $F_0 \sin \omega t \mathbf{e}_u$, приложенная в точке $x_0 \in (0, l)$. Задача, которую нужно решить, имеет вид

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + \frac{F_0}{\rho_0} \sin \omega t \cdot \delta(x - x_0), \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) + hu(l, t) = 0, \quad h = \frac{k}{T_0}, \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$$

Здесь $\mathcal{L} = -d^2/dx^2$, собственные функции $X_n(x) = \sin \sqrt{\lambda_n} x$, где $\sqrt{\lambda_n} = \frac{\mu_n}{l}$, $n \in \mathbb{N}$, μ_n — положительный корень уравнения $p \operatorname{tg} \mu = -\mu$, $p = hl$. Коэффициенты $u_n(t)$ ряда

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(t) X_n(x)$$

определяются условиями

$$\begin{cases} u_n'' + \omega_n^2 u_n = \frac{F_0 X_n(x_0)}{\rho_0 \|X_n\|^2} \sin \omega t, & \omega_n = a\sqrt{\lambda_n}, \\ u_n(0) = u_n'(0) = 0, & \|X_n\|^2 = \frac{l}{2} \frac{\mu_n^2 + p^2 + p}{\mu_n^2 + p^2}. \end{cases} \quad (2.37)$$

Решение задачи (2.37) дается формулой (2.36), в которой надо заменить $\sqrt{\lambda_n}$ на $a\sqrt{\lambda_n}$. Функцию $u_t(n)$ можно найти непосредственно, записав общее решение уравнения как сумму общего решения однородного и частного решения неоднородного уравнения:

$$u_n(t) = \begin{cases} A_n \sin \omega_n t + B_n \cos \omega_n t + M_n \sin \omega t, & \omega \neq \omega_n, \\ C_n \sin \omega_n t + D_n \cos \omega_n t + N_n t \cos \omega t, & \omega_n = \omega_{n_0}. \end{cases}$$

Из начальных условий следует, что $B_n = 0$, $A_n = -\frac{\omega M_n}{\omega_n}$, $D_n = 0$, $C_n = -\frac{N_n}{\omega_n}$, а коэффициенты

$$M_n = \frac{F_0 X_n(x_0)}{\rho_0 \|X_n\|^2 (\omega_n^2 - \omega^2)}, \quad N_n = -\frac{F_0 X_n(x_0)}{\omega \rho_0 \|X_n\|^2}$$

получаются подстановкой частного решения в уравнение задачи (2.37). В итоге, если $\omega \neq \omega_n$, то

$$u(x, t) = \frac{\omega F_0}{\rho_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{X_n(x_0) X_n(x)}{\|X_n\|^2 (\omega^2 - \omega_n^2)} \left(\frac{\sin \omega_n t}{\omega_n} - \frac{\sin \omega t}{\omega} \right). \quad (2.38)$$

Если $\omega = \omega_{n_0}$ (резонанс), то

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \frac{F_0 X_{n_0}(x_0) X_{n_0}(x)}{2\rho_0 \omega \|X_{n_0}\|^2} \left(\frac{\sin \omega t}{\omega} - t \cos \omega t \right) + \\ & + \frac{\omega F_0}{\rho_0 l} \sum_{\substack{n=0 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{X_n(x_0) X_n(x)}{\|X_n\|^2 (\omega^2 - \omega_n^2)} \left(\frac{\sin \omega_n t}{\omega_n} - \frac{\sin \omega t}{\omega} \right). \end{aligned}$$

З а м е ч а н и е. Резонансную часть решения можно получить также из ряда (2.38) предельным переходом при $\omega \rightarrow \omega_n$ (например, по правилу Лопиталя) в соответствующем слагаемом.

2.472. На струну ($0 < x < l$) с закрепленными концами действует сила $F_0 \mathbf{e}_u$, приложенная в точке $x_0 \in (0, l)$ в течение времени от $t = 0$ до $t = t_0 > 0$. Решить задачу о движении струны после прекращения действия силы; начальные условия нулевые.

2.473. Концы струны ($0 < x < l$) закреплены с помощью пружинок, коэффициенты упругости которых k_1 (при $x = 0$) и k_2 (при $x = l$). Решить задачу о движении струны под действием силы $F_0 \sin \omega t \mathbf{e}_u$, приложенной в точке $x_0 \in (0, l)$ с момента времени $t = 0$; начальные условия нулевые.

2.474. К струне ($-l < x < l$) с закрепленными концами прикреплен в точке $x = 0$ шарик, масса которого m . Решить задачу о движении струны под действием силы $F_0 \sin \omega t \mathbf{e}_u$, приложенной к шарiku с момента времени $t = 0$; начальные условия нулевые.

2.475. Концы линии ($0 < x < l$) с пренебрежимо малой утечкой заземлены. В момент времени $t = 0$ в точку $x_0 \in (0, l)$ помещают заряд Q_0 . Определить потенциал линии.

2.476. В стержне ($-l < x < l$) с теплоизолированной поверхностью (включая торцы) в течение времени от $t = 0$ до $t = t_0 > 0$ действуют тепловые источники, мощность которых в единице объема равна Q_0 . Определить температуру стержня при $t > t_0$, если при $t = 0$ она равна нулю.

2.477. В сечении $x_0 \in (0, l)$ стержня ($0 < x < l$) действует источник тепла постоянной мощности Q_0 в течение времени от $t = 0$ до $t = t_0 > 0$. Найти температуру стержня при $t > 0$, если начальная температура равна нулю, конец $x = 0$ поддерживается при нулевой температуре, а остальная поверхность теплоизолирована.

2.478. Конец $x = l$ линии ($0 < x < l$) с параметрами R, C ($L = G = 0$) изолирован, а конец $x = 0$ заземлен через конденсатор C_0 . В момент времени $t = 0$ в точку $x_0 \in (0; l)$ линии помещают заряд Q_0 . Определить заряд конденсатора.

2.479. На прямоугольную мембрану ($|x| < l_1, |y| < l_2$) с закрепленным краем действует сила $F_0 \mathbf{e}_u$, равномерно распределенная по поверхности мембраны. Решить задачу о колебаниях мембраны при нулевых начальных условиях.

2.480. На прямоугольную мембрану ($0 < x < l_1, 0 < y < l_2$) с закрепленным краем действует сила $F_0 \sin \omega t \mathbf{e}_u$, равномерно распределенная по диагонали $y = \frac{l_2}{l_1} x$. Решить задачу о колебаниях мембраны при нулевых начальных условиях.

2.481. На квадратную мембрану ($|x| < l, |y| < l$) с закрепленным краем действует сила, распределенная по отрезку $[-l; l]$ оси Ox

с линейной плотностью $F_0 \sin \frac{6\pi x}{l} \sin \frac{15\pi at}{2l} \mathbf{e}_u$. Решить задачу о колебаниях мембраны при нулевых начальных условиях.

2.482. На квадратную мембрану ($|x| < l, |y| < l$) с закрепленным краем действует сила $F_0 \sin \omega t \mathbf{e}_u$, равномерно распределенная по отрезку $[-l; l]$ оси Ox . Найти резонансную часть u_{rez} решения, если: 1) $\omega = \frac{3\pi a}{l\sqrt{2}}$; 2) $\omega = \frac{3\pi a\sqrt{5}}{l\sqrt{2}}$; 3) $\omega = \frac{\pi a\sqrt{5}}{l\sqrt{2}}$; 4) $\omega = \frac{5\pi a}{l\sqrt{2}}$.

2.483. На прямоугольную мембрану ($|x| < 2l, |y| < 3l$), свободная сторона которой $y = 3l$, а остальные три закреплены, действует сила $F_0 \sin \omega t \mathbf{e}_u$, равномерно распределенная по отрезку $[-l; l]$ оси Ox . Найти резонансную часть u_{rez} решения, если $\omega = \frac{\pi a\sqrt{2}}{4l}$.

2.484. На единицу площади мембраны ($|x| < l, |y| < 3l$) действует сила $(A \cos \frac{9\pi x}{2l} \cos \frac{6\pi y}{l} + B \cos \frac{15\pi x}{2l}) \sin \frac{15\pi at}{2l} \mathbf{e}_u$; стороны $x = -l$ и $x = l$ закреплены, а остальные две свободны. Решить задачу о колебаниях мембраны при нулевых начальных условиях.

2.485. На оси длинного бруса с прямоугольным поперечным сечением ($|x| < l_1, |y| < l_2$) находится проводник с током. Ток включается на время от $t = 0$ до $t = t_0 > 0$; при прохождении тока с единицы длины проводника выделяется тепловая мощность Q_0 . Определить температуру бруса при $t > 0$, если его поверхность теплоизолирована, а начальная температура равна нулю.

2.486. На прямоугольную мембрану ($0 < x < l_1, 0 < y < l_2$) с закрепленным краем действует сила $F_0 \mathbf{e}_u$, равномерно распределенная по диагонали $y = \frac{l_2}{l_1} x$. Найти равновесную форму мембраны и прогиб в центре.

2.487. На мембрану в форме полукруга ($r < r_0, 0 \leq \varphi < \pi$) с закрепленным краем действует сила, распределенная по линии $\varphi = \pi/2$ с плотностью: 1) $p_0 \mathbf{e}_u$; 2) $p_0 \frac{r}{r_0} \mathbf{e}_u$. Определить статический прогиб мембраны.

2.488. Бесконечная нить с зарядом q на единицу длины расположена параллельно оси проводящего заземленного цилиндра, радиус которого r_0 , на расстоянии r_1 от оси. Найти плотность заряда на поверхности цилиндра, если: 1) $r_1 < r_0$; 2) $r_1 > r_0$.

2.489. Решить предыдущую задачу для незаземленного незаряженного цилиндра.

2.490. Параллельно оси цилиндра (радиус r_0 , магнитная проницаемость $\mu = \infty$) на расстоянии $d > r_0$ расположен прямой ток J . Определить векторный потенциал магнитного поля.

2.491. Прямой ток $\mathbf{J} = J\mathbf{e}_z$ течет параллельно оси (ось Oz) длинного цилиндра, радиус которого r_0 , магнитная проницаемость μ . Найти векторный потенциал магнитного поля в цилиндре, если расстояние тока от оси цилиндра $r_1 > r_0$.

2.492. В среде с диэлектрической проницаемостью ϵ имеется цилиндрическая полость (радиус r_0 , $\epsilon_0 = 1$). Внутри полости параллельно оси на расстоянии r_1 от нее расположена бесконечная нить, дипольный момент единицы длины которой $\mathbf{p} = p\frac{\mathbf{r}_1}{r_1}$. Найти силу, действующую на единицу длины нити.

2.493. По оболочке ($r = r_0$, $0 < \varphi < \pi$, $-\infty < z < \infty$), расположенной на проводящем заземленном основании, течет постоянный ток J , втекающий через точку ($r = r_0$, $\varphi = \varphi_0$, $z = 0$). Определить потенциал электрического поля и плотность тока в оболочке, если ее проводимость σ .

2.494. Круглая пластинка, радиус которой r_0 , находится в статическом равновесии под действием поперечной силы $F_0\mathbf{e}_u$, равномерно распределенной по диаметру. Найти максимальный прогиб пластинки, если: 1) ее край жестко закреплен; 2) она свободно опирается по краю.

2.495. Решить предыдущую задачу для силы, распределенной по диаметру с плотностью $p_0\frac{r}{r_0}\mathbf{e}_u$.

2.496. Прямоугольная пластинка ($0 < x < l_1$, $0 < y < l_2$), опертая по краю, находится в статическом равновесии под действием поперечной силы $F_0\mathbf{e}_u$, равномерно распределенной по диагонали $y = \frac{l_2}{l_1}x$. Определить форму пластинки и прогиб ее центра.

2.497. На эллиптическую пластинку (полуоси эллипса a и b) с закрепленным краем действуют поперечные силы, плотность которых на единицу площади равна $p_0\mathbf{e}_u$. Определить равновесную форму пластинки.

Пример 2.18. Смешанная задача с неоднородными граничными условиями. Решение этой задачи завершает построение схемы метода разделения переменных.

Дан стержень ($0 < x < l$) с теплоизолированной боковой поверхностью, начальная температура которого равна нулю, а температура торцов $x = 0$ и $x = l$ равна нулю и $\mu(t)$ соответственно. Итак, предстоит решить задачу теплопроводности

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} & 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = \mu(t), \\ u(x, 0) = 0. \end{cases} \quad (2.39)$$

Решение. Метод Фурье в форме, изложенной в примере 2.1, не применим из-за неоднородности граничных условий (переменные не разделяются).

Один из способов решения задачи 2.39 основан на преобразовании неоднородных граничных условий в однородные. Этого можно достичь двумя путями.

1. Пусть функция $w(x, t)$ удовлетворяет граничным условиям (и только им). Из множества подобных функций естественно выбрать наиболее просто зависящую от x , так как впоследствии нужно вычислять коэффициенты Фурье именно этой функции. Пусть $w = (Ax + B)\mu(t)$. Так как (согласно граничным условиям)

$$u(0, t) = B\mu(t) = 0, \quad u(l, t) = (Al + B)\mu(t) = \mu(t),$$

то $w = \frac{x}{l}\mu(t)$. Если решение задачи 2.39 представить в виде суммы $u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$, то для функции $v(x, t)$ получится задача

$$\begin{aligned} v_t &= a^2 v_{xx} - \frac{x}{l}\mu'(t), \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ v(0, t) &= v(l, t) = 0, \\ v(x, 0) &= -\frac{x}{l}\mu(0), \end{aligned}$$

рассмотренная в примере 2.17.

2. Задача (2.39) имеет эквивалентную постановку (см. задачу 10.268):

$$\begin{aligned} u_t &= a^2 u_{xx} + a^2 \mu(t) \cdot \delta'(x - l), \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) &= u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) &= 0. \end{aligned}$$

В примере 2.17 показано, что решение имеет вид ряда по собственным функциям, коэффициенты которого удовлетворяют

условиям

$$\begin{aligned} u'_n + a^2 \lambda_n u_n &= (-1)^{n+1} \frac{2a^2 \pi n}{l} \mu(t), \quad 0 < t, \\ u_0 &= 0, \end{aligned} \quad (2.40)$$

и, следовательно,

$$u_n(t) = (-1)^{n+1} \frac{2\pi a^2 n}{l^2} \int_0^t \mu(\tau) e^{-(\frac{\pi a n}{l})^2 (t-\tau)} d\tau.$$

Таким образом,

$$u(x, t) = \frac{2\pi a^2}{l^2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n \sin \frac{\pi n x}{l} \int_0^t \mu(\tau) e^{-(\frac{\pi a n}{l})^2 (t-\tau)} d\tau. \quad (2.41)$$

З а м е ч а н и е. При $t > 0$ ряд (2.41) медленно сходится в окрестности точки $x = l$, так как каждый член ряда при $x \rightarrow l$ стремится к нулю и требуется большое число слагаемых для формирования ненулевой суммы ($u(x, t) \rightarrow \mu(t)$ при $x \rightarrow l$). Сходимость ряда (2.41) можно улучшить интегрированием по частям;

$$\begin{aligned} & \int_0^t \mu(\tau) e^{-(\frac{\pi a n}{l})^2 (t-\tau)} d\tau = \\ &= \left(\frac{l}{\pi a n}\right)^2 \left\{ \left[\mu(t) - \mu(0) e^{-(\frac{\pi a n}{l})^2 t} \right] - \int_0^t \mu'(\tau) e^{-(\frac{\pi a n}{l})^2 (t-\tau)} d\tau \right\}, \end{aligned}$$

и применением формулы суммирования. После этих преобразований решение приобретает форму

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{x}{l} \mu(t) - \\ &- \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{\pi n x}{l}}{n} \left[\mu(0) e^{-(\frac{\pi a n}{l})^2 t} + \int_0^t \mu'(\tau) e^{-(\frac{\pi a n}{l})^2 (t-\tau)} d\tau \right]. \end{aligned}$$

Если $x \rightarrow l$, то ряд сходится к нулю и $u(l, t) = \mu(t)$.

Другой способ использует методику, изложенную в примере 2.17. Решение $u(x, t)$ записывается в виде ряда (2.32), коэффициенты $u_n(t)$ которого определяются из соотношения (аналогичного (2.35))

$$(u_t, X_n) = a^2 (u_{xx}, X_n) \quad (2.42)$$

при условии $u_n(0) = 0$. После интегрирования по частям выражения в правой части (2.42)

$$(u_{xx}, X_n) = (u_x X_n - u X'_n) \Big|_0^l + (u, X''_n) = -\mu(t) X'_n(l) - \lambda_n(u, X_n)$$

уравнение (2.42) приобретает форму

$$u_n(t) + a^2 \lambda_n u_n(t) = -\mu(t) X'_n(l).$$

Таким образом, для $u_n(t)$ получается задача (2.40), так что решение $u(x, t)$ имеет вид (2.41).

Третий способ — метод Дюамеля — основан на решении вспомогательной задачи со стационарными неоднородностями в граничных условиях (см. задачу 2.498).

2.498. Метод Дюамеля. Пусть $u(x, t)$ — решение смешанной задачи

$$\begin{aligned} -\mathcal{L}u &= \begin{cases} u_{tt}, & 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u_t & \end{cases} \\ \alpha_1 u_x(0, t) - \beta_1 u(0, t) &= \mu(t), \quad \alpha_2 u_x(l, t) + \beta_2 u(l, t) = 0 \end{aligned}$$

с нулевыми начальными условиями, где оператор $\mathcal{L}$ имеет вид (2.5), $\mu(t)$ — произвольная допустимая функция, а $v(x, t)$ — решение той же задачи при $\mu = 1$. Доказать, что

$$u(x, t) = \int_0^t \mu(\tau) \frac{\partial v(x, t - \tau)}{\partial t} d\tau.$$

2.499. К торцу $x = l$ цилиндрического стержня ($0 < x < l$) приложена сила $F_0 \sin \omega t \eta(t) \mathbf{e}_x$. Применяя метод Дюамеля, решить задачу о продольных колебаниях стержня, если торец $x = 0$: 1) закреплён; 2) свободен; 3) закреплён упруго. Начальные условия нулевые.

2.500. На стержень ($0 < x < l$), торец $x = 0$ которого закреплён, действует с момента времени $t = 0$ сила $F(t) \mathbf{e}_x$, приложенная к свободному торцу $x = l$. Решить задачу о движении стержня при нулевых начальных условиях.

2.501. Однородный цилиндрический стержень, расположенный на гладкой горизонтальной поверхности, начинает двигаться под действием силы $F_0 \mathbf{e}_x$, приложенной к торцу $x = l$ с момента времени $t = 0$ до $t = t_0 = \frac{2l}{a}$, где $a^2 = E/\rho$. Определить движение стержня при $t > t_0$.

2.502. Торец $x = l$ однородного стержня закреплен жестко, а торце $x = 0$ — упруго посредством пружинки с коэффициентом жесткости k , расположенной на оси Ox . С момента времени $t = 0$ свободный конец пружинки движется (относительно положения равновесия) вдоль оси Ox по закону $\alpha(t)$, $\alpha(0) = 0$. Решить задачу о движении стержня при нулевых начальных условиях.

2.503. Решить предыдущую задачу для стержня, торце $x = l$ которого свободен.

2.504. Решить в акустическом приближении задачу о движении идеального газа в трубке ($0 < x < l$), на одном конце ($x = l$) которой находится поршень, движущийся со скоростью $v(t)\eta(t)$, $v(0) = 0$, а другой конец закрыт. До момента $t = 0$ газ находился в равновесном состоянии.

2.505. Трубка ($0 < x < l$) заполнена идеальным газом, давление которого P_0 , плотность ρ_0 . На конце $x = 0$ имеется перегородка, которая движется со скоростью $v(t)\eta(t)$, $v(0) = 0$. Определить в акустическом приближении потенциал скоростей газа, если: 1) конец $x = l$ закрыт; 2) на конце $x = l$ находится легкий, перемещающийся без трения поршень, закрепленный посредством пружинки с коэффициентом упругости k .

2.506. К концу $x = 0$ линии ($0 < x < l$) с пренебрежимо малой утечкой подключена с момента $t = 0$ батарея с э.д.с. $E(t)$, а другой конец заземлен. Найти потенциал линии при условии $4\pi L^2 > CR^2l^2$.

2.507. Сфера (радиус r_0) заполнена газом. С момента $t = 0$ радиус меняется по закону $r_0(1 + \alpha(t))$, $\alpha(0) = 0$, $|\alpha(t)| \ll 1$. Найти в акустическом приближении потенциал скоростей газа.

2.508. Конец $x = l$ стержня ($0 < x < l$) с теплоизолированной боковой поверхностью поддерживается при нулевой температуре, а температура другого конца равна u_0 в течение времени от $t = 0$ до $t = t_0$ и нулю при $t > t_0$. Определить температуру стержня при $t > 0$, если его начальная температура равна нулю.

2.509. Внутри слоя ($0 < x < l$) через поверхность $x = l$ поступает неустойчивый газ (распад пропорционален концентрации), плотность потока которого $q(t)$, а концентрация газа на поверхности $x = 0$ при любом t равна нулю. Решить задачу диффузии, если до момента $t = 0$ газа в слое не было.

2.510. Начальная температура стержня ($0 < x < l$) равна нулю. Найти его температуру при $t > 0$, если на конце $x = l$ происходит

теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой $\mu(t)$, а остальная поверхность теплоизолирована.

2.511. Один конец ($x = 0$) линии ($0 < x < l$) с параметрами R, C ($L = G = 0$) заземлен через сопротивление R_1 , а к другому концу через сопротивление R_2 подключается на время от $t = 0$ до $t = t_0 > 0$ батарея с э.д.с. E_0 . Найти потенциал линии после отключения батареи, если конец $x = l$ остается заземленным через R_2 .

2.512. Через поверхность однородного шара проходит тепловой поток; радиус шара r_0 , плотность потока $\mathbf{q} = -q(t)\mathbf{e}_r$. Найти температуру шара при $t > 0$, если при $t = 0$ она равна нулю.

2.513. Шар погружают в момент времени $t = 0$ в воду, температура которой меняется со временем по закону $u_0 t/t_0$, а в момент времени $t = t_0 > 0$ быстро переносят в другой сосуд с водой, температура которой равна нулю. Определить температуру $u(r, t)$ шара при $t > t_0$, если в течение всего времени на его поверхности происходит теплообмен по закону Ньютона; радиус шара равен r_0 , начальная температура шара равна нулю.

2.514. Грань $x = -l_1$ полуограниченного бруса ($0 < z$) с прямоугольным поперечным сечением ($|x| < l_1, |y| < l_2$) поддерживается при постоянной температуре u_0 , а остальная поверхность — при нулевой температуре. Найти стационарную температуру бруса.

2.515. Грань $x = 0$ неограниченного бруса ($-\infty < z < \infty$) с поперечным сечением ($0 < x < l_1, 0 < y < l_2$) имеет температуру $u_0 e^{-\alpha|z|}$, $\alpha \geq 0$, а остальная поверхность поддерживается при нулевой температуре. Определить стационарную температуру бруса.

2.516. Внутри полуограниченного бруса с прямоугольным поперечным сечением ($|x| < l_1, |y| < l_2, 0 < z$) через грань $y = 0$ поступает тепловой поток постоянной плотности q_0 , а остальная поверхность поддерживается при нулевой температуре. Найти стационарную температуру бруса.

2.517. Грань $z = l$ куба ($0 < x, y, z < l$) поддерживается при температуре u_0 , а остальная поверхность — при нулевой температуре. Найти температуру $u(x, y, z, t)$ куба при $t > 0$, если $u(x, y, z, 0) = 0$.

2.518. В проводящем слое ($-l < x < l$) течет постоянный ток. Ток втекает и вытекает вдоль линий ($x = -l, y = 0$) и ($x = l$,

$y = 0$) соответственно, параллельных оси Oz , и распределен вдоль них с постоянной линейной плотностью J . Найти плотность тока в слое.

2.519. В полукруглой пластинке, толщина которой h , течет постоянный ток J . Ток втекает и вытекает по образующим и равномерно распределен вдоль них (см. задачу 1.441). Найти плотность тока в пластинке.

2.520. Определить плотность тока в тонкой цилиндрической оболочке ($r = r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $-\infty < z < \infty$), в точку $(r_0, 0, 0)$ которой втекает ток J , а через точку $(r_0, \pi, 0)$ вытекает.

2.521. Постоянный ток J течет в тонкой проводящей оболочке, имеющей форму полусферы ($r = r_0$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, $0 < \varphi < 2\pi$). Токковые контакты входа и выхода расположены в точках $(r_0, \theta_0, \varphi_0)$ и $(r_0, \frac{\pi}{2}, 0)$ соответственно. Определить плотность тока в оболочке.

В ответах к задачам 2.522–2.530 представить только резонансную часть u_{rez} решения, т.е. часть, абсолютная величина которой неограниченно растет со временем.

2.522. На торец $x = l$ стержня ($0 < x < l$) действует сила $F_0 \sin \omega t$, торец $x = 0$: 1) закреплён жестко, $\omega = \frac{(2n+1)\pi a}{2l}$, $n \in \mathbb{N}_0$; 2) свободен, $\omega = \frac{\pi n a}{l}$, $n \in \mathbb{N}$; 3) закреплён упруго (коэффициент упругости k), $\omega = \frac{\mu_n a}{l}$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$, $p = hl$, $h = \frac{k}{ES}$.

2.523. На упруго закреплённый торец $x = 0$ стержня ($0 < x < l$) действует сила $F_0 \sin \omega t$, торец $x = l$: 1) закреплён, $\omega = \frac{\mu_n a}{l}$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $p \operatorname{tg} \mu = -\mu$; 2) свободен, $\omega = \frac{\mu_n a}{l}$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$.

2.524. Правый конец $x = l$ струны ($0 < x < l$) движется по закону $u_0 \sin \omega t$, а конец $x = 0$: 1) закреплён жестко, $\omega = \frac{\pi n a}{l}$, $n \in \mathbb{N}$; 2) свободен, $\omega = \frac{(2n+1)\pi a}{2l}$, $n \in \mathbb{N}_0$; 3) закреплён упруго (коэффициент упругости k), $\omega = \frac{\mu_n a}{l}$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $p \operatorname{tg} \mu = -\mu$, $p = hl$, $h = \frac{k}{T}$.

2.525. Стержень ($0 < x < l$) с сосредоточенной массой M на свободном торце $x = l$ движется под действием приложенной к этому торцу силы $F_0 \sin \omega_n t$, $\omega_n = \frac{a\mu_n}{l} > 0$, где: 1) $\mu_n > 0$ — корни уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$, если торец $x = l$ закреплен; 2) $\mu_n \geq 0$ — корни уравнения $p \operatorname{tg} \mu = -\mu$, если торец $x = l$ свободен. В обоих случаях $p = \frac{m}{M}$, $m = \rho l S$ — масса стержня, $a^2 = \frac{E}{\rho}$.

2.526. На свободном торце $x = l$ стержня ($0 < x < l$) находится точечная масса M , а торец $x = 0$ движется: 1) по закону $u_0 \sin \omega_n t$, $\omega_n = \frac{a\mu_n}{l} > 0$, где μ_n — корень уравнения $\mu \sin \mu = p \cos \mu$; 2) под действием силы $F_0 \sin \omega_n t$, $\omega_n = \frac{a\mu_n}{l} > 0$, где μ_n — корень уравнения $\mu \cos + p \sin \mu = 0$. В обоих случаях $p = \frac{m}{M}$, $m = \rho l S$ — масса стержня, $a^2 = \frac{E}{\rho}$.

2.527. Сторона $x = -l$ мембраны ($|x| < l$, $|y| < l$) закреплена, остальные свободны. На сторону $x = l$ действует сила, линейная плотность которой: 1) $f_0 \sin \omega t \cos^2 \frac{\pi y}{l}$, $\omega = \frac{17\pi a}{4l}$; 2) $f_0 \sin \omega t \sin^2 \frac{5\pi y}{2l}$, $\omega = \frac{5\sqrt{5}\pi a}{4l}$; 3) $f_0 \sin \omega t \cos^2 \frac{3\pi y}{2l}$, $\omega = \frac{13\pi a}{4l}$.

2.528. Три стороны мембраны ($|x| < l$, $|y| < l$) закреплены, а четвертая движется по закону $u(l, y, t) = u_0 f(y) \sin \omega t$, где функция $f(y)$ равна: 1) $\sin \frac{6\pi y}{l}$; 2) $\cos \frac{5\pi y}{2l}$. В обоих случаях $\omega = \frac{13\pi a}{2l}$.

2.529. Решить предыдущую задачу, если: 1) $f(y) = \cos \frac{\pi y}{2l}$; 2) $f(y) = \cos \frac{5\pi y}{2l}$; 3) $f(y) = \cos \frac{7\pi y}{2l}$; $\omega = \frac{5\sqrt{2}\pi a}{2l}$.

2.530. Решить задачу 2.528, если $\omega = \frac{5\sqrt{5}\pi a}{2l}$, а функция $f(y)$ равна 1) $\sin \frac{\pi y}{l}$; 2) $\cos \frac{5\pi y}{2l}$; 3) $\sin \frac{5\pi y}{l}$; 4) $\cos \frac{11\pi y}{2l}$.

Пример 2.19. Решить задачу Дирихле

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r, \quad 0 < \varphi < \alpha, \\ u(r, 0) = u_0 \eta(r - r_0), \quad u(r, \alpha) = 0, \quad |u| < \infty.$$

Область Ω , в которой определено решение, неограничена; при этом переменная r принимает значения от 0 до ∞ .

Решение. Метод Фурье к такой задаче непосредственно не применим. Однако задачу можно свести к двум: одна в секторе, радиус которого меньше r_0 , другая в секторе, радиус которого больше $r > r_0$, не задавая пока условий при $r = r_0$, и затем «сшить» найденные решения. К задачам в каждом из секторов метод разделения переменных применим, решения будут содержать неопределенные коэффициенты, вычисление которых осуществляется в процессе сшивки. Для решения задачи

$$\begin{aligned}\Delta u &= 0, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < \varphi < \alpha, \\ u(r, 0) &= 0, \quad u(r, \alpha) = 0, \quad |u| < \infty,\end{aligned}$$

с однородными граничными условиями, в которой отсутствует пока условие при $r = r_0$, можно сразу применить процедуру деления переменных, представив решение в форме произведения: $R(r)\Phi(\varphi)$. Из тождества $\Phi(\varphi)\Delta R(r) = \Phi''(\varphi)R(r)$ с учетом граничных условий возникают задача на собственные значения и уравнение для функции $R(r)$:

$$\begin{aligned}1) \quad \Phi'' + \lambda\Phi &= 0, \quad 0 < \varphi < \alpha, \quad 2) \quad \frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{dR}{dr} - \frac{\lambda}{r^2} R = 0, \\ \Phi(0) &= \Phi(\alpha) = 0; \quad |R(0)| < \infty.\end{aligned}$$

Собственными значениями являются числа $\lambda_n = \left(\frac{\pi n}{\alpha}\right)^2$, а принадлежащие им собственные функции $\Phi_n(\varphi) = \sin \frac{\pi n \varphi}{\alpha}$: из второго уравнения следует, что $R_n(r) = C_n r^{\frac{\pi n}{\alpha}} + D_n r^{-\frac{\pi n}{\alpha}}$, где $n \in \mathbb{N}$. Решение имеет форму ряда по собственным функциям:

$$u(r, \varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{\pi n}{\alpha}} \sin \frac{\pi n \varphi}{\alpha}, \quad r < r_0.$$

Чтобы решить вторую задачу,

$$\begin{aligned}\Delta u &= 0, \quad r_0 < r, \quad 0 < \varphi < \alpha, \\ u(r, 0) &= 0, \quad u(r, \alpha) = 0, \quad |u| < \infty,\end{aligned}$$

методом Фурье, нужно освободиться от неоднородности в граничном условии. Так как оно не зависит от r , то частное решение уравнения можно отыскивать в виде функции $\Phi(\varphi)$, тоже не зависящей от r . Уравнению $\Phi'' = 0$ и граничным условиям удовлетворяет $\Phi(\varphi) = u_0 \left(1 - \frac{\varphi}{\alpha}\right)$, следовательно, в результате замены

$$u(r, \varphi) = u_0 \left(1 - \frac{\varphi}{\alpha}\right) + v(r, \varphi), \quad r > r_0,$$

для $v(r, \varphi)$ получается задача с однородными граничными условиями. Ее решение осуществляется совершенно так же, как в предыдущем случае: задача на собственные значения и уравнение для $R(r)$ точно такие же, поэтому собственные значения и собственные функции те же, а ограниченное решение $R_n(r) = r^{-\frac{\pi n}{\alpha}}$. Следовательно,

$$u(r, \varphi) = u_0 \left(1 - \frac{\varphi}{\alpha}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi n}{\alpha}} \sin \frac{\pi n \varphi}{\alpha}, \quad r > r_0.$$

Для «сшивки» найденных решений следует воспользоваться свойством гладкости функции $u(r, \varphi)$, а именно: $u \in C^2(\Omega)$. Это означает, в частности, что

$$u(r_0-0) = u(r_0+0), \quad u_r(r_0-0) = u_r(r_0+0).$$

Реализацией этих условий является система уравнений

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{\pi n \varphi}{\alpha} &= u_0 \left(1 - \frac{\varphi}{\alpha}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{\pi n \varphi}{\alpha}, \\ \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{\pi n \varphi}{\alpha} &= - \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{\pi n \varphi}{\alpha}, \end{aligned}$$

решение которой

$$\begin{aligned} b_n &= -a_n, \quad u_0 \left(1 - \frac{\varphi}{\alpha}\right) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{\pi n \varphi}{\alpha}, \\ a_n &= \frac{u_0}{\alpha^2} \int_0^{\alpha} (\alpha - \varphi) \sin \frac{\pi n \varphi}{\alpha} d\varphi = \frac{u_0}{\pi n}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} u(r, \varphi) &= \frac{u_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{\pi n}{\alpha}} \sin \frac{\pi n \varphi}{\alpha}, & r < r_0, \\ u(r, \varphi) &= u_0 \left(1 - \frac{\varphi}{\alpha}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi n}{\alpha}} \sin \frac{\pi n \varphi}{\alpha}, & r > r_0. \end{aligned}$$

При $r < r_0$

$$u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \operatorname{Im} S, \quad \text{где } S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n}, \quad t = \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{\pi}{\alpha}} e^{i \frac{\pi}{\alpha}}, \quad |t| < 1.$$

Так как $S' = \sum_{n=1}^{\infty} t^{n-1} = \frac{1}{1-t}$, то $S = -\ln(1-t)$, следовательно,

$$\begin{aligned} u(r, \varphi) &= -\frac{u_0}{\pi} \operatorname{Im} \ln(1-t) = \\ &= -\frac{u_0}{\pi} \arg \left(1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi\varphi}{\alpha} - i \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \sin \frac{\pi\varphi}{\alpha} \right) = \\ &= \frac{u_0}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{\left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \sin \frac{\pi\varphi}{\alpha}}{1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi\varphi}{\alpha}} = \frac{u_0}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi\varphi}{\alpha}}{\left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi\varphi}{\alpha}}. \end{aligned}$$

Если $r > r_0$, то

$$u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \left[\pi - \frac{\pi\varphi}{\alpha} - \operatorname{arctg} \frac{\left(\frac{r_0}{r} \right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \sin \frac{\pi\varphi}{\alpha}}{1 - \left(\frac{r_0}{r} \right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi\varphi}{\alpha}} \right].$$

Угол γ в квадратных скобках равен сумме двух углов: первый, $\pi - \frac{\pi\varphi}{\alpha} \in (0; \pi)$, второй $(-\beta)$, представленный арктангенсом, принадлежит интервалу $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$; следовательно, γ может находиться в интервале $\left(-\frac{\pi}{2}; \pi\right)$. Поскольку

$$\sin \gamma = \frac{\sin \frac{\pi\varphi}{\alpha}}{\sqrt{1 - 2\left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi\varphi}{\alpha} + \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{2\pi}{\alpha}}}} > 0,$$

то угол $\gamma \in (0; \pi)$. Итак, γ принадлежит области главных значений арккотангенса, а

$$\operatorname{ctg} \gamma = \frac{1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi\varphi}{\alpha}}{\left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi\varphi}{\alpha}},$$

откуда следует, что

$$\gamma = \operatorname{arccotg} \frac{1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi\varphi}{\alpha}}{\left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi\varphi}{\alpha}}.$$

Форма решения в обоих случаях: как при $r < r_0$, так и при $r > r_0$, одинакова, стало быть, при любых $r \in (0; \infty)$ решение задачи

$$u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \operatorname{arccotg} \frac{1 - \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi \varphi}{\alpha}}{\left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi \varphi}{\alpha}}.$$

Если вовремя заметить, что решение, полученное при $r > r_0$ после суммирования ряда, удовлетворяет всем условиям исходной задачи и при $r < r_0$, то необходимость преобразования решения при $r < r_0$ отпадает.

2.531. Найти потенциал электростатического поля внутри двугранного угла $0 < \varphi < \alpha$, грань $\varphi = 0$ которого поддерживается при нулевом потенциале, а потенциал другой грани, $\varphi = \alpha$, равен $u_0 \eta(r_0 - r)$, $r_0 > 0$.

2.532. Решить задачу Дирихле:

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r < \infty, \quad 0 < \varphi < \frac{\pi}{4},$$

$$u(r, 0) = 0, \quad u\left(r, \frac{\pi}{4}\right) = u_0 \frac{r}{r_0} \eta(r_0 - r).$$

2.533. Решить задачу Дирихле:

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r < \infty, \quad 0 < \varphi < \frac{3\pi}{4},$$

$$u(r, 0) = u_0 \frac{r}{r_0} \eta(r_0 - r), \quad r_0 > 0, \quad u\left(r, \frac{3\pi}{4}\right) = 0.$$

2.534. Решить краевую задачу

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r < \infty, \quad 0 < \varphi < \frac{3\pi}{2},$$

$$u(r, 0) = u_0 \sqrt{\frac{r_0}{r}} \eta(r - r_0), \quad r_0 > 0, \quad u_\varphi\left(r, \frac{3\pi}{2}\right) = 0.$$

2.535. В плоскости $y = 0$, ограничивающей полупространство $y > 0$, имеется щель $\{x, z: |x| < l, -\infty < z < \infty\}$, через которую втекает идеальная несжимаемая жидкость, плотность потока жидкости $V_0 \eta(l - |x|) \mathbf{e}_y$. При условии потенциальности течения найти потенциал поля скоростей жидкости, а также скорость $\mathbf{V}(x, 0)$.

2.536. В двугранный угол $\left(0 < \varphi < \frac{\pi}{6}\right)$ через полосу $(0 < r_0 < r)$ грани $\varphi = \frac{\pi}{6}$ входит тепловой поток, плотность которого $q_0 \left(\frac{r_0}{r}\right)^4$, а остальная часть грани теплоизолирована. Найти стационарную

температуру двугранного угла, если температура грани $\varphi = 0$ равна нулю.

2.537. В двугранный угол ($0 < x, 0 < y$) через полосу $(0; r_0)$ грани $y = 0$ входит тепловой поток, плотность которого q_0 , а через полосу $(0; r_0)$ грани $x = 0$ точно такой поток выходит; остальная поверхность теплоизолирована. Определить стационарную температуру двугранного угла, если в точке $(r_0; \frac{\pi}{4})$ температура равна нулю; указать изотермическую поверхность нулевой температуры.

2.538. Решить краевую задачу

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r < \infty, \quad 0 < \varphi < \frac{5\pi}{4},$$

$$u(r, 0) = 0, \quad u_\varphi\left(r, \frac{5\pi}{4}\right) = A\left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{2}{5}} \eta(r - r_0), \quad r_0 > 0.$$

2.539. Внутри двугранного угла ($0 < \varphi < \frac{\pi}{5}$) через полосу ($0 < r < r_0$) грани $\varphi = 0$ поступает тепловой поток, плотность которого $q_0 \frac{r}{r_0} \sqrt{\frac{r}{r_0}} \ln \frac{r}{r_0} \eta(r_0 - r)$, а остальная часть грани теплоизолирована. Найти плотность потока через грань $\varphi = \frac{\pi}{5}$, если температура этой грани равна нулю; вычислить также $q(r_0, \frac{\pi}{5})$.

2.540. Грань $\varphi = 0$ двугранного угла ($0 < \varphi < \frac{4\pi}{3}$), заполненного однородным диэлектриком ($\varepsilon = 1$), поддерживается при нулевом потенциале, а потенциал грани $\varphi = \frac{4\pi}{3}$ равен $u_0\left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{3}{4}} \eta(r - r_0)$, $r_0 > 0$. Найти плотность заряда $\sigma(r, 0)$ на внутренней стороне ($\varphi \rightarrow +0$) грани $\varphi = 0$. Вычислить также $\sigma(r_0, 0)$.

2.541. Через грань $\varphi = 0$ двугранного угла ($0 < \varphi < \frac{3\pi}{7}$) внутрь угла проходит стационарный тепловой поток, плотность которого $q(r) = q_0\left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{1}{6}} \ln \frac{r_0}{r} \eta(r_0 - r) \mathbf{e}_\varphi$, а грань $\varphi = \frac{3\pi}{7}$ поддерживается при нулевой температуре. Найти стационарную температуру $u(r, 0)$ грани $\varphi = 0$. Чему равна температура $u(r_0, 0)$?

2.542. Через полуплоскость $\{x, y, z: 0 < x, y = 0, -\infty < z < \infty\}$, расположенную в однородной среде с коэффициентом диффузии D , проходит стационарный поток частиц, плотность которого




Рис. 2.2

$q_0 \eta(r_0 - r) \mathbf{e}_y$ (рис. 2.2, а). Решить задачу стационарной диффузии.

2.543. В однородной проводящей среде с проводимостью σ расположена полуплоскость $\{x, y, z: 0 < x, y = 0, -\infty < z < \infty\}$ — источник тока, плотность которого $j_0 \eta(r_0 - r)$ на стороне $y = +0$, $-j_0 \eta(r_0 - r)$ на стороне $y = -0$ (рис. 2.2, б). Найти плотность тока в среде.

2.544. Внутри двугранного угла ($0 < \varphi < \alpha$) параллельно ребру расположена прямая, с единицы длины которой в единицу времени выделяется q_0 частиц, координаты прямой (r_0, φ_0) . Решить задачу стационарной диффузии, если концентрация на гранях равна нулю

2.545. Внутри двугранного угла ($0 < \varphi < \alpha$) с проводящими заземленными гранями расположена параллельно ребру прямая, координаты которой $(r_0, \frac{\alpha}{2})$, линейная плотность заряда q . Определить силу, действующую на единицу длины нити.

2.546. Внутри двугранного угла ($0 < \varphi < \alpha$) параллельно ребру расположен линейный источник тепла, с единицы длины которого в единицу времени выделяется q_0 единиц тепла; координаты источника $(r_0, \frac{\alpha}{2})$. Решить стационарную задачу теплопроводности, если грань $\varphi = \alpha$ теплоизолирована, а температура грани $\varphi = 0$ равна нулю.

2.547. Внутри двугранного угла ($0 < \varphi < \alpha$) с проводимостью σ параллельно ребру расположена прямая, с единицы длины которой в единицу времени перпендикулярно прямой равномерно по направлениям выделяется заряд J . Найти стационарную плотность тока, если координаты источника (r_0, φ_0) .

2.548. Внутри двугранного угла ($0 < \varphi < \alpha$) с проводящими заземленными гранями расположена параллельно его ребру

бесконечная заряженная нить, дипольный момент единицы длины которой $\mathbf{p}$ (вектор $\mathbf{p}$ перпендикулярен нити), координаты (r_0, φ_0) . Найти потенциал электростатического поля внутри угла, если: 1) $\mathbf{p} = p\mathbf{e}_r$; 2) $\mathbf{p} = p\mathbf{e}_\varphi$.

2.549. Ток J втекает в однородную пластинку клиновидной формы $\{r, \varphi, z: 0 < r, 0 < \varphi < \alpha < 2\pi, |z| < d\}$ через линию на грани $\varphi = 0$, параллельную ребру и отстоящую от него на расстоянии a . Определить плотность тока в пластинке, если ее проводимость σ , а ток J равномерно распределен вдоль контактной линии.

2.550. В однородной среде с коэффициентом теплопроводности k расположена полуплоскость $\{x, y, z: 0 < x, y = 0, -\infty < z < \infty\}$, температура которой $u_0\eta(r_0 - r)$, $r_0 > 0$. Найти стационарную температуру в пространстве.

2.551. В однородном диэлектрике ($\varepsilon = 1$) расположена полуплоскость $\{x, y, z: 0 < x, y = 0, -\infty < z < \infty\}$, потенциал которой $u_0\eta(r - r_0)$, $r_0 > 0$. Найти электростатическое поле в диэлектрике.




Рис. 2.3

2.552. Параллельно краю проводящей заземленной полуплоскости $\{x, y, z: 0 < x, y = 0, -\infty < z < \infty\}$ расположена прямая $\{x, y, z: x = -a, y = 0, -\infty < z < \infty\}$, заряд единицы длины которой равен q (рис. 2.3, а) Найти плотность заряда на полуплоскости.

2.553. В однородной среде с магнитной проницаемостью $\mu \gg 1$ имеется полость в форме двугранного угла $(-\alpha < \varphi < \alpha)$, внутри которой параллельно ребру расположен прямой ток $J\mathbf{e}_z$. Определить силу, действующую на единицу длины тока, если его координаты $(r_0, 0)$ (рис. 2.3, б).

2.3. Задачи, в которых применяются специальные функции и ортогональные полиномы

Пример 2.20. Стержень ($0 < x < l$) в форме клина (рис. 2.4), торец $x = 0$ которого упруго закреплен, расположен на идеально гладкой горизонтальной поверхности и находится в статическом равновесии под действием силы $F\mathbf{e}_x$, приложенной к торцу $x = 0$. В момент $t = 0$ действие силы прекращается. Решить задачу о движении стержня, пренебрегая деформацией поперечных сечений.




Рис. 2.4

Решение. В одномерном приближении движение стержня моделируется совокупностью уравнений

$$\begin{aligned}\rho_0(l-x)u_{tt} &= E_0 \frac{\partial}{\partial x}(l-x) \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ E_0 S_0 u_x(0, t) - ku(0, t) + F_0 &= 0, \quad \lim_{x \rightarrow l} (l-x)u_x(x, t) = 0, \\ u(x, 0) &= u_t(x, 0) = 0.\end{aligned}$$

В переменных $v(\xi, t) = u(x, t) - F_0/k$, $\xi = (l-x)$ задача приобретает вид

$$\begin{aligned}\xi v_{tt} &= a^2 \frac{\partial}{\partial \xi} \xi \frac{\partial v}{\partial \xi}, \quad 0 < \xi < l, \quad 0 < t, \\ \lim_{\xi \rightarrow 0} \xi v_\xi(\xi, t) &= 0, \quad v_\xi(l, t) + hv(l, t) = 0, \\ v(\xi, 0) &= -\frac{F_0}{k}, \quad v_t(\xi, 0) = 0, \quad a^2 = \frac{E_0}{\rho_0}, \quad h = \frac{k}{E_0 S_0}.\end{aligned}$$

В результате разделения переменных $v(\xi, t) = X(\xi)T(t)$ получается уравнение $T'' + a^2 \lambda T = 0$ и задача на собственные значения для уравнения Бесселя

$$\frac{1}{\xi} \frac{d}{d\xi} \xi \frac{dX}{d\xi} + \lambda X = 0, \quad 0 < \xi < l, \quad (2.43)$$

$$\lim_{\xi \rightarrow 0} \xi X'(\xi, t) = 0, \quad X'(l) + hX(l) = 0, \quad (2.44)$$

которую можно представить как задачу $\mathcal{L}X = \lambda X$ для оператора

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{\xi} \frac{d}{d\xi} \xi \frac{d}{d\xi},$$

определенного на множестве гладких комплекснозначных функций $X \in \tilde{L}_2(0, l)$, $\mathcal{L}X \in \tilde{L}_2(0, l)$, удовлетворяющих граничным условиям (2.44). Здесь $\tilde{L}_2(0, l)$ — частный случай пространства $L_2(\Omega)$ (см. задачу (2.2), где Ω — интервал $(0, l)$, $\rho(x) = x$).

Оператор $\mathcal{L}$ будет положительным, так как его квадратичная форма неотрицательна:

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}X, X) &= \int_0^l \overline{X} \frac{d}{d\xi} \xi \frac{dX}{d\xi} d\xi = -\xi \overline{X} X' \Big|_0^l + \int_0^l \xi \left| \frac{dX}{d\xi} \right|^2 d\xi = \\ &= lh |X(l)|^2 + \int_0^l \xi \left| \frac{dX}{d\xi} \right|^2 d\xi \geq 0. \end{aligned}$$

Поэтому все его собственные значения $\lambda_n \geq 0$, а собственные функции, соответствующие различным собственным значениям, ортогональны с весом ξ на промежутке $(0, l)$. Общее решение уравнения (2.43)

$$X(x) = AJ_0(\sqrt{\lambda}\xi) + BY_0(\sqrt{\lambda}\xi)$$

удовлетворяет граничным условиям (2.44) при $B=0$, $\sqrt{\lambda} J'_0(\sqrt{\lambda}l) + hJ_0(\sqrt{\lambda}l) = 0$. Если обозначить $l\sqrt{\lambda} = \mu$, $lh = p$ и учесть, что $J'_0(x) = -J_1(x)$, то уравнение для собственных значений примет вид

$$\mu J_1(\mu) - pJ_0(\mu) = 0. \quad (2.45)$$

Пусть $\mu_n > 0$, $n \in \mathbb{N}$, — корень уравнения (2.45), тогда

$$\lambda_n = \mu_n^2/l^2, \quad X_n(\xi) = J_0\left(\frac{\mu_n}{l}\xi\right),$$

при этом

$$\int_0^l J_0\left(\frac{\mu_m}{l}\xi\right) J_0\left(\frac{\mu_n}{l}\xi\right) \xi d\xi = 0, \quad m \neq n.$$

Для вычисления нормы $\|X_n\|$ можно применить формулу (2.12), в которой $k = \xi$, $X = X(\sqrt{\lambda}\xi)$, $\frac{\partial X}{\partial \lambda} = \frac{\xi}{2\lambda} \frac{\partial X}{\partial \xi}$, $l_1 = 0$, $l_2 = l$,

поэтому

$$\begin{aligned} kW \left[\frac{\partial X}{\partial \lambda}, X \right] &= \frac{\xi}{2\lambda} W \left[\xi \frac{\partial X}{\partial \xi}, X \right] = \frac{\xi}{2\lambda} \left[\xi \left(\frac{\partial X}{\partial \xi} \right)^2 - X \frac{\partial}{\partial \xi} \xi \frac{\partial X}{\partial \xi} \right] = \\ &= \frac{\xi^2}{2\lambda} \left[\left(\frac{\partial X}{\partial \xi} \right)^2 + \lambda X^2 \right] = \frac{\xi^2}{2} [(X')^2 + X^2], \end{aligned}$$

где X' — производная по всему аргументу. Так как подстановка при $\xi = 0$ равна нулю, то

$$\|X_n\|^2 = \frac{l^2}{2} \{ [J'_0(\mu_n)]^2 + J_0^2(\mu_n) \}. \quad (2.46)$$

Решение задачи для $v(x, t)$ представляет собой ряд по собственным функциям,

$$v(\xi, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (C_n \cos \omega_n t + D_n \sin \omega_n t) X_n(\xi), \quad \omega_n = \frac{a\mu_n}{l}.$$

Из начальных условий следует, что $D_n = 0$,

$$C_n = -\frac{F_0}{k\|X_n\|^2} \int_0^l J_0\left(\frac{\mu_n}{l}\xi\right) \xi d\xi = -\frac{l^2 F_0 J_1(\mu_n)}{k\mu_n \|X_n\|^2} = -\frac{2pF_0}{k(\mu_n^2 + p^2)J_0(\mu_n)}.$$

При вычислении интеграла использована рекуррентная формула для цилиндрических функций $(\xi J_1)' = -\xi J_0$, а при вычислении нормы — формула (2.46) и уравнение (2.45). Решение поставленной задачи имеет форму ряда

$$u(x, t) = \frac{F_0}{k} \left(1 - 2p \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\mu_n\left(1 - \frac{x}{l}\right)\right)}{(\mu_n^2 + p^2)J_0(\mu_n)} \cos \frac{a\mu_n}{l} t \right).$$

2.554. Пусть $u_1(z) = Z_\nu(p_1 z)$, $u_2(z) = Z_\nu(p_2 z)$ — какие-нибудь решения уравнения Бесселя с параметром,

$$\frac{d}{dz} z \frac{du}{dz} + \left(p^2 z - \frac{\nu^2}{z} \right) u = 0,$$

в котором p, ν, z — комплексные числа.

Получить при $x_1 > 0, x_2 > 0$ следующие формулы (интегралы Ломмеля):

$$\int_{x_1}^{x_2} Z_\nu(p_1 x) Z_\nu(p_2 x) x dx = \frac{x}{p_1^2 - p_2^2} W[Z_\nu(p_1 x), Z_\nu(p_2 x)] \Big|_{x_1}^{x_2}, \quad (2.47)$$

$$\int_{x_1}^{x_2} Z_\nu^2(px) x dx = \frac{x^2}{2} \left[(Z'_\nu(px))^2 + \left(1 - \frac{\nu^2}{p^2 x^2} \right) Z_\nu^2(px) \right] \Big|_{x_1}^{x_2}, \quad (2.48)$$

где W — определитель Вронского, $Z'_\nu(px)$ — производная по всему аргументу.

2.555. Ортогональность и норма функций Бесселя. Дано уравнение

$$\alpha J_\nu(z) + \beta z J'_\nu(z) = 0, \quad \nu > -1, \quad |\alpha| + |\beta| > 0,$$

корни которого $\mu_1, \mu_2, \dots$. Показать, что для любого $l > 0$

$$\int_0^l J_\nu \left(\frac{\mu_m x}{l} \right) J_\nu \left(\frac{\mu_n x}{l} \right) x dx = 0, \quad \text{если } \mu_m^2 \neq \mu_n^2, \quad (2.49)$$

$$\int_0^l J_\nu^2 \left(\frac{\mu_n x}{l} \right) x dx = \frac{l^2}{2} \left[(J'_\nu(\mu_n))^2 + \left(1 - \frac{\nu^2}{\mu_n^2} \right) J_\nu^2(\mu_n) \right]. \quad (2.50)$$

2.556. Дана функция

$$F_\nu(z) = \alpha J_\nu(z) + \beta z J'_\nu(z), \quad \alpha \geq 0, \quad \beta \geq 0, \quad \alpha + \beta > 0,$$

$$\nu > -1, \quad \text{если } \beta = 0; \quad \text{если } \beta > 0, \quad \text{то } \begin{cases} \alpha > -1, \\ \frac{\alpha}{\beta} + \nu \geq 0. \end{cases}$$

Доказать следующие свойства нулей функции $F_\nu(z)$: все нули вещественные, простые (кроме, может быть, $z = 0$), расположены симметрично относительно $z = 0$, множество нулей счетно с точкой сгущения на бесконечности.

2.557. Оператор Бесселя

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{x} \left(\frac{d}{dx} x \frac{d}{dx} - \frac{\nu^2}{x^2} \right)$$

определен на множестве $\mathcal{M}_{\mathcal{L}}$ достаточно гладких комплекснозначных функций $X \in \tilde{L}_2(0, l)$, $\mathcal{L}X \in \tilde{L}_2(0, l)$ (см. пример 2.20), удовлетворяющих граничным условиям

$$\lim_{x \rightarrow 0} x X'(x) = 0, \quad \alpha x(l) + \beta X'(l) = 0.$$

Доказать, что $\mathcal{L}$: 1) эрмитов; 2) положителен.

2.558. Задача на собственные значения для уравнения Бесселя

$$X'' + \frac{1}{x}X' + \left(1 - \frac{\nu^2}{x^2}\right)X = 0, \quad 0 < x < l, \quad \nu \geq 0, \\ \lim_{x \rightarrow 0} xX'(x) = 0, \quad \alpha x(l) + \beta X'(l) = 0, \\ \alpha \geq 0, \quad \beta \geq 0, \quad \alpha + \beta > 0,$$

представляет собой задачу на собственные значения для оператора Бесселя

$$\mathcal{L}X = \lambda X, \quad X \in \mathcal{M}_{\mathcal{L}},$$

введенного в предыдущей задаче. Доказать, что:

- 1) собственные значения неотрицательны;
- 2) собственные функции можно выбрать вещественными;
- 3) собственные значения простые;
- 4) число $\lambda = 0$ — собственное значение тогда и только тогда, когда $\alpha = \nu = 0$;
- 5) множество собственных значений счетно с точкой сгущения на бесконечности;
- 6) собственные функции, принадлежащие разным собственным значениям, ортогональны на промежутке $(0, l)$ с весом x ,

$$\int_0^l J_{\nu}\left(\frac{\mu_m x}{l}\right) J_{\nu}\left(\frac{\mu_n x}{l}\right) x dx = 0, \quad m \neq n, \quad (2.51)$$

квадрат нормы собственной функции

$$\int_0^l J_{\nu}^2\left(\frac{\mu_n x}{l}\right) x dx = \frac{l^2}{2} \left[(J'_{\nu}(\mu_n))^2 + \left(1 - \frac{\nu^2}{\mu_n^2}\right) J_{\nu}^2(\mu_n) \right], \quad (2.52)$$

где $\mu_k > 0$ — корень уравнения $\alpha l J_{\nu}(\mu) + \beta \mu J'_{\nu}(\mu) = 0$.

2.559. Показать, что линейное дифференциальное уравнение

$$x^2 v'' + (1 + 2\alpha) x v' + [(\beta \gamma x^{\nu})^2 + \alpha^2 - \nu^2 \gamma^2] v = 0 \quad (2.53)$$

заменой $\xi = \beta x^{\gamma}$, $w = x^{\alpha} v$ преобразуется в уравнение Бесселя порядка ν

$$\xi^2 w'' + \xi w' + (\xi^2 - \nu^2) w = 0.$$

2.560. Круглая мембрана, радиус которой r_0 , закреплена по краю. Найти частоты и амплитуды собственных колебаний мембраны.

2.561. Мембрана в форме сектора ($0 < r < r_0$, $0 < \varphi < \alpha$) закреплена по краю. Определить частоты и амплитуды собственных колебаний мембраны.

2.562. Тяжелая струна ($0 < x < l$) подвешена за конец $x = 0$ в поле тяжести. Найти частоты собственных колебаний струны, если ее плотность $\rho(x) = \rho_0 \left(1 - \frac{x}{l}\right)^\nu$, где $\nu > -1$.

2.563. Определить две первые наименьшие частоты и амплитуды собственных продольных колебаний стержня, описанного в задаче 1.83.

2.564. Вертикальный стержень ($0 \leq x \leq l$) с прямоугольным поперечным сечением (рис. 1.12, а) находится в поле тяжести; нижний конец ($x = 0$) закреплен, а верхний свободен. Равновесие прямолинейного стержня остается устойчивым (относительно малых поперечных возмущений), если его длина l меньше некоторой критической величины l_k (см. задачу 2.14). При $l > l_k$ равновесие нарушается и стержень изгибается. Определить критическую длину однородного цилиндрического стержня.

2.565. Стационарная диффузия нейтронов в бесконечном цилиндре, радиус которого r_0 , сопровождается поглощением ($\Sigma_c \ll \Sigma_s$); на поверхности цилиндра поддерживается постоянная концентрация. Определить отношение χ максимальной концентрации к ее среднему (по объему) значению.

2.566. Длинный цилиндр, радиус которого r_0 , изготовлен из замедлителя, поглощающего нейтроны ($\Sigma_c \ll \Sigma_s$), и находится в вакууме. На оси цилиндра расположен линейный изотропный источник нейтронов, мощность единицы длины которого q_0 . Решить задачу стационарной диффузии, поставив условия: 1) для плотности потока нейтронов на экстраполированной границе $r = \tilde{r}_0$; 2) для односторонней плотности тока нейтронов на поверхности $r = r_0$. Сравнить результаты.

2.567. Длинный цилиндр, радиус которого r_0 , находится в изотропном нейтронном поле Φ_0 . При условиях задачи 1.249 найти плотность потока нейтронов $\Phi(r)$ в цилиндре и вычислить коэффициент прохождения γ (см. (2.18)).

2.568. Определить в диффузионном приближении критический радиус длинного цилиндра, поставив условия: 1) для плотности потока нейтронов на экстраполированной границе; 2) для односторонней плотности тока нейтронов на поверхности цилиндра.

2.569. Определить в диффузионном приближении наименьший критический объем реактора, имеющего форму конечного цилиндра ($r \leq r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $|z| < l$), поставив условие для плотности потока нейтронов на экстраполированной границе реактора.

2.570. Получить в диффузионном приближении условие критичности для цилиндрического реактора ($r \leq r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $|z| < l$) с торцевыми отражателями ($r \leq r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $l < |z| < h$). Сечения поглощения и рассеяния соответственно равны Σ_a^C и Σ_s^C для активной зоны, Σ_c^R и Σ_s^R — для отражателя. Поставить условие для плотности потока нейтронов на внешней экстраполированной поверхности, предполагая, что экстраполированные радиусы реактора и отражателя одинаковы.

2.571. Найти в диффузионно-возрастном приближении критический радиус длинного цилиндра, поставив условие для плотности потока нейтронов на экстраполированной границе; делением быстрыми нейтронами пренебречь.

2.572. Решить предыдущую задачу с учетом деления, осуществляемого быстрыми нейтронами.

2.573. В неограниченном круглом цилиндре происходит диффузия нейтронов с размножением. Определить критический радиус цилиндра (см. задачу 2.43), если: 1) концентрация нейтронов на поверхности равна нулю; 2) цилиндр находится в вакууме.

2.574. Цилиндрический проводник, радиус которого r_0 , находится в однородном магнитном поле, параллельном оси проводника. В момент времени $t = 0$ поле отключается и остается равным нулю вне проводника. Определить характерное время t_k затухания поля в проводнике.

2.575. Вертикальный сосуд в форме цилиндра заполнен идеальной несжимаемой жидкостью; радиус цилиндра r_0 , глубина жидкости $h_0 \gg r_0$. Определить частоту и форму гравитационных волн малой амплитуды: $A \ll \lambda \ll h_0$.

2.576. Прямолинейный канал ($-l < x < l$) заполнен идеальной несжимаемой жидкостью. Ось Ox направлена вдоль канала, его поперечное сечение $\{y, z: |y| < d, -h(x) < z < 0\}$, $h(x) = h_0(1 - \frac{|x|}{l})$. В жидкости возбуждаются одномерные (вдоль канала) длинные гравитационные волны малой амплитуды ($A \ll h_0 \ll \lambda$). Определить две первые (наименьшие) частоты колебаний жидкости.

2.577. Решить задачу 2.36 для канала ($0 < x < l$), ширина d и глубина h которого зависят от x :

$$\begin{array}{lll} 1) \quad d(x) = \frac{d_0}{l} x, & 2) \quad d(x) = d_0, & 3) \quad d(x) = \frac{d_0}{l} x, \\ h(x) = h_0; & h(x) = \frac{h_0}{l} x; & h(x) = \frac{h_0}{l} x. \end{array}$$

2.578. В круглом цилиндрическом волноводе с идеально проводящей поверхностью, радиус которого r_0 , распространяется волна типа: 1) TM ; 2) TE . Определить частоту отсечки волны.

2.579. Найти волновые функции и уровни энергии стационарных состояний частицы в двумерной потенциальной яме

$$U(r) = \begin{cases} 0, & 0 \leq r < r_0, \\ \infty, & r_0 < r. \end{cases}$$

2.580. На жесткий круглый каркас, радиус которого r_0 , натянута тонкая пленка; ее поверхностная плотность ρ_0 , натяжение T_0 . Каркас движется с ускорением $w_0 \mathbf{e}_u$, при этом пленка сохраняет постоянную форму. Решить задачу о движении пленки после мгновенной остановки каркаса.

2.581. Решить предыдущую задачу для пленки, край которой закреплен упруго.

2.582. Круглая мембрана с закрепленным краем получает импульс I в результате удара молоточком с круглым основанием; радиус мембраны r_0 , радиус основания молоточка $r_1 < r_0$; при ударе центры обоих кругов совпадают. Решить задачу о колебаниях мембраны.

2.583. Круглая мембрана, закреплена по краю и находится в статическом равновесии под действием силы $F_0 \mathbf{e}_u$, равномерно распределенной по окружности, радиус которой $r = r_1 < r_0$, где r_0 — радиус мембраны. Решить задачу о колебаниях мембраны после того, как сила прекращает действовать.

2.584. Круглая мембрана ($r < r_0$) с закрепленным краем находится в статическом равновесии под действием силы, равномерно распределенной по кругу, радиус которого $r_1 < r_0$, с плотностью $p_0 \mathbf{e}_u$. В момент $t = 0$ действие сил прекращается. Решить задачу о колебаниях мембраны.

2.585. Мембрана, натянутая на кольцо (см. задачу 1.130), расположена в плоскости xOy и находится в покое. Решить задачу

о движении мембраны, если в момент $t = 0$: 1) мембрана получает импульс $I\mathbf{e}_u$, равномерно распределенный по ее поверхности; 2) кольцо получает импульс $I\mathbf{e}_u$, равномерно распределенный по длине; 3) мембрана и кольцо получают импульс $I\mathbf{e}_u$ в результате удара пластинкой, параллельной плоскости xOy .

2.586. Начальная форма мембраны, натянутой на кольцо (см. задачу 1.130), — параболоид вращения относительно оси Oz , координаты вершины которого $(0; h)$, начальная скорость точек мембраны равна нулю, кольцо расположено в плоскости xOy и находится в покое. 1) Решить задачу о движении мембраны; 2) полученный результат применить к мембране с неподвижным кольцом.

2.587. Получить решение $u(r, t)$ задачи о движении кольцевой мембраны (см. задачу 1.131), если $u(r, 0) = u_0(r)$, $u_t(r, 0) = 0$,

где: 1) $u_0(r) = h \frac{\ln \frac{r}{r_2}}{\ln \frac{r_1}{r_2}}$; 2) $u_0(r) = h \frac{r_2^2 - r^2}{r_2^2 - r_1^2}$.

2.588. Кольцевая мембрана (см. задачу 1.131) расположена в плоскости xOy и находится в покое. В момент $t = 0$ в результате удара по кольцу каждая его точка приобретает скорость $v\mathbf{e}_u$. Найти отклонение $u(r, t)$ мембраны от начального положения при $t > 0$.

2.589. Мембрана с диском (см. задачу 1.132) расположена в плоскости xOy и находится в состоянии равновесия. В момент $t = 0$: 1) диск получает импульс $I\mathbf{e}_u$, равномерно распределенный по поверхности; 2) мембрана (но не диск) получает импульс $I\mathbf{e}_u$, равномерно распределенный по ее поверхности; 3) мембрана и диск получают импульс $I\mathbf{e}_u$, при этом все точки (кроме точек окружности $r = r_2$) приобретают одну и ту же скорость. Решить задачу о движении мембраны.

2.590. Мембрана с диском (см. задачу 1.132) находится в состоянии статического равновесия под действием постоянного давления p_0 : 1) на диск; 2) на часть мембраны без диска. В момент $t = 0$ давление становится равным нулю. Решить задачу о движении мембраны.

2.591. Полый цилиндр, радиус которого r_0 , заполнен идеальным газом и движется со скоростью $v_0\mathbf{k}$, где $\mathbf{k}$ — постоянный единичный вектор, перпендикулярный оси цилиндра. В момент $t = 0$ цилиндр мгновенно останавливается. Определить в акустическом приближении потенциал скоростей газа.

2.592. Упругий стержень ($0 < x < l$) в форме клина (рис. 1.9), расположенный на гладкой горизонтальной поверхности, получает импульс I в результате продольного удара в торец $x = 0$, площадь которого S_0 . Решить в одномерном приближении задачу о движении стержня.

2.593. Упругий стержень ($0 < x < l$) в форме клина (рис. 1.9), расположенный на гладкой горизонтальной поверхности, получает импульс в результате продольного удара в торец $x = 0$ сосредоточенной массы m , имеющей скорость v_0 и движущейся вместе со стержнем. Решить в одномерном приближении задачу о движении стержня.

2.594. Тяжелая однородная струна ($0 < x < l$), подвешенная в точке $x = 0$ в поле тяжести, находится в статическом равновесии под действием горизонтальной силы F_0 , приложенной в точке $x_0 \in (0, l)$. Решить задачу о колебаниях струны после прекращения действия силы.

2.595. Тяжелая однородная струна ($0 < x < l$), подвешенная в точке ($x = 0$) в поле тяжести, имеет начальный профиль $u_0 x/l$ и нулевую начальную скорость. Решить задачу о колебаниях струны.

2.596. Струна ($0 < x < l$), плотность которой $\rho(x) = \rho_0(1 - \frac{x}{l})^\nu$, где $\nu > -1$, подвешена за один конец ($x = 0$) в поле тяжести и находится в статическом равновесии. Решить задачу о колебаниях струны, возбужденных поперечным ударом в точку $x_0 \in (0, l)$, в результате которого струна получает импульс I .

2.597. Мембрана, радиус которой r_0 , закреплена по краю. С момента $t = 0$ на мембрану действует сила $F_0 \mathbf{e}_u$, равномерно распределенная по окружности, радиус которой $r = r_1 < r_0$. Решить задачу о колебаниях мембраны при нулевых начальных условиях.

2.598. Круглая мембрана, радиус которой r_0 , закреплена по краю. С момента времени $t = 0$ на мембрану действует сила $F_0 \cos \omega t \mathbf{e}_u$, равномерно распределенная по окружности, радиус которой $r = r_1 < r_0$. Решить задачу о колебаниях мембраны при нулевых начальных условиях.

2.599. Круглая мембрана, радиус которой r_0 , закреплена по краю. С момента времени $t = 0$ до $t = t_0 > 0$ на мембрану действует сила, равномерно распределенная с плотностью $p_0 \mathbf{e}_u$ по кругу, радиус которого $r_1 < r_0$. Решить задачу о движении мембраны при нулевых начальных условиях.

2.600. Круглая мембрана, радиус которой r_0 , закреплена по краю. С момента времени $t = 0$ на мембрану действует сила, равномерно распределенная с плотностью $p_0 \sin \omega t \mathbf{e}_u$ по кругу, радиус которого $r_1 < r_0$. Решить задачу о колебаниях мембраны при нулевых начальных условиях.

2.601. Торец стержня ($0 < x < l$), имеющего форму клина, жестко связан с потолком свободно падающего лифта. При скорости v_0 лифт мгновенно останавливается. Решить в одномерном приближении задачу о колебаниях стержня.

2.602. На гибкую упругую нить ($0 < x < l$), подвешенную за один конец ($x = 0$) в поле тяжести, действует с момента времени $t = 0$ сила $p_0 \mathbf{e}_u$ на единицу длины нити. Определить форму нити в момент времени $t > 0$.

2.603. Идеальный газ заполняет бесконечно длинный цилиндрический сосуд, радиус которого меняется со временем по закону $r_0(1 + \alpha(t))$, где $|\alpha| \ll 1$, $\alpha(0) = 0$. Определить в акустическом приближении потенциал скоростей газа, если до момента $t = 0$ газ находился в равновесии.

2.604. В длинном полом цилиндра, радиус которого r_0 , находится идеальный газ. С момента времени $t = 0$ поверхность цилиндра движется со скоростью $v_0 \alpha(t) \sin \varphi \mathbf{e}_r$, $|\alpha| \ll 1$, $\alpha(0) = 0$. Найти в акустическом приближении потенциал скоростей газа.

2.605. В полом цилиндра ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z < l$) находится идеальный газ. С момента времени $t = 0$ основание $z = l$ цилиндра движется со скоростью $V_0(1 - r^2/r_0^2)\alpha(t)$, $|\alpha| \ll 1$, $\alpha(0) = 0$. Определить в акустическом приближении потенциал скоростей газа.

2.606. На клиновидный стержень ($0 < x < l$), расположенный на гладкой горизонтальной поверхности (рис.1.9), с момента $t = 0$ действует сила $F_0 \mathbf{e}_x$, приложенная к торцу $x = l$, площадь которого S_0 . Решить в одномерном приближении задачу о движении стержня.

2.607. На оси длинного цилиндра, радиус которого $r = r_0$, расположен проводник с током, выделяющий с единицы длины тепловую мощность Q_0 . После того, как тепловое поле стало стационарным, ток отключили. Определить температуру цилиндра, если до и после отключения тока: 1) его поверхность поддерживается при нулевой температуре; 2) на его поверхности

происходит теплообмен по закону Ньютона с внешней средой, температура которой равна нулю.

2.608. Круглая мембрана, радиус которой r_0 , упруго закреплена по краю. Мембрана получает импульс $I \mathbf{e}_u$ в результате удара в ее центр. Решить задачу о движении мембраны, если до удара ее отклонение и скорость равны нулю.

2.609. Поверхность цилиндра ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z < l$) поддерживается при нулевой температуре, а начальная температура равна $u_0 \sin \frac{\pi z}{l}$. Найти температуру цилиндра при $t > 0$.

2.610. Поверхность длинного цилиндра, радиус которого r_0 , поддерживается при нулевой температуре, начальная температура $u_0 \cos 2\varphi$. Решить задачу теплопроводности.

2.611. Начальная температура неограниченного цилиндра, радиус которого r_0 , равна $u_0 \frac{r}{r_0} \sin \varphi$. Определить температуру цилиндра при $t > 0$, если его поверхность поддерживается при нулевой температуре.

2.612. Неограниченный круглый цилиндр с теплоизолированной поверхностью нагрет до температуры $u_0 \frac{r}{r_0} \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2}\right) \sin \varphi$, радиус цилиндра r_0 . Как будет изменяться его температура со временем?

2.613. На поверхности неограниченного круглого цилиндра происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой равна нулю, радиус цилиндра r_0 . Определить температуру $u(r, \varphi, t)$ цилиндра при $t > 0$, если $u(r, \varphi, 0) = u_0 \frac{r^2}{r_0^2} \cos 2\varphi$.

2.614. В цилиндре $\{r, \varphi, z: r \leq r_0, 0 \leq \varphi < 2\pi, |z| \leq l\}$ с непроницаемыми торцами $z = \pm l$ действуют источники газа, мощность в единице объема которых Q_0 , при этом концентрация газа не зависит от времени. В момент $t = 0$ действие источников прекращается. Решить задачу диффузии, если до и после момента $t = 0$: 1) концентрация газа на поверхности $r = r_0$ равна нулю; 2) поверхность $r = r_0$ полупроницаема для газа, концентрация которого вне цилиндра равна нулю (коэффициент α дан).

2.615. Полуокруглая мембрана ($r < r_0$, $0 < \varphi < \pi$) с закрепленным краем получает начальное отклонение $u_0(r) = u_0 \frac{r}{r_0} \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2}\right) \times$

$\times \sin \varphi$ при нулевой начальной скорости. Решить задачу о колебаниях мембраны.

2.616. Мембрана в форме полукруга ($r < r_0$, $0 < \varphi < \pi$), закрепленная по краю, получает импульс $I \mathbf{e}_u$ в результате удара в точку $(r_1, \pi/2)$, где $0 < r_1 < r_0$. Решить задачу о колебаниях мембраны, если до удара смещения и скорости ее точек были равны нулю.

2.617. Длинный цилиндр охлаждается снаружи теплоносителем, температуру которого можно считать равной температуре поверхности цилиндра. Определить температуру $u(r, t)$ цилиндра при $t > 0$, если его радиус равен r_0 , $u(r, 0) = u_0(r)$, а теплоемкость теплоносителя на единицу длины (вдоль оси цилиндра) равна C_0 .

2.618. В неограниченном цилиндре, радиус которого r_0 , с момента времени $t = 0$ действуют тепловые источники; их мощность в единице объема равна $Q_0 e^{-\alpha t}$, $\alpha \geq 0$. Поверхность цилиндра поддерживается при нулевой температуре, его начальная температура равна нулю. Решить задачу теплопроводности.

2.619. Длинный проводящий цилиндр нагревается в течение времени от $t = 0$ до $t = t_0 > 0$ током, при прохождении которого в единице объема выделяется тепловая мощность Q_0 . Определить температуру $u(r, t)$ цилиндра, если $u(r, 0) = 0$, а на поверхности происходит теплообмен по закону Ньютона; температура внешней среды равна нулю, радиус цилиндра $r = r_0$.

2.620. Поверхность неограниченного цилиндра, радиус которого r_0 , поддерживается при температуре u_0 . Найти температуру $u(r, t)$ цилиндра при $t > 0$, если $u(r, 0) = 0$.

2.621. Полый цилиндр, радиус которого r_0 , с вязкой несжимаемой жидкостью начинает вращаться с угловой скоростью ω относительно своей оси. Найти скорость жидкости в момент $t > 0$ и при $t \rightarrow +\infty$, если скорости поверхности и прилегающего элемента жидкости одинаковы.

2.622. Найти температуру бесконечного цилиндра, радиус которого r_0 , если его начальная температура равна нулю, а на поверхности происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой u_0 .

2.623. На поверхности неограниченного цилиндра происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура

которой At , радиус цилиндра r_0 . Определить температуру цилиндра при $t > 0$, если при $t = 0$ она равна нулю.

2.624. В цилиндре, радиус которого r_0 , высота l , диффундирует газ. Боковая поверхность цилиндра представляет собой полупроницаемую перегородку, а основания непроницаемы для газа. Решить задачу диффузии, если начальная концентрация газа в цилиндре равна u_0 , а концентрация во внешнем пространстве $u_1 \exp(-\alpha t)$, $\alpha \geq 0$.

2.625. Круглая мембрана, радиус которой r_0 , закреплена по краю. С момента $t = 0$ на мембрану действует сила, распределенная с линейной плотностью $f_0 \cos \varphi \mathbf{e}_u$ по окружности, радиус которой $r_1 < r_0$. Решить задачу о колебаниях мембраны при нулевых начальных условиях.

2.626. Определить температуру неограниченного цилиндра, радиус которого r_0 , если начальная температура равна нулю, а температура поверхности $u_0 \sin \varphi$.

2.627. Через поверхность длинного цилиндра, радиус которого r_0 , проходит поток частиц, радиальная компонента плотности которого $q_0 \cos \varphi$. Определить концентрацию частиц в цилиндре в процессе диффузии, если начальная концентрация равна нулю.

2.628. На поверхности длинного цилиндра, радиус которого r_0 , происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой $u_0 \cos 2\varphi$. Найти температуру $u(r, \varphi, t)$ цилиндра при $t > 0$, если $u(r, \varphi, 0) = 0$.

2.629. Через поверхность неограниченного цилиндра, радиус которого r_0 , в течение времени от $t = 0$ до $t = t_0 > 0$ проходит поток частиц, радиальная компонента плотности которого $q_0 \cos \varphi$, а затем поверхность покрывают непроницаемой оболочкой. Найти концентрацию частиц в цилиндре в процессе диффузии, если начальная концентрация равна нулю.

2.630. Круглая мембрана, радиус которой r_0 , натяжение T_0 , находится под давлением $p_0 \left(\frac{r}{r_0}\right)^n \sin n\varphi \mathbf{e}_u$, $n \in \mathbb{N}$. Решить задачу о движении мембраны после прекращения в момент $t = 0$ действия сил, если до и после этого момента край мембраны был закреплен: 1) жестко; 2) упруго.

2.631. Через поверхность ($r = r_0$) бруса, поперечным сечением которого является полукруг ($r < r_0$, $0 < \varphi < \pi$), проходит

тепловой поток постоянной плотности $\mathbf{q}_0 = -q_0 \mathbf{e}_r$, а диаметральной плоскость имеет нулевую температуру. Найти температуру бруса при $t > 0$, если при $t = 0$ она равна нулю.

2.632. Начальная температура цилиндра, радиус которого r_0 , высота l , равна нулю. Определить температуру цилиндра при $t > 0$, если его основания теплоизолированы, а на боковой поверхности происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой $At \cos \varphi$.

2.633. Основания цилиндра ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z < l$) поддерживаются при нулевой температуре, боковая поверхность — при температуре $u_0 \sin \frac{\pi z}{l}$, а начальная температура равна нулю. Определить температуру цилиндра при $t > 0$.

2.634. Основания цилиндра ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z < l$) имеют нулевую температуру, боковая поверхность — температуру u_0 . Определить температуру цилиндра при $t > 0$, если при $t = 0$ она равна нулю.

2.635. Основания цилиндра ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z < l$) теплоизолированы, а температура его поверхности $r = r_0$ равна $u_0 \cos \frac{\pi z}{l} e^{-\alpha t}$, где $\alpha \geq 0$. Найти температуру цилиндра при $t > 0$, если при $t = 0$ она равна нулю.

2.636. Определить стационарную температуру однородного цилиндра ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z < l$), если боковая поверхность и основание $z = 0$ поддерживаются при нулевой температуре, а температура основания $z = l$ равна $u_0 \frac{r}{r_0} \cos \varphi$.

2.637. В проводящий цилиндр ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $|z| < l$) через центр основания $z = -l$ втекает постоянный ток I , а через центр другого основания вытекает. Какова плотность тока в цилиндре?

2.638. Дан цилиндр ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z < l$). Его боковая поверхность поддерживается при нулевой температуре, основание $z = l$ теплоизолировано, а через основание $z = 0$ поступает тепловой поток, плотность которого $q_0 \mathbf{e}_z$, столь долго, что в цилиндре устанавливается стационарный тепловой режим. В момент $t = 0$ основание $z = 0$ покрывают теплоизоляцией. Найти температуру цилиндра при $t > 0$.

2.639. Определить стационарную температуру однородного цилиндра ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z < l$), основания $z = 0$ и $z = l$

которого имеют нулевую температуру и температуру u_0 соответственно, а на боковой поверхности происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой равна нулю.

2.640. Боковая поверхность $r = r_0$ ограниченного цилиндра ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z < l$) поддерживается при нулевой температуре, основание $z = 0$ теплоизолировано, а через основание $z = l$ проходит тепловой поток постоянной плотности $q_0 \mathbf{e}_z$. Определить стационарную температуру цилиндра, если в нем происходит выделение тепловой мощности Q_0 в единице объема.

2.641. Основание $z = 0$ цилиндра ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z < l$) имеет нулевую температуру, а на основание $z = l$ падает тепловой поток $\mathbf{Q}_0 = -Q_0 \mathbf{e}_z$, равномерно распределенный по кругу, радиус которого $r_1 < r_0$; а остальная часть основания и боковая поверхность теплоизолированы. Найти стационарную температуру цилиндра.

2.642. Определить температуру бесконечного цилиндра, радиус которого r_0 , если начальная температура равна нулю, а температура поверхности не зависит от времени и равна $f(\varphi)$, где $f(\varphi)$ — нечетная 2π -периодическая функция.

2.643. В неограниченном цилиндре, радиус которого r_0 , действуют источники тепла, мощность которых в единице объема $Q_0 \left(\frac{r}{r_0}\right)^n \sin n\varphi$, $n \in \mathbb{N}$; при этом температура не зависит от времени. В момент $t = 0$ действие источников прекращается. Решить задачу теплопроводности, если до и после момента времени $t = 0$: 1) температура поверхности $r = r_0$ равна нулю; 2) через поверхность $r = r_0$ происходит теплообмен по закону Ньютона с внешней средой, температура которой равна нулю (коэффициент теплообмена α дан).

2.644. На поверхности $r = r_0$ бесконечно длинного бруса с поперечным сечением ($r < r_0$, $0 < \varphi < \pi$) происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой u_0 , а диаметральной плоскости поддерживается при нулевой температуре. Определить температуру бруса при $t > 0$, если при $t = 0$ она равна нулю.

2.645. Поперечным сечением бесконечно длинного бруса является сектор ($r < r_0$, $0 < \varphi < \alpha$). Грани $\varphi = 0$ и $\varphi = \alpha$ теплоизолированы, а поверхность $r = r_0$ поддерживается при стационарной температуре $u_0 \cos \frac{\pi\varphi}{\alpha}$. Решить задачу теплопроводности при нулевой начальной температуре.

Пример 2.21. Задачи следующей группы содержат стационарные неоднородности. Метод их решения (см. пример 3.8) состоит в построении частного решения уравнения, удовлетворяющего граничным условиям. В результате редукции неоднородная задача преобразуется в однородную (однородные граничные условия и однородное уравнение). Техника решения одной из таких задач (с граничным условием второго рода при $r = r_0$),

$$u_{tt} = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + Ar^2, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t,$$

$$|u| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = 0, \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0,$$

сводится к нескольким последовательным заменам. Подстановка $u(r, t) = v(r, t) + f(r)$ в уравнение

$$v_{tt} = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial v}{\partial r} + a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial f}{\partial r} + Ar^2$$

приводит к однородному уравнению для $v(r, t)$, если $f(r)$ удовлетворяет условиям

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{Ar^2}{a^2} = 0, \quad |f| < \infty,$$

откуда $f(r) = -\frac{Ar^4}{16a^2}$ (одно из ограниченных решений). В этом случае функция $v(r, t)$ — решение задачи

$$v_{tt} = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial v}{\partial r} \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t,$$

$$|v| < \infty, \quad v_r(r_0, t) = \frac{Ar_0^3}{4a^2}, \quad v(r, 0) = \frac{Ar^4}{16a^2}, \quad v_t(r, 0) = 0.$$

Сразу придти к однородной задаче таким путем не удастся из-за конструкции граничного условия. Замена $v(r, t) = w(r, t) + g(r)$, где функция $g(r) = \frac{Ar_0^2 r^2}{8a^2}$, убирает неоднородность в граничном условии, и для функций $w(r, t)$ получается следующая задача:

$$w_{tt} = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial w}{\partial r} + \frac{Ar_0^2}{2}, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t,$$

$$|w| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = 0, \quad w(r, 0) = \frac{Ar^4}{16a^2}, \quad w_t(r, 0) = 0.$$

Хотя уравнение снова стало неоднородным, однако характер неоднородности изменился: вместо функции вошла константа. Именно этим фактом диктуется выбор $g(r)$ из множества

возможных функций. Теперь замена $w(r, t) = U(r, t) + \frac{Ar_0^2 t^2}{4}$ снимает неоднородность в уравнении и не влияет на граничные условия. Итак, $u(r, t) = u_0(r, t) + U(r, t)$, где

$$u_0(r, t) = -\frac{Ar^4}{16a^2} + \frac{Ar_0^2 r^2}{8a^2} + \frac{Ar_0^2 t^2}{4}$$

есть частное решение исходного уравнения, удовлетворяющее граничным условиям, а $U(r, t)$ — решение однородной задачи

$$U_{tt} = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial U}{\partial r}, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t,$$

$$|U| < \infty, \quad U_r(r_0, t) = 0, \quad U_0(r) = \frac{Ar^4}{16a^2} - \frac{Ar_0^2 r^2}{8a^2}, \quad U_t(r, 0) = 0,$$

где $U_0(r) = U(r, 0)$.

Далее методом Фурье определяются собственные значения λ_n и собственные функции $R_n(r)$ оператора $\mathcal{L} = -\frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{d}{dr}$:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}R &= \lambda R, \quad 0 < r < r_0, \\ |r| < \infty, \quad R'(r_0) &= 0. \end{aligned}$$

В данном случае $\lambda_n = (\frac{\mu_{1n}}{r_0})^2$, $R_n(r) = J_0(\frac{\mu_{1n}}{r_0} r)$, $n = 0, 1, 2, \dots$; при этом $\lambda_0 = 0$ — собственное значение, которому соответствует собственная функция $R_0(r) = 1$. Квадрат нормы собственных функций определен формулой (2.46), согласно которой

$$\|R_n\|^2 = \frac{r_0^2}{2} J_0(\mu_{1n}^2), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Функция $U(r, t)$ имеет форму ряда

$$U(r, t) = B_0 + C_0 t + \sum_1^\infty \left(B_n \cos \frac{a\mu_{1n}t}{r_0} + C_n \sin \frac{a\mu_{1n}t}{r_0} \right) R_n(r),$$

коэффициенты которого нужно выбрать так, чтобы были выполнены начальные условия

$$U_0(r) = \sum_0^\infty B_n R_n(r), \quad U_t(r, 0) = C_0 + \sum_1^\infty \frac{a\mu_{1n}}{r_0} C_n R_n(r).$$

Так как $u_t(r, 0) = 0$, то $C_n = 0$, а коэффициенты $B_n = \frac{(U_0, R_n)}{\|R_n\|^2}$.

При $n = 0$ коэффициент $B_0 = -\frac{Ar_0^4}{24a^2}$; при $n > 0$ можно

применить методику, изложенную в примерах 2.2 и 2.8. Поскольку $U_0'(r_0) = 0$, то $U_0(r)$ принадлежит области определения оператора $\mathcal{L}$, поэтому в силу эрмитовости

$$\begin{aligned}(U_0, R_n) &= \frac{1}{\lambda_n}(U_0, \mathcal{L}R_n) = \frac{1}{\lambda_n}(\mathcal{L}U_0, R_n) = \frac{1}{\lambda_n}\left(\frac{Ar^2}{a^2} - \frac{Ar_0^2}{4a^2}, R_n\right) = \\ &= \frac{A}{\lambda_n a^2}(r^2, R_n) - \frac{Ar_0^2}{4\lambda_n a^2}(1, R_n) = \frac{A}{\lambda_n a^2}(r^2, R_n),\end{aligned}$$

где $(1, R_n) = 0$ вследствие ортогональности собственных функций. Пусть

$$\varphi = r^2, \quad \tilde{\varphi} = \varphi \quad \text{при} \quad 0 \leq r \leq r_0, \quad \text{а} \quad \tilde{\varphi}' = \begin{cases} \varphi', & 0 \leq r < r_0, \\ 0, & r = r_0. \end{cases}$$

Тогда

$$\mathcal{L}\tilde{\varphi} = \{\mathcal{L}\tilde{\varphi}\} - 2r_0\delta(r - r_0) = 4 - 2r_0\delta(r - r_0).$$

Следовательно,

$$\begin{aligned}(r^2, R_n) &= (\varphi, R_n) = (\tilde{\varphi}, R_n) = \frac{1}{\lambda_n}(\tilde{\varphi}, \mathcal{L}R_n) = \frac{1}{\lambda_n}(\mathcal{L}\tilde{\varphi}, R_n) = \\ &= \frac{1}{\lambda}(4 - 2r_0\delta(r - r_0), R_n) = -\frac{2r_0^2 J_0(\mu_{1n})}{\lambda_n}.\end{aligned}$$

Таким образом, $B_n = -\frac{4Ar_0^4}{a^2\mu_{1n}^4} J_0(\mu_{1n})$, $n = 1, 2, 3, \dots$, так что решение исходной задачи

$$u(r, t) = \frac{Ar^2}{8a^2}\left(r_0^2 - \frac{r^2}{2}\right) + \frac{Ar_0^2 t^2}{4} - \frac{Ar_0^4}{24a^2} - \frac{4Ar_0^4}{a^2} \sum_1^\infty \frac{J_0\left(\frac{\mu_{1n}}{r_0}r\right) \cos \frac{a\mu_{1n}t}{r_0}}{\mu_{1n}^4 J_0(\mu_{1n})}.$$

Решить задачи 2.646–2.670 со стационарными неоднородностями, преобразуя их в однородные задачи (однородное уравнение, однородные граничные условия) с помощью частного решения уравнения, удовлетворяющего граничным условиям.

2.646. Круглая мембрана, радиус которой r_0 , поддерживается в горизонтальном положении с помощью подставки ($\mathbf{e}_u = \mathbf{e}_g$). В момент $t = 0$ подставку убирают. Решить задачу о движении мембраны под действием силы тяжести, если ее край: 1) закреплен жестко; 2) свободен; 3) закреплен упруго.

2.647. Решить задачу о движении мембраны под действием давления $p_0\eta(r_1 - r)\mathbf{e}_u$, $r_1 \leq r_0$ при нулевых начальных условиях; мембрана закреплена по краю, ее радиус r_0 .

2.648. Мембрана с диском (см. задачу 1.132) расположена в плоскости xOy и находится в состоянии равновесия. Решить задачу о движении мембраны в результате действия с момента $t = 0$ постоянного давления p_0 : 1) на диск; 2) на часть мембраны без диска.

2.649. Мембрана с диском (см. задачу 1.132) находится в поле тяжести ($\mathbf{e}_u = \mathbf{e}_g$) и расположена в плоскости xOy на горизонтальной подставке. В момент $t = 0$ подставку убирают. Решить задачу о движении мембраны.

2.650. Мембрана с диском (см. задачу 1.132) находится в состоянии равновесия под действием сил тяжести ($\mathbf{e}_u = -\mathbf{e}_g$) и силы $F_0\mathbf{e}_u$, приложенной к диску в его центре. В момент $t = 0$ действие силы F_0 прекращается. Решить задачу о движении мембраны.

2.651. Мембрана с диском (см. задачу 1.132) находится в поле тяжести ($\mathbf{e}_u = -\mathbf{e}_g$). Решить задачу о движении мембраны под действием постоянной силы $F_0\mathbf{e}_u$, приложенной к диску в его центре при нулевых начальных условиях.

2.652. Неограниченный цилиндр, радиус которого r_0 , имеет нулевую температуру. С момента $t = 0$ через поверхность цилиндра проходит тепловой поток, плотность которого постоянна и равна $-q_0\mathbf{e}_r$. Решить задачу теплопроводности.

2.653.
$$u_{tt} = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + Ar^2, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t,$$

 $|u(0, t)| < \infty, \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0,$
 1) $u(r_0, t) = 0$; 2) $u_r(r_0, t) + hu(r_0, t) = 0$.

2.654.
$$u_{tt} = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + Ar^4, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t,$$

 $|u(0, t)| < \infty, \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0,$
 1) $u(r_0, t) = 0$; 2) $u_r(r_0, t) = 0$; 3) $u_r(r_0, t) + hu(r_0, t) = 0$.

2.655.
$$u_{tt} = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\nu^2}{r^2} u \right) + Ar^\nu, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t,$$

 $|u(0, t)| < \infty, \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0,$ 1) $u(r_0, t) = 0, \nu \geq 0,$
 2) $u_r(r_0, t) = 0, \nu > 0$; 3) $u_r(r_0, t) + hu(r_0, t) = 0, \nu \geq 0$.

2.656.
$$u_{tt} = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + AJ_0(\beta r), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t,$$

 $|u(0, t)| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = 0, \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$

$$\mathbf{2.657.} \quad u_{tt} = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\nu^2}{r^2} u \right) + A J_\nu(\beta r), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0, \quad 1) u(r_0, t) = 0, \quad \nu \geq 0; \\ 2) u_r(r_0, t) = 0, \quad \nu > 0; \quad 3) u_r(r_0, t) + hu(r_0, t) = 0, \quad \nu \geq 0.$$

$$\mathbf{2.658.} \quad u_{tt} = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + A I_0(\beta r), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = 0, \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$$

$$\mathbf{2.659.} \quad u_{tt} = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\nu^2}{r^2} u \right) + A I_\nu(\beta r), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0, \quad 1) u(r_0, t) = 0, \quad \nu \geq 0; \\ 2) u_r(r_0, t) = 0, \quad \nu > 0; \quad 3) u_r(r_0, t) + hu(r_0, t) = 0, \quad \nu \geq 0.$$

$$\mathbf{2.660.} \quad u_{tt} = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r}, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = A, \quad u(r, 0) = 0.$$

$$\mathbf{2.661.} \quad u_{tt} = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\nu^2}{r^2} u \right), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0, \quad 1) u(r_0, t) = A, \quad \nu \geq 0; \\ 2) u_r(r_0, t) = A, \quad \nu > 0; \quad 3) u_r(r_0, t) + hu(r_0, t) = A, \quad \nu \geq 0.$$

2.662. Начальная температура неограниченного цилиндра, радиус которого r_0 , равна нулю. С момента $t = 0$ в единицу времени в единице объема цилиндра выделяется постоянное количества тепла Q_0 . Решить задачу теплопроводности, если: 1) поверхность цилиндра поддерживается при нулевой температуре; 2) через поверхность цилиндра проходит тепловой поток постоянной плотности $-q_0 \mathbf{e}_r$; 3) на поверхности цилиндра происходит теплообмен по закону Ньютона с внешней средой, температура которой равна нулю.

$$\mathbf{2.663.} \quad u_t = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + A r^2, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u(r, 0) = 0, \\ 1) u(r_0, t) = 0; \quad 2) u_r(r_0, t) = 0; \quad 3) u_r(r_0, t) + hu(r_0, t) = 0.$$

$$\mathbf{2.664.} \quad u_t = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + A r^4, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u(r, 0) = 0, \\ 1) u(r_0, t) = 0; \quad 2) u_r(r_0, t) = 0; \quad 3) u_r(r_0, t) + hu(r_0, t) = 0.$$

$$\mathbf{2.665.} \quad u_t = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\nu^2}{r^2} u \right) + A r^\nu, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u(r, 0) = 0, \quad 1) u(r_0, t) = 0, \quad \nu \geq 0; \\ 2) u_r(r_0, t) = 0, \quad \nu > 0; \quad 3) u_r(r_0, t) + hu(r_0, t) = 0, \quad \nu \geq 0.$$

$$\mathbf{2.666.} \quad u_t = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + A J_0(\beta r), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = 0, \quad u(r, 0) = 0.$$

$$\mathbf{2.667.} \quad u_t = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\nu^2}{r^2} u \right) + A J_\nu(\beta r), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u(r, 0) = 0, \quad 1) u(r_0, t) = 0, \nu \geq 0; \\ 2) u_r(r_0, t) = 0, \nu > 0; \quad 3) u_r(r_0, t) + h u(r_0, t) = 0, \nu \geq 0.$$

$$\mathbf{2.668.} \quad u_t = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + A I_0(\beta r), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = 0, \quad u(r, 0) = 0.$$

$$\mathbf{2.669.} \quad u_t = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\nu^2}{r^2} u \right) + A I_\nu(\beta r), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u(r, 0) = 0, \quad 1) u(r_0, t) = 0, \nu \geq 0; \\ 2) u_r(r_0, t) = 0, \nu > 0; \quad 3) u_r(r_0, t) + h u(r_0, t) = 0, \nu \geq 0.$$

$$\mathbf{2.670.} \quad u_t = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\nu^2}{r^2} u \right), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u(r, 0) = 0, \quad 1) u(r_0, t) = A, \nu \geq 0; \\ 2) u_r(r_0, t) = A, \nu > 0; \quad 3) u_r(r_0, t) + h u(r_0, t) = A, \nu \geq 0.$$

Пример 2.22. В некоторых случаях удается свести неоднородную задачу с нестационарными неоднородностями к однородной, выделив частное решение уравнения, удовлетворяющее граничным условиям (см. пример 2.15). Подобным образом можно решить задачу

$$u_t = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + A t, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u(r_0, t) = u(r, 0) = 0$$

с нестационарной неоднородностью в уравнении.

Решение. Сначала осуществляется переход к задаче со стационарной неоднородностью посредством подстановки $u(r, t) = f(r)t + v(r, t)$. Пусть

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial}{\partial r},$$

$$\mathcal{M}_{\mathcal{L}} = \{R(r) : R \in C^2(0; r_0), |R(0)| < \infty, R(r_0) = 0\}.$$

Функцию $f(r)$ нужно подчинить условиям

$$\mathcal{L}f(r) = \frac{A}{a^2}, \quad 0 < r < r_0, \\ |f(0)| < \infty, \quad f(r_0) = 0,$$

откуда $f(r) = \frac{A}{4a^2}(r_0^2 - r^2)$. Тогда $v(r, t)$ — решение задачи со стационарной неоднородностью:

$$\begin{aligned} v_t + f(r) &= -a^2 \mathcal{L}v, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |v(0, t)| < \infty, \quad v(r_0, t) &= v(r, 0) = 0. \end{aligned}$$

Согласно схеме, изложенной в примере 2.14, решение следует отыскивать в виде суммы $v(r, t) = w(r, t) + h(r)$. Для функции w получается задача для однородного уравнения с однородными граничными условиями (см. пример 2.3)

$$\begin{aligned} w_t &= -a^2 \mathcal{L}w, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |w(0, t)| < \infty, \quad w(r_0, t) &= 0, \quad w(r, 0) = -h(r), \end{aligned}$$

где $h(r)$ выбрана так, что

$$\begin{aligned} \mathcal{L}h &= -\frac{1}{a^2}f(r), \quad 0 < r < r_0, \\ |h(0)| < \infty, \quad h(r_0) &= 0. \end{aligned}$$

Отсюда $h(r) = \frac{A}{64a^4}(4r_0^2r^2 - r^4 - 3r_0^4)$, а функция $w(r, t)$ выражается рядом

$$w(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n R_n(r) e^{-a^2 \lambda_n t},$$

в котором величины $\lambda_n = \left(\frac{\mu_{0n}}{r_0}\right)^2$ — собственные значения, $R_n(r) = J_0(\sqrt{\lambda_n} r)$ — собственные функции оператора $\mathcal{L}$. Из начального условия

$$-h(r) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n R_n(r)$$

следует, что коэффициенты $C_n = -\frac{(h, R_n)}{\|R_n\|^2}$. В силу эрмитовости оператора $\mathcal{L}$

$$\begin{aligned} (h, R_n) &= \frac{1}{\lambda_n}(h, \mathcal{L}R_n) = \frac{1}{\lambda_n}(\mathcal{L}h, R_n) = -\frac{1}{a^2 \lambda_n}(f, R_n) = \\ &= -\frac{1}{a^2 \lambda_n^2}(f, \mathcal{L}R_n) = -\frac{1}{a^2 \lambda_n^2}(\mathcal{L}f, R_n) = -\frac{A}{a^4 \lambda_n^2}(1, R_n) = \\ &= -\frac{A}{a^4 \lambda_n^2} \int_0^{r_0} J_0\left(\frac{\mu_{0n}r}{r_0}\right) r dr = -\frac{Ar_0^2}{a^4 \lambda_n^2 \mu_{0n}^2} \int_0^{\mu_n} J_0(\xi) \xi d\xi = \\ &= -\frac{Ar_0^2}{a^4 \lambda_n^2 \mu_{0n}^2} \int_0^{\mu_n} (J_1(\xi) \xi)' d\xi = -\frac{Ar_0^2}{a^4 \lambda_n^2 \mu_{0n}} J_1(\mu_{0n}). \end{aligned}$$

Таким образом,

$$u(r, t) = \frac{A(r_0^2 - r^2)}{4a^2} \left(t - \frac{3r_0^2 - r^2}{16a^2} \right) + \frac{2Ar_0^4}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n}r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{\mu_{0n}a}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{0n}^4 J_1(\mu_{0n})}.$$

Решить задачи 2.687–2.724, выделив частное решение уравнения, удовлетворяющее граничным условиям.

2.671. На единицу площади круглой мембраны действует сила $F_0 J_0\left(\frac{\mu_{0n}r}{r_0}\right) \cos \omega t \mathbf{e}_u$, где $\mu_{0n} > 0$ — нуль функции $J_0(\mu)$. Решить задачу о движении мембраны, если ее радиус r_0 , край закреплен, начальные условия нулевые.

2.672. На круглую мембрану действует сила, поверхностная плотность которой $F_0 J_0\left(\frac{\mu_{1n}r}{r_0}\right) \sin \omega t \mathbf{e}_u$, где $\mu_{1n} > 0$ — нуль функции $J_1(\mu)$. Решить задачу о движении мембраны, если ее радиус r_0 , край свободен, начальные условия нулевые.

2.673. На единицу площади круглой мембраны ($r < r_0$) с закрепленным краем действуют сила упругости, пропорциональная отклонению точки от положения равновесия (коэффициент пропорциональности k известен) и периодическая сила $F_0 J_0\left(\frac{\mu_{0n}r}{r_0}\right) \sin \omega t \mathbf{e}_u$, где $\mu_{0n} > 0$ — нуль функции $J_0(\mu)$. Решить задачу о движении мембраны при нулевых начальных условиях.

2.674. Решить предыдущую задачу для мембраны со свободным краем, на которую действует сила $F_0 J_0\left(\frac{\mu_{1n}r}{r_0}\right) \cos \omega t \mathbf{e}_u$, где $\mu_{1n} > 0$ — нуль функции $J_1(\mu)$; все остальные условия те же.

2.675. На единицу площади круглой мембраны ($r < r_0$) с закрепленным краем действует сила $F_0 J_m\left(\frac{\mu_{mn}r}{r_0}\right) \sin m\varphi \cos \omega t \mathbf{e}_u$, где $\mu_{mn} > 0$ — нуль функции $J_m(\mu)$, $m \in \mathbb{N}$. Решить задачу о движении мембраны при нулевых начальных условиях.

2.676. На единицу площади круглой мембраны ($r < r_0$) со свободным краем действует сила $F_0 J_m\left(\frac{\gamma_{mn}r}{r_0}\right) \cos m\varphi \sin \omega t \mathbf{e}_u$, где $\gamma_{mn} > 0$ — нуль функции $J'_m(\gamma)$, $m \in \mathbb{N}$. Решить задачу о движении мембраны при нулевых начальных условиях.

2.677. Решить задачу 2.675, если на мембрану действует также сила упругости, пропорциональная отклонению точки от положения равновесия (коэффициент пропорциональности k известен).

2.678. Решить задачу 2.676, если на мембрану действует также сила упругости, пропорциональная отклонению точки от положения равновесия (коэффициент пропорциональности k дан).

2.679. В неограниченном цилиндре, радиус которого r_0 , действуют источники тепла, плотность мощности которых $Q_0 J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right) \times e^{-\alpha t}$, $\alpha > 0$, $\mu_{0n} > 0$ — нуль функции $J_0(\mu)$. Решить задачу теплопроводности при нулевой начальной температуре, если температура поверхности $r = r_0$ при любом t равна нулю.

2.680. Решить предыдущую задачу, если плотность источников равна $Q_0 J_0 \left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0} \right) e^{-\alpha t}$, $\alpha > 0$, $\mu_{1n} > 0$ — нуль функции $J_1(\mu)$, а поверхность $r = r_0$ теплоизолирована.

2.681. В неограниченном цилиндре ($r < r_0$), действуют источники газа, плотность мощности которых $Q_0 J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right) e^{-\alpha t}$, $\alpha > 0$, $\mu_{0n} > 0$ — нуль функции $J_0(\mu)$. Диффузия газа сопровождается распадом, пропорциональным концентрации (коэффициент пропорциональности β известен). Решить задачу диффузии, если концентрация газа на поверхности $r = r_0$ равна нулю, а в начальный момент времени $t = 0$ газа в цилиндре не было.

2.682. Решить предыдущую задачу, если плотность источников равна $Q_0 J_0 \left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0} \right) e^{-\alpha t}$, $\alpha > 0$, $\mu_{1n} > 0$ — нуль функции $J_1(\mu)$, а поверхность $r = r_0$ непроницаема для газа.

2.683. В неограниченном цилиндре ($r < r_0$) действуют источники газа, плотность мощности которых $Q_0 J_m \left(\frac{\mu_{mn} r}{r_0} \right) \sin m\varphi e^{-\alpha t}$, $\mu_{mn} > 0$ — нуль функции $J_m(\mu)$, $m \in \mathbb{N}$, $\alpha > 0$. Решить задачу диффузии, если концентрация газа на поверхности $r = r_0$ при любом $t > 0$ равна нулю, а в начальный момент времени $t = 0$ газа в цилиндре не было.

2.684. В неограниченном цилиндре ($r < r_0$) действуют источники газа, плотность мощности которых $Q_0 J_m \left(\frac{\gamma_{mn} r}{r_0} \right) \sin m\varphi e^{-\alpha t}$, $\gamma_{mn} > 0$ — нуль функции $J'_m(\gamma)$, $m \in \mathbb{N}$, $\alpha > 0$. Решить задачу диффузии, если поверхность $r = r_0$ непроницаема для газа, а его начальная концентрация равна нулю.

2.685. Решить задачу 2.683, если диффузия газа сопровождается его распадом, пропорциональным концентрации (коэффициент пропорциональности β известен).

2.686. Решить задачу 2.684 для неустойчивого газа, распад которого пропорционален концентрации (коэффициент пропорциональности β дан).

$$\mathbf{2.687.} \quad u_{tt} = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + Af(r, t), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u(r_0, t) = 0, \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0,$$

где функция $f(r, t)$ равна:

- 1) t ; 2) t^2 ; 3) $r^2 t$; 4) $r^2 t^2$; 5) $e^{-\alpha t}$;
6) $r^2 e^{-\alpha t}$; 7) $J_0(\beta r) t$; 8) $I_0(\beta r) t$; 9) $J_0(\beta r) e^{-\alpha t}$;
10) $I_0(\beta r) e^{-\alpha t}$; 11) $J_0(\beta r) \sin \omega t$; 12) $I_0(\beta r) \sin \omega t$; $\alpha > 0$.

2.688. На круглую мембрану ($r < r_0$) с закрепленным краем действует давление $p_0 \sin \omega t \mathbf{e_u}$; решить задачу о колебаниях мембраны при нулевых начальных условиях.

$$\mathbf{2.689.} \quad u_{tt} = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + Af(r, t), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = 0, \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0,$$

где $f(r, t)$ равна:

- 1) $h(t)$; 2) $r^2 t$; 3) $r^2 t^2$; 4) $r^2 e^{-\alpha t}$; 5) $J_0(\beta r) t$; 6) $I_0(\beta r) t$;
7) $J_0(\beta r) e^{-\alpha t}$; 8) $I_0(\beta r) e^{-\alpha t}$; 9) $J_0(\beta r) \sin \omega t$;
10) $I_0(\beta r) \sin \omega t$; $\alpha > 0$.

$$\mathbf{2.690.} \quad u_{tt} = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + Af(r, t), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u_r(r_0, t) + hu(r_0, t) = 0, \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0,$$

где $f(r, t)$ равна:

- 1) t ; 2) t^2 ; 3) $r^2 t$; 4) $r^2 t^2$; 5) $J_0(\beta r) t$; 6) $I_0(\beta r) t$.

$$\mathbf{2.691.} \quad u_{tt} = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{u}{r^2} \right) + f(r, t), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u_r(r_0, t) + hu(r_0, t) = 0, \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0,$$

где функция $f(r, t)$ равна:

- 1) Art ; 2) Art^2 .

$$\mathbf{2.692.} \quad u_{tt} = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\nu^2}{r^2} u \right) + f(r, t), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u(r_0, t) = 0, \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0,$$

где $f(r, t)$ равна:

- 1) $Ar^\nu t$; 2) $Ar^\nu t^2$; 3) $Ar^\nu e^{-\alpha t}$; 4) $AJ_\nu(\beta r) t$; 5) $AI_\nu(\beta r) t$;
6) $AJ_\nu(\beta r) e^{-\alpha t}$, $\alpha > 0$; 7) $AI_\nu(\beta r) e^{-\alpha t}$, $\alpha > 0$;
8) $Ar^\nu \sin \omega t$; 9) $AJ_\nu(\beta r) \sin \omega t$; 10) $AI_\nu(\beta r) \sin \omega t$.

2.693. $u_{tt} = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\nu^2}{r^2} u \right) + Af(r, t), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t,$
 $|u(0, t)| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = 0, \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0, \quad \nu > 0,$
 $f(r, t)$ равна: 1) $r^\nu t$; 2) $r^\nu t^2$; 3) $r^\nu e^{-\alpha t}$, $\alpha > 0$; 4) $J_\nu(\beta r)t$; 5) $I_\nu(\beta r)t$.

2.694. $u_{tt} = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\nu^2}{r^2} u \right) + f(r, t), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t,$
 $|u(0, t)| < \infty, \quad u_r(r_0, t) + hu(r_0, t) = 0, \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0,$
 где функция $f(r, t)$ равна: 1) $Ar^\nu t$; 2) $Ar^\nu t^2$; $\nu > 0$.

2.695. Однородная тяжелая струна ($0 < x < l$) подвешена в поле тяжести. С момента $t = 0$ точка подвеса $x = 0$ движется вдоль оси Ou по закону $u_0 \sin \omega t$. Решить задачу о колебаниях струны при нулевых начальных условиях.

2.696. $u_{tt} = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r}, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t,$
 $|u(0, t)| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = Af(r, t), \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0,$
 где функция $f(r, t)$ равна: 1) t ; 2) t^2 ; 3) $e^{-\alpha t}$; 4) $\sin \omega t$; $\alpha > 0$.

2.697. $u_{tt} = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r}, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t,$
 $|u(0, t)| < \infty, \quad u_r(r_0, t) + hu(r_0, t) = At^n, \quad u(r, 0) = 0,$
 где n принимает значения 1, 2, 3, 4, 5.

2.698. $u_{tt} = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\nu^2}{r^2} u \right), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \quad \nu > 0,$
 $|u(0, t)| < \infty, \quad u(r_0, t) = Af(r, t), \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0,$
 где функция $f(r, t)$ равна: 1) t ; 2) t^2 ; 3) $e^{-\alpha t}$; 4) $\sin \omega t$; $\alpha > 0$.

2.699. $u_{tt} = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\nu^2}{r^2} u \right), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \quad \nu > 0,$
 $|u(0, t)| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = Af(r, t), \quad u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0,$
 где функция $f(r, t)$ равна: 1) t ; 2) t^2 ; 3) $e^{-\alpha t}$; 4) $\sin \omega t$; $\alpha > 0$.

2.700. $u_{tt} = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\nu^2}{r^2} u \right), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \quad \nu > 0,$
 $|u(0, t)| < \infty, \quad u_r(r_0, t) + hu(r_0, t) = At.$

2.701. $u_{tt} = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \right) + Art^2 \sin \varphi,$
 $0 < r < r_0, \quad 0 < \varphi \leq 2\pi, \quad 0 < t,$
 $|u| < \infty, \quad u(r_0, \varphi, t) = 0, \quad u(r, \varphi, 0) = u_t(r, \varphi, 0) = 0.$

- 2.702.** $u_{tt} = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \right) + A r t \cos \varphi,$
 $0 < r < r_0, \quad 0 < \varphi \leq 2\pi, \quad 0 < t,$
 $|u| < \infty, \quad u_r(r_0, \varphi, t) = A t \cos \varphi, \quad u(r, \varphi, 0) = u_t(r, \varphi, 0) = 0.$
- 2.703.** $u_{tt} = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \right),$
 $0 < r < r_0, \quad 0 < \varphi \leq 2\pi, \quad 0 < t,$
 $|u| < \infty, \quad u(r_0, \varphi, t) = A t \cos \varphi, \quad u(r, \varphi, 0) = u_t(r, \varphi, 0) = 0.$
- 2.704.** $u_{tt} = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \right),$
 $0 < r < r_0, \quad 0 < \varphi \leq 2\pi, \quad 0 < t,$
 $|u| < \infty, \quad u(r_0, \varphi, t) = A t^2 \sin \varphi, \quad u(r, \varphi, 0) = u_t(r, \varphi, 0) = 0.$
- 2.705.** $u_{tt} = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \right),$
 $0 < r < r_0, \quad 0 < \varphi \leq 2\pi, \quad 0 < t,$
 $|u| < \infty, \quad u_r(r_0, \varphi, t) = B t^2 \sin \varphi, \quad u(r, \varphi, 0) = u_t(r, \varphi, 0) = 0.$
- 2.706.** $u_{tt} = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \right),$
 $0 < r < r_0, \quad 0 < \varphi \leq 2\pi, \quad 0 < t,$
 $|u| < \infty, \quad u(r_0, \varphi, t) = A e^{-\alpha t} \cos \varphi, \quad \alpha \geq 0,$
 $u(r, \varphi, 0) = u_t(r, \varphi, 0) = 0.$
- 2.707.** $u_{tt} = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \right),$
 $0 < r < r_0, \quad 0 < \varphi \leq 2\pi, \quad 0 < t,$
 $|u| < \infty, \quad u_r(r_0, \varphi, t) = A t \sin \varphi, \quad u(r, \varphi, 0) = u_t(r, \varphi, 0) = 0.$
- 2.708.** $u_{tt} = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \right),$
 $0 < r < r_0, \quad 0 < \varphi \leq 2\pi, \quad 0 < t,$
 $|u| < \infty, \quad u_r(r_0, \varphi, t) = A t^2 \sin \varphi, \quad u(r, \varphi, 0) = u_t(r, \varphi, 0) = 0.$
- 2.709.** $u_{tt} = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \right),$
 $0 < r < r_0, \quad 0 < \varphi \leq 2\pi, \quad 0 < t,$
 $|u| < \infty, \quad u_r(r_0, \varphi, t) = A e^{-\alpha t} \cos \varphi, \quad \alpha > 0,$
 $u(r, \varphi, 0) = u_t(r, \varphi, 0) = 0.$

$$\begin{aligned} \mathbf{2.710.} \quad u_{tt} &= a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \right) + Atr \cos \varphi, \\ 0 < r < r_0, \quad 0 < \varphi \leq 2\pi, \quad 0 < t, \\ |u| < \infty, \quad u(r_0, \varphi, t) &= u(r, \varphi, 0) = u_t(r, \varphi, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{2.711.} \quad u_{tt} &= a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \right) + Atr \cos \varphi, \\ 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t, \\ |u| < \infty, \quad u_r(r_0, \varphi, t) &= u(r, \varphi, 0) = u_t(r, \varphi, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{2.712.} \quad \sqrt{x} u_{tt} &= a^2 \frac{\partial}{\partial x} \sqrt{x} \frac{\partial u}{\partial x} + Ax, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ |u| < \infty, \quad u(l, t) &= 0, \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{2.713.} \quad \sqrt{x} u_{tt} &= a^2 \frac{\partial}{\partial x} \sqrt{x} \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ |u| < \infty, \quad u(l, t) &= Ae^{-\alpha t}, \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{2.714.} \quad u_t &= a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + Af(r, t), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u(r_0, t) &= 0, \quad u(r, 0) = 0, \end{aligned}$$

где функция $f(r, t)$ равна:

1) t ; 2) t^2 ; 3) $r^2 t$; 4) $r^2 e^{-\alpha t}$; 5) $\sin \omega t$;

6) $J_0\left(\frac{\mu_{0m} r}{r_0}\right) \sin \omega t$; $\alpha > 0$.

$$\begin{aligned} \mathbf{2.715.} \quad u_t &= a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + Af(r, t), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u_r(r_0, t) &= 0, \quad u(r, 0) = 0, \end{aligned}$$

где $f(r, t)$ равна:

1) $h(t)$; 2) $r^2 t$; 3) $J_0(\beta r) t$; 4) $I_0(\beta r) t$;

5) $J_0(\beta r) e^{-\alpha t}$; 6) $I_0(\beta r) e^{-\alpha t}$; $\alpha > 0$.

$$\begin{aligned} \mathbf{2.716.} \quad u_t &= a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + f(r, t), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u_r(r_0, t) + hu(r_0, t) &= 0, \quad u(r, 0) = 0, \end{aligned}$$

где функция $f(r, t)$ равна: 1) At ; 2) $Ar^2 t$.

$$\begin{aligned} \mathbf{2.717.} \quad u_t &= a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + At^2, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \quad hr_0 = 1, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u_r(r_0, t) + hu(r_0, t) &= 0, \quad u(r, 0) = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{2.718.} \quad u_t &= a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{u}{r^2} \right) + Art, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u_r(r_0, t) + hu(r_0, t) &= 0, \quad u(r, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{2.719.} \quad u_t &= a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{4u}{r^2} \right) + Ar^2 t, \quad 0 < r < 1, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u_r(1, t) + u(1, t) &= 0, \quad u(r, 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\mathbf{7.220.} \quad u_t = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\nu^2}{r^2} u \right) + A f(r, t), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u(r_0, t) = 0, \quad u(r, 0) = 0,$$

где функция $f(r, t)$ равна:

$$1) r^\nu t; \quad 2) r^\nu e^{-\alpha t}; \quad 3) J_\nu(\beta r) t; \quad 4) I_\nu(\beta r) t; \\ 5) J_\nu(\beta r) e^{-\alpha t}; \quad 6) I_\nu(\beta r) e^{-\alpha t}; \quad \alpha > 0.$$

$$\mathbf{7.221.} \quad u_t = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\nu^2}{r^2} u \right) + A f(r, t), \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = 0, \quad u(r, 0) = 0,$$

где функция $f(r, t)$ равна: 1) $r^\nu t$; 2) $r^\nu e^{-\alpha t}$; 3) $J_\nu(\beta r) t$; 4) $I_\nu(\beta r) t$;

7.222. Температура поверхности бесконечного цилиндра, радиус которого r_0 , — заданная функция времени, равная: 1) At ; 2) At^2 ; 3) $A \sin \omega t$. Какова температура цилиндра при $t > 0$, если при $t = 0$ она равна нулю?

$$\mathbf{7.223.} \quad u_t = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r}, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = f(t), \quad u(r, 0) = 0,$$

где функция $f(t)$ равна: 1) At ; 2) At^2 .

$$\mathbf{7.224.} \quad u_t = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r}, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(0, t)| < \infty, \quad u_r(r_0, t) + h u(r_0, t) = A t^2, \quad u(r, 0) = 0.$$

Пример 2.23. Температура боковой поверхности цилиндра $\{r, \varphi, z: r < r_0, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 < z < l\}$ равна $f(\varphi, z)$, где $f(\varphi + 2\pi) = f(\varphi)$, а оснований равна нулю. Решить стационарную задачу теплопроводности. Найти решение в частном случае $f(\varphi, z) = u_0 \cos 3\varphi$.

Решение. Чтобы найти температуру $u(r, \varphi, z)$, предстоит решить задачу Дирихле

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < z < l, \\ u(r, \varphi, 0) = u(r, \varphi, l) = 0, \\ |u| < \infty, \quad u(r_0, \varphi, z) = f(\varphi, z).$$

Если существует решения уравнения $\Delta u = 0$ в виде произведения $u(r, \varphi, z) = R(r)v(\varphi, z)$, то соотношение

$$\frac{\frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{dR}{dr}}{R} + \frac{\frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}}{v} = 0$$

должно выполняться тождественно. Продолжая процедуру разделения переменных, следует представить в форме произведения

функцию $v(\varphi, z) = \Phi(\varphi)Z(z)$, подстановка которой в тождество преобразует его к виду

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} r \frac{dR}{dr} + \frac{1}{r^2} \frac{\Phi''}{\Phi} + \frac{Z''}{Z} = 0.$$

Отсюда следуют задачи на собственные значения:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \Phi'' + \mu\Phi = 0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 2) \quad Z'' + \lambda Z = 0, \\ & \Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi); \quad Z(0) = Z(l) = 0, \end{aligned}$$

решения которых

$$\text{при } \mu = m^2: \quad \Phi_m(\varphi) = A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi, \quad m = 0, 1, 2, \dots,$$

$$\text{при } \lambda_n = \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2: \quad Z_n(z) = \sin \frac{\pi n z}{l}, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

и модифицированное уравнение Бесселя

$$R'' + \frac{1}{r}R' - \left(\left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 - \frac{m^2}{r^2}\right)R = 0,$$

ограниченное решение которого

$$R_{mn}(r) = I_m\left(\frac{\pi n r}{l}\right).$$

Итак, найдены частные решения $u_{mn}(r, \varphi, z) = R_{mn}(r)\Phi_m(\varphi)Z_n(z)$ уравнения Лапласа, удовлетворяющие граничным условиям при $z = 0$ и $z = l$ и условию периодичности по φ , а также построена система ортогональных функций $v(\varphi, z) = \Phi_m(\varphi)Z_n(z)$. Решение поставленной задачи имеет форму ряда

$$\begin{aligned} \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} u_{mn}(r, \varphi, z) &= \\ &= \sum_{m=0, n=1}^{\infty} I_m\left(\frac{\pi n r}{l}\right) (A_{mn} \cos m\varphi + B_{mn} \sin m\varphi) \sin \frac{\pi n z}{l}, \end{aligned}$$

коэффициенты которого нужно выбрать так, чтобы при $r = r_0$

$$f(\varphi, z) = \sum_{m=0, n=1}^{\infty} I_m\left(\frac{\pi n r_0}{l}\right) (A_{mn} \cos m\varphi + B_{mn} \sin m\varphi) \sin \frac{\pi n z}{l}.$$

Отсюда следует, что

$$A_{mn} \frac{\pi l}{2} (1 + \delta_{m0}) I_m \left(\frac{\pi n r_0}{l} \right) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^l dz f(\varphi, z) \cos m\varphi \sin \frac{\pi n z}{l},$$

$$B_{mn} \frac{\pi l}{2} I_m \left(\frac{\pi n r_0}{l} \right) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^l dz f(\varphi, z) \sin m\varphi \sin \frac{\pi n z}{l}.$$

В частном случае в силу ортогональности функций $\cos m\varphi$, $\sin m\varphi$ все коэффициенты $B_{mn} = 0$, а коэффициенты A_{mn} отличны от нуля только при $m = 3$:

$$A_{3n} I_3 \left(\frac{\pi n r_0}{l} \right) \frac{\pi l}{2} = \pi \int_0^l u_0 \sin \frac{\pi n z}{l} dz = \frac{u_0 l}{n} (1 - (-1)^n).$$

Решение задачи

$$u(r, \varphi, z) = \frac{4u_0}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{I_3 \left(\frac{(2k+1)\pi r}{l} \right) \sin \frac{(2k+1)\pi z}{l}}{I_3 \left(\frac{(2k+1)\pi r_0}{l} \right) (2k+1)} \cos 3\varphi.$$

В задачах 2.725–2.740 определить стационарное распределение температуры или стационарную концентрацию газа в процессе диффузии.

2.725. Боковая поверхность $r = r_0$ ограниченного цилиндра ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z < l$) поддерживается при температуре $u_0 \sin \frac{2\pi z}{l} \cos \varphi$, а температура оснований равна нулю.

2.726. Дан цилиндр ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z < l$) с теплоизолированными основаниями, боковая поверхность которого поддерживается при температуре $u_0 \cos^2 \frac{\pi z}{l} \sin \varphi$.

2.727. Через боковую поверхность $r = r_0$ конечного цилиндра ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z < l$) с непроницаемыми основаниями проходит поток частиц, плотность которого $q_0 \cos^2 \frac{\pi z}{2l} \cos 2\varphi \mathbf{e}_r$.

2.728. Боковая поверхность $r = r_0$ ограниченного цилиндра ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $|z| < l$) поддерживается при температуре $u_0 \left(1 - \frac{|z|}{l}\right)$, а основания $z = \pm l$ — при нулевой температуре.

2.729. Через боковую поверхность $r = r_0$ ограниченного цилиндра ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $-l < z < l$) проходит тепловой поток, плотность которого $\mathbf{q}_0 = -q_0 \mathbf{e}_r$, а основания $z = -l$ и $z = l$ поддерживаются при температуре $-u_0$ и u_0 соответственно.

2.730. Основания цилиндра ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $-l < z < l$) теплоизолированы, а температура боковой поверхности равна $f(z) \sin \varphi$, где $f(z) = u_1$ при $z < 0$ и $f(z) = u_2$ при $z > 0$.

2.731. В цилиндре ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z < l$) температура основания $z = 0$ равна нулю, а боковой поверхности — $u_0 z/l$; через основание $z = l$ происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой равна нулю.

2.732. Температура боковой поверхность $r = r_0$ ограниченного цилиндра ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z < l$) равна $u_0 \cos \varphi \cos \pi z/l$, основание $z = l$ теплоизолировано, а через основание $z = 0$ проходит тепловой поток, плотность которого $q_0 \mathbf{e}_z$.

2.733. Основания цилиндра ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z < l$) поддерживаются при нулевой температуре, а на поверхности $r = r_0$ происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой u_0 .

2.734. В цилиндре $\{r, \varphi, z: r < r_0, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 < z < l\}$ действуют источники тепла, плотность мощности которых Q_0 . Через поверхность цилиндра проходит тепловой поток, плотность которого $-q_1 \frac{r}{r_0} \cos \varphi \mathbf{e}_z$ при $z = 0$, $q_2 \mathbf{e}_r$ при $r = r_0$, а основание $z = l$ теплоизолировано.

2.735. Диффузия неустойчивого газа в цилиндре $\{r, \varphi, z: r < r_0, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 < z < l\}$ сопровождается распадом, пропорциональным концентрации газа (коэффициент пропорциональности α известен); концентрация газа на основаниях цилиндра равна нулю, а на боковой поверхности u_0 .

2.736. Через бесконечную пластину ($-l < z < l$) проходит проводник с током, с единицы длины которого выделяется тепловая мощность q_0 . Температура поверхностей $z = -l$ и $z = l$ равна нулю; проводник представляет собой круглый цилиндр, радиус которого r_0 , ось перпендикулярна к граням пластины.

2.737. В неограниченной пластине ($-\infty < x, y < \infty, |z| < l$) просверлен цилиндрический канал, радиус которого r_0 , ось перпендикулярна граням пластины. Температура поверхностей $z = -l$

и $z = -l$ равна нулю, а температура стенки канала равна $u_0 \cos 2\varphi$.

2.738. В неограниченной пластине с цилиндрическим каналом (см. предыдущую задачу) поверхности $z = -l$ и $z = -l$ теплоизолированы, а температура поверхности канала равна $u_0 \cos^2 \varphi \cos^2 \frac{\pi z}{l}$.

2.739. Поверхности $z = -l$ и $z = -l$ неограниченной пластины с цилиндрическим каналом (см. задачу 2.737) поддерживаются при нулевой температуре, а через стенку канала происходит теплообмен по закону Ньютона с внешней средой, температура которой равна u_0 .

2.740. Через поверхность $r = r_2$ тороида $\{r, \varphi, z: r_1 < r < r_2, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 < z < l\}$ проходит радиальный тепловой поток, плотность которого $\mathbf{q}_0 = -q_0 \mathbf{e}_r$, а остальная поверхность имеет нулевую температуру.

Пример 2.24. В цилиндре ($r < r_0, 0 \leq \varphi < 2\pi, 0 < z < l$) действуют источники, выделяющие тепловую мощность Q_0 в единице объема. Найти стационарную температуру цилиндра, если через основание $z = 0$ происходит теплообмен по закону Ньютона с внешней средой, температура которой равна нулю, основание $z = l$ теплоизолировано, а боковая поверхность имеет температуру $u_0 \cos 2\varphi$.

Решение. Стационарное распределение температуры описывается следующими уравнениями:

$$\Delta u + Q_0/k = 0,$$

$$(u_z - hu)|_{z=0} = 0, \quad u_z|_{z=l} = 0, \quad u|_{r=r_0} = u_0 \cos 2\varphi.$$

Эта задача с неоднородным условием при $r = r_0$ сводится к двум посредством замены $u(r, \varphi, z) = v(r, \varphi, z) + w(r, \varphi, z)$:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \Delta v = -\frac{Q_0}{k}, \\ & 0 < r < r_0, 0 \leq \varphi < 2\pi, 0 < z < l, \\ & (v_z - hv)|_{z=0} = 0, \\ & v_z|_{z=l} = 0, v|_{r=r_0} = 0, \\ & \Delta w = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad & 0 < r < r_0, 0 \leq \varphi < 2\pi, 0 < z < l, \\ & (w_z - hw)|_{z=0} = 0, \\ & w_z|_{z=l} = 0, w|_{r=r_0} = u_0 \cos 2\varphi. \end{aligned}$$

Уравнение для $v(r, \varphi, z)$ можно преобразовать в однородное, полагая $v(r, \varphi, z) = V(r, \varphi, z) + f(r)$, где

$$\frac{1}{r} \frac{df}{dr} = -\frac{Q_0}{k}, \quad 0 < r < r_0, \quad |f| < \infty, \quad f(r_0) = 0,$$

откуда $f(r) = \frac{Q_0}{4k}(r_0^2 - r^2)$. Для функции V формируется задача

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial V}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} &= 0, \\ (V_z - hV)|_{z=0} &= hf(r), \\ V_z|_{z=l} = 0, \quad V|_{r=r_0} &= 0. \end{aligned}$$

Из граничных условий следует, что функция V не зависит от φ , а конструкция граничных условий такова, что задачу можно решать методом Фурье без дополнительных преобразований. Если $V(r, z) = R(r)Z(z)$, то из тождества

$$\frac{\frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{dR}{dr}}{R} + \frac{Z''}{Z} \equiv 0$$

и из условий $|R(r)| < \infty$, $R(r_0) = 0$ следуют задача Штурма–Лиувилля

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{dR}{dr} + \lambda R &= 0, \quad 0 < r < r_0, \\ |R(r)| < \infty, \quad R(r_0) &= 0 \end{aligned}$$

и уравнение $Z'' - \lambda Z = 0$. Таким образом, собственные значения $\lambda_n = (\frac{\mu_n}{r_0})^2$, где $\mu_n > 0$ — нули функции $J_0(\mu)$; собственные функции $R_n(r) = J_0(\frac{\mu_n r}{r_0})$ и $Z_n(z) = A_n \operatorname{ch} \frac{\mu_n}{r_0}(l - z) + B_n \operatorname{sh} \frac{\mu_n r}{r_0}(l - z)$. Следовательно, функция $V(r, z)$ имеет форму ряда

$$V(r, z) = \sum_1^\infty \left(A_n \operatorname{ch} \frac{\mu_n}{r_0}(l - z) + B_n \operatorname{sh} \frac{\mu_n r}{r_0}(l - z) \right) R_n(r),$$

коэффициенты которого определяются из условий

$$V_z|_{z=l} = 0 \implies -\sum_1^\infty \frac{\mu_n}{r_0} B_n R_n(r) = 0 \implies B_n = 0,$$

$$(V_z - hV)|_{z=0} = 0 \implies -\sum_1^\infty A_n \left(\frac{\mu_n}{r_0} \operatorname{sh} \frac{\mu_n l}{r_0} + h \operatorname{ch} \frac{\mu_n l}{r_0} \right) R_n(r) = f(r),$$

откуда

$$A_n = - \frac{r_0(f, R_n)}{\mu_n \operatorname{sh} \frac{\mu_n l}{r_0} + h r_0 \operatorname{ch} \frac{\mu_n l}{r_0}} = - \frac{2Q_0 r_0^3}{k \mu_n^3 (\mu_n \operatorname{sh} \frac{\mu_n l}{r_0} + h r_0 \operatorname{ch} \frac{\mu_n l}{r_0}) J_1(\mu_n)}.$$

Вычисление интеграла (f, R_n) и квадрата нормы собственной функции $R_n(r)$ проведены в решении задачи 2.580, а также в примере 2.20.

Для решения второй задачи также применим метод Фурье. Замена $w(r, z, \varphi) = R(r)Z(z) \cos 2\varphi$ преобразует уравнение в тождество

$$\frac{1}{R} \left(\frac{d}{dr} r \frac{dR}{dr} - \frac{4R}{r^2} \right) + \frac{Z''}{Z} = 0,$$

которое вместе с граничными условиями определяет задачу на собственные значения

$$Z'' + \lambda Z = 0, \quad 0 < z < l, \quad (2.54)$$

$$Z'(0) - hZ(0) = 0, \quad Z'(l) = 0 \quad (2.55)$$

и модифицированное уравнение Бесселя

$$R'' + \frac{1}{r} R' - \left(\lambda + \frac{4}{r^2} \right) R = 0. \quad (2.56)$$

Функция $Z(z) = A \cos \sqrt{\lambda}(l - z) + B \sin \sqrt{\lambda}(l - z)$, являющаяся общим решением уравнения (2.54), удовлетворяет граничным условиям (2.55), если $B = 0$ и $\sqrt{\lambda} \sin \sqrt{\lambda} l - h \cos \sqrt{\lambda} l = 0$. Следовательно,

$$\lambda_n = \left(\frac{\mu_n}{l} \right)^2, \quad Z_n(z) = \cos \mu_n \left(1 - \frac{z}{l} \right), \quad n \in \mathbb{N},$$

где $\mu_n > 0$ — корни уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$, $p = hl$. Общее решение уравнения (2.56) $R_n(r) = A_n I_2 \left(\frac{\mu_n}{l} r \right) + B_n K_2 \left(\frac{\mu_n}{l} r \right)$ содержит неограниченное слагаемое $B_n K_2 \left(\frac{\mu_n}{l} r \right)$, которое не должно входить в решение $w(r, \varphi, z)$, поэтому $B_n = 0$. Таким образом,

$$w(r, \varphi, z) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n I_2 \left(\frac{\mu_n}{l} r \right) Z_n(z).$$

При $r = r_0$

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n I_2 \left(\frac{\mu_n}{l} r_0 \right) Z_n(z) = u_0,$$

откуда

$$A_n = \frac{u_0}{I_2\left(\frac{\mu_n r_0}{l}\right) \|Z_n\|^2} \int_0^l Z_n(z) dz.$$

После вычисления интеграла и квадрата нормы (см. пример 2.20 и формулу (2.98)) получается следующий результат:

$$\begin{aligned} u(r, \varphi, z) = & \frac{Q}{4k}(r_0^2 - r^2) - \frac{2Q_0 r_0^3}{k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_n r}{r_0}\right) \operatorname{ch} \frac{\mu_n}{r_0}(l-z)}{\mu_n^3 \left(\mu_n \operatorname{sh} \frac{\mu_n l}{r_0} + h r_0 \operatorname{ch} \frac{\mu_n l}{r_0}\right) J_1(\mu_n)} + \\ & + 2p u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} I_2\left(\frac{\mu_n r}{l}\right)}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p) I_2\left(\frac{\mu_n}{l} r_0\right)} \cos \mu_n \left(1 - \frac{z}{l}\right) \cos 2\varphi. \end{aligned}$$

В задачах 2.741–2.754 определить стационарное распределение температуры или стационарную концентрацию газа в процессе диффузии.

2.741. Температура поверхности однородного ограниченного цилиндра $\{r, \varphi, z: r < r_0, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 < z < l\}$ равна: нулю при $z = 0$, u_0 при $z = l$, $u_1 \sin \varphi$ при $r = r_0$.

2.742. Температура боковой поверхности $r = r_0$ ограниченного цилиндра $\{r, \varphi, z: r < r_0, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 < z < l\}$ равна $u_1 \cos 2\varphi$, а оснований $z = 0$ и $z = l$ — нулю и $u_0 \frac{r}{r_0} \sin \varphi$ соответственно.

2.743. Температура поверхности ограниченного цилиндра $\{r, \varphi, z: r < r_0, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 < z < l\}$ равна: нулю при $z = 0$, $u_0 \cos 2\varphi$ — при $z = l$, $u_1 \sin 2\varphi \sin \frac{\pi z}{l}$ при $r = r_0$.

2.744. Температура поверхности ограниченного цилиндра $\{r, \varphi, z: r < r_0, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 < z < l\}$ равна: нулю при $z = 0$, $u_0 \frac{r}{r_0} \sin \varphi$ — при $z = l$, $u_1 \sin \frac{3\pi z}{l}$ при $r = r_0$.

2.745. Температура поверхности ограниченного цилиндра $\{r, \varphi, z: r < r_0, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, -l < z < l\}$ равна: нулю при $z = l$, $u_0 \frac{r^2}{r_0^2}$ при $z = -l$, $u_1 \left(1 - \frac{|z|}{l}\right) \cos \varphi$ при $r = r_0$.

2.746. В цилиндре $\{r, \varphi, z: r < r_0, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 < z < l\}$ действуют источники тепла, мощность которых в единице объема Q_0 . Через поверхность цилиндра проходит тепловой поток, плотность

которого: $-q_1 \frac{r^2}{r_0^2} \mathbf{e}_z$ при $z = 0$, $q_2 \cos \varphi \mathbf{e}_r$ при $r = r_0$, а основание $z = l$ теплоизолировано.

2.747. В цилиндре $\{r, \varphi, z: r < r_0, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 < z < l\}$ действуют источники тепла, мощность которых в единице объема Q_0 . Через основание $z = l$ цилиндра проходит тепловой поток, плотность которого $q_0 \mathbf{e}_z$, основание $z = 0$ теплоизолировано, а температура боковой поверхности равна $u_0 \sin \varphi \sin^2 \frac{\pi z}{l}$.

2.748. В цилиндре $\{r, \varphi, z: r < r_0, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 < z < l\}$ действуют источники тепла, мощность которых в единице объема Q_0 . Через основание $z = 0$ проходит тепловой поток, плотность которого $q_1 \frac{r}{r_0} \cos \varphi \mathbf{e}_z$, температура основания $z = l$ равна нулю, температура боковой поверхности u_1 .

2.749. В цилиндре $\{r, \varphi, z: r < r_0, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, -l < z < l\}$ действуют источники тепла, мощность которых в единице объема равна $Q_0 \frac{r}{r_0} \cos \varphi$. Через основание $z = -l$ проходит тепловой поток, плотность которого $q_0 \mathbf{e}_z$, основание $z = l$ теплоизолировано, температура боковой поверхности равна $u_0 \sin^2 \frac{\pi z}{2l}$.

2.750. В цилиндре $\{r, \varphi, z: r < r_0, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 < z < l\}$ действуют источники газа, мощность которых в единице объема Q_0 . Диффузия газа сопровождается распадом, пропорциональным концентрации (коэффициент пропорциональности α известен). Основание $z = l$ непроницаемо для газа, а его концентрация при $z = 0$ и при $r = r_0$ соответственно равна u_0 и u_1 .

2.751. Температура поверхностей $z = -l$ и $z = l$ слоя с цилиндрическим каналом $\{r, \varphi, z: r_0 < r, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, -l < z < l\}$ равна $-u_0$ и $-u_0$ соответственно, а температура стенки $r = r_0$ канала равна $u_1 \sin \varphi$.

2.752. Поверхность $z = 0$ слоя с цилиндрическим каналом $\{r, \varphi, z: r_0 < r, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 < z < l\}$ теплоизолирована; через поверхность $z = l$ проходит тепловой поток, плотность которого $q_0 \mathbf{e}_z$, температура поверхности $r = r_0$ равна $u_0 \sin 3\varphi$.

2.753. Диффузия неустойчивого газа в слое с цилиндрическим каналом (см. задачу 2.752) сопровождается распадом, пропорциональным концентрации газа (коэффициент пропорциональности α известен). В слое действуют источники газа, мощность которых в единице объема Q_0 , концентрация газа на поверхно-

стях $z = 0$ и $z = l$ равна нулю, поверхность $r = r_0$ — полупроницаемая перегородка, концентрация газа в канале $u_0 \cos \varphi$.

2.754. В слое с цилиндрическим каналом (см. задачу 2.752) действуют источники тепла, расположенные на поверхности $S_1 = \{r, \varphi, z: r = r_1 > r_0, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 < z < l\}$, с единицы площади которой выделяется тепловая мощность q_0 ; температура поверхностей $z = 0$ и $z = l$ равна нулю, а поверхности $r = r_0$ — $u_0 \cos \varphi \sin \frac{2\pi z}{l}$.

2.755. В точке $z_0 \in (0, l)$ оси проводящей заземленной цилиндрической коробки ($r < r_0, 0 \leq \varphi < 2\pi, 0 < z < l$) находится заряд Q . Показать, что потенциал внутри цилиндра

$$u(r, z) = \frac{4Q}{l} \times \\ \times \sum_{n=1}^{\infty} \frac{I_0\left(\frac{\pi n r_0}{l}\right) K_0\left(\frac{\pi n r}{l}\right) - K_0\left(\frac{\pi n r_0}{l}\right) I_0\left(\frac{\pi n r}{l}\right)}{I_0\left(\frac{\pi n r_0}{l}\right)} \sin \frac{\pi n z_0}{l} \sin \frac{\pi n z}{l}.$$

2.756. В пространстве между проводящими заземленными плоскостями $z = 0$ и $z = l$ в точке $(0, 0, z_0)$ находится заряд Q . Показать, что потенциал этой системы

$$u(r, z) = \frac{4Q}{l} \sum_{n=1}^{\infty} K_0\left(\frac{\pi n r}{l}\right) \sin \frac{\pi n z_0}{l} \sin \frac{\pi n z}{l}.$$

2.757. Показать, что в двумерной потенциальной яме

$$U(r) = \begin{cases} 0, & r < r_0, \\ U_0, & r_0 < r, \end{cases}$$

при любом U_0 существует связанное состояние.

2.758. Найти собственные колебания электромагнитного поля в цилиндрическом резонаторе, радиус которого r_0 , высота l .

2.759. Найти собственные колебания электромагнитного поля в секториальном резонаторе ($r < r_0, 0 < \varphi < \alpha < 2\pi, 0 < z < l$).

2.760. В круглом ступенчатом волокне могут распространяться TE - и TM -моды с аксиально симметричным полем; такие моды обозначаются символами TE_{0s} и TM_{0s} , где первый индекс $m = 0$ — азимутальное модовое число, второй индекс s — радиальное модовое число. Найти электромагнитное поле каждой моды и определить частоты отсечки (см. задачу 1.478).

2.761. Для слабонаправляющего ступенчатого волокна решить задачу о распространении электромагнитной волны, поле которой не обладает аксиальной симметрией (см. задачу 1.481).

2.762. Пропускная способность длинных волоконно-оптических линий связи снижается из-за дисперсии (см. задачу 1.480). Межмодовая дисперсия отсутствует в одномодовом режиме работы волновода. Доказать, что в интервале частот

$$0 < \omega < \frac{c\mu_{11}}{r_0\sqrt{n_1^2 - n_2^2}},$$

где μ_{11} — первый положительный нуль функции Бесселя $J_1(\mu)$, ступенчатый круглый волновод пропускает только одну (двукратно вырожденную) моду.

2.763. Моделью плоского волновода ($-\infty < x < \infty$), формирование которого обусловлено диффузионным процессом, может служить градиентный волновод с экспоненциальным профилем показателя преломления

$$n(x) = n_2 \left(1 + \Delta e^{-\frac{|x|}{l}} \right), \quad \Delta = \frac{n_1 - n_2}{n_2} \ll 1.$$

Решить задачу о распространении TE - и TM -мод в таком волноводе и определить частоты отсечки направляемых мод.

2.764. Плоский градиентный волновод ($0 < x$) граничит с воздухом. В результате диффузионного процесса формируется сильно асимметричный показатель преломления, профиль которого описывается функцией

$$n(x) = \begin{cases} n_3, & x < 0, \\ n_2 \left(1 + \Delta e^{-\frac{x}{l}} \right), & x > 0, \end{cases}$$

$$\Delta = \frac{n_1 - n_2}{n_2} \ll 1.$$

При условии, что показатель преломления воздуха $n_3 \ll n_2$, решить задачу о распространении TE - и TM -мод и определить их частоты отсечки.

2.765. Определить плотность переменного тока в круглом цилиндрическом проводнике (задача 1.464). Рассмотреть случаи $pr_0 \ll 1$ и $pr_0 \gg 1$. В приближении $pr_0 \gg 1$ определить среднюю по времени тепловую мощность w , выделяющуюся в единице длины проводника.

2.766. Найти магнитное поле H и амплитуду A_j тока Фуко в цилиндрическом проводнике, находящемся в переменном магнитном поле (задача 1.459). При условии $pr_0 \ll 1$ определить среднюю по времени тепловую мощность w , выделяющуюся в единице длины проводника.

2.767. Проводящий цилиндр (радиус r_0 , $\mu = 1$) находится в поперечном магнитном поле $\mathbf{H}e^{i\omega t}$. Определить установившееся магнитное поле в цилиндре в квазистационарном приближении.

2.768. Получить в диффузионном приближении условие критичности для длинного цилиндрического реактора ($r < r_1$) с полостью ($r < r_0 < r_1$). Условие для плотности потока нейтронов поставить на экстраполированной границе.

2.769. Получить в диффузионном приближении условие критичности для длинного цилиндрического реактора ($r < r_1$), если внутри находится сильный поглотитель («черное» тело) в форме цилиндра, радиус которого $r_0 < r_1$. Условие для плотности потока нейтронов поставить на экстраполированной границе реактора, используя соотношение (1.50).

2.770. В длинный цилиндрический реактор ($r_0 < r < r_1$) введен регулирующий стержень ($r < r_0$), поглощающий нейтроны. Получить в диффузионном приближении условие критичности, если сечения поглощения и рассеяния равны Σ_a^C и σ_s^C в активной зоне, Σ_a^D и σ_s^D в поглотителе. Условие для плотности потока нейтронов поставить на экстраполированной границе.

2.771. Длинный цилиндрический реактор ($r < r_0$) окружен отражателем ($r_0 < r < r_1$), где r_1 — экстраполированный радиус. Получить в диффузионном приближении условие критичности, если сечения поглощения и рассеяния равны Σ_a^C и σ_s^C в активной зоне, Σ_a^R и σ_s^R в отражателе. Условие для плотности потока нейтронов поставить на внешней экстраполированной границе.

2.772. Решить задачу 2.769 для конечного цилиндрического реактора ($r_0 < r < r_1$, $|z| < l$).

2.773. Решить задачу 2.770 для конечного цилиндрического реактора ($r_0 < r < r_1$, $|z| < l$) с регулирующим стержнем ($r < r_0$, $|z| < l$) при условии, что экстраполированная длина $\tilde{l}$ реактора и стержня одна и та же.

2.774. Решить задачу 2.771 для конечного реактора ($r < r_0$, $|z| < l$), окруженного отражателем ($r_0 < r < r_1$, $|z| < l$) при усло-

вии, что экстраполированная длина $\tilde{l}$ реактора и отражателя одна и та же.

Пример 2.25. Решить задачу теплопроводности для трубы ($r_1 < r < r_2$), если температура поверхностей $r = r_1$ и $r = r_2$ равна нулю и $u_0 \cos \varphi$ соответственно; начальная температура равна нулю.

Решение. Температура $u(r, \varphi, t)$ определяется условиями

$$u_t = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \right), \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < t,$$

$$u(r_1, \varphi, t) = 0, \quad u(r_2, \varphi, t) = u_0 \cos \varphi, \quad u(r, \varphi, 0) = 0.$$

Зависимость от φ можно учесть, полагая $u(r, \varphi, t) = v(r, t) \cos \varphi$. Чтобы освободиться от неоднородности в граничных условиях, следует представить функцию $v(r, t)$ в виде суммы $w(r, t) + s(r)$, где $s(r)$ — решение стационарной задачи

$$\mathcal{L}s \equiv - \left(\frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{ds}{dr} - \frac{s}{r^2} \right) = 0, \quad r_1 < r < r_2, \quad s(r_1) = 0, \quad s(r_2) = u_0.$$

Отсюда

$$s(r) = u_0 \frac{r^2 - r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} \frac{r_2}{r}$$

и, следовательно, $w(r, t)$ — решение задачи

$$w_t = -a^2 \mathcal{L}w, \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < t,$$

$$w(r_1, t) = w(r_2, t) = 0, \quad w(r, 0) = -s(r),$$

рассмотренной в примере 2.1. Согласно методу Фурье определение функции $w(r, t) = R(r) T(t)$ сводится к решению уравнения $T' + a^2 \lambda T = 0$ и задачи на собственные значения

$$\mathcal{L}R = \lambda R, \quad r_1 < r < r_2,$$

$$R(r_1) = R(r_2) = 0.$$

Общее решение уравнения $R(r) = AJ_1(\sqrt{\lambda}r) + BY_1(\sqrt{\lambda}r)$ рано нулю при $r = r_{1,2}$, если

$$\begin{cases} AJ_1(\sqrt{\lambda}r_1) + BY_1(\sqrt{\lambda}r_1) = 0, \\ AJ_1(\sqrt{\lambda}r_2) + BY_1(\sqrt{\lambda}r_2) = 0. \end{cases}$$

Условием совместности системы является уравнение

$$Y_1(\mu)J_1(\alpha\mu) - J_1(\mu)Y_1(\alpha\mu) = 0, \quad (2.57)$$

где $\mu = r_2\sqrt{\lambda}$, $\alpha = r_1/r_2$. Пусть $0 < \mu_1 < \mu_2 < \dots$ — корни уравнения (2.57), тогда $\lambda_n = (\mu_n/r_2)^2$,

$$R_n(r) = Y_1(\mu_n)J_1\left(\frac{\mu_n r}{r_2}\right) - J_1(\mu_n)Y_1\left(\frac{\mu_n r}{r_2}\right). \quad (2.58)$$

Квадрат нормы собственной функции

$$\|R_n\|^2 = \frac{r^2}{2} \left[(R'_n(r))^2 + \left(1 - \frac{n^2}{\mu_n^2 r^2}\right) R_n^2(r) \right] \Big|_{r_1}^{r_2}$$

получен так же, как в примере 2.20. Здесь $R_n(r_1) = R_n(r_2) = 0$, поэтому

$$\|R_n\|^2 = \frac{r_2^2}{2} (R'_n(r_2))^2 - \frac{r_1^2}{2} (R'_n(r_1))^2.$$

Значения производных выражаются через вронскиан (при этом используется уравнение (2.57)):

$$\begin{aligned} R'_n(r_2) &= -W[J_1(\mu_n), Y_1(\mu_n)] = -\frac{2}{\pi\mu_n}, \\ R'_n(r_1) &= -\frac{J_1(\mu_n)}{J_1(\alpha\mu_n)} W[J_1(\alpha\mu_n), Y_1(\alpha\mu_n)] = -\frac{2r_2}{\pi r_1 \mu_n} \frac{J_1(\mu_n)}{J_1(\alpha\mu_n)}. \end{aligned}$$

В результате

$$\|R_n\|^2 = \frac{2r_2^2}{\pi^2 \mu_n^2} \frac{J_1^2(\alpha\mu_n) - J_1^2(\mu_n)}{J_1^2(\alpha\mu_n)}.$$

Функция $w(r, t)$ имеет вид ряда

$$w(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n R_n(r) e^{-a_2 \lambda_n t},$$

коэффициенты которого

$$C_n = -\frac{1}{\|R_n\|^2} \int_{r_1}^{r_2} s(r) R_n(r) r dr.$$

Один из способов вычисления интеграла основан на формуле (10.44). Пусть

$$\begin{aligned} \tilde{s}(r) &= \begin{cases} s(r), & r_1 \leq r < r_2, \\ 0, & r = r_2, \end{cases} \\ \tilde{s}'(r) &= s'(r), \quad r \leq r \leq r_2, \end{aligned}$$

тогда (см. формулу (10.40))

$$\mathcal{L}\tilde{s} = \mathcal{L}s - u_0 \delta'(r - r_2) = -u_0 \delta'(r - r_2).$$

Для $f = \tilde{s}(r)$, $u = R_n(r)$ соотношение (10.40) приобретает форму (интеграл по φ , равный 2π , сокращается)

$$\int_{r_1}^{r_2} \tilde{s} \mathcal{L} R_n r dr = \int_{r_1}^{r_2} R_n \mathcal{L} \tilde{s} r dr.$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} \int_{r_1}^{r_2} s R_n r dr &= \int_{r_1}^{r_2} \tilde{s} R_n r dr = \frac{1}{\lambda_n} \int_{r_1}^{r_2} \tilde{s} \mathcal{L} R_n r dr = \frac{1}{\lambda_n} \int_{r_1}^{r_2} R_n \mathcal{L} \tilde{s} r dr = \\ &= -\frac{u_0}{\lambda_n} \int_{r_1}^{r_2} \delta'(r - r_2) R_n r dr = \frac{u_0}{\lambda_n} \left. \frac{r R_n}{dr} \right|_{r=r_2} = \frac{u_0 r_2}{\lambda_n} \left. \frac{dR_n}{dr} \right|_{r=r_2} = \\ &= \frac{u_0 r_2 \sqrt{\lambda_n}}{\lambda_n} R'_n(r_2) = -\frac{2u_0 r_2^2}{\pi \mu_n^2}. \end{aligned}$$

Стандартный способ вычисления интеграла достаточно громоздок. Однако использование условий, которым удовлетворяют функции $s(r)$ и $R_n(r)$, упрощает эту процедуру:

$$\begin{aligned} \int_{r_1}^{r_2} s R_n r dr &= \frac{1}{\lambda_n} \int_{r_1}^{r_2} s \mathcal{L} R_n r dr = \frac{1}{\lambda_n} \left(\int_{r_1}^{r_2} s \frac{d}{dr} r \frac{dR_n}{dr} dr - \int_{r_1}^{r_2} \frac{s R_n}{r} dr \right) = \\ &= \frac{1}{\lambda_n} \left(s r \frac{dR_n}{dr} \Big|_{r_1}^{r_2} - \int_{r_1}^{r_2} \frac{ds}{dr} \frac{dR_n}{dr} r dr - \int_{r_1}^{r_2} \frac{s R_n}{r} dr \right) = \frac{s(r_2) r_2}{\lambda_n} \frac{dR_n}{dr} \Big|_{r_2} - \\ &\quad - \frac{1}{\lambda_n} \left(\frac{ds}{dr} R_n r \Big|_{r_1}^{r_2} + \int_{r_1}^{r_2} \left(\frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{ds}{dr} - \frac{s}{r^2} \right) R_n r dr \right) = \\ &= \frac{u_0 r_2 \sqrt{\lambda_n}}{\lambda_n} R'_n(r_2) = -\frac{2u_0 r_2^2}{\pi \mu_n^2}. \end{aligned}$$

Итак, $u(r, \varphi, t) = v(r, t) \cos \varphi$, где

$$v(r, t) = u_0 \left[\frac{r^2 + r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} \frac{r_2}{r} + \pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1^2(\alpha \mu_n) R_n(r)}{J_1^2(\alpha \mu_n) - J_1^2(\mu_n)} e^{-\left(\frac{\alpha \mu_n}{r_2}\right)^2 t} \right].$$

2.775. На упругий клиновидный стержень с прямоугольным поперечным сечением (рис. 1.12) действует сжимающая сила $F \mathbf{e}_x$ (рис. 2.5, а). Найти критическую величину силы (см. задачу 2.12), если: 1) $l_2 = \text{const}$ (рис. 2.5, б); 2) $l_1 = \text{const}$ (рис. 2.5, в); l — длина стержня (усеченный клин), l_0 — длина полного клина.




Рис. 2.5

2.776. Определить частоты и амплитуды собственных колебаний кольцевой мембраны ($r_1 < r < r_2$) с закрепленной границей.

2.777. Мембрана в форме сектора ($r_1 < r < r_2$, $0 < \varphi < \varphi_0 < 2\pi$) закреплена по краю. Определить частоты и амплитуды собственных колебаний мембраны.

2.778. В бесконечно глубоком бассейне, ограниченном двумя вертикальными коаксиальными цилиндрами, радиусы которых r_1 (внутренний) и r_2 (внешний), находится идеальная несжимаемая жидкость. Определить частоты гравитационных волн малой амплитуды, возникающих в результате внешнего воздействия на поверхность.

2.779. Решить задачу 2.36 для канала ($0 < x < l$) с прямоугольным поперечным сечением, ширина d и глубина h которого заданы:

$$1) \quad d(x) = d_1 + \frac{d_2 - d_1}{l}x, \quad 2) \quad d(x) = d_0, \\ h(x) = h_0; \quad h(x) = h_1 + \frac{h_2 - h_1}{l}x.$$

2.780. Тяжелая однородная струна ($0 < x < l$) с шариком на конце $x = l$ подвешена в точке $x = 0$. Найти собственные частоты колебаний струны относительно вертикального положения равновесия, если масса шарика m .

2.781. Определить волновые функции и уровни энергии стационарных состояний частицы, масса которой M , находящейся в двумерной потенциальной яме

$$U(r) = \begin{cases} 0, & r \in (r_1, r_2), \\ \infty, & r \notin [r_1, r_2]. \end{cases}$$

2.782. Решить задачу о распространении TEM -, TE -, TM -волн в пространстве между двумя идеально проводящими коаксиальными цилиндрами, радиусы которых r_1 и $r_2 > r_1$.

2.783. Пространство между двумя коаксиальными цилиндрами, радиусы которых r_1 и $r_2 > r_1$, заполнено вязкой несжимаемой жидкостью. Внешний цилиндр неподвижен, а внутренний вращается вокруг своей оси с постоянной угловой скоростью ω . После того, как движение жидкости установилось, внутренний цилиндр мгновенно останавливается. Найти скорость жидкости в предположении, что элемент жидкости у стенки и стенка имеют одинаковую скорость.

2.784. Кольцевая мембрана ($r_1 < r < r_2$) с закрепленным краем находится в равновесии под действием постоянного давления $p_0 \mathbf{e}_u$. В момент времени $t = 0$ давление становится равным нулю. Решить задачу о колебаниях мембраны.

2.785. Кольцевая мембрана ($r_1 < r < r_2$) с закрепленным краем находится в горизонтальном положении. Решить задачу о колебаниях мембраны под действием силы тяжести при нулевых начальных условиях.

2.786. Горизонтальный пласт с непроницаемыми основаниями имеет форму плоской линзы, радиус которой r_2 , толщины H . Пласт заполнен малосжимаемой жидкостью, давление в которой P_0 . В центре линзы пробурили скважину, радиус которой $r_1 < r_2$. Найти расход жидкости (поток скорости) через поверхность скважины при установившейся изотермической фильтрации, если давление в скважине $P_1 < P_0$, давление вне пласта P_0 .

2.787. Решить задачу (в одномерном приближении) о движении клиновидного стержня ($0 < x < l$) с закрепленным торцом $x = 0$

под действием постоянной силы $F_0 \mathbf{e}_x$, приложенной с момента времени $t = 0$ к торцу $x = l$, площадь которого S_0 (рис. 1.3), при нулевых начальных условиях.

2.788. Упругий клиновидный стержень ($0 < x < l$), расположенный на гладкой горизонтальной поверхности (рис. 1.3), получает импульс I в результате продольного удара в торец $x = 0$, площадь которого S_0 . Решить в одномерном приближении задачу о движении стержня.

2.789. Струна ($0 < x < l$) с шариком на конце $x = l$ подвешена в поле тяжести ($\mathbf{e}_x = \mathbf{e}_g$) и находится в покое. В результате горизонтального удара в момент времени $t = 0$ шарик, масса которого m , приобретает скорость v_0 . Решить задачу о колебаниях струны.

2.790. Однородная струна ($0 < x < l$) с шариком на конце $x = l$ подвешена в поле тяжести ($\mathbf{e}_x = \mathbf{e}_g$) и находится в равновесии под действием горизонтальной силы F_0 , приложенной к шарiku, масса которого m . Решить задачу о движении струны после прекращения действия силы.

2.791. Решить задачу о движении струны с шариком на конце (описание в задаче 2.789), если ее начальная скорость равна нулю, а начальное отклонение $u_0 x/l$.

2.792. Решить задачу о движении струны с шариком на конце (описание в задаче 2.789) под действием горизонтальной силы F_0 , приложенной к шарiku с момента $t = 0$; начальные условия нулевые.

2.793. Определить температуру трубы ($r_1 < r < r_2$), внешняя поверхность которой теплоизолирована, внутренняя имеет нулевую температуру, а начальная температура равна u_0 .

2.794. Через внутреннюю поверхность трубы ($r_1 < r < r_2$) проходит радиальный тепловой поток, плотность которого q_0 , а внешняя поверхность имеет нулевую температуру. Какова температура трубы при $t > 0$, если начальная температура равна нулю?

2.795. Горизонтальный пласт имеет форму плоской линзы, радиус которой r_2 ; в центре пласта пробита скважина, радиус которой $r_1 < r_2$. Пласт заполнен газом, начальное давление которого в пласте равно P_0 , давление на поверхности $r = r_1$ равно P_1 , а остальная поверхность пласта непроницаема для газа. Обычно $P_0 \gg P_1$ и в коэффициенте при лапласиане в уравнении

фильтрации (1.106) полагают $P = P_0$. Решить линеаризованную задачу фильтрации.

2.796. Определить стационарную температуру полуограниченной трубы ($r_1 < r < r_2$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z$), если через торец $z = 0$ происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой постоянна и равна u_0 , а остальная поверхность поддерживается при нулевой температуре.

2.797. Определить стационарную температуру полубесконечной трубы ($r_1 < r < r_2$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z$), внутренняя поверхность которой теплоизолирована, внешняя имеет нулевую температуру, а через торец $z = 0$ внутрь трубы поступает тепловой поток, плотность которого q_0 .

2.798. Определить стационарную температуру толстостенной трубы ($r_1 < r < r_2$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z < l$), поверхность $r = r_2$ которой теплоизолирована, температура торца $z = 0$ постоянна и равна u_0 , а остальная поверхность имеет нулевую температуру.

2.799. Торец $z = 0$ трубы ($r_1 < r < r_2$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z < l$) имеет температуру

$$u(r, 0) = \begin{cases} u_0, & r_1 < r < r_0, \\ 0, & r_0 < r < r_2, \end{cases}$$

а остальная поверхность теплоизолирована. Определить стационарную температуру трубы.

2.800. Упругая круглая пластинка, радиус которой r_0 , толщина h , закреплена по краю и находится в статическом равновесии под действием силы $F_0 \mathbf{e}_u$, приложенной в центре пластинки. Решить задачу о движении пластинки после прекращения действия силы.

2.801. Упругая круглая пластинка, радиус которой r_0 , толщина h , закреплена по краю. Пластинка получает импульс $I \mathbf{e}_u$ в результате удара в ее центр. Определить движение пластинки при нулевых начальных условиях.

2.802. Решить задачу о движении упругой круглой пластинки (радиус r_0 , толщина h) с закрепленным краем под действием силы $F_0 \mathbf{e}_u$, приложенной к центру пластинки с момента времени $t = 0$; начальные условия нулевые.

2.803. Закрепленная по краю круглая пластинка, радиус которой r_0 , толщина h , расположена на горизонтальной подставке.

В момент $t = 0$ подставку убирают. Решить задачу о движении пластинки под действием силы тяжести при нулевых начальных условиях.

2.804. Упругая круглая пластинка, радиус которой r_0 , толщина h , закреплена по краю. Решить задачу о колебаниях пластинки под действием силы, поверхностная плотность которой равна $F_0 \sin \omega t \mathbf{e}_u$. Начальные условия нулевые, резонанс отсутствует. Решение представить в виде суммы вынужденных и свободных колебаний.

2.805. Решить задачу о колебаниях круглой пластинки

$$\begin{aligned} u_{tt} + a^2 \Delta^2 u &= 0, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(r, t)| < \infty, \quad u(r_0, t) &= A \sin \omega t, \quad u_r(r_0, t) = 0, \\ u(r, 0) &= u_t(r, 0) = 0 \end{aligned}$$

при условии, что частота ω не совпадает ни с одной из собственных частот пластинки. Решение представить в виде суммы вынужденных и собственных колебаний.

2.806. Решить задачу о колебаниях круглой пластинки при отсутствии резонанса:

$$\begin{aligned} u_{tt} + a^2 \Delta^2 u &= 0, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(r, t)| < \infty, \quad u(r_0, t) &= 0, \quad u_r(r_0, t) = A \sin \omega t, \\ u(r, 0) &= u_t(r, 0) = 0. \end{aligned}$$

Решение представить в виде суммы вынужденных и собственных колебаний.

Получить решения смешанных задач 2.807–2.822, в которых $\Delta = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial}{\partial r}$ — радиальная часть оператора Лапласа в двумерном пространстве в полярных координатах. Решение представить в виде суммы, одно из слагаемых которой — частное решение уравнения, удовлетворяющее граничным условиям.

2.807. $u_{tt} = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + A f(r, t), \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < t,$

$$u(r_1, t) = u(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0,$$

где функция $f(r, t)$ равна:

1) $J_0(\beta r)$; 2) $Y_0(\beta r)$; 3) $I_0(\beta r)$; 4) $K_0(\beta r)$;

5) $J_0(\beta r)t$; 6) $Y_0(\beta r)t$; 7) $I_0(\beta r)t$; 8) $K_0(\beta r)t$.

$$\mathbf{2.808.} \quad u_{tt} = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + Af(r, t), \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < t,$$

$$u_r(r_1, t) = u(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0,$$

где функция $f(r, t)$ равна:

$$1) J_0(\beta r); \quad 2) Y_0(\beta r); \quad 3) I_0(\beta r); \quad 4) K_0(\beta r);$$

$$5) J_0(\beta r)t; \quad 6) Y_0(\beta r)t; \quad 7) I_0(\beta r)t; \quad 8) K_0(\beta r)t.$$

$$\mathbf{2.809.} \quad u_{tt} = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + Af(r, t), \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < t,$$

$$u_r(r_1, t) = u_r(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0,$$

где функция $f(r, t)$ равна:

$$1) h(t); \quad 2) J_0(\beta r); \quad 3) Y_0(\beta r); \quad 4) I_0(\beta r);$$

$$5) K_0(\beta r); \quad 6) J_0(\beta r)t; \quad 7) Y_0(\beta r)t; \quad 8) I_0(\beta r)t; \quad 9) K_0(\beta r)t.$$

$$\mathbf{2.810.} \quad u_{tt} = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\nu^2}{r^2} u \right) + f(r, t), \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < t,$$

$$u(r_1, t) = u_r(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0,$$

где функция $f(r, t)$ равна: 1) Ar^ν ; 2) $Ar^\nu t$.

$$\mathbf{2.811.} \quad u_{tt} = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\nu^2}{r^2} u \right) + f(r, t), \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < t,$$

$$u_r(r_1, t) = u(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0,$$

где функция $f(r, t)$ равна: 1) Ar^ν ; 2) $Ar^\nu t$.

$$\mathbf{2.812.} \quad u_{tt} = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\nu^2}{r^2} u \right) + f(r, t), \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < t,$$

$$u_r(r_1, t) = u_r(r_2, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0,$$

где функция $f(r, t)$ равна: 1) Ar^ν ; 2) $Ar^\nu t$.

$$\mathbf{2.813.} \quad u_t = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + Af(r, t), \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < t,$$

$$u(r_1, t) = u(r_2, t) = u(r, 0) = 0,$$

функция $f(r, t)$ равна: 1) $J_0(\beta r)$; 2) $Y_0(\beta r)$; 3) $I_0(\beta r)$; 4) $K_0(\beta r)$.

$$\mathbf{2.814.} \quad u_t = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + Af(r, t), \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < t,$$

$$u_r(r_1, t) = u(r_2, t) = u(r, 0) = 0,$$

функция $f(r, t)$ равна: 1) $J_0(\beta r)$; 2) $Y_0(\beta r)$; 3) $I_0(\beta r)$; 4) $K_0(\beta r)$.

$$\mathbf{2.815.} \quad u_t = a^2 \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + Af(r, t), \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < t,$$

$$u_r(r_1, t) = u_r(r_2, t) = u(r, 0) = 0,$$

где $f(r, t)$ равна: 1) $h(t)$; 2) $J_0(\beta r)$; 3) $Y_0(\beta r)$; 4) $I_0(\beta r)$; 5) $K_0(\beta r)$.

$$2.816. \quad u_t = a^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\nu^2}{r^2} u \right) + Ar^\nu, \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < t:$$

$$1) \quad u(r_1, t) = u(r_2, t) = u(r, 0) = 0;$$

$$2) \quad u_r(r_1, t) = u(r_2, t) = u(r, 0) = 0;$$

$$3) \quad u_r(r_1, t) = u_r(r_2, t) = u(r, 0) = 0,$$

$$2.817. \quad u_{tt} + a^2 \Delta^2 u = At, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(r, t)| < \infty, \quad u(r_0, t) = u_r(r_0, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$$

$$2.818. \quad u_{tt} + a^2 \Delta^2 u = A(r_0^2 - r^2)t, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(r, t)| < \infty, \quad u(r_0, t) = u_r(r_0, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$$

$$2.819. \quad u_{tt} + a^2 \Delta^2 u = A(r_0^2 - r^2)^2 t, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(r, t)| < \infty, \quad u(r_0, t) = u_r(r_0, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$$

$$2.820. \quad u_{tt} + a^2 \Delta^2 u = At^2, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(r, t)| < \infty, \quad u(r_0, t) = u_r(r_0, t) = u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$$

$$2.821. \quad u_{tt} + a^2 \Delta^2 u = 0, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(r, t)| < \infty, \quad u(r_0, t) = At, \quad u_r(r_0, t) = 0, \\ u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$$

$$2.822. \quad u_{tt} + a^2 \Delta^2 u = 0, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u(r, t)| < \infty, \quad u(r_0, t) = 0, \quad u_r(r_0, t) = At, \\ u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0.$$

Пример 2.26. Определить стационарную температуру однородного шара, радиус которого r_0 , если температура поверхности $f(\theta)$. Рассмотреть случай $f(\theta) = u_0 \cos 2\theta$.

Решение. В сферических координатах задача для определения температуры $u(r, \theta)$ ставится следующим образом:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} = 0, \quad (2.59)$$

$$r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < \theta < \pi,$$

$$|u| < \infty, \quad u(r_0, \theta) = f(\theta).$$

При подстановке $u(r, \theta) = R(r) P(\theta)$ в уравнение (2.59) оно превращается в тождество

$$-\frac{1}{R} \frac{d}{dr} r^2 \frac{dR}{dr} = \frac{1}{P} \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \sin \theta \frac{dP}{d\theta} = -\lambda.$$

Задача на собственные значения

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \sin \theta \frac{dP}{d\theta} + \lambda P = 0, \quad 0 < \theta < \pi, \quad (2.60)$$

$$|P| < \infty$$

имеет нетривиальные решения лишь при $\lambda_n = n(n+1)$, $n \in \mathbb{N}_0$, и этими решениями являются полиномы Лежандра $P_n(\cos \theta)$ ([63]), ортогональные на отрезке $[0; \pi]$ с весом $\sin \theta$. Для $R(r)$ получается уравнение Эйлера $r^2 R''_n + 2r R'_n - n(n+1) R_n = 0$, фундаментальная система решений которого r^n и $r^{-(n+1)}$.

Итак, решение задачи представляет собой ряд по полиномам Лежандра

$$u(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[A_n \left(\frac{r}{r_0} \right)^n + B_n \left(\frac{r_0}{r} \right)^{n+1} \right] P_n(\cos \theta).$$

Из ограниченности $u(r, \theta)$ следует, что $B_n = 0$, а граничное условие при $r = r_0$ приводит к разложению

$$f(\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n P_n(\cos \theta), \quad (2.61)$$

коэффициенты которого

$$A_n = \frac{1}{\|P_n\|^2} \int_0^\pi f(\theta) P_n(\cos \theta) \sin \theta d\theta, \quad \|P_n\|^2 = \frac{2}{2n+1}.$$

Таким образом,

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} A_n (2n+1) \left(\frac{r}{r_0} \right)^n \int_0^\pi f(\psi) P_n(\cos \psi) \sin \psi d\psi P_n(\cos \theta).$$

Если $f(\theta) = u_0 \cos 2\theta$, то коэффициенты ряда (2.61) можно получить, заметив, что $\cos 2\theta = 2\cos^2 \theta - 1 = 2x^2 - 1$ есть линейная комбинация многочленов $P_0(x)$, $P_2(x)$:

$$2x^2 - 1 = a_0 P_0(x) + a_2 P_2(x).$$

Отсюда $a_0 = -1/3$, $a_2 = 4/3$ и

$$u(r, \theta) = \frac{u_0}{3} \left[4 \frac{r^2}{r_0^2} P_2(\cos \theta) - 1 \right].$$

2.823. Если $u_0 \cos 3\theta$ — температура поверхности шара, радиус которого r_0 , то какова стационарная температура окружающей его среды?

2.824. Проводящий шар помещен в однородное электростатическое поле E_0 . Найти плотность заряда на шаре.

2.825. Определить потенциал и электрическое поле равномерно поляризованного шара, радиус которого r_0 , вектор поляризации $\mathbf{P}$ (см. задачу 1.386).

2.826. Диэлектрический шар (радиус r_0 , диэлектрическая проницаемость ϵ) внесен в однородное электростатическое поле $\mathbf{E}_0$. Определить поле внутри шара и дипольный момент шара.

2.827. Сферический слой ($r_1 < r < r_2$), магнитная проницаемость которого μ , помещен в однородное магнитное поле $\mathbf{H}_0$. Определить магнитное поле в полости ($r < r_1$) и магнитный момент слоя.

2.828. Неподвижный твердый шар, радиус которого r_0 , находится в плоскопараллельном потоке идеальной несжимаемой жидкости. Считая течение потенциальным, определить давление на поверхности шара, если плотность жидкости ρ_0 , ее скорость и давление на бесконечности V_0 и P_0 соответственно.

2.829. Твердый шар, радиус которого r_0 , движется в идеальной несжимаемой жидкости со скоростью $V(t)\mathbf{k}$, где $\mathbf{k}$ — постоянный единичный вектор. Считая течение потенциальным, определить давление на поверхности шара. Давление невозмущенной жидкости P_0 , ее плотность ρ_0 .

2.830. Решить внутреннюю задачу Дирихле

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ |u| < \infty, \quad u|_{r=r_0} = u_0 \sin \theta \sin 2\theta.$$

2.831. Решить внешнюю задачу Дирихле

$$\Delta u = \frac{A \cos \theta}{r^4}, \quad 0 < r_0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ u|_{r=r_0} = u_0 \cos 2\theta, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} u = 0.$$

2.832. Решить внутреннюю задачу Неймана

$$\Delta u = Ar \cos^2 \theta, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ |u| < \infty, \quad u_r|_{r=r_0} = v_0 \sin^2 \theta.$$

2.833. Решить внешнюю задачу Неймана

$$\Delta u = \frac{A \sin^2 \theta}{r^4}, \quad 0 < r_0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=r_0} = 0, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} u = 0.$$

2.834. Решить внутреннюю краевую задачу с граничным условием третьего типа

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$|u| < \infty, \quad \left(\frac{\partial u}{\partial r} + hu \right) \Big|_{r=r_0} = hA \cos^4 \theta.$$

2.835. Решить внешнюю краевую задачу с граничным условием третьего типа

$$\Delta u = \frac{A}{r^3}, \quad 0 < r_0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial r} - hu \right) \Big|_{r=r_0} = -hu_0 \cos 3\theta, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} u = 0.$$

2.836. Решить задачу

$$\Delta u = 0, \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$u|_{r=r_1} = A_1 \cos \theta, \quad \left(\frac{\partial u}{\partial r} + hu \right) \Big|_{r=r_2} = A_2.$$

2.837. При каком условии задача

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r_1 < r < r_2, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=r_1} = A_1, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=r_2} = A_2 \cos^2 \theta$$

имеет решение? Найти это решение.

2.838. Решить задачу

$$\Delta u = Ar^2 \cos \theta, \quad 0 < r_1 < r < r_2, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=r_1} = v_1 \cos^2 \theta, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=r_2} = v_2 \sin^2 \theta.$$

2.839. Прямолинейный проводник с током, с единицы длины которого выделяется тепловая мощность q_0 , проходит через центр шара радиуса r_0 . Определить стационарную температуру шара, если его поверхность имеет нулевую температуру.

2.840. На расстоянии r_1 от центра шара, радиус которого $r_0 < r_1$, находится точечный источник тепла мощностью Q_0 . Найти стационарную температуру вне шара, если шар поддерживается при нулевой температуре.

2.841. Внутри незаземленной проводящей сферы, радиус которой r_0 , заряд Q , помещен на расстоянии r_1 от центра точечный заряд Q_0 . Найти плотность заряда на сфере, ее дипольный момент и силу, действующую на заряд Q_0 .

2.842. На расстоянии r_1 от центра шара, радиус которого $r_0 < r_1$, расположен точечный источник идеальной несжимаемой жидкости мощностью Q_0 . Считая течение потенциальным, определить потенциал скоростей жидкости.

2.843. На расстоянии r_1 от центра проводящего заземленного шара, радиус которого $r_0 < r_1$, расположен точечный диполь с моментом $\mathbf{p} = \frac{pr_1}{r_1}$. Найти плотность заряда на сфере, ее полный заряд и дипольный момент, а также силу, действующую на диполь.

2.844. Вне диэлектрического шара (радиус r_0 , диэлектрическая проницаемость ε) на расстоянии r_1 от центра расположен точечный заряд Q . Какая сила действует на заряд?

2.845. По диаметру проводящей заземленной сферы, радиус которой r_0 , расположена равномерно заряженная нить с изолированными концами; длина нити $2r_0$, линейная плотность заряда q . Определить потенциал электростатического поля внутри сферы.

2.846. Найти потенциал равномерно заряженного тонкого кольца, радиус которого r_0 , если линейная плотность заряда q . Ответ дать в форме ряда по полиномам Лежандра.

2.847. В среде с магнитной проницаемостью μ имеется сферическая полость (радиус r_0 , $\mu = 1$). Внутри полости на расстоянии r_1 от ее центра расположен круговой ток, радиус которого много меньше r_0 . Определить силу, действующую на ток, если его магнитный момент $\mathbf{M} = Mr_1/r_1$.

2.848. В среде с магнитной проницаемостью μ имеется сферическая полость (радиус r_0 , $\mu = 1$), внутри которой находится круговой ток (радиус r_1 , сила тока J). Определить магнитное поле вне полости при условии, что центры полости и витка совпадают.

2.849. Шар, радиус которого r_0 , магнитная проницаемость μ , находится в магнитном поле витка с током J ; радиус витка $r_1 > r_0$, центры шара и витка совпадают. Как изменится магнитное поле на больших расстояниях от витка, если шар убрать?

2.850. Получить разложения:

$$1) \operatorname{sign} x = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n+3}{n+1} P_{2n}(0) P_{2n+1}(x);$$

$$2) |x| = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n+1}{(n+1)(2n+1)} P_{2n}(0) P_{2n}(x);$$

$$3) x^2 \operatorname{sign} x = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n+3}{(2n-1)(n+1)(n+2)} P_{2n}(0) P_{2n+1}(x).$$

Пример 2.27. Определить стационарную температуру полушара $\Omega = \{x, y, z: x^2 + y^2 + z^2 < r_0^2, z > 0\}$, плоская часть S_0 поверхности которого имеет температуру $f(r) = u_0 \left(1 - \frac{r_0^2}{r^2}\right)$, а температура сферической части равна нулю.

Решение. Для определения температуры приемлема схема: переход к задаче с однородным граничным условием на S_0 с последующим продолжением решения на полный шар. Процедура продолжения обеспечивает построение системы собственных функций, необходимых для формирования решения. В сферических координатах задача имеет следующую постановку:

$$\begin{aligned} \Delta u &= 0 \quad \text{в } \Omega, \\ u(r_0, \theta) &= 0, \quad u(r, \frac{\pi}{2}) = f(r). \end{aligned}$$

Снять неоднородность в граничном условии можно двояко.

1. Пусть (см. задачу 10.268)

$$\begin{aligned} \tilde{u} &= \begin{cases} u, & 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \theta = \frac{\pi}{2}, \end{cases} \\ \tilde{u}_\theta &= u_\theta, \quad \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \end{aligned}$$

тогда $[\tilde{u}]_{\frac{\pi}{2}} = -f(r)$, $[\tilde{u}_\theta]_{\frac{\pi}{2}} = 0$. Обобщенные производные

$$\begin{aligned} \tilde{u}_\theta &= \{\tilde{u}_\theta\} - f(r) \cdot \delta\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) = u_\theta - f(r) \cdot \delta\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right), \\ \tilde{u}_{\theta\theta} &= \{\tilde{u}_{\theta\theta}\} - f(r) \cdot \delta'\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) = u_{\theta\theta} - f(r) \cdot \delta'\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right). \end{aligned}$$

Отсюда $\Delta \tilde{u} = \Delta u + \frac{1}{r^2} f(r) \cdot \delta' \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right)$, следовательно,

$$\Delta \tilde{u} + \frac{1}{r^2} f(r) \cdot \delta' \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) = 0, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}.$$

Знак над функцией u можно опустить, поскольку на интервале $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, где определено уравнение, функции $\tilde{u}$ и u совпадают; информация о скачке содержится в уравнении.

Таким образом, получается задача, эквивалентная исходной:

$$\begin{aligned} \Delta \tilde{u} + \frac{1}{r^2} f(r) \cdot \delta' \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) &= 0, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}, \\ |u| < \infty, \quad u(r_0, \theta) &= 0, \quad u \left(r, \frac{\pi}{2} \right) = 0. \end{aligned}$$

В соответствии с граничным условием на S_0 функцию $u(r, \theta)$ следует продолжить нечетно:

$$U(r, \theta) = \begin{cases} u(r, \theta), & 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \\ -u(r, \pi - \theta), & \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi. \end{cases}$$

Так как $\delta'(-x) = -\delta'(x)$ (задача 10.200), а при продолжении величина источника удваивается, то $U(r, \theta)$ — решение задачи в шаре

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial U}{\partial r} + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial U}{\partial \theta} + 2f(r) \cdot \delta' \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) &= 0, \\ |U| < \infty, \quad U(r_0, \theta) &= 0. \end{aligned} \quad (2.62)$$

Решение уравнения (2.62) при дополнительных условиях имеет форму ряда по собственным функциям (пример 2.26)

$$U(r, \theta) = \sum_0^{\infty} U_n(r) P_n(\cos \theta).$$

Задача для определения коэффициентов $U_n(r)$ ряда получается в результате действия функционала (2.62) на собственную функцию $P_n(\cos \theta) / \|P_n\|^2$:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} r^2 \frac{dU_n}{dr} - n(n+1)U_n &= -u_0(2n+1) \left(1 - \frac{r_0^2}{r^2}\right) P'_n(0), \quad 0 < r < r_0, \\ |U_n| < \infty, \quad U_n(r_0) &= 0. \end{aligned}$$

Так как $P'_n(0) = nP_{n-1}(0)$, $n \geq 1$, (следствие из рекуррентных формул) и $P'_0(0) = 0$, то правая часть уравнения для $U_n(r)$ отлич-

на от нуля при $n = 2k + 1$, $k = 0, 1, 2, \dots$, следовательно, общее решение

$$U_n(r) = \begin{cases} A_n \left(\frac{r}{r_0}\right)^n + B_n \left(\frac{r_0}{r}\right)^{n+1}, & n = 2k, \quad k \in \mathbb{N}_0, \\ A_n \left(\frac{r}{r_0}\right)^n + B_n \left(\frac{r_0}{r}\right)^{n+1} + K_n + M_n \left(\frac{r}{r_0}\right)^2, & n = 2k + 1, \quad k \in \mathbb{N}_0. \end{cases}$$

Подстановка $U_n(r)$ в уравнение и граничные условия определяет коэффициенты $A_n = B_n = K_n = M_n = 0$ при четных n , а при нечетных n

$$K_n = \frac{(2n+1)P'_n(0)}{n(n+1)}u_0, \quad M_n = -\frac{(2n+1)P'_n(0)}{(n-2)(n+3)}u_0,$$

$$A_n = -K_n - M_n = \frac{6(2n+1)P'_n(0)}{n(n-2)(n+1)(n+3)}u_0, \quad B_n = 0.$$

Для упрощения формы решения $u(r, \theta)$ функцию $U_n(r)$ целесообразно представить в виде

$$U_n(r) = A_n \left(\frac{r}{r_0}\right)^n + K_n \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2}\right) - A_n \left(\frac{r}{r_0}\right)^2, \quad n = 2k + 1.$$

Итак,

$$U(r, \theta) = \sum_{k=0}^{\infty} A_{2k+1} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} P_{2k+1}(\cos \theta) +$$

$$+ \frac{u_0}{2} \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2}\right) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(4k+3)P_{2k}(0)P_{2k+1}(\cos \theta)}{k+1} -$$

$$- \frac{3u_0 r^2}{2r_0^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(4k+3)P_{2k}(0)P_{2k+1}(\cos \theta)}{(2k-1)(k+1)(k+2)}.$$

В результате суммирования рядов с помощью разложений из задачи 2.850 и при условии $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ получается решение исходной задачи вида

$$u(r, \theta) = u_0 \left[\left(1 - \frac{r^2}{r_0^2}\right) + \frac{3r^2}{2r_0^2} \cos^2 \theta + \right.$$

$$\left. + \frac{3}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} \frac{(4k+3)P_{2k}(0)P_{2k+1}(\cos \theta)}{(2k-1)(k+1)(k+2)} \right].$$

2. Переход к задаче с однородным граничным условием достигается заменой $u(r, \theta) = v(r, \theta) + f(r)$, где $v(r, \theta)$ — решение

задачи

$$\Delta v = h \text{ в } \Omega, \quad h = \frac{6u_0}{r_0^2},$$

$$|v| < \infty, \quad v(r_0, \theta) = v(r, \frac{\pi}{2}) = 0.$$

Нечетное продолжение $V(r, \theta)$ решения $v(r, \theta)$ на полный шар определяется условиями

$$\Delta V = H(\theta),$$

$$(r, \theta, \varphi) \in B(0, r_0),$$

$$|V| < \infty, \quad V(r_0, \theta) = 0,$$

$$H(\theta) = \begin{cases} h(\theta), & 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \\ -h(\pi - \theta), & \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi. \end{cases}$$

Далее можно действовать так же, как в предыдущем пункте, при этом форма ответа та же.

2.851. Прямолинейный канал $(-l < x < l)$ заполнен идеальной несжимаемой жидкостью. Ось Ox направлена вдоль канала, его поперечное сечение $(|y| < d, -h(x) < z < 0)$, $h(x) = h_0 \left(1 - \frac{x^2}{l^2}\right)$. В жидкости возбуждаются одномерные (вдоль канала) длинные гравитационные волны малой амплитуды $(A \ll h_0 \ll \lambda)$. Определить две первые (наименьшие) частоты собственных колебаний жидкости.

2.852. Найти распределение скоростей жидкости при условиях задачи 1.320, если Ω_1 — полушар, радиус которого r_0 , S_1 — полусфера. Какова скорость жидкости на свободной поверхности?

2.853. Струна $(0 < x < l)$ вращается в плоскости с угловой скоростью ω_0 около оси Ou , проходящей через точку $x = 0$. Решить задачу о колебаниях струны, если конец $x = 0$ закреплен, начальная скорость равна нулю, а начальное отклонение $u_0 \frac{x}{l} \left(1 - \frac{x^2}{l^2}\right)$.

2.854. Решить предыдущую задачу для струны, начальная скорость которой $v_0 x^3 / l^3$, а начальное отклонение равно нулю.

2.855. Струна $(-l < x < l)$ вращается в плоскости с угловой скоростью ω_0 около оси Ou , проходящей через точку $x = 0$. Решить задачу о движении струны, если точка $x = 0$ не

закреплена, начальная скорость равна нулю, а начальное отклонение $h\left(1 - \frac{x^2}{l^2}\right)$.

2.856. На вращающуюся струну (см. задачу 2.853) действует сила, линейная плотность которой $F_0 P_{2n+1}\left(\frac{x}{l}\right) \times \sin \omega t \mathbf{e}_u$. Решить задачу о движении струны при нулевых начальных условиях.

2.857. На вращающуюся струну (см. задачу 2.855) действует сила, линейная плотность которой $F_0 P_{2n}\left(\frac{x}{l}\right) \times \cos \omega t \mathbf{e}_u$. Решить задачу о движении струны при нулевых начальных условиях.

2.858. Решить задачу 2.856, если на струну наряду с периодической силой действует в направлении оси Ou сила упругости, пропорциональная отклонению точки от положения равновесия (коэффициент пропорциональности k дан).

2.859. Решить задачу 2.857, если на струну наряду с периодической силой действует в направлении оси Ou сила упругости, пропорциональная отклонению точки от положения равновесия (коэффициент пропорциональности k дан).

2.860. На вращающуюся струну (см. задачу 2.853) действует сила, линейная плотность которой $F_0 \left(\frac{x}{l}\right)^3 \cos \omega t \mathbf{e}_u$. Решить задачу о колебаниях струны при нулевых начальных условиях.

2.861. На вращающуюся струну (см. задачу 2.855) действует сила, линейная плотность которой $F_0 \left(\frac{x}{l}\right)^2 \sin \omega t \mathbf{e}_u$. Решить задачу о движении струны при нулевых начальных условиях.

2.862. Найти потенциал электростатического поля внутри полусферы, радиус которой r_0 , если потенциал сферической части поверхности равен u_1 , плоской части — u_0 .

2.863. Постоянный ток J протекает через однородный полушар, радиус которого r_0 , проводимость σ . Ток втекает через полюс P (точка полусферы, принадлежащая диаметру, перпендикулярному к основанию полушара) и вытекает через центр основания т. O . Найти плотность тока в полушаре.

2.864. Однородный полушар, радиус которого r_0 , проводимость σ , расположен на проводящем основании. Через полюс P

(пояснение в задаче 2.863) втекает постоянный ток J . Найти плотность тока в полушаре.

2.865. В полушар, радиус которого r_0 , через сферическую часть поверхности поступает радиальный тепловой поток плотности q_0 , а плоская часть поверхности поддерживается при температуре u_0 . Найти стационарное распределение температуры в полушаре.

2.866. Основание полушара поддерживается при температуре u_0 , а через сферическую часть поверхности происходит теплообмен по закону Ньютона с внешней средой, температура которой u_1 . Определить стационарное распределение температуры в полушаре, если его радиус r_0 .

2.867. Определить стационарную температуру полушара, радиус которого r_0 , если температура сферической части поверхности равна u_0 , а через основание внутрь полушара поступает тепловой поток плотности q_0 .

2.868. На сферической части поверхности полушара происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой u_0 , а через основание внутрь полушара поступает тепловой поток плотности q_0 . Определить стационарную температуру полушара, если его радиус r_0 .

2.869. В полушаре, радиус которого r_0 , действуют тепловые источники, выделяющие в единицу времени в единице объема Q_0 единиц тепловой энергии. Решить стационарную задачу теплопроводности, если поверхность полушара поддерживается при температуре u_0 .

2.870. Точки O и P полушара (пояснение в задаче 2.863) соединены нитью, концы которой изолированы; заряд единицы длины нити q . Определить потенциал внутри полушара, если потенциал поверхности равен нулю.

2.871. Через точки O и P полушара (пояснение в задаче 2.863) проходит тонкий проводник с током, с единицы длины которого выделяется тепловая мощность: 1) $Q_0 r/r_0$; 2) $Q_0 r^2/r_0^2$. Определить стационарную температуру полушара, если его поверхность имеет температуру u_0 .

2.872. Определить стационарную температуру однородного полушара $\{x, y, z: x^2 + y^2 + z^2 < r_0^2, z > 0\}$, температура плоской

части поверхности которого равна $f(r) = u_0 \left(1 - \frac{r_0^2}{r^2}\right)$, если:
 1) сферическая часть S_r теплоизолирована; 2) через S_r происходит теплообмен по закону Ньютона с внешней средой, температура которой равна нулю.

2.873. В полушар $\{x, y, z: x^2 + y^2 + z^2 < r_0^2, z > 0\}$ через плоскую часть поверхности поступает тепловой поток, плотность которого $q \frac{r}{r_0}$, где $q = \text{const}$. Какова стационарная температура полушара, если: 1) сферическая часть S_r поверхности поддерживается при нулевой температуре; 2) через S_r происходит теплообмен по закону Ньютона с внешней средой, температура которой равна нулю?

2.874. Определить стационарную температуру однородного полушара $\{x, y, z: x^2 + y^2 + z^2 < r_0^2, z > 0\}$, если через плоскую часть поверхности в полушар входит тепловой поток, плотность которого $q \frac{r}{r_0}$, где $q = \text{const}$, а через сферическую часть выходит тепловой поток, плотность которого: 1) $\frac{q}{3}$; 2) $q \cos^2 \theta$.

2.875. Найти стационарное распределение температуры в шаровом секторе ($r < r_0, 0 < \theta < \alpha, 0 \leq \varphi < 2\pi$), если часть $r = r_0$ поверхности поддерживается при температуре $f(\theta)$, а остальная поверхность: 1) имеет нулевую температуру; 2) теплоизолирована.

2.876. Найти стационарное распределение температуры в коническом теле ($r_0 < r, 0 < \theta < \alpha, 0 \leq \varphi < 2\pi$), если его поверхность $r = r_0$ поддерживается при температуре $f(\theta)$, а остальная поверхность: 1) имеет нулевую температуру; 2) теплоизолирована.

2.877. Найти потенциал электрического поля точечного квадруполя, описанного в задаче 1.401.

2.878. Найти магнитное поле $\mathbf{H}$ и магнитную индукцию $\mathbf{B}$ внутри равномерно намагниченного шара, радиус которого r_0 , намагниченность $\mathbf{M}$ (см. задачу 1.394).

2.879. Найти электрическое поле равномерно намагниченного диэлектрического шара, вращающегося с постоянной угловой скоростью около диаметра, параллельного вектору намагниченности. Радиус шара r_0 , диэлектрическая проницаемость ϵ , намагниченность $\mathbf{M}$, угловая скорость ω ($\omega r_0 \ll c$) (см. задачу 1.395). Показать, что электрическое поле имеет квадрупольный характер и найти квадрупольный электрический момент шара.

2.880. Определить плотность заряда на поверхности нейтронной звезды (см. задачу 1.396).

Пример 2.28. Поверхность S шара B , радиус которого r_0 , имеет температуру $f(\theta, \varphi) = u_0 \sin 2\theta \cos \varphi$. Определить стационарную температуру шара.

Решение. В стационарном случае уравнение теплопроводности сводится к уравнению Лапласа $\Delta u = 0$, которое нужно решать в классе функций $u \in C^2(B) \cap C(\bar{B})$ при условии $u|_S = f$ (внутренняя задача Дирихле). Подстановка $u(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi)$ в уравнение Лапласа, записанного в сферических координатах, приводит к задаче на собственные значения

$$\Delta_{\theta, \varphi} Y + \lambda Y = 0, \quad Y \in C(S_1), \quad (2.63)$$

и к уравнению Эйлера

$$\frac{d}{dr} r^2 \frac{dR}{dr} - \lambda R = 0. \quad (2.64)$$

При $\lambda = n(n+1)$, $n \in \mathbb{N}_0$, и только при таких λ задача (2.63) имеет нетривиальные решения — сферические функции

$$Y_n^m(\theta, \varphi) = P_n^{|m|}(\cos \theta) \begin{cases} \cos m\varphi, & m = 0, -1, \dots, -n, \\ \sin m\varphi, & m = 1, 2, \dots, n, \end{cases} \quad (2.65)$$

ортогональные на S_1 :

$$\int_{S_1} Y_n^m Y_{n'}^{m'} ds = 2\pi \frac{1 + \delta_{m0}}{2n+1} \frac{(n+|m|)!}{(n-|m|)!} \delta_{nn'} \delta_{mm'}. \quad (2.66)$$

При $\lambda = n(n+1)$ функции r^n и $r^{-(n+1)}$ образуют фундаментальную систему решений уравнения (2.64). Таким образом,

$$u(r, \theta, \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=-n}^n \left[A_{nm} \left(\frac{r}{r_0} \right)^n + B_{nm} \left(\frac{r_0}{r} \right)^{n+1} \right] Y_n^m(\theta, \varphi).$$

Ввиду ограниченности функции $u(r, \theta, \varphi)$ коэффициенты B_{nm} равны нулю, а коэффициенты A_{nm} определяются с помощью свойства (2.66) из разложения

$$f(\theta, \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=-n}^n A_{nm} Y_n^m(\theta, \varphi).$$

Итак, решение задачи представлено рядом по сферическим функциям

$$u(r, \theta, \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=-n}^n A_{nm} \left(\frac{r}{r_0}\right)^n Y_n^m(\theta, \varphi), \quad A_{nm} = \frac{\int_{S_1} f Y_n^m ds}{\|Y_n^m\|^2}.$$

В частном случае, ввиду того, что $\sin 2\theta \cos \varphi = \frac{2}{3} Y_2^{-1}(\theta, \varphi)$,

$$u(r, \theta, \varphi) = u_0 \left(\frac{r}{r_0}\right)^2 \sin 2\theta \cos \varphi.$$

З а м е ч а н и е. В квантовой механике применяются сферические функции

$$Y_n^m(\theta, \varphi) = (-1)^m \sqrt{\frac{2n+1}{4\pi} \frac{(n-|m|)!}{(n+|m|)!}} P_n^{|m|}(\cos \theta) e^{im\varphi}, \quad (2.67)$$

норма которых равна 1.

2.881. Решить внутреннюю краевую задачу для шара

$$\begin{aligned} \Delta u &= F(r, \theta, \varphi), \quad r < r_0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < \theta < \pi, \\ (\alpha u + \beta u_r)|_{r=r_0} &= f(\theta, \varphi), \end{aligned}$$

если:

- 1) $\alpha = 1, \beta = 0, f = u_0 \sin 3\theta \sin \varphi, F = 0$;
- 2) $\alpha = 1, \beta = 0, f = u_0 \sin 2\theta \sin^2 \theta \cos \varphi, F = 0$;
- 3) $\alpha = 0, \beta = 1, f = v_0 \sin^3 \theta \cos \varphi, F = 0$;
- 4) $\alpha = 0, \beta = 1, f = v_0 \cos^3 \theta \sin \theta \sin \varphi, F = 0$;
- 5) $\alpha = 0, \beta = 1, f = v_0 \sin^2 2\theta \sin 2\varphi, F = 0$;
- 6) $\alpha = h, \beta = 1, f = hu_0 \sin^2 \theta \sin 2\varphi, F = 0$;
- 7) $\alpha = h, \beta = 1, f = hu_0 \sin 2\theta (1 + \cos^2 \theta) \sin \varphi, F = 0$;
- 8) $\alpha = 0, \beta = 1, f = v_0 \sin \theta \sin \varphi (1 - \sin \theta \cos \varphi),$
 $F = Ar \sin^3 \theta \cos 3\varphi$;
- 9) $\alpha = 1, \beta = 0, f = u_0 \sin^4 \theta \sin 4\varphi, F = A \sin \theta \sin \varphi$;
- 10) $\alpha = 1, \beta = 0, f = u_0 \sin 2\theta \sin \varphi, F = Ar \cos \theta$;
- 11) $\alpha = 1, \beta = 0, f = u_0 \sin \theta \sin \varphi (1 + \sin \theta \cos \varphi),$
 $F = Ar^3 \sin \theta \cos \varphi$;
- 12) $\alpha = 1, \beta = 0, f = u_0 \cos \theta \sin^3 \theta \sin 3\varphi,$
 $F = Ar \sin^3 \theta \cos 3\varphi$;
- 13) $\alpha = 1, \beta = 0, f = u_0 \sin^4 \theta \cos 4\varphi, F = A \sin 2\theta \cos \varphi$;
- 14) $\alpha = 0, \beta = 1, f = v_0 \sin 2\theta \sin \varphi, F = Ar^2 \sin^2 2\theta \cos 2\varphi$;

- 15) $\alpha = 0, \beta = 1, f = v_0 \sin^3 \theta \cos 3\varphi, F = Ar^2 \sin \theta \cos \varphi;$
 16) $\alpha = h, \beta = 1, f = hu_0 \sin^3 \theta \cos 3\varphi, F = A \cos^2 \theta;$
 17) $\alpha = h, \beta = 1, f = hu_0 \sin \theta \sin \varphi, F = Ar^2 \cos^2 \theta.$

2.882. Решить внешнюю краевую задачу для шара

$$\Delta u = F(r, \theta, \varphi), \quad r_0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < \theta < \pi, \\ (\alpha u - \beta u_r)|_{r=r_0} = f(\theta, \varphi), \quad \lim_{r \rightarrow \infty} u(\mathbf{r}) = 0,$$

если:

- 1) $\alpha = 1, \beta = 0, f = u_0 \sin \theta \cos^2 \theta \sin \varphi, F = 0;$
 2) $\alpha = 1, \beta = 0, f = u_0 \sin 4\theta \sin \varphi, F = 0;$
 3) $\alpha = 1, \beta = 0, f = u_0 \sin^4 \theta \sin 2\varphi, F = 0;$
 4) $\alpha = 0, \beta = 1, f = v_0 \cos 3\theta \sin \theta \sin \varphi, F = 0;$
 5) $\alpha = 0, \beta = 1, f = v_0 \sin^2 \theta \cos 2\theta \cos 2\varphi, F = 0;$
 6) $\alpha = h, \beta = 1, f = hu_0 \sin 2\theta \sin \varphi, F = 0;$
 7) $\alpha = h, \beta = 1, f = hu_0 \sin 2\theta \sin^2 \theta \sin \varphi, F = 0;$
 8) $\alpha = 1, \beta = 0, f = 0, F = \frac{A \sin \theta \sin \varphi}{r^3};$
 9) $\alpha = 1, \beta = 0, f = u_0 \sin \theta \sin 2\theta \sin 2\varphi, F = \frac{A \sin^2 \theta \cos 2\varphi}{r^3};$
 10) $\alpha = 1, \beta = 0, f = u_0 \sin 2\theta \sin \varphi (1 + \sin \theta \cos \varphi),$
 $F = \frac{A \sin^2 \theta \sin 2\varphi}{r^4};$
 11) $\alpha = 1, \beta = 0, f = u_0 \sin 2\theta \sin \varphi, F = \frac{A}{r^3};$
 12) $\alpha = 1, \beta = 0, f = u_0 \sin^2 \theta \sin 2\varphi, F = \frac{A \sin \theta \cos \varphi}{r^4};$
 13) $\alpha = 1, \beta = 0, f = u_0 \sin^3 \theta \cos 3\varphi, F = \frac{A \cos \theta}{r^4};$
 14) $\alpha = 0, \beta = 1, f = v_0 \sin^4 \theta \cos 4\varphi, F = \frac{A \cos \theta}{r^3};$
 15) $\alpha = 0, \beta = 1, f = v_0 \sin^3 \theta \cos \theta \cos 3\varphi,$
 $F = \frac{A \sin^2 \theta \cos \theta \sin 2\varphi}{r^3};$
 16) $\alpha = 0, \beta = 1, f = v_0 \sin \theta \sin \varphi (\cos \theta - \sin \theta \cos \varphi),$
 $F = \frac{A \sin \theta \sin \varphi}{r^4}.$

2.883. Решить краевую задачу в сферическом слое

$$\Delta u = F(r, \theta, \varphi), \quad r_1 < r < r_2, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < \theta < \pi, \\ (\alpha_1 u - \beta_1 u_r)|_{r=r_1} = f_1(\theta, \varphi), \\ (\alpha_2 u + \beta_2 u_r)|_{r=r_2} = f_2(\theta, \varphi),$$

если:

- 1) $\alpha_1 = \alpha_2 = 1, \beta_1 = \beta_2 = 0,$
 $f_1 = u_1, f_2 = u_2 \sin^2 \theta \cos 2\varphi, F = 0;$
- 2) $\alpha_1 = \alpha_2 = 1, \beta_1 = \beta_2 = 0, f_1 = u_1 \cos \theta,$
 $f_2 = u_2 \sin \theta \sin \varphi, F = 0;$
- 3) $\alpha_1 = \alpha_2 = 1, \beta_1 = \beta_2 = 0,$
 $f_1 = u_1(1 + \cos \theta) \sin \theta \sin \varphi, f_2 = 0, F = 0;$
- 4) $\alpha_1 = \beta_2 = 1, \beta_1 = \alpha_2 = 0,$
 $f_1 = u_1 \cos 2\theta, f_2 = v_2 \sin \theta \sin \varphi, F = 0;$
- 5) $\alpha_1 = \beta_2 = 0, \beta_1 = \alpha_2 = 1,$
 $f_1 = v_1 \sin^2 \theta, f_2 = u_2 \sin 2\theta \sin \varphi, F = 0;$
- 6) $\alpha_1 = \alpha_2 = 0, \beta_1 = \beta_2 = 1,$
 $f_1 = v_1 \cos \theta, f_2 = v_2 \sin \theta \sin \varphi, F = 0;$
- 7) $\alpha_1 = \alpha_2 = 1, \beta_1 = \beta_2 = 0,$
 $f_1 = u_1, f_2 = u_2 \sin 2\theta \sin \varphi, F = A \sin \theta \sin \varphi;$
- 8) $\alpha_1 = \beta_2 = 0, \beta_1 = \alpha_2 = 1,$
 $f_1 = 0, f_2 = u_2 \sin 2\theta \cos \varphi, F = Ar^2 \cos^2 \theta;$
- 9) $\alpha_1 = \beta_2 = 1, \beta_1 = \alpha_2 = 0,$
 $f_1 = u_1 \sin 2\theta \sin \varphi, f_2 = v_2 \cos \theta, F = \frac{A}{r^3};$
- 10) $\alpha_1 = \alpha_2 = 0, \beta_1 = \beta_2 = 1,$
 $f_1 = v_1 \sin \theta \sin \varphi, f_2 = v_2 \sin^2 \theta \cos 2\varphi,$
 $F = A \sin \theta \sin \varphi \cos \varphi.$

2.884. Определить уровни энергии и волновые функции стационарных состояний пространственного ротатора с моментом инерции I .

2.885. Найти волновую функцию $\Psi(\theta, \varphi, t)$ пространственного ротатора, если $\Psi(\theta, \varphi, 0) = A \sin^2 \theta (1 + \cos \theta e^{2i\varphi})$.

2.886. Непроводящая, равномерно заряженная сфера, радиус которой r_0 , заряд Q , вращается с угловой скоростью ω около оси, проходящей через центр сферы. Определить магнитное поле в пространстве.

2.887. Равномерно заряженный шар, радиус которого r_0 , объемная плотность заряда ρ , вращается с постоянной скоростью ω около оси, проходящей через центр шара. Определить векторный потенциал магнитного поля.

2.888. Найти ограниченное решение уравнения Лапласа в шаре, радиус которого r_0 , при условии на границе в случаях:

1) $u(r_0, \theta, \varphi) = u_0 \cos 2\varphi$; 2) $u_r(r_0, \theta, \varphi) = A \cos 2\varphi$; 3) $(u_r + hu)|_{r=r_0} = hu_0 \cos 2\varphi$, $h > 0$.

2.889. Найти решение уравнения $\Delta u = 0$ в области $r > r_0$, равномерно стремящееся к нулю при $r \rightarrow \infty$, если: 1) $u(r_0, \theta, \varphi) = u_0 \sin 4\varphi$; 2) $u_r(r_0, \theta, \varphi) = -A \sin 4\varphi$; 3) $(u_r - hu)|_{r=r_0} = -hu_0 \sin 4\varphi$, $h > 0$.

2.890. Найти ограниченное решение уравнения Лапласа в области $\Omega = \{r, \theta, \varphi: 0 < r < r_0, 0 < \theta < \pi, \varphi_1 < \varphi < \varphi_2\}$, если заданы следующие условия при $r = r_0, \varphi = \varphi_1, \varphi = \varphi_2$:

1) $u(r_0, \theta, \varphi) = u_0 \cos^2 \theta \sin 2\varphi$; $u(r, \theta, 0) = u_\varphi(r, \theta, \frac{\pi}{4}) = 0$;

2) $u(r_0, \theta, \varphi) = u_0 \sin \theta \cos^2 \theta \cos 3\varphi$; $u(r, \theta, \frac{\pi}{6}) = u_\varphi(r, \theta, \frac{\pi}{3}) = 0$;

3) $u_r(r_0, \theta, \varphi) = A \sin^2 2\theta \cos 4\varphi$; $u_\varphi(r, \theta, \frac{\pi}{4}) = u_\varphi(r, \theta, \frac{3\pi}{4}) = 0$;

4) $(u_r + hu)|_{r=r_0} = hu_0 \cos^2 \theta \sin^3 \theta \cos 5\varphi$, $u(r, \theta, \frac{3\pi}{10}) = u_\varphi(r, \theta, \frac{4\pi}{5}) = 0$;

5) $(u_r + hu)|_{r=r_0} = hu_0 \cos^2 \theta \sin^4 \theta \cos 6\varphi$, $u_\varphi(r, \theta, 0) = u(r, \theta, \frac{\pi}{12}) = 0$.

2.891. Решить краевую задачу для уравнения Лапласа в шаре, радиус которого r_0 при условиях: 1) $u(r_0, \theta, \varphi) = u_0 \sin \theta \sin 5\varphi$; 2) $u_r(r_0, \theta, \varphi) = A \sin \theta \cos 5\varphi$; 3) $(u_r + hu)|_{r=r_0} = hu_0 \sin \theta \sin 5\varphi$, $h > 0$.

2.892. Найти решение уравнения $\Delta u = 0$ в области $r > r_0$, равномерно стремящееся к нулю относительно переменных θ, φ при $r \rightarrow \infty$, если: 1) $u(r_0, \theta, \varphi) = u_0 \sin 2\theta \cos 5\varphi$; 2) $u_r(r_0, \theta, \varphi) = -A \sin 2\theta \sin 5\varphi$; 3) $(u_r - hu)|_{r=r_0} = -hu_0 \sin 2\theta \cos 5\varphi$, $h > 0$.

2.893. Решить краевую задачу для уравнения Лапласа в сферическом слое ($r_1 < r < r_2$) при условиях:

1) $u(r_1, \theta, \varphi) = u_1 \sin 2\theta \cos 3\varphi$, $u(r_2, \theta, \varphi) = u_2 \sin^2 \theta \sin 2\varphi$;

2) $u_r(r_1, \theta, \varphi) = A \sin \theta \sin 3\varphi$, $u(r_2, \theta, \varphi) = u_0 \sin \theta \sin \varphi$;

3) $u_r(r_1, \theta, \varphi) = A_1 \sin^4 \theta \cos 4\varphi$, $u_r(r_2, \theta, \varphi) = A_2 \cos \theta \sin 2\varphi$.

2.894. Решить краевую задачу для уравнения Лапласа в сферическом слое ($r_1 < r < r_2$) при условиях:

1) $u(r_1, \theta, \varphi) = u_1 \cos 2\varphi$, $u(r_2, \theta, \varphi) = u_2 \sin \theta \sin 3\varphi$;

2) $u(r_1, \theta, \varphi) = u_0 \cos^2 \theta \cos 4\varphi$, $u_r(r_2, \theta, \varphi) = A \sin \theta \sin 5\varphi$;

- 3) $u(r_1, \theta, \varphi) = u_1 \sin^4 \theta \cos 6\varphi$, $(u_r + hu)|_{r=r_2} = hu_2 \cos \theta \sin^3 \theta \sin 5\varphi$;
 4) $(u_r - hu)|_{r=r_1} = -hu_0 \sin 2\theta \cos 3\varphi$, $u_r(r_2, \theta, \varphi) =$
 $= A \sin \theta \sin 2\theta \sin 6\varphi$;
 5) $u_r(r_1, \theta, \varphi) = \frac{A}{r_1^2} \sin^2 \varphi$, $u_r(r_2, \theta, \varphi) = \frac{3A}{2r_2^2} \sin^2 \theta \cos^2 2\varphi$.

2.895. В полушаре $\{x, y, z: x^2 + y^2 + z^2 < r_0^2, z > 0\}$ через плоскую часть поверхности поступает тепловой поток, плотность которого $q \sin m\varphi$, где $q = \text{const}$, $m = 1, 2, 3, \dots$. Решить стационарную задачу теплопроводности, если: 1) сферическая часть S_r поверхности поддерживается при нулевой температуре; 2) через S_r происходит теплообмен по закону Ньютона с внешней средой, температура которой равна нулю.

2.896. Найти ограниченное решение уравнения Лапласа в полушаре $\{x, y, z: x^2 + y^2 + z^2 < r_0^2, z > 0\}$, если $u|_{z=0} = 0$ и:
 1) $u(r_0, \theta, \varphi) = u_0 \sin 2\theta \sin 3\varphi$; 2) $u_r(r_0, \theta, \varphi) = A \sin 2\theta \sin 3\varphi$;
 3) $(u_r + hu)|_{r=r_0} = hu_0 \sin 2\theta \sin 3\varphi$.

2.897. Найти ограниченное решение уравнения Лапласа в полушаре $\{x, y, z: x^2 + y^2 + z^2 < r_0^2, z > 0\}$, если $u_z|_{z=0} = 0$ и:
 1) $u(r_0, \theta, \varphi) = u_0 \cos 6\varphi$; 2) $u_r(r_0, \theta, \varphi) = A \cos 6\varphi$;
 3) $(u_r + hu)|_{r=r_0} = hu_0 \cos 6\varphi$.

2.898. Найти ограниченное решение $u(r, \theta, \varphi)$ уравнения $\Delta u = 0$ в области $\Omega = \{r, \theta, \varphi: 0 < r < r_0, 0 < \theta < \pi, \varphi_1 < \varphi < \varphi_2\}$, если $u|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = 0$ и заданы следующие условия при $r = r_0$, $\varphi = \varphi_1$, $\varphi = \varphi_2$:

- 1) $u(r_0, \theta, \varphi) = u_0 \cos \theta \cos 4\varphi$, $u_\varphi(r, \theta, 0) = u_\varphi\left(r, \theta, \frac{\pi}{4}\right) = 0$;
 2) $u(r_0, \theta, \varphi) = u_0 \cos^3 \theta \cos 4\varphi$, $u\left(r, \theta, \frac{\pi}{8}\right) = u\left(r, \theta, \frac{7\pi}{8}\right) = 0$;
 3) $u(r_0, \theta, \varphi) = u_0 \sin \theta \sin 2\theta \cos 4\varphi$, $u_\varphi(r, \theta, 0) = u_\varphi\left(r, \theta, \frac{\pi}{2}\right) = 0$;
 4) $u(r_0, \theta, \varphi) = u_0 \sin 2\theta \cos 5\varphi$, $u_\varphi(r, \theta, 0) = u_\varphi\left(r, \theta, \frac{\pi}{5}\right) = 0$;
 5) $u_r(r_0, \theta, \varphi) = A \sin^2 \theta \sin 2\theta \sin 5\varphi$, $u(r, \theta, 0) = u_\varphi\left(r, \theta, \frac{3\pi}{2}\right) = 0$;
 6) $u_r(r_0, \theta, \varphi) = A \sin \theta \cos^3 \theta \sin 5\varphi$, $u_\varphi\left(r, \theta, \frac{\pi}{10}\right) = u_\varphi\left(r, \theta, \frac{9\pi}{10}\right) = 0$;
 7) $u_r(r_0, \theta, \varphi) = A \sin^2 \theta \cos \theta \sin 6\varphi$, $u(r, \theta, 0) = u_\varphi\left(r, \theta, \frac{\pi}{4}\right) = 0$;
 8) $u_r(r_0, \theta, \varphi) = A \cos^3 \theta \sin 6\varphi$, $u(r, \theta, 0) = u_\varphi\left(r, \theta, \frac{7\pi}{12}\right) = 0$;

- 9) $u_r(r_0, \theta, \varphi) = A \sin^4 \theta \cos \theta \sin 6\varphi$, $u(r, \theta, 0) = u_\varphi\left(r, \theta, \frac{\pi}{4}\right) = 0$;
 10) $(u_r + hu)|_{r=r_0} = hu_0 \cos \theta \cos 2\varphi$, $u\left(r, \theta, \frac{\pi}{4}\right) = u_\varphi\left(r, \theta, \frac{\pi}{2}\right) = 0$;
 11) $(u_r + hu)|_{r=r_0} = hu_0 \cos \theta \cos 6\varphi$, $u_\varphi(r, \theta, 0) = u_\varphi\left(r, \theta, \frac{2\pi}{3}\right) = 0$;
 12) $(u_r + hu)|_{r=r_0} = hu_0 \sin 2\theta \sin 3\varphi$, $u_\varphi\left(r, \theta, \frac{\pi}{6}\right) = u\left(r, \theta, \frac{\pi}{3}\right) = 0$.
 13) $(u_r + hu)|_{r=r_0} = hu_0 \sin^2 \theta \cos^3 \theta \cos 6\varphi$, $u_\varphi\left(r, \theta, \frac{\pi}{6}\right) =$
 $= u\left(r, \theta, \frac{7\pi}{12}\right) = 0$.

2.899. Найти ограниченное решение $u(r, \theta, \varphi)$ уравнения $\Delta u = 0$ в области $\Omega = \{r, \theta, \varphi: 0 < r < r_0, 0 < \theta < \pi, \varphi_1 < \varphi < \varphi_2\}$, если $\frac{\partial u}{\partial \theta}\Big|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = 0$ и заданы следующие условия при $r = r_0$, $\varphi = \varphi_1$,

$\varphi = \varphi_2$:

- 1) $u(r_0, \theta, \varphi) = u_0 \sin 2\varphi$, $u(r, \theta, 0) = u\left(r, \theta, \frac{\pi}{2}\right) = 0$;
 2) $u(r_0, \theta, \varphi) = u_0 \sin \theta \sin 3\varphi$, $u(r, \theta, 0) = u_\varphi\left(r, \theta, \frac{\pi}{2}\right) = 0$;
 3) $u(r_0, \theta, \varphi) = u_0 \cos^2 \theta \cos 4\varphi$, $u_\varphi\left(r, \theta, \frac{\pi}{4}\right) = u_\varphi\left(r, \theta, \frac{3\pi}{2}\right) = 0$;
 4) $u(r_0, \theta, \varphi) = u_0 \sin^2 \theta \sin 4\varphi$, $u\left(r, \theta, \frac{\pi}{4}\right) = u_\varphi\left(r, \theta, \frac{5\pi}{8}\right) = 0$;
 5) $u_r(r_0, \theta, \varphi) = A \sin^3 \theta \sin 5\varphi$, $u_\varphi\left(r, \theta, \frac{\pi}{2}\right) = u_\varphi\left(r, \theta, \frac{3\pi}{2}\right) = 0$;
 6) $u_r(r_0, \theta, \varphi) = A \sin \theta \cos^2 \theta \sin 5\varphi$, $u_\varphi\left(r, \theta, \frac{\pi}{5}\right) = u_\varphi\left(r, \theta, \frac{\pi}{2}\right) = 0$;
 7) $u_r(r_0, \theta, \varphi) = A \sin^2 \theta \cos 6\varphi$, $u_\varphi\left(r, \theta, \frac{\pi}{6}\right) = u_\varphi\left(r, \theta, \frac{\pi}{3}\right) = 0$;
 8) $u_r(r_0, \theta, \varphi) = A \sin^4 \theta \sin 6\varphi$, $u(r, \theta, 0) = u\left(r, \theta, \frac{\pi}{6}\right) = 0$;
 9) $(u_r + hu)|_{r=r_0} = hu_0 \sin^2 2\theta \sin 6\varphi$, $u_\varphi\left(r, \theta, \frac{\pi}{12}\right) = u\left(r, \theta, \frac{\pi}{6}\right) = 0$;
 10) $(u_r + hu)|_{r=r_0} = hu_0 \cos^2 \theta \sin 6\varphi$, $u(r, \theta, 0) = u_\varphi\left(r, \theta, \frac{\pi}{4}\right) = 0$;
 11) $(u_r + hu)|_{r=r_0} = hu_0 \cos 6\varphi$, $u_\varphi\left(r, \theta, \frac{\pi}{3}\right) = u\left(r, \theta, \frac{11\pi}{12}\right) = 0$.
 12) $(u_r + hu)|_{r=r_0} = hu_0 \sin^4 \theta \cos 6\varphi$, $u\left(r, \theta, \frac{\pi}{12}\right) = u_\varphi\left(r, \theta, \frac{\pi}{6}\right) = 0$.

2.900. Решить задачу Дирихле для уравнения Лапласа в области $\Omega = \{r, \theta, \varphi: 0 < r < r_0, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}, 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}\}$ при следу-

ющих условиях: $u(r_0, \theta, \varphi) = u_0 \sin 2\varphi$, $u\left(r, \frac{\pi}{2}, \varphi\right) = u(r, \theta, 0) = u\left(r, \theta, \frac{\pi}{2}\right) = 0$.

2.901. Решить задачу Неймана для уравнения Лапласа в области $\Omega = \{r, \theta, \varphi: 0 < r < r_0, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}, 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}\}$ при следующих условиях: $u_r(r_0, \theta, \varphi) = A \cos \theta \cos 2\varphi$, $u_\theta(r, \frac{\pi}{2}, \varphi) = u_\varphi(r, \theta, 0) = u_\varphi(r, \theta, \frac{\pi}{2}) = 0$.

2.902. Найти магнитное поле кругового тока (радиус r_0 , сила тока J). Рассмотреть предельный случай $r_0 \rightarrow 0$ при постоянном значении магнитного момента.

Пример 2.29. Решить задачу теплопроводности для шара B , радиус которого r_0 , если температура поверхности равна нулю, а начальная температура $u_0 \frac{r}{r_0} \sin \theta \sin \varphi$.

Решение. Распределение температуры в шаре при $t > 0$ описывается уравнением теплопроводности $u_t = a^2 \Delta u$ и условиями

$$u(r_0, \theta, \varphi, t) = 0, \quad u(r, \theta, \varphi, 0) = u_0 \frac{r}{r_0} \sin \theta \sin \varphi,$$

$$u \in C^2(B) \cap C(\overline{B}) \cap C^1(t > 0) \cap C(t \geq 0).$$

Согласно схеме метода Фурье $u(r, \theta, \varphi, t) = v(r, \theta, \varphi) T(t)$, где $T(t)$ — решение уравнения $T' + a^2 \lambda T = 0$, а $v(r, \theta, \varphi)$ — решение задачи на собственные значения

$$\begin{aligned} \Delta v + \lambda v &= 0, \\ v(r_0, \theta, \varphi) &= 0, \quad v \in C^2(B) \cup C(\overline{B}). \end{aligned} \quad (2.68)$$

Пусть $v(r, \theta, \varphi) = R(r) Y(\theta, \varphi)$, тогда задача (2.68) сводится к двум:

$$\begin{aligned} 1) \quad \Delta_{\theta, \varphi} Y + \alpha Y &= 0, \quad 2) \quad \frac{d}{dr} r^2 \frac{dR}{dr} - \alpha R + \lambda r^2 R = 0, \quad 0 < r < r_0, \\ Y &\in C(S_1); \quad |R(0)| < \infty, \quad R(r_0) = 0. \end{aligned}$$

Первая задача рассмотрена в примере 2.28, а уравнение второй задачи, в котором параметр $\alpha = n(n+1)$, преобразуется к уравнению Бесселя заменой $R(r) = r^{-\frac{1}{2}} Z(r)$. Ограниченным будет решение $R(r) = r^{-\frac{1}{2}} J_{n+\frac{1}{2}}(\sqrt{\lambda} r)$; оно удовлетворяет краевому условию при $r = r_0$, если $\lambda_{nk} = \mu_{n+\frac{1}{2}, k}^2 / r_0^2$,

где $\mu_{n+\frac{1}{2},k} > 0$, $k \in \mathbb{N}$, — нули функции $J_{n+\frac{1}{2}}(\mu)$. Итак, каждому собственному значению λ_{nk} соответствуют функции

$$v_{nkm}(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{r}} J_{n+\frac{1}{2}} \left(\frac{\mu_{n+\frac{1}{2},k}}{r_0} r \right) Y_n^m(\theta, \varphi),$$

$$T_{nk}(t) = A_{nk} e^{-a^2 \lambda_{nk} t},$$

с помощью которых формируется решение

$$u(r, \theta, \varphi, t) =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{m=-n}^n C_{nkm} J_{n+\frac{1}{2}} \left(\frac{\mu_{n+\frac{1}{2},k}}{r_0} r \right) Y_n^m(\theta, \varphi) e^{-\left(\frac{a \mu_{n+\frac{1}{2},k}}{r_0} \right)^2 t}.$$

При $t = 0$

$$\frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{n,k,m} C_{nkm} J_{n+\frac{1}{2}} \left(\frac{\mu_{n+\frac{1}{2},k}}{r_0} r \right) Y_n^m(\theta, \varphi) = u_0 \frac{r}{r_0} \sin \theta \sin \varphi.$$

Так как $\sin \theta \sin \varphi = Y_1^1(\theta, \varphi)$, то

$$C_{nkm} = \frac{u_0}{r_0 \|v_{nkm}\|^2} \int_0^{r_0} J_{n+\frac{1}{2}} \left(\frac{\mu_{n+\frac{1}{2},k}}{r_0} r \right) r^{\frac{5}{2}} dr \int_{S_1} Y_n^m Y_1^1 ds.$$

Из ортогональности сферических функций следует, что интеграл по единичной сфере

$$\int_{S_1} Y_n^m Y_1^1 ds = \|Y_1^1\|^2 \delta_{n1} \delta_{m1}.$$

Вычисление оставшегося интеграла основано на рекуррентных формулах (см. раздел Основные формулы) $(x^\nu J_\nu(x))' = x^\nu J_{\nu-1}(x)$ при $\nu = \frac{5}{2}$ и $J_{\nu-1}(x) + J_{\nu+1}(x) = \frac{2\nu}{x} J_\nu(x)$ при $\nu = \frac{3}{2}$, $x = \mu_{\frac{3}{2},k}$:

$$\int_0^{r_0} J_{\frac{3}{2}} \left(\frac{\mu_{\frac{3}{2},k}}{r_0} r \right) r^{\frac{5}{2}} dr = \left(\frac{r_0}{\mu_{\frac{3}{2},k}} \right)^{\frac{7}{2}} \int_0^{\mu_{\frac{3}{2},k}} J_{\frac{3}{2}}(x) x^{\frac{5}{2}} dx =$$

$$= \left(\frac{r_0}{\mu_{\frac{3}{2},k}} \right)^{\frac{7}{2}} \int_0^{\mu_{\frac{3}{2},k}} \frac{d}{dx} \left(x^{\frac{5}{2}} J_{\frac{5}{2}}(x) \right) dx = \frac{r_0^{\frac{7}{2}}}{\mu_{\frac{3}{2},k}^{\frac{7}{2}}} J_{\frac{5}{2}}(\mu_{\frac{3}{2},k}) = -\frac{r_0^{\frac{7}{2}}}{\mu_{\frac{3}{2},k}^{\frac{7}{2}}} J_{\frac{1}{2}}(\mu_{\frac{3}{2},k}).$$

Квадрат нормы определяется формулой (2.66) и выражением (2.108) в ответе к задаче (2.579):

$$\|v_{1k1}\|^2 = \frac{r_0^2}{2} \left[J'_{\frac{3}{2}} \left(\mu_{\frac{3}{2},k} \right) \right]^2 \|Y_1^1\|^2 = \frac{r_0^2}{2} J_{\frac{1}{2}}^2 \left(\mu_{\frac{3}{2},k} \right) \|Y_1^1\|^2.$$

Здесь окончательное выражение получено по рекуррентной формуле $xJ'_\nu(x) + \mu J_\nu(x) = xJ_{\nu-1}(x)$ при $\nu = \frac{3}{2}$, $x = \mu_{\frac{3}{2},k}$.

Таким образом,

$$c_{1k1} = -\frac{2u_0\sqrt{r_0}}{\mu_{\frac{3}{2},k} J_{\frac{1}{2}} \left(\mu_{\frac{3}{2},k} \right)}.$$

В результате

$$u(r, \theta, \varphi, t) = -2u_0 \sqrt{\frac{r_0}{r}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{J_{\frac{3}{2}} \left(\frac{\mu_{\frac{3}{2},k}}{r_0} r \right)}{\mu_{\frac{3}{2},k} J_{\frac{1}{2}} \left(\mu_{\frac{3}{2},k} \right)} e^{-\left(\frac{\mu_{\frac{3}{2},k}}{r_0} \right)^2 t} \sin \theta \sin \varphi.$$

2.903. В однородном шаре происходит диффузия нейтронов с размножением. Определить критический радиус шара (см. задачу 2.43), если: 1) концентрация нейтронов на его поверхности равна нулю; 2) вне шара — вакуум.

2.904. Найти уровни энергии частицы, масса которой m , находящейся в трехмерной потенциальной яме

$$U(r) = \begin{cases} 0, & r < r_0, \\ \infty, & r > r_0. \end{cases}$$

2.905. Частица, масса которой m , находится в трехмерной потенциальной яме

$$U(r) = \begin{cases} 0, & r < r_0, \\ U_0, & r > r_0. \end{cases}$$

При каком условии существуют связанные состояния?

2.906. Решить предыдущую задачу для трехмерной потенциальной ямы $U(r) = -U_0 \exp(-r/r_0)$, $U_0 > 0$, $r_0 > 0$.

2.907. Определить уровни энергии и волновые функции стационарных состояний частицы в трехмерной потенциальной яме

$$U(r) = \begin{cases} 0, & r \in (r_1, r_2), \\ \infty, & r \notin [r_1, r_2]. \end{cases}$$

2.908. Найти собственные колебания электромагнитного поля в сферическом резонаторе, радиус которого r_0 .

2.909. Решить задачу теплопроводности для однородного шара, радиус которого r_0 , если начальная температура шара равна $u_0 \frac{r}{r_0} \sin \theta \sin \varphi$, а температура его поверхности при любом $t > 0$ равна u_1 .

2.910. Поверхность однородного шара, радиус которого r_0 , теплоизолирована, начальная температура равна $u_0 \frac{r}{r_0} \sin \theta \cos \varphi$. Решить задачу теплопроводности.

2.911. Сфера, радиус которой r_0 , заполнена идеальным газом и движется по закону $w_0 t^2/2$. Найти в акустическом приближении потенциал скоростей газа при нулевых начальных условиях.

2.912. Неподвижная сфера, радиус которой r_0 , заполнена идеальным газом. В момент времени $t = 0$ сфера начинает двигаться с постоянной скоростью v_0 и в момент времени $t = t_0$ мгновенно останавливается. Найти в акустическом приближении потенциал скоростей газа.

2.913. Сфера, радиус которой r_0 , заполнена идеальным газом; равновесные давление и плотность газа P_0 и ρ_0 соответственно. С момента $t = 0$ поверхность сферы совершает малые радиальные колебания с заданной скоростью $V(r, \theta, \varphi, t)$. Определить в акустическом приближении потенциал скоростей газа при условиях: 1) $V(r, \theta, \varphi, t) = f(t)Y_n^m(\theta, \varphi)$, где $n > 0$; 2) $V(r, \theta, \varphi, t) = f(\theta) \sin \omega t$.

2.914. Через поверхность шара, радиус которого r_0 , происходит теплообмен по закону Ньютона с внешней средой. Решить задачу теплопроводности, если начальная температура шара равна $u_0 \frac{r}{r_0} \cos \theta$, температура внешней среды в любой момент времени $t > 0$ нулевая.

2.915. Поверхность шара, радиус которого r_0 , поддерживается при температуре $u_0 \cos 2\theta$. Какова температура шара при $t > 0$, если при $t = 0$ она равна нулю?

2.916. Определить температуру шара, радиус которого r_0 , если температура его поверхности $\mu(t) \cos \theta$, а начальная температура равна нулю.

2.917. Поверхность шара, радиус которого r_0 , поддерживается при температуре $f(\theta) \sin \varphi$. Определить температуру шара при $t > 0$, если при $t = 0$ она равна нулю.

2.918. Внутри шара через поверхность поступает радиальный тепловой поток, плотность которого $q_0 Y_n^m(\theta, \varphi)$. Решить задачу теплопроводности, если начальная температура равна нулю, радиус шара r_0 .

2.919. Шар ($r < r_0$) нагревается радиальным тепловым потоком, плотность которого $q_0 \cos \theta$, в течение времени от $t = 0$ до $t = t_0 > 0$, затем поверхность покрывается теплоизоляцией. Определить температуру шара при $t > 0$, если при $t = 0$ она равна нулю.

2.920. Поверхность шара ($r < r_0$) нагревается радиальным тепловым потоком, плотность которого $f(\theta) \cos \varphi$. Определить температуру шара при $t > 0$, если начальная температура равна нулю.

2.921. Через поверхность шара ($r < r_0$) происходит теплообмен по закону Ньютона с внешней средой, температура которой $u_0 e^{-\alpha t} \cos \theta$. Решить задачу теплопроводности при нулевой начальной температуре.

2.922. Определить температуру однородного шара ($r < r_0$), если начальная температура равна нулю, а через поверхность происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой $\mu(t) Y_n^m(\theta, \varphi)$.

2.923. Найти температуру сферического слоя ($r_1 < r < r_2$), если температура его поверхностей равна нулю, а начальная температура $u_0 \left(\frac{r}{r_2}\right)^n Y_n(\theta, \varphi)$.

2.924. Проводящий шар (радиус r_0 , $\mu = 1$) находится в магнитном поле $\mathbf{H}_0 \exp(i\omega t)$. Определить установившееся магнитное поле в шаре в квазистационарном приближении.

Пример 2.30. Неограниченный твердый цилиндр, радиус которого r_0 , совершает гармонические колебания в фиксированном направлении, перпендикулярном к оси; частота колебаний ω , амплитуда A . Найти полную интенсивность $I(r)$ излучения звука на больших расстояниях от цилиндра при условиях: $A \ll r_0$, $\omega A \ll a$; интенсивность $I(r)$ равна среднему по времени потоку энергии через цилиндрическую поверхность, радиус которой r , длина (вдоль оси) равна единице:

$$I(r) = \int_0^{2\pi} I(r, \varphi) r d\varphi, \quad I(r, \varphi) = (PV_r) = \frac{1}{T} \int_0^T PV_r dt.$$

Решение. Установившиеся давление и скорость газа являются периодическими функциями времени,

$$P(\mathbf{r}, t) = \operatorname{Re}(p(\mathbf{r})e^{i\omega t}), \quad \mathbf{V}(\mathbf{r}, t) = \operatorname{Re}(\mathbf{v}(\mathbf{r})e^{i\omega t}).$$

В данном случае справедливо акустическое приближение, так что (пример 1.17)

$$\begin{aligned} \Delta p + k^2 p &= 0, \quad r_0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ \left. \frac{\partial p}{\partial r} \right|_{r=r_0} &= \rho_0 \omega^2 A \cos \varphi, \\ p &= O\left(\frac{1}{\sqrt{r}}\right), \quad \frac{\partial p}{\partial r} + ikp = o\left(\frac{1}{\sqrt{r}}\right), \quad r \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Функции $p(\mathbf{r})$ и $\mathbf{v}(\mathbf{r})$ связаны соотношением (1.82),

$$\mathbf{v} = \frac{i}{\omega \rho_0} \nabla p. \quad (2.69)$$

Пусть $p(r, \varphi) = f(r) \cos \varphi$, тогда

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{df}{dr} + \left(k^2 - \frac{1}{r^2}\right) f &= 0, \quad r_0 < r, \\ \left. \frac{df}{dr} \right|_{r=r_0} &= \rho_0 A \omega^2, \\ f(r) &= O\left(\frac{1}{\sqrt{r}}\right), \quad \frac{\partial f}{\partial r} + ikf = o\left(\frac{1}{\sqrt{r}}\right), \quad r \rightarrow \infty. \end{aligned} \quad (2.70)$$

В качестве фундаментальной системы решений уравнения (2.70) следует выбрать функции Ганкеля $H_1^{(1)}(kr)$, $H_1^{(2)}(kr)$, которые при $r \rightarrow \infty$ представляют собой сходящуюся и расходящуюся цилиндрические волны. Условиям излучения удовлетворяет

$$f(r) = C H_1^{(2)}(kr), \quad C = \frac{\rho_0 A \omega^2}{\left(\frac{dH_1^{(2)}}{dr}\right)\Big|_{r=r_0}}.$$

При $r \rightarrow \infty$ давление и радиальная скорость (см. (2.69)) имеют вид

$$p(r, \varphi) = \frac{\rho_0 \omega^2 A}{\left(\frac{dH_1^{(2)}}{dr}\right)\Big|_{r=r_0}} \sqrt{\frac{2}{\pi kr}} e^{-i(kr - \frac{3}{4}\pi)} \cos \varphi, \quad v_r = \frac{kp}{\omega \rho_0}.$$

Интенсивность излучения звука есть результат усреднения:

$$I(r, \varphi) (\text{Re } P, \text{Re } V_r) = \frac{2\rho_0 A^2 \omega^3 \cos^2 \varphi}{\pi r} \left\{ \left(\text{Re} \left[\frac{e^{-i(kr - \frac{3}{4}\pi - \omega t)}}{\left(\frac{dH_1^{(2)}}{dr} \right) \Big|_{r=r_0}} \right] \right)^2 \right\}_{\text{cp}}.$$

Если $\lambda \gg r_0$ (т.е. $kr_0 \ll 1$), то

$$\left(\frac{dH_1^{(2)}}{dr} \right) \Big|_{r=r_0} \approx \frac{2i}{\pi k r_0^2}.$$

Следовательно,

$$I(r, \varphi) = \frac{\pi \rho_0 r_0^4 A^2 \omega^5 \cos^2 \varphi}{4a^2 r}.$$

Полная интенсивность

$$I = \frac{\pi^2 \rho_0 r_0^4 A^2 \omega^5}{4a^2}.$$

С уменьшением частоты ω интенсивность звука падает (как ω^5), и возрастает (как (r_0^4)) с ростом радиуса. Именно этим объясняется разная толщина струн музыкальных инструментов: чем ниже частота звука струны, тем толще струна.

2.925. Найти полную интенсивность излучения звука вибрирующим цилиндром (пример 2.30), если $A \ll \lambda \ll r_0$.

2.926. Найти полную интенсивность излучения звука на больших расстояниях от цилиндра, радиус которого меняется по закону $r_0 + A \cos \omega t$, если $A \ll r_0 \ll \lambda$, $\lambda = 2\pi a/\omega$.

2.927. Решить предыдущую задачу, если $A \ll \lambda \ll r_0$.

2.928. Твердый шар, радиус которого r_0 , совершает гармонические колебания вдоль фиксированной оси, частота колебаний ω , амплитуда A . Найти полную интенсивность излучения звука на больших расстояниях от шара, если $A \ll r_0$, $\omega A \ll a$.

2.929. Найти полную интенсивность звука, излучаемого сферой, на больших расстояниях, если радиус сферы меняется по закону $r_0 + A \cos \omega t$, $A \ll r_0$, $\omega A \ll a$.

2.930. На длинный неподвижный цилиндр падает плоская звуковая волна; давление в волне $P_0 \exp(i(\omega t - \mathbf{k}\mathbf{r}))$, волновой вектор $\mathbf{k}$ перпендикулярен оси цилиндра, радиус цилиндра r_0 .

Определить в акустическом приближении давление в рассеянной волне.

2.931. Определить интенсивность $I(r, \varphi)$ и полную интенсивность I излучения звука цилиндром при условиях предыдущей задачи.

2.932. Какая сила действует на единицу длины цилиндра при условиях задачи 2.930, если длина волны: 1) $\lambda \gg r_0$; 2) $\lambda \ll r_0$?

2.933. На идеально проводящий неограниченный цилиндр, радиус которого r_0 , падает плоская электромагнитная волна; электрическое поле волны $\mathbf{E}_0 \exp(i(\omega t - \mathbf{kr}))$, где вектор $\mathbf{E}_0$ параллелен оси цилиндра. Найти рассеянную электромагнитную волну, а также мощность энергии излучения на больших расстояниях от цилиндра, если $\lambda \gg r_0$.

2.934. На твердый неподвижный шар ($r < r_0$) падает плоская звуковая волна, давление в которой $P_0 \exp(i(\omega t - \mathbf{kr}))$. Найти давление в рассеянной волне.

2.935. Определить интенсивность $I(r, \theta)$ и полную интенсивность I рассеянной шаром волны (задача 2.934) на больших расстояниях от шара при условии $\lambda \gg r_0$.

2.936. Какая сила действует на шар при условиях задачи 2.934, если длина волны: 1) $\lambda \gg r_0$; 2) $\lambda \ll r_0$?

2.937. Определить установившееся электромагнитное поле точечного электрического диполя, момент которого $\mathbf{p}_0 e^{i\omega t}$, где $\mathbf{p}_0$ — постоянный вектор. Определить мощность излучения диполя.

2.938. Найти установившееся электромагнитное поле излучающей антенны, расположенной на расстоянии l от поверхности земли: 1) параллельно поверхности; 2) перпендикулярно поверхности. Антенна моделируется точечным электрическим диполем с моментом $\mathbf{p}_0 \exp(i\omega t)$, поверхность земли — идеально проводящей плоскостью.

2.939. Определить установившееся электромагнитное поле точечного магнитного диполя, момент которого $\mathbf{M}_0 e^{i\omega t}$, где $\mathbf{M}_0$ — постоянный вектор.

2.940. Точечный магнитный диполь с моментом $\mathbf{M}_0 e^{i\omega t}$ расположен на расстоянии l от идеально проводящей плоскости $z = 0$ (магнитная антенна над поверхностью земли). Определить установившееся электромагнитное поле диполя, если: 1) $\mathbf{M}_0 = M_0 \mathbf{e}_z$; 2) $\mathbf{M}_0 = M_0 \mathbf{e}_x$, где $\mathbf{M}_0$ — постоянный вектор.

Пример 2.31. Для изучения вращательно-колебательного спектра двухатомной молекулы используется сферически симметричный потенциал

$$U(r) = -2U_0 \left(\frac{r_0}{r} - \frac{r_0^2}{2r^2} \right), \quad U_0 > 0.$$

Определить уровни энергии частицы в таком поле.

Решение. Волновая функция, описывающая стационарное состояние частицы, является собственной функцией оператора энергии

$$\begin{aligned} \Delta\psi + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + 2U_0 \left(\frac{r_0}{r} - \frac{r_0^2}{2r^2} \right) \right) \psi &= 0, \\ 0 < r, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ |\psi| < \infty, \quad \int_{R^3} |\psi|^2 d\mathbf{r} &= 1. \end{aligned}$$

Методом Фурье эта задача для функции $\psi = \frac{1}{r}R(r)Y(\theta, \varphi)$ сводится к двум:

$$\begin{aligned} 1) \quad \Delta Y + \beta Y &= 0, \\ Y &\in C(S_1), \\ 2) \quad R'' + \left(-\frac{2m|E|}{\hbar^2} + \frac{4mU_0r_0}{\hbar^2r} - \frac{\beta\hbar^2 + 2mU_0r_0^2}{\hbar^2r^2} \right) R &= 0, \\ 0 < r, \\ R(0) = 0, \quad \int_0^\infty R^2(r)dr &= 1. \end{aligned}$$

Первая задача имеет при $\beta = l(l+1)$, $l \in \mathbb{N}_0$, нетривиальные решения $Y_l^m(\theta, \varphi)$ (пример 2.28), а вторая в безразмерных переменных $\xi = 2sr/r_0$, $s = \sqrt{2m|E|}r_0/\hbar$ запишется в виде

$$R'' + \left(-\frac{1}{4} + \frac{b^2}{s\xi} - \frac{l(l+1) + b^2}{\xi^2} \right) R = 0, \quad 0 < \xi, \quad (2.71)$$

$$\left| \frac{R(\xi)}{\xi} \right| < \infty, \quad \int_0^\infty R^2 d\xi < \infty, \quad b^2 = \frac{2mU_0r_0^2}{\hbar^2}. \quad (2.72)$$

Уравнение (2.71) принадлежит классу уравнений вида

$$u'' + \frac{\tilde{\tau}(z)}{\sigma(z)}u' + \frac{\tilde{\sigma}(z)}{\sigma^2}u = 0, \quad (2.73)$$

где $\tilde{\tau}$ — полином не выше первой степени, а σ и $\tilde{\sigma}$ — полиномы не выше второй степени. В книге [63] разработана теория таких дифференциальных уравнений и предложен метод приведения их к наиболее простой форме. С этой целью сначала вводится замена $u(z) = \varphi(z)v(z)$, приводящая к уравнению

$$v'' + \left(2\frac{\varphi'}{\varphi} + \frac{\tilde{\tau}}{\sigma}\right)v' + \left(\frac{\varphi''}{\varphi} + \frac{\varphi'}{\varphi}\frac{\tilde{\tau}}{\sigma} + \frac{\tilde{\sigma}}{\sigma^2}\right)v = 0. \quad (2.74)$$

Затем функция φ выбирается так, чтобы тип уравнения (2.74) был таким же, что и (2.73). Для этого нужно, чтобы коэффициент при v' был равен $\frac{\tau}{\sigma}$, где τ — полином не выше первой степени, т. е.

$$\frac{\varphi'}{\varphi} = \frac{\pi(z)}{\sigma(z)}; \quad (2.75)$$

при этом

$$2\pi(z) = \tau(z) - \tilde{\tau}(z). \quad (2.76)$$

Тогда из соотношения

$$\frac{\varphi''}{\varphi} = \left(\frac{\varphi'}{\varphi}\right)' + \left(\frac{\varphi'}{\varphi}\right)^2 \left(\frac{\pi}{\sigma}\right)' + \left(\frac{\pi}{\sigma}\right)^2$$

вытекает, что коэффициент при v в (2.74) равен σ_1/σ^2 , где

$$\sigma_1 = \tilde{\sigma} + \pi^2 + \pi(\tilde{\tau} - \sigma') + \pi'\sigma, \quad (2.77)$$

и уравнение (2.74) запишется в виде

$$v'' + \frac{\tau}{\sigma}v' + \frac{\sigma_1}{\sigma^2}v = 0. \quad (2.78)$$

Если распорядиться пока еще произвольными коэффициентами полинома $\pi(z)$ так, чтобы

$$\sigma_1 = \lambda\sigma, \quad (2.79)$$

где λ — некоторая константа, то уравнение (2.78) приобретает более простую форму

$$\sigma v'' + \tau v' + \lambda v = 0 \quad (2.80)$$

и называется уравнением гипергеометрического типа.

Из условия (2.79), записанного в виде

$$\pi^2 + (\tilde{\tau} - \sigma') + \tilde{\sigma} - k\sigma = 0,$$

где

$$k = \lambda - \pi'(z), \quad (2.81)$$

следует, что

$$\pi(z) = \frac{\sigma' - \tilde{\tau}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma' - \tilde{\tau}}{2}\right)^2 - \tilde{\sigma} + k\sigma}. \quad (2.82)$$

Так как $\pi(z)$ — полином, то дискриминант квадратного трехчлена под корнем равен нулю. Из этого условия можно найти k и затем π , φ , τ , λ по формулам (2.82), (2.75), (2.76), (2.81).

Уравнению (2.80) можно придать самосопряженную форму

$$\frac{d}{dz} \rho \sigma \frac{dv}{dz} + \lambda \rho v = 0 \quad (2.83)$$

умножением на функцию ρ , которая удовлетворяет уравнению $(\sigma\rho)' = \tau\rho$ (оно следует из сравнения коэффициентов в уравнениях (2.80) и (2.83)). С уравнением гипергеометрического типа связана следующая задача на собственные значения: пусть положительная и ограниченная на интервале (a, b) функция $\rho(x)$ такова, что

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \rho \sigma &= \rho \tau, \\ \forall k \in \mathbb{N}_0: \sigma \rho x^k \Big|_{x=a, x=b} &= 0. \end{aligned} \quad (2.84)$$

Тогда нетривиальное решение $v(x)$ уравнения (2.83) при условии ограниченности и квадратичной интегрируемости на (a, b) функции $v(x)\sqrt{\rho(x)}$ существует лишь при

$$\lambda = \lambda_n = -n\tau' - \frac{n(n-1)}{2}\sigma'', \quad n \in \mathbb{N}_0, \quad (2.85)$$

и имеет вид

$$v_n(x) = \frac{B_n}{\rho(x)} \frac{d^n}{dx^n} [\sigma^n(x) \rho(x)], \quad (2.86)$$

где B_n — константа. Для выполнения условий (2.84), налагаемых на $\rho(x)$, необходимо, чтобы

$$\begin{aligned} \exists x_0 \in (a, b): \tau(x_0) &= 0, \\ \forall x \in (a, b): \tau'(x) &< 0. \end{aligned} \quad (2.87)$$

Уравнение (2.71) является частным случаем (2.73) при

$$\tilde{\tau} = 0, \quad \tilde{\sigma}(\xi) - \frac{1}{4}\xi^2 + \frac{b^2}{s}\xi - [l(l+1) + b^2], \quad \sigma = \xi.$$

Квадратный трехчлен под корнем выражения (2.82),

$$\frac{1}{4}\xi^2 + \left(k - \frac{b^2}{s}\right)\xi + \frac{(2l+1)^2 + 4b^2}{4},$$

имеет дискриминант $(k - b^2/s) - \alpha^2/4$, где $\alpha^2 = (2l+1)^2 + 4b^2$.

Дискриминант обращается в нуль при $k_{1,2} = \frac{b^2}{s} \pm \frac{\alpha}{2}$, следовательно, $\pi(\xi) = \frac{1}{2} \pm \left(\frac{\xi}{2} \pm \frac{\alpha}{2}\right)$, $\tau = \pm(\xi \pm \alpha)$; условия (2.87) выполняются для $\tau(\xi) = 1 + \alpha - \xi$, так что

$$\begin{aligned}\pi &= \frac{1 + \alpha - \xi}{2}, \quad \varphi = \xi^{\frac{\alpha+1}{2}} e^{-\frac{\xi}{2}}, \quad \rho = \xi^\alpha e^{-\xi}, \\ k &= \frac{b^2}{s} - \frac{\alpha}{2}, \quad \lambda = \frac{b^2}{s} - \frac{\alpha+1}{2}.\end{aligned}$$

Итак,

$$R(\xi) = \xi^{\frac{\alpha+1}{2}} e^{-\frac{\xi}{2}} v(\xi),$$

где $v(\xi)$ — решение уравнения (2.80),

$$\xi v'' + (\alpha + 1 - \xi)v' + \left(\frac{b^2}{s} - \frac{\alpha+1}{2}\right)v = 0, \quad 0 < \xi,$$

при условиях

$$\left| \xi^{\frac{\alpha-1}{2}} e^{-\frac{\xi}{2}} v(\xi) \right| < \infty, \quad \int_0^\infty \xi^{\alpha+1} e^{-\xi} v^2(\xi) d\xi < \infty,$$

которые следуют из (2.72). Условия применимости формул (2.85), (2.86) выполняются, поэтому

$$v_n(\xi) = C_n L_n^\alpha(\xi), \quad \frac{b^2}{s} - \frac{\alpha+1}{2} = n \in \mathbb{N}_0.$$

Отсюда

$$\begin{aligned}E_{nl} &= -\frac{\hbar^2}{2mr_0^2} s_{nl}^2 - \frac{\hbar^2 b^4}{2mr_0^2} \left(n + \frac{1}{2} + \sqrt{b^2 + \left(l + \frac{1}{2}\right)^2} \right)^{-2}, \\ R_{nl}(r) &= C_{nl} \left(\frac{2s_{nl}}{r_0} r \right)^{\frac{\alpha+1}{2}} L_n^\alpha \left(\frac{2s_{nl}}{r_0} r \right) e^{-\frac{s_{nl}}{r_0} r}, \quad n, l \in \mathbb{N}_0.\end{aligned}$$

Вычисление нормы $\|R_{nl}\|$ основано на рекуррентной формуле и ортогональности полиномов Лагерра $L_n^\alpha(\xi)$:

$$\begin{aligned}\|R_{nl}\|^2 &= C_{nl}^2 \frac{r_0}{2s_{nl}} \int_0^\infty \xi^{\alpha+1} e^{-\xi} (L_n^\alpha(\xi))^2 d\xi = \\ &= C_{nl}^2 \frac{r_0}{2s_{nl}} \int_0^\infty \xi^\alpha e^{-\xi} (2n + \alpha + 1) (L_n^\alpha(\xi))^2 d\xi = \\ &= C_{nl}^2 \frac{r_0}{2s_{nl}} (2n + \alpha + 1) \frac{\Gamma(\alpha + 1)}{n!}.\end{aligned}$$

Потенциал $U(r)$ имеет минимум $U(r_0) = -U_0$. В окрестности точки r_0

$$U(r) = -U_0 + \frac{m\omega^2}{2}(r - r_0)^2 + \dots,$$

где $\omega^2 = \frac{2U_0}{mr_0^2}$. При $b \gg 1$ и небольших n и l

$$\begin{aligned}E_{nl} &\approx -U_0 \left[1 - \frac{2}{b} \left(n + \frac{1}{2} \right) - \frac{1}{b^2} \left(l + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{b^2} \left(n + \frac{1}{2} \right)^2 \right] = \\ &= -U_0 + \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) + \frac{\hbar^2}{2mr_0^2} \left(l + \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{3\hbar^2}{2mr_0^2} \left(n + \frac{1}{2} \right)^2.\end{aligned}$$

Второе слагаемое характеризует энергию гармонических колебаний, последнее учитывает ангармоничность, а третье слагаемое представляет собой энергию вращательного движения. Основной вклад в энергию низких колебаний вносят гармонические колебания, что согласуется с формой потенциала вблизи точки $r = r_0$ (см. задачу 2.951).

2.941. Идеальная несжимаемая жидкость заполняет круглый бассейн, радиус которого r_0 ; поверхность дна бассейна имеет форму

$$h(r) = h_0 \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2} \right), \quad h_0 \ll r_0.$$

В жидкости возбуждаются длинные гравитационные волны малой амплитуды (амплитуда волны A , длина λ). Определить две первые (наименьшие) частоты колебаний жидкости при условии $A \ll h_0 \ll \lambda$.

2.942. Решить уравнение Шредингера для связанного состояния электрона в поле бесконечно тяжелого ядра с зарядом Ze .

2.943. Найти волновые функции и уровни энергии стационарных состояний частицы, масса которой m , в двумерном потенциальном поле $U(r) = \frac{1}{2}m\omega^2 r^2$ (круговой осциллятор).

2.944. Найти энергию и волновые функции стационарных состояний частицы (масса частицы m) в сферически симметричном трехмерном поле, потенциал которого $U(r) = \frac{1}{2}m\omega^2 r^2$.

2.945. Найти волновые функции и уровни энергии стационарных состояний частицы, масса которой m , в трехмерном потенциальном поле

$$U(r) = U_0 \left(\frac{r^2}{r_0^2} + \alpha \frac{r_0^2}{r^2} \right), \quad U_0 > 0, \quad \alpha > 0.$$

2.946. Электрон находится в постоянном однородном магнитном поле $\mathbf{B}$. Определить волновые функции и энергию стационарных состояний электрона.

2.947. Определить уровни энергии стационарных состояний частицы, масса которой m , в одномерной потенциальной яме

$$U(x) = -\frac{U_0}{\operatorname{ch} \frac{x}{a}}, \quad U_0 > 0, \quad a > 0.$$

2.948. Частица, масса которой m , находится в трехмерной потенциальной яме

$$U(r) = -\frac{U_0}{e^{\frac{r}{r_0}} - 1}, \quad U_0 > 0, \quad r_0 > 0.$$

Определить уровни энергии стационарных состояний частицы с моментом, равным нулю.

2.949. Найти волновые функции и уровни энергии стационарных состояний линейного гармонического осциллятора.

2.950. Линейный гармонический осциллятор, заряд которого e , находится в однородном электростатическом поле $\mathbf{E}$. Найти волновые функции стационарных состояний и уровни энергии осциллятора.

2.951. Начальное состояние линейного гармонического осциллятора описывается волновой функцией

$$\Psi(x, 0) = A e^{-\frac{1}{2}\alpha^2(x-x_0)^2}, \quad \alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}.$$

Найти $|\Psi(x, t)|^2$ при $t > 0$. Рассмотреть предельные случаи малых и больших (по сравнению с шириной начального волнового пакета) значений $|x_0|$.

2.952. Для описания взаимодействия атомов в двухатомной молекуле применяется сферически симметричный потенциал

$$U(r) = U_0 \left(e^{-2\kappa \frac{r-r_0}{r_0}} - 2e^{-\kappa \frac{r-r_0}{r_0}} \right), \quad U_0 > 0, \quad \kappa > 0.$$

Определить энергию стационарных состояний частицы с моментом, равным нулю, при условиях: $1 \ll b$, $\ln b \ll \exp(\kappa)$, где величина $b = 2r_0\sqrt{2mU_0}/(\kappa\hbar)$. Получить приближенную формулу для энергии низких уровней.

2.953. Для описания взаимодействия нейтрона с тяжелым ядром применяется сферически симметричный потенциал

$$U(r) = -\frac{U_0}{1 + e^{\frac{r-r_0}{a}}}, \quad U_0 > 0, \quad 0 < a \ll r_0,$$

где r_0 — радиус ядра, параметр a характеризует «толщину» поверхностного слоя ядра (при $a \rightarrow 0$ получается прямоугольная потенциальная яма). Определить энергию связанных состояний частицы с моментом, равным нулю, с точностью до величин второго порядка малости относительно a/r_0 .

2.954. Если изменение показателя преломления $n(x)$ по сечению плоского симметричного волновода (задача 1.475) невелико, то функцию $n(x)$ можно аппроксимировать первыми членами ряда Тейлора; это приводит к модели волновода с усеченным параболическим профилем показателя преломления

$$n(x) = \begin{cases} n_1 \left(1 - \Delta \left(\frac{x}{l} \right)^2 \right), & |x| \leq l, \\ n_2 = \text{const}, & |x| > l, \end{cases}$$

$$\Delta = \frac{n_1 - n_2}{n_1} \ll 1.$$

Решить задачу о распространении высокочастотных (сравнительно с частотой отсечки) TE - и TM -мод в таком волноводе.

2.955. Решить задачу о распространении высокочастотных (по сравнению с частотой отсечки) электромагнитных волн в слабо направляющем оптическом волокне с α -профилем показателя преломления (1.125) при $\alpha = 2$.

2.956. Решить предыдущую задачу (2.955) в прямоугольных координатах.

2.957. Показатель преломления

$$n^2(x) = n_1^2 + \frac{n_1^2 - n_2^2}{\operatorname{ch}^2 \frac{2x}{l}}$$

в плоском волноводе моделирует профиль, который формируется диффузионным процессом. Решить задачу о распространении TE -мод; дать выражения для поля двух мод низшего порядка.

2.958. Для изучения отражения радиоволн от ионосферы используется модель волновода с асимметричным профилем показателя преломления

$$n^2(x) = n_3^2 + \frac{n_2^2 - n_3^2}{1 + e^{\frac{2x}{l}}} e^{\frac{2x}{l}} + \frac{4n_1^2 - 2(n_2^2 + n_3^2)}{\left(1 + e^{\frac{2x}{l}}\right)^2} e^{\frac{2x}{l}}.$$

Решить задачу о распространении TE -мод; дать выражение для поля моды низшего порядка.

2.4. Ответы

2.1. У к а з а н и я: 1) Применить соотношение $\operatorname{div}(pv\nabla u) = v \operatorname{div}(p\nabla u) + p(\nabla u \nabla v)$ и формулу Остроградского; 2) в первой формуле поменять местами u и v и полученную формулу вычесть из исходной.

2.2. Р е ш е н и е. 1) Множество называется линейным, если оно содержит линейную комбинацию любых двух своих элементов. Линейность следует из неравенства для комплексных чисел:

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 &= (z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) = \\ &= |z_1|^2 + z_1\bar{z}_2 + \bar{z}_1z_2 + |z_2|^2 \leq |z_1|^2 + 2|z_1||z_2| + |z_2|^2 \leq 2|z_1|^2 + |z_2|^2, \end{aligned}$$

так как $(a + b)^2 \geq 2\sqrt{ab}$, для $a \geq 0, b \geq 0$. 2) Существование скалярного произведения гарантируется неравенством Коши–Буняковского,

$$\left| \int_{\Omega} fg \rho dx \right| \leq \sqrt{\int_{\Omega} |f|^2 \rho dx} \sqrt{\int_{\Omega} |g|^2 \rho dx}.$$

3) Первые два свойства нормы очевидны. Третье вытекает из неравенства Минковского,

$$\|f + g\|^2 \leq (\|f\| + \|g\|)^2,$$

доказательство которого основано на неравенстве Коши–Буняковского:

$$\begin{aligned} \|f + g\|^2 &= (f + g, f + g) = \\ &= \|f\|^2 + (fg) + (gf) + \|g\|^2 \leq \|f\|^2 + 2\|f\|\|g\| + \|g\|^2 = (\|f\| + \|g\|)^2. \end{aligned}$$

2.3. Решение. Достаточно доказать положительность оператора. Выражение для квадратичной формы получается из формулы Грина (2.16) при $v = \bar{u}$:

$$(\mathcal{L}u, u) = \int_{\Omega} (p|\nabla u|^2 + q|u|^2) dx - \int_S p\bar{u} \frac{\partial u}{\partial n} ds.$$

Из граничного условия на поверхности S следует, что

$$\beta \frac{\partial u}{\partial n} \bar{u} = -\alpha |u|^2,$$

поэтому квадратичная форма

$$(\mathcal{L}u, u) = \int_{\Omega} (p|\nabla u|^2 + q|u|^2) dx + \left| \int_S p\bar{u} \frac{\partial u}{\partial n} ds \right|. \quad (2.88)$$

неотрицательна.

2.4. Решение. 1) Поскольку оператор положителен, то

$$\mathcal{L}u = \lambda u \implies (\mathcal{L}u, u) = \lambda(u, u) \implies \lambda = \frac{(\mathcal{L}u, u)}{\|u\|^2} \geq 0.$$

2) Пусть $u_1 + iu_2$ — собственная функция. В силу вещественности $\mathcal{L}$ и λ

$$\mathcal{L}(u_1 + iu_2) = \lambda(u_1 + iu_2) \implies \mathcal{L}u_1 = \lambda u_1, \quad \mathcal{L}u_2 = \lambda u_2.$$

Собственная функция $u_1 + iu_2 \neq 0$, поэтому (хотя бы одна из функций) u_1 либо u_2 отлична от нуля и является собственной.

3) Необходимость. Если $\lambda = 0$ собственное значение, то существует нетривиальное решение u_0 уравнения $\mathcal{L}u = 0$. В этом случае $(\mathcal{L}u_0, u_0) = 0$, так что правая часть (2.88) равна нулю, откуда

$$\nabla u_0 = 0 \implies u_0 = C, \quad q(x)u_0 = 0 \implies q(x) = 0.$$

Равенство $\alpha(x) = 0$ содержится в граничном условии:

$$\left(\alpha(x)u_0 + \beta(x) \frac{\partial u_0}{\partial n} \right) \Big|_S = 0 \implies \alpha(x)u_0|_S = 0 \implies \alpha(x) = 0.$$

Достаточность. Если $\alpha(x) = q(x) = 0$, то задача на собственные значения

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(p\nabla u) + \lambda \rho u &= 0, \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_S &= 0 \end{aligned}$$

при $\lambda = 0$ имеет нетривиальное решение $u_0 = C$.

4) Если λ_1, u_1 и λ_2, u_2 — собственные функции и собственные значения оператора $\mathcal{L}$, то

$$\begin{cases} \mathcal{L}u_1 = \lambda_1, \\ \mathcal{L}u_2 = \lambda_2, \end{cases} \implies (\mathcal{L}u_1, u_2) - (\mathcal{L}u_2, u_1) = (\lambda_1 - \lambda_2)(u_1, u_2).$$

Левая часть результирующего равенства в силу эрмитовости оператора равна нулю, стало быть $(u_1, u_2) = 0$.

2.5. $\omega_n = \frac{\pi}{2l} \sqrt{\frac{T_0}{\rho_0}} n$, $X_n(x) = A_n \sin \frac{\pi n}{2l} \left(1 + \frac{x}{l}\right)$, $n \in \mathbb{N}$; множество функций $X_n(x)$ — объединение двух подмножеств: $X_{2m}(x) = B_{2m} \sin \frac{\pi n x}{l}$ — нечетные функции, $X_{2m+1}(x) = B_{2m+1} \cos \frac{\pi (2m+1)x}{2l}$ — четные функции.

2.6. $\omega_n = \frac{\pi}{l} \sqrt{\frac{T_0}{\rho_0}} \left(n + \frac{1}{2}\right)$, $n \in \mathbb{N}_0$.

2.7. 1) $\omega_n = \frac{\pi a}{l} \left(n + \frac{1}{2}\right)$, $\omega_n = \frac{\pi a}{l} \left(2n + 1 \pm \frac{1}{\pi} \arccos \frac{1}{3}\right)$, $n \in \mathbb{N}$.

2) $\omega_n = \frac{2\pi a}{l} n$, $n \in \mathbb{N}$, $\omega_n = \frac{7\pi a}{3l} \left(n + (-1)^n \frac{1}{6}\right)$, $n \in \mathbb{N}_0$;

$\omega_n = \frac{7\pi a}{3l} \left(2n + 1 \pm \frac{1}{\pi} \arccos \frac{3}{4}\right)$, $n \in \mathbb{N}_0$, $a = \sqrt{\frac{T_0}{\rho_0}}$.

2.8. $\omega_n = \frac{\pi a n}{l}$, $X_n(x) = A_n \sin \frac{\pi n x}{l}$, $\omega_s = \frac{\mu_s a}{l}$, $X_s(x) = A_s \sin \mu_s \left(1 - \frac{|x|}{l}\right)$,

где $a = \sqrt{\frac{T_0}{\rho_0}}$, $\mu_s > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = \frac{2\rho_0 l}{m}$, $n, s \in \mathbb{N}$.

2.9. $\omega_n = \frac{\pi \omega n}{\arcsin \frac{l}{l_0}}$, $X_n(x) = A_n \sin \left(\frac{\pi n \arcsin \frac{x}{l_0}}{\arcsin \frac{l}{l_0}}\right)$, $n \in \mathbb{N}$.

У к а з а н и е. Сделать замену $\xi = \arcsin \frac{x}{l_0}$.

2.10. $\omega_n = \sqrt{\frac{g}{2}} \frac{\pi n}{\sqrt{l_0} - \sqrt{l_0 - l}}$, $n \in \mathbb{N}$.

У к а з а н и е. Осуществить замену $\xi = \sqrt{l_0} - \sqrt{l_0 - x}$.

2.11. $\omega_n = \frac{1}{l} \sqrt{\frac{E_0}{\rho_0}} \mu_n$, $n \in \mathbb{N}$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = \frac{\rho_0 S_0 l}{m}$.

2.12. 1) $\omega_n = \frac{\pi}{l} \sqrt{\frac{E}{\rho}} n$, $n \in \mathbb{N}$; 2) $\omega_n = \frac{\mu_n}{l} \sqrt{\frac{E}{\rho}}$, $n \in \mathbb{N}$,

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{ctg} \mu = -\frac{l}{l_0 - l}$.

У к а з а н и е. В уравнении для функции $u(x, t)$ сделать замену $v(x, t) = (l_0 - x)u(x, t)$.

2.13. $\omega_n = \frac{\mu_n}{l} \sqrt{\frac{E}{\rho}}$, $n \in \mathbb{N}$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{ctg} \mu = \frac{\mu^2 - p_1 p_2}{p_1 + p_2}$,

где $p_1 = \frac{l(hl_0 - 1)}{l_0}$, $p_2 = \frac{l}{l_0} \left(\frac{kl_0}{ES_0} - 1\right)$.

У к а з а н и е. См. предыдущую задачу.

2.14. $F_k = \frac{\pi^2 J E}{4l^2}$, $J = \frac{4}{3} l_1 l_2^3$.

У к а з а н и е. Надо найти наименьшее собственное значение задачи (см. задачу 1.167)

$$\begin{aligned} u_{xx} + \lambda u &= 0, \quad 0 < x < l, \quad \lambda = \frac{F}{J E}, \\ u(0) &= u'(l) = 0. \end{aligned}$$

- 2.15.** 1) $\omega_n = a\mu_n^2$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\cos \mu \operatorname{ch} \mu = -1$;
 2) $\omega_n = a\mu_n^2$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\cos \mu \operatorname{ch} \mu = 1$;
 3) $\omega_n = \frac{\pi^2 a}{l^2} n^2$, $n \in \mathbb{N}$, $a = \sqrt{\frac{EJ}{\rho S}}$.

2.16. $\omega_n = \frac{\mu_n}{l} \sqrt{\frac{GJ}{K}}$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{ctg} \mu = -\frac{kl}{GJ}$.

2.17. Собственные частоты $\omega_n = \frac{a\mu_n}{l}$, амплитуды: 1) $A_n \sin \frac{\mu_n x}{l}$, где $\mu_n > 0$ есть корень уравнения $\alpha \operatorname{ctg} \mu = \frac{\mu}{\beta} - \frac{\beta}{\mu}$; 2) $A_n \cos \frac{\mu_n x}{l}$, где $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\alpha \operatorname{tg} \mu = \frac{\beta}{\mu} - \frac{\mu}{\beta}$; 3) $A_n \left(p_2 \sin \frac{\mu_n x}{l} + \mu_n \cos \frac{\mu_n x}{l} \right)$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\left(\alpha + \frac{1}{\alpha} \right) \operatorname{tg} \mu = \frac{\beta}{\mu} - \frac{\mu}{\beta}$, $p_1 = \frac{Kl}{K_0}$, $p_2 = \frac{kl}{JG}$, $\alpha = \sqrt{\frac{p_1}{p_2}}$, $\beta = \sqrt{p_1 p_2}$. Собственные функции ортогональны на отрезке $[0; l]$ весом $1 + \frac{l}{p_1} \delta(x - l)$.

2.18. $\omega_n = \frac{\mu_n}{l} \sqrt{\frac{GJ}{K}}$, $n \in \mathbb{N}$, где μ_n — положительный корень уравнения $(\mu \operatorname{tg} \mu - p)(\mu \operatorname{ctg} \mu + p) = 0$, $p = \frac{Kl}{K_0}$.

2.19. $\omega_k = \frac{1}{r_0} \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\rho_0}} \mu_n$, $n \in \mathbb{N}$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\operatorname{tg} \mu = \mu$. У к а з а н и е. В уравнении для потенциала скоростей ψ сделать замену $v = r\psi$.

2.20. 1) $R_n(r) = \frac{1}{r} \sin \frac{\pi n(r - r_1)}{r_2 - r_1}$, $n \in \mathbb{N}$, $\|R_n\|^2 = \frac{r_2 - r_1}{2}$; 2) $R_n(r) = \frac{1}{r} \sin \frac{\mu_n(r - r_1)}{r_2 - r_1}$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu = p \sin \mu$, где $p = 1 - \frac{r_1}{r_2}$, $\|R_n\|^2 = \frac{\mu_n^2 + p^2 + p}{\mu_n^2 + p^2}$, $n \in \mathbb{N}$; 3) $R_n(r) = \frac{1}{r} \sin \frac{\mu_n(r_2 - r)}{r_2 - r_1}$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu = -p \sin \mu$, $p = \frac{r_1}{r_2} - 1$, $\|R_n\|^2 = \frac{\mu_n^2 + p^2 - p}{\mu_n^2 + p^2}$, где $n \in \mathbb{N}$; 4) $R_n(r) = \frac{1}{r} \left(\sin \frac{\mu_n(r - r_1)}{d} + \frac{\mu_n r_1}{d} \cos \frac{\mu_n(r - r_1)}{d} \right)$, $d = r_2 - r_1$, μ_n — положительный корень уравнения $\mu \cos \mu = \left(1 + \frac{\mu^2 r_1 r_2}{d^2} \right) \sin \mu$, $\|R_n\|^2 = \frac{\mu_n^2}{2} \frac{(r_1 r_2 \mu_n)^2 + 3r_1 r_2 d^2 + d^4}{d(r_2^2 \mu_n^2 + d^2)}$.

У к а з а н и е. Для вычисления квадрата нормы собственной функции $R_n(r)$ применима техника, изложенная в примере 2.1 и в задаче 2.114. Следует исходить из системы

$$\begin{cases} \Delta R + \lambda R = 0, \\ \Delta R_n + \lambda_n R_n = 0, \end{cases}$$

в которой λ_n — собственное значение. После перекрестного умножения на R_n и R и вычитания получается тождество

$$(\lambda - \lambda_n) R_n R r^2 = r^2 (R R'_n - R_n R'),$$

из которого следует

$$\|R_n\|^2 = \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_n} \frac{r^2 (R R'_n - R_n R')}{\lambda - \lambda_n} \Big|_{r_1}^{r_2} = \frac{r^2}{2\lambda_n} (r R_n'^2 + R_n R'_n + \lambda_n r R_n'^2) \Big|_{r_1}^{r_2}.$$

$$\mathbf{2.21.} \quad \omega_k = \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\rho_0}} \frac{\mu}{r_2 - r_1}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad \mu_n > 0 \text{ — корень уравнения } \mu \operatorname{ctg} \mu = \frac{r_1 r_2 \mu^2}{(r_1 - r_2)^2} + 1.$$

$$\mathbf{2.22.} \quad \omega_n = \frac{a \mu_n}{l}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad \mu_n > 0 \text{ — корень уравнения } \mu \operatorname{ctg} \mu = 1 - \sqrt{\frac{S_2}{S_1}}.$$

$$\mathbf{2.23.} \quad \omega_n = \frac{a}{l} \sqrt{\mu_n^2 + \alpha^2}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad \mu_n > 0 \text{ — корень уравнения } \mu \operatorname{ctg} \mu = -\alpha.$$

$$\mathbf{2.24.} \quad \omega_{mnk} = \pi a \sqrt{\left(\frac{m}{l_1}\right)^2 + \left(\frac{n}{l_2}\right)^2 + \left(\frac{k}{l_3}\right)^2}, \quad a = \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\rho_0}}, \quad m, n, k \in \mathbb{N}_0,$$

где m, n, k удовлетворяют условию $m + n + k > 0$.

$$\mathbf{2.25.} \quad \omega_{mn} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{T_0}{\rho_0}} \left(\frac{m^2}{l_1^2} + \frac{n^2}{l_2^2} \right)^{\frac{1}{2}}, \quad m, n \in \mathbb{N}. \quad 1a) x + y = 0; \quad 1b) x - y = 0;$$

$$2a) x = 0, y = 0, \text{ стороны квадрата с вершинами } (l; 0), (0; l), (-l; 0), (0; -l);$$

$$2b) x = 0, y = 0, x + y = 0, x - y = 0.$$

У к а з а н и е. Колебания мембраны с закрепленным краем Γ описываются системой уравнений

$$u_{tt} = a^2 \Delta u, \quad |x| < l_1, \quad |y| < l_2, \quad 0 < t,$$

$$u|_{\Gamma} = 0, \quad u(x, y, 0) = u_0(x, y), \quad u_t(x, y, 0) = u_1(x, y).$$

Подстановка $u(x, y, t) = v(x, y)T(t)$ приводит к задаче

$$v_{xx} + v_{yy} + \lambda v = 0, \quad |x| < l_1, \quad |y| < l_2,$$

$$v|_{\Gamma} = 0.$$

Эта задача на собственные значения, и ее следует решать методом Фурье, полагая $v(x, y) = X(x)Y(y)$, что дает две задачи на собственные значения:

$$X'' + \alpha X = 0, \quad |x| < l_1, \quad Y'' + \beta Y = 0, \quad |y| < l_2, \quad \alpha + \beta = \lambda.$$

$$X(-l_1) = X(l_1) = 0, \quad Y(-l_2) = Y(l_2) = 0.$$

$$\mathbf{2.26.} \quad \omega_{mn} = \frac{\pi}{l} \sqrt{\frac{T_0}{\rho_0}} \sqrt{m^2 + \left(n + \frac{1}{2}\right)^2}, \quad m \in \mathbb{N}, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

$$\mathbf{2.27.} \quad \omega_n = \frac{\pi n}{l \sqrt{LC}}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

$$\mathbf{2.28.} \quad \omega_n = \frac{\mu_n}{l \sqrt{LC}}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad \text{где } \mu_n \text{ — положительный корень уравнения:}$$

$$1) \operatorname{tg} \mu = -\mu \frac{l_0}{lL}; \quad 2) \mu \operatorname{tg} \mu = \frac{Cl}{l_0}.$$

$$\mathbf{2.29.} \quad j(z, t) = pJ\sqrt{2} e^{-pz} \cos(pz - \omega t - \frac{\pi}{4}), \quad \text{где } p = \frac{\sqrt{2\pi\sigma\omega}}{c}.$$

$$\mathbf{2.30.} \quad \left| \frac{j(z)}{j(l)} \right| = e^{-\frac{l-z}{\delta}}, \quad \delta = \frac{c}{\sqrt{2\pi\sigma\omega\mu}}, \quad \rho = \frac{1}{2lc} \sqrt{\frac{\pi\omega\mu}{2\sigma}}.$$

$$\mathbf{2.31.} \quad \psi(x, z, t) = A_n \cos \frac{\pi n x}{l} \operatorname{ch} \frac{\pi n(z+h)}{l} \cos(\omega_n t + \delta_n), \quad \omega_n = \sqrt{\frac{\pi g n}{l} \operatorname{th} \frac{\pi h n}{l}},$$

где $n \in \mathbb{N}$.

2.32. 1) $\omega_{mn}^2 = g\lambda_{mn}$; 2) $\omega_{mn}^2 = g\lambda_{mn} \operatorname{th}(h\lambda_{mn})$, где $\lambda_{mn} = \frac{\pi}{2} \left(\frac{m^2}{l_1^2} + \frac{n^2}{l_2^2} \right)^{\frac{1}{2}}$, $m, n \in \mathbb{N}$.

2.33. $V = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{g}{k}}$.

У к а з а н и е. Показать, что задача для потенциала скоростей (см. задачу 1.321, п.2)

$$\Delta\psi = 0, \quad -\infty < x, y < \infty, \quad 0 < z, \\ (\psi_{tt} + g\psi_z)|_{z=0} = 0, \quad |\psi| < \infty$$

имеет решение вида $\psi(x, z, t) = Ae^{kz} \cos(kx - \omega t)$, $\omega = \sqrt{kg}$. Скорость волны определяется формулой $V = \frac{d\omega}{dk}$.

2.34. $\psi(x, z, t) = A \operatorname{ch} k(z+h) \cos(kx - \omega t)$, $\omega^2 = kg \operatorname{th} kh$;
 $V = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{g}{k \operatorname{th} kh}} \left(\operatorname{th} kh + \frac{kh}{\operatorname{ch}^2 kh} \right)$.

2.35. $V = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{g(\rho_2 - \rho_1)}{k(\rho_2 + \rho_1)}}$.

2.36. $\zeta(x, t) = \frac{A \cos \frac{\omega x}{\sqrt{gh}}}{\cos \frac{\omega l}{\sqrt{gh}}} \cos \omega t$.

У к а з а н и е. В уравнении для потенциала скоростей ψ (см. задачу 1.325) сделать замену $v = r\psi$.

2.37. $\chi = \frac{l}{L} \operatorname{th} \frac{l}{L}$.

У к а з а н и е. При отсутствии источников стационарное уравнение диффузии имеет вид (см. задачу 1.244) $u_{xx} - \frac{1}{L^2}u = 0$.

2.38. $\chi = \frac{r_0^2}{3L^2 \left(\frac{r_0}{L} \operatorname{cth} \frac{r_0}{L} - 1 \right)}$. См. указание к задаче 2.37.

2.39. 1) $\Phi_1(x) = \frac{4q_0 \operatorname{sh} \frac{\tilde{l}-x}{L}}{\operatorname{sh} \frac{\tilde{l}}{L} - \frac{2D}{L} \operatorname{ch} \frac{\tilde{l}}{L}}$; 2) $\Phi_2(x) = \frac{4q_0 \left(\operatorname{sh} \frac{l-x}{L} + \frac{2D}{L} \operatorname{ch} \frac{l-x}{L} \right)}{\left(1 + \frac{2D}{L} \right)^2 e^{\frac{l}{L}} - \left(1 - \frac{2D}{L} \right)^2 e^{-\frac{l}{L}}}$.
 $\Phi_1(x) \approx \Phi_2(x) = \frac{4q_0 \operatorname{sh} \frac{l-x}{L}}{\operatorname{sh} \frac{l}{L}}, \quad L = \sqrt{\frac{D}{\Sigma_c}}, \quad D = \frac{1}{3\Sigma_s}$.

У к а з а н и е. В диффузионном приближении справедливы оценки

$$\frac{D}{L} \sqrt{\frac{\Sigma_c}{3\sigma_s}} \ll 1, \quad \frac{D}{l} = \frac{\lambda}{3l} \ll 1.$$

2.40. 1) $\Phi_1(r) = \frac{Q_0}{4\pi Dr} \frac{\operatorname{sh} \frac{\tilde{r}_0 - r}{L}}{\operatorname{sh} \frac{\tilde{r}_0}{L}}$;

$$2) \Phi_2(r) = \frac{Q_0}{4\pi Dr} \frac{\left(1 - \frac{2D}{L}\right) \operatorname{sh} \frac{r_0 - r}{L} + \frac{2D}{L} \operatorname{ch} \frac{r_0 - r}{L}}{\left(1 - \frac{2D}{L}\right) \operatorname{sh} \frac{r_0}{L} + \frac{2D}{L} \operatorname{ch} \frac{r_0}{L}}.$$

$$\Phi_1(r) \approx \Phi_2(r) = \frac{Q_0}{4\pi Dr} \frac{\operatorname{sh} \frac{r_0 - r}{L}}{\operatorname{sh} \frac{r_0}{L}}, \quad L = \sqrt{\frac{D}{\Sigma_c}}, \quad D = \frac{1}{3\Sigma_s}.$$

См. указание к задаче 2.39.

$$\begin{aligned} \mathbf{2.41.} \quad \Phi(r) &= \frac{r_0 \Phi_0}{\operatorname{sh} \kappa \left[1 + \frac{2D}{r_0} (\kappa \operatorname{cth} \kappa - 1) \right]} \frac{\operatorname{sh} \frac{r}{L}}{r}, \quad \gamma = \frac{1 - \frac{2D}{r_0} (\kappa \operatorname{cth} \kappa - 1)}{1 + \frac{2D}{r_0} (\kappa \operatorname{cth} \kappa - 1)}, \quad \kappa = \\ &= \frac{r_0}{L}, \quad L = \sqrt{\frac{D}{\Sigma_c}}, \quad D = \frac{1}{3\Sigma_s}. \end{aligned}$$

$$\mathbf{2.42.} \quad \Phi(x) = \frac{\Phi_0 \operatorname{ch} \frac{x}{L}}{\operatorname{ch} \kappa + \frac{2D}{L} \operatorname{sh} \kappa}, \quad \gamma = \frac{1 - \frac{2D}{L} \operatorname{th} \kappa}{1 + \frac{2D}{L} \operatorname{th} \kappa}, \quad \kappa = \frac{r_0}{L}, \quad L = \sqrt{\frac{D}{\Sigma_c}}, \quad D = \frac{1}{3\Sigma_s}.$$

$$\mathbf{2.43.} \quad 1) \tilde{l} = \frac{\pi}{2\alpha}; \quad 2) l = \frac{1}{2\alpha} \operatorname{arccctg} \left[\frac{1}{2} \left(2\alpha D - \frac{1}{2\alpha D} \right) \right].$$

У к а з а н и е. См. задачу 1.252.

$$\begin{aligned} \mathbf{2.44.} \quad 1a) \quad \tilde{l} &= \frac{\pi}{2\alpha}; \quad 1b) \quad l = \frac{1}{2\alpha} \operatorname{arccctg} \left[\frac{1}{2} \left(2\alpha D - \frac{1}{2\alpha D} \right) \right]; \\ 2a) \quad \tilde{l} &= \frac{\pi}{\alpha\sqrt{2}}; \quad 2b) \quad l = \frac{1}{\sqrt{2}\alpha} \operatorname{arccctg} \left[\frac{1}{2} \left(\alpha\sqrt{2} D - \frac{1}{\alpha\sqrt{2} D} \right) \right]; \\ 3a) \quad \tilde{l} &= \frac{\pi\sqrt{3}}{2\alpha}; \quad 3b) \quad l = \frac{\sqrt{3}}{2\alpha} \operatorname{arccctg} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{2\alpha D}{\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{3}}{2\alpha D} \right) \right]. \end{aligned}$$

У к а з а н и е. В n -мерном случае критическое состояние среды описывается стационарной плотностью потока нейтронов $\Phi(x)$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Функция $\Phi(x)$ является решением краевой задачи (см. задачу 1.252)

$$\Delta \Phi(x) + \alpha^2 \Phi(x) = 0, \quad x \in \Omega = \{x: |x_k| < l, k = 1, 2, \dots, n\}$$

$$1) \quad \Phi|_{x_k = \mp l} = 0, \quad 2) \quad \left(\frac{1}{2} \Phi \mp \frac{\partial \Phi}{\partial x_k} \right) \Big|_{x_k = \mp l} = 0,$$

$$\Phi(x)|_{x \in \Omega} > 0, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Эта задача сводится методом разделения переменных к n одномерным задачам на собственные значения. В результате

$$\Phi(x) = \prod_{k=1}^n (A_k \sin \alpha(x + l) + B_k \cos \alpha(x + l)), \quad \text{где} \quad \sum_{k=1}^n \alpha_k = \alpha.$$

Подстановка функции $\Phi(x)$ в граничные условия определяет уравнение для критического размера.

2.45. 1) $r_k = \frac{\pi}{\alpha}$; 2) $r_k = \frac{\mu}{\alpha}$, где μ — наименьший положительный корень уравнения $\operatorname{tg} \mu = \mu$.

2.46. $r_{2k} = \frac{\mu}{\alpha}$, где $\mu > 0$ — наименьший корень уравнения $\operatorname{tg}(\mu - \alpha r_1) = -\alpha r_1$.

$$2.47. \quad \tilde{r}_{2k} = \tilde{r}_1 + \frac{\pi}{\alpha}.$$

2.48. Критический радиус r_{0k} — наименьший корень уравнения

$$D_C - D_R = D_C \alpha_C r_0 \operatorname{ctg} \alpha r_0 + D_R \frac{r_0}{L_R} \operatorname{cth} \frac{r_1 - r_0}{L_R},$$

$$\text{в котором } \alpha_C^2 = \frac{k_\infty - 1}{L_C^2 - \tau_C}, \quad L_C = \sqrt{\frac{D_C}{\Sigma_a^C}}, \quad D_C = \frac{1}{3\Sigma_s^C}, \quad L_R = \sqrt{\frac{D_R}{\Sigma_c^R}}, \quad D_R = \frac{1}{3\Sigma_s^R}.$$

Частные случаи: 1) $r_{0k} = r_k - L_R$ (для графита $L_R = 50$ см); 2) $r_{0k} = \frac{1}{2}r_k$.
У к а з а н и е. См. задачу 1.256.

$$2.49. \quad D_C \mu_C \operatorname{tg}(\mu_C l_3) = D_R \mu_R \operatorname{cth}(\mu_R(\tilde{d} - l_3)), \quad \mu_C^2 = \alpha_C^2 - \left(\frac{\pi}{2\tilde{l}_1}\right)^2 - \left(\frac{\pi}{2\tilde{l}_2}\right)^2, \\ \mu_R^2 = \left(\frac{\pi}{2\tilde{l}_1}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{2\tilde{l}_2}\right)^2 + \frac{1}{L_R^2}, \text{ величины } \alpha_C \text{ и } L_R \text{ определены в ответе} \\ \text{к предыдущей задаче.}$$

$$2.50. \quad 1) \tilde{l}_k = \frac{\pi}{\sqrt{\lambda}}; \quad 2) \tilde{l}_k = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{3}{\lambda}}, \text{ где } \lambda \text{ — корень уравнения критичности}$$

$$\frac{k_\infty e^{-\lambda \tau_T}}{1 + \lambda L_T^2} = 1, \quad (2.89)$$

в котором коэффициент размножения k_∞ имеет вид (1.40), а $\tau_T = \tau(u_T)$ (см. (1.66)), $L_T = \sqrt{\frac{D_T}{\Sigma_a^T}}, \quad D_T = \frac{1}{3\Sigma_s^T}$.

Р е ш е н и е. Система уравнений для определения критических размеров приведена в ответе к задаче 1.271. Подстановка $\Phi = q/(\xi\Sigma)$ преобразует первое уравнение системы к виду

$$\Delta q - \frac{\Sigma_a(u)}{D(u)} q = \frac{\xi\Sigma(u)}{D(u)} \frac{\partial q}{\partial u}, \quad 0 \leq u \leq u_T.$$

В результате разделения переменных $q(\mathbf{r}, u) = R(\mathbf{r})U(u)$ получается задача на собственные значения

$$\Delta R + \lambda R = 0 \text{ в } \Omega, \\ R|_{\bar{S}} = 0, \quad R(\mathbf{r}) > 0 \text{ в } \Omega, \quad (2.90)$$

и уравнение

$$U' + \left(\lambda \frac{D(u)}{\xi\Sigma(u)} + \frac{\Sigma_a(u)}{\xi\Sigma(u)} \right) = 0, \quad 0 \leq u \leq u_T,$$

решение которого

$$U(u) = U(0) e^{-\int_0^u \left(\lambda \frac{D(u)}{\xi\Sigma(u)} + \frac{\Sigma_a(u)}{\xi\Sigma(u)} \right) du}$$

приводится к виду (см. (1.66), (1.149))

$$U(u) = U(0) \varphi(u) e^{-\lambda \tau(u)}.$$

Уравнение диффузии для $\Phi_T(\mathbf{r}) = C_T R(\mathbf{r})$, записанное в форме

$$\Delta R + \left(\frac{U(0)\varphi_T e^{-\lambda\tau_T}}{C_T D_T} - \frac{\Sigma_a^T}{D_T} \right) R = 0 \quad \text{в } \Omega,$$

должно совпадать с уравнением (2.91). Следовательно,

$$\lambda = \frac{U(0)\varphi_T e^{-\lambda\tau_T}}{C_T D_T} - \frac{\Sigma_a^T}{D_T}, \quad \varphi_T = \varphi(u_T),$$

откуда $C_T = \frac{U(0)\varphi_T e^{-\lambda\tau_T}}{\lambda D_T + \Sigma_a^T}$. Уравнение критичности (2.89) получается из условия $q(\mathbf{r}, 0) = \xi \Sigma_f^T \Phi_T(\mathbf{r})$ после подстановки $q(\mathbf{r}, 0)$ и $\Phi_T(\mathbf{r})$.

2.51. $r_k = \frac{\pi}{\sqrt{\lambda}}$, где λ — корень уравнения (2.89).

2.52. 1) $\tilde{r}_k = \frac{\pi}{2\sqrt{\lambda}}$; 2) $\tilde{r}_k = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{3}{\lambda}}$, где λ — корень уравнения критичности

$$\frac{k_\infty e^{-\lambda\tau_T}}{1 + \lambda L_T^2} + \nu \int_0^{u_T} \frac{\Sigma_f(u)\varphi(u)}{\xi \Sigma(u)} e^{-\lambda\tau(u)} du = 1, \quad (2.91)$$

$k_\infty, L_T, \tau_T, u_T$ даны в ответе к задаче 2.50.

2.53. $r_k = \frac{\pi}{\sqrt{\lambda}}$, где λ — корень (2.91).

2.54. $t_k = \frac{16\mu\sigma l^2}{\pi c^2}$.

2.55. $t_k = \frac{16\mu\sigma l_1^2 l_2^2}{\pi c^2 (l_1^2 + l_2^2)}$. Задача (см. пример 1.27)

$$H_t = \Delta H, \quad |x| < l_1, \quad |y| < l_2, \quad 0 < t,$$

$$H|_\Gamma = 0, \quad H|_{t=0} = H_0, \quad a^2 = \frac{c^2}{4\pi\mu\sigma},$$

имеет решение $H(x, y, t) = \sum_{m,n=1} C_{mn} v_{mn}(x, y) e^{-a^2 \lambda_{mn} t}$, $t_c = \frac{1}{a^2 \lambda_{11}}$.

2.56. $\mathbf{E} = \mathcal{E} e^{i\omega t}$, $\mathbf{H} = \mathcal{H} e^{i\omega t}$; собственные частоты

$$\omega = \pi c \left(\frac{m^2}{l_1^2} + \frac{n^2}{l_2^2} + \frac{s^2}{l_3^2} \right)^{\frac{1}{2}}, \quad m, n, s \in \mathbb{N}, \quad m + n + s \geq 2;$$

амплитуды собственных колебаний

$$\mathcal{E}_x = A \cos \frac{\pi m x}{l_1} \sin \frac{\pi n y}{l_2} \sin \frac{\pi s z}{l_3}, \quad \mathcal{H}_x = \frac{i\pi c}{\omega} \left(\frac{nC}{l_2} - \frac{sB}{l_3} \right) \sin \frac{\pi m x}{l_1} \cos \frac{\pi n y}{l_2} \sin \frac{\pi s z}{l_3},$$

$$\mathcal{E}_y = B \sin \frac{\pi m x}{l_1} \cos \frac{\pi n y}{l_2} \sin \frac{\pi s z}{l_3}, \quad \mathcal{H}_y = \frac{i\pi c}{\omega} \left(\frac{sA}{l_3} - \frac{mC}{l_1} \right) \cos \frac{\pi m x}{l_1} \sin \frac{\pi n y}{l_2} \cos \frac{\pi s z}{l_3},$$

$$\mathcal{E}_z = C \sin \frac{\pi m x}{l_1} \sin \frac{\pi n y}{l_2} \cos \frac{\pi s z}{l_3}, \quad \mathcal{H}_z = \frac{i\pi c}{\omega} \left(\frac{mB}{l_1} - \frac{nA}{l_2} \right) \cos \frac{\pi m x}{l_1} \cos \frac{\pi n y}{l_2} \sin \frac{\pi s z}{l_3},$$

$$\frac{mA}{l_1} + \frac{nB}{l_2} + \frac{sC}{l_3} = 0.$$

У к а з а н и е. Каждая компонента $\mathcal{E}_x, \mathcal{E}_y, \mathcal{E}_z$ является решением задачи на собственные значения. Для $\mathcal{E}_x$ эта задача имеет вид (см. задачу 1.468)

$$\Delta \mathcal{E}_x + \frac{\omega^2}{c^2} \mathcal{E}_x = 0, \quad 0 < x < l_1, \quad 0 < y < l_2, \quad 0 < z < l_3,$$

$$\left. \frac{\partial \mathcal{E}_x}{\partial x} \right|_{x=0} = \left. \frac{\partial \mathcal{E}_x}{\partial x} \right|_{x=l_1} = 0, \quad \mathcal{E}_x|_{y=0} = \mathcal{E}_x|_{y=l_2} = \mathcal{E}_x|_{z=0} = \mathcal{E}_x|_{z=l_3} = 0.$$

Далее применить метод Фурье, полагая $\mathcal{E}_x = X(x)Y(y)Z(z)$.

2.57. *TE*-волна: $\mathcal{E} = (0, \mathcal{E}_y, 0)$, $\mathcal{H} = (\mathcal{H}_x, 0, \mathcal{H}_z)$,

$$\mathcal{E}_y = A \sin \frac{\pi n x}{l}, \quad \mathcal{H}_x = -\frac{\beta A}{k} \sin \frac{\pi n x}{l}, \quad \mathcal{H}_z = \frac{\pi n A i}{kl} \cos \frac{\pi n x}{l}, \quad n \in \mathbb{N}_0;$$

TM-волна: $\mathcal{E} = (\mathcal{E}_x, 0, \mathcal{E}_z)$, $\mathcal{H} = (0, \mathcal{H}_y, 0)$,

$$\mathcal{E}_x = -\frac{\beta B}{k} \cos \frac{\pi n x}{l}, \quad \mathcal{E}_z = -\frac{\pi n B i}{kl} \sin \frac{\pi n x}{l}, \quad \mathcal{H}_y = B \cos \frac{\pi n x}{l}, \quad n \in \mathbb{N}_0;$$

при $n = 0$ *TM*-волна $\mathbf{E} = \mathcal{E}_0 e^{i(kz - \omega t)} \mathbf{e}_x$, $\mathbf{H} = -\frac{k \mathcal{E}_0}{\beta} e^{i(kz - \omega t)} \mathbf{e}_y$ представляет собой *TEM*-волну.

2.58. $\omega_{oTM} = \frac{\pi c}{l_1 l_2} \sqrt{l_1^2 + l_2^2}$, $\omega_{oTE} = \pi c \min \left(\frac{1}{l_1}, \frac{1}{l_2} \right)$, $\omega_{oTE} < \omega_{oTM}$.

У к а з а н и е. Компонента $\mathcal{E}_z(x, y)$ электрического поля в *TM*-волне является решением краевой задачи (1.189). Нетривиальное решение этой задачи

$$\mathcal{E}_z(x, y) = A_{mn} \sin \frac{\pi n x}{l_1} \sin \frac{\pi m y}{l_2}, \quad m, n \in \mathbb{N},$$

получается методом Фурье, а остальные компоненты полей $\mathcal{E}$ и $\mathcal{H}$ выражаются через $\mathcal{E}_z$ посредством соотношений (1.190) (при этом выполняется равенство $\left(\frac{\pi m}{l_1}\right)^2 + \left(\frac{\pi n}{l_2}\right)^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \beta^2$). Неравенство $\frac{\omega^2}{c^2} > \pi^2 \left(\frac{1}{l_1} + \frac{1}{l_2}\right)$ определяет частоту отсечки. Исследование *TE*-волн проводится аналогично: нужно решить задачу (1.191) и применить соотношения (1.192).

2.59. *TE*-моды: $\mathcal{E} = (0, \mathcal{E}_y, 0)$, $\mathcal{H} = (\mathcal{H}_x, 0, \mathcal{H}_z)$,

$$\mathcal{E}_y = A \begin{cases} q e^{-\frac{rx}{l}}, & 0 \leq x, \\ q \cos \frac{qx}{l} - r \sin \frac{qx}{l}, & -l \leq x < 0, \\ (q \cos q + r \sin q) e^{p(1+\frac{x}{l})}, & x < -l, \end{cases}$$

$$q^2 = (k^2 n_1^2 - \beta^2) l^2, \quad p^2 = (\beta^2 - k^2 n_2^2) l^2, \quad r^2 = (\beta^2 - k^2 n_3^2) l^2, \quad (2.92)$$

$$\mathcal{H}_x = -\frac{\beta}{k} \mathcal{E}_y, \quad \mathcal{H}_z = -\frac{i}{k} \frac{d \mathcal{E}_y}{dx}.$$

Характеристическое уравнение

$$\operatorname{ctg} q = \frac{q^2 - pr}{q(p+r)}. \quad (2.93)$$

Частота отсечки j -й моды $\omega_{0j} = ck_{0j}$, где

$$k_{0j} = \frac{1}{l \sqrt{n_1^2 - n_2^2}} \left(\operatorname{arctg} \sqrt{\frac{n_2^2 - n_3^2}{n_1^2 - n_2^2}} + \pi j \right), \quad j \in \mathbb{N}_0;$$

число мод с частотой ω равно целой части числа

$$\frac{1}{\pi} \left(\frac{\omega l}{c} \sqrt{n_1^2 - n_2^2} - \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{n_2^2 - n_3^2}{n_1^2 - n_2^2}} \right).$$

TM -моды: $\mathcal{E} = (\mathcal{E}_x, 0, \mathcal{E}_z)$, $\mathcal{H} = (0, \mathcal{H}_y, 0)$,

$$\mathcal{H}_y(x) = B \begin{cases} qe^{-\frac{rx}{l}}, & 0 \leq x, \\ q \cos \frac{qx}{l} - \frac{n_1^2}{n_3^2} r \sin \frac{qx}{l}, & -l \leq x < 0, \\ (q \cos q + \frac{n_1^2}{n_3^2} r \sin q) e^{p(1+\frac{x}{l})}, & x < -l, \end{cases}$$

$$\mathcal{E}_x = \frac{\beta}{kn^2(x)} \mathcal{H}_y, \quad \mathcal{E}_z = \frac{i}{kn^2(x)} \frac{d\mathcal{H}_y}{dx}, \quad n(x) = \begin{cases} n_3, & 0 < x, \\ n_1, & -l < x < 0, \\ n_2, & x < -l. \end{cases}$$

Характеристическое уравнение

$$\operatorname{ctg} q = \frac{q^2 n_2^2 n_3^2 - p n_1^4}{q n_1^2 (p n_3^2 + r n_2^2)}. \quad (2.94)$$

Частота отсечки j -й моды $\omega_{0j} = ck_{0j}$,

$$k_{0j} = \frac{1}{l\sqrt{n_1^2 - n_2^2}} \left(\operatorname{arctg} \frac{n_1^2}{n_2^2} \sqrt{\frac{n_2^2 - n_3^2}{n_1^2 - n_2^2}} + \pi j \right), \quad j \in \mathbb{N}_0;$$

число мод с частотой ω равно целой части числа

$$\frac{1}{\pi} \left(\frac{\omega l}{c} \sqrt{n_1^2 - n_2^2} - \operatorname{arctg} \frac{n_1^2}{n_3^2} \sqrt{\frac{n_2^2 - n_3^2}{n_1^2 - n_2^2}} \right).$$

Графики решений $\beta = \varphi_j(k)$ уравнения (2.93) изображены на рис. 2.6. Графики решений уравнения (2.94) имеют аналогичную форму.




Рис. 2.6

У к а з а н и е. Уравнение для TE -мод имеет вид

$$\frac{d^2 \mathcal{E}_y}{dx^2} - (\beta^2 - k^2 n^2(x)) \mathcal{E}_y = 0,$$

его решение

$$\mathcal{E}_y(x) = \begin{cases} A_1 e^{-\frac{rx}{l}}, & 0 < x, \\ A_2 \cos \frac{qx}{l} + A_3 \sin \frac{qx}{l}, & -l < x < 0, \\ A_4 e^{p(1+\frac{x}{l})}, & x < -l. \end{cases}$$

Требование непрерывности $\mathcal{E}_y(x)$ и $\mathcal{E}'_y(x)$ на границе раздела двух диэлектриков приводит к однородной системе линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов A_1, A_2, A_3, A_4 . Система имеет нетривиальное решение, если ее определитель равен нулю, откуда следует (2.93). По теореме существования неявной функции уравнение (2.93) определяет функцию $\beta = \varphi_j(k)$, $j \in \mathbf{N}_0$. Функция $\beta = \varphi_j(k)$ определена на промежутке $[k_{0j}, \infty)$, монотонно возрастает ($\varphi'_j(k) > 0$), а соответствующий график обладает асимптотой $\beta = kn_1$.

2.60. См. ответ к предыдущей задаче, где

$$A = 4 \left[\frac{\pi k l p r W}{\beta c (q^2 + r^2)(pr + p + r)} \right]^{\frac{1}{2}},$$

$$B = 4 n_1 n_3^2 \left[\frac{\pi k l p r W}{\beta c (q^2 n_3^4 + r^2 n_1^4) \left(pr + \frac{n_1^2 n_3^2 p (r^2 + q^2)}{q^2 n_3^4 + r^2 n_1^4} + \frac{n_1^2 n_2^2 r (p^2 + q^2)}{p^2 n_1^4 + q^2 n_2^4} \right)} \right]^{\frac{1}{2}}.$$

У к а з а н и е. Плотность потока энергии электромагнитного поля (вектор Пойнтинга) $\mathbf{w} = \frac{c}{4\pi} [\mathbf{E} \mathbf{H}]$.

2.61. $\mathbf{E} = \mathcal{E} e^{i(\beta z - \omega t)}$, $\mathbf{H} = \mathcal{H} e^{i(\beta z - \omega t)}$.

TE-моды: $\mathcal{E} = (0, \mathcal{E}_y, 0)$, $\mathcal{H} = (\mathcal{H}_x, 0, \mathcal{H}_z)$, $\mathcal{H}_x = -\frac{\beta}{k} \mathcal{E}_y$, $\mathcal{H}_z = -\frac{i}{k} \frac{d\mathcal{E}_y}{dx}$.

Нечетные моды

$$\mathcal{E}_y(x) = A \begin{cases} \sin q e^{p(1-\frac{|x|}{l})} \operatorname{sign} x, & |x| \geq l, \\ \sin \frac{qx}{l}, & |x| < l, \end{cases}$$

характеристическое уравнение и частоты отсечки

$$\operatorname{tg} q = -\frac{q}{p}, \quad \omega_{0j} = \frac{\pi c}{l \sqrt{n_1^2 - n_2^2}} \left(j + \frac{1}{2} \right), \quad j \in \mathbf{N}_0.$$

Четные моды

$$\mathcal{E}_y(x) = A \begin{cases} \cos q e^{p(1-\frac{|x|}{l})}, & |x| \geq l, \\ \cos \frac{qx}{l}, & |x| < l, \end{cases}$$

характеристическое уравнение и частоты отсечки

$$\operatorname{tg} q = \frac{p}{q}, \quad \omega_{0j} = \frac{\pi c}{l \sqrt{n_1^2 - n_2^2}} j, \quad j \in \mathbf{N}_0.$$

Коэффициент локализации TE -моды

$$P_1 = \frac{1 + \frac{p}{p^2 + q^2}}{1 + \frac{1}{p}}.$$

TM -моды: $\mathcal{E} = (\mathcal{E}_x, 0, \mathcal{E}_z)$, $\mathcal{H} = (0, \mathcal{H}_y, 0)$, $\mathcal{E}_x = \frac{\beta}{kn^2} \mathcal{H}_y$, $\mathcal{E}_z = \frac{i}{kn^2} \frac{d\mathcal{H}_y}{dx}$.

Нечетные моды

$$\mathcal{H}_y(x) = B \begin{cases} \sin q e^{p(1 - \frac{|x|}{l})} \operatorname{sign} x, & l \leq |x|, \\ \sin \frac{qx}{l}, & |x| < l, \end{cases}$$

характеристическое уравнение и частоты отсечки

$$\operatorname{tg} q = -\frac{n_2^2}{n_1^2} \frac{q}{p}, \quad \omega_{0j} \frac{\pi c}{l \sqrt{n_1^2 - n_2^2}} \left(j + \frac{1}{2} \right), \quad j \in \mathbb{N}_0.$$

Четные моды

$$\mathcal{H}_y(x) = B \begin{cases} \cos q e^{p(1 - \frac{|x|}{l})}, & l \leq x, \\ \cos \frac{qx}{l}, & |x| < l, \end{cases}$$

характеристическое уравнение и частоты отсечки

$$\operatorname{tg} q = \frac{n_1^2}{n_2^2} \frac{p}{q}, \quad \omega_{0j} = \frac{\pi c}{l \sqrt{n_1^2 - n_2^2}} j, \quad j \in \mathbb{N}_0.$$

Коэффициент локализации TM -моды

$$P_1 = \frac{1 + \frac{n_1^2 n_2^2 p}{n_1^4 p^2 + n_2^4 q^2}}{1 + \frac{n_1^2 n_2^2 (p^2 + q^2)}{p(n_1^4 p^2 + n_2^4 q^2)}}.$$

Величины p и q определены выражениями (2.92).

$$\mathbf{2.62.} \quad 1) \quad \psi_{nr}(x, y) = \frac{2}{\sqrt{l_1 l_2}} \sin \frac{\pi n}{2} \left(1 + \frac{x}{l_1} \right) \sin \frac{\pi r}{2} \left(1 + \frac{y}{l_2} \right),$$

$$E_{nr} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m} \left(\frac{n^2}{l_1^2} + \frac{r^2}{l_2^2} \right), \quad n, r \in \mathbb{N};$$

$$2) \quad \psi_{nrs}(x, y, z) = 2 \sqrt{\frac{2}{l_1 l_2 l_3}} \sin \frac{\pi n}{2} \left(1 + \frac{x}{l_1} \right) \sin \frac{\pi r}{2} \left(1 + \frac{y}{l_2} \right) \sin \frac{\pi s}{2} \left(1 + \frac{z}{l_3} \right),$$

$$E_{nrs} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m} \left(\frac{n^2}{l_1^2} + \frac{r^2}{l_2^2} + \frac{s^2}{l_3^2} \right), \quad n, r, s \in \mathbb{N}.$$

$$\mathbf{2.63.} \quad \psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{l}} \sin \frac{\pi n x}{l}, \quad E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m l^2} n^2,$$

$$\psi_s(x) = \left(\frac{1}{l} \frac{\mu_s^2 + q^2}{\mu_s^2 + q^2 + q} \right)^{\frac{1}{2}} \sin \mu_s \left(1 - \frac{|x|}{l} \right), \quad E_s = \frac{\hbar^2}{2m l^2} \mu_s,$$

$n, s \in \mathbb{N}$, $\mu_s > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{ctg} \mu = -q$, $q = \alpha l$.

У к а з а н и е. Волновые функции $\psi(x)$ стационарных состояний являются решениями задачи на собственные значения

$$\begin{aligned}\psi'' + k^2 \psi &= 2\alpha \psi(0) \delta(x), \quad k^2 = \frac{2m}{\hbar^2} E, \quad -l < x < l \\ \psi(-l) &= \psi(l) = 0.\end{aligned}$$

Чтобы решить эту задачу, ее следует поставить в эквивалентной форме, используя формулу (10.15):

$$\begin{aligned}\psi'' + k^2 \psi &= 0, \quad -l < x < 0, \quad 0 < x < l, \\ \psi(-l) &= \psi(l) = 0, \\ \psi(+0) - \psi(-0) &= 0, \quad \psi'(+0) - \psi'(-0) = 2\alpha \psi(0).\end{aligned}$$

2.64. $E_n = \frac{\hbar^2}{2ml^2} \mu_n^2$, $n \in \mathbb{N}$; $\mu_n > 0$ — решение системы

$$\begin{cases} \sin \mu = \pm \frac{\mu}{\mu_0}, & \mu = \frac{l}{\hbar} \sqrt{2mE}, \quad \mu_0 = \frac{l}{\hbar} \sqrt{2mU_0}, \\ \operatorname{tg} \mu < 0. \end{cases}$$

Число уровней $-1 - \left[-\frac{\mu_0}{\pi} - \frac{1}{2} \right]$. Связанных состояний не существует при условии $U_0 \leq \frac{\pi^2 \hbar^2}{8ml^2}$. Р е ш е н и е. Волновые функции $\psi(x)$ стационарных состояний являются решениями задачи

$$\begin{aligned}\frac{\hbar^2}{2m} \psi'' + E\psi &= 0, \quad 0 < x < l, \\ \frac{\hbar^2}{2m} \psi'' + (E - U_0)\psi &= 0, \quad l < x, \\ \psi(0) &= 0, \quad \int_0^\infty \psi^2 dx = 1, \\ \psi(l-0) &= \psi(l+0), \quad \psi'(l-0) = \psi'(l+0).\end{aligned}$$

Отсюда следует, что условию при $x = 0$ и интегральному условию нормировки удовлетворяют решения вида

$$\psi(x) = \begin{cases} A \sin \frac{\mu}{l} x, & x < l, \\ B e^{\sqrt{\mu_0^2 - \mu^2} \frac{x}{l}}, & l \leq x. \end{cases}$$

Граничные условия выполняются, если $\mu \operatorname{ctg} \mu = -\sqrt{\mu_0^2 - \mu^2}$, $\mu < \mu_0$ (связанные состояния), что эквивалентно системе $\sin \mu = \pm \frac{\mu}{\mu_0}$, $\operatorname{tg} \mu < 0$. Из графического решения системы (см. рис. 2.7) следует, что число уровней конечно; связанных состояний не существует, если $\frac{1}{\mu_0} \geq \frac{2}{\pi}$, т.е. при усло-

вии $\frac{\hbar}{l\sqrt{2mU_0}} \geq \frac{2}{\pi}$.




Рис. 2.7

2.65. $E_n = \frac{\hbar^2}{2ml^2} \mu_n^2$, $n \in \mathbb{N}$; $\mu_n > 0$ удовлетворяет условиям

$$\begin{cases} \sin \mu = \pm \frac{\mu}{\mu_0}, \\ \operatorname{tg} \mu < 0, \end{cases} \quad \begin{cases} \cos \mu = \pm \frac{\mu}{\mu_0}, \\ \operatorname{tg} \mu > 0, \end{cases} \quad \begin{aligned} \mu &= \frac{l}{\hbar} \sqrt{2mE}, \\ \mu_0 &= \frac{l}{\hbar} \sqrt{2mU_0}. \end{aligned}$$

Если $U \leq \frac{\hbar^2}{8ml^2}$, то существует лишь один уровень.

2.66. Собственные значения λ являются корнями трансцендентного уравнения

$$c_1 \sqrt{D_1} \sin s_1 \sqrt{\lambda} \cos s_2 \sqrt{\lambda} + c_2 \sqrt{D_2} \sin s_2 \sqrt{\lambda} \cos s_1 \sqrt{\lambda} = 0, \quad (2.95)$$

где $s_i = \frac{l_i}{\sqrt{D_i}}$, $i = 1, 2$, собственные функции

$$X_n = \begin{cases} A_{1n} \cos s_1 \sqrt{\lambda_n} \left(1 + \frac{x}{l_1}\right), & x \in \Delta_1, \\ A_{2n} \cos s_2 \sqrt{\lambda_n} \left(1 - \frac{x}{l_2}\right), & x \in \Delta_2, \end{cases} \quad (2.96)$$

$$A_{in} = \begin{cases} \frac{(-1)^{i-1}}{\sqrt{D_i} \sin s_i \sqrt{\lambda_n}}, & \sin^2 s_1 \sqrt{\lambda_n} + \sin^2 s_2 \sqrt{\lambda_n} \neq 0, \\ \frac{c_i}{\cos s_i \sqrt{\lambda_n}}, & \sin^2 s_1 \sqrt{\lambda_n} + \sin^2 s_2 \sqrt{\lambda_n} = 0, \end{cases} \quad i = 1, 2.$$

У к а з а н и е. Ввести билинейную форму

$$(\rho \mathcal{L} X, Y) = \int_{\Delta} \bar{Y} \mathcal{L} X \rho dx, \quad X, Y \in \mathcal{M}_{\mathcal{L}},$$

и доказать, что $(\rho \mathcal{L} X, X) \geq 0$.

2.67. Собственные значения — корни уравнения

$$\alpha \left(\frac{1}{c_1 \sqrt{D_1}} \sin s_2 \sqrt{\lambda} \cos s_1 \sqrt{\lambda} + \frac{1}{c_2 \sqrt{D_2}} \sin s_1 \sqrt{\lambda} \cos s_2 \sqrt{\lambda} \right) - \sqrt{\lambda} \sin s_1 \sqrt{\lambda} \sin s_2 \sqrt{\lambda} = 0,$$

собственные функции

$$X_n(x) = \begin{cases} A_{1n} \cos s_1 \sqrt{\lambda_n} \left(1 + \frac{x}{l_1}\right), & x \in \Delta_1, \\ A_{2n} \cos s_2 \sqrt{\lambda_n} \left(1 - \frac{x}{l_2}\right), & x \in \Delta_2, \end{cases} \quad (2.97)$$

$$A_{in} = \begin{cases} \frac{(-1)^{i-1}}{\sqrt{D_i} \sin s_i \sqrt{\lambda_n}}, & \sin^2 s_1 \sqrt{\lambda_n} + \sin^2 s_2 \sqrt{\lambda_n} \neq 0, \\ \frac{c_i}{\cos s_i \sqrt{\lambda_n}}, & \sin^2 s_1 \sqrt{\lambda_n} + \sin^2 s_2 \sqrt{\lambda_n} = 0, \end{cases} \quad i = 1, 2.$$

2.68. $x - x_0 = Ae^{kz_0} \cos(kx_0 - \omega t)$, $z - z_0 = Ae^{kz_0} \sin(kx_0 - \omega t)$, где x_0, z_0 — равновесные координаты частицы; частица движется по окружности с центром в точке x_0, z_0 , радиус которой e^{kz_0} экспоненциально убывает с глубиной.

У к а з а н и е. См. задачу 1.321, п. 2.

2.69. $\tau = \sqrt{\frac{3\pi\rho a^2}{2P_0}} \frac{\Gamma(\frac{5}{6})}{\Gamma(\frac{1}{3})}$. У к а з а н и е. См. ответ к задаче 1.317.

2.70. 1) $u(x, t) = \frac{u_0}{2} \left(\sin \frac{2\pi x}{l} \cos \frac{2\pi at}{l} + \sin \frac{4\pi x}{l} \cos \frac{4\pi at}{l} \right);$
 2) $u(x, t) = \frac{v_0 l}{\pi a} \left(\frac{1}{5} \cos \frac{5\pi x}{2l} \sin \frac{5\pi at}{2l} + \frac{1}{3} \cos \frac{3\pi x}{2l} \sin \frac{3\pi at}{2l} \right).$

2.71. 1) $u(x, t) = \frac{32h}{\pi^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^3};$
 2) $u(x, t) = \frac{16h}{\pi^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^3}.$

2.72. $u(x, t) = \frac{8h}{\pi^2} \sum_0^{\infty} (-1)^n \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{l}}{(2n+1)^2}.$

2.73. $u(x, t) = \frac{8v_0 l}{\pi^6 a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} \sin \frac{(2n+1)\pi at}{l}}{(2n+1)^6}.$

У к а з а н и е. Функции $u_t(x, 0)$ и $u_{tt}(x, 0)$ принадлежат области определения оператора $\mathcal{L}$, что упрощает вычисление коэффициентов, если воспользоваться эрмитовостью оператора.

2.74. $u(x, t) = \frac{256v_0 l}{\pi^6 a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \sin \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^6}.$

У к а з а н и е. Функции $u_t(x, 0)$ и $u_{ttx}(x, 0)$ принадлежат области определения оператора $\mathcal{L}$, что упрощает вычисление коэффициентов, если воспользоваться его эрмитовостью.

2.75. $u(x, t) = \frac{16v_0 l}{\pi^3 a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \sin \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^3}.$

2.76. $u(x, t) = \frac{16v_0 l}{\pi^3 a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \sin \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^3}.$

2.77. $u(x, t) = \frac{8h}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^2}.$

2.78. $u(x, t) = \frac{32h}{\pi^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{l}}{(2n+1)^3}.$

$$2.79. 1) u(x, t) = \frac{2I}{\pi a \rho} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} \sin \frac{(2n+1)\pi at}{l}}{2n+1};$$

$$2) u(x, t) = \frac{2\sqrt{2}I}{\pi a \rho} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{[\frac{n}{2}]} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \sin \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{2n+1};$$

$$3) u(x, t) = \frac{2I}{a \rho} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \sin \frac{\mu_n}{2} \sin \frac{\mu_n x}{l} \sin \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 \text{ — корень уравнения } p \operatorname{tg} \mu = -\mu, \quad p = hl, \quad h = \frac{k}{T}, \quad \sin \frac{\mu_n}{2} = (-1)^{[\frac{n+1}{2}]} \sqrt{\frac{1 - \cos \mu_n}{2}}, \quad \cos \mu_n = \frac{(-1)^n p}{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}};$$

$$4) u(x, t) = \frac{2I}{\rho a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \cos \frac{\mu_n}{2} \cos \frac{\mu_n x}{l} \sin \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 \text{ — корень уравнения } \mu \operatorname{tg} \mu = p, \quad p = hl, \quad h = \frac{k}{T}, \quad \cos \frac{\mu_n}{2} = (-1)^{[\frac{n}{2}]} \sqrt{\frac{1 + \cos \mu_n}{2}}, \quad \cos \mu_n = \frac{(-1)^{n-1} \mu_n}{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}}.$$

$$2.80. u(x, t) = \frac{It}{2\rho l} + \frac{2I}{\pi a \rho} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{\pi n x}{l} \sin \frac{\pi n at}{l}}{n}.$$

$$2.81. u(x, t) = \frac{It}{\rho l} + \frac{2I}{\pi a \rho} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{\pi n x_0}{l} \cos \frac{\pi n x}{l} \sin \frac{\pi n at}{l}}{n}.$$

$$2.82. 1) u(x, t) = \frac{It}{\rho l} + \frac{I}{\pi a \rho} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos \frac{2\pi n x}{l} \sin \frac{2\pi n at}{l}}{n};$$

$$2) u(x, t) = \frac{2\sqrt{2}I}{\pi a \rho} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{[\frac{n}{2}]} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \sin \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{2n+1}.$$

$$2.83. 1) u(x, t) = \frac{2F_0 l}{\pi^2 T} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{l}}{(2n+1)^2};$$

$$2) u(x, t) = \frac{4\sqrt{2}F_0 I}{\pi^2 T} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{[\frac{n}{2}]} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^2}.$$

$$2.84. 1) u(x, t) = \frac{2F_0 l}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \sin \frac{\mu_n}{2} \sin \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{\mu_n \pi at}{l}}{\mu_n^2 (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 \text{ — корень уравнения } p \operatorname{tg} \mu = -\mu, \quad p = hl, \quad h = \frac{k}{T}, \quad \sin \frac{\mu_n}{2} = \frac{(-1)^{[\frac{n-1}{2}]} }{\sqrt{2}} \sqrt{1 - \frac{(-1)^n p}{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}}};$$

$$2) u(x, t) = \frac{2F_0 I}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \cos \frac{\mu_n}{2} \cos \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{\mu_n \pi at}{l}}{\mu_n^2 (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 \text{ — корень уравнения } p \operatorname{tg} \mu = \mu, \quad p = hl, \quad h = \frac{k}{T}, \quad \cos \frac{\mu_n}{2} = \frac{(-1)^{[\frac{n}{2}]} }{\sqrt{2}} \sqrt{1 + \frac{(-1)^n \mu_n}{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}}}.$$

$$2.85. 1) u(x, t) = \frac{8F_0 l}{\pi^2 T} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^2};$$

$$2) u(x, t) = \frac{2F_0 l}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \cos \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 \text{ — корень уравнения } \mu \operatorname{tg} \mu = p, \quad p = hl, \quad h = \frac{k}{T};$$

$$3) u(x, t) = \frac{F_0 l}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \sin \frac{\mu_n (l-x)}{l} \cos \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 \text{ — корень уравнения } p \operatorname{tg} \mu = -\mu, \quad p = hl, \quad h = \frac{k}{T};$$

$$4) u(x, t) = \frac{F_0 l}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \cos \frac{\mu_n (l-x)}{l} \cos \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 \text{ — корень уравнения } \mu \operatorname{tg} \mu = p, \quad p = hl, \quad h = \frac{k}{T}.$$

$$2.86. u(x, t) = \frac{F_0 l}{4T_0} + \frac{2F_0 l}{\pi^2 T_0} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2m+1)\pi x}{l} \cos \frac{(2m+1)\pi at}{l}}{(2m+1)^2}.$$

$$2.87. 1) u(x, t) = \frac{8h}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^2};$$

$$2) u(x, t) = \frac{8\sqrt{2}h}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \sin \frac{\pi(2n+1)(x+l)}{4l} \cos \frac{\pi(2n+1)at}{4l}}{(2n+1)^2}.$$

$$2.88. u(x, t) = \frac{16F_0 l}{\pi^2 T_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin^2 \frac{(2n+1)\pi}{8} \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^2}.$$

$$2.89. u(x, t) = \frac{F_0 l}{8T_0} + \frac{4F_0 l}{\pi^2 T_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 \frac{\pi n}{4} \cos \frac{\pi n x}{l} \cos \frac{\pi n at}{l}}{n^2}.$$

$$2.90. u(x, t) = h + \frac{F_0 l}{T} + \frac{8F_0 I}{\pi^2 T} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^2}.$$

$$2.91. u(x, t) = h + \frac{F_0 l}{2T} - \frac{4F_0 I}{\pi^2 T} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi x}{l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{l}}{(2n+1)^2}.$$

$$2.92. 1) u(x, t) = \frac{4F_0 l}{\pi^3 T} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{l}}{(2n+1)^3};$$

$$2) u(x, t) = \frac{16F_0 l}{\pi^3 T} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^3};$$

$$3) u(x, t) = \frac{4F_0 l}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \sin^2 \frac{\mu_n}{2} \sin \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n^3 (\mu_n^2 + p^2 + p)},$$

$$\mu_n - \text{положительный корень уравнения } p \operatorname{tg} \mu = -\mu, \quad p = hl, \quad h = \frac{k}{T}, \quad \sin^2 \frac{\mu_n}{2} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{(-1)^{n+1} p}{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}} \right).$$

2.93. $u(x, t) = \frac{2F_0 3l}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \cos \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n^3 (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 - \text{корень}$
уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p, \quad p = hl, \quad h = \frac{k}{T}.$

2.94. $u(x, t) = \frac{8F_0 l}{\pi^5 T} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{l}}{(2n+1)^5}.$

2.95. $u(x, t) = \frac{128F_0 l}{\pi^5 T} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^5}.$

2.96. 1) $u(x, t) = \frac{F_0 l^2}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n(x_0) X_n(x) \cos \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n^2 \|X_n\|^2};$
2) $u(x, t) = \frac{Il}{a\rho} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n(x_0) X_n(x) \sin \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n \|X_n\|^2};$

$\mu_n - \text{положительный корень уравнения } 2p \operatorname{ctg} \mu = \mu^2 - p^2, \quad p = hl, \quad h = \frac{k}{T},$
 $X_n(x) = p \sin \frac{\mu_n x}{l} + \mu_n \cos \frac{\mu_n x}{l}, \quad \|X_n\|^2 = \frac{l}{2} (\mu_n^2 + p^2 + 2p).$

2.97. $u(x, t) = u_0 \sin \frac{\pi x}{l} \cos \sqrt{\frac{k}{\rho} + \frac{\pi^2 T}{\rho l^2}} t.$

2.98. $u(x, t) = u_0 \cos \frac{\pi x}{2l} \cos \sqrt{\frac{k}{\rho} + \frac{\pi^2 T}{4\rho l^2}} t.$

2.99. $u(x, t) = v_0 \sin \frac{2\pi x}{l} e^{-\frac{\alpha t}{2\rho}} \cdot \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\frac{\alpha^2}{4\rho^2} - \frac{4\pi^2 T}{\rho l^2}}} \operatorname{sh} \sqrt{\frac{\alpha^2}{4\rho^2} - \frac{4\pi^2 T}{\rho l^2}} t, & \alpha^2 l^2 > 16\pi^2 \rho T, \\ \frac{1}{\sqrt{\frac{4\pi^2 T}{\rho l^2} - \frac{\alpha^2}{4\rho^2}}} \sin \sqrt{\frac{4\pi^2 T}{\rho l^2} - \frac{\alpha^2}{4\rho^2}} t, & \alpha^2 l^2 < 16\pi^2 \rho T. \end{cases}$

2.100. $u(x, t) = v_0 \cos \frac{3\pi x}{2l} e^{-\frac{\alpha t}{2\rho}} \cdot \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\frac{\alpha^2}{4\rho^2} - \frac{9\pi^2 T}{4\rho l^2}}} \operatorname{sh} \sqrt{\frac{\alpha^2}{4\rho^2} - \frac{9\pi^2 T}{4\rho l^2}} t, & \alpha^2 l^2 > 9\pi^2 \rho T, \\ \frac{1}{\sqrt{\frac{9\pi^2 T}{4\rho l^2} - \frac{\alpha^2}{4\rho^2}}} \sin \sqrt{\frac{9\pi^2 T}{4\rho l^2} - \frac{\alpha^2}{4\rho^2}} t, & \alpha^2 l^2 < 9\pi^2 \rho T. \end{cases}$

$$\mathbf{2.101.} \quad u(x, t) = \frac{v_0 l}{8\pi a} \left(\frac{1}{2} \sin \frac{\pi x}{l} \sin \frac{\pi at}{l} - \frac{5}{6} \sin \frac{3\pi x}{l} \sin \frac{3\pi at}{l} + \sin \frac{5\pi x}{l} \sin \frac{5\pi at}{l} \right).$$

$$\mathbf{2.102.} \quad u(x, t) = \frac{v_0 l}{2\pi a} \left(\sin \frac{\pi x}{2l} \sin \frac{\pi at}{2l} - \frac{1}{3} \sin \frac{3\pi x}{2l} \sin \frac{3\pi at}{2l} \right).$$

$$\mathbf{2.103.} \quad u(x, t) = \frac{u_0}{4} \left(\cos \frac{5\pi x}{2l} \cos \frac{5\pi at}{2l} + 3 \cos \frac{15\pi x}{2l} \cos \frac{15\pi at}{2l} \right).$$

$$\mathbf{2.104.} \quad 1) u(x, t) = \frac{u_0}{2} \left(1 + \cos \frac{6\pi x}{l} \cos \frac{6\pi at}{l} \right);$$

$$2) u(x, t) = \frac{u_0}{4} \left(\cos \frac{2\pi x}{l} \cos \frac{2\pi at}{l} + 3 \cos \frac{6\pi x}{l} \cos \frac{6\pi at}{l} \right).$$

$$\mathbf{2.105.} \quad 1) u(x, t) = \frac{v_0 l}{2} \left(t - \frac{l}{3\pi a} \cos \frac{3\pi x}{l} \sin \frac{3\pi at}{l} \right);$$

$$2) u(x, t) = \frac{v_0 l}{4} \left(t + \frac{l}{6\pi a} \cos \frac{6\pi x}{l} \sin \frac{6\pi at}{l} + \frac{l}{24\pi a} \cos \frac{12\pi x}{l} \sin \frac{12\pi at}{l} \right).$$

$$\mathbf{2.106.} \quad u(x, t) = \frac{8u_0}{\pi^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{l}}{(2n+1)^3}.$$

$$\mathbf{2.107.} \quad u(x, t) = \frac{128v_0 l}{\pi^4 a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \sin \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^4}.$$

$$\mathbf{2.108.} \quad 1) u(x, t) = \frac{u_0}{2} \sin \frac{\pi x}{l} \cos \frac{\pi at}{l} - \frac{16u_0}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 \sin \frac{\pi nx}{l} \cos \frac{\pi nat}{l}}{(2n+1)(4n^2-1)^2};$$

$$2) u(x, t) = \frac{64u_0}{\pi^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n \sin \frac{\pi nx}{l} \cos \frac{\pi nat}{l}}{(4n^2-1)^3}.$$

$$\mathbf{2.109.} \quad u(x, t) = vt; \quad 2) u(x, t) = \frac{vl}{\pi^2 a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} \sin \frac{(2n+1)\pi at}{l}}{(2n+1)^2};$$

$$3) u(x, t) = \frac{8vl}{\pi^2 a} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \sin \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^2};$$

$$4) u(x, t) = \frac{4vl}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \sin^2 \frac{\mu_n x}{2} \sin \frac{\mu_n x}{l} \sin \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n^2 (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 - \text{корень уравне-}$$

$$\text{ния } p \operatorname{tg} \mu = -\mu, \quad p = hl, \quad h = \frac{k}{ES}, \quad \sin^2 \frac{\mu_n}{2} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{(-1)^{n-1} p}{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}} \right);$$

$$5) u(x, t) = \frac{2plv}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \cos \frac{\mu_n x}{l} \sin \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n^2 (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 - \text{корень урав-}$$

$$\text{нения } \mu \operatorname{tg} \mu = p, \quad p = hl, \quad h = \frac{k}{ES}.$$

$$\mathbf{2.110.} \quad 1) u(x, t) = \frac{4I}{\pi \rho a S} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi nx}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi nat}{l}}{(2n+1)(4n^2-1)^2};$$

$$2) u(x, t) = \frac{2I}{\pi \rho a S} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \cos \frac{\mu_n x}{l} \sin \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 - \text{корень уравнения}$$

$$\mu \operatorname{tg} \mu = p, \quad p = hl, \quad h = \frac{k}{ES}.$$

$$2.111. u(x, t) = \frac{I}{m}t + \frac{2I}{\pi am} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cos \frac{n\pi x}{l} \sin \frac{n\pi at}{l}, \quad m = \rho Sl.$$

$$2.112. u(x, t) = \frac{8u_0}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^2}.$$

$$2.113. u(x, t) = \frac{8Pl}{ES\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^2}.$$

$$2.114. u(x, t) = \frac{F_0 l^2}{ES} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \mu_n \left(1 - \frac{x}{l}\right)}{\mu_n^2 \|X_n\|^2} \cos \frac{\mu_n at}{l}, \quad \|X_n\|^2 = \frac{l}{2} \frac{\mu_n^2 + p^2 + p}{\mu_n^2 + p^2},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$, $p = \frac{kl}{ES}$.

У к а з а н и е к вычислению нормы $\|X_n\|$. Уравнение $X'' + \lambda X = 0$ задачи Штурма—Лиувилля заменой $\xi = x\sqrt{\lambda}$ сводится к уравнению $X''_{\xi\xi} + X = 0$, следовательно, $X = X(x\sqrt{\lambda})$. Так как $X'_\lambda = X' \frac{x}{2\lambda}$, где X' — производная по x , то из (2.12)

$$\begin{aligned} \|X_n\|^2 &= \frac{1}{2\lambda_n} W[xX'_n, X_n] \Big|_0^l = \\ &= \frac{1}{2\lambda_n} \left[l(X_n'^2(l) + \lambda_n X_n^2(l)) - X_n(l)X_n'(l) + X_n'(0)X_n(0) \right]. \end{aligned} \quad (2.98)$$

Из уравнения $X'' + \lambda X = 0$ следует, что $X_n'^2 + \lambda X_n^2 = \text{const}$, т. е.

$$X_n'^2(0) + \lambda_n X_n^2(0) = X_n'^2(l) + \lambda_n X_n^2(l). \quad (2.99)$$

$$2.115. 1) u(x, t) = \frac{2F_0}{ES} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \sin \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 \text{ — корень уравнения } p \operatorname{tg} \mu = -\mu;$$

$$2) u(x, t) = \frac{2F_0}{ES} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \cos \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 \text{ — корень уравнения } \mu \operatorname{tg} \mu = p; \text{ в обоих случаях } p = \frac{k}{ES}, \quad \|X_n\|^2 = \frac{l}{2} \frac{\mu_n^2 + p^2 + p}{\mu_n^2 + p^2}.$$

$$2.116. u(x, t) = u_0 + \frac{F_0 l}{2ES} + \frac{4F_0 l}{\pi^2 ES} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi x}{l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^2}.$$

$$2.117. u(x, t) = \frac{u_1 + u_2}{2} + \frac{4(u_1 - u_2)}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi x}{l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{l}}{(2n+1)^2}.$$

$$2.118. u(x, t) = u_0 \sin \frac{\pi x}{l} e^{-\beta t} \times \begin{cases} \operatorname{ch} \sqrt{\beta^2 - \left(\frac{\pi a}{l}\right)^2} t + \frac{\beta}{\sqrt{\beta^2 - \left(\frac{\pi a}{l}\right)^2}} \operatorname{sh} \sqrt{\beta^2 - \left(\frac{\pi a}{l}\right)^2} t, & \beta > \frac{\pi a}{l}, \\ \beta t + 1, & \beta = \frac{\pi a}{l}, \\ \frac{\beta}{\sqrt{\left(\frac{\pi a}{l}\right)^2 - \beta^2}} \sin \sqrt{\left(\frac{\pi a}{l}\right)^2 - \beta^2} t + \cos \sqrt{\left(\frac{\pi a}{l}\right)^2 - \beta^2} t, & \beta < \frac{\pi a}{l}, \beta = \frac{\alpha}{2\rho S}. \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 & \mathbf{2.119.} \quad u(x, t) = v_0 \cos \frac{\pi x}{2l} e^{-\beta t} \times \\
 & \times \begin{cases} \operatorname{ch} \sqrt{\beta^2 - \left(\frac{\pi a}{2l}\right)^2} t + \frac{\beta}{\sqrt{\beta^2 - \left(\frac{\pi a}{2l}\right)^2}} \operatorname{sh} \sqrt{\beta^2 - \left(\frac{\pi a}{2l}\right)^2} t, & \beta > \frac{\pi a}{2l}, \\ \beta t + 1, & \beta = \frac{\pi a}{2l}, \\ \frac{\beta}{\sqrt{\left(\frac{\pi a}{2l}\right)^2 - \beta^2}} \sin \sqrt{\left(\frac{\pi a}{2l}\right)^2 - \beta^2} t + \cos \sqrt{\left(\frac{\pi a}{2l}\right)^2 - \beta^2} t, & \beta < \frac{\pi a}{2l}, \beta = \frac{\alpha}{2\rho S}. \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{2.120.} \quad \text{Если } \frac{\pi n_0}{l} < \frac{\beta}{2} < \frac{\pi(n_0 + 1)}{l}, \quad n \in \mathbb{N}, \text{ то}$$

$$u(x, t) = \frac{I}{\beta m} \left[1 - e^{-\beta t} + 2\beta \sum_{n=1}^{n=n_0} \frac{\cos \frac{\pi n x}{l} \operatorname{sh} \alpha_n t}{\alpha_n} + 2\beta \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{\cos \frac{\pi n x}{l} \sin \omega_n t}{\omega_n} \right];$$

$$\text{если } \frac{\beta}{2} = \frac{a\pi n_0}{l}, \quad n \in \mathbb{N}, \text{ то}$$

$$\begin{aligned}
 u(x, t) = & \frac{I}{\beta m} \left(1 - e^{-\beta t} + 2\beta t e^{-\frac{\beta t}{2}} \cos \frac{\pi n_0 x}{l} \right) + \\
 & + \frac{2I}{m} \left(\sum_{n=1}^{n=n_0-1} \frac{\cos \frac{\pi n x}{l} \operatorname{sh} \alpha_n t}{\alpha_n} + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{\cos \frac{\pi n x}{l} \sin \omega_n t}{\omega_n} \right), \quad \alpha_n = \sqrt{\left(\frac{\beta}{2}\right)^2 - \left(\frac{a\pi n}{l}\right)^2},
 \end{aligned}$$

$$\omega_n = \sqrt{\left(\frac{a\pi n}{l}\right)^2 - \left(\frac{\beta}{2}\right)^2}, \quad m = \rho l S - \text{масса стержня.}$$

$$\mathbf{2.121.} \quad u(x, t) = \frac{Fl}{ES} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(p \sin \frac{\mu_n x}{l} + \mu_n \cos \frac{\mu_n x}{l}\right) \cos \frac{\mu_n a t}{l}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + 2p)}, \quad \mu_n > 0 - \text{корень}$$

уравнения $\mu \operatorname{ctg} \mu = \frac{\mu^2 - p^2}{2p}, \quad p = \frac{kl}{ES}.$

$$\mathbf{2.122.} \quad u(x, t) = \frac{lI}{\rho} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n(x) \sin \frac{a\mu_n t}{l}}{\mu_n \|X\|^2}, \quad \mu_n > 0 - \text{корень уравнения}$$

$$\mu \operatorname{ctg} \mu = \frac{\mu^2 - p_1 p_2}{p_1 + p_2}, \tag{2.100}$$

$$X_n(x) = p_1 \sin \frac{\mu_n}{l} x + \mu_n \cos \frac{\mu_n}{l} x, \tag{2.101}$$

$$\|X\|^2 = \frac{l}{2} \frac{(\mu_n^2 + p_1^2)(\mu_n^2 + p_2^2) + (p_1 + p_2)(\mu_n^2 + p_1 p_2)}{\mu_n^2 + p_2^2}, \tag{2.102}$$

$$\text{где } p_i = \frac{l k_i}{ES_0}, \quad i = 1, 2.$$

У к а з а н и е. Для вычисления нормы $\|X\|$ применить формулы (2.98), (2.99).

$$\mathbf{2.123.} \quad u(x, t) = \frac{8u_0}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi a t}{2l}}{(2n+1)^2}.$$

$$\mathbf{2.124.} \quad 1) u(x, t) = \frac{16M_0 l^2}{JG\pi^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^3};$$

$$2) u(x, t) = \frac{32M_0 l^2}{JG\pi^4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^4}.$$

$$\mathbf{2.125.} \quad u(x, t) = \frac{2u_0 l^2}{x_0(l-x_0)\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{\pi n x_0}{l} \sin \frac{\pi n x}{l} \cos \frac{\pi n at}{l}}{(2n+1)^3}.$$

$$\mathbf{2.126.} \quad u(x, t) = \frac{2u_0 l(1+p)}{(l-x_0)(1+hx_0)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \sin \frac{\mu_n(l-x_0)}{l} \sin \frac{\mu_n(l-x)}{l} \cos \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n^2(\mu_n^2 + p^2 + p)},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu + p \sin \mu = 0$, $h = \frac{k}{JG}$, $p = lh$.

$$\mathbf{2.127.} \quad 1) u(x, t) = \frac{2M_0 l}{JG} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \cos \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n^2(\mu_n^2 + p^2 + p)};$$

$$2) u(x, t) = \frac{2M_0 l}{JG} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \cos \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n(\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 \quad \text{— корень}$$

уравнения $\mu \sin \mu - p \cos \mu = 0$, $p = \frac{kl}{JG}$.

$$\mathbf{2.128.} \quad u(x, t) = \frac{u_1 + u_2}{2} + \frac{4(u_1 - u_2)}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{l}}{(2n+1)^2}.$$

$$\mathbf{2.129.} \quad u(x, t) = \frac{2pv_0 l}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \cos \frac{\mu_n x}{l} \sin \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n^2(\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 \quad \text{— корень}$$

уравнения $\mu \sin \mu = p \cos \mu$, $p = \frac{kl}{JG}$.

$$\mathbf{2.130.} \quad u(x, t) = \frac{4P}{\pi a K} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \sin \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{2n+1}.$$

$$\mathbf{2.131.} \quad u(x, t) = \frac{Pt}{Kl} + \frac{2P}{K\pi a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos \frac{\pi n x}{l} \sin \frac{\pi n at}{l}}{n}.$$

$$\mathbf{2.132.} \quad 1) u(x, t) = \frac{2P}{aK} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \cos \frac{\mu_n x}{l} \sin \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n(\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 \quad \text{— корень уравнения}$$

$$2) u(x, t) = \frac{2P}{Ka} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \sin \frac{\mu_n(l-x)}{l} \sin \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n^2 + p^2 + p}, \quad \mu_n > 0 \quad \text{— корень}$$

$$3) u(x, t) = \frac{2P}{Ka} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \sin \frac{\mu_n x}{l} \sin \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n^2 + p^2 + p}, \quad \mu_n > 0 \quad \text{— корень уравнения}$$

$$4) u(x, t) = \frac{2P}{Ka} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (p \sin \frac{\mu_n x}{l} + \mu_n \cos \frac{\mu_n x}{l}) \sin \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n^2 + p^2 + p}, \quad \mu_n > 0 \quad \text{— корень}$$

уравнения $\mu \operatorname{ctg} \mu = \frac{\mu^2 - p^2}{2p}$, $p = \frac{kl}{JG}$.

$$2.133. u(x, t) = \frac{4P}{K\pi a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi x}{l} \sin \frac{(2n+1)\pi at}{l}}{2n+1}.$$

$$2.134. u(x, t) = \frac{2(p+1)l^2 M_0}{JG} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \sin \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n^3 (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0$$

есть корень уравнения $\mu \cos \mu + p \sin \mu = 0$, $p = \frac{kl}{JG}$.

$$2.135. u(x, t) = \frac{8u_0}{\pi^2} e^{-\beta t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (\omega_n \cos \omega_n t + \beta \sin \omega_n t) \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l}}{\omega_n (2n+1)^2},$$

$$\beta = \frac{\pi \alpha r_0^2}{K}, \quad \omega_n = \sqrt{\left(\frac{(2n+1)\pi a}{l}\right)^2 - \beta^2}.$$

$$2.136. u(x, t) = \frac{8u_0}{\pi^2} e^{-\beta t} \left[(1+\beta t) \cos \frac{\pi x}{l} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\omega_n \cos \omega_n t + \beta \sin \omega_n t) \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l}}{(2n+1)^2} \right],$$

$$\beta = \frac{\alpha \pi r_0^2}{K}, \quad \omega_n = \sqrt{\left(\frac{(2n+1)\pi a}{l}\right)^2 - \beta^2}.$$

$$2.137. u(x, t) = 2pv_0 e^{-\beta t} \sum_{n=0}^m \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \cos \frac{\mu_n x}{l} \operatorname{sh} \alpha_n t}{\alpha_n \mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)} + 2pv_0 e^{-\beta t} \times$$

$$\times \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \cos \frac{\mu_n x}{l} \sin \omega_n t}{\omega_n \mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 - \text{корень уравнения } \mu \sin \mu =$$

$$= p \cos \mu, \quad p = \frac{kl}{JG}, \quad \beta = \frac{\pi \alpha r_0^2}{K}, \quad \alpha_n = \sqrt{\beta^2 - \left(\frac{a\mu_n}{l}\right)^2}, \quad \omega_n = \sqrt{\left(\frac{a\mu_n}{l}\right)^2 - \beta^2}.$$

$$2.138. \lim_{t \rightarrow \infty} u(x, t) = \frac{3u_0}{4}.$$

$$2.139. s(x, t) = s_0 - \frac{4\Delta s}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos \frac{(2n+1)\pi x}{l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{l}}{2n+1}.$$

$$2.140. s(x, t) = -\frac{2\sqrt{2}\Delta\rho}{\pi\rho_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{[\frac{n}{2}]} \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{2n+1}.$$

$$2.141. u(x, t) = \frac{8\Delta u}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^2}.$$

$$2.142. u(x, t) = \frac{It}{\rho_0 l S} + \frac{2I}{\pi \rho_0 a S} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{\pi n x}{l} \sin \frac{\pi n at}{l}}{n}.$$

$$2.143. u(x, t) = \frac{2lF_0}{\gamma S P_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \sin \frac{\mu_n(l-x)}{l} \cos \frac{a\mu_n t}{l}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad p = \frac{kl}{\gamma S p_0},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu + p \sin \mu = 0$.

$$2.144. u(x, t) = \frac{2I}{\pi a \rho_0 S} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \sin \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{2n+1}.$$

$$2.145. v(x, t) = \frac{8v_0}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^2}.$$

$$2.146. 1) v(x, t) = -\frac{4v_0}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{l}}{2n+1};$$

$$2) v(x, t) = -\frac{4v_0}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{2n+1}.$$

$$2.147. v(x, t) = -4v_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \sin^2 \frac{\mu_n}{2} \sin \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{a\mu_n t}{l}}{\mu_n(\mu_n^2 + p^2 + p)}, p = \frac{kl}{\gamma S p_0}, \text{ где}$$

$$\mu_n > 0 - \text{корень уравнения } \mu \cos \mu + p \sin \mu = 0, \sin^2 \frac{\mu_n}{2} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{(-1)^n p}{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}} \right).$$

$$2.148. P(x, t) = P_0 + \frac{4\Delta p}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos \frac{(2n+1)\pi x}{l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{l}}{2n+1}.$$

$$2.149. P(x, t) = P_0 + \frac{4\Delta p}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{2n+1}.$$

$$2.150. P(x, t) = P_0 + \frac{4\alpha\gamma P_0}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{l}}{2n+1}.$$

$$2.151. \psi(x, t) = C + \frac{4\alpha al}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{l}}{(2n+1)^2}.$$

$$2.152. u(x, t) = \frac{2u_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{\pi nx}{l}}{n} e^{-\left(\frac{\pi an}{l}\right)^2 t}.$$

$$2.153. u(x, t) = \frac{8u_0 c \operatorname{ch} cl}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l}}{(2n+1)^2 + \left(\frac{2cl}{\pi}\right)^2} e^{-\left[\frac{(2n+1)\pi a}{2l}\right]^2 t}.$$

$$2.154. u(x, t) = \frac{8lu_0}{\pi^2 x_0} \sum_0^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x_0}{2l} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l}}{(2n+1)^2} e^{-\left[\frac{(2n+1)\pi a}{2l}\right]^2 t}.$$

$$2.155. u(x, t) = \frac{u_0}{2} e^{-ht} \left[1 - \cos \frac{2\pi x}{l} e^{-\left(\frac{2\pi a}{l}\right)^2 t} \right].$$

$$2.156. u(x, t) = -\frac{2u_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{2\pi nx}{l}}{n} e^{-\left(\frac{2\pi an}{l}\right)^2 t}.$$

$$2.157. 1) u(x, t) = \frac{2u_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sin \frac{\pi nx}{l}}{n} e^{-\left(\frac{\pi an}{l}\right)^2 t},$$

$$2) u(x, t) = \frac{4u_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l}}{2n+1} e^{-\left[\frac{(2n+1)\pi a}{2l}\right]^2 t}.$$

2.158. $u(x, t) = 2u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \sin \frac{\mu_n(l-x)}{l}}{\mu_n(\mu_n^2 + p^2 + p)} e^{-\left(\frac{\mu_n}{l}\right)^2 t}$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu + p \sin \mu = 0$, $p = \frac{\alpha l}{k}$.

У к а з а н и е. Функция $u(x, 0) = u_0(x)$ — решение задачи

$$\begin{aligned} u_0''(x) &= -u_0 \delta'(x-l), \quad 0 < x < l, \\ u_0'(0) - h u_0(0) &= 0, \quad u(l) = 0. \end{aligned}$$

2.159. $u(x, t) = \frac{2q_0 l}{k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \cos \frac{\mu_n(l-x)}{l}}{\mu_n^2(\mu_n^2 + p^2 + p)} e^{-\left(\frac{\mu_n}{l}\right)^2 t}$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \sin \mu - p \cos \mu = 0$, $p = \frac{\alpha l}{k}$.

2.160. $u(x, t) = \frac{Q_0}{kS} \sum_{n=n_0}^{\infty} \frac{X_n(x_0) X_n(x) e^{-a^2 \lambda_n t}}{\lambda_n \|X_n\|^2}$:

1) $\lambda_n = \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2$, $X_n = \sin \frac{\pi n x}{l}$, $\|X_n\|^2 = \frac{l}{2}$, $n_0 = 1$;

2) $\lambda_n = \left(\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right)^2$, $X_n = \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l}$, $\|X_n\|^2 = \frac{l}{2}$, $n_0 = 0$;

3) $\lambda_n = \left(\frac{\mu_n}{l}\right)^2$, $X_n = \sin \frac{\mu_n x}{l}$, μ_n — положительный корень уравнения $\mu \cos \mu + p \sin \mu = 0$, $\|X_n\|^2 = \frac{l}{2} \frac{\mu_n^2 + p^2 + p}{\mu_n^2 + p^2}$, $n_0 = 1$.

2.161. $u(x, t) = \frac{Q_0 l^2}{Sk} \sum_{n=n_0}^{\infty} \frac{\cos \frac{\mu_n x_0}{l} \cos \frac{\mu_n x}{l}}{\mu_n^2 \|X_n\|^2} e^{-\left(\frac{\mu_n}{l}\right)^2 t}$.

1) $\|X_n\|^2 = \frac{l}{2}$, $\mu_n = \frac{\pi(2n+1)}{2l}$, $n_0 = 0$; 2) $\|X_n\|^2 = \frac{l}{2} \frac{\mu_n^2 + p^2 + p}{\mu_n^2 + p^2}$, $\mu_n > 0$ есть корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$, $p = \frac{\alpha l}{k}$, $n_0 = 1$.

2.162. $u(x, t) = \frac{2q_0 l}{k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p \sin \frac{\mu_n x}{l} + \mu_n \cos \frac{\mu_n x}{l}}{\mu_n(\mu_n^2 + p^2 + 2p)} e^{-\left(\frac{\mu_n}{l}\right)^2 t}$, μ_n — положительный корень уравнения $\operatorname{ctg} \mu = \frac{1}{2} \left(\frac{\mu}{p} - \frac{p}{\mu}\right)$, $p = hl$.

У к а з а н и е. Функция $u(x, 0) = u_0(x)$ — решение задачи

$$\begin{aligned} u_0''(x) + \frac{q}{k} \delta(x) &= 0, \quad 0 < x < l, \\ u_0'(0) - h u_0(0) &= 0, \quad u_0'(l) + h u_0(l) = 0. \end{aligned}$$

Для вычисления нормы $\|X_n\|$ применить формулы (2.98), (2.99).

2.163. $u(x, t) = \frac{4u_0}{\pi^2} e^{-\beta t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n+1) \cos \sqrt{\lambda_n} e^{-a^2 \lambda_n t}}{(2n+1)^2 + \gamma^2}$, $\sqrt{\lambda_n} = \frac{(2n+1)\pi}{2l}$,

$$\beta = \frac{\alpha P}{\rho C S}, \quad \gamma^2 = \frac{4\alpha l^2 P}{\pi^2 k S}.$$

$$2.164. u(x, t) = \frac{8q_0 l}{\pi^2} e^{-\beta t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \sqrt{\lambda_n} e^{-a^2 \lambda_n t}}{(2n+1)^2 + \gamma^2}, \quad \sqrt{\lambda_n} = \frac{(2n+1)\pi}{2l}, \quad \beta = \frac{\alpha P}{\rho CS},$$

$$\gamma^2 = \frac{4\alpha l^2 P}{\pi^2 k S}.$$

$$2.165. u(x, t) = \frac{2q_0 l}{k} e^{-\beta t} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n^2 + p^2}{\mu_n^2 (\mu_n^2 + p^2 + p)} \cos \mu_n \left(1 - \frac{x}{l}\right) e^{-\left(\frac{\mu_n a}{l}\right)^2 t},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$, $p = hl$.

$$2.166. u(x, t) = \frac{\alpha P \cos \frac{\pi x}{2l} e^{-(\frac{\pi a}{2l})^2 t - \beta t}}{k S \left(\frac{\pi^2}{4l^2} + \frac{\alpha P}{k S}\right)}, \quad \beta = \frac{\alpha P}{\rho CS}.$$

$$2.167. u(x, t) = \frac{2\gamma^2 u_0}{\pi} e^{-\beta t} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sin \frac{\pi n x}{l} e^{-\left(\frac{\pi a n}{l}\right)^2 t}}{n(n^2 + \gamma^2)}, \quad \beta = \frac{\alpha P}{\rho CS}, \quad \gamma^2 = \frac{\alpha l^2 P}{\pi^2 k S}.$$

$$2.168. u(x, t) = \frac{2u_0}{l} \left(\frac{P}{S} + \frac{\alpha}{k}\right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \cos \frac{\mu_n x}{l} e^{-\left(\frac{\mu_n^2}{l^2} a^2 t - \beta t\right)}}{(\mu_n^2 + \gamma^2)(\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0$$

корень уравнения $\mu \sin \mu - p \cos \mu = 0$, $p = \frac{\alpha l}{k}$.

$$2.169. u(x, t) = \frac{2u_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{\pi n x}{l}}{n} e^{-\left(\frac{\pi a n}{l}\right)^2 t}.$$

$$2.170. u(x, t) = \frac{8u_0 c l \operatorname{ch} c l}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l}}{(2n+1)^2 + \left(\frac{2cl}{\pi}\right)^2} e^{-\left[\frac{(2n+1)\pi a}{2l}\right]^2 D t}.$$

$$2.171. u(x, t) = \frac{2\sqrt{2} u_0}{\pi} \sum_0^{\infty} (-1)^{\left[\frac{n+1}{2}\right]} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l}}{2n+1} e^{-\left(\frac{\pi(2n+1)}{2l}\right)^2 D t}.$$

$$2.172. u(x, t) = \frac{u_0 c l \operatorname{sh} c l}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos \frac{\pi n x}{l}}{n^2 + \left(\frac{cl}{\pi}\right)^2} e^{-\left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 D t}.$$

$$2.173. u(x, t) = \frac{m}{l S} + \frac{4q_0 l}{\pi^2 D} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi x}{l}}{(2n+1)^2} e^{-\left(\frac{2n+1}{l}\pi\right)^2 D t}.$$

$$2.174. u(x, t) = 2(p+1)u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \sin \frac{\mu_n x}{l} e^{-\frac{\mu_n^2}{l^2} D t}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0$$

корень уравнения $\mu \cos \mu + p \sin \mu = 0$, $p = \frac{\alpha l}{D}$.

$$2.175. u(x, t) = 2pu_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \cos \frac{\mu_n (l-x)}{l} e^{-\frac{\mu_n^2}{l^2} D t}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0$$

корень уравнения $\mu \sin \mu - p \cos \mu = 0$, $p = \frac{\alpha l}{D}$.

$$\mathbf{2.176.} \quad 1) u(x, t) = \frac{4u_0}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos \sqrt{\lambda_n} e^{-(\lambda_n D + \beta)t}}{2n+1}, \quad \sqrt{\lambda_n} = \frac{(2n+1)\pi}{2l};$$

$$2) u(x, t) = u_0 e^{-\beta t}; \quad 3) u(x, t) = 2pu_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \cos \frac{\mu_n x}{l} e^{-\left(\beta + \frac{\mu_n^2}{l^2} D\right)t}}{\mu_n(\mu_n^2 + p^2 + p)},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$, $p = \frac{\beta l}{D}$.

$$\mathbf{2.177.} \quad 1) u(x, t) = \frac{4u_0}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} e^{-(\lambda_n D - \beta)t}}{2n+1},$$

$$\sqrt{\lambda_n} = \frac{(2n+1)\pi}{l}, \quad \beta l^2 \leq \pi^2 D, \quad m(\infty) = \frac{8lSu_0}{\pi^2};$$

$$2) u(x, t) = \frac{4u_0}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} e^{-(\lambda_n D - \beta)t}}{2n+1},$$

$$\sqrt{\lambda_n} = \frac{(2n+1)\pi}{2l}, \quad 4\beta l^2 \leq \pi^2 D, \quad m(\infty) = \frac{8lSu_0}{\pi^2};$$

$$3) u(x, t) = 4u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \sin^2 \frac{\mu_n}{2} \sin \frac{\mu_n x}{l} e^{-\left(\beta - \frac{\mu_n^2}{l^2} D\right)t}}{\mu_n(\mu_n^2 + p^2 + p)},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$, $p = \frac{\beta l}{D}$, $\sin^2 \frac{\mu_n}{2} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{(-1)^{n+1} \mu_n}{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}} \right)$,

$$\beta l^2 \leq \mu_1^2 D, \quad m(\infty) = \frac{8lSu_0(\mu_1^2 + p^2) \sin^4 \frac{\mu_n}{2}}{\mu_1^2(\mu_1^2 + p^2 + p)}.$$

$$\mathbf{2.178.} \quad 1) u(x, t) = \frac{2Q_0 l}{\pi^2 DS} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \sqrt{\lambda_{2n+1}} x e^{-\lambda_{2n+1} Dt}}{(2n+1)^2}, \quad \sqrt{\lambda_{2n+1}} = \frac{(2n+1)\pi}{l};$$

$$2) u(x, t) = \frac{4\sqrt{2}Q_0 l}{\pi^2 SD} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{[\frac{n}{2}]} \sin \sqrt{\lambda_n} x e^{-\lambda_n Dt}}{(2n+1)^2}, \quad \sqrt{\lambda_n} = \frac{(2n+1)\pi}{2l};$$

$$3) u(x, t) = \frac{2Q_0 l}{SD} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \sin \frac{\mu_n}{2} \sin \frac{\mu_n(l-x)}{l} e^{-\frac{\mu_n^2}{l^2} Dt}}{\mu_n(\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 \quad - \quad \text{корень}$$

уравнения $\mu \cos \mu + p \sin \mu = 0$, $p = \frac{\alpha l}{D}$, $\sin \frac{\mu_n}{2} = \frac{(-1)^{[\frac{n-1}{2}]}}{\sqrt{2}} \sqrt{1 + \frac{(-1)^{n-1} p}{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}}}$;

$$4) u(x, t) = \frac{2Q_0 l}{SD} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \cos \frac{\mu_n}{2} \cos \frac{\mu_n(l-x)}{l} e^{-\frac{\mu_n^2}{l^2} Dt}}{\mu_n(\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 \quad - \quad \text{корень}$$

уравнения $\mu \sin \mu - p \cos \mu = 0$, $p = \frac{\alpha l}{D}$, $\cos \frac{\mu_n}{2} = \frac{(-1)^{[\frac{n}{2}]}}{\sqrt{2}} \sqrt{1 + \frac{(-1)^n p}{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}}}$.

$$\mathbf{2.179.} \quad u(x, t) = \frac{m}{lS} + \frac{2\sqrt{2}Q_0 l}{\pi^2 SD} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{[\frac{n+1}{2}]} \cos \sqrt{\lambda_{2n+1}} x e^{-\lambda_{2n+1} Dt}}{(2n+1)^2},$$

$$\sqrt{\lambda_{2n+1}} = \frac{(2n+1)\pi}{l}.$$

$$\mathbf{2.180.} \quad u(x, t) = 2u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n(\mu_n^2 + p^2) \sin \frac{\mu_n(l-x)}{l} e^{-\left(\frac{\mu_n^2}{l^2} D + \beta\right)t}}{(\mu_n^2 + \gamma^2)(\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 \quad - \quad \text{корень}$$

уравнения $\mu \cos \mu + p \sin \mu = 0$, $p = \frac{\alpha l}{D}$, $\beta = \frac{\alpha P}{S}$, $\gamma^2 = \frac{\alpha Pl^2}{DS}$.

$$2.181. u(x, t) = \frac{2u_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} n \sin \frac{\pi n x}{l} e^{-\left(\frac{\pi^2 n^2}{l^2} D + \beta\right)t}}{n^2 + \gamma^2}, \quad \beta = \frac{\alpha P}{S}, \quad \gamma^2 = \frac{\alpha P l^2}{\pi^2 S D}.$$

$$2.182. u(x, t) = \frac{4u_0 \gamma^2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \sqrt{\lambda_{2n+1}} x e^{-(\lambda_{2n+1} D + \beta)t}}{(2n+1)((2n+1)^2 + \gamma^2)}, \quad \sqrt{\lambda_{2n+1}} = \frac{(2n+1)\pi}{l},$$

$$\beta = \frac{\alpha P}{S}, \quad \gamma^2 = \frac{\alpha P l^2}{\pi^2 D S}.$$

$$2.183. u(x, t) = \frac{u_0}{2} - \frac{4u_0 \gamma^2}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \sqrt{\lambda_{2n+1}} x e^{-(\lambda_{2n+1} D + \beta)t}}{(2n+1)^2((2n+1)^2 + \gamma^2)}, \quad \sqrt{\lambda_{2n+1}} = \frac{(2n+1)\pi}{l},$$

$$\beta = \frac{\alpha P}{S}, \quad \gamma^2 = \frac{\alpha P l^2}{\pi^2 D S}.$$

$$2.184. u(x, t) = \frac{2(u_2 - u_1)}{\pi} \sum_0^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{l}}{2n+1} e^{-\left(\frac{\pi(2n+1)}{l}\right)^2 D t} +$$

$$+ \frac{2(u_2 + u_1)}{\pi} \sum_0^{\infty} \frac{(-1)^n \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l}}{2n+1} e^{-\left(\frac{\pi(2n+1)}{2l}\right)^2 D t}.$$

$$2.185. i(x, t) = -\frac{1}{R} u_x(x, t), \quad u(x, t) = u_0 \sin \frac{3\pi x}{l} e^{-\left(\frac{3\pi}{l}\right)^2 t}.$$

$$2.186. i(x, t) = -\frac{1}{R} u_x(x, t), \quad u(x, t) = u_0 \cos \frac{\pi x}{2l} e^{-\left(\frac{\pi}{2l}\right)^2 t}.$$

$$2.187. u(x, t) = 2(p+1)u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2}}{\mu_n(\mu_n^2 + p^2 + p)} \sin \mu_n \left(1 - \frac{x}{l}\right) e^{-\left(\frac{\mu_n}{l}\right)^2 t},$$

μ_n — положительный корень уравнения $\mu \operatorname{ctg} \mu = -p$, $p = \frac{Rl}{R_0}$, $a^2 = \frac{1}{RC}$.

$$2.188. i(x, t) = -\frac{1}{R} u_x(x, t), \quad u(x, t) = 4u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \sin^2 \frac{\mu_n}{2} \cos \frac{\mu_n x}{l} e^{-\left(\frac{\mu_n}{l}\right)^2 t}}{\mu_n^2(\mu_n^2 + p^2 + p)},$$

μ_n — положительный корень уравнения $\mu \sin \mu = p \cos \mu$, $p = \frac{lR}{R_0}$, $a^2 = \frac{1}{RC}$,

$$\sin^2 \frac{\mu_n}{2} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{(-1)^n \mu_n}{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}}\right).$$

$$2.189. i(x, t) = -\frac{1}{R} u_x(x, t), \quad u(x, t) = \frac{2E_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{\pi n x}{l} e^{-\left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 t}}{n}.$$

$$2.190. i(x, t) = -\frac{1}{R} u_x(x, t), \quad u(x, t) = -2E_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \sin \frac{\mu_n(l-x)}{l} e^{-\left(\frac{\mu_n}{l}\right)^2 t}}{\mu_n(\mu_n^2 + p^2 + p)},$$

μ_n — положительный корень уравнения $\mu \cos \mu + p \sin \mu = 0$, $p = \frac{lR}{R_0}$.

$$2.191. i(x, t) = -\frac{1}{R} u_x(x, t), \quad u(x, t) = u_0 \sin \frac{2\pi x}{l} e^{-\frac{G}{C} t - \left(\frac{2\pi a}{l}\right)^2 t}.$$

$$2.192. i(x, t) = -\frac{1}{R} u_x(x, t), \quad u(x, t) = u_0 \cos \frac{3\pi x}{2l} e^{-\frac{G}{C} t - \left(\frac{3\pi a}{2l}\right)^2 t}.$$

$$\mathbf{2.193.} \quad i(x, t) = -\frac{1}{R}u_x(x, t), \quad u(x, t) = 2E_0 e^{-\beta t} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n(\mu_n^2 + p^2) \sin \frac{\mu_n x}{l} e^{-\left(\frac{\mu_n a}{l}\right)^2 t}}{(\mu_n^2 + (\alpha l)^2)(\mu_n^2 + p^2 + p)},$$

μ_n — положительный корень уравнения $\mu \cos \mu + p \sin \mu = 0$, $p = \frac{lR}{R_0}$, $\beta = \frac{G}{C}$,
 $\alpha = RG$, $a^2 = \frac{1}{RC}$.

$$\mathbf{2.194.} \quad u(x, t) = \frac{4u_0}{\pi} e^{-\frac{G}{C}t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{2(2n+1)\pi x}{l}}{2n+1} e^{-\left(\frac{2(2n+1)\pi a}{l}\right)^2 t}, \quad a^2 = \frac{1}{RC}.$$

$$\mathbf{2.195.} \quad i(x, t) = -\frac{lE_0}{R_1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_1 \cos \frac{\mu_n x}{l} - \mu_n \sin \frac{\mu_n x}{l}}{\|X_n\|^2} e^{-\left(\frac{a\mu_n}{l}\right)^2 t}, \quad \mu_n > 0 \text{ — корень}$$

уравнения (2.100), $\|X_n\|^2$ определяется выражением (2.102), где $p_{1,2} = \frac{lR}{R_{1,2}}$.

У к а з а н и е. Ток в линии $i(x, t) = -\frac{1}{R}u_x(x, t)$, $u(x, t)$ — решение задачи

$$\begin{aligned} u_{ttt} &= a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u_x(0, t) - h_1 u(0, t) &= 0, \\ u_x(l, t) + h_2 u(l, t) &= 0, \\ u(x, 0) &= u_0(x), \quad u_t(x, 0) = 0, \end{aligned}$$

где $h_i = \frac{R}{R_i}$, $i = 1, 2$. Задачу для $u_0(x)$ можно поставить в двух (эквивалентных) формах (см. задачу 10.270):

$$\begin{aligned} 1) \quad u_0''(x) &= 0, \quad 0 < x < l, & 2) \quad u_0''(x) &= -h_1 E_0 \delta(x), \\ u_0'(0) - h_1 u_0(0) &= -h_1 E_0, & 0 < x < l, & \\ u_0'(l) + h_2 u_0(l) &= 0, & u_0'(0) - h_1 u_0(0) &= 0, \\ & & u_0'(l) + h_2 u_0(l) &= 0. \end{aligned} \quad (2.103)$$

Постановка (1) удобна для определения явного вида функции $u_0(x)$, а постановка (2) — для вычисления коэффициентов ряда Фурье этой функции (см. пример 2.3.)

$$\mathbf{2.196.} \quad 1) \quad \Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_2(x) e^{-\frac{iE_2}{\hbar}t} - \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_6(x) e^{-\frac{iE_6}{\hbar}t}, \quad P_n = \frac{1}{2} \delta_{n2} + \frac{1}{2} \delta_{n6};$$

$$2) \quad \Psi(x, t) = \frac{3}{\sqrt{10}} \psi_4(x) e^{-\frac{iE_4}{\hbar}t} - \frac{1}{\sqrt{10}} \psi_{12}(x) e^{-\frac{iE_{12}}{\hbar}t}, \quad P_n = \frac{9}{10} \delta_{n4} + \frac{1}{10} \delta_{n,12},$$

$$\psi_n = \frac{1}{\sqrt{l}} \sin \frac{\pi n}{2} \left(1 + \frac{x}{l}\right), \quad E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{8ml^2} n^2, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (2.104)$$

$$\mathbf{2.197.} \quad 1) \quad \Psi(x, t) = \frac{8\sqrt{15}}{\pi^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^3} \psi_{2n+1}(x) e^{-\frac{iE_{2n+1}}{\hbar}t},$$

$$P(E = E_{2n+1}) = \frac{960}{\pi^6 (2n+1)^6}, \quad P(E = E_{2n}) = 0;$$

$$2) \quad \Psi(x, t) = -\frac{3\sqrt{105}}{\pi^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \psi_{2n}(x) e^{-\frac{iE_{2n}}{\hbar}t},$$

$$P(E = E_{2n}) = \frac{945}{\pi^6 n^6}, \quad P(E = E_{2n+1}) = 0,$$

где ψ_n и E_n имеют вид (2.104).

$$2.198. u(x, t) = \frac{M_0 l p^2}{GJ} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n(x) \cos \frac{\mu_n a}{l} t}{\mu_n^2 (\mu_n^2 + p^2 + p)},$$

$$X_n(x) = \begin{cases} \frac{\sin \frac{\mu_n x}{l}}{\sin \frac{\mu_n}{2}}, & 0 < x < \frac{l}{2}, \\ \frac{\cos \mu_n \left(1 - \frac{x}{l}\right)}{\cos \frac{\mu_n}{2}}, & \frac{l}{2} < x < l, \end{cases}$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$, $p = \frac{2lK_0}{K}$, $a^2 = \frac{GI}{K}$.

$$2.199. u(x, t) = \frac{u_0}{p+1} - 4u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1 - \cos \mu_n)(\mu_n^2 + p^2) \cos \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{a\mu_n t}{l}}{\mu_n^2 (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \cos \mu_n =$$

$$= \frac{(-1)^n p}{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}}, \quad p = \frac{Kl}{K_0}, \quad \mu_n > 0 \text{ — корень уравнения } \operatorname{tg} \mu = -\frac{\mu}{p}.$$

$$2.200. 1) u(x, t) = \frac{It}{m+m_0} + \frac{2lI}{ma} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\mu_n^2 + p^2}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)} \cos \mu_n \left(1 - \frac{x}{l}\right) \sin \frac{\mu_n a}{l} t;$$

$$2) u(x, t) = -\frac{It}{m+m_0} - \frac{2lI}{m_0 a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \cos \mu_n \left(1 - \frac{x}{l}\right) \sin \frac{\mu_n a}{l} t}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0$$

есть корень уравнения $\mu \operatorname{ctg} \mu = -p$, $p = \frac{\rho_0 l S}{m}$.

У к а з а н и е. Начальные условия 1) представить в форме $u(x, 0) = 0$, $S\rho(x)u_t(x, 0) = I\delta(x)$, где $\rho(x) = \rho_0 + \frac{m}{S}\delta(x)$; собственные функции $X_n(x) = \cos \mu_n \left(1 - \frac{x}{l}\right)$ ортогональны с весом $\rho(x)$.

$$2.201. 1) u(x, t) = \frac{2lI}{ma} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \sin \frac{\mu_n x}{l} \sin \frac{\mu_n a}{l} t}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)};$$

$$2) u(x, t) = 2h \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \sin \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{\mu_n a}{l} t}{\mu_n^2 (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 \text{ — корень уравне-}$$

ния $\mu \operatorname{tg} \mu = p$, $p = \frac{m_0}{m}$, $m_0 = \rho_0 l$ — масса струны.

У к а з а н и е к п. 2. Решение $u(x, t)$ представляет собой ряд по собственным функциям оператора $\mathcal{L}$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n X_n(x) \cos \omega_n t, \quad \text{где } A_n = \frac{(w, \rho X_n)}{\|X_n\|^2};$$

$\mathcal{L}$ определен соотношением $\rho \mathcal{L}f = -f''$, а собственные функции $X_n(x)$ и функция $w(x)$ — начальное отклонение струны — являются решениями задач (см. также примеры 1.6 и 2.8):

$$X_n'' + \lambda \rho X_n = 0, \quad 0 < x < l, \quad w'' = 0, \quad 0 < x < l,$$

$$X_n(0) = X_n'(l) = 0, \quad w(0) = 0, \quad w'(l) = \frac{h}{l}.$$

В примере 2.8 изложен способ вычисления значения функционала $(w, \rho X_n)$, основанный на эрмитовости оператора $\mathcal{L}$ и требующий меньшее количество операций, чем непосредственное интегрирование. В данном случае этот прием не пригоден, так как $w(x)$ не принадлежит области определения $\mathcal{M}_{\mathcal{L}}$ опера-

тора. Однако можно построить обобщенную функцию $\tilde{w}$, удовлетворяющую условиям: $(w, \rho X_n) = (\tilde{w}, \rho X_n)$ и $\tilde{w} \in \mathcal{M}_{\mathcal{L}}$. Такой будет функция

$$\tilde{w}(x) = w(x), \quad x \in [0, l], \quad \tilde{w}'(x) = \begin{cases} w'(x), & 0 \leq x < l, \\ 0, & x = l. \end{cases}$$

Так как $[\tilde{w}']_{x=l} = -\frac{h}{l}$ и $\tilde{w}'' = -\frac{h}{l}\delta(x-l)$, то $(\tilde{w}, \rho X_n) = \frac{1}{\lambda_n}(\tilde{w}, \rho \mathcal{L} X_n) = \frac{1}{\lambda_n}(\rho \mathcal{L} \tilde{w}, X_n) = -\frac{1}{\lambda_n}(\tilde{w}'', X_n) = \frac{h}{\lambda_n l}(\delta(x-l), X_n) = \frac{h X_n(l)}{\lambda_n l}$.

2.202. $v(t) = \frac{2m_0 I}{m^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{\mu_n a}{l} t}{\mu_n^2 + p^2 + p}$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$;
 $p = \frac{2\rho_0 l}{m}$.

2.203. $u(x, t) = 2pu_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \sin \mu_n \left(1 - \frac{|x|}{l}\right) \cos \frac{\mu_n a t}{l}}{\mu_n^2 (\mu_n^2 + p^2 + p)}$, $p = \frac{2\rho l}{m}$,
 $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$.

2.204. $u(x, t) = \frac{8h}{\pi^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} \cos \frac{(2n+1)\pi a t}{l}}{(2n+1)^3}$.

2.205. $u(x, t) = I \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n(x) \sin \mu_n t}{\mu_n \|X_n\|^2}$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения

$$\frac{1}{a_1} \operatorname{ctg} \frac{\mu}{a_1} x_0 + \frac{1}{a_2} \operatorname{ctg} \frac{\mu}{a_2} (l - x_0) = 0, \quad a_i = \sqrt{\frac{T}{\rho_i}}, \quad i = 1, 2,$$

собственные функции ортогональны на промежутке $[0; l]$ с весом

$$\rho(x) = \begin{cases} \rho_1, & 0 < x < x_0, \\ \rho_2, & x_0 < x < l, \end{cases}$$

и могут быть представлены в виде

$$X_n(x) = \begin{cases} \frac{\sin \frac{\mu_n}{a_1} x}{\sin \frac{\mu_n}{a_1} x_0}, & 0 < x < x_0, \\ \frac{\sin \frac{\mu_n}{a_2} (l - x)}{\sin \frac{\mu_n}{a_2} (l - x_0)}, & x_0 < x < l, \end{cases}$$

$$\|X_n\|^2 = \frac{\rho_1 x_0}{2 \sin^2 \frac{\mu_n x_0}{a_1}} + \frac{\rho_2 (l - x_0)}{2 \sin^2 \frac{\mu_n (l - x_0)}{a_2}}.$$

З а м е ч а н и е. Уравнение для собственных значений получено в результате деления уравнения $\frac{1}{a_1} \cos \frac{\mu}{a_1} x_0 \sin \frac{\mu}{a_2} (l - x_0) + \frac{1}{a_2} \sin \frac{\mu}{a_1} x_0 \cos \frac{\mu}{a_2} (l - x_0) = 0$ на $\sin \frac{\mu x_0}{a_1} \sin \frac{\mu (l - x_0)}{a_2}$, что может привести к потере части собственных значений (следовательно, и собственных функций), а именно тех, при которых $\sin \frac{\mu x_0}{a_1} = \sin \frac{\mu (l - x_0)}{a_2} = 0$; это будет, если $(\frac{l}{x_0} - 1) \sqrt{\frac{\rho_2}{\rho_1}}$ — рациональное

число (см. задачу 2.7.) Однако в данном случае соответствующие собственные функции обращаются в нуль при $x = x_0$ и не дают вклада в решение.

$$\mathbf{2.206.} \quad i(t) = -\frac{2Q}{C_0} \sqrt{\frac{C}{L}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n \sin \frac{\mu_n a}{l} t}{\mu_n^2 + p^2 + p}, \quad p = \frac{Cl}{C_0}, \quad \mu_n > 0 \text{ — корень уравнения}$$

$\mu \operatorname{tg} \mu = p$. У к а з а н и е. $i(t) = C_0 u_t(l, t)$, $u(x, t)$ — решение задачи

$$\rho(x) u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \quad \rho(x) = 1 + \frac{C_0}{C} \delta(x - l), \quad a^2 = \frac{1}{LC},$$

$$u(0, t) = u_x(l, t) = 0,$$

$$\rho(x) u(x, 0) = \frac{Q}{C} \delta(x - l), \quad u_t(x, 0) = 0.$$

$$\mathbf{2.207.} \quad u(x, t) = 2u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n^2 + p^2}{\mu_n(\mu_n^2 + p^2 + p)} \sin \mu_n \left(1 - \frac{x}{l}\right) e^{-(\frac{\mu_n a}{l})^2 t}, \quad \mu_n > 0 \text{ есть}$$

корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$, $p = \frac{\rho_0 S_0 CL}{C_0}$.

$$\mathbf{2.208.} \quad u(x, t) = q_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n(l) X_n(x)}{\mu_n \|X_n\|^2} e^{-\mu_n^2 t}, \quad \mu_n > 0 \text{ — корень уравнения}$$

$$\frac{k_1}{a_1} \cos \frac{\mu}{a_1} x_0 \cos \frac{\mu}{a_2} (l - x_0) - \frac{k_2}{a_2} \sin \frac{\mu}{a_1} x_0 \sin \frac{\mu}{a_2} (l - x_0) = 0,$$

собственные функции определены с точностью до постоянного множителя

$$a_i = \sqrt{\frac{k_i}{C_i \rho_i}}, \quad i = 1, 2, \quad X_n = \begin{cases} A_{1n} \sin \frac{\mu_n}{a_1} x, & 0 < x < x_0, \\ A_{2n} \cos \frac{\mu_n}{a_2} (l - x), & x_0 < x < l, \end{cases}$$

$$\text{если } \sin^2 \frac{\mu_n x_0}{a_1} + \cos^2 \frac{\mu_n (l - x_0)}{a_2} \neq 0, \text{ то } \begin{cases} A_{1n} = \frac{1}{\sin \frac{\mu_n x_0}{a_1}}, \\ A_{2n} = \frac{1}{\cos \frac{\mu_n (l - x_0)}{a_2}}, \end{cases}$$

$$\text{если } \sin^2 \frac{\mu_n x_0}{a_1} + \cos^2 \frac{\mu_n (l - x_0)}{a_2} = 0 \text{ то } \begin{cases} A_{1n} = \frac{a_1}{k_1 \cos \frac{\mu_n x_0}{a_1}}, \\ A_{2n} = \frac{a_2}{k_2 \sin \frac{\mu_n (l - x_0)}{a_2}}. \end{cases}$$

Функции $X_n(x)$ ортогональны на промежутке $[0; l]$ с весом

$$\rho(x) C(x) = \begin{cases} \rho_1 C_1, & 0 < x < x_0, \\ \rho_2 C_2, & x_0 < x < l, \end{cases}$$

$$\|X_n\|^2 = \frac{1}{2} [\rho_2 C_2 l X_n^2(l) - x_0 (\rho_2 C_2 - \rho_1 C_1) X_n^2(x_0) + \\ + \frac{x_0}{\lambda_n} (k_2 - k_1) X_n'(x_0 - 0) X_n'(x_0 + 0)].$$

У к а з а н и е. Норму $\|X_n\|$ вычислить способом, изложенным в указании к задаче 2.114.

$$\mathbf{2.209.} \quad Q(t) = 2Q_0 \frac{Cl}{C_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-(\frac{\mu_n a}{l})^2 t}}{\mu_n^2 + p^2 + p}, \quad \mu_n \text{ — положительный корень уравне-}$$

ния $\mu \operatorname{tg} \mu = p$, $p = \frac{Cl}{C_0}$.

2.210. $u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n X_n e^{-\lambda_n t}$, $\lambda_n \geq 0$ — корень уравнения (2.95), коэффициенты ряда

$$A_0 = \frac{u_1 l_1 + u_2 l_2}{c_1 l_1 + c_2 l_2}, \quad A_n = \frac{2}{\lambda_n} \frac{\frac{D_2 u_2}{c_2} X'_n(+0) - \frac{D_1 u_1}{c_1} X'_n(-0)}{\frac{l_1}{c_1} X_n^2(-l_1) + \frac{l_2}{c_2} X_n^2(l_2)}, \quad n \in \mathbb{N},$$

собственные функции $X_n(x)$ ортогональны на промежутке $(-l_1, l_2)$ с весом $\rho(x) = 1/c(x)$ и имеют вид (2.96), $u(x, \infty) = c(x) \frac{u_1 l_1 + u_2 l_2}{c_1 l_1 + c_2 l_2}$.

У к а з а н и е. Для вычисления нормы $\|X_n\|$ применить способ, изложенный в указании к задаче 2.114.

2.211. $u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n X_n e^{-\lambda_n t}$, $\lambda_n \geq 0$ — корни уравнения (2.97), коэффициенты ряда

$$A_0 = \frac{u_1 l_1 + u_2 l_2}{c_1 l_1 + c_2 l_2}, \quad A_n = \frac{1}{\lambda_n \|X_n\|^2} \left(\frac{D_2 u_2}{c_2} X'_n(+0) - \frac{D_1 u_1}{c_1} X'_n(-0) \right),$$

$$\|X_n\|^2 = \frac{1}{2} \left[\frac{l_1}{c_1} X_n^2(-l_1) + \frac{l_2}{c_2} X_n^2(l_2) + \frac{\alpha}{\lambda_n} \left(\frac{X_n(+0)}{c_1} - \frac{X_n(-0)}{c_2} \right)^2 \right], \quad n \in \mathbb{N},$$

собственные функции $X_n(x)$ ортогональны на промежутке $(-l_1, l_2)$ с весом $\rho(x) = 1/c(x)$ и имеют вид (2.97), $u(x, \infty) = c(x) \frac{u_1 l_1 + u_2 l_2}{c_1 l_1 + c_2 l_2}$.

У к а з а н и е. Для вычисления нормы $\|X_n\|$ применить способ, изложенный в указании к задаче 2.114.

2.212. $i(x, t) = \frac{2u_0(1+p)}{aL} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \cos \frac{\mu_n(l-x)}{l} \sin \frac{\mu_n a t}{l}}{\mu_n(\mu_n^2 + p^2 + p)}$, $\mu_n > 0$

есть корень уравнения $\mu \cos \mu + p \sin \mu = 0$, $p = \frac{lL}{L_0}$, $a = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

Р е ш е н и е (фрагменты). Если считать индуктивность линии функцией x , т. е.

$$L(x) = L + L_0 \delta(x) = L \rho(x), \quad \rho(x) = 1 + \frac{l}{p} \delta(x),$$

то можно предложить следующую модель распространения электромагнитного поля в линии:

$$u_x + i_t L(x) = 0, \quad 0 < x < l, \quad t > 0,$$

$$i_x + u_t C = 0,$$

$$u(0, t) = u(l, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = \frac{u_0(l-x)}{l}, \quad i(x, 0) = 0.$$

Для определения тока получается задача

$$\rho(x) i_{tt} = a^2 i_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \quad a^2 = \frac{1}{LC},$$

$$i_x(0, t) = i_x(l, t) = 0,$$

$$i(x, 0) = 0, \quad i_t(x, 0) L(x) = -\frac{u_0}{l} + u_0 \delta(x).$$

Применение метода Фурье формирует для множителей $X(x)$ и $T(t)$ функции $i(x, t) = X(x)T(t)$ задачу Штурма–Лиувилля для $X(x)$ (см. пример 2.9) и уравнение для $T(t)$:

$$X'' + \lambda X = 0, \quad 0 < x < l, \quad T'' + a^2 \lambda T = 0, \quad t > 0,$$

$$X''(0) - \frac{1}{h} X(0) = 0, \quad X'(l) = 0,$$

решения которых

$$\lambda_0=0, \quad X_0(x)=1, \quad T_0(t)=A_0t+B_0, \\ \lambda_n=\left(\frac{\mu_n}{l}\right)^2, \quad X_n(x)=\cos \frac{\mu_n(l-x)}{l}, \quad T_n(t)=A_n \sin \omega_n t+B_n \cos \omega_n t, \quad \omega_n=a\sqrt{\lambda_n};$$

собственные функции $X_n(x)$ ортогональны с весом $\rho(x)$ на промежутке $(0; l)$:

$$\int_0^l X_m(x)X_n(x)\rho(x)dx = \frac{l}{2} \frac{\mu_n^2 + p^2 + p}{\mu_n^2 + p^2} \delta_{mn}.$$

Решение завершается представлением функции $i(x, t)$ рядом по собственным функциям:

$$i(x, t) = A_0t + B_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \sin \omega_n t + B_n \cos \omega_n t) X_n(x).$$

Из начального условия $i(x, 0) = 0$ следует, что $B_n = 0$, $n = 0, 1, 2, \dots$, второе условие

$$\frac{u_0}{L} \left(\frac{1}{l} - \delta(x) \right) = A_0 \rho(x) + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \omega_n X_n \rho(x)$$

определяет все коэффициенты B_n .

2.213. $i(x, t) = \frac{2u_0(1+p)}{lL} e^{-\frac{\beta t}{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \cos \frac{\mu_n x}{l} \sin \frac{\omega_n t}{l}}{\omega_n (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n - \text{поло-}$
 жительный корень уравнения $\mu \cos \mu + p \sin \mu = 0$, $p = \frac{lL}{L_0}$, $\beta = \frac{G}{C}$, $a = \frac{1}{\sqrt{LC}}$,
 $\omega_n = \sqrt{\left(\frac{a\mu_n}{l}\right)^2 - \left(\frac{\beta}{2}\right)^2}.$

2.214. $u(x, t) = 4E_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \sin^2 \frac{\mu_n}{2} \sin \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 - \text{корень}$
 уравнения $\mu \sin \mu = p \cos \mu$, $p = \frac{lC}{C_0}$, $a = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $\sin^2 \frac{\mu_n}{2} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{(-1)^n \mu_n}{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}} \right).$

2.215. $u(x, t) = 2E_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \cos \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n^2 + p^2 + p}, \quad \mu_n > 0 - \text{корень}$
 уравнения $p \sin \mu + \mu \cos \mu = 0$, $p = \frac{lC}{C_0}$, $a = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$

2.216. $u(x, t) = 2E_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \sin \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 - \text{корень уравнения}$
 $\mu \sin \mu = p \cos \mu$, $p = \frac{lC}{C_0}$, $a = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$

2.217. $u(x, t) = 2E_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2)(\cos \omega_n t + \frac{\beta}{2\omega_n} \sin \omega_n t) \sin \frac{\mu_n x}{l}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)}, \quad \mu_n > 0 - \text{ко-}$
 рень уравнения $\mu \sin \mu = p \cos \mu$, $p = \frac{lC}{C_0}$, $a = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $\omega_n = \sqrt{\left(\frac{a\mu_n}{l}\right)^2 - \left(\frac{\beta}{2}\right)^2}.$

2.218 $\Psi(r, t) = \frac{3}{\sqrt{10}} \psi_3(r) e^{-\frac{iE_3 t}{\hbar}} - \frac{1}{\sqrt{10}} \psi_9 e^{-\frac{iE_9 t}{\hbar}}, \quad \psi_n(r) = \frac{2}{\sqrt{r_0}} \frac{\sin \frac{\pi n r}{r_0}}{r}, \quad E_n =$
 $= \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mr_0^2} n^2, \quad n \in \mathbb{N}, \quad P(n=1) = 0.$

$$2.219. \quad u(r, t) = \frac{2r_0 u_0}{\pi r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin \frac{\pi n r}{r_0} e^{-\left(\beta + \left(\frac{\pi n}{r_0}\right)^2 D\right) t}.$$

2.220. Если $hr_0 = 1$, то

$$u(r, t) = \frac{8u_0 r_0}{\pi^2 r} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi r}{2r_0} (2n+1)^2 e^{-\left(\beta + \left(\frac{(2n+1)\pi}{2r_0}\right)^2 D\right) t}}{(2n+1)^2};$$

если $hr_0 \neq 1$, то

$$u(r, t) = \frac{2hr_0^2 u_0}{r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)} \sin \frac{\mu_n r}{r_0} e^{-\left(\beta + \left(\frac{\mu_n}{r_0}\right)^2 D\right) t},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{ctg} \mu = -p$, $p = hr_0 - 1$.

$$2.221. \quad 1) \quad u(r, t) = \frac{8r_0 u_0}{\pi^3 r} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi r}{r_0}}{(2n+1)^3} e^{-\left(\frac{(2n+1)\pi a}{r_0}\right)^2 t};$$

$$2) \quad u(r, t) = \frac{12r_0 u_0}{\pi^3 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^3} \sin \frac{\pi n r}{r_0} e^{-\left(\frac{\pi a n}{r_0}\right)^2 t}.$$

2.222. Если $hr_0 = 1$, то

$$u(r, t) = \frac{16u_0 r_0}{\pi^4 r} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n [12 + (2n+1)^2 \pi^2] \sin \frac{(2n+1)\pi r}{2r_0}}{(2n+1)^4} e^{-\left(\frac{(2n+1)\pi a}{2r_0}\right)^2 t};$$

если $hr_0 \neq 1$, то

$$u(r, t) = \frac{4r_0 u_0}{r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (\mu_n^2 + 3hr_0) \sqrt{\mu_n^2 + p^2}}{\mu_n^3 (\mu_n^2 + p^2 - p)} \sin \frac{\mu_n r}{r_0} e^{-\left(\frac{\mu_n a}{r_0}\right)^2 t},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{ctg} \mu = -p$, $p = hr_0 - 1$.

$$2.223. \quad 1) \quad u(r, t) = \frac{2u_0}{\pi r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r_1 + (-1)^{n+1} r_2}{n} \sin \frac{\pi n (r - r_1)}{r_2 - r_1} e^{-\left(\frac{\pi a n}{r_2 - r_1}\right)^2 t};$$

$$2) \quad u(r, t) = \frac{4u_0 (r_2 - r_1)^2}{\pi^3 r_1 r_2 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{[2(-1)^n + 1] [r_1 - (-1)^n r_2]}{n^3} \times \\ \times \sin \frac{\pi n (r - r_1)}{r_2 - r_1} e^{-\left(\frac{\pi a n}{r_2 - r_1}\right)^2 t}.$$

$$2.224. \quad u(r, t) = \frac{2pr_1 u_0}{r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 - p)} \sin \mu_n \frac{r - r_1}{r_2 - r_1} e^{-\left(\frac{\mu_n a}{r_2 - r_1}\right)^2 t},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{ctg} \mu = p$, $p = 1 - \frac{r_1}{r_2}$.

$$2.225. \quad u(r, t) = \frac{21A}{74} + 2A \sum_{n=1}^{\infty} \frac{16\mu_n^2 + 1}{\mu_n^3 (144\mu_n^2 + 37)} \left(1 + (-1)^{n+1} \sqrt{\frac{9\mu_n^2 + 1}{16\mu_n^2 + 1}} \right) \times \\ \times R_n(r) e^{(a\mu_n)^2 t}, \quad R_n(r) = \frac{1}{r} (\sin \mu_n (r - 3) + 3\mu_n \cos \mu_n (r - 3)),$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu = (1 + 12\mu^2) \sin \mu$.

У к а з а н и е. См. задачу 2.20, п. 4.

$$2.226. \quad u(x, t) = \frac{2l_0 u_0}{\pi(l_0 - x)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{\pi n x}{l_0} e^{-\left(\frac{\pi a n}{l_0}\right)^2 t}.$$

$$2.227. u(x, t) = \frac{2l_0 u_0}{\pi(l_0 - x)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{\pi n x}{l} e^{-\left(\frac{\pi a n}{l}\right)^2 t}.$$

$$2.228. u(r, t) = \frac{9Q}{56\pi D} + \frac{Q}{2\pi D} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4\mu_n^2 + 1}{\mu_n^3(4\mu_n^2 + 7)} \left(1 + (-1)^{n+1} \sqrt{\frac{\mu_n^2 + 1}{4\mu_n^2 + 1}}\right) \times \\ \times R_n(r) e^{(a\mu_n)^2 t}, \quad R_n(r) = \frac{1}{r} (\sin \mu_n(r-1) + \mu_n \cos \mu_n(r-1)), \\ \mu_n > 0 - \text{корень уравнения } \mu \cos \mu = (1 + 2\mu^2) \sin \mu.$$

У к а з а н и е. См. задачи 2.20, п. 4.

$$2.229. 1) u(r, t) = \frac{8A(r_2 - r_1)^2}{\pi^3 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{\pi(2n+1)(r-r_1)}{r_2-r_1} \cos \frac{\pi a(2n+1)t}{r_2-r_1}}{(2n+1)^3}; \\ 2) u(r, t) = \frac{4A(r_2 - r_1)^2}{\pi^3 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2+(-1)^n)(r_1 - (-1)^n)}{n^4} \sin \frac{\pi n(r-r_1)}{r_2-r_1} \cos \frac{\pi a n t}{r_2-r_1} t.$$

$$2.230. u(r, t) = \frac{4A(r_2 - r_1)^3}{ar} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n^2 + p^2}{\mu_n^4(\mu_n^2 + p^2 - p)} \left(1 + \frac{(-1)^n p}{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}}\right) \sin \frac{\mu_n(r-r_1)}{r_2-r_1} \times \\ \times \sin \frac{a\mu_n t}{r_2-r_1}, \quad \mu_n > 0 - \text{корень уравнения } \mu \cos \mu = p \sin \mu, \quad p = 1 - \frac{r_1}{r_2}.$$

$$2.231. u(x, t) = -\frac{2(l_0 - l)I}{\rho_0 a S_2(l_0 - x)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2}}{\mu_n^2 + p^2 + p} \sin \frac{\mu_n x}{l} \sin \frac{\mu_n a t}{l}, \\ \mu_n > 0 - \text{корень уравнения } \mu \operatorname{ctg} \mu = -p, \quad p = \frac{l}{l_0 - l}, \quad l_0 = \frac{\sqrt{S_1}}{\sqrt{S_1} - \sqrt{S_2}} l.$$

$$2.232. u(x, t) = \frac{I}{m_0} \left(t + \frac{2l^2}{3a(l-x)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{1+\mu_n^2}}{\mu_n^2} \sin \mu_n \left(1 - \frac{x}{l}\right) \sin \frac{\mu_n a}{l} t \right), \\ \mu_n > 0 - \text{корень уравнения } \operatorname{tg} \mu = \mu, \quad m_0 - \text{масса стержня.}$$

$$2.233. u(x, y) = \frac{4u_1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sh} \frac{(2n+1)\pi x}{l_2} \sin \frac{(2n+1)\pi y}{l_2}}{(2n+1) \operatorname{sh} \frac{(2n+1)\pi l_1}{l_2}} + \\ + \frac{4u_2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sh} \frac{(2n+1)\pi y}{l_1} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{l_1}}{(2n+1) \operatorname{sh} \frac{(2n+1)\pi l_2}{l_1}}.$$

У к а з а н и е. Решение представить в виде суммы $u(x, y) = u_1(x, y) + u_2(x, y)$, где $u_1(x, y)$ удовлетворяет однородным граничным условиям при $y = 0$ и $y = l_2$, а $u_2(x, y)$ — однородным граничным условиям при $x = 0$ и $x = l_1$.

$$2.234. u(x, y) = \frac{12u_0}{\pi^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \operatorname{ch} \frac{\pi n(l_1 - x)}{l_2} \sin \frac{\pi n y}{l_2}}{n^3 \operatorname{ch} \frac{\pi n l_1}{l_2}}.$$

$$2.235. 1) u(x, y) = \frac{q_0 l}{2\pi k} \sin \frac{2\pi y}{l} e^{-\frac{2\pi x}{l}}; \\ 2) u(x, y) = \frac{8q_0 l}{\pi^2 k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos \frac{(2n+1)\pi y}{2l}}{(2n+1)^2} e^{-\frac{(2n+1)\pi x}{2l}}.$$

$$2.236. u(x, y) = \frac{Q}{4\pi k h} \ln \frac{\operatorname{ch} \frac{\pi x}{2l} + \cos \frac{\pi y}{2l}}{\operatorname{ch} \frac{\pi x}{2l} - \cos \frac{\pi y}{2l}}.$$

$$2.237. u(x, y, z) = C - \frac{I}{\sigma l_1 l_2} \left(\frac{z}{4} + \sum_{m,n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{\pi m x}{l_1} \cos \frac{\pi n y}{l_2} \operatorname{sh} \sqrt{\lambda_{mn}} z}{\sqrt{\lambda_{mn}} \operatorname{ch} \sqrt{\lambda_{mn}} l_3} \right),$$

$$\lambda_{mn} = \pi^2 \left(\frac{m^2}{l_1^2} + \frac{n^2}{l_2^2} \right).$$

$$2.238. 1) u(r, \varphi) = \frac{u_0}{2} \left(1 + \frac{r^2}{r_0^2} \cos 2\varphi \right); \quad 2) u(r, \varphi) = \frac{u_0 r}{4r_0} \left(3 \sin \varphi - \frac{r^2}{r_0^2} \right).$$

$$2.239. 1) \mathbf{A}(r) = A(r) \mathbf{e}_\varphi, \quad A(r) = \begin{cases} \frac{2J}{c} \ln \frac{1}{r_0} + C, & 0 \leq r \leq r_0, \\ \frac{2J}{c} \ln \frac{1}{r} + C, & r_0 \leq r; \end{cases}$$

$$2) \mathbf{A}(r, \varphi) = A(r, \varphi) \mathbf{e}_\varphi,$$

$$A(r) = \begin{cases} C - \frac{2\pi i_0}{c} \ln \frac{1}{r_0} + \frac{\pi i_0 r^2 \cos 2\varphi}{2r_0^2}, & 0 \leq r \leq r_0, \\ C - \frac{2\pi i_0 r_0}{c} \ln \frac{1}{r} + \frac{\pi i_0 r_0^2 \cos 2\varphi}{2r^2}, & r_0 \leq r. \end{cases}$$

У к а з а н и е. См. задачу 1.410.

$$2.240. \mathbf{A}(r) = A(r) \mathbf{e}_\varphi, \quad A(r) = \begin{cases} \frac{2i_0 r}{c}, & 0 \leq r \leq r_0, \\ \frac{2i_0 r_0^2}{cr}, & r_0 \leq r. \end{cases}$$

У к а з а н и е. См. задачу 1.412.

$$2.241. \mathbf{A}(r) = A(r) \mathbf{e}_\varphi, \quad A(r) = \frac{\pi \rho \omega r_0^2}{c} \begin{cases} r \left(1 - \frac{r^2}{2r_0^2} \right), & 0 \leq u \leq r_0, \\ \frac{r_0^2}{2r}, & r_0 < r. \end{cases}$$

У к а з а н и е. См. задачу 1.413.

$$2.242. \sigma(\varphi) = \frac{E_0}{2\pi} \cos \varphi.$$

$$2.243. P = P_0 + \frac{\rho_0 V^2(t)}{2} (4 \cos^2 \varphi - 3) + \rho_0 r_0 \frac{dV(t)}{dt} \cos \varphi.$$

$$2.244. \mathbf{V} = \nabla u, \quad u(r, \varphi) = -\frac{V_0 r_0^2}{r} \sin \varphi + C, \quad \mathbf{V}|_S = -\frac{V_0 r_0^2}{r^2} \mathbf{e}_e, \text{ ось } Oy \text{ направ-}$$

лена по ускорению свободного падения $\mathbf{g}$. У к а з а н и е. Продолжить функцию $u(r, \varphi)$ так, чтобы получить для нее внешнюю задачу Неймана для круга.

$$2.245. u(r, \varphi) = \frac{u_0 h r \sin \varphi}{1 + h r_0}.$$

$$2.246. u(r, \varphi) = \frac{q_0}{\pi k h} \left(1 + \frac{\pi h \cos \varphi}{2(1 + h r_0)} - 2 h r_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2n} \cos 2n\varphi}{(4n^2 - 1)(2n + h r_0)} \right).$$

$$2.247. \mathbf{E} = \frac{2\mathbf{E}_0}{\varepsilon + 1}, \quad \mathbf{P} = \frac{(\varepsilon - 1)r_0^2 \mathbf{E}}{2(\varepsilon + 1)}.$$

$$2.248. \mathbf{H} = \frac{4\mu \mathbf{H}_0}{(\mu + 1)^2 - (\mu - 1)^2 \frac{r_1^2}{r_2^2}}, \quad \mathbf{M} = \frac{\mathbf{H}_0}{2} \frac{(\mu^2 - 1)(r_2^2 - r_1^2)}{(\mu + 1)^2 - (\mu - 1)^2 \frac{r_1^2}{r_2^2}}.$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.249.} \quad & 1) \mathbf{A}(r) = A(r) \mathbf{e}_z, \quad A(r) = \frac{4\pi r_0 i_0}{c} \cdot \begin{cases} \ln \frac{1}{r_0} + C, & r < r_0, \\ \ln \frac{1}{r} + C, & r_0 < r; \end{cases} \\
 & 2) \mathbf{A}(r, \varphi) = A(r, \varphi) \mathbf{e}_z, \quad A(r, \varphi) = \frac{4\pi i_0}{c} \cdot \begin{cases} r \sin \varphi + C, & r < r_0, \\ \frac{r_0^2}{r} \sin \varphi + C, & r_0 < r. \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.250.} \quad & 1) \mathbf{A} = A(r) \mathbf{e}_z, \quad A(r) = \frac{4\pi r_0 i_0}{c} \cdot \begin{cases} \ln \frac{1}{r_0} + C, & r < r_0, \\ \ln \frac{1}{r} + C, & r_0 < r; \end{cases} \\
 & 2) \mathbf{A} = A(r, \varphi) \mathbf{e}_z, \quad A(r, \varphi) = \frac{2\pi i_0}{c} \cdot \begin{cases} r \sin \varphi + C, & r < r_0, \\ \frac{r_0^2}{r} \sin \varphi + C, & r_0 < r. \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{2.251.} \quad u(r, \varphi) = u_0 + \frac{q_0 r_2}{2k} \frac{r_1^2 r_2^2}{r_1^4 + r_2^4} \left(\frac{r^2}{r_1^2} - \frac{r_1^2}{r^2} \right) \cos 2\varphi.$$

$$\mathbf{2.252.} \quad u(r, \varphi) = \frac{u_0 r_1 r_2}{r_1^2 + r_2^2 + p(r_2^2 - r_1^2)} \left[(1-p) \frac{r}{r_2} + (1+p) \frac{r_2}{r} \right] \sin \varphi, \quad p = hr_2.$$

$$\mathbf{2.253.} \quad u(r, \varphi) = u_1 \frac{1 + hr_2 \ln \frac{r_2}{r}}{1 + hr_2 \ln \frac{r_2}{r_1}} + u_2 \frac{hr_2^2}{r} \frac{r^2 - r_1^2}{r_2^2 + r_1^2 + hr_2(r_2^2 - r_1^2)} \sin \varphi.$$

$$\mathbf{2.254.} \quad u(r, \varphi) = \frac{u_0}{2} \left[1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{2\pi}{\alpha}} \cos \frac{2\pi\varphi}{\alpha} \right].$$

$$\mathbf{2.255.} \quad u(r, \varphi) = \frac{u_0 r_1^{\frac{2\pi}{\alpha}} r_2^{\frac{2\pi}{\alpha}}}{r_2^{\frac{4\pi}{\alpha}} - r_1^{\frac{4\pi}{\alpha}}} \left[\left(\frac{r}{r_1} \right)^{\frac{2\pi}{\alpha}} - \left(\frac{r_1}{r} \right)^{\frac{2\pi}{\alpha}} \right] \cos \frac{2\pi\varphi}{\alpha}.$$

$$\mathbf{2.256.} \quad u(\varphi, z) = \frac{I}{\pi\sigma h} \left(\frac{z}{2r_0} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sh} \frac{nz}{r_0} \cos n\varphi}{n \operatorname{ch} \frac{nl}{r_0}} \right), \quad \mathbf{i}(\varphi, z) \text{ имеет вид (1.168)}.$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.257.} \quad & u(r, \varphi) = C - \frac{I}{2\pi\sigma h} \left(\frac{z}{r_0} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\operatorname{ch} \frac{(2n+1)z}{r_0} \cos(2n+1)\varphi}{(2n+1) \operatorname{sh} \frac{(2n+1)l}{r_0}} \right) - \frac{I}{2\pi\sigma h} \times \\
 & \times \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sh} \frac{2nz}{r_0} \cos 2n\varphi}{n \operatorname{ch} \frac{2nl}{r_0}}, \text{ плотность тока имеет вид (1.168)}.
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{2.258.} \quad i(z, \varphi) = \frac{J}{2\pi r_0} \frac{\operatorname{sh} \frac{z}{r_0} \mathbf{e}_z + \sin \varphi \mathbf{e}_\varphi}{\operatorname{ch} \frac{z}{r_0} - \cos \varphi}.$$

$$\mathbf{2.259.} \quad \mathbf{i}(\varphi, z) = \frac{J}{\pi r_0} \frac{\operatorname{sh} \frac{2z}{r_0} \cdot \mathbf{e}_z - \sin 2\varphi \cdot \mathbf{e}_\varphi}{\operatorname{ch} \frac{2z}{r_0} + \cos 2\varphi}.$$

2.260. $u(\theta, \varphi) = C + \frac{I}{4\pi\sigma} \ln \left(\sec^2 \frac{\theta}{2} - 2 \operatorname{ctg} \frac{\theta}{2} \cos \varphi \right)$, плотность тока определяется формулой (1.169). У к а з а н и е. Задачу для потенциала

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = -\frac{J}{\sigma} \left[\frac{\delta(\theta)}{2\pi \sin \theta} - \frac{\delta(\theta - \frac{\pi}{2})}{\sin \theta} \cdot \delta(\varphi) \right],$$

$$0 < \theta < \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$|u(\pi, \varphi)| < \infty$$

свести с помощью замены $r = \operatorname{tg} \frac{\theta}{2}$ и формулы (10.12) к следующей задаче:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = -\frac{J}{\sigma} [\delta(\mathbf{r}) - \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_1)], \quad 0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$|u(\infty, \varphi)| < \infty,$$

где $\mathbf{r}_1$ — точка с координатами $r_1 = 1$, $\varphi_1 = 0$, и воспользоваться соотношением (10.16).

2.261. $\psi_n(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\varphi}$, $E_n = \frac{\hbar^2}{2I} n^2$, $n \in \mathbb{Z}$; при $n \neq 0$ собственные значения оператора энергии имеют кратность 2.

2.262. $\psi_n(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\varphi}$, $E_n = \frac{\hbar^2 n^2}{2I} - \frac{e\hbar H_0}{2mc} n$, $n \in \mathbb{Z}$.

У к а з а н и е. Магнитный момент μ и момент количества движения $\mathcal{L} = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \varphi}$ ротатора связаны соотношением $\mu = \frac{e}{2mc} \mathcal{L}$, потенциальная энергия ротатора равна $-(\mu H_0)$.

2.263. 1) $\Psi(\varphi, t) = \sqrt{\frac{2}{3}} \psi_0(\varphi) + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2}{3}} (\psi_2(\varphi) + \psi_{-2}(\varphi)) e^{-\frac{iE_2 t}{\hbar}}$,
 $P(E=0) = \frac{2}{3}$, $P(E=E_2) = \frac{1}{3}$, $P(E=E_n) = 0$, если $n \neq 0$, $n \neq 2$;
 2) $\Psi(\varphi, t) = \sqrt{\frac{2}{7}} \psi_0(\varphi) - \left(\frac{1-2i}{\sqrt{14}} \psi_2(\varphi) + \frac{1+2i}{\sqrt{14}} \psi_{-2}(\varphi) \right) e^{-\frac{iE_2 t}{\hbar}}$,
 $P(E=0) = \frac{2}{7}$, $P(E=E_2) = \frac{5}{7}$, $P(E=E_n) = 0$, если $n \neq 0$, $n \neq 2$.
 $\psi_n(\varphi)$ и E_n даны в ответе к задаче (2.261).

2.264. 1) $P(M_z = m\hbar) = P(M_z = -m\hbar) = \frac{1}{2} \delta_{mn}$;

$$2) P(M_z = (n-2k)\hbar) = \frac{(n! C_n^k)^2}{(2n)!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n,$$

в остальных случаях вероятность равна нулю.

У к а з а н и е. Оператор энергии и оператор M_z коммутируют, поэтому проекция на ось Oz момента количества движения ротатора не зависит от времени и равна

$$P(M_z = m\hbar) = |a_m|^2, \quad a_m = (\Psi(\varphi, 0), \quad \psi(\varphi)) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} \Psi(\varphi, 0) e^{-im\varphi} d\varphi.$$

$$2.265. \Psi(\varphi, t) = \frac{-3i}{2\sqrt{5}}\psi_1(\varphi)e^{-\frac{iE_1t}{\hbar}} + \frac{3i}{2\sqrt{5}}\psi_{-1}(\varphi)e^{-\frac{iE_{-1}t}{\hbar}} + \\ + \frac{i}{2\sqrt{5}}\psi_3(\varphi)e^{-\frac{iE_3t}{\hbar}} - \frac{i}{2\sqrt{5}}\psi_{-3}(\varphi)e^{-\frac{iE_{-3}t}{\hbar}},$$

$P(E = E_{\pm 1}) = \frac{9}{20}$, $P(E = E_{\pm 3}) = \frac{1}{20}$, $P(M_z = \pm \hbar) = \frac{9}{20}$, $P(M_z = \pm 3\hbar) = \frac{1}{20}$, в остальных случаях $P = 0$; собственные функции $\psi_n(\varphi)$ и собственные значения E_n оператора Гамильтона определены в ответе к задаче 2.261.

$$2.266. \quad 1) u(r, \varphi) = \frac{u_0}{8} \left[3 + 4 \left(\frac{r}{r_0} \right)^4 \cos 4\varphi + \left(\frac{r}{r_0} \right)^8 \cos 8\varphi \right]; \\ 2) u(r, \varphi) = \frac{u_0}{2^{2n}} \left[C_{2n}^n + 2 \sum_{k=1}^n C_{2n}^{n-k} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2k} \cos 2k\varphi \right]; \\ 3) u(r, \varphi) = \frac{Ar^2(r^2 - r_0^2)}{24} \sin 2\varphi; \\ 4) u(r, \varphi) = \frac{A}{4} r^2 \ln \frac{r}{r_0} \sin 2\varphi; \\ 5) u(r, \varphi) = \frac{Ar^k(r^2 - r_0^2)}{4(k+1)} \sin k\varphi; \\ 6) u(r, \varphi) = \frac{A}{8} r^3 \sin 2\varphi (\cos \varphi + \sin \varphi) - \\ - \frac{Ar_0^3}{16} \left[\frac{r}{r_0} (\cos \varphi + \sin \varphi) - \frac{r^3}{r_0^3} (\cos 3\varphi - \sin 3\varphi) \right]; \\ 7) u(r, \varphi) = AI_0(\sigma r_0) + 2A \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0} \right)^k I_k(\sigma r_0) \cos k\varphi.$$

$$2.267. \quad 1) u(r, \varphi) = \frac{u_0}{8} \left[1 - 4 \left(\frac{r_0}{r} \right)^6 \cos 6\varphi + \left(\frac{r_0}{r} \right)^{12} \cos 12\varphi \right]; \\ 2) u(r, \varphi) = \frac{u_0}{2^{2n}} \left[C_{2n}^n + 2 \sum_{k=1}^n (-1)^k C_{2n}^{n-k} \left(\frac{r_0}{r} \right)^{2k} \cos 2k\varphi \right]; \\ 3) u(r, \varphi) = \frac{u_0}{4} \left[3 + \left(\frac{r_0}{r} \right)^4 \cos 4\varphi \right]; \\ 4) u(r, \varphi) = \frac{A}{4} \left(\frac{1}{r^2} - \frac{1}{r_0^2} \right) + \frac{A}{4r^2} \ln \frac{r_0}{r} \cos 2\varphi; \\ 5) u(r, \varphi) = \frac{A}{8r^2} \ln \frac{r_0}{r} \sin 2\varphi; \\ 6) u(r, \varphi) = \frac{A}{2r} \ln \frac{r_0}{r} (\sin \varphi - \cos \varphi) + \frac{A}{8r^3} (r_0^2 - r^2) (\sin 3\varphi - \cos 3\varphi); \\ 7) u(r, \varphi) = \frac{A \sin k\varphi}{(2k-1)} r^{k-1} \left(1 - \frac{r_0}{r} \right); \\ 8) u(r, \varphi) = AI_0(\sigma) + 2A \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{r_0}{r} \right)^{2n} I_{2n}(\sigma).$$

$$2.268. \quad 1) u(r, \varphi) = \frac{u_0}{4} \left(r \sin \varphi + \frac{1}{3} \frac{r^3}{r_0^2} \sin 3\varphi \right) + C; \\ 2) u(r, \varphi) = \frac{Ar^3}{21} (3r - 4r_0) \sin 3\varphi + C; \\ 3) u(r, \varphi) = \frac{Ar^5}{10} \left(\ln \frac{r}{r_0} - \frac{1}{5} \right) \sin 5\varphi + C;$$

- 4) $u(r, \varphi) = \frac{Ar^2}{4} \left(\ln \frac{r}{r_0} - \frac{1}{2} \right) \cos 2\varphi + C;$
 5) $u(r, \varphi) = \frac{Ar}{32} (4r^2 \ln r - 3r^2 - 12r_0^2 \ln r_0 + 5r_0^2) \cos \varphi + C;$
 6) $u(r, \varphi) = \frac{Ar^3}{12} \left(\ln r^2 - \ln r_0^2 - \frac{1}{3} \ln rr_0 + \frac{1}{9} \right) \cos 3\varphi + C;$
 7) если $Ar_0 \neq K$, то задача не имеет решения; если $Ar_0 = K$,
 то $u(r, \varphi) = \frac{Kr^2}{2r_0} \cos^2 \varphi + \frac{Br^5}{11} \left(\frac{5r}{6r_0} - 1 \right) \sin 6\varphi + C;$
 8) $u(r, \varphi) = \frac{2Ar_0}{\pi} \left[\frac{1}{2} \sin \frac{\varphi}{2} \left(\sqrt{\frac{r}{r_0}} + \sqrt{\frac{r_0}{r}} \right) \ln \frac{r+r_0+2\sqrt{rr_0} \cos \frac{\varphi}{2}}{r+r_0-2\sqrt{rr_0} \cos \frac{\varphi}{2}} + \right.$
 $\left. + \cos \frac{\varphi}{2} \left(\sqrt{\frac{r}{r_0}} - \sqrt{\frac{r_0}{r}} \right) \operatorname{arctg} \frac{2\sqrt{rr_0} \sin \frac{\varphi}{2}}{r-r_0} \right] + C.$

- 2.269.** 1) $u(r, \varphi) = C - \frac{Ar_0}{4} \left(\frac{r_0}{r} \cos \varphi - \frac{1}{3} \frac{r_0^3}{r^3} \cos 3\varphi \right);$
 2) $u(r, \varphi) = \frac{A}{4r^2} \left(\ln \frac{r_0}{r} - \frac{1}{2} \right) \cos 2\varphi + C;$
 3) $u(r, \varphi) = \frac{A}{3r} \left(\frac{r_0 \ln r_0}{2r} - \frac{5r_0}{6r} - \ln r + \frac{2}{3} \right) \cos 2\varphi + C;$
 4) $u(r, \varphi) = \frac{A}{4r} \left[\left(1 + \ln \frac{r}{r_0} \right) \ln rr_0 + 1 \right] \sin \varphi + C;$
 5) $u(r, \varphi) = \frac{A}{8r} \left(\frac{1}{4} - \ln r + \frac{r_0^2}{3r^2} \ln r_0 - \frac{5r_0^2}{12r^2} \right) \cos 3\varphi + C;$
 6) $u(r, \varphi) = \frac{A}{3r} \left(\frac{1}{r} - \frac{2}{r_0} \right) \cos \varphi;$
 7) если $2A \neq Br_0^2$, то задача не имеет решения; если $2A = br_0^2$,
 то $u(r, \varphi) = -\frac{Br_0^2}{2r} \left(1 - \frac{r_0}{2r} \cos 2\varphi \right) + C;$
 8) если $2B + \pi A \neq 0$, то задача не имеет решения; если $2B + \pi A = 0$,
 то $u(r, \varphi) = \frac{2Br_0}{\pi} \left[\ln \left(1 + \frac{r_0^2}{r^2} - 2\frac{r_0}{r} \cos \varphi \right) + \right.$
 $\left. + \frac{1}{2} \cos \frac{\varphi}{2} \left(\sqrt{\frac{r}{r_0}} + \sqrt{\frac{r_0}{r}} \right) \ln \frac{r+r_0+2\sqrt{rr_0} \cos \frac{\varphi}{2}}{r+r_0-2\sqrt{rr_0} \cos \frac{\varphi}{2}} + \right.$
 $\left. + \sin \frac{\varphi}{2} \left(\sqrt{\frac{r}{r_0}} - \sqrt{\frac{r_0}{r}} \right) \operatorname{arctg} \frac{r-r_0}{2\sqrt{rr_0} \sin \frac{\varphi}{2}} \right] + C.$

- 2.270.** 1) $u(r, \varphi) = \frac{Ar_0^3}{2p} \left(1 - \frac{pr^2 \cos 2\varphi}{r_0^2(2+p)} \right);$
 2) $u(r, \varphi) = \frac{Ar}{8} \left(r^2 - r_0^2 \frac{p+3}{p+1} \right);$
 3) $u(r, \varphi) = \frac{Ar^3}{7(p+3)} [(p+3)r - (p+4)r_0] \cos 3\varphi;$
 4) $u(r, \varphi) = \frac{Ar^2}{4} \left(\ln \frac{r}{r_0} - \frac{1}{p+2} \right) \cos \varphi.$

$$2.271. \quad 1) \quad u(r, \varphi) = \frac{Ap}{p+4} \left(\frac{r_0}{r}\right)^4 \cos 4\varphi;$$

$$2) \quad u(r, \varphi) = \frac{A}{4} \left(\frac{pr_0^2}{(p+2)r^2} - 1 \right) \sin 2\varphi;$$

$$3) \quad u(r, \varphi) = \frac{A}{2r} \left(\ln \frac{r_0}{r} - \frac{1}{p+1} \right) \sin \varphi;$$

$$4) \quad u(r, \varphi) = \frac{A}{4r} \left(\ln^2 r_0 - \ln^2 r - \ln r - \frac{1}{2} \right) \cos \varphi.$$

$$2.272. \quad 1) \quad u(r, \varphi) = \frac{u_1 r_1 (r_2^2 - r^2)}{(r_2^2 - r_1^2)r} \cos \varphi + \frac{u_2 r_2^3 (r^6 - r_1^6)}{(r_2^6 - r_1^6)r^3} \sin 3\varphi;$$

$$2) \quad u(r, \varphi) = Ar_1 \ln \frac{r}{r_2} + \frac{u_0 r_2^2 (r^4 + r_1^4)}{(r_2^4 + r_1^4)r^2} \cos 2\varphi;$$

$$3) \quad u_0 + \frac{Ar_2}{2} \ln \frac{r}{r_1} + \frac{Ar_2^3 (r_1^4 - r^4) \cos 2\varphi}{4(r_1^4 + r_2^4)r^2};$$

$$4) \quad \text{если } A_1 r_1 \neq 2A_2 r_2, \text{ то задача не имеет решения; если } A_1 r_1 = 2A_2 r_2,$$

$$\text{то } u(r, \varphi) = C_0 + \frac{A_1 r_1}{2} \ln r - \frac{A_1 r_1^3 (r^4 + r_2^4) \cos 2\varphi}{4(r_2^4 - r_1^4)r^2};$$

$$5) \quad u(r, \varphi) = \frac{Ar_2^2 (r_1^2 - r^2) \sin \varphi}{[(1-p)r_1^2 + (1+p)r_2^2]r};$$

$$6) \quad u(r, \varphi) = \frac{Ar_1^2 (r^2 + r_2^2) \cos \varphi}{[(1+p)r_1^2 - (1-p)r_2^2]r}.$$

$$2.273. \quad u(x, y, t) = \frac{2I}{a\rho_0 l_1 l_2} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} (2 - \delta_{n0}) \frac{v_{mn}(x_0 y_0) v_{nm}(x, y)}{\sqrt{\lambda_{mn}}} \sin \omega_{mn} t,$$

$$\omega_{mn} = a\sqrt{\lambda_{mn}}, \quad \lambda_{mn} = \left(\frac{\pi m}{l_1}\right)^2 + \left(\frac{\pi n}{l_2}\right)^2, \quad v_{mn}(x, y) = \sin \frac{\pi m x}{l_1} \cos \frac{\pi n y}{l_2}.$$

$$2.274. \quad u(x, y, t) = \frac{8I}{a\rho_0 \pi^3} \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\alpha_m + \alpha_n} \cos \frac{(2m+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi y}{2l} \sin \omega_{mn} t}{(2m+1)(2n+1)\sqrt{(2m+1)^2 + (2n+1)^2}},$$

$$\omega_{mn} = \frac{\pi a}{l} \sqrt{(2m+1)^2 + (2n+1)^2}, \quad \alpha_k = \left[\frac{k}{2}\right].$$

$$2.275. \quad u(x, y, t) = \frac{8F_0}{\pi^3 l_1 l_2 T_0} \sum_{m,n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+n} \cos \frac{(2m+1)\pi x}{2l_1} \cos \frac{(2n+1)\pi y}{2l_2} \cos \omega_{mn} t}{(2m+1)(2n+1)\sqrt{\left(\frac{2n+1}{l_1}\right)^2 + \left(\frac{2m+1}{l_2}\right)^2}},$$

$$\frac{\omega_{mn}}{\pi a} = \sqrt{\left(\frac{2m+1}{2l_1}\right)^2 + \left(\frac{2n+1}{2l_2}\right)^2}.$$

$$2.276. \quad u(x, y, t) = \frac{64u_0}{\pi^6} \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2m+1)\pi x}{l_1} \sin \frac{(2n+1)\pi y}{l_2}}{(2m+1)^3 (2n+1)^3} e^{-a^2 \lambda_{mn} t},$$

$$\lambda_{mn} = \pi^2 \left[\left(\frac{2m+1}{l_1}\right)^2 + \left(\frac{2n+1}{l_2}\right)^2 \right].$$

$$2.277. \quad u(x, y, t) = \frac{64u_0}{\pi^4} \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2m+1)\pi x}{2l_1} \cos \frac{(2n+1)\pi y}{2l_2}}{(2m+1)^2(2n+1)^2} \times \\ \times e^{-\frac{\pi^2 a^2}{4} \left(\frac{(2m+1)^2}{l_1^2} + \frac{(2n+1)^2}{l_2^2} \right) t}.$$

$$2.278. \quad u(x, y, t) = \frac{8q_0}{\pi k l_2} \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{(2m+1)\pi x}{l_1} \sin \frac{(2n+1)\pi y}{2l_2}}{(2m+1)\alpha_{mn}} e^{-a^2 \alpha_{mn} t}, \\ \alpha_{mn} = \pi^2 \left[\left(\frac{(2m+1)}{l_1} \right)^2 + \left(\frac{(2n+1)}{2l_2} \right)^2 \right].$$

$$2.279. \quad u(x, y, z, t) = \frac{32u_0}{\pi^3} \sum_{m,n=0}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k \sin \frac{(2m+1)\pi x}{l} \sin \frac{(2n+1)\pi y}{l} \sin \frac{\pi k z}{l}}{(2m+1)(2n+1)[(2m+1)^2 + (2n+1)^2 + k^2]} \times \\ \times e^{-a^2 \alpha_{mnk} t}, \quad \alpha_{mnk} = \frac{\pi^2}{l^2} [(2m+1)^2 + (2n+1)^2 + k^2].$$

$$2.280. \quad u(l, t) = \frac{4l^3 F_0}{EJ} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\mu_n^4} \cos \frac{a\mu_n^2 t}{l^2}, \quad \mu_n - \text{положительный корень уравнения} \\ \cos \mu \operatorname{ch} \mu = -1. \quad \text{Решение. Функция } u(x, t) - \text{решение задачи}$$

$$u_{tt} + a^2 u_{xxxx} = 0, \quad x \in \Delta = (0; l), \quad 0 < t, \\ u(0, t) = u_x(0, t) = u_{xx}(l, t) = u_{xxx}(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = 0,$$

где $u_0(x)$ — решение стационарной задачи

$$JE \frac{d^4 u_0(x)}{dx^4} = F_0 \delta(x - l), \quad 0 < x < l, \\ u_0(0) = u'_0(0) = u''_0(l) = u'''_0(l) = 0.$$

Пусть $u(x, t) = X(x)T(t)$; из тождества

$$\frac{T''}{a^2 T} + \frac{X''''}{X} = 0$$

следует, что $T(t)$ удовлетворяет уравнению $T'' + a^2 \lambda T = 0$, а $X(x)$ — решение задачи на собственные значения

$$X'''' - \lambda X = 0, \quad x \in \Delta = (0; l), \\ X(0) = X'(0) = X''(l) = X'''(l) = 0,$$

которую можно записать в виде $\mathcal{L}X = \lambda X$, $X \in \mathcal{M}_{\mathcal{L}}$, где $\mathcal{L} = \frac{d^4}{dx^4}$, а $\mathcal{M}_{\mathcal{L}}$ есть множество функций класса $C^4(\Delta) \cap C^2(0 \leq x < l) \cap C^3(0 < x \leq l)$, удовлетворяющих граничным условиям. Общее решение уравнения

$$X(x) = \operatorname{sh} \sqrt[4]{\lambda} x + B \operatorname{ch} \sqrt[4]{\lambda} x + C \sin \sqrt[4]{\lambda} x + D \cos \sqrt[4]{\lambda} x$$

является собственной функцией, если $X(x) \not\equiv 0$ и выполняются граничные условия, т. е.

$$B + D = 0, \\ A + C = 0, \\ A \operatorname{sh} \mu + B \operatorname{ch} \mu - C \sin \mu - D \cos \mu = 0, \\ A \operatorname{ch} \mu + B \operatorname{sh} \mu - C \cos \mu + D \sin \mu = 0,$$

где $\mu = \sqrt[4]{\lambda}l$. Если определитель системы $-2(\operatorname{ch} \mu \cos \mu + 1)$ равен нулю, то система имеет нетривиальное решение

$$A = -C = c(\operatorname{ch} \mu + \cos \mu), \quad B = -D = -c(\operatorname{sh} \mu + \sin \mu).$$

Таким образом, собственному значению $\lambda_n = \mu_n^2/l^2$, где $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\operatorname{ch} \mu \cos \mu = -1$, соответствует собственная функция

$$X_n = (\operatorname{ch} \mu_n + \cos \mu_n) \left(\operatorname{sh} \frac{\mu_n x}{l} - \sin \frac{\mu_n x}{l} \right) - (\operatorname{sh} \mu_n + \sin \mu_n) \left(\operatorname{ch} \frac{\mu_n x}{l} - \cos \frac{\mu_n x}{l} \right),$$

где $n \in \mathbb{N}$. Поскольку для любой функции $X \in \mathcal{M}_{\mathcal{L}}$

$$(\mathcal{L}X, X) = \int_0^l X'''' X dx (X''' X - X'' X')|_0^l + \int_0^l (X'')^2 dx = \int_0^l (X'')^2 dx \geq 0,$$

то оператор $\mathcal{L}$ положителен, следовательно, эрмитов. Поэтому собственные значения λ_n неотрицательны, а соответствующие собственные функции X_n ортогональны на промежутке Δ . Для вычисления нормы можно применить способ, изложенный в указании к задаче 1.74. Из уравнений

$$\begin{aligned} X'''' - \lambda X &= 0, \\ X_1'''' - \lambda_1 X_1 &= 0 \end{aligned}$$

вытекает тождество

$$\frac{d}{dx} (X_1''' X - X_1 X''' - X_1'' X' + X_1' X'') = (\lambda_1 - \lambda) X X_1,$$

интегрирование которого приводит к формуле

$$\|X\|^2 = \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_1} \frac{(X_1''' X - X_1 X''' - X_1'' X' + X_1' X'')|_0^l}{\lambda_1 - \lambda}.$$

Так как $X = X(\sqrt[4]{\lambda} x)$, то

$$\|X_n\|^2 = \frac{1}{4\lambda} [x(\lambda X^2 - 2X' X''' + (X'')^2) + 3X X''' - X' X'']|_0^l.$$

В данном случае $\|X_n\|^2 = \frac{l}{4} X_n^2(l)$. Решение задачи представляет собой ряд по собственным функциям

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{a\mu_n^2 t}{l^2} + B_n \sin \frac{a\mu_n^2 t}{l^2} \right) X_n(x).$$

При $t = 0$

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n X_n(x) = u_0(x), \quad \sum_{n=1}^{\infty} B_n \frac{\mu_n^2 a}{l^2} X_n(x) = 0.$$

Отсюда

$$B_n = 0, \quad A_n = \frac{(u_0, X_n)}{\|X_n\|^2} = \frac{1}{\lambda_n} \frac{(u_0, \mathcal{L}X_n)}{\|X_n\|^2} = \frac{1}{\lambda_n} \frac{(\mathcal{L}u_0, X_n)}{\|X_n\|^2} = \frac{4l^3 F_0}{EJ\mu_n^4 X_n(l)}.$$

Окончательный вид решения

$$u(x, t) = \frac{4l^3 F_0}{EJ} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n(x)}{\mu_n^4 X_n(l)} \cos \frac{a\mu_n^2 t}{l^2}.$$

$$2.281. u(x, t) = \frac{2M_0 l^2}{\pi^4 J E} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} \cos \frac{(2n+1)^2 \pi^2 a t}{l^2}}{(2n+1)^4}.$$

$$2.282. u(x, t) = \frac{16Fl^3}{\pi^4 J E} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)^2 \pi^2 a t}{4l^2}}{(2n+1)^4}.$$

$$2.283. u(x, t) = \frac{Il^2}{m_0 a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{ch} 2\mu_n}{\mu_n^4 \operatorname{sh}^4 \mu_n}, \quad \mu_n > 0 - \text{корень уравнения } \operatorname{tg} \mu = \operatorname{th} \mu,$$

$$X_n(x) = \operatorname{sh} \mu_n \sin \mu_n \left(1 - \frac{x}{l}\right) - \sin \mu_n \operatorname{sh} \mu_n \left(1 - \frac{x}{l}\right), \quad m_0 = \rho_0 S_0 l.$$

$$2.284. u(x, t) = \frac{M_0 l^3}{EJ} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X'_n(x_0) X_n(x) \cos \frac{\mu_n^2 a t}{l^2}}{\mu_n^4 \operatorname{sh}^2 \mu_n \sin^2 \mu_n}, \quad \mu_n > 0 - \text{корень уравнения}$$

$$\operatorname{tg} \mu = \operatorname{th} \mu, \quad X_n(x) = \operatorname{sh} \mu_n \sin \frac{\mu_n x}{l} - \sin \mu_n \operatorname{sh} \frac{\mu_n x}{l}.$$

$$2.285. u(x, t) = -\frac{8M_0 l^2}{EJ} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sh} \mu_n \sin \mu_n X_n(x) \cos \frac{\mu_n^2 a t}{l^2}}{\mu_n^3 (\operatorname{sh} \mu_n + \sin \mu_n)^2}, \quad \mu_n \text{ и } X_n(x) \text{ даны}$$

в ответе к задаче 2.280.

$$2.286. u(x, t) = \frac{4f_0 l^2}{\pi^2 T} \left(1 - \cos \frac{\pi a t}{2l}\right) \cos \frac{\pi x}{2l}.$$

$$2.287. u(x, t) = \frac{g(l^2 - x^2)}{2a^2} + \frac{16gl^2}{\pi^3 a^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi a t}{2l}}{(2n+1)^3}.$$

$$2.288. u(x, t) = \frac{m_0 g l}{4T} \left(1 - \frac{x^2}{l^2} + \frac{2}{p} \left(1 - \frac{|x|}{l}\right) - 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \sin \mu_n \left(1 - \frac{|x|}{l}\right) \cos \omega_n t}{\mu_n^3 (\mu_n^2 + p^2 + p)}\right),$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$, $p = m_0/m$, $m_0 = 2\rho_0 l$.

$$2.289. u(x, t) = \frac{F_0}{T} \left[\frac{x}{12} \left(1 - 2\frac{x^2}{l^2} + \frac{x^3}{l^3}\right) + \frac{8l}{\pi^5} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi a t}{2l}}{(2n+1)^5} \right].$$

$$2.290. u(x, t) = \frac{F_0 l}{2T} \left(1 - \frac{|x|}{l} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi a t}{2l}}{(2n+1)^2}\right).$$

$$2.291. u(x, t) = \frac{F_0 l}{2T} \left(1 - \frac{|x|}{l} + 2p \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\mu_n^2 + p^2}}{\mu_n^2 (\mu_n^2 + p^2 + p)} \sin \mu_n \left(1 - \frac{|x|}{l}\right) \cos \frac{\mu_n a t}{l}\right),$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$, $p = m_0/m$, m_0 — масса струны.

$$2.292. 1) u(x, t) = v_0 t - \frac{8v_0 l}{\pi^2 a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi a t}{2l}}{(2n+1)^2};$$

$$2) u(x, t) = \frac{w_0}{2a^2} (x^2 + a^2 t^2 - 2xl) + \frac{16w_0 l^2}{a^2 \pi^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi a t}{2l}}{(2n+1)^3}.$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.293.} \quad 1) u(x, t) &= \frac{v_0}{2l} \left(x^2 + a^2 t^2 - \frac{l^2}{3} \right) + \frac{v_0 l}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cos \frac{\pi n x}{l} \cos \frac{\pi n a t}{l}}{n^2}; \\
 2) u(x, t) &= \frac{w_0 t}{2l} \left(x^2 + \frac{a^2 t^2}{3} - \frac{l^2}{3} \right) + \frac{2w_0 l^2}{a\pi^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cos \frac{\pi n x}{l} \sin \frac{\pi n a t}{l}}{n^3}.
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{2.294.} \quad u(x, t) = \frac{g(m+m_0)x}{T_0} - \frac{gx^2}{2a^2} - \frac{2gl^2}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \sin \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{\mu_n a t}{l}}{\mu_n^3 (\mu_n^2 + p^2 + p)},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$, $p = \frac{m_0}{m}$, $m_0 = \rho_0 l$ — масса струны.

У к а з а н и е. 2) Решение $u(x, t)$ представляет собой сумму ряда по собственным функциям оператора $\mathcal{L}$ и частного решения $w(x)$,

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n X_n(x) \cos \omega_n t + w(x), \quad \text{где } A_n = -\frac{(w, \rho X_n)}{\|X_n\|^2},$$

$\mathcal{L}$ определен соотношением $\rho \mathcal{L} f = -f''$, а собственные функции $X_n(x)$ и функция $w(x)$ удовлетворяют условиям

$$\begin{aligned}
 X_n'' + \lambda \rho X_n &= 0, \quad 0 < x < l, & w'' &= -\frac{g}{a^2}, \quad 0 < x < l, \\
 X_n(0) &= X_n(l) = 0, & w(0) &= 0, \quad w'(l) = \frac{mg}{T_0}.
 \end{aligned}$$

Для вычисления коэффициентов применим способ, изложенный в ответе к задаче 2.201. Пусть

$$\tilde{w}(x) = w(x), \quad x \in [0; l], \quad \tilde{w}'(x) = \begin{cases} w'(x), & 0 \leq x < l, \\ 0, & x = l. \end{cases}$$

Тогда $[\tilde{w}']_{x=l} = -\frac{mg}{T_0}$ и $\tilde{w}'' = -\frac{g}{a^2} - \frac{mg}{T_0} \delta(x-l)$. Так как $(w, \rho X_n) = (\tilde{w}, \rho X_n)$, $\tilde{w} \in \mathcal{M}_{\mathcal{L}}$, а оператор $\mathcal{L}$ эрмитов, то

$$\begin{aligned}
 (\tilde{w}, \rho X_n) &= \frac{1}{\lambda_n} (\tilde{w}, \rho \mathcal{L} X_n) = \frac{1}{\lambda_n} (\rho \mathcal{L} \tilde{w}, X_n) = -\frac{1}{\lambda_n} (\tilde{w}'', X_n) = \\
 &= \frac{1}{\lambda_n} \left(\frac{g}{a^2}, X_n \right) + \frac{mg}{\lambda_n T_0} (\delta(x-l), X_n) = \frac{g}{a^2 \lambda_n} (1, X_n) + \frac{mg X_n(l)}{T_0} = \frac{gl}{\mu_n a^2};
 \end{aligned}$$

на последнем этапе преобразований использовано уравнение для величин μ_n .

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.295.} \quad u(x, t) &= \frac{gx^2}{2a^2} - \frac{(mg+m_0)gx}{T_0} + \\
 &+ \frac{2}{T_0} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{m_0 g}{\mu_n} - F_0 \frac{(-1)^{n-1} \mu_n}{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}} \right] \frac{(\mu_n^2 + p^2) \sin \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{\mu_n a t}{l}}{\mu_n^3 (\mu_n^2 + p^2 + p)},
 \end{aligned}$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$, $p = \frac{m_0}{m}$, $m_0 = \rho_0 l$ — масса струны.

См. указание в ответе к задаче 2.294.

$$\mathbf{2.296.} \quad u(x, t) = \frac{gx^2}{2a^2} - \frac{(mg+m_0g)x}{T_0} + \frac{2F_0}{T_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \sin \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{\mu_n a t}{l}}{\mu_n^2 (\mu_n^2 + p^2 + p)},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$, $p = \frac{m_0}{m}$, $m_0 = \rho_0 l$ — масса струны.

См. указание в ответе к задаче 2.294.

$$2.297. u(x, t) = \frac{F_2 - F_1}{2(m + m_0)} t^2 + \frac{F_2 - F_1}{2a^2(m + m_0)} x^2 - \frac{F_1}{ES} x - \frac{(p^2 + 3p + 3)F_1 + p(p + 1)F_2}{6ES(p + 1)^2} - \\ - \frac{2l}{ES} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2)(F_2 \cos \mu_n - F_1) \cos \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{\mu_n a}{l} t}{\mu_n^2(\mu_n^2 + p^2 + p)},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = -p$, $p = \frac{m_0}{m}$, $m_0 = \rho_0 l$ — масса струны, $\cos \mu_n = \frac{(-1)^{n-1} p}{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}}$. См. указание в ответе к задаче 2.294.

$$2.298. u(x, t) = 2u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2}}{\mu_n^2 + p^2 + p} \cos \frac{\mu_n x}{l} e^{-\frac{\mu_n^2 a^2}{l^2} t}, \mu_n > 0 \text{ — корень}$$

уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$, $p = \frac{C_0}{C}$, C_0 — теплоемкость всего стержня, $\cos \mu_n = \frac{(-1)^{n-1} p}{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}}$. См. указание в ответе к задаче 2.200.

$$2.299. u(x, t) = \frac{qpa^2}{kl(p + 1)} t + \frac{qp}{kl(p + 1)} x^2 - \frac{q}{k} x - \frac{ql(p^2 + 3p + 3)}{3(p + 1)^2} - \\ - \frac{2ql}{k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \cos \frac{\mu_n x}{l} e^{-\frac{\mu_n^2 a^2}{l^2} t}}{\mu_n^2(\mu_n^2 + p^2 + p)},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$, $p = \frac{C_0}{C}$, C_0 — теплоемкость всего стержня. См. указание в ответе к задаче 2.294.

$$2.300. u(x, t) = E_0 \left(1 - \frac{x}{l} - \frac{2}{\pi} e^{-\beta t} \sum_{n=1}^{\infty} (\cos \omega_n t + \frac{\beta}{\omega_n} \sin \omega_n t) \frac{\sin \frac{n\pi x}{l}}{n} \right),$$

$$\beta = \frac{R}{2L}, a^2 = \frac{1}{LC}, \omega_n = \sqrt{\left(\frac{\pi a n}{l} \right)^2 + \beta^2}.$$

$$2.301. u(x, t) = E_0 \left(1 - \frac{p}{p + 1} \frac{x}{l} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n^2 + p^2}{\mu_n(\mu_n^2 + p^2 + p)} \sin \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{\mu_n a t}{l} \right),$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{ctg} \mu = -p$, $p = \frac{lL}{L_0}$, $a^2 = \frac{1}{LC}$.

$$2.302. u(x, t) = \frac{2Ql}{\pi^2 \rho_0 S} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{n\pi x_0}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} \cos \frac{n\pi a t}{l}}{n^2} + g(x),$$

$$g(x) = \begin{cases} -\frac{Q}{\rho_0 S} \left(1 - \frac{x_0}{l} \right) x, & 0 \leq x \leq x_0, \\ -\frac{Q}{\rho_0 S} \left(1 - \frac{x}{l} \right) x_0, & x_0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

$$2.303. u(x, t) = \frac{P_0 - P_1}{\gamma P_0} l \left(\frac{1}{p + 1} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{\mu_n a t}{l}}{\mu_n^2 + p^2 + p} \right), p = \frac{kl}{\gamma P_0 S}, \mu_n \text{ — поло-}$$

жительный корень уравнения $p \operatorname{tg} \mu = -\mu$.

$$2.304. u(x, t) = V_0 \left(\frac{x}{l} + \frac{2}{p} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{\pi n x}{l}}{n} e^{-\frac{\pi^2 n^2 \nu}{l^2} t} \right).$$

$$2.305. u(x, t) = \frac{f_0}{a^2} \left(x^2 + a^2 t^2 - \frac{l^2}{3} \right) + \frac{1}{2a^2 l} \int_0^l (l - \xi)^2 f(\xi) d\xi - \\ - \frac{1}{a^2} \int_0^x (x - \xi) f(\xi) d\xi - \frac{l^2}{\pi^2 a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n \cos \frac{\pi n x}{l} \cos \frac{\pi n a t}{l}}{n^2},$$

f_n — коэффициент ряда $f(x) = \sum_0^{\infty} f_n \cos \frac{\pi n x}{l}$.

$$2.306. u(x, t) = \frac{A l e^{-\alpha x}}{\alpha a^2} \left(\frac{x}{l} - \frac{e^{\alpha x} - 1}{e^{\alpha l} - 1} \right) - \\ - \frac{2 \pi A e^{-\frac{\alpha x}{2}}}{a^2 l^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \left(1 + (-1)^{n+1} e^{-\frac{\alpha l}{2}} \right) \sin \frac{\pi n x}{l} \cos a \sqrt{\frac{\pi^2 n^2}{l^2} + \frac{\alpha^2}{4}} t}{\left(\frac{\pi^2 n^2}{l^2} + \frac{\alpha^2}{4} \right)^2}.$$

$$2.307. u(x, t) = \frac{A}{\alpha^2 a^2} [(\alpha l + 1)(e^{\alpha x} - 1) - \alpha x e^{\alpha x}] - \\ - \frac{2 A l^2 e^{\frac{\alpha x}{2}}}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n \left(\sqrt{\mu_n^2 + p^2} + (-1)^{n+1} 2 p e^{\frac{\alpha l}{2}} \right) \sin \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{a \sqrt{\mu_n^2 + p^2} t}{l}}{(\mu_n^2 + p^2 + p)(\mu_n^2 + p^2)^{\frac{3}{2}}},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{ctg} \mu = -p$, $p = \frac{\alpha l}{2}$.

$$2.308. u(x, t) = \frac{A}{\alpha(e^{\alpha l} - 1)} \left[\alpha x + e^{-\alpha x} + \alpha^2 a^2 t + \frac{(\alpha l - 1)e^{\alpha l} + \alpha l + 1}{e^{\alpha l} - 1} \right] + \\ + \frac{2 \pi A e^{\frac{\alpha(l-x)}{2}}}{l^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n \left(\frac{\pi n}{l} \cos \frac{\pi n x}{l} + \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\pi n x}{l} \right) \cos a \sqrt{\frac{\pi^2 n^2}{l^2} + \frac{\alpha^2}{4}} t}{\left(\frac{\pi^2 n^2}{l^2} + \frac{\alpha^2}{4} \right)^2}.$$

$$2.309. u(r, t) = \frac{A}{60 a^2} (r_0^2 - r^2)(7 r_0^2 - 3 r^2) + \frac{12 A r_0^5}{\pi^5 a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{\pi n r}{r_0} - \cos \frac{\pi n a t}{r_0}}{n^5}.$$

$$2.310. u(r, t) = \frac{3 A a^2 t^2}{2 r_0} + \frac{A r^2}{2 r_0} - \frac{3 A r_0}{10} - \frac{2 A r_0^2}{r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{1 + \mu_n^2}}{\mu_n^3} \sin \frac{\mu_n r}{r_0} \cos \frac{\mu_n a t}{r_0},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\operatorname{tg} \mu = \mu$.

$$2.311. u(r, t) = \frac{3 A r_0 t^2}{8} + \frac{A r^2}{4 a^2} \left(\frac{r_0}{2} - \frac{r}{3} \right) - \frac{A r_0^3}{90 a^2} - \\ - \frac{2 A r_0^4}{a^2 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left[(-1)^n (2 + \mu_n^2) - 2 \sqrt{1 + \mu_n^2} \right] \sqrt{1 + \mu_n^2}}{\mu_n^7} \sin \frac{\mu_n r}{r_0} \cos \frac{\mu_n a t}{r_0},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\operatorname{tg} \mu = \mu$.

$$2.312. u(r, t) = \frac{3 A r_0^2 t^2}{10} - \frac{A r^2}{10 a^2} \left(\frac{r^2}{2} - r_0^2 \right) - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\mu_n^2 + 1} \sin \frac{\pi n r}{r_0} \cos \frac{\pi n a t}{r_0}}{\mu_n^5},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\operatorname{tg} \mu = \mu$.

$$\mathbf{2.313.} \quad u(x, t) = \frac{q_0 l}{k} \left(\frac{x}{l} + \frac{1}{p} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n^2 + p^2}{\mu_n^2 (\mu_n^2 + p^2 + p)} \cos \left(1 - \frac{x}{l} \right) e^{-(\frac{\mu_n a}{l})^2 t} \right),$$

$p = hl$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$.

$$\mathbf{2.314.} \quad 1) u(x, t) = \frac{Q_0 l^2}{k \pi^2} \cos \frac{\pi x}{l} \cdot \left(1 - e^{-(\frac{\pi a}{l})^2 t} \right);$$

$$2) u(x, t) = \frac{Q_0 l^2}{k \pi^2} \left[\frac{2 \pi a^2}{l^2} t + \frac{\pi^2 - 12}{6 \pi} - \pi \frac{x}{l} \left(1 - \frac{x}{l} \right) + \sin \frac{\pi x}{l} + \right. \\ \left. + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{2 n \pi x}{l}}{n^2 (4 n^2 - 1)} e^{-(\frac{2 n \pi a}{l})^2 t} \right].$$

$$\mathbf{2.315.} \quad u(x, t) = \frac{l R}{R_0} E_0 \left(\frac{1 - \frac{x}{l}}{1 + \frac{R l}{R_0}} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\mu_n^2 + p^2}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)} \sin \mu_n \left(1 - \frac{x}{l} \right) e^{-(\frac{\mu_n a}{l})^2 t} \right),$$

$p = \frac{R l}{R_0}$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{ctg} \mu = -p$.

$$\mathbf{2.316.} \quad u(x, t) = \frac{L_2 E_0}{L_1 + L_2 + l L} \left[1 + \frac{l L}{L_2} \left(1 - \frac{x}{l} \right) - \frac{l^2 L E_0}{L_1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n(x) \cos \frac{a \mu_n}{l}}{\mu_n \|X\|^2} \right],$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения (2.100), $X_n(x)$ и $\|X\|^2$ имеют вид (2.101) и (2.102) соответственно, где $p_i = l L / L_i$, $i = 1, 2$.

У к а з а н и е. Выделить стационарное решение, полагая $u(x, t) = u_0(x) + v(x, t)$; задачу для $u_0(x)$ поставить в виде (2.103), где $h_i = \frac{L}{L_i}$, $i = 1, 2$.

$$\mathbf{2.317.} \quad u(x, t) = \frac{k \alpha_2 \tau_0}{k(\alpha_1 + \alpha_2) + \alpha_1 \alpha_2 l} \left(1 + \frac{\alpha_1}{k} x \right) + \frac{\alpha_2 \tau_0 l^2}{k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n(x) e^{-(\frac{a \mu_n}{l})^2 t}}{\mu_n \|X\|^2},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения (2.100),

$$X_n(x) = p_2 \sin \mu_n \left(1 - \frac{x}{l} \right) + \mu_n \cos \mu_n \left(1 - \frac{x}{l} \right), \quad (2.105)$$

$$\|X\|^2 = \frac{l}{2} \frac{(\mu_n^2 + p_1^2)(\mu_n^2 + p_2^2) + (p_1 + p_2)(\mu_n^2 + p_1 p_2)}{\mu_n^2 + p_1^2}, \quad (2.106)$$

$p_i = \frac{\alpha_i}{k}$, $i = 1, 2$. У к а з а н и е. См. предыдущую задачу. Для вычисления квадрата нормы собственных функций применить формулу (2.98).

$$\mathbf{2.318.} \quad u(x, t) = \frac{f_0}{12 a^2} (3 x^2 - l^2 + 6 a^2 t) + \frac{1}{2 a^2 l} \int_0^l f(\eta) (l - \eta)^2 d\eta - \\ - \frac{1}{a^2} \int_0^x f(\xi) (x - \xi) d\xi - \frac{l^2}{\pi^2 a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n \cos \frac{\pi n x}{l} e^{-(\frac{\pi n a}{l})^2 t}}{n^2},$$

f_n — коэффициент ряда $f(x) = \sum_0^{\infty} f_n \cos \frac{\pi n x}{l}$.

$$\mathbf{2.319.} \quad u(x, t) = \frac{A}{\alpha(1 - e^{\alpha l})} (\alpha x - e^{\alpha x} + \alpha l + 1 - \alpha^2 a^2 t) + \frac{\pi \alpha A}{l^2} \times \\ \times \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n X_n(x)}{\left[\left(\frac{\pi n}{l} \right)^2 + \frac{\alpha^2}{4} \right]} e^{-a^2 \left(\frac{\pi^2 n^2}{l^2} + \frac{\alpha^2}{4} \right) t}, \quad X_n(x) = e^{\frac{\alpha x}{2}} \left(\sin \frac{\pi n x}{l} - \frac{2 \pi n}{\alpha l} \cos \frac{\pi n x}{l} \right).$$

$$2.320. u(x, t) = \frac{A}{\alpha^2 a^2} \left[(\alpha x + 1) e^{-\alpha x} + \frac{\alpha l e^{-\alpha l}}{1 - e^{-\alpha l}} (\alpha x + e^{-\alpha x}) \right] - \frac{l A e^{-\alpha l}}{\alpha a^2 (1 - e^{-\alpha l})^2} - \\ - \frac{4 \pi A l^2}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(1 - (-1)^n e^{-\alpha l}) X_n(x) e^{-a^2 \left(\frac{\pi^2 n^2}{l^2} + \frac{\alpha^2}{4} \right) t}}{\left(\pi^2 n^2 + \frac{\alpha^2 l^2}{4} \right)^3},$$

где собственные функции $X_n(x) = e^{-\frac{\alpha x}{2}} \left(\sin \frac{\pi n x}{l} - \frac{2 \pi n}{\alpha l} \cos \frac{\pi n x}{l} \right)$.

$$2.321. Q = -\frac{k S_0}{\mu l} (P_0 - P_1) \left[\frac{h l}{1 + h l} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\gamma_n^2 + h^2 l^2}{\gamma_n^2 + h^2 l^2 + h l} e^{-\left(\frac{\gamma_n a}{l} \right)^2 t} \right], \text{ где } \gamma_n - \\ \text{положительный корень уравнения } \gamma \operatorname{ctg} \gamma = -h l.$$

$$2.322. P^2(x) = P_1^2 + \frac{2 h l \left[h l P^2 - (2 h l + 1) P_1^2 + P_2 \sqrt{h^2 l^2 P_2^2 + (2 h l + 1) P_1^2} \right]}{(2 h l + 1)^2}, \quad h = \frac{\alpha \mu}{k}.$$

$$2.323. P^2(x, t) = P_1^2 + \frac{4(P_0^2 - P_1^2)}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{\pi(2n+1)}{2l}}{2n+1} e^{-\left[\frac{\pi a(2n+1)}{2l} \right]^2 t}, \quad a^2 = \frac{k P_0}{\mu m}.$$

$$2.324. \mathbf{q} = \frac{k(P_1^2 - P_2^2)}{2 \mu l R T} \mathbf{e}_x.$$

$$2.325. \zeta(x) = \left(H^2 + \frac{2 \mu q}{k \rho g} x \right)^{\frac{1}{2}}.$$

$$2.326. t_0 = \frac{m L_0 [\mu_1 k_2 L_0 + \mu_2 k_1 (2l - L_0)]}{2 k_1 k_2 (P_2 - P_1)}, \quad L(t) = \left[1 - \frac{2 k_1 (P_2 - P_1)}{\mu_1 m L_0^2} t \right]^{\frac{1}{2}}.$$

$$2.327. u(x, t) = u_0 \left[1 + \frac{2(p+1)l}{l-x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\mu_n^2 + p^2}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)} \sin \mu_n \left(1 - \frac{x}{l} \right) e^{-\left(\frac{\mu_n a}{l} \right)^2 t} \right], \\ \mu_n > 0 - \text{корень уравнения } \mu \operatorname{ctg} \mu = -p, \quad p = h l - 1.$$

$$2.328. u(x, t) = \frac{Q_0 l^2}{k} \left[\frac{x}{l} \left(2 - \frac{x}{l} \right) - \frac{2l}{\pi^3 (l-x)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{n \pi x}{l}}{n^3} e^{-\left(\frac{n \pi a}{l} \right)^2 t} \right].$$

$$2.329. u(x, t) = u_0 \left(1 - \frac{2 l_0}{l_0 - x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n^2 + p^2}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)} \sin \frac{\mu_n x}{l} e^{-\left(\frac{\mu_n a}{l} \right)^2 t} \right), \quad \mu_n > 0 - \\ \text{корень уравнения } \mu \operatorname{ctg} \mu = -p, \quad p = \frac{l_0}{l_0 - l}.$$

$$2.330. u(x, t) = \frac{l^2 l_0^2 F_0}{E_0 S_0 (l_0 - l) (l_0 - x)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n(x) \cos \frac{\mu_n a t}{l}}{\mu_n \|X_n\|^2}, \quad \mu_n - \text{корень уравне-} \\ \text{ния (2.100), собственные функции } X_n \text{ и квадрат их нормы } \|X_n\|^2 \text{ опре-} \\ \text{делены формулами (2.105) и (2.106) соответственно, где } p_i = l h_i, \quad i = 1, 2, \\ h_1 = \frac{l_0 h - 1}{l_0}, \quad h_2 = \frac{1}{l_0 - l}, \quad h = \frac{k}{E_0 S_0}. \quad \text{У к а з а н и е. Функция } u(x, t) - \text{реше-} \\ \text{ние задачи}$$

$$u_{tt} = -a^2 \mathcal{L} u, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u_x(0, t) - h u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = u_0(x), \quad u_t(x, 0) = 0,$$

где $\mathcal{L} = -\frac{1}{\rho(x)} \frac{\partial}{\partial x} (l_0 - x)^2 \frac{\partial}{\partial x}$, $\rho(x) = (l_0 - x)^2$, $a^2 = \frac{E_0}{\rho_0}$, а $u_0(x)$ — решение стационарной задачи, которую можно поставить в двух (эквивалентных) формах (см. задачу 10.269):

$$\begin{aligned} 1) \quad \mathcal{L}u_0(x) &= 0, & 2) \quad \rho(x)\mathcal{L}u_0(x) &= \frac{L_0^2 F_0}{E_0 S_0} \delta(x - l), \\ 0 < x < l, & & 0 < x < l, \\ u'_0(0) - hu_0(0) &= 0, & u'_0(0) - hu_0(0) &= 0, \\ u'(l) &= \frac{F_0}{E_0 S_l}, & u'(l) &= 0. \end{aligned}$$

Задача на собственные значения

$$\begin{aligned} \mathcal{L}v(x) &= \lambda v(x), \quad 0 < x < l, \\ v'_0(0) - hv_0 &= 0, \quad v'(l) = 0 \end{aligned}$$

заменой $v(x) = X(x)/(l_0 - x)$ сводится к

$$\begin{aligned} X'' + \lambda X &= 0, \quad 0 < x < l, \\ X'(0) - h_1 X(0) &= 0, \quad X'(l) - h_2 X(l) = 0. \end{aligned}$$

Собственные функции $v_n(x)$ ортогональны с весом $\rho(x)$ на отрезке $[0; l]$, при этом $\|v_n\|^2 = \int_0^l v_n^2 \rho dx = \int_0^l X_n^2 dx = \|X_n\|^2$. Решение имеет форму ряда

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n v_n(x) \cos \frac{a\mu_n}{l} t,$$

коэффициенты которого

$$A_n = \frac{(u_0, \rho v_n)}{\|v_n\|^2} = \frac{(u_0, \rho \mathcal{L}v_n)}{\lambda \|v_n\|^2} = \frac{(\rho \mathcal{L}u_0, v_n)}{\lambda \|v_n\|^2} = \frac{(l_0^2 F_0 \delta(x - l), v_n)}{E_0 S_0 \lambda \|v_n\|^2} = \frac{l_0^2 F_0 v_n(l)}{E_0 S_0 \lambda_n \|v_n\|^2}.$$

2.331. $u(x, t) = \frac{l_0 F_0}{E_0 S_0} \left(\frac{l_0}{l_0 - x} + \frac{E_0 S_0}{kl_0} - \frac{l^2 l_0}{(l_0 - l)(l_0 - x)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n(x) \cos \frac{a\mu_n}{l} t}{\mu_n \|X\|^2} \right),$

$\mu_n > 0$, $X_n(x)$, $\|X\|^2$ те же, что и в ответе к предыдущей задаче.

У к а з а н и е. Решение представить в виде $u(x, t) = u_0(x) + v(x, t)$, где функция $u_0(x)$ та же, что и в предыдущей задаче.

2.332. $u(r, t) = \frac{q_0 r_0}{k} \left(\frac{3a^2 t}{r_0^2} + \frac{r^2}{2r_0^2} - \frac{3}{10} - 2 \frac{r_0}{r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\mu_n^2 + 1}}{\mu_n^3} \sin \frac{\mu_n r}{r_0} e^{-\left(\frac{\mu_n a}{r_0}\right)^2 t} \right),$
 $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\operatorname{tg} \mu = \mu$.

2.333. $u(r, t) = u_0 \left(1 - \frac{2r_0}{\pi r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin \frac{n\pi r}{r_0} e^{-\left(\frac{\pi n}{r_0}\right)^2 D t} \right).$

2.334. $u(r, t) = u_0 \left(1 - \frac{2hr_0^2}{r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)} \sin \frac{\mu_n r}{r_0} e^{-\left(\frac{\mu_n}{r_0}\right)^2 D t} \right),$
 $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{ctg} \mu = -p$, $p = hr_0 - 1$.

2.335. 1) $u(r, t) = \frac{Q}{6k} (r - r_1)(r_2 - r) \left(1 + \frac{r_1 + r_2}{r} + \frac{2Q(r_2 - r_1)^2}{k\pi^3 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n r_2 - r_1}{n^3} \sin \frac{\pi n(r - r_1)}{r_2 - r_1} e^{-\left(\frac{\pi a n}{r_2 - r_1}\right)^2 t} \right);$

$$2) u(r, t) = \frac{Q}{3k}(r_2 - r)\left(\frac{r_2 + r}{2} - \frac{r_1^3}{r_2 r}\right) - \frac{2Q(r_2 - r_1)^2}{kr} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n^2 + p^2}{\mu_n^3(\mu_n^2 + p^2 + p)} \sin \frac{\mu_n(r_2 - r)}{r_2 - r_1} e^{-\left(\frac{a\mu_n}{r_2 - r_1}\right)^2 t},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu = -p \sin \mu$, $p = \frac{r_2}{r_1} - 1$;

$$3) u(r, t) = \frac{Qt}{C\rho}.$$

2.336. 1) $u(r, t) = \frac{A(r - r_1)(r_2 - r)}{2a^2 r} - \frac{4A(r_2 - r_1)^2}{\pi^3 a^2 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{\pi(2n+1)(r - r_1)}{r_2 - r_1}}{(2n+1)^3} e^{-\left(\frac{\pi a(2n+1)}{r_2 - r_1}\right)^2 t};$

$$2) u(r, t) = \frac{A}{2a^2}(r - r_1)\left(\frac{r_2^2}{r_1 r} - 1\right) + \frac{2A(r_2 - r_1)^2}{a^2 r} \times$$

$$\times \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n^2 + p^2}{\mu_n^3(\mu_n^2 + p^2 - p)} \left(\frac{(-1)^{n+1} p}{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}} - 1 \right) \sin \frac{\mu_n(r - r_1)}{r_2 - r_1} e^{-\left(\frac{a\mu_n}{r_2 - r_1}\right)^2 t},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu = p \sin \mu$, $p = 1 - \frac{r_1}{r_2}$;

$$3) u(r, t) = \frac{15At}{38} + \frac{A}{2a^2} \left(\frac{5r^2}{38} - r - \frac{36}{19r} + \frac{3519}{1444} \right) +$$

$$+ \frac{2A}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9\mu_n^2 + 1}{\mu_n^5(36\mu_n^2 + 19)} \left((-1)^n \sqrt{\frac{4\mu_n^2 + 1}{9\mu_n^2 + 1}} - 1 \right) R_n(r) e^{-(a\mu_n)^2 t},$$

$$R_n(r) = \frac{1}{r} (\sin \mu_n(r - 2) + 2\mu_n \cos \mu_n(r - 2)),$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu = (1 + 6\mu^2) \sin \mu$.

У к а з а н и я к п. 2), п. 3) см. в задаче 2.20, п. 2), п. 4).

2.337. 1) $u(r, t) = \frac{A}{12a^2 r} (r - r_1)(r_2 - r)(r^2 + (r_1 + r_2)r + r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2) +$

$$+ \frac{2A(r_2 - r_1)^2}{\pi^3 a^2 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \left[(-1)^n r_2^2 - r_1^2 - \frac{2(r_2 - r_1)^2}{\pi^2 n^2} ((-1)^n - 1) \right] \times$$

$$\times \sin \frac{\pi n(r - r_1)}{r_2 - r_1} e^{-\left(\frac{\pi a n}{r_2 - r_1}\right)^2 t};$$

$$2) u(r, t) = \frac{A}{12a^2} (r - r_1) \left(\frac{3r_1^4}{r_1 r} - r_1^2 - r_1 r - r^2 \right) -$$

$$- \frac{2Ad^2}{a^2 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n^2 + p^2}{\mu_n^3(\mu_n^2 + p^2 - p)} \left(r_1^2 - \frac{2d^2}{\mu_n^2} + \left(r_2^2 + \frac{2d^2}{\mu_n^2} \right) \frac{(-1)^{n+1} p}{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}} \right) \times$$

$$\times \sin \frac{\mu_n(r - r_1)}{d} e^{-\left(\frac{a\mu_n}{d}\right)^2 t},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu = p \sin \mu$, $p = 1 - \frac{r_1}{r_2}$, $d = r_2 - r_1$;

$$3) u(r, t) = \frac{195At}{76} - \frac{A}{a^2} \left(\frac{r^3}{12} - \frac{65r^2}{152} - \frac{54}{19r} + \frac{70759}{6498} \right) +$$

$$+ \frac{2A}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9\mu_n^2 + 1}{\mu_n^5(36\mu_n^2 + 19)} \left(4 + \frac{2}{\mu_n^2} + (-1)^n \left(9 + \frac{2}{\mu_n^2} \right) \sqrt{\frac{4\mu_n^2 + 1}{9\mu_n^2 + 1}} \right) \times$$

$$\times R_n(r) e^{-(a\mu_n)^2 t},$$

$R_n(r) = \frac{1}{r}(\sin \mu_n(r-2) + 2\mu_n \cos \mu_n(r-2))$,
 $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu = (1 + 6\mu^2) \sin \mu$.

У к а з а н и я к п. 2), п. 3) см. в задаче 2.20, п. 2), п. 4).

$$\mathbf{2.338.} \quad u(r, t) = \frac{u_2 r_2 - u_1 r_1}{r_2 - r_1} - \frac{r_1 r_2 (u_2 - u_1)}{(r_2 - r_1)r} + \\ + \frac{2}{\pi r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n r_2 u_2 - r_1 u_1}{n} \sin \frac{\pi n (r - r_1)}{r_2 - r_1} e^{-(\frac{\pi a n}{r_2 - r_1})^2 t}.$$

$$\mathbf{2.339.} \quad u(r, t) = u_0 \left(1 - \frac{2r_2}{r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n^2 + p^2}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)} \sin \mu_n \frac{r_2 - r}{r_2 - r_1} e^{-(\frac{\mu_n}{r_2 - r_1})^2 D t} \right),$$

$\mu > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = -p$, $p = \frac{r_2}{r_1} - 1$. См. задачу 2.20, п.3.

$$\mathbf{2.340.} \quad u(r, t) = \frac{q_0 r_1^2}{k} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_2} \right) - \frac{2q_0 (r_2 - r_1) r_1}{kr} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)} \times \\ \times \sin \frac{\mu_n (r_2 - r)}{r_2 - r_1} e^{-(\frac{a \mu_n}{r_2 - r_1})^2 t}, \mu_n \text{ и } p \text{ определены в предыдущей задаче.}$$

$$\mathbf{2.341.} \quad u(r, t) = \frac{q_0}{14k} \left(r^2 + \frac{16}{r} - \frac{453}{35} + 6a^2 t \right) - \frac{28q_0}{k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4\mu_n^2 + 1}{\mu_n^3 (4\mu_n^2 + 7)} R_n(r) e^{-(a\mu_n)^2 t},$$

$R_n(r) = \frac{1}{r}(\sin \mu_n(r-1) + \mu_n \cos \mu_n(r-1))$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu = (1 + 2\mu^2) \sin \mu$. У к а з а н и е. См. задачу 2.20, п.4.

$$\mathbf{2.342.} \quad u(r, t) = \frac{Q}{4\pi k} \left(\frac{1}{r} - \frac{9}{14} \right) - \frac{Q}{2\pi k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4\mu_n^2 + 1}{\mu_n^3 (4\mu_n^2 + 7)} \left(1 + (-1)^{n+1} \sqrt{\frac{\mu_n^2 + 1}{4\mu_n^2 + 1}} \right) \times \\ \times R_n(r) e^{-(a\mu_n)^2 t}, R_n(r) \text{ и } \mu_n \text{ те же, что и в предыдущей задаче.}$$

$$\mathbf{2.343.} \quad u(r, t) = \frac{q_0}{7k} \left(\frac{99}{70} - \frac{3r^2}{2} + \frac{4}{r} - 9a^2 t \right) + \\ + \frac{2q_0}{k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4\mu_n^2 + 1}{\mu_n^3 (4\mu_n^2 + 7)} \left(1 + (-1)^{n+1} 4 \sqrt{\frac{\mu_n^2 + 1}{4\mu_n^2 + 1}} \right) R_n(r) e^{-(a\mu_n)^2 t}, R_n(r) \text{ и } \mu_n$$

определены в задаче 2.341.

$$\mathbf{2.344.} \quad \mathbf{q} = -D \frac{\partial u}{\partial r} \mathbf{e}_r, \quad u(r, t) = C_0 + \frac{Q}{4\pi^2 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_n R_n(r)}{\|R_n\|} e^{-(\frac{a\mu_n}{d})^2 t}, \quad C_0 \text{ — про-}$$

извольная постоянная, $C_n = \frac{d}{\mu_n} \left(1 + (-1)^n \sqrt{\frac{\mu_n^2 r_1^2 + d^2}{\mu_n^2 r_2^2 + d^2}} \right)$, $d = r_2 - r_1$, μ_n

положительный корень уравнения $\mu \cos \mu = \left(1 + \frac{\mu^2 r_1^2 r_2^2}{d^2} \right) \sin \mu$, $R_n(r) =$

$$= \frac{1}{r} \left(\sin \frac{\mu_n (r - r_1)}{d} + \frac{\mu_n r_1}{d} \cos \frac{\mu_n (r - r_1)}{d} \right), \quad \|R_n\|^2 = \frac{\mu_n^2 (\mu_n^2 r_1^2 r_2^2 + 3r_1 r_2 d^2 + d^4)}{2d(\mu_n^2 r_2^2 + d^2)}.$$

$$\mathbf{2.345.} \quad 1) u(r, t) = \frac{A}{6a^2} (r - r_1)(r_2 - r) \left(1 + \frac{r_1 + r_2}{r} \right) + \\ + \frac{2A(r_2 - r_1)^2}{a^2 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n r_2 - r_1}{n^3} \sin \frac{\pi n (r - r_1)}{r_2 - r_1} \cos \frac{\pi a n t}{r_2 - r_1};$$

$$2) u(r, t) = \frac{A}{6a^2}(r - r_1) \left(\frac{2r_2^3}{r_1 r} - r - r_1 \right) - \\ - \frac{2Ar_1(r_2 - r_1)^2}{a^2 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n^2 + p^2}{\mu_n^3(\mu_n^2 + p^2 - p)} \sin \frac{\mu_n(r - r_1)}{r_2 - r_1} \cos \frac{a\mu_n t}{r_2 - r_1},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu = p \sin \mu$, $p = 1 - \frac{r_1}{r_2}$;

$$3) u(r, t) = \frac{At^2}{2}.$$

2.346. 1) $u(r, t) = \frac{A(r_2 - r)(r - r_1)}{2a^2 r} + \\ + \frac{4A(r_2 - r_1)^2}{\pi^3 a^2 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi(r - r_1)}{r_2 - r_1} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{r_2 - r_1}}{(2n+1)^3};$

$$2) u(r, t) = \frac{A}{2a^2}(r_2 - r) \left(1 + \frac{r_1^2}{r_2 r} \right) + \frac{2A(r_2 - r_1)^2}{a^2 r} \times \\ \times \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n^2 + p^2}{\mu_n^3(\mu_n^2 + p^2 + p)} \left(1 + \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}} \right) \sin \frac{\mu_n(r_2 - r)}{r_2 - r_1} \cos \frac{a\mu_n t}{r_2 - r_1},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu = -p \sin \mu$, $p = \frac{r_2}{r_1} - 1$;

$$3) u(r, t) = \frac{21At^2}{148} - \frac{A}{a^2} \left(\frac{r}{2} - \frac{7r^2}{1148} + \frac{72}{37r} + \frac{116167}{54760} \right) + \\ + \frac{2A}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{16\mu_n^2 + 1}{\mu_n^5(144\mu_n^2 + 1)} \left((-1)^n \sqrt{\frac{9\mu_n^2 + 1}{16\mu_n^2 + 1}} - 1 \right) R_n(r) \cos a\mu_n t,$$

$$R_n(r) = \frac{1}{r} (\sin \mu_n(r - 3) + 3\mu_n \cos \mu_n(r - 3)),$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu = (1 + 12\mu^2) \sin \mu$.

У к а з а н и я к п. 2), п. 3): см. задачу 2.20 п. 2), п. 4).

2.347. 1) $u(r, t) = \frac{A}{12a^2 r}(r - 1)(2 - r)(r^2 + 3r + 7) + \\ + \frac{2A}{a^2 \pi^3 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n - 1 + \frac{2}{\pi^2 n^2}(1 + (-1)^{n+1})}{n^3} \sin \pi n(r - 1) \cos \pi a n t;$

$$2) u(r, t) = \frac{A(2 - r)(2r^3 + 4r^2 + 8r - 3)}{24a^2 r} + \\ + \frac{2A}{a^2 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\mu_n^3} \left(\frac{2}{\mu_n^2} - 4 + (-1)^{n+1} \frac{\mu_n^2 + 2}{\mu_n^2 \sqrt{\mu_n^2 + 1}} \right) \frac{\mu_n^2 + 1}{\mu_n^2 + 2} \sin \mu_n(2 - r),$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu = -\sin \mu$;

$$3) u(r, t) = \frac{45At^2}{56} - \frac{A}{a^2} \left(\frac{r^3}{12} - \frac{15r^2}{56} + \frac{2}{7r} + \frac{117}{196} \right) + \frac{2A}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4\mu_n^2 + 1}{\mu_n^5(4\mu_n^2 + 7)} \times \\ \times \left(1 + \frac{2}{\mu_n^2} + 2(-1)^{n+1} \left(2 + \frac{1}{\mu_n^2} \right) \sqrt{\frac{\mu_n^2 + 1}{4\mu_n^2 + 1}} \right) R_n(r) \cos a\mu_n t,$$

$$R_n(r) = \frac{1}{r} (\sin \mu_n(r - 1) + \mu_n \cos \mu_n(r - 1)),$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu = (1 + 2\mu^2) \sin \mu$.

У к а з а н и я к п. 2), п. 3): см. задачу 2.20, п. 2), п. 4).

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.348.} \quad 1) u(r, t) &= \frac{u_2 r_2 - u_1 r_1}{r_2 - r_1} - \frac{r_1 r_2 (u_2 - u_1)}{(r_2 - r_1)r} + \\
 &+ \frac{2}{\pi r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n r_2 u_2 - r_1 u_1}{n} \sin \frac{\pi n (r - r_1)}{r_2 - r_1} \cos \frac{\pi a n t}{r_2 - r_1}; \\
 2) u(r, t) &= u_0 \left(1 - \frac{2r_2}{r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n^2 + p^2}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)} \sin \mu_n \frac{r_2 - r}{r_2 - r_1} \cos \frac{a \mu_n t}{r_2 - r_1} \right),
 \end{aligned}$$

$\mu > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = -p$, $p = \frac{r_2}{r_1} - 1$. См. задачу 2.20, п.3;

$$\begin{aligned}
 3) u(r, t) &= -A r_1^2 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_1} \right) + \frac{2A r_1 (r_2 - r_1)}{r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)} \times \\
 &\times \sin \frac{\mu_n (r_2 - r)}{r_2 - r_1} \cos \frac{a \mu_n t}{r_2 - r_1},
 \end{aligned}$$

μ_n и p определены в ответе к задаче 2.339;

$$4) u(r, t) = \frac{A}{7} \left(\frac{453}{70} - \frac{3a^2 t^2}{2} - \frac{r^2}{2} - \frac{8}{r} \right) + 2A \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4\mu_n^2 + 1}{\mu_n^3 (4\mu_n^2 + 7)} R_n(r) e^{-(a\mu_n)^2 t},$$

$$R_n(r) = \frac{1}{r} (\sin \mu_n (r - 1) + \mu_n \cos \mu_n (r - 1)),$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu = (1 + 2\mu^2) \sin \mu$.

У к а з а н и е. См. задачу 2.20, п. 4).

$$\mathbf{2.349.} \quad u(x, y) = \frac{F_0 l_2}{4T_0 l_1} \left(1 + \frac{|y|}{l_2} - \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\operatorname{ch} \frac{(2n+1)\pi x}{2l_2} \cos \frac{(2n+1)\pi y}{2l_2}}{(2n+1)^2 \operatorname{ch} \frac{(2n+1)\pi l_1}{2l_2}} \right).$$

$$\mathbf{2.350.} \quad u(x, y, t) = \frac{F_0 l_2}{4\pi T_0 l_1} \left[\frac{\operatorname{sh} \frac{\pi(l_1 - |x|)}{l_2}}{\operatorname{ch} \frac{\pi l_1}{l_2}} - \frac{2}{\pi l_1 l_2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l_1} \cos \omega_n t}{\left(\frac{2n+1}{2l_1} \right)^2 + \frac{1}{l_2^2}} \right] \sin \frac{\pi y}{l_2},$$

$$\omega_n = \pi a \sqrt{\left(\frac{2n+1}{2l_1} \right)^2 + \frac{1}{l_2^2}}.$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.351.} \quad u(x, y, t) &= \frac{4I}{\pi a \rho l} \sum_{m,n=1}^{\infty} \frac{[1 - (-1)^{m+n}] \sin \frac{\pi m}{4} \sin \frac{\pi n}{4}}{\sqrt{m^2 + n^2}} \times \\
 &\times \sin \frac{\pi m x}{l} \sin \frac{\pi n x}{l} \sin \frac{\pi a}{l} \sqrt{m^2 + n^2} t.
 \end{aligned}$$

У к а з а н и е. Методом продолжений перейти к задаче для квадрата.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.352.} \quad u(x, y, t) &= \frac{4I}{\pi a \rho l} \sum_{m,n=1}^{\infty} \frac{[1 + (-1)^{m+n}] \sin \frac{\pi m}{4} \sin \frac{\pi n}{4}}{\sqrt{m^2 + n^2}} \times \\
 &\times \sin \frac{\pi m x}{l} \sin \frac{\pi n x}{l} \sin \frac{\pi a}{l} \sqrt{m^2 + n^2} t. \quad \text{См. указание к предыдущей задаче.}
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{2.353.} \quad u(x, y) = C - \frac{Qy}{kl_1}.$$

$$\mathbf{2.354.} \quad u(x, y) = \frac{Q}{k} \left(\frac{x}{l_2} - \frac{y}{l_1} \right) + C.$$

$$\mathbf{2.355.} \quad u(x, y) = C - \frac{1}{k} \left(Q_1 \frac{x}{l_1} - Q_2 \frac{y}{l_2} \right).$$

$$2.356. u(x, y) = \frac{q_0 \sqrt{2}}{kl} xy, u_{\max} = u\left(\frac{l}{2}, \frac{l}{2}\right) = \frac{q_0 l \sqrt{2}}{4k}.$$

$$2.357. u(x, y) = \frac{Q}{2kl^2} [(l-x)^2 - y^2].$$

$$2.358. u(x, y) = \frac{u_0}{2l^2} [(l-x)^2 - y^2] + \frac{u_0 x}{l}.$$

$$2.359. \mathbf{j}(x, y) = -\frac{\sqrt{2} j_0}{l} (y \mathbf{e}_x + x \mathbf{e}_y).$$

$$2.360. 1) u(x, y) = \frac{Q}{2kl_1 l_2} [(x-l_1)^2 - (y-l_2)^2] + C; 2) u(x, y) = \frac{Q}{2kl_1 l_2} [-(x+l_1)^2 + (y-l_2)^2] + C; 3) u(x, y) = \frac{Q}{2kl_1 l_2} (x^2 - y^2) + C.$$

$$2.361. u(x, y, z) = \frac{1}{16kl_1 l_2 l_3} [Q_{-1}(l_1 - x)^2 - Q_1(l_1 + x)^2 + Q_{-2}(l_2 - y)^2 - Q_2(l_2 + y)^2 + Q_{-3}(l_3 - z)^2 - Q_3(l_3 + z)^2] + C.$$

$$2.362. u(r, \varphi) = \frac{Q_0}{2k} \left[\frac{r}{r_0} \sin - \frac{1}{\pi} \ln \left(1 + \frac{r^4}{r_0^4} + 2 \frac{r^2}{r_0^2} \cos 2\varphi \right) + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2n} \frac{\cos 2n\varphi}{n(4n^2 - 1)} \right].$$

$$2.363. u(r, \varphi) = u_0 \left(1 - \frac{\varphi}{\alpha} - \frac{2r_0 h}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0} \right)^n \frac{\sin \frac{n\pi\varphi}{\alpha}}{n(n + r_0 h)} \right).$$

$$2.364. u(r, \varphi) = \frac{Q}{k} \left[\frac{r}{r_0} \frac{\cos \left(\varphi - \frac{\alpha}{2} \right)}{\sin \frac{\alpha}{2}} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{2\pi n}{\alpha}} \frac{\cos \frac{2\pi n \varphi}{\alpha}}{n \left[\left(\frac{2\pi n}{\alpha} \right)^2 - 1 \right]} \right].$$

$$2.365. \text{Если } Q_0 l = q_1 + q_2 + \frac{2q_3 l}{r_0}, \text{ то } u(r, \varphi, z) = C - \frac{q_1(l-z)^2}{2kl} - \frac{q_2 z^2}{2kl} - \frac{q_3 r^2}{2kr_0},$$

в противном случае задача не имеет решения.

$$2.366. \text{Если } Q_0 l = q_1 + q_2, \text{ то } u(r, \varphi, z) = C - \frac{q_1(l-z)^2}{2kl} - \frac{q_2 z^2}{2kl} - q_3 r \cos \varphi,$$

в противном случае задача не имеет решения.

$$2.367. \text{Если } Q_0(r_2^2 - r_1^2) = (q_1 + q_2) \frac{(r_2^2 - r_1^2)}{l} + 2q_3 r_1 + 2q_4 r_2, \text{ то } u(r, \varphi, z) = C - \frac{q_1(l-z)^2}{2kl} - \frac{q_2 z^2}{2kl} - \frac{Q_0 r^2}{4k} + \frac{(q_1 + q_2)r^2}{4kl} + \left[\frac{Q_0(r_1^2 + r_2^2)}{4k} - \frac{(q_1 + q_2)(r_1^2 + r_2^2)}{4kl} + \frac{q_3 r_1 - q_4 r_2}{2k} \right] \ln r,$$

в противном случае задача не имеет решения.

$$2.368. u(x, y) = \frac{(P_1 - P_2)a^2 b^2}{2\rho\nu(a^2 + b^2)} \left(1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} \right). \text{ У к а з а н и е. Решение отыскивать в виде многочлена второй степени относительно } x \text{ и } y.$$

$$2.369. \quad u(x, t) = \frac{gl^2}{24a^2} \left[\left(1 - \frac{x^2}{l^2} \right)^2 - 48 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \mu_n X_n(x) \cos \frac{a\mu_n^2 t}{l^2}}{\mu_n^5 \operatorname{ch} \mu_n \cos^2 \mu_n} \right], \quad \mu_n > 0$$

есть корень уравнения $\operatorname{tg} \mu + \operatorname{th} \mu = 0$, $X_n(x) = \operatorname{ch} \mu_n \cos \frac{\mu_n}{l} x - \cos \mu_n \operatorname{ch} \frac{\mu_n}{l} x$.

$$2.370. \quad P^2(r) = P_1^2 + \frac{P_2^2 - P_1^2}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \ln \frac{r}{r_1}.$$

$$2.371. \quad \mathbf{q} = \frac{\alpha r_2}{RT(1+2\beta)} \left[P_1^2 - P_2 \frac{\beta P_2 + \sqrt{\beta^2 P_2^2 + (1+2\beta)P_1^2}}{1+2\beta} \right] \mathbf{e}_r, \quad \text{где } h = \frac{\alpha \mu}{k},$$

$$\beta = hr_2 \ln \frac{r_2}{r_1}.$$

$$2.372. \quad \zeta(r) = \left(H^2 + \frac{\mu q}{\pi \rho k g} \ln \frac{r}{r_1} \right)^{\frac{1}{2}}.$$

$$2.373. \quad t_0 = \frac{\mu_1 m r_1}{4k_1} \frac{\left(\frac{R_0}{r_1} \right)^2 \left[\ln \left(\frac{R_0}{r_1} \right)^2 - 1 \right] + 1}{P_2 - P_1}.$$

$$2.374. \quad v(r, \varphi) = u(r, \varphi) - \frac{\rho g}{4T} (r_0^2 - r^2), \quad \text{где } u(r, \varphi) - \text{решение задачи 2.238.}$$

$$2.375. \quad u(r) = \frac{F_0 r_0^2}{16\pi D} \left[1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 + \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \ln \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right].$$

$$2.376. \quad u(r) = \frac{F_0 r_0^2}{16\pi D} \left[\left(1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right) \frac{3+\sigma}{1+\sigma} + \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \ln \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right].$$

$$2.377. \quad u(x, t) = \frac{F_0}{\rho_0 l} \begin{cases} \frac{\omega_0 \sin \omega t - \omega \sin \omega_0 t}{\omega_0 (\omega_0^2 - \omega^2)} \sin \frac{\pi}{4} \left(1 - \frac{x}{l} \right), & \omega \neq \omega_0 = \frac{\pi a}{4l}, \\ \frac{\sin \omega t - \omega t \cos \omega t}{2\omega} \sin \frac{\pi}{4} \left(1 - \frac{x}{l} \right), & \omega = \omega_0. \end{cases}$$

$$2.378. \quad \text{Если } \omega \neq \omega_n = \frac{(2n+1)\pi a}{2l}, \text{ то}$$

$$u(x, t) = \frac{f_0}{\rho_0 \omega^2} \left[\left(\frac{\cos \frac{\omega x}{a}}{\cos \frac{\omega l}{a}} - 1 \right) \sin \omega t - \frac{8\omega^3 l}{\pi^2 a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \sin \omega_n t}{(2n+1)^2 (\omega_n^2 - \omega^2)} \right];$$

если $\omega = \omega_{n_0}$, то

$$u(x, t) = \frac{f_0}{\rho_0 \omega^2} \left[\left(\frac{x \sin \frac{\omega x}{a}}{l \sin \frac{\omega l}{a}} - \frac{5a \cos \frac{\omega x}{a}}{2\omega l \sin \frac{\omega l}{a}} - 1 \right) \sin \omega t - \right. \\ \left. - \frac{a \cos \frac{\omega x}{a}}{l \sin \frac{\omega l}{a}} t \cos \omega t - \frac{8\omega^3 l}{\pi^2 a} \sum_{n=1, n \neq n_0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \sin \omega_n t}{(2n+1)^2 (\omega^2 - \omega_n^2)} \right].$$

2.379. Если $\omega \neq \frac{(2n+1)\pi a}{l}$, то

$$u(x, t) = \frac{f_0}{\rho \omega^2} \left[\frac{2a^2 \cos \frac{\omega(l-2x)}{2a}}{\omega^2 l^2 \cos \frac{\omega l}{2a}} - \frac{(l-x)x}{l^2} - \frac{2a^2}{\omega^2 l^2} \right] \sin \omega t - \\ - \frac{8\omega l f_0}{\rho a^3 \pi^4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} \sin \frac{(2n+1)\pi a t}{l}}{(2n+1)^4 \left[\left(\frac{(2n+1)\pi}{l} \right)^2 - \frac{\omega^2}{a^2} \right]},$$

если $\omega = \frac{(2n_0+1)\pi a}{l}$, то

$$u(x, t) = \frac{F_0}{\rho \omega^2} \left[\frac{2a^2}{\omega^2 l^2} \left(\frac{7a}{\omega l} \sin \frac{\omega x}{a} + \frac{l-2x}{l} \cos \frac{\omega x}{a} - 1 \right) - \frac{(l-x)x}{l^2} \right] \sin \omega t + \\ + \frac{4F_0}{\rho} \left[\frac{a^3}{\omega^5 l^3} (\sin \omega t - \omega t \cos \omega t) \sin \frac{\omega x}{a} - \frac{2\omega l}{a^3 \pi^4} \sum_{\substack{n=0 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} \sin \frac{(2n+1)\pi a t}{l}}{(2n+1)^4 \left[\left(\frac{(2n+1)\pi}{l} \right)^2 - \frac{\omega^2}{a^2} \right]} \right].$$

$$\mathbf{2.380.} \quad u(x, t) = \frac{f_0}{\rho} \cdot \begin{cases} \frac{(\omega_n \sin \omega t - \omega \sin \omega_n t) \sin \frac{\omega_n x}{a}}{\omega_n (\omega_n^2 - \omega^2)}, & \omega \neq \omega_n = \frac{\pi n a}{l}, \\ \frac{(\sin \omega t - \omega t \cos \omega t) \sin \frac{\omega x}{a}}{2\omega^2}, & \omega = \omega_n. \end{cases}$$

$$\mathbf{2.381.} \quad u(x, t) = \frac{f_0}{\rho \omega_n} \cdot \begin{cases} \frac{(\omega_n \sin \omega t - \omega \sin \omega_n t) \sin \frac{\omega_n x}{a}}{\omega_n^2 - \omega^2}, & \omega \neq \omega_n = \frac{\pi n x}{l}, \\ \frac{(\sin \omega_n t - \omega_n t \cos \omega_n t) \sin \frac{\omega_n x}{a}}{2\omega_n}, & \omega = \omega_n. \end{cases}$$

$$\mathbf{2.382.} \quad u = -\frac{2lF_0}{\pi T} \left[\frac{1}{3} \sin \frac{3\pi x}{2l} \sin \frac{3\pi a t}{2l} \eta \left(\frac{2l}{3} - x \right) + \frac{6}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{2\pi n}{3} \sin \frac{\pi n x}{l} \sin \frac{\pi n a t}{l}}{n(4n^2 - 9)} \right].$$

$$\mathbf{2.383.} \quad 1) u = -\frac{lF_0}{4\pi T} \left[\left| \sin \frac{2\pi x}{l} \right| \sin \frac{2\pi a t}{l} + \frac{16}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} \sin \frac{(2n+1)\pi a t}{l}}{(2n+3)(4n^2 - 1)} \right];$$

$$2) u = f(x) \sin \frac{2\pi a t}{l} + \frac{2lF_0}{\pi^2 T} \left[\frac{\sqrt{3}}{16} \left(\sin \frac{2\pi a t}{l} - \frac{2\pi a t}{l} \cos \frac{2\pi a t}{l} \right) + \right. \\ \left. + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \frac{\pi x}{l} \sin \frac{\pi a t}{l} - 2 \sum_{n=4}^{\infty} \frac{\sin \frac{2\pi n}{3} \sin \frac{\pi n x}{l} \sin \frac{\pi n a t}{l}}{n(n^2 - 4)} \right],$$

$$\text{где } f(x) = \frac{lF_0}{4\pi T} \cdot \begin{cases} \left(\frac{\sqrt{3}}{4\pi} - \frac{2}{3} \right) \sin \frac{2\pi x}{l} - \frac{\sqrt{3}}{l} x \cos \frac{2\pi x}{l}, & 0 \leq x \leq \frac{l}{3}, \\ \left(\frac{\sqrt{3}}{4\pi} + \frac{1}{3} \right) \sin \frac{2\pi x}{l} - \frac{\sqrt{3}(l-x)}{l} \cos \frac{2\pi x}{l}, & \frac{l}{3} \leq x \leq l. \end{cases}$$

2.384. Если $\omega \neq \omega_n = \frac{\pi n a}{l}$, $n \in \mathbb{N}$, то

$$u(x, t) = f(x) \sin \omega t - \frac{2\omega F_0}{\rho l} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n(x_0) X_n(x) \sin \omega_n t}{\omega_n (\omega_n^2 - \omega^2)}, \quad X_n(x) = \sin \frac{\pi n x}{l},$$

где

$$f(x) = \frac{F_0}{a\omega\rho \sin \frac{\omega l}{a}} \cdot \begin{cases} \sin \frac{\omega(l-x_0)}{a} \sin \frac{\omega x}{a}, & 0 \leq x \leq x_0, \\ \sin \frac{\omega(l-x)}{a} \sin \frac{\omega x_0}{a}, & x_0 \leq x \leq l; \end{cases}$$

если $\omega = \omega_{n_0}$ и $X_{n_0}(x_0) = 0$, где $x_0 = \frac{ml}{n_0}$, $0 < m < n_0$ (m — целое), то

$$u(x, t) = f(x) \sin \omega t - \frac{2\omega F_0}{\rho l} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{X_n(x_0) X_n(x) \sin \omega_n t}{\omega_n (\omega_n^2 - \omega^2)},$$

где

$$f(x) = \frac{(-1)^m F_0}{a\omega\rho l} \sin \frac{\omega x}{a} \cdot \begin{cases} l - x, & 0 \leq x \leq x_0, \\ -x_0, & x_0 \leq x \leq l; \end{cases}$$

если $\omega = \omega_{n_0}$, а $X_{n_0}(x_0) \neq 0$, то

$$u(x, t) = f(x) \sin \omega t - \frac{F_0 \sin \frac{\omega x_0}{a}}{\omega^2 \rho l} (\omega t \cos \omega t - \sin \omega t) \sin \frac{\omega x}{a} - \\ - \frac{2\omega F_0}{\rho l} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{X_n(x_0) X_n(x) \sin \omega_n t}{\omega_n (\omega_n^2 - \omega^2)},$$

где функция $f(x)$ имеет вид

$$f = \frac{F_0}{a\omega\rho l} \cdot \begin{cases} \left(\frac{a}{2\omega} \sin \frac{\omega x}{a} - x \cos \frac{\omega x}{a} \right) \sin \frac{\omega x_0}{a} + (l - x_0) \cos \frac{\omega x_0}{a} \sin \frac{\omega x}{a}, & 0 \leq x \leq x_0, \\ \left(\frac{a}{2\omega} \sin \frac{\omega x_0}{a} - x_0 \cos \frac{\omega x_0}{a} \right) \sin \frac{\omega x}{a} + (l - x) \cos \frac{\omega x}{a} \sin \frac{\omega x_0}{a}, & x_0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

2.385. $u(x, t) = u_0 \left[\left(\frac{1}{2\pi} \sin \frac{\pi at}{l} - \frac{at}{l} \cos \frac{\pi at}{l} \right) \sin \frac{\pi x}{l} - \right. \\ \left. - \frac{x}{l} \cos \frac{\pi x}{l} \sin \frac{\pi at}{l} \right] + \frac{2u_0}{\pi} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{\pi nx}{l} \sin \frac{\pi at}{l}}{n^2 - 1}.$

У к а з а н и е. Исходную задачу для функции $u(x, t)$ можно свести к двум, более простым, полагая $u(x, t) = U(x, t) + w(x, t)$, где $U(x, t)$ и $w(x, t)$ — решения следующих смешанных задач:

$$U_{tt} = a^2 U_{xx} + C \sin \frac{\pi x}{l} \sin \frac{\pi at}{l}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$U(0, t) = 0, \quad U(l, t) = u_0 \sin \frac{\pi at}{l}, \quad U(x, 0) = U_t(x, 0) = 0,$$

$$w_{tt} = a^2 w_{xx} - C \sin \frac{\pi x}{l} \sin \frac{\pi at}{l}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$w(0, t) = w(l, t) = w(x, 0) = w_t(x, 0) = 0.$$

Для обоснования указанной редукции следует перевести неоднородность из граничного условия в уравнение (см. задачу 10.268) и воспользоваться методикой, изложенной в примере 2.15.

$$\mathbf{2.386.} \quad u(x, t) = \frac{lF_0}{\pi ES} \left[\left(\frac{at}{l} - \frac{1}{2\pi} \cos \frac{\pi x}{l} - \frac{l-x}{l} \sin \frac{\pi x}{l} \right) \sin \frac{\pi at}{l} + \right. \\ \left. + \frac{at}{l} \cos \frac{\pi at}{l} \cos \frac{\pi x}{l} \right] - \frac{2lF_0}{\pi^2 ES} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos \frac{\pi nx}{l} \sin \frac{\pi nat}{l}}{n(n^2 - 1)}.$$

$$\mathbf{2.387.} \quad u(x, t) = \frac{2lF_0}{\pi ES} \left[\left(\frac{3}{\pi} \sin \frac{\pi x}{2l} - \frac{x}{l} \cos \frac{\pi x}{2l} \right) \sin \frac{\pi at}{2l} - \right. \\ \left. - \frac{at}{l} \cos \frac{\pi at}{2l} \sin \frac{\pi x}{2l} \right] - \frac{lF_0}{2\pi^2 ES} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \sin \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{n(n+1)(2n+1)}.$$

$$\mathbf{2.388.} \quad \text{Если } \omega \neq \omega_n = a\sqrt{\lambda_n}, \quad \sqrt{\lambda_n} = \frac{(2n+1)\pi}{2l}, \quad n \in \mathbb{N}_0, \quad \text{то}$$

$$u(x, t) = u_0 \left[\frac{\cos \frac{\omega(l-x)}{a}}{\cos \frac{\omega l}{a}} \sin \omega t - \frac{2a\omega}{l} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} x \sin \omega_n t}{\omega_n^2 - \omega^2} \right];$$

если $\omega = \omega_{n_0}$, то

$$u(x, t) = u_0 \left[\left(\frac{at}{2\omega l} \sin \frac{\omega x}{a} + \frac{l-x}{l} \cos \frac{\omega x}{a} \right) \sin \omega t \right] + \\ + \frac{a}{\omega l} (\sin \omega t - \omega t \cos \omega t) \sin \frac{\omega x}{a} \Big] - \frac{2\omega a u_0}{l} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} x \sin \omega_n t}{\omega_n^2 - \omega^2}.$$

$$\mathbf{2.389.} \quad \text{Если } \omega \neq \frac{\pi na}{l}, \quad \text{то}$$

$$u(x, t) = \frac{av_0}{\omega} \left[\frac{\cos \frac{\omega(l-x)}{a}}{\sin \frac{\omega l}{a}} \sin \omega t + \frac{at}{l} + \frac{2\omega^2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{\pi nx}{l} \sin \frac{\pi nat}{l}}{n \left(\left(\frac{\pi na}{l} \right)^2 - \omega^2 \right)} \right];$$

если $\omega = \frac{\pi n_0 a}{l}$, то

$$u(x, t) = \frac{v_0 a}{l\omega} \left\{ \left[(l-x) \sin \frac{\omega x}{a} - \frac{3a}{2\omega} \cos \frac{\omega x}{a} \right] \sin \omega t + at \cos \frac{\omega x}{a} \cos \omega t + at \right\} + \\ + \frac{2\omega a^2 v_0}{l} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{\cos \frac{\pi nx}{l} \sin \frac{\pi nat}{l}}{n \left(\left(\frac{\pi na}{l} \right)^2 - \omega^2 \right)}.$$

$$\mathbf{2.390.} \quad u(x, t) = \frac{\rho A}{12la^4} [2l^2(l-x)^2 - 6a^2 t^2(l-x)^2 - (l-x)^4 - a^4 t^4 + 2a^2 l^2 t^2] + \\ + \frac{A\rho l^3}{3a^4} \left(-\frac{7}{60} + \frac{1}{\pi^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{\pi nx}{l} \sin \frac{\pi nat}{l}}{n^4} \right).$$

$$\mathbf{2.391.} \quad u(x, t) = \frac{Ax(l-x)t}{2a^2} - \frac{4Al^3}{\pi^4 a^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} \sin \frac{(2n+1)\pi at}{l}}{(2n+1)^4}.$$

$$\mathbf{2.392.} \quad u(x, t) = \frac{A(l^2 - x^2)t}{2a^2} - \frac{32Al^3}{\pi^4 a^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi x}{l} \sin \frac{(2n+1)\pi at}{l}}{(2n+1)^4}.$$

$$2.393. u(x, t) = \frac{Alxt}{2a^2} \left(\frac{2+p}{1+p} - \frac{x}{l} \right) - \\ - \frac{2Al^3}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{\mu_n^2 + p^2} (\sqrt{\mu_n^2 + p^2} + (-1)^{(n+1)}p) \sin \frac{\mu_n x}{l} \sin \frac{\mu_n at}{l}}{\mu_n^4 (\mu_n^2 + p^2 + p)},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{ctg} \mu = -p$, $p = hl$.

$$2.394. u(x, t) = \frac{Ax(l-x)}{2a^2} \left(t^2 + \frac{x^2 - lx + l^2}{6a^2} \right) + \frac{8Al^4}{\pi^5 a^4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} \sin \frac{(2n+1)\pi at}{l}}{(2n+1)^5}.$$

$$2.395. u(x, t) = \frac{A(l^2 - x^2)}{2a^2} \left(t^2 - \frac{5l^2 - x^2}{6a^2} \right) + \\ + \frac{128Al^4}{\pi^5 a^4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^5}.$$

$$2.396. u(x, t) = \frac{Ax(l^2 - x^2)t}{6a^2} + \frac{2Al^4}{\pi^4 a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{\pi nx}{l} \sin \frac{\pi nat}{l}}{n^4}.$$

$$2.397. u(x, t) = \frac{Ax(3l^2 - x^2)t}{6a^2} - \frac{64Al^4}{\pi^5 a^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \sin \frac{(2n+1)\pi at}{2l}}{(2n+1)^5}.$$

$$2.398. u(x, t) = \frac{Al}{a^2} \left(\frac{x}{l} - \frac{\operatorname{sh} \frac{\alpha x}{a}}{\operatorname{sh} \frac{\alpha l}{a}} \right) - \\ - \frac{2Al}{\pi a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{\pi nx}{l} \left(\frac{\alpha l}{\pi a n} \sin \frac{\pi nat}{l} - \cos \frac{\pi nat}{l} \right)}{n \left(\frac{\pi^2 n^2}{l^2} + \frac{\alpha^2}{a^2} \right)}.$$

$$2.399. u(x, t) = \int_0^t (t - \tau) f(\tau) d\tau.$$

$$2.400. u(x, t) = \frac{Ala^2 t^3}{12a^2} + \frac{Ax^2(3l - 2x)t}{12a^2} + \frac{Al^4}{24a^2} + \\ + \frac{4Al^4}{\pi^5 a^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi x}{l} \sin \frac{(2n+1)\pi at}{l}}{(2n+1)^5}.$$

$$2.401. u(x, t) = \frac{Alt^4}{24} - \frac{A}{2a^2} \left(\frac{x^3}{3} - \frac{lx^2}{2} + \frac{l^3}{2} \right) t^2 - \frac{Ax^2}{4a^4} \left(\frac{x^3}{15} - \frac{lx^2}{6} + \frac{l^3}{6} \right) - \\ - \frac{Al^5}{120a^4} - \frac{8Al^5}{\pi^6 a^4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi x}{l} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{l}}{(2n+1)^6}.$$

$$2.402. u(x, t) = \frac{A\alpha \operatorname{ch} \frac{\alpha x}{a}}{\alpha \operatorname{sh} \frac{\alpha l}{a}} + \frac{a^2 A}{l\alpha^2} (\alpha t - 1) + \\ + \frac{2A}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\alpha l}{\pi n} \sin \frac{\pi ant}{l} - \cos \frac{\pi ant}{l} \right) \frac{(-1)^n \cos \frac{\pi nx}{l}}{\left(\frac{\pi n}{l} \right)^2 + \frac{\alpha^2}{a^2}}.$$

$$2.403. u(x, t) = \frac{A e^{-\alpha x}}{\alpha a^2} \left(\frac{x}{l} - \frac{e^{\alpha x} - 1}{e^{\alpha l} - 1} \right) - \\ - \frac{2\pi A}{a^2 l^2} e^{-\frac{\alpha x}{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n[1 + (-1)^{n+1} e^{-\frac{\alpha l}{2}} \sin \frac{\pi n x}{l} \cos a \sqrt{\frac{\pi^2 n^2}{l^2} + \frac{\alpha^2}{4}} t]}{\left(\frac{\pi^2 n^2}{l^2} + \frac{\alpha^2}{4} \right)^2}.$$

$$2.404. u(x, t) = \frac{A}{\alpha^2 a^2} [(\alpha l + 1)(e^{\alpha x} - 1) - x \alpha e^{\alpha x}] - \\ - \frac{2Al^3}{a^3} e^{\frac{\alpha x}{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n \left(\sqrt{\mu_n^2 + p^2} + (-1)^{n+1} 2p e^{\frac{\alpha l}{2}} \right) \sin \frac{\mu_n x}{l} \sin \frac{a \sqrt{\mu_n^2 + p^2} t}{l}}{(\mu_n^2 + p^2 + p) \left(\frac{\mu_n^2}{l^2} + \frac{\alpha^2}{4} \right)^{\frac{5}{2}}}, \\ \mu_n > 0 - \text{корни уравнения } \mu \operatorname{ctg} \mu = -p, \quad p = \frac{\alpha l}{2}.$$

$$2.405. u(r, t) = \frac{A}{2a^2} (r_0 - r)(r_0^2 + rr_0 - r^2)t - \frac{8Ar_0^5}{\pi^6 a^3 r} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi r}{r_0} \sin \frac{(2n+1)\pi at}{r_0}}{(2n+1)^6}.$$

$$2.406. u(r, t) = \frac{A(r_0^2 - r^2)}{6a^2} \left(t^2 - \frac{7r_0^2 - 3r^2}{30a^2} \right) - \frac{4Ar_0^5}{\pi^5 a^4 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{\pi nr}{r_0} \cos \frac{\pi nat}{r_0}}{n^5}.$$

$$2.407. u(r, t) = \frac{A(r_0^2 - r^2)}{2a^2} \left[(7r_0^2 - 3r^2)t^2 - \frac{3r^4 - 18r_0^2 r^2 + 31r_0^4}{630a^2} \right] - \\ - \frac{24Ar_0^7}{\pi^7 a^4 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{\pi nr}{r_0} \cos \frac{\pi nat}{r_0}}{n^7}.$$

$$2.408. \text{Если } \omega \neq \omega_n = \frac{\pi na}{l}, \text{ то}$$

$$u(r, t) = \frac{u_0 r_0}{r} \left[\frac{\sin \frac{\omega r}{a} \sin \omega t}{\sin \frac{\omega r_0}{a}} + \frac{2\omega a}{r_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{\pi nr}{r_0} \sin \frac{\pi nat}{r_0}}{\omega_n^2 - \omega^2} \right];$$

если $\omega = \omega_{n_0}$, то

$$u(x, t) = \frac{u_0 a \omega}{\cos \frac{\omega r_0}{a}} \left[\left(\omega t \cos \omega t - \frac{1}{2} \sin \omega t \right) \frac{\sin \frac{\omega r}{a}}{r} + \frac{\omega}{a} \cos \frac{\omega r}{a} \sin \omega t \right] + \\ + \frac{2u_0 a \omega}{r} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{\pi nr}{r_0} \sin \frac{\pi nat}{r_0}}{\omega_n^2 - \omega^2}.$$

$$2.409. u(t) = \frac{A}{\alpha} \left(1 - \frac{1 - e^{-\alpha t}}{\alpha} \right).$$

$$2.410. u(r, t) = \frac{Ar_0 t^3}{8} + \frac{Ar}{4a^2} \left(\frac{r_0 r}{2} - \frac{r^2}{3} \right) - \frac{Ar_0^3 t}{90a^2} - \\ - \frac{2Ar_0^5}{a^3 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left[(-1)^n (2 + \mu_n^2) - 2\sqrt{1 + \mu_n^2} \right] \sqrt{1 + \mu_n^2}}{\mu_n^8} \sin \frac{\mu_n r}{r_0} \sin \frac{\mu_n at}{r_0}.$$

$$2.411. u(r, t) = \frac{Ar_0^2 t^2}{20} - \frac{Ar^2}{2a^2} \left(\frac{r^2}{10} - \frac{rr_0}{3} + \frac{3r_0^2}{10} \right) t - \\ - \frac{8Ar_0^6}{a^3 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\sqrt{\mu_n^2 + 1} - (-1)^n) \sqrt{\mu_n^2 + 1} \sin \frac{\mu_n r}{r_0} \cos \frac{\mu_n at}{r_0}}{\mu_n^8}.$$

$$2.412. u(r, t) = \frac{Aa^2 t^3}{2r_0} + \frac{Ar^2 t}{2r_0} - \frac{3Ar_0 t}{10} - \frac{2Ar_0^3}{ar} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{1 + \mu_n^2}}{\mu_n^4} \sin \frac{\mu_n r}{r_0} \sin \frac{\mu_n at}{r_0}.$$

$$2.413. u(r, t) = \frac{Aa^2 t^4}{4r_0} + \frac{A}{2r_0} \left(r^2 - \frac{3r_0^2}{5} \right) t^2 + \frac{A}{20a^2 r_0} \left(r^4 - 2r_0^2 r^2 + \frac{27r_0^4}{35} \right) + \\ + \frac{4Ar_0^4}{a^2 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{1 + \mu_n^2}}{\mu_n^5} \sin \frac{\mu_n r}{r_0} \cos \frac{\mu_n at}{r_0}.$$

Решение. Пусть $\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r}$ — радиальная часть оператора Лапласа в сферических координатах в трехмерном пространстве. Отыскание частного решения задачи

$$u_{tt} = a^2 \Delta u, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |u| < \infty, \quad u_r(r_0, t) = At^2, \\ u(r, 0) = u_t(r, 0) = 0$$

достигается несколькими заменами. Замена $u(r, t) = v(r, t) + \frac{Ar^2 t^2}{2r_0}$ ликвидирует неоднородность в граничном условии:

$$v_{tt} = a^2 \Delta v + \frac{3Aa^2 t^2}{r_0} - \frac{Ar^2}{r_0}, \quad v_r(r_0, t) = 0.$$

Замена $v(r, t) = w(r, t) + f(r) + \frac{Aa^2 t^4}{4r_0}$, где $\Delta f = \frac{Ar^2}{a^2 r_0}$, приводит к однородному уравнению для функции $v(r, t)$ с неоднородным (но стационарным) граничным условием:

$$w_{tt} = a^2 \Delta w, \quad w_r(r_0, t) = -f'(r_0).$$

Наконец, замена $w(r, t) = U(r, t) - \frac{f'(r_0)r^2}{2r_0} - \frac{3a^2 f'(r_0)t^2}{2r_0}$ (см. пример 2.14) полностью снимает неоднородности. Итак,

$$u(r, t) = U(r, t) + f(r) - \frac{f'(r_0)r^2}{2r_0} + \frac{Aa^2 t^4}{4r_0} - \frac{3a^2 f'(r_0)t^2}{2r_0},$$

где

$$U_{tt} = a^2 \Delta U, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t, \\ |U| < \infty, \quad U_r(r_0, t) = 0, \\ U(r, 0) = F(r), \quad U_t(r, 0) = 0, \quad F(r) = -f(r) + \frac{f'(r_0)r^2}{2r_0}.$$

Задача на собственные значения

$$\Delta R + \lambda R = 0, \quad 0 < r < r_0, \\ |R| < \infty, \quad R'(r_0) = 0,$$

возникающая в процессе разделения переменных $U(r, t) = R(r)T(t)$, решена в примере 2.10. Для функции $U(r, t)$ получается ряд

$$U(r, t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n R_n(r) \cos \frac{\mu_n a t}{r_0},$$

при формировании которого учтено, что $U_t(r, 0) = 0$. При $t = 0$

$$F(r) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n R_n(r),$$

откуда

$$C_0 = \frac{(F, R_0)}{\|R_0\|^2} = \frac{1}{\|R_0\|^2} \int_0^{r_0} F(r) r^2 dr, \quad C_n = \frac{(F, R_n)}{\|R_n\|^2} = \frac{1}{\|R_n\|^2} \int_0^{r_0} F(r) R_n(r) r^2 dr.$$

Так как $|F(r)| < \infty$ и $F'(r_0) = 0$, то функция $F(r)$ принадлежит области определения эрмитова оператора Δ , поэтому при $n > 1$

$$\begin{aligned} (F, R_n) &= -\frac{1}{\lambda_n} (F, \Delta R_n) = -\frac{1}{\lambda_n} (\Delta F, R_n) = -\frac{1}{\lambda_n} (-\Delta f + \frac{3f'(r_0)}{r_0}, R_n) = \\ &= \frac{1}{\lambda_n} \left(\frac{Ar^2}{a^2 r_0}, R_n \right) + \frac{3f'(r_0)}{r_0} (1, R_n) = \frac{A}{a^2 r_0 \lambda_n} (r^2, R_n), \end{aligned}$$

где $(1, R_n) = 0$ в силу ортогональности собственных функций. Пусть

$$h(r) = r^2, \quad 0 \leq r \leq r_0, \quad h'(r_0) = \begin{cases} 2r, & 0 \leq r < r_0, \\ 0, & r = r_0, \end{cases}$$

тогда обобщенный оператор $\Delta h = 6 - 2r_0 \delta(r - r_0)$ (см. (10.40)). Следовательно,

$$\begin{aligned} (r^2, R_n) &= (h, R_n) = -\frac{1}{\lambda_n} (h, \Delta R_n) = -\frac{1}{\lambda_n} (\Delta h, R_n) = \frac{2r_0}{\lambda_n} R_n(r_0) r^2 = \\ &= \frac{2r_0^2}{\lambda_n} \sin \mu_n = \frac{2r_0^2 \mu_n (-1)^n}{\lambda_n \sqrt{\mu_n^2 + 1}} = \frac{2r_0^4 (-1)^n}{\mu_n \sqrt{\mu_n^2 + 1}}. \end{aligned}$$

$$\mathbf{2.414.} \quad u(x, t) = \frac{M_0 l^2}{EJ} \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\operatorname{sh} \mu_n - \sin \mu_n) X_n(x) \cos \frac{a \mu_n^2 t}{l^2}}{\mu_n^3 \operatorname{sh} \mu_n^2 \sin^2 \mu_n} - \frac{x^2}{4l^2} \left(1 - \frac{x}{l} \right) \right],$$

$X_n(x) = \operatorname{sh} \mu_n \sin \mu_n \left(1 - \frac{x}{l} \right) - \sin \mu_n \operatorname{sh} \mu_n \left(1 - \frac{x}{l} \right)$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\operatorname{tg} \mu = th \mu$.

$$\mathbf{2.415.} \quad u(x, t) = \frac{2M_0 l^2}{EJ} \left[\frac{1}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sin \frac{\pi n x}{l} \cos \frac{a \mu_n^2 t}{l^2}}{n^3} - \frac{x}{12l} \left(1 - \frac{x^2}{l^2} \right) \right].$$

$$\mathbf{2.416.} \quad u(x, t) = w(x) - \frac{M_0 l^2}{EJ} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n(x_0) X_n(x) \cos \frac{a \mu_n^2 t}{l^2}}{\mu_n^4 \operatorname{sh} \mu_n^2 \sin^2 \mu_n},$$

$$w(x) = \begin{cases} (l-x)^2 (2x_0 x + lx - 3lx_0) x^2, & 0 \leq x \leq x_0, \\ (l-x_0)^2 (2x_0 x + lx_0 - 3lx) x_0^2, & x_0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

Собственные функции $X_n(x)$ имеют вид

$$X_n(x) = (\cos \mu_n - \operatorname{ch} \mu_n) \left(\sin \frac{\mu_n x}{l} - \operatorname{sh} \frac{\mu_n x}{l} \right) - (\sin \mu_n - \operatorname{sh} \mu_n) \left(\cos \frac{\mu_n x}{l} - \operatorname{ch} \frac{\mu_n x}{l} \right),$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\operatorname{ch} \mu \cos \mu = 1$.

У к а з а н и е. Функция $w(x)$ — решение задачи, которая имеет следующие эквивалентные постановки:

$$\begin{aligned} w^{IV} &= \frac{F_0}{EJ} \delta(x - x_0), \quad 0 < x < l, & w^{IV} &= 0, \quad 0 < x < x_0, \quad x_0 < x < l, \\ w(0) = w'(0) = w(l) = w'(l) &= 0, & w(0) = w'(0) = w(l) = w'(l) &= 0, \\ w(x_0 + 0) - w(x_0 - 0) &= 0, & w(x_0 + 0) - w(x_0 - 0) &= 0, \\ w'(x_0 + 0) - w'(x_0 - 0) &= 0, & w'(x_0 + 0) - w'(x_0 - 0) &= 0, \\ w''(x_0 + 0) - w''(x_0 - 0) &= 0, & w''(x_0 + 0) - w''(x_0 - 0) &= 0, \\ w'''(x_0 + 0) - w'''(x_0 - 0) &= \frac{M_0}{EJ}. \end{aligned}$$

Для вычисления коэффициентов Фурье функции $w(x)$ по собственным функциям $X_n(x)$ следует воспользоваться постановкой в первой форме.

$$\begin{aligned} \mathbf{2.417.} \quad u(x, t) &= \frac{M_0}{2EJ} [x_0(x_0 - 2x) - (x_0 - x)^2 \eta(x_0 - x)] - \\ &- \frac{M_0 l^3}{EJ} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X'_n(x_0) X_n(x) \cos \frac{a \mu_n^2 t}{l^2}}{\mu_n^3 (\operatorname{sh} \mu_n + \sin \mu_n)^2}, \end{aligned}$$

где μ_n и X_n даны в ответе к задаче 2.280.

2.418. 1) если $\alpha = 0$, то

$$u(x, t) = \frac{Q_0 l^2}{2k} \left[\frac{x}{l} \left(1 - \frac{x}{l} \right) - \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} e^{-\left(\frac{(2n+1)\pi a}{l}\right)^2 t}}{(2n+1)^3} \right];$$

если $0 < \frac{\sqrt{\alpha}}{a} \neq \frac{(2n+1)\pi}{l}$, то

$$u(x, t) = \frac{Q}{\alpha \rho C} \left[\left(\frac{\cos \frac{\sqrt{\alpha}(2x-l)}{2a}}{\cos \frac{\sqrt{\alpha}l}{2a}} - 1 \right) e^{-\alpha t} - \frac{4\alpha}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} e^{-\left(\frac{(2n+1)\pi a}{l}\right)^2 t}}{(2n+1) \left(\left(\frac{(2n+1)\pi a}{l} \right)^2 - \alpha \right)} \right];$$

если $\frac{\sqrt{\alpha}}{a} = \frac{(2n_0+1)\pi}{l}$, то

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{Q}{\alpha \rho C} \left[\left(1 - \frac{2x}{l} \right) \cos \frac{\sqrt{\alpha}}{a} x - 1 + \frac{a}{l\sqrt{\alpha}} (3 + 4\alpha t) \right] e^{-\alpha t} - \\ &- \frac{4Q_0}{\pi \rho C} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} e^{-\left(\frac{(2n+1)\pi a}{l}\right)^2 t}}{(2n+1) \left(\left(\frac{(2n+1)\pi a}{l} \right)^2 - \alpha \right)}; \end{aligned}$$

2) если $\alpha = 0$, то $u(x, t) = \frac{Q_0 t}{\rho C}$, если $\alpha > 0$, то $u(x, t) = \frac{Q_0}{\alpha \rho C} (1 - e^{-\alpha t})$.

2.419. Если $\alpha < h = \frac{\beta}{\rho C}$, то

$$u(x, t) = f(x) e^{-\alpha t} - \frac{Q_0}{kl\gamma^2} \left[1 - 2\gamma^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n(x_0) X_n(x) e^{-a^2 \lambda_n t}}{\lambda_n + \gamma^2} \right] e^{-ht}, \quad \sqrt{\lambda_n} = \frac{\pi n}{l},$$

$$\gamma^2 = \frac{h - \alpha}{a^2}, \quad X_n(x) = \cos \frac{\pi n x}{l},$$

$$f(x) = \frac{Q_0}{k\gamma \operatorname{sh} \gamma l} \cdot \begin{cases} \operatorname{ch} \gamma(l - x_0) \operatorname{ch} \gamma x, & 0 \leq x \leq x_0, \\ \operatorname{ch} \gamma(l - x) \operatorname{ch} \gamma x_0, & x_0 \leq x \leq l; \end{cases}$$

если $\alpha = h$, то

$$u(x, t) = \left[f(x) + \frac{lQ_0}{k} \left(\frac{a^2 t}{l^2} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n(x_0) X_n(x) e^{-a^2 \lambda_n t}}{n^2} \right) \right] e^{-ht},$$

где

$$f(x) = \frac{Q_0}{k} \cdot \begin{cases} \frac{x^2 + x_0^2}{2l} - x_0 + \frac{l}{3}, & 0 \leq x \leq x_0, \\ \frac{x^2 + x_0^2}{2l} - x + \frac{l}{3}, & x_0 \leq x \leq l; \end{cases}$$

если

$$\alpha > h, \quad \frac{\alpha - h}{a^2} = \gamma^2 \neq \lambda_n,$$

то

$$u(x, t) = f(x) e^{-\alpha t} + \frac{Q_0 e^{-ht}}{kl\gamma^2} \left[1 - 2\gamma^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n(x_0) X_n(x) e^{-a^2 \lambda_n t}}{\lambda_n - \gamma^2} \right],$$

где

$$f(x) = \frac{Q_0}{k\gamma \sin \gamma l} \cdot \begin{cases} \cos \gamma(l - x_0) \cos \gamma x, & 0 \leq x \leq x_0, \\ \cos \gamma(l - x) \cos \gamma x_0, & x_0 \leq x \leq l; \end{cases}$$

если $\alpha > h$, $\frac{\alpha - h}{a^2} = \lambda_{n_0}$, $X_{n_0}(x_0) = 0$, то $x_0 = \frac{(2m+1)l}{2n_0}$, $0 \leq m \leq n_0 - 1$,

$$u(x, t) = f(x) e^{-\alpha t} + \frac{lQ_0}{k\pi^2 n_0^2} \left[1 - 2n_0^2 \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{X_n(x_0) X_n(x) e^{-a^2 \lambda_n t}}{n^2 - n_0^2} \right] e^{-ht}, \quad \text{где}$$

$$f(x) = (-1)^{m+1} \frac{lQ_0}{k\pi n_0} \cos \frac{\pi n_0 x}{l} \cdot \begin{cases} l - x_0, & 0 \leq x \leq x_0, \\ -x_0, & x_0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad m - \text{целое число};$$

если $\alpha > h$, $\frac{\alpha - h}{a^2} = \lambda_{n_0}$, $X_{n_0}(x_0) \neq 0$, то

$$u(x, t) = \left[f(x) + \frac{2a^2 Q_0}{kl\pi^2} X_{n_0}(x_0) X_{n_0}(x) t \right] e^{-\alpha t} + \frac{Q_0 l}{k\pi^2 n_0^2} \left(1 - 2 \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{X_n(x_0) X_n(x) e^{-a^2 \lambda_n t}}{\lambda_n - \lambda_{n_0}} \right) e^{-ht},$$

где функция $f(x)$ на промежутке $[0; x_0]$ определена выражением

$$f(x) = \frac{lQ_0}{k\pi n_0} \left[\frac{1}{2\pi n_0} \cos \frac{\pi n_0 x_0}{l} - \left(1 - \frac{x_0}{l} \right) \sin \frac{\pi n_0 x_0}{l} \right] \cos \frac{\pi n_0 x}{l} + \frac{x}{l} \sin \frac{\pi n_0 x}{l} \cos \frac{\pi n_0 x_0}{l},$$

а при $x_0 \leq x \leq l$ в этом выражении надо заменить $x \rightarrow x_0$, $x_0 \rightarrow x$.

2.420. Если $\alpha < \beta$, то

$$u(x, t) = f(x) e^{-\alpha t} - \frac{2Q_0 e^{-\beta t}}{lD} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n(x_0) X_n(x) e^{-D\lambda_n t}}{\lambda_n + \gamma^2}, \quad \text{где } \gamma^2 = \frac{\beta - \alpha}{D},$$

$$X_n(x) = \sin \sqrt{\lambda_n} x, \quad \sqrt{\lambda_n} = \frac{\pi n}{l}, \quad f(x) = \frac{Q_0}{D\gamma \operatorname{sh} \gamma l} \cdot \begin{cases} \operatorname{sh} \gamma(l - x_0) \operatorname{sh} \gamma x, & 0 \leq x \leq x_0, \\ \operatorname{sh} \gamma(l - x) \operatorname{sh} \gamma x_0, & x_0 \leq x \leq l; \end{cases}$$

если $\alpha = \beta$, то $u(x, t) = \left[f(x) - \frac{2lQ_0}{\pi^2 D} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n(x_0) X_n(x) e^{-D\lambda_n t}}{n^2} \right] e^{-\alpha t},$

$$\text{где } f(x) = \frac{Q_0}{lD} \cdot \begin{cases} (l-x_0)x, & 0 \leq x \leq x_0, \\ (l-x)x_0, & x_0 \leq x \leq l; \end{cases}$$

$$\text{если } \alpha > \beta, \quad \frac{\alpha - \beta}{D} = \gamma^2 \neq \lambda_n, \text{ то}$$

$$u(x, t) = f(x) e^{-\alpha t} - \frac{2Q_0 e^{-\beta t}}{lD} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n(x_0) X_n(x) e^{-D\lambda_n t}}{\lambda_n - \gamma^2},$$

$$\text{где } f(x) = \frac{Q_0}{D\gamma \sin \gamma l} \cdot \begin{cases} \sin \gamma(l-x_0) \sin \gamma x, & 0 \leq x \leq x_0, \\ \sin \gamma(l-x) \sin \gamma x_0, & x_0 \leq x \leq l; \end{cases}$$

$$\text{если } \alpha > \beta, \quad \frac{\alpha - \beta}{D} = \lambda_{n_0}, \quad X_{n_0}(x_0) = 0, \quad \text{то } x_0 = \frac{ml}{n_0}, \quad 0 < m < n_0,$$

$$u(x, t) = f(x) e^{-\alpha t} - \frac{2lQ_0 e^{-\beta t}}{\pi^2 D} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{X_n(x_0) X_n(x) e^{-D\lambda_n t}}{n^2 - n_0^2},$$

$$\text{где } f(x) = (-1)^m \frac{Q_0}{\pi D n_0} \sin \frac{\pi n_0 x}{l} \cdot \begin{cases} l - x_0, & 0 \leq x \leq x_0, \\ -x_0, & x_0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad m - \text{целое число;}$$

$$\text{если } \alpha > \beta, \quad \frac{\alpha - \beta}{D} = \lambda_{n_0}, \quad X_{n_0}(x_0) \neq 0, \quad \text{то}$$

$$u(x, t) = f(x) e^{-\alpha t} + \frac{2Q_0}{l} \sin \frac{\pi n_0 x_0}{l} \sin \frac{\pi n_0 x}{l} t e^{-\alpha t} - \frac{2lQ_0 e^{-\beta t}}{\pi^2 D} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{X_n(x_0) X_n(x) e^{-D\lambda_n t}}{n^2 - n_0^2},$$

где функция

$$f(x) = \frac{Q_0}{\pi n_0 D} \left\{ \left[\frac{l}{2\pi n_0} \sin \frac{\pi n_0 x_0}{l} + (l-x_0) \cos \frac{\pi n_0 x_0}{l} \right] \sin \frac{\pi n_0 x}{l} - x \sin \frac{\pi n_0 x_0}{l} \cos \frac{\pi n_0 x}{l} \right\}$$

определена при $0 \leq x \leq x_0$, а при $x_0 \leq x \leq l$ выражение для $f(x)$ получается из данного заменами $x \rightarrow x_0$, $x_0 \rightarrow x$.

$$\mathbf{2.421.} \quad u(x, t) = \frac{Al^2}{a^2} \left(\frac{a^2 x t}{l^3} + \frac{x^3}{6l^3} - \frac{x}{6l} - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{n\pi x}{l} e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t}}{n^3} \right).$$

$$\mathbf{2.422.} \quad u(x, t) = \frac{Al^3}{ka^2} \left(\frac{a^2 x t}{l^3} + \frac{x^3}{6l^3} - \frac{x}{2l} + \frac{32}{\pi^4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} e^{-\left(\frac{(2n+1)\pi a}{2l}\right)^2 t}}{(2n+1)^4} \right).$$

$$\mathbf{2.423.} \quad u(x, t) = \frac{Al^2}{D} \left(\frac{Dt}{l^2} - \frac{1}{2} + \frac{x^2}{2l^2} + \frac{16}{\pi^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} e^{-\left(\frac{(2n+1)\pi a}{2l}\right)^2 t}}{(2n+1)^3} \right).$$

$$\mathbf{2.424.} \quad u(x, t) = \frac{Al^3}{D^2} \left[\frac{Dt}{2l^2} \left(\frac{x^2}{l^2} + \frac{Dt}{l^3} - \frac{1}{3} \right) - \frac{x^2}{12l^2} \left(1 - \frac{x^2}{2l^2} \right) + \frac{7}{360} + \frac{2}{\pi^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos \frac{n\pi x}{l} e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t}}{n^4} \right].$$

$$\mathbf{2.425.} \quad u(x, t) = \frac{Al^2}{D} \left(\frac{Dt}{l^2} + \frac{x^2}{2l^2} - \frac{p+2}{2p} - 2p \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \cos \frac{\mu_n x}{l} e^{-\left(\frac{\mu_n a}{l}\right)^2 t}}{\mu_n^2 (\mu_n^2 + p^2 + p)} \right),$$

$$p = hl, \quad h = \frac{\alpha}{D}, \quad \mu_n > 0 - \text{корень уравнения } \mu \operatorname{tg} \mu = p.$$

2.426. Если $\frac{\sqrt{\alpha}}{a} \neq \sqrt{\lambda_n} = \frac{\pi n}{l}$, то

$$u(x, t) = u_0 \left[\frac{\sin \frac{\sqrt{\alpha} x}{a}}{\sin \frac{\sqrt{\alpha} l}{a}} e^{-\alpha t} + \frac{2}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\lambda_n} X_n(x) e^{-a^2 \lambda_n t}}{\lambda_n - \frac{\alpha}{a^2}} \right], \quad X_n(x) = \sin \sqrt{\lambda_n} x;$$

если $\frac{\sqrt{\alpha}}{a} = \sqrt{\lambda_{n_0}}$, то

$$u(x, t) = u_0 (-1)^{n_0} \left[\left(\frac{1}{2\pi n_0} - \frac{2\pi n_0 a^2 t}{l^2} \right) \sin \frac{\pi n_0 x}{l} + \frac{x}{l} \cos \frac{\pi n_0 x}{l} \right] e^{-\left(\frac{\pi a n_0}{l}\right)^2 t} + \frac{2u_0}{\pi} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{n \sin \frac{\pi n x}{l} e^{-\left(\frac{\pi a n}{l}\right)^2 t}}{n^2 - n_0^2}.$$

2.427. Если $\frac{\sqrt{\alpha}}{a} \neq \sqrt{\lambda_n} = \frac{(2n+1)\pi}{2l}$, то

$$u(x, t) = u_0 \left[\frac{\cos \frac{\sqrt{\alpha}(l-x)}{a}}{\cos \frac{\sqrt{\alpha} l}{a}} e^{-\alpha t} - \frac{2}{l} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\lambda_n} \sin \sqrt{\lambda_n} x e^{-a^2 \lambda_n t}}{\lambda_n - \frac{\alpha}{a^2}} \right];$$

если $\frac{\sqrt{\alpha}}{a} = \sqrt{\lambda_{n_0}}$, то

$$u(x, t) = \frac{u_0 a}{2l\sqrt{\alpha}} \left[\left(\frac{2(l-x)\sqrt{\alpha}}{a} \cos \frac{\sqrt{\alpha} x}{a} + (4\alpha t - 1) \sin \frac{\sqrt{\alpha} x}{a} \right) e^{-\alpha t} - \frac{4\sqrt{\alpha}}{a} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{\sqrt{\lambda_n} \sin \sqrt{\lambda_n} x e^{-a^2 \lambda_n t}}{\lambda_n - \frac{\alpha}{a^2}} \right].$$

2.428. Если $\frac{\sqrt{\alpha}}{a} \neq \sqrt{\lambda_n} = \frac{(2n+1)\pi}{2l}$, то

$$u(x, t) = \frac{q_0}{k} \left[\frac{a \sin \frac{\sqrt{\alpha}(l-x)}{a}}{\sqrt{\alpha} \cos \frac{\sqrt{\alpha} l}{a}} e^{-\alpha t} - \frac{2}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n(x) e^{-a^2 \lambda_n t}}{\lambda_n - \frac{\alpha}{a^2}} \right], \quad X_n(x) = \cos \sqrt{\lambda_n} x;$$

если $\frac{\sqrt{\alpha}}{a} = \sqrt{\lambda_{n_0}}$, то

$$u(x, t) = \frac{q_0 a^2}{2kl\alpha} \left((1 + 4\alpha t) \cos \frac{\sqrt{\alpha} x}{a} - \frac{2(l-x)\sqrt{\alpha}}{a} \sin \frac{\sqrt{\alpha} x}{a} \right) e^{-\alpha t} - \frac{2q_0}{kl} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{X_n(x) e^{-a^2 \lambda_n t}}{\lambda_n - \frac{\alpha}{a^2}}.$$

2.429. Если $\alpha = 0$, то

$$u(x, t) = \frac{q_0}{2kl} \left[\left(x^2 - 2lx - 2a^2 t + \frac{2l}{3} \right) - \frac{4l^2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cos \frac{\pi n x}{l} e^{-\left(\frac{\pi n a}{l}\right)^2 t} \right];$$

если $0 < \frac{\sqrt{\alpha}}{a} \neq \sqrt{\lambda_n} = \frac{\pi n}{l}$, то

$$u(x, t) = \frac{q_0}{kl} \left[\frac{a^2}{\alpha} \left(1 - \frac{l\sqrt{\alpha} \cos \frac{\sqrt{\alpha}(l-x)}{a}}{a \sin \frac{\sqrt{\alpha}l}{a}} e^{-\alpha t} \right) - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{\pi n x}{l} e^{-(\frac{\pi n a}{l})^2 t}}{\lambda_n - \frac{\alpha}{a^2}} \right];$$

если $0 < \frac{\sqrt{\alpha}}{a} = \sqrt{\lambda_{n_0}}$, то

$$u(x, t) = \frac{q_0 a^2}{2kl\alpha} \left[\left(1 + 4\alpha t \right) \cos \frac{\sqrt{\alpha}x}{a} - \frac{2(l-x)\sqrt{\alpha}}{a} \sin \frac{\sqrt{\alpha}x}{a} \right] e^{-\alpha t} - \frac{4\alpha}{a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{\cos \frac{\pi n x}{l} e^{-(\frac{\pi n a}{l})^2 t}}{\lambda_n - \frac{\alpha}{a^2}}.$$

$$\mathbf{2.430.} \quad u(x, t) = \frac{Ahl^3}{(p+1)a^2} \left(\frac{a^2 x t}{l^3} + \frac{x^3}{6l^3} - \frac{(p+3)x}{6(p+1)l} - 2(p+1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \sin \frac{\mu_n x}{l} e^{-(\frac{\mu_n a}{l})^2 t}}{\mu_n^2 (\mu_n^2 + p^2 + p)} \right)$$

$h = \frac{\alpha}{k}$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{ctg} \mu = -p$, $p = hl$, α — коэффициент теплообмена.

$$\mathbf{2.431.} \quad u(x, t) = u_0 \left[\frac{\operatorname{ch} \beta(l-x) - \operatorname{ch} \beta x}{\beta l \operatorname{sh} \beta l} + \frac{x}{l} - \frac{1}{2} e^{-\beta t} \right] + \frac{\gamma^2 u_0}{\pi^2} \sum_0^{\infty} \frac{\cos \sqrt{\lambda_{2n+1}} x e^{-(\lambda_{2n+1} D + \beta) t}}{(2n+1)^2 [(2n+1)^2 + \gamma^2]}$$

$\beta = \frac{\alpha P}{S}$, $\gamma^2 = \frac{\alpha P l^2}{\pi^2 D S}$, $\sqrt{\lambda_{2n+1}} = \frac{(2n+1)\pi}{l}$, S — площадь, P — периметр поперечного сечения трубки.

$$\mathbf{2.432.} \quad u(x, t) = \frac{Ax(l-x)}{2a^2} \left(t + \frac{x^2 - lx - l^2}{12a^2} \right) + \frac{4Al^4}{\pi^5 a^4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} e^{-(\frac{(2n+1)\pi a}{l})^2 t}}{(2n+1)^5}.$$

$$\mathbf{2.433.} \quad u(x, t) = \frac{Ax(2l-x)}{2a^2} \left(t + \frac{x^2 - 2lx - 4l^2}{12a^2} \right) + \frac{64Al^4}{\pi^5 a^4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} e^{-(\frac{(2n+1)\pi a}{2l})^2 t}}{(2n+1)^5}.$$

$$\mathbf{2.434.} \quad u(x, t) = \frac{Ax(l^2 - x^2)}{6a^2} \left(t - \frac{7l^2 - 3x^2}{6a^2} \right) - \frac{2Al^5}{\pi^5 a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{\pi n x}{l} e^{-(\frac{\pi n a}{l})^2 t}}{n^5}.$$

$$\mathbf{2.435.} \quad u(x, t) = \frac{A}{h} \left(1 - \frac{\operatorname{ch} \alpha x}{\operatorname{ch} \alpha l} \right) t + \frac{A}{2h\alpha^2 \operatorname{ch} \alpha l} [(2 + \alpha l \operatorname{th} \alpha l) \operatorname{ch} \alpha x - \alpha x \operatorname{sh} \alpha x - 2 \operatorname{ch} \alpha l] + \frac{4Ale^{-ht}}{\pi a^4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l} e^{-(\frac{(2n+1)\pi a}{2l})^2 t}}{(2n+1) \left(\frac{(2n+1)^2 \pi^2}{4l^2} + \alpha^2 \right)}, \quad \alpha = \frac{\sqrt{h}}{a}.$$

$$2.436. u(x, t) = \int_0^t f(\tau) d\tau.$$

$$2.437. u(x, t) = \frac{Alt^2}{4} - \frac{A}{24a^2}(4x^3 - 6lx^2 + l^3)t - \\ - \frac{A}{240a^4}(2x^5 - 5lx^4 + 5l^3x^2 - l^5) + \frac{4Al^5}{\pi^6 a^4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi x}{l} e^{-\left(\frac{(2n+1)\pi a}{l}\right)^2 t}}{(2n+1)^6}.$$

$$2.438. u(x, t) = \frac{Aa^2 t^3}{3l} + \frac{A}{6l}(3x^2 - l^2)t^2 + \frac{A}{180a^2 l}(15x^4 - 30l^2 x^2 + 7l^4)t + \\ + \frac{Ax^2}{360a^4 l}(x^4 - 5x^2 l^2 + 7l^4) - \frac{31Al^5}{7560a^4} - \frac{4Al^5}{\pi^6 a^4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos \frac{\pi n x}{l} e^{-\left(\frac{\pi n a}{l}\right)^2 t}}{n^6}.$$

$$2.439. u(x, t) = tf(x) + g(x) + \frac{C_1 t^2}{2} + C_2 t + C_0 + \\ + \frac{2\alpha a A}{a^4 l^4} e^{-\frac{\alpha x}{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n n \left(\frac{\pi n}{l} \cos \frac{\pi n x}{l} + \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\pi n x}{l} \right) e^{-a^2 \lambda_n t}}{\left[\left(\frac{\pi n}{l} \right)^2 + \left(\frac{\alpha}{2} \right)^2 \right]^4}, \\ f(x) = \frac{Al}{\alpha a^2} \left[\frac{\alpha x + e^{-\alpha x}}{e^{\alpha l} - 1} + \frac{(\alpha x + 1)e^{-\alpha x}}{\alpha l} \right], \\ g(x) = \frac{Al}{\alpha^3 a^4} \left[\frac{\alpha x - 1 + \alpha x e^{-\alpha x}}{e^{\alpha l} - 1} - \left(\frac{\alpha x^2}{2l} + \frac{2x}{l} + \frac{2}{\alpha l} \right) e^{-\alpha x} \right] + \frac{C_2 x}{\alpha a^2} - \frac{C e^{-\alpha x}}{\alpha a^2}, \\ h(x) = \int g e^{\alpha x} dx = \frac{Al}{\alpha^4 a^4} \left[\frac{(\alpha x - 2)e^{\alpha x} + \frac{\alpha^2 x^2}{2}}{e^{\alpha l} - 1} - \frac{x \left(\frac{\alpha^2 x^2}{6} + \alpha x + 2 \right)}{l} \right] - \\ - \frac{C_2(\alpha x + 1)e^{-\alpha x}}{\alpha^3 a^2} - \frac{Cx}{\alpha a^2}, \quad C_1 = \frac{\alpha l A}{e^{\alpha l} - 1}, \quad C_2 = \frac{Al^2(3e^{\alpha l} + 1)}{2a^2(e^{\alpha l} - 1)^2}, \\ C = \frac{Al}{\alpha^2 a^2(e^{\alpha l} - 1)} \left[\frac{\alpha l(3e^{\alpha l} + 1)}{2(e^{\alpha l} - 1)} + 1 \right], \quad C_0 = \frac{\alpha(h(l) - h(0))}{e^{\alpha l} - 1}, \\ c_n = 1 - (-1)^n e^{-\frac{\alpha l}{2}}, \quad \lambda_n = \left(\frac{\pi n}{l} \right)^2 + \left(\frac{\alpha}{2} \right)^2.$$

Решение (фрагменты). Математическая структура задачи определяется линейным дифференциальным оператором

$$\mathcal{L} = -e^{-\alpha x} \frac{\partial}{\partial x} e^{\alpha x} \frac{\partial}{\partial x},$$

область определения которого

$$\mathcal{M}_{\mathcal{L}} = \{f: f \in C^2(0; l) \cap C^1[0; l], f'(0) = f'(l) = 0\}.$$

Действительно, задачу можно представить в виде

$$u_t = -a^2 \mathcal{L}u + Ate^{-\alpha x}, \quad u \in \mathcal{M}_{\mathcal{L}}, \quad u(x, 0) = 0.$$

Квадратичная форма

$$(\mathcal{L}f, f) = \int_0^l \mathcal{L}f f e^{\alpha x} dx = - \int_0^l \overline{\frac{d}{dx} (e^{\alpha x} \frac{df}{dx})} f dx = -f \overline{f'} e^{\alpha x} \Big|_0^l + \int_0^l e^{\alpha x} |f'|^2 dx \geq 0.$$

неотрицательна, стало быть, оператор положителен (следовательно, эрмитов), его собственные значения неотрицательны, а собственные функции,

принадлежащие разным собственным значениям, ортогональны на промежутке $(0; l)$ с весом $\rho(x) = e^{\alpha x}$.

Построение решения уравнения, удовлетворяющего граничным условиям. Посредством замены $u(x, t) = v(x, t) + tf(x)$ уравнение

$$v_t + f = -a^2 \mathcal{L}v - a^2 \mathcal{L}f + Ate^{-\alpha x}$$

упрощается, если потребовать, чтобы

$$-a^2 \mathcal{L}f + Ate^{-\alpha x} = C_1, \quad f'(0) = f'(l) = 0;$$

константа C_1 введена для сохранения однородности граничных условий. Замена $v(x, t) = w(x, t) + \frac{C_1 t^2}{2}$ преобразует исходную задачу с нестационарной неоднородностью в задачу со стационарной неоднородностью

$$\begin{aligned} w_t &= -a^2 \mathcal{L}w - f, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ w_x(0, t) &= w_x(l, t) = w(x, 0\infty) = 0. \end{aligned}$$

Далее повторяется предыдущая процедура. Последовательными заменами $w(x, t) = U(x, t) + g(x)$, где $g(x)$ — решение задачи

$$-a^2 \mathcal{L}g - f = C_2, \quad g'(0) = g'(l) = 0$$

и $U(x, t) = V(x, t) + C_2 t$, для функции $V(x, t)$ получается однородная задача

$$\begin{aligned} V_t &= -a^2 \mathcal{L}V, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ V_x(0, t) &= V_x(l, t) = 0, \quad V(x, 0) = -g(x), \end{aligned}$$

при этом

$$u(x, t) = tf(x) + \frac{C_1 t^2}{2} + g(x) + C_2 t + V(x, t).$$

Теперь применим метод разделения переменных (см. пример 2.1) — средство построения счетного множества решений вида $u_n(x, t) = X(x)T(t)$, $n \in \mathbb{N}_0$, каждое из которых удовлетворяет однородным условиям. В данном случае $X_n(x)$ — собственная функция задачи

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} e^{\alpha x} \frac{dX}{dx} + \lambda e^{-\alpha x} X &= 0, \quad 0 < x < l, \\ X'(0) &= X'(l) = 0, \end{aligned}$$

решение которой

$$\begin{cases} \lambda_0 = 0, & X_0(x) = 1, \\ \lambda_n = \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 + \left(\frac{\alpha}{2}\right)^2, & X_n(x) = \left(\frac{\pi n}{l} \cos \frac{\pi n x}{l} + \left(\frac{\alpha}{2}\right)^2 \sin \frac{\pi n x}{l}\right) e^{-\frac{\alpha l}{2}}, \quad n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Функция $T_n(t)$ удовлетворяет уравнению

$$T_n'' + a^2 \lambda_n T_n = 0 \implies T_n(t) = C_n e^{-a^2 \lambda_n t}.$$

Таким образом,

$$V(x, t) = C_0 X_0(x) + \sum_{n=1}^{\infty} C_n X_n(x) e^{-a^2 \lambda_n t}.$$

При $t = 0$

$$-g(x) = C_0 X_0(x) + \sum_{n=1}^{\infty} C_n X_n(x),$$

откуда

$$C_0 = -\frac{(g, X_0)}{\|X_0\|^2} = -\frac{\int_0^l g X_0 e^{\alpha x} dx}{\int_0^l X_0^2 e^{\alpha x} dx} = -\frac{\int_0^l g e^{\alpha x} dx}{\int_0^l e^{\alpha x} dx},$$

$$C_n = -\frac{(g, X_n)}{\|X_n\|^2}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Так как функции $f(x)$ и $g(x)$ принадлежат области определения эрмитова оператора $\mathcal{L}$ и $\mathcal{L}X_n = \lambda_n X_n$, то

$$\begin{aligned} (g, X_n) &= \frac{1}{\lambda_n} (g, \mathcal{L}X_n) = \frac{1}{\lambda_n} (\mathcal{L}g, X_n) = -\frac{1}{\lambda_n} \left(\frac{f}{a^2} + \frac{C_2}{a^2}, X_n \right) = \\ &= -\frac{1}{a^2 \lambda_n} (f, X_n) = -\frac{1}{a^2 \lambda_n^2} (f, \mathcal{L}X_n) = -\frac{1}{a^2 \lambda_n^2} (\mathcal{L}f, X_n) = \\ &= -\frac{1}{a^2 \lambda_n^2} \left(\frac{A}{a^2} e^{-\alpha x} - \frac{C_1}{a^2}, X_n \right) = -\frac{A}{a^4 \lambda_n^2} (e^{-\alpha x}, X_n) = -\frac{A}{a^4 \lambda_n^3} (e^{-\alpha x}, \mathcal{L}X_n) = \\ &= \frac{A}{a^4 \lambda_n^3} \int_0^l e^{-\alpha x} \frac{d}{dx} e^{-\alpha x} \frac{dX_n}{dx} dx = \frac{A}{a^4 \lambda_n^3} (e^{-\alpha x} e^{\alpha x} X_n'|_0^l + \alpha \int_0^l X_n' dx) = \text{и т. д.} \end{aligned}$$

Интегралы

$$(C_{1,2}, X_n) = C_{1,2}(1, X_n) = C_{1,2}(X_0, X_n) = 0$$

в силу ортогональности собственных функций.

$$\begin{aligned} \mathbf{2.440.} \quad u(x, t) &= t f(x) + g(x) + \frac{C_1 t^2}{2} + C_2 t + C_0 + \\ &+ \frac{2\pi A}{a^4 l^2} e^{-\frac{\alpha(l-x)}{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n \left(\frac{\pi n}{l} \cos \frac{\pi n x}{l} + \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\pi n x}{l} \right) e^{-a^2 \lambda_n t}}{\left[\left(\frac{\pi n}{l} \right)^2 + \left(\frac{\alpha}{2} \right)^2 \right]^3}, \\ f(x) &= \frac{A(\alpha x + e^{-\alpha x})}{\alpha(1 - e^{-\alpha l})}, \quad g(x) = \frac{A \left[\frac{\alpha^2 x^2}{2} - \alpha x - (\alpha x + 1) e^{-\alpha x} \right]}{\alpha^3 a^2 (1 - e^{-\alpha l})} + \frac{C_2 x}{\alpha a^2} - \frac{C e^{-\alpha x}}{\alpha a^2}, \\ h(x) &= \int g e^{\alpha x} dx = \frac{A \left[\left(\frac{\alpha^2 x^2}{2} - 2\alpha x + 2 \right) e^{\alpha x} - \frac{\alpha^2 x^2}{2} - \alpha x \right]}{\alpha^4 a^2 (1 - e^{-\alpha l})} - \\ &- \frac{C_2 (\alpha x - 1) e^{-\alpha x}}{\alpha^2 a^2} - \frac{C x}{\alpha a^2}, \\ C_1 &= \frac{\alpha a^2 A}{1 - e^{-\alpha l}}, \quad C_2 = -\frac{A[(\alpha l + 1)e^{-\alpha l} + \alpha l - 1]}{\alpha(1 - e^{-\alpha l})^2}, \\ C &= \frac{A[\alpha l + (\alpha l + 1)e^{-\alpha l}]}{\alpha^2 (1 - e^{-\alpha l})^2}, \quad C_0 = \frac{\alpha[h(l) - h(0)]}{e^{\alpha l} - 1}, \quad \lambda_n = \left(\frac{\pi n}{l} \right)^2 + \left(\frac{\alpha}{2} \right)^2. \end{aligned}$$

$$\mathbf{2.441.} \quad u(r, t) = \frac{A r_0^3}{a^2 r} \left[\frac{a^2 t}{r_0^2} + \frac{r^2}{2 r_0^2} - \frac{1}{2} + \frac{4}{\pi^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi r}{r_0} e^{-\left(\frac{(2n+1)\pi a}{r_0} \right)^2 t}}{(2n+1)^3} \right].$$

2.442. Если $\frac{\sqrt{\alpha}}{a} \neq \sqrt{\lambda_n} = \frac{\pi n}{r_0}$, то

$$u(x, t) = \frac{u_0 r_0}{r} \left[\frac{\sin \frac{\sqrt{\alpha} r}{a}}{\sin \frac{\sqrt{\alpha} r_0}{a}} e^{-\alpha t} + \frac{2}{r_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\lambda_n} \sin \sqrt{\lambda_n} r e^{-a^2 \lambda_n t}}{\lambda_n - \frac{\alpha}{a^2}} \right];$$

если $\frac{\sqrt{\alpha}}{a} = \sqrt{\lambda_{n_0}}$, то

$$u(x, t) = \frac{u_0}{\cos \frac{\sqrt{\alpha} r_0}{a}} \left[\cos \frac{\sqrt{\alpha} r}{a} + \left(\frac{a}{2\sqrt{\alpha}} - 2\sqrt{\alpha} at \right) \frac{\sin \frac{\sqrt{\alpha} r}{a}}{r} \right] e^{-\alpha t} + \frac{2u_0}{r} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\lambda_n} \sin \sqrt{\lambda_n} r e^{-a^2 \lambda_n t}}{\lambda_n - \frac{\alpha}{a^2}}.$$

2.443. $u(r, t) = \frac{A}{2kr_0} \left(\frac{r^4}{20a^2} - \frac{r_0^2 r^2}{10a^2} + r^2 t - \frac{3r_0^2 t}{5} + 3a^2 t^2 + \frac{27r_0^4}{700a^2} \right) + \frac{2Ar_0^4}{a^2 kr} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{1 + \mu_n^2} \sin \frac{\mu_n r}{r_0} e^{-\left(\frac{\mu_n a}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_n^5}$, μ_n — положительный корень уравнения $\operatorname{tg} \mu = \mu$.

2.444. При $\alpha = 0$ см. ответ к задаче 2.332.

Если $\sqrt{\alpha} r_0 \neq a\mu_n$, где $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\operatorname{tg} \mu = \mu$, то

$$u(r, t) = \frac{q_0 r_0^2}{kr} \left[\frac{\sin \frac{\sqrt{\alpha} r}{a} e^{-\alpha t}}{\frac{\sqrt{\alpha} r_0}{a} \cos \frac{\sqrt{\alpha} r_0}{a} - \sin \frac{\sqrt{\alpha} r_0}{a}} + \frac{3a^2 r}{\alpha r_0^3} \right] - \frac{2q_0 r_0^2}{kr} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\mu_n^2 + 1} \sin \frac{\mu_n r}{r_0} e^{-\left(\frac{\mu_n a}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_n \left(\mu_n^2 - \left(\frac{\sqrt{\alpha} r_0}{a} \right)^2 \right)};$$

если $0 < \frac{\sqrt{\alpha} r_0}{a} = \mu_{n_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{q_0 r_0^2}{kr} \left\{ \frac{a^2}{2\alpha r_0^2 \sin \frac{\sqrt{\alpha} r_0}{a}} \left[\left(1 + 4\alpha t \right) \sin \frac{\sqrt{\alpha} r}{a} - \frac{2r\sqrt{\alpha}}{a} \cos \frac{\sqrt{\alpha} r}{a} \right] + \frac{3a^2 r}{\alpha r_0^3} \right\} - \frac{2q_0 r_0^2}{kr} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\mu_n^2 + 1} \sin \frac{\mu_n r}{r_0} e^{-\left(\frac{\mu_n a}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_n \left(\mu_n^2 - \left(\frac{\sqrt{\alpha} r_0}{a} \right)^2 \right)}.$$

2.445. Если $hr_0 = 1$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{6a^2} \left[r^2 + 6a^2 t - 3r_0^2 + \frac{192r_0^3}{\pi^4 r} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{(2n+1)\pi r}{2r_0} e^{-\left(\frac{(2n+1)\pi a}{2r_0}\right)^2 t}}{(2n+1)^4} \right];$$

если $hr_0 \neq 1$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{6a^2} \left[r^2 + a^2 t - r_0^2 - \frac{2r_0}{h} + \frac{12hr_0^4}{r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \sin \frac{\mu_n r}{r_0} e^{-\left(\frac{\mu_n a}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_n^3 (\mu_n^2 + p^2 + p)} \right],$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{ctg} \mu = p$, $p = 1 - hr_0$.

$$2.446. u(r, t) = \frac{A}{r} \sin \frac{\pi n}{r_0} \cdot \begin{cases} \frac{e^{-\alpha t} - e^{-\alpha_n t}}{\alpha_n - \alpha}, & \alpha \neq \alpha_n = \left(\frac{\pi n}{r_0}\right)^2 D, \\ te^{-\alpha t}, & \alpha = \alpha_n. \end{cases}$$

$$2.447. u(r, t) = \frac{A}{r} \sin \frac{\pi n}{r_0} \cdot \begin{cases} \frac{e^{-\alpha t} - e^{-(\beta + \alpha_n t)}}{\beta + \alpha_n - \alpha}, & \alpha - \beta \neq \alpha_n = \left(\frac{\pi n}{r_0}\right)^2 D, \\ te^{-\alpha t}, & \alpha - \beta = \alpha_n. \end{cases}$$

$$2.448. \text{Если } \frac{\sqrt{\alpha}}{a} \neq \frac{(2n+1)\pi}{r_0}, \text{ то}$$

$$u(r, t) = \frac{2a^4 Q_0}{k\alpha^2 r_0 r} \left[\frac{\cos \frac{(2r-r_0)\sqrt{\alpha}}{2a}}{\cos \frac{\sqrt{\alpha} r_0}{2a}} - 1 - \frac{\alpha r_0 r}{2a^2} \left(1 - \frac{r}{r_0}\right) \right] e^{-\alpha t} - \frac{8Q_0 r_0}{k\pi^3 r} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi r}{r_0} e^{-\left(\frac{(2n+1)\pi a}{r_0}\right)^2 t}}{(2n+1)^3 \left[\frac{\pi^2 (2n+1)^2}{r_0^2} - \frac{\alpha}{a^2} \right]};$$

$$\text{если } \frac{\sqrt{\alpha}}{a} = \frac{(2n_0+1)\pi}{r_0}, \text{ то}$$

$$u(r, t) = \frac{2a^4 Q_0}{k\alpha^2 r_0 r} \left[\frac{2a}{r_0 \sqrt{\alpha}} (3 + \alpha t) \sin \frac{\sqrt{\alpha} r}{a} - 1 - \frac{\alpha r_0 r}{2a^2} \left(1 - \frac{r}{r_0}\right) + \left(1 - \frac{2r}{r_0}\right) \cos \frac{\sqrt{\alpha} r}{a} \right] e^{-\alpha t} - \frac{8Q_0 r_0}{k\pi^3 r} \sum_{\substack{n=0 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi r}{r_0} e^{-\left(\frac{(2n+1)\pi a}{r_0}\right)^2 t}}{(2n+1)^3 \left[\frac{\pi^2 (2n+1)^2}{r_0^2} - \frac{\alpha}{a^2} \right]}.$$

$$2.449. u(r, t) = \frac{A(r_0^2 - r^2)}{6a^2} \left(t - \frac{7r_0^2 - 3r^2}{60a^2} \right) - \frac{2Ar_0^5}{\pi^5 a^4 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{\pi n r}{r_0} e^{-\left(\frac{\pi n a}{r_0}\right)^2 t}}{n^5}.$$

$$2.450. u(r, t) = \frac{Aa^2 t^3}{r_0} + \frac{A}{10r_0} (5r^2 - 3r_0^2) t^2 + \frac{A}{700a^2 r_0} (35r^4 - 70r_0^2 r^2 + 27r_0^4) t + \frac{Ar^2}{4200a^4 r_0} (5r^4 - 21r_0^2 r^2 + 27r_0^4) - \frac{353Ar_0^5}{6300a^4} - \frac{4Ar_0^6}{a^4 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\mu_n^2 + 1}}{\mu_n^7} \sin \frac{\mu_n r}{r_0} \times e^{-\left(\frac{a\mu_n}{r_0}\right)^2 t}, \mu_n > 0 - \text{корень уравнения } \operatorname{tg} \mu = \mu.$$

$$2.451. u(r, t) = \frac{3Ar_0 a^2 t^2}{8a^2} - \frac{A}{2a^2} \left(\frac{r^3}{6} - \frac{r_0 r^2}{4} + \frac{r_0^3}{15} \right) t - \frac{Ar^2}{20a^4} \left(\frac{r^3}{18} - \frac{r_0 r^2}{8} + \frac{r_0^3}{9} \right) + \frac{29Ar_0^5}{11200a^4} + \frac{2Ar_0^6}{a^4 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{[(-1)^n (\mu_n + 2) - 2\sqrt{\mu_n^2 + 1}] \sqrt{\mu_n^2 + 1}}{\mu_n^9} \sin \frac{\mu_n r}{r_0} e^{-\left(\frac{a\mu_n}{r_0}\right)^2 t},$$

$$\mu_n > 0 - \text{корень уравнения } \operatorname{tg} \mu = \mu.$$

$$2.452. 1) u(r, t) = \frac{A}{6a^2} (r - r_1)(r_2 - r) \left(1 + \frac{r_1 + r_2}{r} \right) t + \frac{A(r_2 - r_1)^3}{\pi^4 a^3 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n r_2 - r_1}{n^4} \sin \frac{\pi n(r - r_1)}{r_2 - r_1} \sin \frac{\pi a n t}{r_2 - r_1};$$

$$2) u(r, t) = \frac{A}{6a^2} (r - r_1) \left(\frac{2r_2^3}{r_1 r} - r_1 - r \right) t + \frac{2A(r_2 - r_1)^3 r_1}{a^3 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n^2 + p^2}{\mu_n^2 + p^2 - p} \sin \frac{\mu_n(r - r_1)}{r_2 - r_1} \sin \frac{a\mu_n t}{r_2 - r_1},$$

$$\mu_n > 0 - \text{корень уравнения } p \operatorname{tg} \mu = \mu, p = 1 - r_1/r_2.$$

$$2.453. u(r, t) = \int_0^t (t - \tau) f(\tau) d\tau.$$

$$2.454. 1) u(r, t) = \frac{A(r - r_1)(r_2 - r)}{2a^2 r} t - \\ - \frac{4A(r_2 - r_1)^3}{\pi^4 a^3 r} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{\pi(2n+1)(r - r_1)}{r_2 - r_1} \sin \frac{a\pi(2n+1)t}{r_2 - r_1}}{(2n+1)^4}; \\ 2) u(r, t) = \frac{A(r - r_1)}{2a^2} \left(\frac{r_2^2}{r_1 r} - 1 \right) t + \frac{2A(r_2 - r_1)^3}{a^3 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n^2 + p^2}{\mu_n^4 (\mu_n^2 + p^2 - p)} \times \\ \times \left(\frac{(-1)^n p}{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}} - 1 \right) \sin \frac{\mu_n(r - r_1)}{r_2 - r_1} \sin \frac{a\mu_n t}{r_2 - r_1},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $p \operatorname{tg} \mu = \mu$, $p = 1 - \frac{r_1}{r_2}$;

$$3) u(r, t) = \frac{At^3}{3} + \frac{A}{2a^2} \left(\frac{2r^2}{13} - r - \frac{9}{13r} + \frac{1494}{845} \right) t + \\ + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{(9\mu_n^2 + 4)(\mu_n^2 + 4)}}{\mu_n^5 (9\mu_n^2 + 52)} \sin \frac{\mu_n(r - 1)}{2} \sin \frac{a\mu_n t}{2},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu = \left(1 + \frac{3\mu^2}{4}\right) \sin \mu$.

$$2.455. 1) u(r, t) = \frac{A(r - 4)(5 - r)(r^2 + 9r - 61)t}{12a^2 r} + \frac{2A}{\pi^4 a^3 r} \times \\ \times \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin \pi n(r - 4) \sin a\pi n t, \quad c_n = \left(25 - \frac{2}{\pi^2 n^2}\right) (-1)^n - 16 + \frac{2}{\pi^2 n^2}; \\ 2) u(r, t) = \frac{A(r - 1)(243 - r^3 - r^2 - r)}{12a^2 r} - \\ - \frac{512A}{a^3 r} \sum_{n=1}^{\infty} c_n \frac{9\mu_n^2 + 4}{9\mu_n^2 - 2} \frac{\sin \frac{\mu_n(r - 1)}{2} \sin \frac{a\mu_n t}{2}}{\mu_n^4}, \\ c_n = \frac{1}{2} - \frac{4}{\mu_n^2} + \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{9\mu_n^2 + 4}} \left(9 + \frac{8}{\mu_n^2}\right),$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $2 \operatorname{tg} \mu = 3 \cos \mu$;

$$3) u(r, t) = \frac{A}{a^2} \left(-\frac{r^3}{12} + \frac{65r^2}{152} + \frac{54}{19r} - \frac{5443}{2166} + \frac{65t^2}{152} \right) t + \\ + \frac{2A}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} c_n \frac{9\mu_n^2 + 1}{\mu_n^6 (36\mu_n^2 + 19)} R_n(r) \sin a\mu_n t, \\ c_n = 4 + \frac{2}{\mu_n^2} + (-1)^{n+1} \left(9 + \frac{2}{\mu_n^2} \sqrt{\frac{4\mu_n^2 + 1}{9\mu_n^2 + 1}} \right), \\ R_n(r) = \frac{1}{r} (\sin \mu_n(r - 2) + 2\mu_n \cos \mu_n(r - 2)),$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu = (1 + 6\mu^2) \sin \mu$.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.456.} \quad u(r, t) = & \frac{A}{a^2} \left(1 - \frac{r_2 \operatorname{sh} \frac{\alpha(r-r_1)}{a} + r_1 \operatorname{sh} \frac{\alpha(r_2-r)}{a}}{r \operatorname{sh} \frac{\alpha(r_2-r_1)}{a}} \right) + \\
 & + \frac{2A}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} c_n \frac{\alpha \sin \omega_n t - \omega_n \cos \omega_n t}{\omega_n (\omega_n^2 + a^2)} \sin \frac{\pi n(r-r_1)}{r_2-r_1}, \quad c_n = (-1)^{n+1} r_2 + r_1, \\
 & \omega_n = \frac{a \pi n}{r_2-r_1}.
 \end{aligned}$$

2.457. Если $\omega \neq \omega_n = \frac{\pi n a}{d}$, $d = r_2 - r_1$, то

$$\begin{aligned}
 u(r, t) = & \frac{A}{a^2} \left(\frac{r_2 \sin \frac{\omega(r-r_1)}{a} + r_1 \sin \frac{\omega(r_2-r)}{a}}{r \sin \frac{\omega(r_2-r_1)}{a}} - 1 \right) \sin \omega t + \\
 & + \frac{2\omega a d}{\pi^2 a r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r_2 (-1)^n - r_1}{n^2 (\omega_n^2 - \omega^2)} \sin \frac{\pi n(r-r_1)}{d} \sin \omega_n t;
 \end{aligned}$$

если $\omega = \omega_{n_0}$, то

$$\begin{aligned}
 u(r, t) = & \frac{A a (-1)^{n_0}}{d \omega^2 r} \left[\left(r_2 \sin \frac{\omega(r-r_1)}{a} + r_1 \sin \frac{\omega(r_2-r)}{a} \right) t \cos \omega t + \right. \\
 & + \left((-1)^{n_0+1} \frac{dr}{a} + \frac{r_2}{a} (r-r_1) \cos \frac{\omega(r-r_1)}{a} + \frac{r_1}{a} (r_2-r) \cos \frac{\omega(r_2-r)}{a} - \right. \\
 & \left. \left. - \frac{5}{2\omega} \left(r_2 \sin \frac{\omega(r-r_1)}{a} + r_1 \sin \frac{\omega(r_2-r)}{a} \right) \right) \sin \omega t \right] + \\
 & + \frac{2\omega a d}{\pi^2 a r} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{r_2 (-1)^n - r_1}{n^2 (\omega_n^2 - \omega^2)} \sin \frac{\pi n(r-r_1)}{d} \sin \omega_n t.
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{2.458.} \quad 1) \quad u(r, t) = \frac{A r_1 r_2}{r_2 - r_1} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_1} \right) t - \frac{2A(r_2-r_1)r_1}{\pi^2 a r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{\pi n(r-r_1)}{r_2-r_1} \sin \frac{a \pi n t}{r_2-r_1};$$

$$\begin{aligned}
 2) \quad u(r, t) = & \frac{A r_1^2}{r_2} \left(1 - \frac{r_2}{r} \right) + \\
 & + \frac{2A(r_2-r_1)r_1}{r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)} \sin \frac{\mu_n(r_2-r)}{r_2-r_1} \sin \frac{a \mu_n t}{r_2-r_1},
 \end{aligned}$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $p \operatorname{tg} \mu = -\mu$, $p = \frac{r_2}{r_1} - 1$;

$$3) \quad u(r, t) = A t - \frac{2A r_1 (r_2-r_1)}{a r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n^2 + p^2}{\mu_n^2 (\mu_n^2 + p^2 - p)} \sin \frac{\mu_n(r-r_1)}{r_2-r_1} \sin \frac{a \mu_n t}{r_2-r_1},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $p \operatorname{tg} \mu = \mu$, $p = 1 - \frac{r_1}{r_2}$;

$$4) \quad u(r, t) = -\frac{3A a^2 t^2}{14} - \frac{A}{7} \left(\frac{r^2}{2} + \frac{8}{r} \right) + \frac{2A}{r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4\mu_n^2 + 1}{\mu_n^3 (\mu_n^2 + 7)} R_n(r) \sin a \mu_n t,$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu = (1 + 2\mu^2) \sin \mu$,
 $R_n(r) = \frac{1}{r} (\sin \mu_n(r-1) + \mu_n \cos \mu_n(r-1)).$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.459.} \quad u(r, t) = & \frac{A r_1 \operatorname{sh} \frac{\alpha(r_2-r)}{a}}{r \operatorname{sh} \frac{a}{d}} e^{-\alpha t} + \\
 & + \frac{2A a r_1}{d r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\omega_n}{\omega_n^2 + \alpha^2} \left(\frac{\alpha}{\omega_n} \sin \omega_n t - \cos \omega_n t \right) \sin \frac{\pi n(r-r_1)}{d}, \\
 & d = r_2 - r_1, \quad \omega_n = \frac{a \pi n}{d}.
 \end{aligned}$$

2.460. Если $\omega \neq \omega_n = \frac{\pi n a}{d}$, $d = r_2 - r_1$, то

$$u(r, t) = \frac{Ar_1 \sin \frac{\omega(r_2 - r)}{a}}{\sin \frac{\omega d}{a}} \sin \omega t + \frac{2Aa\omega r_1}{dr} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{\pi n(r - r_1)}{d} \sin \frac{\pi a n t}{d}}{\omega_n^2 - \omega^2};$$

если $\omega = \omega_{n_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{Ar_1 a}{dr} (-1)^{n_0} \left[\left(\frac{r_2 - r}{a} \cos \frac{\omega(r_2 - r)}{a} - \frac{1}{2\omega} \sin \frac{\omega(r_2 - r)}{a} \right) \sin \omega t + \right. \\ \left. + \sin \frac{\omega(r_2 - r)}{a} t \cos \omega t \right] + \frac{2Aa\omega r_1}{dr} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{\pi n(r - r_1)}{d} \sin \frac{\pi a n t}{d}}{\omega_n^2 - \omega^2}.$$

$$\mathbf{2.461.} \quad u(r, t) = \frac{A}{r} \sin \frac{\pi n(r - r_1)}{r_2 - r_1} \cdot \begin{cases} \frac{\omega_n \sin \omega t - \omega \sin \omega_n t}{\omega_n(\omega^2 - \omega_n^2)}, & \omega \neq \omega_n = \left(\frac{a\pi n}{r_2 - r_1} \right)^2, \\ \frac{\omega t \cos \omega t - \sin \omega t}{2\omega^2}, & \omega = \omega_n. \end{cases}$$

$$\mathbf{2.462.} \quad u(x, t) = \frac{F_0}{\rho} \sin \frac{\pi x}{l} \cos \frac{3\pi y}{4l} \cdot \begin{cases} \frac{(\omega_0 \sin \omega t - \omega \sin \omega_0 t)}{\omega_0(\omega_0^2 - \omega^2)}, & \omega \neq \omega_0 = \frac{5\pi a}{l}, \\ \frac{(\sin \omega t - \omega t \cos \omega t)}{2\omega^2}, & \omega = \omega_0. \end{cases}$$

$$\mathbf{2.463.} \quad u(x, t) = \frac{F_0}{\rho\omega_0} \sin \frac{3\pi x}{l} \cos \frac{4\pi y}{l} \cdot \begin{cases} \frac{(\omega_0 \sin \omega t - \omega \sin \omega_0 t)}{\omega_0(\omega_0^2 - \omega^2)}, & \omega \neq \omega_0 = \frac{5\pi a}{2l}, \\ \frac{(\sin \omega t - \omega t \cos \omega t)}{2\omega^2}, & \omega = \omega_0. \end{cases}$$

$$\mathbf{2.464.} \quad 1) \quad u(r, t) = \frac{A}{6a^2} (r - 1)(2 - r) \left(1 + \frac{3}{r} \right) t - \\ - \frac{A}{120a^2} (r - 1)(2 - r) (r^2 + 3r - \frac{49}{3} + \frac{5}{r}) + \\ + \frac{2A}{a^4 \pi^5 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1} + 1}{n^5} \sin \pi n(r - 1) e^{-(a\pi n)^2 t};$$

$$2) \quad u(r, t) = \frac{A(r - 1)(2 - r)(16 - r - r^2)}{6a^2 r} t - \\ - \frac{A(r - 1)3r^4 + 3r^3 - 167r^2 + 313r + 416}{360a^4 r} + \\ + \frac{2A}{a^4 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4\mu_n^2 - 1}{\mu_n^5 (4\mu_n^2 + 2)} \sin \mu_n(r - 1) e^{-a^2 \mu_n^2 t},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\operatorname{tg} \mu = 2\mu$;

$$3) \quad u(r, t) = -\frac{A}{6a^2 r} (2 - r)(r^2 + 2r - 1)t - \frac{A}{720a^4 r} (r - 2)(5r^4 + \\ + 10r^3 - 80r^2 - 40r + 28) + \frac{4A}{a^4 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n^2 + 1}{\mu_n^5 (\mu_n^2 + 2)} \sin \mu_n(2 - r) e^{-a^2 \mu_n^2 t},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\operatorname{tg} \mu = -\mu$.

2.465. 1) $u(r, t) = \frac{A(r-1)(4-r)}{2a^2r}t - \frac{A(r-1)(4-r)(5-5r-5r^2)}{2a^4r} +$
 $+ \frac{324A}{a^4\pi^5} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(r-1)(4-r)}{3}}{(2n+1)^5} e^{-\left(\frac{a\pi(2n+1)}{3}\right)^2 t};$
 2) $u(r, t) = \frac{A(4-r)(r-1)}{2a^2r}t + \frac{A(4-r)(r^3-6r^2+4)}{24a^4r} -$
 $- \frac{32A}{a^4r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n^2+1}{\mu_n^5(\mu_n^2+2)} \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{\mu_n^2+1}}\right) \sin \frac{\mu_n(4-r)}{2} e^{-\left(\frac{a\mu_n}{2}\right)^2 t};$
 3) $u(r, t) = \frac{9A}{28}t^2 + \frac{A}{a^2} \left(\frac{3r^2}{28} - \frac{r}{2} - \frac{2}{7r} + \frac{1377}{1960}\right)t +$
 $+ \frac{A}{a^4} \left(\frac{3r^4}{560} - \frac{r^3}{24} + \frac{459r^2}{1960} - \frac{r}{7} - \frac{3}{250r} + \frac{9903}{137200}\right) +$
 $+ \frac{2A}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4\mu_n^2+1}{\mu_n^7(4\mu_n^2+7)} \left(1 + (-1)^{n+1} \sqrt{\frac{\mu_n^2+1}{4\mu_n^2+1}}\right) R_n(r) e^{-a^2\mu_n^2 t},$
 $R_n(r) = \frac{1}{r}(\sin \mu_n(r-1) + \mu_n \cos \mu_n(r-1)),$
 $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu = (1+2\mu^2) \sin \mu$.

2.466. 1) $u(r, t) = \frac{A(r-2)(3-r)}{12a^2r} \times$
 $\times \left[(r^2+5r-19)t + \frac{1}{3a^2}(r^4+5r^3+19r^2-26r+296) \right] +$
 $+ \frac{A}{\pi^3 a^4 r} \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin \pi n(r-2) e^{-a^2 \pi^2 n^2 t}, \quad c_n = (-1)^n \left[9 - \frac{2}{\pi^2 n^2} - 2 \left(2 - \frac{1}{\pi^2 n^2} \right) \right];$
 2) $u(r, t) = \frac{A(2-r)(2r^3+4r^2+8r-3)}{24a^2r}t +$
 $+ \frac{A(2-r)(r^5+2r^4+4r^3-30r^2-24r+18)}{288a^4r} +$
 $+ \frac{2A}{a^4} r \sum_{n=1}^{\infty} c_n \frac{\mu_n^2+1}{\mu_n^5(\mu_n^2+2)} \sin \mu_n(2-r) e^{-a^2\mu_n^2 t},$
 $c_n = 40\mu_n^2 + \frac{(-1)^n(\mu_n^2+2)}{\mu_n^2 \sqrt{\mu_n^2+1}},$
 $\mu_n > 0$ — корень уравнения $p \operatorname{tg} \mu = -\mu, \quad p = \frac{r_2}{r_1} - 1;$
 3) $u(r, t) = \frac{45A}{28a^2}t^2 - \frac{A}{a^2} \left(\frac{r^3}{12} - \frac{15r^2}{56} - \frac{2}{7r} - \frac{51}{98} \right)t -$
 $- \frac{A}{a^4} \left(\frac{r^5}{360} - \frac{3r^4}{224} + \frac{17r^2}{196} - \frac{r}{7} + \frac{7809}{109760} - \frac{4}{441r} \right) +$
 $+ \frac{2A}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} c_n \frac{4\mu_n^2+1}{\mu_n^7(4\mu_n^2+7)} R_n(r) e^{-a^2\mu_n^2 t},$
 $R_n(r) = \frac{1}{r}(\sin \mu_n(r-1) + \mu_n \cos \mu_n(r-1)),$
 $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu = (1+2\mu^2) \sin \mu,$
 $c_n = (-1)^n 2 \left(2 + \frac{1}{\mu_n^2} \right) \sqrt{\frac{\mu_n^2+1}{4\mu_n^2+1}} - 1 - \frac{2}{\mu_n^2}.$

$$2.467. u(r, t) = \frac{A}{r} \sin \frac{\pi n(r-r_1)}{r_2-r_1} \cdot \begin{cases} \frac{e^{-\alpha_n^2 t} - e^{-\alpha^2 t}}{\alpha^2 - \alpha_n^2}, & \alpha \neq \alpha_n = \frac{a\pi n}{r_2-r_1}, \\ te^{-\alpha^2 t}, & \alpha = \alpha_n. \end{cases}$$

$$2.468. u(r, t) = \frac{A}{r} \sin \frac{\pi n(r-r_1)}{r_2-r_1} \cdot \begin{cases} \frac{e^{-(\beta+\alpha_n^2)t} - e^{-\alpha^2 t}}{\alpha^2 - \beta - \alpha_n^2}, & \alpha - \beta \neq \alpha_n = \frac{\sqrt{D}\pi n}{r_2-r_1}, \\ te^{-\alpha^2 t}, & \alpha - \beta = \alpha_n. \end{cases}$$

2.469. Если $\alpha \neq a^2 \lambda_n = (\frac{a\pi n}{d})^2$, $d = r_2 - r_1$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{\alpha} \left(\frac{r_2 \sin \frac{\sqrt{\alpha}(r-r_1)}{a} + r_1 \sin \frac{\sqrt{\alpha}(r_2-r)}{a}}{r \sin \frac{\sqrt{\alpha}d}{a}} - 1 \right) e^{-\alpha t} + \\ + \frac{2A}{\pi r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r_2(-1)^n - r_1}{n(a^2 \lambda_n - \alpha)} \sin \frac{\pi n(r-r_1)}{d} e^{-(\frac{a\pi n}{d})^2 t};$$

если $\alpha = (\frac{a\pi n_0}{d})^2$, то

$$u(r, t) = (-1)^{n_0} \frac{A}{\alpha} \left[\frac{r_2(r-r_1)}{rd} \cos \frac{\sqrt{\alpha}(r-r_1)}{a} + \frac{r_1(r_2-r)}{rd} \cos \frac{\sqrt{\alpha}(r_2-r)}{a} - (-1)^{n_0} - \right. \\ \left. - \frac{a}{rd} \left(r_2 \sin \frac{\sqrt{\alpha}(r-r_1)}{a} + r_1 \sin \frac{\sqrt{\alpha}(r_2-r)}{a} \right) \left(\frac{2a\pi}{d} + \frac{3}{2\sqrt{\alpha}} \right) \right] e^{-\alpha t} + \\ + \frac{2A}{\pi r} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{r_2(-1)^n - r_1}{n(a^2 \lambda_n - \alpha)} \sin \frac{\pi n(r-r_1)}{d} e^{-(\frac{a\pi n}{d})^2 t}.$$

$$2.470. 1) u(r, t) = \frac{A(r_2-r)r_1}{(r_2-r_1)r} t + \frac{Ar_1(r-r_1)(r_2-r)(r+r_1-2r_2)}{6a^2(r_2-r_1)r} + \\ + \frac{2Ar_1(r_2-r_1)^2}{\pi^3 a^3 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \sin \frac{\pi n(r-r_1)}{r_2-r_1} e^{-(\frac{\pi a n}{r_2-r_1})^2 t}; \\ 2) u(r, t) = \frac{B(r_2-r)r_1^2}{kr_2 r} t - \frac{Br_1^2(r_2-r)(r_2 r^2 - r_2^2 r + 3r_1^2 r_2 - 2r_1^3)}{6ka^2 r_2^2 r} - \\ - \frac{2Br_1(r_2-r_1)^3}{ka^2 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\mu_n^2 + p^2}}{\mu_n^2(\mu_n^2 + p^2 + p)} \sin \frac{\mu_n(r-r_1)}{r_2-r_1} e^{-(\frac{a\mu_n}{r_2-r_1})^2 t},$$

$p = \frac{r_2}{r_1} - 1$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu = -p \sin \mu$;

$$3) u(r, t) = At + \frac{A(r-r_1)(r_1 r^2 + r_1^2 r_2 - 2r_2^3)}{6a^2 r_1 r} + \\ + \frac{2A(r_2-r_1)^3 r_1}{a^2 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n^2 + p^2}{\mu_n^3(\mu_n^2 + p^2 - p)} \sin \frac{\mu_n(r-r_1)}{r_2-r_1} e^{-(\frac{a\mu_n}{r_2-r_1})^2 t},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu = p \sin \mu$;

$$4) u(r, t) = \frac{3Ba^2}{14k} t^2 + \frac{B}{7k} \left(\frac{r^2}{2} + \frac{8}{r} - \frac{453}{70} \right) t + \\ + \frac{B}{7ka^2} \left(\frac{r^4}{40} - \frac{151r^2}{450} + 4r - \frac{49059}{9800} \right) + \frac{2B}{ka^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4\mu_n^2 + 1}{\mu_n^5(4\mu_n^2 + 7)} R_n(r) e^{-a^2 \mu_n^2 t},$$

$$R_n(r) = \frac{1}{r} (\sin \mu_n(r-1) + \mu_n \cos(r-1)),$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \cos \mu = (1 + 2\mu^2) \sin \mu$.

2.471. Если $\alpha \neq a^2 \lambda_n = \left(\frac{a\pi n}{d}\right)^2$, $d = r_2 - r_1$, то

$$u(r, t) = \frac{Ar_1 \sin \frac{\sqrt{\alpha}(r_2 - r)}{a}}{r \sin \frac{\sqrt{\alpha}d}{a}} e^{-\alpha t} - \frac{2A\pi a^2 r_1}{d^2 r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sin \frac{\pi n(r - r_1)}{d}}{\lambda_n a^2 - \alpha} e^{-a^2 \lambda_n t},$$

если $\alpha = \left(\frac{a\pi n_0}{d}\right)^2$, то

$$u(r, t) = (-1)^{n_0} \frac{Ar_1}{r} \left[\frac{a}{d} \left(\frac{1}{2\sqrt{\alpha}} - 2\pi\sqrt{\alpha}t \right) \sin \frac{\sqrt{\alpha}(r_2 - r)}{a} + \right. \\ \left. + \frac{r_2 - r}{d} \cos \frac{\sqrt{\alpha}(r_2 - r)}{a} \right] e^{-\alpha t} - \frac{2A\pi a^2 r_1}{d^2 r} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{n \sin \frac{\pi n(r - r_1)}{d}}{\lambda_n a^2 - \alpha} e^{-a^2 \lambda_n t}.$$

2.472.
$$u(x, t) = \frac{2lF_0}{\pi^2 T_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{n\pi x_0}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} \left(\cos \frac{n\pi}{l} a(t - t_0) - \cos \frac{n\pi}{l} at \right)}{n^2}.$$

2.473. Если $\omega \neq \omega_n$, то $u(x, t) = \frac{\omega F_0}{\rho_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n(x_0)X_n(x)}{\|X_n\|^2(\omega^2 - \omega_n^2)} \left(\frac{\sin \omega_n t}{\omega_n} - \frac{\sin \omega t}{\omega} \right);$

если $\omega = \omega_{n_0}$, то

$$u(x, t) = \frac{F_0 X_{n_0}(x_0)X_{n_0}(x)}{2\rho_0 \omega^2 \|X_{n_0}\|^2} (\sin \omega t - \omega t \cos \omega t) + \\ + \frac{\omega F_0}{\rho_0} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{X_n(x_0)X_n(x)}{\|X_n\|^2(\omega^2 - \omega_n^2)} \left(\frac{\sin \omega_n t}{\omega_n} - \frac{\sin \omega t}{\omega} \right),$$

$$X_n(x) = p_1 \sin \frac{\mu_n}{l} x + \mu_n \cos \frac{\mu_n}{l} x,$$

$$\|X_n\|^2 = \frac{l}{2} \frac{(\mu_n^2 + p_1^2)(\mu_n^2 + p_2^2) + (p_1 + p_2)(\mu_n^2 + p_1 p_2)}{\mu_n^2 + p_2^2},$$

$p_i = l h_i$, $i = 1, 2$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{ctg} \mu = \frac{\mu^2 - p_1 p_2}{p_1 + p_2}$, $\omega_n = \frac{\mu_n}{l} a$.
У к а з а н и е. Для вычисления нормы $\|X_n\|$ применить формулы (2.98), (2.99).

2.474. Если $\omega \neq \omega_n = \frac{\mu_n a}{l}$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$, $p = \frac{2\rho_0 l}{m}$,

то
$$u(x, t) = \frac{\omega F_0}{\rho_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n(0)X_n(x)}{\|X_n\|^2(\omega^2 - \omega_n^2)} \left(\frac{\sin \omega_n t}{\omega_n} - \frac{\sin \omega t}{\omega} \right);$$

если $\omega = \omega_{n_0}$, то

$$u(x, t) = \frac{F_0 X_{n_0}(0)X_{n_0}(x)}{2\rho_0 \omega^2 \|X_{n_0}\|^2} (\sin \omega t - \omega t \cos \omega t) + \\ + \frac{\omega F_0}{\rho_0} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{X_n(0)X_n(x)}{\|X_n\|^2(\omega^2 - \omega_n^2)} \left(\frac{\sin \omega_n t}{\omega_n} - \frac{\sin \omega t}{\omega} \right),$$

$$X_n(x) = \sin \mu_n \left(1 - \frac{|x|}{l} \right), \quad X_n(x) = \frac{(-1)^{n+1} p}{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}}, \quad \|X_n\|^2 = l \frac{\mu_n^2 + p^2 + p}{\mu_n^2 + p^2}.$$

2.475.
$$u(x, t) = \frac{2Q}{lC} e^{-\frac{Rt}{2L}} \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi x_0}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} \left(\cos \omega_n t + \frac{R}{2L} \frac{\sin \omega_n t}{\omega_n} \right),$$

$$\omega_n^2 = \left(\frac{n\pi a}{l} \right)^2 - \left(\frac{R}{2L} \right)^2.$$

$$2.476. \quad u(x, t) = \frac{4Ql^2}{k\pi^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \alpha_n x}{(2n+1)^3} e^{-(a\alpha_n)^2 t} \left(e^{(a\alpha_n)^2 t_0} - 1 \right), \quad \alpha_n = \frac{(2n+1)\pi}{l}.$$

$$2.477. \quad u(x, t) = \frac{8lQ_0}{\pi^2 kS} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} x_0 \sin \sqrt{\lambda_n} x}{(2n+1)^3} \times \\ \times \left[1 - e^{-a^2 \lambda_n t} - \left(1 - e^{-a^2 \lambda_n (t-t_0)} \right) \eta(t-t_0) \right], \quad \sqrt{\lambda_n} = \frac{(2n+1)\pi}{2l}.$$

$$2.478. \quad Q(t) = Q_0 \left[\frac{C_0}{lC} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\mu_n^2 + p^2}}{\mu_n^2 + p^2 + p} \cos \mu_n \left(1 - \frac{x_0}{l} \right) e^{-\left(\frac{a\mu_n}{l} \right)^2 t} \right], \\ \mu_n > 0 - \text{корень уравнения } \mu \operatorname{ctg} \mu = -p, \quad p = \frac{CL}{C_0}, \quad a^2 = \frac{1}{RC}.$$

$$2.479. \quad u(x, y, t) = \frac{64F_0}{\pi^4 l_1 l_2 T_0} \times \\ \times \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{m+n} \cos \frac{(2m+1)\pi x}{2l_1} \cos \frac{(2m+1)\pi y}{2l_2} \sin^2 \frac{\pi a}{4} \alpha_{mn} t}{(2m+1)(2n+1)\alpha_{mn}^2}, \\ \text{где } \alpha_{mn} = \sqrt{\left(\frac{(2m+1)}{l_1} \right)^2 + \left(\frac{(2n+1)}{l_2} \right)^2}.$$

$$2.480. \quad u(x, y, t) = \frac{2F_0}{\pi a \rho_0 \sqrt{l_1^2 + l_2^2}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\omega_n \sin \omega t - \omega \sin \omega_n t}{n(\omega_n^2 - \omega^2)} \sin \frac{n\pi x}{l_1} \sin \frac{n\pi y}{l_2}, \\ \omega_n = \frac{\sqrt{l_1^2 + l_2^2}}{l_1 l_2} \pi a n.$$

$$2.481. \quad u(x, y, t) = \frac{F_0}{2\rho l^2} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\omega_n \sin \omega t - \omega \sin \omega_n t}{\omega_n(\omega_n^2 - \omega^2)} \cos \frac{(2n+1)\pi y}{2l} + \right. \\ \left. + \frac{\sin \omega t - \omega t \cos \omega t}{2\omega^2} \cos \frac{9\pi y}{2l} \right] \sin \frac{6\pi x}{l}, \quad \omega_n = \frac{\pi a}{2l} \sqrt{(2n+1)^2 + 144}, \\ \omega = \frac{15\pi a}{2l}.$$

$$2.482. \quad 1) u_{rez} = \frac{F_0}{3\pi\rho\omega^3 l^2} \cos \frac{3\pi x}{2l} \cos \frac{3\pi y}{2l} t \cos \omega t; \\ 2) u_{rez} = \frac{F_0}{3\pi\rho\omega^3 l^2} \left(\frac{1}{3} \cos \frac{3\pi x}{2l} \cos \frac{9\pi y}{2l} - \cos \frac{9\pi x}{2l} \cos \frac{3\pi y}{2l} \right) t \cos \omega t; \\ 3) u_{rez} = \frac{F_0}{\pi\rho\omega^3 l^2} \left(\frac{1}{3} \cos \frac{3\pi x}{2l} \cos \frac{\pi y}{2l} - \cos \frac{\pi x}{2l} \cos \frac{3\pi y}{2l} \right) t \cos \omega t; \\ 4) u_{rez} = \frac{F_0}{\pi\rho\omega^3 l^2} \left(\frac{1}{7} \cos \frac{7\pi x}{2l} \cos \frac{\pi y}{2l} - \cos \frac{\pi x}{2l} \cos \frac{7\pi y}{2l} - \right. \\ \left. - \frac{1}{5} \cos \frac{5\pi x}{2l} \cos \frac{5\pi y}{2l} \right) t \cos \omega t; \quad H(\xi) = \xi \cos \xi - \sin \xi.$$

$$2.483. \quad u_{rez} = \frac{F_0}{6\pi\rho\omega^3 l^2} \cos \frac{\pi x}{4l} \sin \frac{\pi}{4} (y-l) t \cos \omega t.$$

$$2.484. \quad u(x, y, t) = \frac{1}{\rho\omega^3} \left(A \cos \frac{9\pi x}{2l} \cos \frac{6\pi y}{l} + B \cos \frac{15\pi x}{2l} \right) t \cos \omega t, \\ \text{где } \omega = \frac{15\pi a}{2l}.$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.485.} \quad u(x, y, t) &= \frac{Q_0}{kl_1 l_2} a^2 [t - (t - t_0) \eta(t - t_0)] + \\
 &+ \frac{Q_0}{kl_1 l_2} \sum_{m+n>0} \frac{\cos \frac{m\pi x}{l_1} \cos \frac{n\pi y}{l_2}}{\alpha_{mn}} \left[1 - e^{-a^2 \alpha_{mn} t} - \left(1 - e^{-a^2 \alpha_{mn} (t-t_0)} \right) \eta(t - t_0) \right], \\
 \alpha_{mn} &= \pi^2 \left[\left(\frac{m}{l_1} \right)^2 + \left(\frac{n}{l_2} \right)^2 \right].
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{2.486.} \quad u(x, y) = \frac{2F_0 l_1 l_2}{\pi^2 T_0 (l_1^2 + l_2^2)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{n\pi x}{l_1} \sin \frac{n\pi y}{l_2}, \quad u\left(\frac{l_1}{2}, \frac{l_2}{2}\right) = \frac{l_1 l_2 F_0}{4(l_1^2 + l_2^2) T_0}.$$

$$\mathbf{2.487.} \quad 1) \quad u(r, \varphi) = \frac{p_0 r}{\pi T_0} \left\{ \ln \frac{r_0}{r} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)} \left[1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2n} \right] \sin(2n+1)\varphi \right\};$$

$$2) \quad u(r, \varphi) = \frac{2p_0 r^2}{\pi r_0 T_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-1)(2n+3)} \left[\left(1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2n-1} \right) \sin(2n+1)\varphi \right].$$

$$\mathbf{2.488.} \quad \sigma(\varphi) = -\frac{q}{2\pi r_0} \cdot \frac{|r_0^2 - r_1^2|}{r_0^2 + r_1^2 - 2r_0 r_1 \cos \varphi}.$$

$$\mathbf{2.489.} \quad \sigma(\varphi) = \frac{q}{2\pi r_0} \left(1 - \frac{|r_0^2 - r_1^2|}{r_0^2 + r_1^2 - 2r_0 r_1 \cos \varphi} \right).$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.490.} \quad \mathbf{A}(r, \varphi) &= \frac{2J}{c} \left(\ln \frac{1}{\sqrt{r^2 + d^2 - 2rd \cos \varphi}} + \ln \frac{1}{\sqrt{r^2 + d_1^2 - 2rd_1 \cos \varphi}} - \right. \\
 &\left. - \ln \frac{1}{r} + C \right) \mathbf{e}_z, \quad d_1 = \frac{r_0^2}{d}.
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{2.491.} \quad \mathbf{A}(r, \varphi) = \left(\frac{4\mu J}{(\mu+1)c} \ln \frac{1}{\sqrt{r_1^2 + r^2 - 2r_1 r \cos \varphi}} + C \right) \mathbf{e}_z.$$

$$\mathbf{2.492.} \quad \mathbf{F} = 4p^2 \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 1} \frac{r_1 r_0^2}{(r_0^2 - r_1^2)^3} \frac{\mathbf{r}_1}{r_1}.$$

$$\mathbf{2.493.} \quad u(z, \varphi) = \frac{I}{4\pi\sigma} \ln \frac{\operatorname{ch} \frac{z}{r_0} - \cos(\varphi + \varphi_0)}{\operatorname{ch} \frac{z}{r_0} - \cos(\varphi - \varphi_0)} + C, \quad \text{плотность тока определяется}$$

формулой (1.168).

$$\mathbf{2.494.} \quad 1) \quad u_0 = \frac{F_0 r_0^2}{18\pi D};$$

$$2) \quad u_0 = \frac{F_0 r_0^2}{18\pi D} \frac{4 + \sigma r_0}{1 + \sigma r_0}.$$

$$\mathbf{2.495.} \quad 1) \quad u_0 = \frac{p_0 r_0^3}{64\pi D};$$

$$2) \quad u_0 = \frac{p_0 r_0^3}{64\pi D} \frac{5 + \sigma r_0}{1 + \sigma r_0}.$$

$$\mathbf{2.496.} \quad u(x, y) = \frac{2F_0 l_1^3 l_2^3}{\pi^4 D (l_1^2 + l_2^2)^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} \sin \frac{n\pi x}{l_1} \sin \frac{n\pi y}{l_2}; \quad u\left(\frac{l_1}{2}, \frac{l_2}{2}\right) = \frac{F_0 l_1^3 l_2^3}{48D (l_1^2 + l_2^2)^2}.$$

$$\mathbf{2.497.} \quad u(x, y) = \frac{p_0 a^4 b^4}{8D(3a^4 + 3b^4 + 2a^2 b^2)} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 \right)^2.$$

2.498. У к а з а н и е. Если неоднородность представить в форме

$$\mu(t) = \int_0^t \mu(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = \int_0^t \mu(\tau) \frac{\partial \eta(t - \tau)}{\partial t} d\tau,$$

то естественно предположить, что

$$u(x, t) = \int_0^t \mu(\tau) \frac{\partial v(x, t - \tau)}{\partial t} d\tau,$$

где функция $v(x, t - \tau)$ — решение вспомогательной задачи с неоднородностью $\eta(t - \tau)$ или (после замены $t - \tau \rightarrow \tau$) с неоднородностью $\eta(t)$. Остается доказать, что $u(x, t)$ удовлетворяет условиям исходной задачи.

2.499. 1) $u(x, t) = \frac{4F_0}{\pi a \rho S} \times$

$$\times \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \left(\omega \sin \frac{\pi(2n+1)a}{2l} t - \frac{\pi(2n+1)a}{2l} \sin \omega t \right)}{(2n+1) \left(\omega^2 - \left(\frac{\pi(2n+1)a}{2l} \right)^2 \right)};$$

2) $u(x, t) = \frac{F_0}{\rho \omega^2 l S} \times$

$$\times \left(\omega t - \sin \omega t + \frac{2\omega^2 l}{\pi a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos \frac{\pi n x}{l} \left(\omega \sin \frac{\pi n a}{l} t - \frac{\pi n a}{l} \sin \omega t \right)}{n \left(\omega^2 - \left(\frac{\pi n a}{l} \right)^2 \right)} \right);$$

3) $u(x, t) = \frac{2F_0}{\rho a S} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p^2) \cos \mu_n \left(1 - \frac{x}{l} \right) \left(\omega \sin \frac{\mu_n a}{l} t - \frac{\mu_n a}{l} \sin \omega t \right)}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p) \left(\omega^2 - \left(\frac{\mu_n a}{l} \right)^2 \right)},$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$, $p = hl$.

2.500. $u(x, t) = \frac{4}{\pi a \rho_0 S} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l}}{2n+1} \int_0^t F(\tau) \sin \frac{(2n+1)\pi a(t - \tau)}{2l} d\tau.$

2.501. $u(x, t) = \frac{2F_0}{a \rho_0 S} \left(t - \frac{l}{a} \right) \eta \left(t - \frac{2l}{a} \right).$

2.502. $u(x, t) = \frac{2k}{S \sqrt{E \rho_0}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2}}{\mu_n^2 + p^2 + p} \times$

$$\times \sin \mu_n \left(1 - \frac{x}{l} \right) \int_0^t \alpha(\tau) \sin \frac{\mu_n a(t - \tau)}{l} d\tau,$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{ctg} \mu = -p$, $p = \frac{kl}{ES}$.

2.503. $u(x, t) = \frac{2k}{S \sqrt{\rho_0 E}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2}}{\mu_n^2 + p^2 + p} \times$

$$\times \cos \mu_n \left(1 - \frac{x}{l} \right) \int_0^t \alpha(\tau) \sin \frac{\mu_n \pi a(t - \tau)}{l} d\tau.$$

2.504. Потенциал скоростей

$$u(x, t) = \frac{a^2}{l} \int_0^t v(\tau) (t - \tau) d\tau + \frac{2a}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos \frac{n\pi x}{l}}{n} \int_0^t v(\tau) \sin \frac{n\pi a(t - \tau)}{l} d\tau.$$

$$2.505. \quad 1) u(x, t) = \frac{4a}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l}}{2n+1} \int_0^t v(\tau) \sin \frac{(2n+1)\pi a(t-\tau)}{2l} d\tau;$$

$$2) u(x, t) = 2a \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + q^2) \cos \mu_n \left(1 - \frac{x}{l}\right)}{\mu_n (\mu_n^2 + q^2 + q)} \int_0^t v(\tau) \sin \frac{\mu_n a(t-\tau)}{l} d\tau,$$

μ_n — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = q$, $q = \frac{kl}{\gamma P_0}$.

$$2.506. \quad u(x, t) = \frac{2\pi a^2}{l^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sin \frac{n\pi x}{l}}{\omega_n} \int_0^t E(\tau) e^{-\frac{\beta}{2}(t-\tau)} \sin \omega_n(t-\tau) d\tau,$$

$$\omega_n = \frac{\pi^2 n^2}{LCl^2} - \frac{R^2}{4L^2}.$$

$$2.507. \quad u(r, t) = 3a^2 \int_0^t \alpha(\tau) d\tau + \\ + \frac{2a^2 r_0}{r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\mu_n^2 + 1}}{\mu_n} \sin \frac{\mu_n r}{r_0} \int_0^t \alpha(\tau) \cos \frac{a\mu_n(t-\tau)}{r_0} d\tau,$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\operatorname{tg} \mu = \mu$.

У к а з а н и е. Задачу поставить в виде

$$u_{tt} = a^2 \Delta u + a^2 r_0 \alpha_t \delta S, \\ u_r|_{r=r_0} = 0, \quad u|_{t=0} = u_t|_{t=0} = 0.$$

$$2.508. \quad u(x, t) = \frac{2u_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi x}{l} \times \\ \times \left[1 - e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t} - \left(1 - e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 (t-t_0)}\right) \eta(t-t_0) \right].$$

$$2.509. \quad u(x, t) = \frac{2}{l} \sum_{n=0}^{\infty} \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \int_0^t q(\tau) e^{-\left(\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right)^2 D(t-\tau)} d\tau.$$

$$2.510. \quad u(x, t) = \frac{2a^2 h}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \mu_n \sqrt{\mu_n^2 + p}}{\mu_n^2 + p^2 + p} \cos \frac{\mu_n x}{l} \int_0^t \mu(\tau) e^{-\left(\frac{\mu_n a}{l}\right)^2 (t-\tau)} d\tau,$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = p$, $p = hl$.

$$2.511. \quad u(x, t) = \frac{2E_0 Rl}{R_2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 + p_1^2) \left(p_1 \sin \mu_n \left(1 - \frac{x}{l}\right) + \mu_n \cos \mu_n \left(1 - \frac{x}{l}\right)\right)}{\mu_n [(\mu_n^2 + p_1^2)(\mu_n^2 + p_2^2) + (p_1 + p_2)(\mu_n^2 + p_1 p_2)]} \times \\ \times e^{-\left(\frac{\mu_n a}{l}\right)^2 t} \left(e^{\left(\frac{\mu_n a}{l}\right)^2 t_0} - 1\right),$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{ctg} \mu = \frac{\mu^2 - p_1 p_2}{p_1 + p_2}$, $p_i = \frac{Rl}{R_i}$.

$$2.512. \quad u(r, t) = \frac{3a^2}{2r_0} \left[\int_0^t q(\tau) d\tau + \frac{2r_0}{3r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\mu_n^2 + 1}}{\mu_n} \sin \frac{\mu_n r}{r_0} \times \right. \\ \left. \times \int_0^t q(\tau) e^{-\left(\frac{\mu_n a}{r_0}\right)^2 (t-\tau)} d\tau \right], \quad \mu_n > 0 \text{ корень уравнения } \operatorname{tg} \mu = \mu.$$

$$2.513. \quad u(r, t) = \frac{2hr_0^2 u_0}{r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{\mu_n^2 + p^2} \sin \frac{\mu_n r}{r_0}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p)} e^{-\left(\frac{\mu_n a}{r_0}\right)^2 (t-t_0)} \times \\ \times \left[1 - \frac{r_0^2}{a^2 t_0 \mu_n^2} \left(1 - e^{\left(\frac{\mu_n a}{r_0}\right)^2 t_0}\right) \right],$$

$p = hr_0 - 1$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{ctg} \mu = p$.

$$2.514. \quad u(x, y, z) = \frac{2u_0}{l_1^2} \sum_{n=1, k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k n \sin \frac{\pi n}{2} (1 + \frac{x}{l_1}) \cos \frac{(2k+1)\pi y}{2l_2}}{(2k+1)\alpha_{nk}^2} (1 - e^{-\alpha_{nk}z}),$$

$$\alpha_{nk} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{n^2}{l_1^2} + \frac{(2k+1)^2}{l_2^2}}.$$

2.515. Если $\alpha \neq \lambda_{nk} = \pi \sqrt{\frac{n^2}{l_1^2} + \frac{(2k+1)^2}{l_2^2}}$, то

$$u(x, y, z) = \frac{8\alpha u_0}{l_1^2} \sum_{n=1, k=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{\pi n x}{l_1} \sin \frac{(2k+1)\pi y}{l_2}}{(2k+1)(\lambda_{nk}^2 - \alpha^2)} \left(\frac{e^{-\alpha|z|}}{\alpha} - \frac{e^{-\lambda_{nk}|z|}}{\lambda_{nk}} \right);$$

если $\alpha = \lambda_{n_0 k_0}$, то

$$u(x, y, z) = \frac{8\alpha u_0}{l_1^2} \frac{n_0 l_1 (1 + \alpha z) e^{-\alpha z}}{(2k_0 + 1)\alpha^2} +$$

$$+ \frac{8\alpha u_0}{l_1^2} \sum_{\substack{n=1, k=0 \\ n \neq n_0, k \neq k_0}}^{\infty} \frac{\sin \frac{\pi n x}{l_1} \sin \frac{(2k+1)\pi y}{l_2}}{(2k+1)(\lambda_{nk}^2 - \alpha^2)} \left(\frac{e^{-\alpha|z|}}{\alpha} - \frac{e^{-\lambda_{nk}|z|}}{\lambda_{nk}} \right).$$

$$2.516. \quad u(x, y, z) = \frac{8q_0}{k\pi l_2} \sum_{n, m=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{l_1} \sin \frac{(2m+1)\pi y}{2l_2}}{(2m+1)\alpha_{nm}^2} (1 - e^{-\alpha_{nm}z}),$$

$$\alpha_{nm} = \pi \sqrt{\left(\frac{2n+1}{l_1} \right)^2 + \left(\frac{2m+1}{2l_2} \right)^2}.$$

$$2.517. \quad u(x, y, z, t) = \frac{32u_0}{\pi l^2} \sum_{k, m=0}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n \sin \frac{(2k+1)\pi x}{l} \sin \frac{(2m+1)\pi y}{l} \sin \frac{n\pi z}{l}}{(2k+1)(2m+1)a_{kmn}} \times$$

$$\times (1 - e^{-a^2 \alpha_{kmn} t}), \quad \alpha_{kmn} = \frac{\pi^2}{l^2} [(2k+1)^2 + (2m+1)^2 + n^2].$$

$$2.518. \quad u(x, y) = \frac{I}{2\pi\sigma h} \ln \frac{\operatorname{ch} \frac{\pi y}{2l} - \sin \frac{\pi x}{2l}}{\operatorname{ch} \frac{\pi y}{2l} + \sin \frac{\pi x}{2l}} + C, \quad \mathbf{j} = -\sigma \nabla u.$$

$$2.519. \quad u(r, \varphi) = C - \frac{I}{2\pi\sigma h} \ln \frac{r^2 r_0^2}{r^4 + r_0^4 + 2r^2 r_0^2 \cos 2\varphi}, \quad \mathbf{j} = -\sigma \nabla u.$$

$$2.520. \quad u(z, \varphi) = C - \frac{J}{2\pi\sigma} \ln \frac{\operatorname{ch} \frac{z}{r_0} - \cos \varphi}{\operatorname{ch} \frac{z}{r_0} + \cos \varphi}, \quad \text{плотность тока имеет вид (1.168).}$$

$$2.521. \quad u(\theta, \varphi) = C - \frac{J}{4\pi\sigma} \left[\ln \frac{\operatorname{tg}^2 \frac{\theta}{2} + \operatorname{tg}^2 \frac{\theta_0}{2} - 2 \operatorname{tg} \frac{\theta}{2} \operatorname{tg} \frac{\theta_0}{2} \cos(\varphi - \varphi_0)}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\theta}{2} - 2 \operatorname{tg} \frac{\theta}{2} \cos \varphi} + \right.$$

$$\left. + \ln \frac{\operatorname{tg}^2 \frac{\theta}{2} + \operatorname{ctg}^2 \frac{\theta_0}{2} - 2 \operatorname{tg} \frac{\theta}{2} \operatorname{ctg} \frac{\theta_0}{2} \cos(\varphi - \varphi_0)}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\theta}{2} - 2 \operatorname{tg} \frac{\theta}{2} \cos \varphi} \right].$$

Плотность тока имеет вид (1.169).

У к а з а н и е. Задачу поставить в форме

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} = -\frac{J}{\sigma} \left[\frac{\delta(\theta - \theta_0)}{\sin \theta} \cdot \delta(\varphi - \varphi_0) - \frac{\delta(\frac{\pi}{2} - \theta)}{\sin \theta} \cdot \delta(\varphi) \right],$$

$$0 < \theta, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

$$|u(0, \varphi)| < \infty, \quad \left. \frac{\partial}{\partial \theta} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = 0.$$

Продолжить функцию $u(\theta, \varphi)$ на всю сферу и воспользоваться указанием к задаче 2.260.

$$\mathbf{2.522.} \quad 1) u_{rez} = \frac{(-1)^{n+1} F_0}{\rho l S \omega} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} t \cos \omega t;$$

$$2) u_{rez} = \frac{(-1)^{n+1} F_0}{\rho l S \omega} \cos \frac{\pi n x}{l} t \cos \omega t;$$

$$3) u_{rez} = -\frac{F_0(\mu_n^2 + p^2 + p)}{2l\rho S(\mu_n^2 + p^2)} \cos \mu_n \left(1 - \frac{x}{l}\right) t \cos \omega t.$$

$$\mathbf{2.523.} \quad 1) u_{rez} = \frac{(-1)^n F_0 \mu_n \sqrt{\mu_n^2 + p^2}}{\rho l S \omega (\mu_n^2 + p^2 + p)} \sin \mu_n \left(1 - \frac{x}{l}\right) t \cos \omega t;$$

$$2) u_{rez} = \frac{(-1)^n F_0 \mu_n \sqrt{\mu_n^2 + p^2}}{\rho l S \omega (\mu_n^2 + p^2 + p)} \cos \mu_n \left(1 - \frac{x}{l}\right) t \cos \omega t.$$

$$\mathbf{2.524.} \quad 1) u_{rez} = \frac{(-1)^{n-1} a u_0 t \cos \omega t}{l \omega} \sin \frac{\pi n x}{l};$$

$$2) u_{rez} = \frac{(-1)^{n-1} a u_0 t \cos \omega t}{l \omega} \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l};$$

$$3) u_{rez} = -\frac{a u_0 (\mu_n^2 + p^2) t \cos \omega t}{l (\mu_n^2 + p^2 + p)} \sin \mu_n \left(1 - \frac{x}{l}\right).$$

$$\mathbf{2.525.} \quad 1) u_{rez} = \frac{(-1)^n F_0 H(\mu_n) t \cos \omega t}{M \omega} \sin \frac{\mu_n x}{l};$$

$$2) u_{rez} = \frac{(-1)^n F_0 H(\mu_n) t \cos \omega t}{M \omega} \cos \frac{\mu_n x}{l}; \quad H(\mu) = \frac{\sqrt{\mu_n^2 + p^2}}{\mu_n^2 + p^2 + p}.$$

$$\mathbf{2.526.} \quad 1) u_{rez} = -\frac{a u_0}{l} H(\mu_n) t \cos \omega t \sin \frac{\mu_n x}{l};$$

$$2) u_{rez} = -\frac{F_0 H(\mu_n) t \cos \omega t}{M \omega} \cos \frac{\mu_n x}{l}; \quad H(\mu) = \frac{\mu_n^2 + p^2}{\mu_n^2 + p^2 + p}.$$

$$\mathbf{2.527.} \quad 1) u_{rez} = \frac{f_0}{4\rho l \omega} \left[\sin \frac{\pi}{4} \left(\frac{15x}{l} - 1 \right) \cos \frac{2\pi y}{l} - \sin \frac{\pi}{4} \left(\frac{17x}{l} + 1 \right) \right] t \cos \omega t;$$

$$2) u_{rez} = -\frac{f_0}{4\rho l \omega} \sin \frac{\pi}{4} \left(\frac{5x}{l} + 1 \right) \cos \frac{5\pi y}{l} t \cos \omega t;$$

$$3) u_{rez} = \frac{f_0}{4\rho l \omega} \left[\sin \frac{\pi}{4} \left(\frac{5x}{l} + 1 \right) \cos \frac{3\pi y}{l} - \sin \frac{\pi}{4} \left(\frac{13x}{l} - 1 \right) \right] t \cos \omega t.$$

$$\begin{aligned} 2.528. \quad 1) u_{rez} &= -\frac{5\pi a^2 u_0}{8l^2 \omega} \cos \frac{5\pi x}{2l} \cos \frac{6\pi y}{l} t \cos \omega t; \\ 2) u_{rez} &= \frac{3\pi a^2 u_0}{2l^2 \omega} \sin \frac{6\pi x}{l} \cos \frac{5\pi y}{2l} t \cos \omega t. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.529. \quad 1) u_{rez} &= -\frac{7\pi a^2 u_0}{8l^2 \omega} \cos \frac{7\pi x}{2l} \cos \frac{\pi y}{2l} t \cos \omega t; \\ 2) u_{rez} &= -\frac{5\pi a^2 u_0}{8l^2 \omega} \cos \frac{5\pi x}{2l} \cos \frac{5\pi y}{2l} t \cos \omega t; \\ 3) u_{rez} &= -\frac{\pi a^2 u_0}{4l^2 \omega} \sin \frac{\pi x}{l} \cos \frac{7\pi y}{2l} t \cos \omega t. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.530. \quad 1) u_{rez} &= \frac{11\pi a^2 u_0}{8l^2 \omega} \cos \frac{11\pi x}{2l} \sin \frac{\pi y}{l} t \cos \omega t; \\ 2) u_{rez} &= -\frac{5\pi a^2 u_0}{4l^2 \omega} \sin \frac{5\pi x}{l} \cos \frac{5\pi y}{2l} t \cos \omega t; \\ 3) u_{rez} &= -\frac{5\pi a^2 u_0}{8l^2 \omega} \cos \frac{5\pi x}{2l} \sin \frac{5\pi y}{l} t \cos \omega t; \\ 4) u_{rez} &= -\frac{\pi a^2 u_0}{4l^2 \omega} \sin \frac{\pi x}{l} \cos \frac{11\pi y}{2l} t \cos \omega t. \end{aligned}$$

$$2.531. \quad u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{r^{\frac{\pi}{\alpha}} - r_0^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi \varphi}{\alpha}}{r_0^{\frac{\pi}{\alpha}} \sin \frac{\pi \varphi}{\alpha}}.$$

$$\begin{aligned} 2.532. \quad u(r, \varphi) &= \frac{u_0 r}{\pi r_0} \left[\frac{1}{2} \cos \left(\varphi + \frac{\pi}{4} \right) \ln \frac{r^2 - 2rr_0 \cos \left(\varphi - \frac{\pi}{4} \right) + r_0^2}{r^2 + 2rr_0 \cos \left(\varphi - \frac{\pi}{4} \right) + r_0^2} - \right. \\ &\quad - \frac{1}{2} \cos \left(\varphi - \frac{\pi}{4} \right) \ln \frac{r^2 - 2rr_0 \cos \left(\varphi + \frac{\pi}{4} \right) + r_0^2}{r^2 + 2rr_0 \cos \left(\varphi + \frac{\pi}{4} \right) + r_0^2} + \\ &\quad + \cos \left(\varphi - \frac{\pi}{4} \right) \operatorname{arctg} \frac{r^2 - r_0^2}{2rr_0 \cos \left(\varphi + \frac{\pi}{4} \right)} - \\ &\quad \left. - \cos \left(\varphi + \frac{\pi}{4} \right) \operatorname{arctg} \frac{r^2 - r_0^2}{2rr_0 \cos \left(\varphi - \frac{\pi}{4} \right)} \right]. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.533. \quad u(r, \varphi) &= \frac{u_0}{\pi} \left[\frac{r}{2r_0} \sin \varphi \ln \frac{r^{\frac{2}{3}} - 2r^{\frac{1}{3}} r_0^{\frac{1}{3}} \cos \frac{\varphi}{3} + r_0^{\frac{2}{3}}}{r^{\frac{2}{3}} + 2r^{\frac{1}{3}} r_0^{\frac{1}{3}} \cos \frac{\varphi}{3} + r_0^{\frac{2}{3}}} + \right. \\ &\quad + \frac{r}{2r_0} \cos \varphi \ln \frac{r^{\frac{2}{3}} - 2r^{\frac{1}{3}} r_0^{\frac{1}{3}} \sin \frac{\varphi}{3} + r_0^{\frac{2}{3}}}{r^{\frac{2}{3}} + 2r^{\frac{1}{3}} r_0^{\frac{1}{3}} \sin \frac{\varphi}{3} + r_0^{\frac{2}{3}}} + \frac{r}{r_0} \cos \varphi \operatorname{arctg} \frac{r^{\frac{2}{3}} - r_0^{\frac{2}{3}}}{2r^{\frac{1}{3}} r_0^{\frac{1}{3}} \sin \frac{\varphi}{3}} + \\ &\quad \left. + \frac{r}{r_0} \sin \varphi \operatorname{arctg} \frac{r^{\frac{2}{3}} - r_0^{\frac{2}{3}}}{2r^{\frac{1}{3}} r_0^{\frac{1}{3}} \cos \frac{\varphi}{3}} \right]. \end{aligned}$$

$$2.534. u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \sqrt{\frac{r_0}{r}} \left[4 \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{1}{6}} \sin \frac{\varphi}{3} + \frac{1}{2} \sin \frac{\varphi}{2} \ln \frac{r^{\frac{1}{3}} + 2r^{\frac{1}{6}} r_0^{\frac{1}{6}} \cos \frac{\varphi}{6} + r_0^{\frac{1}{3}}}{r^{\frac{1}{3}} - 2r^{\frac{1}{6}} r_0^{\frac{1}{6}} \cos \frac{\varphi}{6} + r_0^{\frac{1}{3}}} + \right. \\ \left. + \frac{1}{2} \cos \frac{\varphi}{2} \ln \frac{r^{\frac{1}{3}} + 2r^{\frac{1}{6}} r_0^{\frac{1}{6}} \sin \frac{\varphi}{6} + r_0^{\frac{1}{3}}}{r^{\frac{1}{3}} - 2r^{\frac{1}{6}} r_0^{\frac{1}{6}} \sin \frac{\varphi}{6} + r_0^{\frac{1}{3}}} + \cos \frac{\varphi}{2} \operatorname{arctg} \frac{r_0^{\frac{1}{3}} - r^{\frac{1}{3}}}{2r^{\frac{1}{6}} r_0^{\frac{1}{6}} \sin \frac{\varphi}{6}} - \right. \\ \left. - \sin \frac{\varphi}{2} \operatorname{arctg} \frac{r_0^{\frac{1}{3}} - r^{\frac{1}{3}}}{2r^{\frac{1}{6}} r_0^{\frac{1}{6}} \cos \frac{\varphi}{6}} \right].$$

$$2.535. u(r, \varphi) = \frac{lV_0}{2\pi} \left[\ln \left(1 + \frac{r^4}{r_0^4} - 2 \frac{r^2}{r_0^2} \cos 2\varphi \right) + \frac{r}{r_0} \cos \varphi \ln \frac{r^2 + 2rr_0 \cos \varphi + r_0^2}{r^2 - 2rr_0 \cos \varphi + r_0^2} + \right. \\ \left. + 2 \frac{r}{r_0} \sin \varphi \operatorname{arctg} \frac{r^2 - r_0^2}{2rr_0 \sin \varphi} \right] + C. \quad \mathbf{V}(r, 0) = \frac{V_0}{\pi} \ln \left| \frac{r + r_0}{r - r_0} \right| \mathbf{e}_r + V_0 \eta (r_0 - r) \mathbf{e}_\varphi, \\ \mathbf{V}(r, 0) = \frac{V_0}{\pi} \ln \left| \frac{r + r_0}{r - r_0} \right| \mathbf{e}_r - V_0 \eta (r_0 - r) \mathbf{e}_\varphi.$$

$$2.536. u(r, \varphi) = \frac{q_0 r_0}{3k\pi} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{r_0}{r} \right)^3 \sin 3\varphi \ln \left(1 + 2 \left(\frac{r}{r_0} \right)^3 \cos 6\varphi + \left(\frac{r}{r_0} \right)^6 \right) + \right. \\ \left. + \frac{1}{2} \ln \frac{r_0^6 + 2r_0^3 r^3 \sin 3\varphi + r^6}{r_0^6 - 2r_0^3 r^3 \sin 3\varphi + r^6} - \left(\frac{r}{r_0} \right)^3 \cos 3\varphi \operatorname{arctg} \frac{r^6 + r_0^6 \cos 6\varphi}{r^6 \sin 6\varphi} \right].$$

$$2.537. u(r, \varphi) = \frac{q_0 r_0}{k\pi} \left[\frac{1}{2} \ln \frac{r^4 + r_0^4 + 2r^2 r_0^2 \cos 2\varphi}{r^4 + r_0^4 - 2r^2 r_0^2 \cos 2\varphi} - \right. \\ \left. - \frac{1}{2} \frac{r}{r_0} \cos \varphi \ln \frac{r^2 + r_0^2 + 2rr_0 \cos \varphi}{r^2 + r_0^2 - 2rr_0 \cos \varphi} + \frac{1}{2} \frac{r}{r_0} \sin \varphi \ln \frac{r^2 + r_0^2 + 2rr_0 \sin \varphi}{r^2 + r_0^2 - 2rr_0 \sin \varphi} + \right. \\ \left. + \frac{r}{r_0} \cos \varphi \operatorname{arctg} \frac{r^2 - r_0^2}{2rr_0 \cos \varphi} - \frac{r}{r_0} \sin \varphi \operatorname{arctg} \frac{r^2 - r_0^2}{2rr_0 \sin \varphi} \right].$$

$$2.538. u(r, \varphi) = \frac{5A}{2\pi} \left\{ \frac{1}{2} \ln \frac{1 + 2 \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{2}{5}} \sin \frac{2\varphi}{5} + \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{4}{5}}}{1 - 2 \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{2}{5}} \sin \frac{2\varphi}{5} + \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{4}{5}}} + \frac{1}{2} \left(\frac{r_0}{r} \right)^{\frac{2}{5}} \sin \frac{2\varphi}{5} \ln [1 + \right. \\ \left. + 2 \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{4}{5}} \cos \frac{4\varphi}{5} + \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{8}{5}}] - \left(\frac{r_0}{r} \right)^{\frac{2}{5}} \cos \frac{2\varphi}{5} \operatorname{arctg} \frac{1 + \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{4}{5}} \cos \frac{4\varphi}{5}}{\left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{4}{5}} \sin \frac{4\varphi}{5}} \right\}.$$

$$2.539. \mathbf{q} \left(r, \frac{\pi}{5} \right) = \mathbf{e}_\varphi \frac{2q}{5\pi} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{3}{2}} \left[\frac{1}{12} + \frac{25}{4\pi^2} \ln^2 \frac{r_0}{r} - \frac{1}{\pi^2} \int_0^\rho \frac{\ln(1 + \xi^2)}{\xi} d\xi \right], \\ \rho = \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{5}{2}}, \quad r < r_0, \quad \mathbf{q} \left(r, \frac{\pi}{5} \right) = \mathbf{e}_\varphi \frac{2q}{5\pi} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{3}{2}} \int_0^\rho \frac{\ln(1 + \xi^2)}{\xi} d\xi, \\ \rho = \left(\frac{r_0}{r} \right)^{\frac{5}{2}}, \quad r > r_0; \quad \mathbf{q} \left(r, \frac{\pi}{5} \right) = \mathbf{e}_\varphi \frac{\pi q}{60}.$$

$$2.540. \sigma(r, 0) = -\frac{u_0}{4\pi^2 r \rho} \left[\int_0^\rho \frac{\ln(1 + \xi)}{\xi} d\xi - \ln(1 + \rho) \right], \quad \rho = \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{3}{4}} < 1,$$

$$\sigma(r, 0) = -\frac{u_0}{4\pi^2 r \rho} \left[\frac{\pi^2}{6} - \ln \frac{1+\rho}{\rho} + \frac{1}{2} \ln^2 \rho - \int_0^\rho \frac{\ln(1+\xi)}{\xi} d\xi \right],$$

$$\rho = \left(\frac{r_0}{r} \right)^{\frac{3}{4}} < 1, \quad \sigma(r_0, 0) = -\frac{u_0}{4\pi^2 r_0} \left(\frac{\pi^2}{12} - \ln 2 \right).$$

2.541. $u(r, 0) = \frac{36q_0 r_0}{49k\pi} \rho \left[-\frac{\pi^2}{6} - 2 \ln \rho + \ln^2 \rho + \frac{1+\rho}{\rho} - \right.$

$$\left. - \frac{1-\rho}{\rho} \ln \frac{1-\rho}{\rho} - \int_0^\rho \frac{\ln(1-\xi^2)}{\xi} d\xi \right],$$

$$\rho = \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{7}{6}} < 1, \quad u(r, 0) = \frac{36q_0 r_0}{49k\pi} \rho \left[(1+\rho) \ln(1+\rho) + (1-\rho) \ln(1-\rho) + \right.$$

$$\left. + \int_0^\rho \frac{\ln(1-\xi^2)}{\xi} d\xi \right], \quad \rho = \left(\frac{r_0}{r} \right)^{\frac{7}{6}} < 1, \quad u(r_0, 0) = \frac{36q_0 r_0}{49k\pi} \left(2 \ln 2 - \frac{\pi^2}{12} \right).$$

2.542. $u(r, \varphi) = \frac{2q_0 r_0}{\pi D} \left[\sqrt{\frac{r}{r_0}} \cos \frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4} \left(1 - \frac{r}{r_0} \cos \varphi \right) \ln \frac{r_0^2 + 2\sqrt{r_0 r} \cos \frac{\varphi}{2} + r^2}{r_0^2 - 2\sqrt{r_0 r} \cos \frac{\varphi}{2} + r^2} - \right.$

$$\left. - \frac{r}{r_0} \sin \varphi \operatorname{arccctg} \frac{r-r_0}{2\sqrt{r r_0} \sin \frac{\varphi}{2}} \right].$$

2.543. $\mathbf{j} = -\sigma \nabla u, \quad u(r, \varphi) = \frac{j_0 r_0}{\pi} \left[\ln \frac{r_0}{r} + \frac{1}{2} \left(\frac{r \cos \varphi}{r_0} - 1 \right) \times \right.$

$$\left. \times \ln \left(1 + \frac{r_0^2}{r^2} - 2 \frac{r_0}{r} \cos \varphi \right) - \frac{r}{r_0} \sin \varphi \operatorname{arccctg} \frac{r-r_0 \cos \varphi}{r_0 \sin \varphi} \right].$$

2.544. $u(r, \varphi) = \frac{q_0}{4\pi D} \ln \frac{1 - 2\left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi}{\alpha}(\varphi + \varphi_0) + \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{2\pi}{\alpha}}}{1 - 2\left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi}{\alpha}(\varphi - \varphi_0) + \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{2\pi}{\alpha}}}.$

2.545. $\mathbf{F} = -\frac{q_0}{r_0} \mathbf{e}_r.$

2.546. $u(r, \varphi) = \frac{q_0}{4\pi k} \ln \frac{1 - 2\left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi}{2\alpha}} \cos \frac{\pi}{2\alpha}(\varphi + \varphi_0) + \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi}{\alpha}}}{1 - 2\left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi}{2\alpha}} \cos \frac{\pi}{2\alpha}(\varphi - \varphi_0) + \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi}{\alpha}}} +$

$$+ \frac{q_0}{4\pi k} \ln \frac{1 + 2\left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi}{2\alpha}} \cos \frac{\pi}{2\alpha}(\varphi - \varphi_0) + \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi}{\alpha}}}{1 + 2\left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi}{2\alpha}} \cos \frac{\pi}{2\alpha}(\varphi + \varphi_0) + \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi}{\alpha}}}.$$

2.547. $\mathbf{j} = -\sigma \nabla u, \quad u(r, \varphi) = -\frac{J}{\sigma} \ln \rho_1 \rho_2 + C,$

$$\rho_{1,2} = r^{\frac{2\pi}{\alpha}} + r_0^{\frac{2\pi}{\alpha}} - 2r^{\frac{\pi}{\alpha}} a^{\frac{2\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi}{\alpha}(\varphi \pm \varphi_0).$$

2.548. 1) $u(r, \varphi) = \frac{\pi p}{\alpha r_0} \left(r^{\frac{2\pi}{\alpha}} - r_0^{\frac{2\pi}{\alpha}} \right) \left(\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2} \right);$

2) $u(r, \varphi) = \frac{2\pi p}{\alpha r_0} r^{\frac{\pi}{\alpha}} a^{\frac{2\pi}{\alpha}} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{\alpha}(\varphi + \varphi_0)}{\rho_1} + \frac{\sin \frac{\pi}{\alpha}(\varphi - \varphi_0)}{\rho_2} \right) + C,$

$$\rho_{1,2} = r^{\frac{2\pi}{\alpha}} + r_0^{\frac{2\pi}{\alpha}} - 2r^{\frac{\pi}{\alpha}} a^{\frac{2\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi}{\alpha}(\varphi \pm \varphi_0).$$

$$2.549. \mathbf{j} = -\sigma \nabla u, u(r, \varphi) = -\frac{J}{2\pi\sigma d} \ln(r^{\frac{2\pi}{\alpha}} + a^{\frac{2\pi}{\alpha}} - 2r^{\frac{\pi}{\alpha}} a^{\frac{2\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi\varphi}{\alpha}) + C.$$

$$2.550. u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \operatorname{arccctg} \frac{r-r_0}{2\sqrt{rr_0} \sin \frac{\varphi}{2}}.$$

$$2.551. \mathbf{E} = -\nabla u, u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \sqrt{\frac{r_0}{r}} \left[\sin \frac{\varphi}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{r_0}{r}} \sin \varphi \ln \left(1 + \frac{r}{r_0} - \right. \right. \\ \left. \left. - 2\sqrt{\frac{r}{r_0}} \cos \frac{\varphi}{2} \right) + \sqrt{\frac{r_0}{r}} \cos \varphi \operatorname{arccctg} \frac{\sqrt{r_0} - \sqrt{r} \cos \frac{\varphi}{2}}{\sqrt{r} \sin \frac{\varphi}{2}} \right].$$

$$2.552. \sigma(x) = -\frac{q}{2\sqrt{x} \left(\sqrt{\frac{a}{x}} + \sqrt{\frac{x}{a}} \right)}.$$

$$2.553. \mathbf{F} = -\frac{(\pi - \alpha)J^2}{\alpha r_0 c^2} \mathbf{e}_z.$$

2.554. Р е ш е н и е. 1) После умножения уравнения для u_1 на u_2 уравнения для u_2 на u_1 и вычитания из второго первого получается тождество

$$u_1 \frac{d}{dz} z \frac{du_2}{dz} - u_2 \frac{d}{dz} z \frac{du_1}{dz} + (p_2^2 - p_1^2) z u_1 u_2 = 0,$$

левая часть которого равна

$$\frac{d}{dz} \left[z \left(u_1 \frac{du_2}{dz} - u_2 \frac{du_1}{dz} \right) \right] = \frac{d}{dz} (zW[u_1, u_2]).$$

Стало быть,

$$\frac{d}{dz} (zW[u_1, u_2]) = (p_1^2 - p_2^2) z u_1 u_2,$$

откуда следует (2.47).

2) При $p_1 \rightarrow p_2 = p$ в формуле (2.47) возникает неопределенность, устранение которой по правилу Лопиталья приводит к соотношению

$$\int_{x_1}^{x_2} Z_\nu^2(px) x dx = \frac{x}{2p} W \left[\frac{\partial Z_\nu(px)}{\partial p}, Z_\nu(px) \right] \Big|_{x_1}^{x_2}. \quad (2.107)$$

Так как

$$\frac{\partial Z_\nu(px)}{\partial p} = Z'_\nu(px) x, \quad \frac{\partial Z_\nu(px)}{\partial x} = Z'_\nu(px) p,$$

где $Z'_\nu(px)$ — производная по всему аргументу, то $\frac{\partial Z_\nu(px)}{\partial p} = \frac{x}{p} \frac{\partial Z_\nu(px)}{\partial x}$, следовательно,

$$W \left[\frac{\partial Z_\nu}{\partial p}, Z_\nu \right] = W \left[\frac{x}{p} \frac{\partial Z_\nu}{\partial x}, Z_\nu \right] = \frac{x}{p} \left(\frac{\partial Z_\nu}{\partial x} \right)^2 - Z_\nu \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{p} \frac{\partial Z_\nu}{\partial x} \right) = \\ = p^2 \frac{x}{p} (Z'_\nu)^2 + px \left(1 - \frac{\nu^2}{p^2 x^2} \right) Z_\nu^2.$$

Последнее выражение получается в результате применения уравнения для (второе слагаемое) $Z_\nu(px)$ и замены дифференцирования по x дифференцированием по всему аргументу. Отсюда следует (2.48).

2.555. У к а з а н и е. Доказательство основано на формулах (2.49), (2.50).

2.556. Решение. При условиях задачи

$$J_\nu(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k a_k z^{2k+\nu}, \text{ где } a_k = \frac{1}{2^{2k+\nu} k! \Gamma(k+\nu+1)} > 0,$$

следовательно,

$$F_\nu(z) = z^\nu \sum_{k=0}^{\infty} [\alpha + \beta(\nu + 2k)] a_k (-1)^k z^{2k}.$$

Мнимое число ix_0 не может быть нулем $F_\nu(z)$, т. е.

$$F_\nu(ix_0) = (ix_0)^\nu \sum_{k=0}^{\infty} [\alpha + \beta(\nu + 2k)] a_k x_0^{2k} \neq 0.$$

Действительно, если $\beta = 0$, то $F_\nu(ix_0) = (ix_0)^\nu \alpha \sum_{k=0}^{\infty} a_k x_0^{2k} \neq 0$. Если $\beta \neq 0$, то

$$F_\nu(ix_0) = (ix_0)^\nu \beta \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{\beta} + \nu + 2k \right) a_k x_0^{2k} \neq 0.$$

Пусть комплексное число $\mu = \lambda + i\sigma$ — нуль функции $F_\nu(z)$. Так как коэффициенты ряда для $J_\nu(z)$ в данном случае вещественны, а ряд сходится, то $J_\nu(\mu) = J_\nu(\bar{\mu})$, $F_\nu(\mu) = F_\nu(\bar{\mu})$, стало быть $\bar{\mu}$ — также нуль функции $F_\nu(z)$, при этом $\mu^2 \neq \bar{\mu}^2$. Выполнены условия теоремы об ортогональности функций Бесселя (задача 2.555), применение которой порождает противоречие:

$$0 = \int_0^l J_\nu\left(\frac{\mu x}{l}\right) J_\nu\left(\frac{\bar{\mu} x}{l}\right) x dx = \int_0^l \left| J_\nu\left(\frac{\mu x}{l}\right) \right|^2 x dx > 0.$$

Соотношение 2.49, в котором $Z_\nu(px) = J_\nu(px)$, $x_1 = 0$, $x_2 = x > 0$, приобретает форму

$$\int_0^x J_\nu^2(px) x dx = \frac{x}{2p} W \left[\frac{\partial J_\nu(px)}{\partial p}, J_\nu(px) \right] = \frac{x}{2p} W \left[\frac{x}{p} \frac{\partial J_\nu(px)}{\partial x}, J_\nu(px) \right],$$

где проведена замена $\frac{\partial J_\nu(px)}{\partial p} = \frac{x}{p} \frac{\partial J_\nu(px)}{\partial x}$ (как при выводе формулы (2.48)).

При $p = 1$

$$\int_0^x J_\nu^2(x) x dx = \frac{x}{2} W[x J'_\nu(x), J_\nu(x)].$$

Если $\beta = 0$, то $F_\nu(z) = \alpha J_\nu(z)$ не может иметь кратный нуль $x_0 \neq 0$, так как в этом случае $J_\nu(x_0) = J'_\nu(x_0) = 0$ и определитель Вронского в этой точке был бы равен нулю, что невозможно. Если $\beta > 0$, то

$$\begin{aligned} \int_0^x J_\nu^2(x) x dx &= \frac{x}{2\beta} W[\beta x J'_\nu(x), J_\nu(x)] = \\ &= \frac{x}{2\beta} W[\beta x J'_\nu(x) + \alpha J_\nu(x), J_\nu(x)] = \frac{x}{2\beta} W[F_\nu(x), J_\nu(x)]. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что $F_\nu(x)$ не может иметь кратных нулей. Очевидно, что нули расположены симметрично относительно $z = 0$. Существование счетного множества нулей с точкой сгущения на бесконечности следует из асимптотического представления функций Бесселя при $x \rightarrow +\infty$ и из свойства изолированности нулей аналитической функции.

2.557. У к а з а н и е. Достаточно доказать, что оператор положителен (см. пример 2.20).

2.558. У к а з а н и е. См. пример 2.20 и задачи 2.4, 2.555, 2.556.

2.560. $\omega_{mn} = \sqrt{\frac{T_0}{\rho_0} \frac{\mu_{mn}}{r_0}}$, $v_{mn}(r, \varphi) = (A_{mn} \cos m\varphi + B_{mn} \sin m\varphi) J_m\left(\frac{\mu_{mn}}{r_0} r\right)$, $m \in \mathbb{N}_0$, $n \in \mathbb{N}$, $\mu_{mn} > 0$ — нуль с номером n функции Бесселя $J_m(\mu)$.

2.561. $\omega_{mn} = \sqrt{\frac{T_0}{\rho_0} \frac{\mu_{mn}}{r_0}}$, $v_{mn}(r, \varphi) = A_{mn} \sin \frac{\pi m \varphi}{\alpha} J_{\frac{\pi m}{\alpha}}\left(\frac{\mu_{mn}}{r_0} r\right)$, $m \in \mathbb{N}_0$, $n \in \mathbb{N}$, $\mu_{mn} > 0$ — нуль с номером n функции Бесселя $J_{\frac{\pi m}{\alpha}}(\mu)$.

2.562. $\omega_n = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{g}{l(\nu+1)}} \mu_{\nu n}$. У к а з а н и е. Натяжение струны

$$T(x) = \int_0^l g \rho(x) dx = \frac{lgA}{\nu+1} \left(1 - \frac{x}{l}\right)^{\nu+1},$$

$\omega_k = \sqrt{\lambda_k}$, λ_k — собственные значения задачи (см. пример 1.5)

$$\frac{d}{dx} \left[\left(1 - \frac{x}{l}\right)^{\nu+1} \frac{dX}{dx} \right] + \frac{(\nu+1)\lambda}{lg} \left(1 - \frac{x}{l}\right)^{\nu} X = 0, \quad 0 < x < l,$$

$$X(0) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow l} \left(1 - \frac{x}{l}\right)^{\nu+1} X'(x) = 0.$$

Уравнение для $X(x)$ является частным случаем линейного дифференциального уравнения (2.53), которое в данной ситуации преобразуется в уравнение

Бесселя порядка ν заменой $1 - \frac{x}{l} = \frac{\xi^2 g}{4\lambda l(\nu+1)}$, $X = \xi^{-\nu} v(\xi)$.

2.563. $\omega_1 = \frac{\mu_{01}}{l}$, $X_1(x) = A \frac{x}{|x|} J_0\left(\mu_{01} \left(1 - \frac{|x|}{l}\right)\right)$, $\omega_2 = \frac{\mu_{11}}{l}$,
 $X_2(x) = B J_0\left(\mu_{11} \left(1 - \frac{|x|}{l}\right)\right)$.

2.564. $l_k = \left(\frac{3l_2^2 E \mu_1^2}{4\rho g}\right)^{\frac{1}{3}}$, $\mu_1 > 0$ наименьший корень уравнения $J_{-\frac{1}{3}}(\mu) = 0$.

У к а з а н и е. Уравнение равновесия стержня под действием сил тяжести запишется в виде (см. задачу 1.167).

$$J E u_{xx} = \int_x^l q(u(\xi) - u(x)) d\xi, \quad q = 4l_1 l_2 \rho g,$$

при этом $u'(0) = u''(l) = 0$. После дифференцирования по x и замены $v = u_x$ получается задача на собственные значения

$$v'' + \lambda(l-x)v = 0, \quad 0 < x < l, \quad \lambda = \frac{q}{ES},$$

$$v(0) = v'(l) = 0.$$

Уравнение для v является частным случаем уравнения (2.53).

2.565. $\chi = \frac{r_0}{2L} \frac{I_0\left(\frac{r_0}{L}\right)}{I_1\left(\frac{r_0}{L}\right)}$.

У к а з а н и е. Уравнение диффузии приведено в ответе к задаче 1.245.

2.566. 1) $\Phi_1(r) = \frac{q_0 L}{2\pi D} \frac{I_0\left(\frac{\tilde{r}_0}{L}\right) K_0\left(\frac{r}{L}\right) - K_0\left(\frac{\tilde{r}_0}{L}\right) I_0\left(\frac{r}{L}\right)}{I_0\left(\frac{\tilde{r}_0}{L}\right)}$;

$$2) \Phi_2(r) = \frac{q_0 L}{2\pi D} \frac{\left(I_0\left(\frac{r_0}{L}\right) + \frac{2D}{L} I_1\left(\frac{r_0}{L}\right)\right) K_0\left(\frac{r}{L}\right) - \left(K_0\left(\frac{r_0}{L}\right) - \frac{2D}{L} K_1\left(\frac{r_0}{L}\right)\right) I_0\left(\frac{r}{L}\right)}{\left(I_0\left(\frac{r_0}{L}\right) + \frac{2D}{L} I_1\left(\frac{r_0}{L}\right)\right)},$$

$$\Phi_1(r) \approx \Phi_2(r) \approx \frac{q_0 L}{2\pi D} \frac{I_0\left(\frac{r_0}{L}\right) K_0\left(\frac{r}{L}\right) - K_0\left(\frac{r_0}{L}\right) I_0\left(\frac{r}{L}\right)}{I_0\left(\frac{r_0}{L}\right)},$$

$$L = \sqrt{\frac{D}{\Sigma_c}}, \quad D = \frac{1}{3\Sigma_c}. \quad \text{См. указание к задаче 2.39.}$$

$$2.567. \quad \Phi(r) = \frac{\Phi_0 I_0\left(\frac{r}{L}\right)}{I_0(\varkappa) + \frac{2D}{L} I_1(\varkappa)}, \quad \gamma = \frac{1 - \frac{2D}{L} \frac{I_1(\varkappa)}{I_0(\varkappa)}}{1 + \frac{2D}{L} \frac{I_1(\varkappa)}{I_0(\varkappa)}}, \quad \varkappa = \frac{r_0}{L}, \quad L = \sqrt{\frac{D}{\Sigma_c}}, \quad D = \frac{1}{3\Sigma_c}.$$

$$2.568. \quad 1) \tilde{r}_k = \frac{\mu_{01}}{\alpha}; \quad 2) r_k = \frac{\mu}{\alpha},$$

где $\mu > 0$ — наименьший корень уравнения $J_0(\mu) - \alpha D J_1(\mu) = 0$.

$$2.569. \quad V = \frac{3\sqrt{3}\pi^2\mu_{01}^2}{2\alpha^3}.$$

$$2.570. \quad D_C \sqrt{\alpha_C^2 - \frac{\mu_{01}}{\tilde{r}_0^2}} \operatorname{tg} \sqrt{\alpha^2 - \frac{\mu_{01}}{\tilde{r}_0^2}} l = D_R \sqrt{\frac{1}{L_R^2} + \frac{\mu_{01}}{\tilde{r}_0^2}} \operatorname{cth} \sqrt{\frac{1}{L_R^2} + \frac{\mu_{01}}{\tilde{r}_0^2}} (\tilde{h} - l),$$

где D_C и L_R те же, что в ответе к задаче 2.48.

$$2.571. \quad r_k = \frac{\mu_{01}}{\sqrt{\lambda}}, \quad \text{где } \lambda — \text{корень уравнения (2.89).}$$

$$2.572. \quad r_k = \frac{\mu_{01}}{\sqrt{\lambda}}, \quad \text{где } \lambda — \text{корень уравнения (2.91).}$$

$$2.573. \quad r_k = \sqrt{\frac{D}{\beta}} \mu_{01}.$$

$$2.574. \quad \tau = \left(\frac{r_0}{a\mu_{01}}\right)^2, \quad a^2 = \frac{c^2}{4\pi\mu\sigma}.$$

$$2.575. \quad R_{nm}(r, \varphi, z, t) =$$

$$= A_{nm} J_n \left(\frac{\gamma_{nm} r}{r_0} \right) \cos(n\varphi + \delta_n) \operatorname{ch} \frac{\gamma_{nm}(z + h_0)}{r_0} \cos(\omega_{nm} t + \beta_{nm}),$$

$$\omega_{nm}^2 = \frac{g\gamma_{nm}}{r_0} t h \frac{\gamma_{nm} h_0}{r_0}, \quad \gamma_{nm} > 0 — \text{нуль функции } J'_n(\gamma) = 0, \quad n \in \mathbb{N}_0, \quad m \in \mathbb{N}.$$

У к а з а н и е. См. задачу 1.321, п. 1.

$$2.576. \quad \omega_1 = \frac{2}{l} \sqrt{gh_0} \mu_{01}, \quad \omega_2 = \frac{2}{l} \sqrt{gh_0} \mu_{11}. \quad \text{У к а з а н и е. См. задачу 1.325.}$$

$$2.577. \quad 1) \zeta(x, t) = A \frac{J_0(kx)}{J_0(kl)} \cos \omega t, \quad k = \frac{\omega}{\sqrt{gh_0}};$$

$$2) \zeta(x, t) = A \frac{J_0(2\sqrt{kx})}{J_0(2\sqrt{kl})} \cos \omega t, \quad k = \omega \sqrt{\frac{l}{gh_0}};$$

$$3) \zeta(x, t) A \sqrt{\frac{l}{x}} \frac{J_1(2\sqrt{kx})}{J_1(2\sqrt{kl})} \cos \omega t, \quad k = \omega \sqrt{\frac{l}{gh_0}}.$$

У к а з а н и е. См. задачу 1.326.

$$2.578. \omega_{0TM} = \frac{c}{r_0} \mu_{01} \approx \frac{2,41 c}{r_0}; \quad \omega_{0TE} = \frac{c}{r_0} \mu_{11} \approx \frac{1,84 c}{r_0}.$$

У к а з а н и е. См. задачу 2.58.

$$2.579. \psi_{ns}(r, \varphi) = \frac{1}{r_0 \sqrt{\pi} J_{n+1}(\mu_{ns})} J_n\left(\frac{\mu_{ns} r}{r_0}\right) e^{in\varphi}, \quad E_{ns} = \frac{\hbar^2}{2mr_0^2} \mu_{ns}^2, \quad n \in \mathbb{Z}, \\ s \in \mathbb{N}. \quad \text{У к а з а н и е. Для вычисления нормы собственной функции применить формулу}$$

$$\int_0^l J_\nu^2\left(\frac{\mu x}{l}\right) x dx = \frac{l^2}{2} \left\{ [(J'(\mu))^2] + \left(1 - \frac{\nu^2}{\mu^2}\right) J_\nu^2(\mu) \right\}, \quad \nu > -1, \quad (2.108)$$

которая получается тем же способом, что и соотношение (2.46), полученное в примере 2.20.

$$2.580. u(r, t) = -\frac{2\rho_0 w_0 r_0^2}{T_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_n r}{r_0}\right) \cos \omega_n t}{\mu_n^3 J_1(\mu_n)}, \quad \mu_n > 0 \text{ — нули функции } J_0(\mu), \quad \omega_n = \frac{a\mu_n}{r_0}. \quad \text{Р е ш е н и е (фрагменты). Функция } u(r, t), \text{ описывающая}$$

отклонение точек пленки от положения равновесия, удовлетворяет условиям

$$u_{tt} = a^2 \Delta u, \quad 0 < r < r_0, \quad t > 0, \\ |u(r, t)| < \infty, \quad u(r_0, t) = 0, \\ u(r, 0) = u_0(r), \quad u_t(r, 0) = 0,$$

где $u_0(r)$ — решение стационарной задачи

$$\Delta u - \frac{\rho_0 w_0}{T_0} = 0, \quad 0 < r < r_0, \\ |u_0(r)| < \infty, \quad u(r_0) = 0.$$

Метод Фурье содержит способ построения системы ортогональных функций, которые являются собственными функциями задачи на собственные значения для оператора $\mathcal{L} = -\left(\frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d}{dr}\right) = -\Delta$:

$$\Delta R + \lambda R, \quad 0 < r < r_0, \\ |R(r)| < \infty, \quad R(r_0) = 0.$$

В данном случае собственные значения $\lambda_n = \frac{\mu_n^2}{r_0^2}$, где $\mu_n > 0$ — нули функции Бесселя $J_0(\mu)$, собственные функции $R_n(r) = J_0\left(\frac{\mu_n r}{r_0}\right)$. Функция $u(r, t)$ имеет форму ряда по собственным функциям:

$$u(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t) R_n(r), \quad \omega_n = \frac{a\mu_n}{r_0}.$$

Коэффициенты ряда определяются из начальных условий

$$u(r, 0) = u_0(r) \implies \sum_{n=1}^{\infty} A_n R_n(r) = u_0(r) \implies A_n = \frac{(u_0, R_n)}{\|R_n\|}, \\ u_t(r, 0) = 0 \implies \sum_{n=1}^{\infty} \omega_n B_n R_n(r) = 0 \implies B_n = 0.$$

Так как оператор эрмитов, а функция $u_0(r)$ принадлежит его области определения, то

$$(u_0, R_n) = -\frac{1}{\lambda_n} (u_0, \Delta R_n) = -\frac{1}{\lambda_n} (\Delta u_0, R_n) = -\frac{\rho_0 w_0 r_0^2}{\lambda_n \mu_n^2 T_0} (1, R_n) = -\frac{\rho_0 w_0 r_0^4 J_1(\mu_n)}{\mu_n^3 T_0}.$$

В процессе вычислений использовано уравнение для u_0 ; вычисление интеграла и квадрата нормы собственных функций проведено в примере 2.20. В итоге $A_n = -\frac{2\rho_0 w_0 r_0^2}{T_0 \mu_n^3 J_1(\mu_n)}$. З а м е ч а н и е. При вычислении коэффициентов Фурье функции $u_0(r)$ ее явный вид не понадобился.

$$2.581. \quad u(r, t) = -\frac{2\rho_0 w_0 r_0^2}{T_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_n r}{r_0}\right) \cos \omega_n t}{\mu_n^3 (p^2 + \mu_n^2) J_1(\mu_n)},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $pJ_0(\mu) = \mu J_1(\mu)$, $p = hr_0$, $\omega_n = \frac{a\mu_n}{r_0}$.

$$2.582. \quad u(r, t) = \frac{2I}{\pi a r_1 \rho_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\mu_{0n} r_1}{r_0}\right) J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right)}{\mu_{0n}^2 J_1^2(\mu_{0n})} \sin \frac{\mu_{0n} a}{r_0} t.$$

$$2.583. \quad (r, t) = \frac{F_0}{\pi T_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n} r_1}{r_0}\right) J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right)}{\mu_{0n}^2 J_1^2(\mu_{0n})} \cos \frac{\mu_{0n} a}{r_0} t.$$

$$2.584. \quad u(r, t) = \frac{2p_0 r_0 r_1}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\mu_{0n} r_1}{r_0}\right) J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right) \cos \frac{\mu_{0n} a}{r_0} t}{\mu_{0n}^3 J_1^2(\mu_{0n})}.$$

$$2.585. \quad 1) u_1(r, t) = \frac{It}{m + m_0} - \frac{4Ir_0}{ma} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_n r}{r_0}\right) \sin \frac{a\mu_n}{r_0} t}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + 2p) J_0(\mu_n)};$$

$$2) u_2(r, t) = \frac{It}{m + m_0} + \frac{4Im_0 r_0}{ma^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_n r}{r_0}\right) \sin \frac{a\mu_n}{r_0} t}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + 2p) J_0(\mu_n)};$$

$$3) u_3(r, t) = \frac{mu_1(r, t) + m_0 u_2(r, t)}{m + m_0} I,$$

где $\mu_n > 0$ — корни уравнения $\mu J_0(\mu) + p J_1(\mu) = 0$, $p = \frac{2m_0}{m}$, $m_0 = \pi \rho_0 r_0^2$.

$$2.586. \quad 1) u_1(r, t) = \frac{m_0 h}{2(m + m_0)} - 4hp(p + 2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_n r}{r_0}\right) \cos \frac{a\mu_n}{r_0} t}{\mu_n^3 (\mu_n^2 + p^2 + 2p) J_0(\mu_n)};$$

2) $u_2(r, t) = 8h \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_n r}{r_0}\right) \cos \frac{a\mu_n}{r_0} t}{\mu_n^3 J_1(\mu_n)}$. Обозначения те же, что в ответе к предыдущей задаче. У к а з а н и е к п.1. Решение $u(r, t)$, полученное методом Фурье, имеет форму ряда по собственным функциям оператора $\mathcal{L}$,

$$u(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n R_n(r) \cos \frac{a\mu_n}{r_0} t, \quad \text{где } A_n = \frac{(u_0, \rho R_n)}{\|R_n\|^2},$$

скалярное произведение $(f, g) = \int_0^{r_0} \bar{f} g r dr$, оператор $\mathcal{L}$ здесь определен соотношением $\rho \mathcal{L} f = -\Delta f$, а собственные функции $R_n(r)$ и функция $u_0(r)$ (начальное отклонение мембраны) являются решениями задач

$$\Delta R_n + \lambda_n \rho R_n = 0, \quad 0 < r < r_0, \quad \Delta u_0 = 0, \quad 0 < r < r_0,$$

$$|R_n(0)| < \infty, \quad R'_n(r_0) = 0, \quad |u_0(0)| < \infty, \quad u'_0(r_0) = -\frac{2h}{r_0}.$$

Для вычисления коэффициентов A_n пригоден способ, описанный в ответе к задаче 2.201. В данном случае $u_0(r) \notin \mathcal{M}_{\mathcal{L}}$, поскольку $u'_0 \neq 0$. Пусть

$$\tilde{u}_0(r) = u_0(r), \quad r \in [0, r_0], \quad \tilde{u}'_0(r) = \begin{cases} u'_0(r), & 0 \leq r < r_0, \\ 0, & r = r_0; \end{cases}$$

тогда $\Delta \tilde{u}_0 = -\frac{4h}{r_0^2} + \frac{2h}{r_0} \delta(r - r_0)$. Следовательно, $(\tilde{u}_0, \rho_n R_n) = \frac{1}{\lambda_n} (\tilde{u}_0, \rho \mathcal{L} R_n) = \frac{1}{\lambda_n} (\rho \mathcal{L} \tilde{u}_0, R_n) = \frac{1}{\lambda} (-\Delta u_0, R_n) = \frac{4h}{\lambda_n r_0^2} (1, R_n) - \frac{2h R_n(r_0)}{\lambda_n}$. Для вычисления скалярного произведения $(1, R_n)$ можно исходить из постановки задачи на собственные значения в виде

$$\Delta R_n + \lambda_n R_n = 0, \quad 0 < r < r_0, \quad |R_n(0)| < \infty, \quad \frac{dR_n}{dr} \Big|_{r=r_0} = \frac{\lambda_n r_0}{p} R_n(r_0).$$

В этом случае

$$(1, R_n) = -\frac{1}{\lambda_n} (1, \Delta R_n) = -\frac{1}{\lambda_n} r \frac{dR_n}{dr} \Big|_{r=r_0} = -\frac{r_0^2}{p} R_n(r_0).$$

$$\mathbf{2.587.} \quad 1) u(r, t) = \frac{hr_2^2}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{R_n(r_1) R_n(r) \cos \frac{a\mu_n t}{r_0}}{\mu_n^2 \|R_n\|^2};$$

$$2) u(r, t) = \frac{2hr_2^4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n R_n(r) \cos \frac{a\mu_n t}{r_0}}{(r_2^2 - r_1^2) \mu_n^2 \|R_n\|^2}, \quad a_n = \frac{4}{\mu_n^2} - \frac{\pi(m - m_1)}{m_1 r_2^2} R_n(r_1),$$

функции $R_n(r) = Y_0(\mu_n) J_0\left(\frac{\mu_n}{r_2} r\right) - J_0(\mu_n) Y_0\left(\frac{\mu_n}{r_2} r\right)$ ортогональны с весом $\rho = 1 + \frac{r_2}{p} \delta(r - r_1)$ на $[r_1; r_2]$, $\frac{1}{p} = \frac{m}{2\pi\rho_0 r_1 r_2}$, $\mu_n > 0$ — корни уравнения $R'_n(r_1) = -\frac{\mu_n}{p} R_n(r_1)$, где «штрих» — производная по всему аргументу, $\|R_n\|^2 = \frac{r_2^2}{2} \left[\frac{4}{\pi^2 \mu_n^2} + \left(\frac{m - m_1}{m_2} - \frac{\mu_n^2 m^2}{4m_2^2} \right) R_n^2(r_1) \right]$, $m_1 = \pi\rho_0 r_1^2$, $m_2 = \pi\rho_0 r_2^2$.

У к а з а н и е. Для вычисления коэффициентов A_n ряда

$$u(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n R_n(r) \cos \frac{a\mu_n t}{r_0}, \quad \text{где } A_n = \frac{(u_0, \rho R_n)}{\|R_n\|^2},$$

применима та же техника, что и при решении предыдущей задачи. Следует ввести функцию

$$\tilde{u}_0(r) = u_0(r), \quad r \in [r_1, r_2], \quad \tilde{u}'_0(r) = \begin{cases} 0, & r = r_1, \\ u'_0(r), & r_1 < r \leq r_2, \end{cases}$$

тогда обобщенный оператор Лапласа (см. задачу 10.314, т. 2)

$$1) \Delta \tilde{u}_0 = \frac{h}{r_1^2 \ln \frac{r_1}{r_2}} \delta(r - r_1) \quad \text{и} \quad (\tilde{u}_0, \rho_n R_n) = \frac{1}{\lambda_n} (\rho \mathcal{L} \tilde{u}_0, R_n) = \frac{1}{\lambda} (-\Delta \tilde{u}_0, R_n) = \frac{h R_n(r_1)}{\lambda_n \ln \alpha};$$

$$2) \Delta \tilde{u}_0 = \frac{4h}{r_2^2 - r_1^2} - \frac{2hr_1}{r_2^2 - r_1^2} \delta(r - r_1) \quad \text{и} \quad (\tilde{u}_0, \rho_n R_n) = \frac{4h}{\lambda_n (r_2^2 - r_1^2)} (1, R_n) + \frac{2h}{\lambda_n (r_2^2 - r_1^2)} R_n(r_1).$$

$$\mathbf{2.588.} \quad u(r, t) = \frac{mvr_2^3}{2m_2 a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{R_n(r_1) R_n(r) \sin \frac{a\mu_n t}{r_0}}{\mu_n \|R_n\|^2}, \quad \text{обозначения те же, что и в ответе к предыдущей задаче.}$$

$$2.589. 1) u_1(r, t) = \frac{Ir_2^3}{2am_2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{R_n(r_1)R_n(r) \sin \frac{a\mu_n t}{r_0}}{\mu_n \|R_n\|^2};$$

$$2) u_2(r, t) = \frac{2Ir_2^3}{\pi am_2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{R_n(r) \sin \frac{a\mu_n t}{r_0}}{\mu_n^3 \|R_n\|^2};$$

$$3) u_3(r, t) = \frac{m+m_1}{m+m_2} u_1(r, t) + \frac{m_2-m}{m+m_2} u_2(r, t),$$

$R_n(r) = Y_0(\mu_n)J_0\left(\frac{\mu_n}{r_2}r\right) - J_0\left(\mu_n\right)Y_0\left(\frac{\mu_n}{r_2}r\right)$ ортогональны с весом $\rho = 1 + \frac{r_2}{p}\delta(r-r_1)$ на $[r_1; r_2]$, $\mu_n > 0$ — корни уравнения $R'_n(r_1) = -\frac{\mu_n}{p}R_n(r_1)$,

«штрих» — производная по всему аргументу, $\|R_n\|^2 = \frac{r_2^2}{2} \left[\frac{4}{\pi^2 \mu_n^2} + \left(\frac{m}{m_2} - \frac{\mu_n^2 m^2}{4m_2^2} \right) R_n^2(r_1) \right]$, $\frac{1}{p} = \frac{m}{2\pi\rho_0 r_1 r_2}$, $m_1 = \pi\rho_0 r_1^2$, $m_2 = \pi\rho_0 r_2^2$.

$$2.590. 1) u_1(r, t) = \frac{p_0 r_2^4}{2T_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{R_n(r_1)R_n(r) \cos \frac{a\mu_n t}{r_0}}{\pi \mu_n^2 \|R_n\|^2};$$

$$2) u_2(r, t) = \frac{p_0 r_2^4}{am_2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n R_n(r) \cos \frac{a\mu_n t}{r_0}}{\pi \mu_n^2 \|R_n\|^2},$$

$a_n = \frac{4}{\pi \mu_n^2} - \frac{m}{m_2} R_n(r_1)$, обозначения даны в ответе к задаче 2.587.

$$2.591. u(r, \varphi, t) = 2r_0 V_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\mu_n r}{r_0}\right) \cos \frac{\mu_n at}{r_0}}{\mu_n (\mu^2 - 1) J_0(\mu)} \cos \varphi, \mu_n > 0 \text{ — нуль } J'_1(\mu).$$

$$2.592. u(x, t) = \frac{2I}{a\rho_0 S_0} \left(\frac{at}{l} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\mu_{1n}\left(1 - \frac{x}{l}\right)\right)}{\mu_{1n} J_0(\mu_{1n})} \sin \frac{\mu_{1n} a}{l} t \right).$$

$$2.593. u(x, t) = \frac{m}{m+m_0} V_0 t + \frac{2p l V_0}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\mu_n\left(1 - \frac{x}{l}\right)\right)}{(\mu_n^2 + p^2 + 2p)\mu_n J_0(\mu_n)} \sin \frac{\mu_n a}{l} t,$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu J_0(\mu) + p J_1(\mu) = 0$, $p = \frac{2m_0}{m}$, $m_0 = \frac{\rho_0 S_0 l}{2}$.

$$2.594. u(x, t) = \frac{4F_0}{g\rho_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\mu_{0n}\sqrt{1 - \frac{x_0}{l}}) J_0(\mu_{0n}\sqrt{1 - \frac{x}{l}})}{\mu_{0n}^2 J_1^2(\mu_{0n})} \cos\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{g}{l}} \mu_{0n} t\right).$$

$$2.595. u(x, t) = 8u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\mu_{0n}\sqrt{1 - \frac{x}{l}}\right)}{\mu_{0n}^3 J_1(\mu_{0n})} \cos\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{g}{l}} \mu_{0n} t\right).$$

$$2.596. u(x, t) = \frac{2I}{\rho_0} \sqrt{\frac{\nu+1}{gl}} \frac{1}{\xi_0^\nu \xi^\nu} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu(\mu_{\nu n} \xi_0) J_\nu(\mu_{\nu n} \xi)}{\mu_{\nu n} J_{\nu-1}^2(\mu_{\nu n})} \sin\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{g}{l(\nu+1)}} \mu_{\nu n} t\right),$$

$$\xi = \sqrt{1 - \frac{x}{l}}.$$

$$2.597. \quad u(r, t) = \frac{F_0}{\pi T_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n} r_1}{r_0}\right) J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right)}{\mu_{0n}^2 J_1^2(\mu_{0n})} \left(1 - \cos \frac{\mu_{0n} a}{r_0} t\right).$$

2.598. Если $\omega \neq \omega_n = \frac{\mu_{0n} a}{r_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{\omega F_0}{\pi a r_0 \rho_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n} r_1}{r_0}\right) J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right)}{\mu_{0n} J_1^2(\mu_{0n})} \frac{\cos \omega t - \cos \omega_n t}{\omega_n^2 - \omega^2};$$

если $\omega = \omega_{n_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{\omega F_0}{\pi a r_0 \rho_0} \left[\frac{a J_0\left(\frac{\omega r_1}{a}\right) J_0\left(\frac{\omega r}{a}\right)}{2 r_0 \omega^2 J_1^2\left(\frac{\omega r_0}{a}\right)} t \sin \omega t + \right. \\ \left. + \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n} r_1}{r_0}\right) J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right)}{\mu_{0n} J_1^2(\mu_{0n})} \frac{\cos \omega t - \cos \omega_n t}{\omega_n^2 - \omega^2} \right].$$

$$2.599. \quad u(r, t) = \frac{F_0}{\pi T_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right)}{\mu_{0n}^2 J_1^2(\mu_{0n})} \times \\ \times \left[1 - \cos \frac{\mu_{0n} a}{r_0} t - \left(1 - \cos \frac{\mu_{0n} a}{r_0} (t - t_0)\right) \eta(t - t_0) \right].$$

2.600. Если $\omega \neq \omega_n = \frac{\mu_{0n} a}{r_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{F_0}{\pi a r_0 \rho_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right)}{\mu_{0n} J_1^2(\mu_{0n})} \frac{\omega \sin \omega_n t - \omega_n \sin \omega t}{\omega^2 - \omega_n^2};$$

если $\omega = \omega_{n_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{F_0}{\pi a r_0 \rho_0} \left[\frac{a J_0\left(\frac{\omega r}{a}\right)}{2 r_0 \omega^2 J_1^2\left(\frac{\omega r_0}{a}\right)} (\sin \omega t + \omega t \cos \omega t) + \right. \\ \left. + \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right)}{\mu_{0n} J_1^2(\mu_{0n})} \frac{\omega \sin \omega_n t - \omega_n \sin \omega t}{\omega^2 - \omega_n^2} \right].$$

$$2.601. \quad u(x, t) = \frac{g l^2}{4 a^2} \left[\frac{x}{l} \left(2 - \frac{x}{l}\right) - 8 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\mu_{0n} \left(1 - \frac{x}{l}\right)\right)}{\mu_{0n}^3 J_1(\mu_{0n})} \cos \frac{\mu_{0n} a}{l} t \right] + \\ + \frac{2 l V_0}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\mu_{0n} \left(1 - \frac{x}{l}\right)\right)}{\mu_{0n}^2 J_1(\mu_{0n})} \sin \frac{\mu_{0n} a}{l} t.$$

$$2.602. \quad u(x, t) = \frac{p_0 l}{g \rho_0} \left(\frac{x}{l} - 8 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\mu_{0n} \sqrt{1 - \frac{x}{l}}\right)}{\mu_{0n}^3 J_1(\mu_{0n})} \cos \left(\frac{1}{2} \sqrt{\frac{g}{l}} \mu_{0n} t\right) \right).$$

$$2.603. \quad u(r, t) = 2 a^2 \left[\int_0^t \alpha(\tau) d\tau + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0}\right)}{J_0(\mu_{1n})} \int_0^t \alpha(\tau) \cos \frac{\mu_{1n} a}{r_0} (t - \tau) d\tau \right].$$

2.604. Потенциал скоростей

$$u(r, \varphi, t) = 2aV_0 \sin \varphi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n J_1 \left(\frac{\mu_n r}{r_0} \right)}{(\mu_n^2 - 1) J_1(\mu_n)} \int_0^t \alpha(\tau) \sin \frac{\mu_n a}{r_0} (t - \tau) d\tau,$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $J_1'(\mu) = 0$.

$$\begin{aligned} \mathbf{2.605.} \quad u(r, z, t) = & \frac{a^2 V_0}{2l} \left[\int_0^t \alpha(\tau) (t - \tau) d\tau - 16 \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^m J_0 \left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0} \right) \cos \frac{m\pi}{l} z}{(1 + \delta_{m0}) \mu_{1n}^2 \omega_{mn} J_0(\mu_{1n})} \times \right. \\ & \left. \times \int_0^t \alpha(\tau) \sin \omega_{mn} (t - \tau) d\tau \right], \quad \omega_{mn} = a \sqrt{\left(\frac{\mu_{1n}}{r_0} \right)^2 + \left(\frac{m\pi}{l} \right)^2}. \end{aligned}$$

$$\mathbf{2.606.} \quad u(x, t) = \frac{F_0 t^2}{\rho_0 l S_0} + \frac{F_0 l}{2ES_0} \left(\frac{x^2}{l^2} - \frac{2x}{l} + \frac{1}{2} - 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\mu_{1n}^2 \left(1 - \frac{x}{l} \right) \right)}{\mu_{1n}^2 J_0(\mu_{1n})} \cos \frac{\mu_{1n} a}{l} t \right).$$

$$\begin{aligned} \mathbf{2.607.} \quad 1) \quad u(r, t) = & \frac{Q_0}{\pi k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right)}{\mu_{0n}^2 J_1^2(\mu_{0n})} e^{-\left(\frac{\mu_{0n} a}{r_0} \right)^2 t}; \\ 2) \quad u(r, t) = & \frac{Q_0}{\pi k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_n r}{r_0} \right)}{(\mu_n^2 + p^2) J_0^2(\mu_n)} e^{-\left(\frac{\mu_n a}{r_0} \right)^2 t}, \end{aligned}$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения

$$p J_0(\mu) - \mu J_1(\mu) = 0, \quad p = r_0 h. \quad (2.109)$$

$$\mathbf{2.608.} \quad u(r, t) = \frac{I}{\pi a r_0 \rho} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_n r}{r_0} \right) \sin \frac{\mu_n a}{r_0} t}{(\mu_n^2 + p^2) J_0^2(\mu_n)}, \quad \mu_n — \text{положительный корень}$$

уравнения (2.109).

$$\mathbf{2.609.} \quad u(r, z, t) = 2u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right)}{\mu_{0n} J_1(\mu_{0n})} e^{-a^2 \left(\frac{\pi^2}{l^2} + \frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} \right) t} \sin \frac{\pi z}{l}.$$

$$\mathbf{2.610.} \quad u(r, \varphi, t) = 16u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \left(1 + \frac{1}{4} \mu_{2n}^2 \right) J_0(\mu_{2n})}{\mu_{2n}^4 J_0^2(\mu_{2n})} J_2 \left(\frac{\mu_{2n} r}{r_0} \right) e^{-\left(\frac{\mu_{2n} a}{r_0} \right)^2 t} \cos 2\varphi.$$

$$\mathbf{2.611.} \quad u(r, \varphi, t) = -2u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1 \left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0} \right)}{\mu_{1n} J_0(\mu_{1n})} e^{-\left(\frac{\mu_{1n} a}{r_0} \right)^2 t} \sin \varphi.$$

$$\mathbf{2.612.} \quad u(r, \varphi, t) = -4u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_n^2 - 4) J_1 \left(\frac{\mu_n r}{r_0} \right)}{\mu_n^2 (\mu_n^2 - 1) J_0(\mu_n)} e^{-\left(\frac{\mu_n a}{r_0} \right)^2 t} \sin \varphi, \quad \mu_n > 0 — \text{нуль}$$

функции $J_1'(\mu)$.

$$\mathbf{2.613.} \quad u(r, \varphi, t) = 2(p + 2)u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_2 \left(\frac{\mu_n r}{r_0} \right) e^{-\left(\frac{\mu_n a}{r_0} \right)^2 t}}{(\mu_n^2 + p^2 - 4) J_2(\mu_n)} \cos 2\varphi, \quad \mu_n > 0 — \text{ко-}$$

рень уравнения $\mu J_2'(\mu) + p J_2(\mu) = 0$, $p = r_0 h$.

2.614. 1) $u(r, t) = \frac{2Q_0 r_0^2}{D} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_n r}{r_0}\right) e^{-\frac{D\mu_n^2 t}{r_0^2}}}{\mu_n^3 J_1(\mu_n)}, \mu_n > 0$ — нули функции $J_0(\mu)$;

2) $u(r, t) = \frac{2Q_0 r_0^2}{D} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_n r}{r_0}\right) e^{-\frac{D\mu_n^2 t}{r_0^2}}}{\mu_n^3 (p^2 + \mu_n^2) J_1(\mu_n)}, \mu_n > 0$ — корень уравнения $pJ_0(\mu) = \mu J_1(\mu)$, $p = \frac{\alpha r_0}{D}$, D — коэффициент диффузии.

2.615. $u(r, \varphi, t) = -16u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0}\right)}{\mu_{1n}^3 J_0(\mu_{1n})} \cos \frac{\mu_{1n} a t}{r_0} \sin \varphi.$

2.616. $u(r, \varphi, t) = \frac{4Ir_1}{\pi \rho a r_0} \times$
 $\times \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_{2m+1}\left(\frac{\mu_{mn} r_1}{r_0}\right) J_{2m+1}\left(\frac{\mu_{mn} r}{r_0}\right) \sin(2m+1)\varphi \cos \frac{\mu_{mn} a t}{r_0}}{\mu_{mn} J_{2m+2}^2(\mu_{mn})},$

где $\mu_{mn} > 0$ — нуль функции $J_{2m+1}(\mu)$.

2.617. $u(r, t) = \frac{2p}{r_0^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{p \int_0^{r_0} u_0(r) J_0\left(\frac{\mu_n r}{r_0}\right) r dr + r_0^2 u_0(r_0) J_0(\mu_n)}{(\mu_n^2 + p^2 + 2p) J_0^2(\mu_n)} J_0\left(\frac{\mu_n r}{r_0}\right) e^{-\frac{\mu_n a}{r_0} t},$
 $p = \frac{2\pi r_0^2 \rho_0 C}{C_0}, \quad 0 = \mu_0 < \mu_1 < \mu_2 < \dots$ — корни уравнения $\mu J_0(\mu) + p J_1(\mu) = 0$.

2.618. Если $\alpha \neq \left(\frac{\mu_{0n} a}{r_0}\right)^2$, то

$$u(r, t) = \frac{Q_0 a^2}{k\alpha} \left(\frac{J_0\left(\frac{\sqrt{\alpha} r}{a}\right)}{J_0\left(\frac{\sqrt{\alpha} r_0}{a}\right)} - 1 \right) e^{-\alpha t} - \frac{2Q_0}{k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{\mu_{0n} a}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{0n} \left(\frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} - \frac{\alpha}{a^2}\right) J_1(\mu_{0n})};$$

если $\alpha = \left(\frac{\mu_{0n_0} a}{r_0}\right)^2$, то

$$u(r, t) = \frac{Q_0 a^2}{k r_0 \alpha J_1\left(\frac{\sqrt{\alpha} r_0}{a}\right)} \left[\frac{a}{\sqrt{\alpha}} (1 + 2\alpha t) J_0\left(\frac{\sqrt{\alpha} r}{a}\right) + r J_1\left(\frac{\sqrt{\alpha} r}{a}\right) \right] e^{-\alpha t} +$$

$$+ \frac{Q_0 a^2}{k r_0 \alpha J_1\left(\frac{\sqrt{\alpha} r_0}{a}\right)} r_0 J_1\left(\frac{\sqrt{\alpha} r_0}{a}\right) e^{-\alpha t} - \frac{2Q_0}{k} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{\mu_{0n} a}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{0n} \left(\frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} - \frac{\alpha}{a^2}\right) J_1(\mu_{0n})}.$$

Другая форма ответа:

$$u(r, t) = \frac{2Q_0}{k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right)}{\mu_{0n} \left(\frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} - \frac{\alpha}{a^2}\right) J_1(\mu_{0n})} \left(e^{-\alpha t} - e^{-\left(\frac{\mu_{0n} a}{r_0}\right)^2 t} \right).$$

$$\mathbf{2.619.} \quad u(r, t) = \frac{2pr_0^2 Q_0}{k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_n r}{r_0}\right)}{\mu_n^2(\mu_n^2 + p^2)J_0(\mu_n)} \times \\ \times \left[1 - e^{-\left(\frac{\mu_n a}{r_0}\right)^2 t} - \left(1 - e^{-\left(\frac{\mu_n a}{r_0}\right)^2 (t-t_0)} \right) \eta(t-t_0) \right],$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения (2.109).

$$\mathbf{2.620.} \quad u(r, t) = u_0 \left(1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right)}{\mu_{0n} J_1(\mu_{0n})} e^{-\left(\frac{\mu_{0n} a}{r_0}\right)^2 t} \right).$$

$$\mathbf{2.621.} \quad v(r, t) = \omega r_0 \left[\frac{r}{r_0} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0}\right)}{\mu_{1n} J_0(\mu_{1n})} e^{-\left(\frac{\mu_{1n}}{r_0}\right)^2 \nu t} \right], \quad v(r, \infty) = \omega r_0, \text{ т. е.}$$

жидкость вращается как твердое тело. У к а з а н и е. См. задачу 1.335.

$$\mathbf{2.622.} \quad u(r, t) = u_0 \left[1 - 2p \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_n r}{r_0}\right)}{(\mu_n^2 + p^2)J_0(\mu_n)} e^{-\left(\frac{\mu_n a}{r_0}\right)^2 t} \right],$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения (2.109).

$$\mathbf{2.623.} \quad u(r, t) = \frac{Ar_0^2}{4a^2} \left(\frac{4a^2 t}{r_0^2} + \frac{r^2}{r_0^2} - \frac{p+2}{p} + 8p \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_n r}{r_0}\right)}{\mu_n^2(p^2 + \mu_n^2)J_0(\mu_n)} e^{-\left(\frac{\mu_n a}{r_0}\right)^2 t} \right),$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения (2.109).

$$\mathbf{2.624.} \quad u(r, t) = 2pu_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_n r}{r_0}\right) e^{-D\left(\frac{\mu_n}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_n^2(p^2 + \mu_n^2)J_0(\mu_n)} - \\ - \frac{2hu_1 D}{r_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n^2 J_0\left(\frac{\mu_n r}{r_0}\right)}{\mu_n^2(p^2 + \mu_n^2)J_0(\mu_n)} \frac{e^{-D\left(\frac{\mu_n}{r_0}\right)^2 t} - e^{-\alpha t}}{D\left(\frac{\mu_n}{r_0}\right)^2 - \alpha^2},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения (2.109).

$$\mathbf{2.625.} \quad u(r, \varphi, t) = \frac{2r_0 f_0}{T_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\mu_{1n} r_1}{r_0}\right) J_1\left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0}\right)}{\mu_{1n}^2 J_0^2(\mu_{1n})} \left(1 - \cos \frac{\mu_{1n} a}{r_0} t \right) \cos \varphi.$$

$$\mathbf{2.626.} \quad u(r, \varphi, t) = u_0 \left[\frac{r}{r_0} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0}\right)}{\mu_{1n} J_0(\mu_{1n})} e^{-\left(\frac{\mu_{1n} a}{r_0}\right)^2 t} \right] \sin \varphi.$$

$$\mathbf{2.627.} \quad u(r, \varphi, t) = -\frac{q_0 r_0}{D} \left[\frac{r}{r_0} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\mu_n r}{r_0}\right) e^{-D\left(\frac{\mu_n}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_n(\mu_n^2 - 1)J_0(\mu_n)} \right] \cos \varphi,$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $J_1'(\mu) = 0$.

$$2.628. \quad u(r, \varphi, t) = pu_0 \left[\frac{1}{p+2} \frac{r^2}{r_0^2} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_2\left(\frac{\mu_n}{r_0} r\right) e^{-\left(\frac{\mu_n a}{r_0}\right)^2 t}}{(\mu_n^2 + p^2 - 4) J_2(\mu_n)} \right] \cos 2\varphi,$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu J_2'(\mu) + p J_2(\mu) = 0$, $p = r_0 h$.

$$2.629. \quad u(r, \varphi, t) = -\frac{2q_0 r_0}{D} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\mu_n}{r_0} r\right)}{(\mu_n^2 - 1) J_1(\mu_n)} \times \\ \times \left[1 - e^{-\left(\frac{\mu_n}{r_0}\right)^2 D t} - \left(1 - e^{-\left(\frac{\mu_n}{r_0}\right)^2 D (t-t_0)} \right) \eta(t-t_0) \right] \cos \varphi,$$

$\mu_n > 0$ — нуль функции $J_1'(\mu)$.

$$2.630. \quad 1) u(r, t) = \frac{2p_0 r_0^2}{T_0} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{J_n\left(\frac{\mu_{nk} r}{r_0}\right) \cos \frac{a \mu_{nk} t}{r_0^2}}{\mu_{nk}^3 J_{n+1}(\mu_{nk})} \sin n\varphi, \quad \mu_{nk} > 0 \text{ — нули функ-} \\ \text{ции } J_n(\mu); \quad 2) u(r, t) = \frac{2p_0 r_0^2 (p+n)^2}{T_0} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{J_n\left(\frac{\mu_{nk} r}{r_0}\right) \cos \frac{a \mu_{nk} t}{r_0}}{\mu_{nk}^3 (p^2 + \mu_{nk}^2 - n^2) J_{n+1}(\mu_{nk})} \sin n\varphi, \\ \mu_{nk} > 0 \text{ — корень уравнения } p J_n(\mu) + \mu J_n'(\mu) = 0, \quad p = \frac{k r_0}{T_0}, \quad k \text{ — коэффициент} \\ \text{упругих сил, действующих на край мембраны.}$$

$$2.615. \quad u(r, \varphi, t) = -16u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0}\right)}{\mu_{1n}^3 J_0(\mu_{1n})} \cos \frac{\mu_{1n} a t}{r_0} \sin \varphi.$$

$$2.631. \quad u(r, \varphi, t) = \frac{2q_0 r_0}{k} \left(\frac{r}{2r_0} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\mu_n}{r_0} r\right)}{(\mu_n^2 - 1) J_1(\mu_n)} e^{-\left(\frac{\mu_n a}{r_0}\right)^2 t} \right) \sin \varphi,$$

$\mu_n > 0$ — нуль функции $J_1'(\mu)$.

$$2.632. \quad u(r, \varphi, t) = 2hr_0 A \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\mu_n}{r_0} r\right)}{(p^2 + \mu_n^2 - 1) J_1(\mu_n)} \left(t - \frac{1 - e^{-\left(\frac{\mu_n a}{r_0}\right)^2 t}}{\left(\frac{\mu_n a}{r_0}\right)^2} \right) \cos \varphi,$$

$\mu_n > 0$ — нуль функции $J_1'(\mu)$.

$$2.633. \quad u(r, z, t) = u_0 \left[\frac{I_0\left(\frac{\pi r}{l}\right)}{I_0\left(\frac{\pi r_0}{l}\right)} - \frac{2}{r_0^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_{0n} J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right)}{\left(\frac{\pi^2}{l^2} + \frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2}\right) J_1(\mu_{0n})} e^{-\left(\frac{\mu_{0n} a}{r_0}\right)^2 t} \right] \sin \frac{\pi z}{l}.$$

$$2.634. \quad u(r, z, t) = \frac{8u_0}{r_0^2} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\mu_{0n} J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right) \sin \frac{(2m+1)\pi}{l} z}{(2m+1) \alpha_{nm} J_1(\mu_{0n})} \left(1 - e^{-a^2 \alpha_{nm} t} \right), \\ \alpha_{nm} = \left(\frac{\mu_{0n}}{r_0} \right)^2 + \left(\frac{(2m+1)\pi}{l} \right)^2.$$

$$2.635. \quad u(r, z, t) = \frac{2a^2 u_0}{r_0^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_{0n} J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right)}{J_1(\mu_{0n})} \cdot \frac{e^{-\alpha t} - e^{-a^2 \lambda_n t}}{a^2 \lambda_n - \alpha} \cdot \cos \frac{\pi z}{l},$$

$$\lambda_n = \left(\frac{\mu_{0n}}{r_0} \right)^2 + \left(\frac{\pi}{l} \right)^2. \quad \text{Другая форма ответа:}$$

$$u(r, z, t) = u_0 \left[\frac{I_0 \left(\frac{\beta r}{r_0} \right)}{I_0(\beta)} e^{-\alpha t} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_{0n} J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right) e^{-\left(\frac{\mu_{0n} a}{r} \right)^2 t}}{(\beta^2 + \mu_{0n}^2) J_1(\mu_{0n})} \right] \cos \frac{\pi z}{l}, \quad \beta = \frac{\pi r_0}{l}.$$

$$2.636. \quad u(r, \varphi, z) = -2u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1 \left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0} \right) \operatorname{sh} \frac{\mu_{1n} z}{r_0}}{\mu_{1n} J_0(\mu_{1n}) \operatorname{sh} \frac{\mu_{1n} l}{r_0}} \cos \varphi.$$

$$2.637. \quad \mathbf{j} = -\sigma \nabla u, \quad u(r, z) = C - \frac{I}{\pi \sigma r_0} \left[\frac{z}{r_0} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0} \right) \operatorname{sh} \frac{\mu_{1n} z}{r_0}}{\mu_{1n} J_0^2(\mu_{1n}) \operatorname{ch} \frac{\mu_{1n} l}{r_0}} \right].$$

$$2.638. \quad u(r, z, t) = \frac{4q}{kl} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right) \cos \frac{\pi m}{l} z e^{-a^2 \left(\frac{\pi^2 m^2}{l^2} + \frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} \right) t}}{\mu_{0n} \left(\frac{\pi^2 m^2}{l^2} + \frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} \right) J_1(\mu_{0n}) (1 + \delta_{0m})}.$$

$$2.639. \quad u(r, z) = 2pu_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_n r}{r_0} \right) \operatorname{sh} \frac{\mu_n z}{r_0}}{(\mu_n^2 + p^2) J_0(\mu_n) \operatorname{sh} \frac{\mu_n l}{r_0}}, \quad \mu_n > 0 - \text{корень (2.109)}.$$

$$2.640. \quad u(r, z) = \frac{Q_0}{4k} (r_0^2 - r^2) - \frac{2q_0 r_0}{k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right) \operatorname{ch} \frac{\mu_{0n} z}{r_0}}{\mu_{0n}^2 J_1(\mu_{0n}) \operatorname{sh} \frac{\mu_{0n} l}{r_0}}.$$

$$2.641. \quad u(r, z) = \frac{2Q_0}{\pi k r_1} \left[\frac{r_1 z}{2r_0^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1 \left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0} \right) J_0 \left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0} \right) \operatorname{sh} \frac{\mu_{1n} z}{r_0}}{\mu_{1n}^2 J_0^2(\mu_{1n}) \operatorname{ch} \frac{\mu_{1n} l}{r_0}} \right].$$

$$2.642. \quad u(r, \varphi, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(\frac{r}{r_0} \right)^n \sin n\varphi + \\ + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{a_n J_n \left(\frac{\mu_{nm} r}{r_0} \right) e^{-\left(\frac{\mu_{nm} a}{r_0} \right)^2 t}}{\mu_{nm} J_{n-1}(\mu_{nm})} \sin n\varphi, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(\varphi) \sin n\varphi d\varphi.$$

$$2.643. \quad 1) \quad u(r, \varphi, t) = \frac{2Q_0 r_0^2 (p+n)^2}{k} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{J_n \left(\frac{\mu_{nk} r}{r_0} \right) e^{-\frac{a^2 \mu_{nk}^2 t}{r_0^2}}}{\mu_{nk}^3 J_{n+1}(\mu_{nk})} \sin n\varphi;$$

$$2) \quad u(r, \varphi, t) = \frac{2Q_0 r_0^2 (p+n)^2}{k} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{J_n \left(\frac{\mu_{nk} r}{r_0} \right) e^{-\frac{a^2 \mu_{nk}^2 t}{r_0^2}}}{\mu_{nk}^3 (p^2 + \mu_{nk}^2 - n^2) J_{n+1}(\mu_{nk})} \sin n\varphi,$$

$$\mu_{nk} - \text{корень уравнения } \mu J'_n(\mu) + p J_n(\mu) = 0, \quad p = \frac{\alpha r_0}{k}.$$

2.644. $u(r, \varphi, t) = \frac{8pu_0}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{J_{2n+1}\left(\frac{\gamma_{nm}r}{r_0}\right) \left(1 - e^{-\left(\frac{\gamma_{nm}a}{r_0}\right)^2 t}\right)}{(2n+1)(p^2 + \gamma_{nm}^2 - (2n+1)^2)J_{2n+1}(\gamma_{nm})} \times$
 $\times \sin(2n+1)\varphi, \gamma_{nm} > 0$ — корень уравнения $\gamma J'_{2n+1}(\gamma) + pJ_{2n+1}(\gamma) = 0, p = hr_0$.

2.645. $u(r, \varphi, t) = u_0 \left[\left(\frac{r}{r_0}\right)^\nu - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n}r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{\mu_{\nu n}a}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{\nu n} J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})} \right] \cos \nu \varphi, \quad \nu = \frac{\pi}{\alpha}.$

2.646. 1) $u(r, t) = \frac{gr_0^2}{4a^2} \left[1 - \frac{r^2}{r_0^2} - 8 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n}r}{r_0}\right)}{\mu_{0n}^3 J_1(\mu_{0n})} \cos \frac{\mu_{0n}at}{r_0} \right];$ 2) $u(r, t) = \frac{gt^2}{2};$

3) $u(r, t) = \frac{g}{4a^2} \left[\left(1 + \frac{2}{p}r_0^2 - r^2\right) - \frac{2pgr_0^2}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\gamma}{r_0}\right) \cos \frac{a\gamma t}{r_0}}{\gamma_n^2(\gamma_n^2 + p^2)J_0(\gamma_n)} \right], \gamma_n > 0$ — корень уравнения $\gamma J_1(\gamma) = pJ_0(\gamma), p = hr_0$.

2.647. $u(r, t) = f(r) - \frac{2p_0r_0r_1}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\mu_{0n}r_1}{r_0}\right) J_0\left(\frac{\mu_{0n}r}{r_0}\right) \cos \frac{\mu_{0n}at}{r_0}}{\mu_{0n}^3 J_1^2(\mu_{0n})},$
 $f(r) = \frac{p_0}{4T} \cdot \begin{cases} r_1^2 - r^2 + 2r_1^2 \ln \frac{r_0}{r_1}, & 0 \leq r \leq r_1, \\ 2r_1^2 \ln \frac{r_1}{r}, & r_1 \leq r \leq r_0. \end{cases}$

2.648. 1) $u(r, t) = \frac{p_0r_2^2}{2T_0} \ln \frac{r_2}{r} - u_1(r, t);$ 2) $u(r, t) = \frac{p_0(r_2^2 - r^2)}{4T_0} + \frac{p_0r_1^2}{2T_0} \ln \frac{r}{r_2} -$
 $- u_2(r, t),$ где u_1 и u_2 — решения задачи 2.590.

2.649. 1) $u(r, t) = -\frac{g}{2a^2}(r_2^2 - r^2) - \frac{mg}{2\pi T_0} \ln \frac{r}{r_2} + \frac{2gr_2^4}{\pi a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{R_n(r) \cos \frac{a\mu_n t}{r_0}}{\mu_n^4 \|R_n\|^2},$
 обозначения те же, что и в ответе к задаче 2.589.

2.650. 1) $u(r, t) = \frac{g}{4a^2}(r^2 - r_2^2) + \frac{mg}{2\pi T_0} \ln \frac{r}{r_2} + \frac{F_0r_2^2}{2\pi T_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{R_n(r_1)R_n(r) \cos \frac{a\mu_n t}{r_0}}{\mu_n^2 \|R_n\|^2},$
 обозначения те же, что и в ответе к задаче 2.589.

2.651. 1) $u(r, t) = \frac{g}{4a^2}(r^2 - r_2^2) + \frac{mg}{2\pi T_0} \ln \frac{r}{r_2} + \frac{gr_2^4}{2a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n R_n(r) \cos \frac{a\mu_n t}{r_0}}{\mu_n^2 \|R_n\|^2},$
 $a_n = \frac{4}{\mu_n^2} - \frac{F_0}{m_2g} R_n(r_1),$ обозначения те же, что и в ответе к задаче 2.589.

2.652. $u(r, t) = \frac{q_0r_0}{k} \left(\frac{2a^2t}{r_0^2} + \frac{r^2}{2r_0^2} - \frac{1}{4} \sum_1 \frac{J_0\left(\frac{\mu_{1n}r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{1n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{1n}^2 J_0(\mu_{1n})} \right).$

$$\mathbf{2.653.} \quad 1) \quad u(r, t) = \frac{A}{16a^2}(r_0^4 - r^4) - \frac{2Ar_0^4}{a^2} \sum_1^\infty \frac{(\mu_{0n}^2 - 4)J_0\left(\frac{\mu_{0n}}{r_0}r\right) \cos \frac{a\mu_{0n}t}{r_0}}{\mu_{0n}^5 J_1(\mu_{0n})};$$

$$2) \quad u(r, t) = \frac{A}{16a^2} \left(1 + \frac{4}{p}(r_0^4 - r^4)\right) - \frac{2Ar_0^4}{a^2} \sum_1^\infty \frac{((p+2)\gamma_n^2 - 4p)J_0\left(\frac{\gamma_n}{r_0}r\right) \cos \frac{a\gamma_n t}{r_0}}{\gamma_n^4(p^2 + \gamma_n^2)J_0(\gamma_n)},$$

$\gamma_n > 0$ — корень уравнения $\gamma J_1(\gamma) = pJ_0(\gamma)$, $p = r_0 h$.

$$\mathbf{2.654.} \quad 1) \quad u(r, t) = \frac{A}{36a^2}(r_0^6 - r^6) - \frac{2Ar_0^6}{a^2} \sum_1^\infty \frac{(\mu_{0n}^2 - 8)^2 J_0\left(\frac{\mu_{0n}}{r_0}r\right) \cos \frac{a\mu_{0n}t}{r_0}}{\mu_{0n}^7 J_1(\mu_{0n})};$$

$$2) \quad u(r, t) = \frac{Ar^2}{12a^2} \left(r_0^4 - \frac{r^4}{3}\right) + \frac{Ar_0^4 t^2}{4} - \frac{5Ar_0^6}{144a^2} - \frac{8Ar_0^6}{a^2} \sum_1^\infty \frac{(\mu_{1n}^2 - 8)J_0\left(\frac{\mu_{1n}}{r_0}r\right) \cos \frac{a\mu_{1n}t}{r_0}}{\mu_{1n}^6 J_0(\mu_{1n})};$$

$$3) \quad u(r, t) = \frac{A}{36a^2} \left(1 + \frac{6}{p}(r_0^6 - r^6)\right) - \\ - \frac{2Ar_0^6}{a^2} \sum_1^\infty \frac{((p+4)\gamma_n^4 - 16(p+2)\gamma_n^2 + 64p)J_0\left(\frac{\gamma_n}{r_0}r\right) \cos \frac{a\gamma_n t}{r_0}}{\gamma_n^6(p^2 + \gamma_n^2)J_0(\gamma_n)},$$

$\gamma_n > 0$ — корень уравнения $\gamma J_1(\gamma) = pJ_0(\gamma)$, $p = r_0 h$.

$$\mathbf{2.655.} \quad 1) \quad u(r, t) = \frac{Ar^\nu(r_0^2 - r^2)}{4a^2(\nu+1)} - \frac{2Ar_0^{\nu+2}}{a^2} \sum_{n=1}^\infty \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n}}{r_0}r\right) \cos \frac{a\mu_{\nu n}t}{r_0}}{\mu_{\nu n}^3 J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})};$$

2) если $\nu > 0$, то

$$u(r, t) = \frac{Ar^\nu\left(\frac{\nu+2}{\nu}r_0^2 - r^2\right)}{4a^2(\nu+1)} - \frac{2A\nu r_0^{\nu+2}}{a^2} \sum_{n=1}^\infty \frac{J_\nu\left(\frac{\gamma_n}{r_0}r\right) \cos \frac{a\gamma_n t}{r_0}}{\gamma_n^2(\gamma_n^2 - \nu^2)J_\nu(\gamma_n)},$$

$\gamma_n > 0$ — корень уравнения $J'_\nu(\gamma) = 0$, если $\nu = 0$, то $u(r, t) = \frac{At^2}{2}$;

$$3) \quad u(r, t) = \frac{Ar^\nu\left(\frac{p+\nu+2}{p+\nu}r_0^2 - r^2\right)}{4a^2(\nu+1)} - \\ - \frac{2A(p+\nu)r_0^{\nu+2}}{a^2} \sum_{n=1}^\infty \frac{J_\nu\left(\frac{\gamma_n}{r_0}r\right) \cos \frac{a\gamma_n t}{r_0}}{\gamma_n^2(\gamma_n^2 + p^2 - \nu^2)J_\nu(\gamma_n)},$$

$\gamma_n > 0$ — корень уравнения $\gamma J_\nu(\gamma)' + pJ_\nu(\gamma) = 0$.

$$\mathbf{2.656.} \quad \text{Если } 0 < \beta \neq \frac{\mu_{1n}}{r_0}, \text{ то } u(r, t) = \frac{A}{a^2\beta^2} \left(J_0(\beta r) + \frac{\beta J_1(\beta r_0)r^2}{2r_0}\right) + \\ + \frac{AJ_1(\beta r_0)}{\beta r_0} t^2 - \frac{2AJ_1(\beta r_0)}{a^2\beta^3 r_0} \left(1 + \frac{\beta^2 r_0^2}{8}\right) + \frac{2\beta r_0 AJ_1(\beta r_0)}{a^2} \sum_1^\infty \frac{J_0\left(\frac{\mu_{1n}}{r_0}r\right) \cos \frac{a\mu_{1n}t}{r_0}}{\mu_{1n}^2 \left(\frac{\mu_{1n}^2}{r_0^2} - \beta^2\right) J_0(\mu_{1n})},$$

если $0 < \beta = \frac{\mu_{1m}}{r_0}$, то $u(r, t) = \frac{Ar_0^2}{a^2\mu_{1m}^2} \left(1 - \cos \frac{a\mu_{1m}t}{r_0}\right) J_0\left(\frac{\mu_{1m}}{r_0}r\right)$, если $\beta = 0$,

то $u(r, t) = \frac{At^2}{2}$.

$$\mathbf{2.657.} \quad 1) \quad u(r, t) = \frac{A}{a^2\beta^2} \left(\frac{r^\nu}{r_0^\nu} J_\nu(\beta r_0) - J_\nu(\beta r)\right) - \\ - \frac{2AJ_\nu(\beta r_0)}{a^2} \sum_1^\infty \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n}}{r_0}r\right) \cos \frac{a\mu_{\nu n}t}{r_0}}{\mu_{\nu n} \left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} - \beta^2\right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})} \text{ при условии } \beta \neq \frac{\mu_n^2}{r_0^2},$$

$$u(r, t) = \frac{Ar_0^2}{a^2 \mu_m^2} \left(1 - \cos \frac{a\mu_m t}{r_0}\right) J_\nu\left(\frac{\mu_m r}{r_0}\right) \text{ при условии } \beta = \frac{\mu_m^2}{r_0^2};$$

$$2) u(r, t) = \frac{A}{a^2 \beta^2} \left(J_\nu(\beta r_0) - \frac{\beta r^\nu J'_\nu(\beta r_0)}{\nu r_0^{\nu-1}} \right) - \\ - \frac{2A\beta r_0 J'_\nu(\beta r_0)}{a^2} \sum_1^\infty \frac{J_\nu\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) \cos \frac{a\gamma_n t}{r_0}}{(\gamma_n^2 - \nu^2) \left(\frac{\gamma_n^2}{r_0^2} - \beta^2\right) J_\nu(\gamma_n)}$$

при $\beta \neq \frac{\gamma_n^2}{r_0^2}$, $\gamma_n > 0$ — нуль $J'_\nu(\gamma)$,

если $\beta = \frac{\gamma_m^2}{r_0^2}$, то $u(r, t) = \frac{Ar_0^2}{a^2 \gamma_m^2} \left(1 - \cos \frac{a\gamma_m t}{r_0}\right) J_\nu\left(\frac{\gamma_m r}{r_0}\right)$;

$$3) u(r, t) = \frac{A}{a^2 \beta^2} \left(J_\nu(\beta r) - \frac{\beta r_0 J'_\nu(\beta r_0) + p J_\nu(\beta r_0) r^\nu}{(p + \nu) r_0^\nu} \right) - \\ - \frac{2A}{a^2} (\beta r_0 J'_\nu(\beta r_0) + p J_\nu(\beta r_0)) \sum_1^\infty \frac{J_\nu\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) \cos \frac{a\gamma_n t}{r_0}}{(\gamma_n^2 - \nu^2) \left(\frac{\gamma_n^2}{r_0^2} - \beta^2\right) J_\nu(\gamma_n)}$$

при $\beta \neq \frac{\gamma_n^2}{r_0^2}$, где $\gamma_n > 0$ — корень уравнения $\gamma J'_\nu(\gamma) + p J_\nu(\gamma) = 0$, $p = hr_0$,

$$u(r, t) = \frac{Ar_0^2}{a^2 \gamma_m^2} \left(1 - \cos \frac{a\gamma_m t}{r_0}\right) J_\nu\left(\frac{\gamma_m r}{r_0}\right) \text{ при } \beta = \frac{\gamma_m^2}{r_0^2}.$$

$$\mathbf{2.658.} \quad u(r, t) = \frac{A}{a^2 \beta^2} \left(\frac{\beta I_1(\beta r_0)}{2r_0} r^2 - I_0(\beta r) \right) + \frac{AI_1(\beta r_0)}{\beta r_0} t^2 - \frac{2AI_1(\beta r_0)}{a^2 \beta^3 r_0} \left(1 + \frac{\beta^2 r_0^2}{8}\right) + \\ + \frac{2\beta r_0 AI_1(\beta r_0)}{a^2} \sum_1^\infty \frac{J_0\left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0}\right) \cos \frac{a\mu_{1n} t}{r_0}}{\mu_{1n}^2 \left(\frac{\mu_{1n}^2}{r_0^2} + \beta^2\right) J_0(\mu_{1n})}, \text{ если } \beta = 0, \text{ то } u(r, t) = \frac{At^2}{2}.$$

$$\mathbf{2.659.} \quad 1) u(r, t) = \frac{A}{a^2 \beta^2} \left(I_\nu(\beta r) - \frac{r^\nu}{r_0^\nu} I_\nu(\beta r_0) \right) - \\ - \frac{2AI_\nu(\beta r_0)}{a^2} \sum_1^\infty \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right) \cos \frac{a\mu_{\nu n} t}{r_0}}{\mu_{\nu n} \left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} + \beta^2\right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})}; \\ 2) u(r, t) = \frac{A}{a^2 \beta^2} \left(\frac{\beta r^\nu I'_\nu(\beta r_0)}{\nu r_0^{\nu-1}} - I_\nu(\beta r) \right) - \\ - \frac{2A\beta r_0 I'_\nu(\beta r_0)}{a^2} \sum_1^\infty \frac{J_\nu\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) \cos \frac{a\gamma_n t}{r_0}}{(\gamma_n^2 - \nu^2) \left(\frac{\gamma_n^2}{r_0^2} + \beta^2 gr\right) J_\nu(\gamma_n)},$$

где $\gamma_n > 0$ — нуль $J'_\nu(\gamma)$;

$$3) u(r, t) = \frac{A}{a^2 \beta^2} \left(\frac{\beta r_0 I'_\nu(\beta r_0) + p I_\nu(\beta r_0) r^\nu}{(p + \nu) r_0^\nu} - I_\nu(\beta r) \right) - \\ - \frac{2A}{a^2} (\beta r_0 I'_\nu(\beta r_0) + p I_\nu(\beta r_0)) \sum_1^\infty \frac{J_\nu\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) \cos \frac{a\gamma_n t}{r_0}}{(\gamma_n^2 - \nu^2) \left(\frac{\gamma_n^2}{r_0^2} + \beta^2\right) J_\nu(\gamma_n)},$$

где $\gamma_n > 0$ — корень уравнения $\gamma J'_\nu(\gamma) + p J_\nu(\gamma) = 0$, $p = hr_0$.

$$\mathbf{2.660.} \quad u(r, t) = \frac{Ar^2}{r_0} + \frac{a^2 At^2}{r_0} - \frac{Ar_0}{2} - 4Ar_0 \sum_1^\infty \frac{J_0\left(\frac{\mu_{1n}}{r_0}r\right) \cos \frac{a\mu_{2n}t}{r_0}}{\mu_{1n}^2 J_0(\mu_{1n})}.$$

$$\mathbf{2.661.} \quad 1) \quad u(r, t) = \frac{Ar^\nu}{r_0^\nu} - 2A \sum_1^\infty \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n}}{r_0}r\right) \cos \frac{a\mu_{\nu n}t}{r_0}}{\mu_{\nu n} J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})};$$

$$2) \quad u(r, t) = \frac{Ar^\nu}{\nu r_0^{\nu-1}} - 2Ar_0 \sum_1^\infty \frac{J_\nu\left(\frac{\gamma_n}{r_0}r\right) \cos \frac{a\gamma_n t}{r_0}}{\gamma_n (\gamma_n^2 - \nu^2) J_\nu(\gamma_n)}, \quad \gamma_n > 0 - \text{нуль } J'_\nu(\gamma), \quad \nu > 0;$$

$$3) \quad u(r, t) = \frac{Ar^\nu}{(\nu + p)r_0^{\nu-1}} - 2Ar_0 \sum_1^\infty \frac{J_\nu\left(\frac{\gamma_n}{r_0}r\right) \cos \frac{a\gamma_n t}{r_0}}{((p^2 - \nu^2 + \gamma_n^2) J_\nu(\gamma_n))},$$

$\gamma_n > 0$ — корень уравнения $\gamma J'_\nu(\gamma) + p J_\nu(\gamma) = 0$, $p = hr$.

$$\mathbf{2.662.} \quad 1) \quad u(r, t) = \frac{Q_0}{4k}(r_0^2 - r^2) - \frac{2Q_0 r_0^2}{k} \sum_{n=1}^\infty \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n}}{r_0}r\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{0n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{0n}^3 J_1(\mu_{0n})};$$

$$2) \quad u(r, t) = \frac{Q_0 t}{C\rho};$$

$$3) \quad u(r, t) = \frac{Q_0}{4k} \left[\left(1 + \frac{2}{p}\right) r_0^2 - r^2 \right] - \frac{2p r_0^2 Q_0}{k} \sum_{n=1}^\infty \frac{J_0\left(\frac{\gamma_n}{r_0}r\right) e^{-\left(\frac{a\gamma_n}{r_0}\right)^2 t}}{\gamma_n^2 (\gamma_n^2 + p^2) J_0(\gamma_n)},$$

$$\gamma_n > 0 - \text{корень уравнения } \gamma J_1(\gamma) = p J_0(\gamma), \quad p = hr_0.$$

$$\mathbf{2.663.} \quad 1) \quad u(r, t) = \frac{A}{16a^2}(r_0^4 - r^4) - \frac{2Ar_0^4}{a^2} \sum_1^\infty \frac{(\mu_{0n}^2 - 4) J_0\left(\frac{\mu_{0n}}{r_0}r\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{0n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{0n}^5 J_1(\mu_{0n})};$$

$$2) \quad u(r, t) = \frac{Ar^2}{8a^2} \left(r_0^2 - \frac{r^2}{2} \right) + \frac{Ar_0^2 t}{2} - \frac{Ar_0^4}{24a^2} - \frac{2Ar_0^4}{a^2} \sum_1^\infty \frac{J_0\left(\frac{\mu_{1n}}{r_0}r\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{1n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{1n}^4 J_0(\mu_{1n})};$$

$$3) \quad u(r, t) = \frac{A}{16a^2} \left(\left(1 + \frac{4}{p}\right) r_0^4 - r^4 \right) - \frac{2Ar_0^4}{a^2} \sum_1^\infty \frac{((p+2)\gamma_n^2 - 4p) J_0\left(\frac{\gamma_n}{r_0}r\right) e^{-\left(\frac{a\gamma_n}{r_0}\right)^2 t}}{\gamma_n^4 (p^2 + \gamma_n^2) J_0(\gamma_n)},$$

$\gamma_n > 0$ — корень уравнения $\gamma J'_\nu(\gamma) + p J_\nu(\gamma) = 0$, $p = hr$.

$$\mathbf{2.664.} \quad 1) \quad u(r, t) = \frac{A}{36a^2}(r_0^6 - r^6) - \frac{2Ar_0^6}{a^2} \sum_1^\infty \frac{(\mu_{0n}^2 - 8)^2 J_0\left(\frac{\mu_{0n}}{r_0}r\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{0n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{0n}^7 J_1(\mu_{0n})};$$

$$2) \quad u(r, t) = \frac{Ar^2}{12a^2} \left(r_0^4 - \frac{r^4}{3} \right) + \frac{Ar_0^4 t}{2} - \frac{5Ar_0^6}{144a^2} - \frac{8Ar_0^6}{a^2} \sum_1^\infty \frac{(\mu_{1n}^2 - 8) J_0\left(\frac{\mu_{1n}}{r_0}r\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{1n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{1n}^6 J_0(\mu_{1n})};$$

$$3) \quad u(r, t) = \frac{A}{36a^2} \left(1 + \frac{6}{p} (r_0^6 - r^6) \right) -$$

$$- \frac{2Ar_0^6}{a^2} \sum_1^\infty \frac{((p+4)\gamma_n^4 - 16(p+2)\gamma_n^2 + 64p) J_0\left(\frac{\gamma_n}{r_0}r\right) e^{-\left(\frac{a\gamma_n}{r_0}\right)^2 t}}{\gamma_n^6 (p^2 + \gamma_n^2) J_0(\gamma_n)},$$

$$\gamma_n > 0 - \text{корень уравнения } \gamma J_1(\gamma) = p J_0(\gamma), \quad p = r_0 h.$$

2.665. 1) $u(r, t) = \frac{Ar^\nu(r_0^2 - r^2)}{4a^2(\nu + 1)} - \frac{2Ar_0^{\nu+2}}{a^2} \sum_1^\infty \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n}}{r_0}r\right)e^{-\left(\frac{a\mu_{\nu n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{\nu n}^3 J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})};$
 2) $u(r, t) = \frac{Ar^\nu}{4a^2(\nu + 1)}\left(\frac{\nu + 2}{\nu}r_0^2 - r^2\right) - \frac{2\nu Ar_0^{\nu+2}}{a^2} \sum_1^\infty \frac{J_\nu\left(\frac{\gamma_n}{r_0}r\right)e^{-\left(\frac{a\gamma_n}{r_0}\right)^2 t}}{\gamma_n^2(\gamma_n^2 - \nu^2)J_\nu(\gamma_n)},$
 $\gamma_n > 0$ — нуль функции $J'_\nu(\gamma)$; 3) $u(r, t) = \frac{Ar^\nu}{4a^2(\nu + 1)}\left(\frac{p + \nu + 2}{p + \nu}r_0^2 - r^2\right) -$
 $-\frac{2(p + \nu)Ar_0^{\nu+2}}{a^2} \sum_1^\infty \frac{((p + 2)\gamma_n^2 - 4p)J_\nu\left(\frac{\gamma_n}{r_0}r\right)e^{-\left(\frac{a\gamma_n}{r_0}\right)^2 t}}{\gamma_n^2((p^2 - \nu^2 + \gamma_n^2)J_\nu(\gamma_n))},$ $\gamma_n > 0$ — корень уравнения $\gamma J'_\nu(\gamma) + p J_\nu(\gamma) = 0$, $p = hr$.

2.666. Если $0 < \beta \neq \frac{\mu_{1n}}{r_0}$, то $u(r, t) = \frac{A}{a^2\beta^2}\left(J_0(\beta r) + \frac{\beta J_1(\beta r_0)}{2r_0}r^2\right) +$
 $+\frac{AJ_1(\beta r_0)}{\beta r_0}t^2 - \frac{2AJ_1(\beta r_0)}{a^2\beta^3 r_0}\left(1 + \frac{\beta^2 r_0^2}{8}\right) + \frac{2\beta r_0 AJ_1(\beta r_0)}{a^2} \sum_1^\infty \frac{J_0\left(\frac{\mu_{1n}}{r_0}r\right)e^{-\left(\frac{a\mu_{1n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{1n}^2\left(\frac{\mu_{1n}^2}{r_0^2} - \beta^2\right)J_0(\mu_{1n})};$
 если $0 < \beta = \frac{\mu_{1m}}{r_0}$, то $u(r, t) = \frac{Ar_0^2}{a^2\mu_{1m}^2}\left(1 - e^{-\left(\frac{a\mu_{1m}}{r_0}\right)^2 t}\right)J_0\left(\frac{\mu_{1m}}{r_0}r\right);$
 если $\beta = 0$, то $u(r, t) = \frac{At^2}{2}.$

2.667. 1) $u(r, t) = \frac{A}{a^2\beta^2}\left(\frac{r^\nu}{r_0^\nu}J_\nu(\beta r_0) - J_\nu(\beta r)\right) -$
 $-\frac{2AJ_\nu(\beta r_0)}{a^2} \sum_1^\infty \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n}}{r_0}r\right)e^{-\left(\frac{a\mu_{\nu n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{\nu n}\left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} - \beta^2\right)J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})}$ для $\beta \neq \frac{\mu_n^2}{r_0^2},$
 если $\beta = \frac{\mu_{\nu m}^2}{r_0^2}$, то $u(r, t) = \frac{Ar_0^2}{a^2\mu_{\nu m}^2}\left(1 - e^{-\left(\frac{a\mu_{\nu m}}{r_0}\right)^2 t}\right)J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu m}}{r_0}r\right);$
 2) $u(r, t) = \frac{A}{a^2\beta^2}\left(J_\nu(\beta r_0) - \frac{\beta r^\nu J'_\nu(\beta r_0)}{\nu r_0^{\nu-1}}\right) -$
 $-\frac{2A\beta r_0 J'_\nu(\beta r_0)}{a^2} \sum_1^\infty \frac{J_\nu\left(\frac{\gamma_n}{r_0}r\right)e^{-\left(\frac{a\gamma_n}{r_0}\right)^2 t}}{(\gamma_n^2 - \nu^2)\left(\frac{\gamma_n^2}{r_0^2} - \beta^2\right)J_\nu(\gamma_n)}$ при $\beta \neq \frac{\gamma_n^2}{r_0^2},$
 $\gamma_n > 0$ — нуль $J'_\nu(\gamma)$, если $\beta = \frac{\gamma_m^2}{r_0^2}$, то $u(r, t) = \frac{Ar_0^2}{a^2\gamma_m^2}\left(1 - e^{-\left(\frac{a\gamma_m}{r_0}\right)^2 t}\right)J_\nu\left(\frac{\gamma_m}{r_0}r\right);$
 3) $u(r, t) = \frac{A}{a^2\beta^2}\left(J_\nu(\beta r) - \frac{\beta r_0 J'_\nu(\beta r_0) + p J_\nu(\beta r_0)r^\nu}{(p + \nu)r_0^\nu}\right) - \frac{2A}{a^2}(\beta r_0 J'_\nu(\beta r_0) +$
 $+ p J_\nu(\beta r_0)) \sum_1^\infty \frac{J_\nu\left(\frac{\gamma_n}{r_0}r\right)e^{-\left(\frac{a\gamma_n}{r_0}\right)^2 t}}{(\gamma_n^2 - \nu^2)\left(\frac{\gamma_n^2}{r_0^2} - \beta^2\right)J_\nu(\gamma_n)},$

при $\beta \neq \frac{\gamma_n^2}{r_0^2}$, где $\gamma_n > 0$ — корень уравнения $\gamma J'_\nu(\gamma) + p J_\nu(\gamma) = 0$, $p = hr_0$,
если $\beta = \frac{\gamma_m^2}{r_0^2}$, то $u(r, t) = \frac{Ar_0^2}{a^2 \gamma_m^2} \left(1 - e^{-\left(\frac{a\gamma_m}{r_0}\right)^2 t} \right) J_\nu\left(\frac{\gamma_m}{r_0} r\right)$.

$$\mathbf{2.668.} \quad u(r, t) = \frac{A}{a^2 \beta^2} \left(\frac{\beta I_1(\beta r_0)}{2r_0} r^2 - I_0(\beta r) \right) + \frac{A I_1(\beta r_0)}{\beta r_0} t^2 - \frac{2A I_1(\beta r_0)}{a^2 \beta^3 r_0} \left(1 + \frac{\beta^2 r_0^2}{8} \right) + \frac{2\beta r_0 A I_1(\beta r_0)}{a^2} \sum_1 \frac{J_0\left(\frac{\mu_{1n}}{r_0} r\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{1n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{1n}^2 \left(\frac{\mu_{1n}^2}{r_0^2} + \beta^2 \right) J_0(\mu_{1n})}, \text{ если } \beta = 0, \text{ то } u(r, t) = \frac{At^2}{2}.$$

$$\mathbf{2.669.} \quad 1) u(r, t) = \frac{A}{a^2 \beta^2} \left(I_\nu(\beta r) - \frac{r^\nu}{r_0^\nu} I_\nu(\beta r_0) \right) - \frac{2A I_\nu(\beta r_0)}{a^2} \sum_1 \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n}}{r_0} r\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{\nu n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{\nu n} \left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} + \beta^2 \right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})};$$

$$2) u(r, t) = \frac{A}{a^2 \beta^2} \left(\frac{\beta r^\nu I'_\nu(\beta r_0)}{\nu r_0^{\nu-1}} - I_\nu(\beta r) \right) - \frac{2A \beta r_0 I'_\nu(\beta r_0)}{a^2} \sum_1 \frac{J_\nu\left(\frac{\gamma_n}{r_0} r\right) e^{-\left(\frac{a\gamma_n}{r_0}\right)^2 t}}{(\gamma_n^2 - \nu^2) \left(\frac{\gamma_n^2}{r_0^2} + \beta^2 \right) J_\nu(\gamma_n)}, \text{ где } \gamma_n > 0 \text{ — нуль } J'_\nu(\gamma);$$

$$3) u(r, t) = \frac{A}{a^2 \beta^2} \left(\frac{\beta r_0 I'_\nu(\beta r_0) + p I_\nu(\beta r_0)}{(p + \nu) r_0^\nu} r^\nu - I_\nu(\beta r) \right) - \frac{2A}{a^2} (\beta r_0 I'_\nu(\beta r_0) + p I_\nu(\beta r_0)) \sum_1 \frac{J_\nu\left(\frac{\gamma_n}{r_0} r\right) e^{-\left(\frac{a\gamma_n}{r_0}\right)^2 t}}{(\gamma_n^2 - \nu^2) \left(\frac{\gamma_n^2}{r_0^2} + \beta^2 \right) J_\nu(\gamma_n)},$$

где $\gamma_n > 0$ — корень уравнения $\gamma J'_\nu(\gamma) + p J_\nu(\gamma) = 0$, $p = hr_0$.

$$\mathbf{2.670.} \quad 1) u(r, t) = \frac{Ar^\nu}{r_0^\nu} - 2A \sum_1 \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n}}{r_0} r\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{\nu n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{\nu n} J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})};$$

$$2) u(r, t) = \frac{Ar^\nu}{\nu r_0^{\nu-1}} - 2A r_0 \sum_1 \frac{J_\nu\left(\frac{\gamma_n}{r_0} r\right) e^{-\left(\frac{a\gamma_n}{r_0}\right)^2 t}}{\gamma_n (\gamma_n^2 - \nu^2) J_\nu(\gamma_n)}, \quad \gamma_n > 0 \text{ — нуль } J'_\nu(\gamma);$$

$$3) u(r, t) = \frac{Ar^\nu}{(\nu + p) r_0^{\nu-1}} - 2A r_0 \sum_1 \frac{J_\nu\left(\frac{\gamma_n}{r_0} r\right) e^{-\left(\frac{a\gamma_n}{r_0}\right)^2 t}}{((p^2 - \nu^2 + \gamma_n^2) J_\nu(\gamma_n))}, \quad \gamma_n > 0 \text{ — корень уравнения } \gamma J'_\nu(\gamma) + p J_\nu(\gamma) = 0, \quad p = hr.$$

$$\mathbf{2.671.} \quad u(r, t) = \frac{F_0}{\rho} J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right) \cdot \begin{cases} \frac{\cos \omega t - \cos \omega_n t}{\omega_n^2 - \omega^2}, & \omega \neq \omega_n = \frac{a\mu_{0n}}{r_0}, \\ \frac{t \sin \omega t}{2\omega}, & \omega = \omega_n. \end{cases}$$

$$2.672. u(r, t) = \frac{F_0}{\rho} J_0 \left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0} \right) \cdot \begin{cases} \frac{\omega_n \sin \omega t - \omega \sin \omega_n t}{\omega_n (\omega_n^2 - \omega^2)}, & \omega \neq \omega_n = \frac{a \mu_{1n}}{r_0}, \\ \frac{\sin \omega t - \omega t \cos \omega t}{2\omega^2}, & \omega = \omega_n. \end{cases}$$

$$2.673. u(r, t) = \frac{F_0}{\rho} J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right) \cdot \begin{cases} \frac{\omega_n \sin \omega t - \omega \sin \omega_n t}{\omega_n (\omega_n^2 - \omega^2)}, & \omega \neq \omega_n = \sqrt{\frac{k}{\alpha} + \frac{a^2 \mu_{0n}^2}{r_0^2}}, \\ \frac{\sin \omega t - \omega t \cos \omega t}{2\omega^2}, & \omega = \omega_n. \end{cases}$$

$$2.674. u(r, t) = \frac{F_0}{\rho} J_0 \left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0} \right) \cdot \begin{cases} \frac{\cos \omega t - \cos \omega_n t}{\omega_n^2 - \omega^2}, & \omega \neq \omega_n = \sqrt{\frac{k}{\alpha} + \frac{a^2 \mu_{1n}^2}{r_0^2}}, \\ \frac{t \sin \omega t}{2\omega}, & \omega = \omega_n. \end{cases}$$

$$2.675. u(r, t) = \frac{F_0}{\rho} J_m \left(\frac{\mu_{mn} r}{r_0} \right) \sin m\varphi \cdot \begin{cases} \frac{\cos \omega t - \cos \omega_n t}{\omega_n^2 - \omega^2}, & \omega \neq \omega_n = \frac{a \mu_{mn}}{r_0}, \\ \frac{t \sin \omega t}{2\omega}, & \omega = \omega_n. \end{cases}$$

$$2.676. u(r, t) = \frac{F_0}{\rho} J_m \left(\frac{\gamma_{mn} r}{r_0} \right) \cos m\varphi \cdot \begin{cases} \frac{\omega_n \sin \omega t - \omega \sin \omega_n t}{\omega_n (\omega_n^2 - \omega^2)}, & \omega \neq \omega_n = \frac{a \gamma_{mn}}{r_0}, \\ \frac{\sin \omega t - \omega t \cos \omega t}{2\omega^2}, & \omega = \omega_n. \end{cases}$$

$$2.677. u(r, t) = \frac{F_0}{\rho} J_m \left(\frac{\mu_{mn} r}{r_0} \right) \sin m\varphi \times \\ \times \begin{cases} \frac{\cos \omega t - \cos \omega_n t}{\omega_n^2 - \omega^2}, & \omega \neq \omega_n = \sqrt{\frac{k}{\rho} + \frac{a^2 \mu_{mn}^2}{r_0^2}}, \\ \frac{t \sin \omega t}{2\omega}, & \omega = \omega_n. \end{cases}$$

$$2.678. u(r, t) = \frac{F_0}{\rho} J_m \left(\frac{\gamma_{mn} r}{r_0} \right) \cos m\varphi \times \\ \times \begin{cases} \frac{\omega_n \sin \omega t - \omega \sin \omega_n t}{\omega_n (\omega_n^2 - \omega^2)}, & \omega \neq \omega_n = \sqrt{\frac{k}{\rho} + \frac{a^2 \gamma_{mn}^2}{r_0^2}}, \\ \frac{\sin \omega t - \omega t \cos \omega t}{2\omega^2}, & \omega = \omega_n. \end{cases}$$

$$2.679. u(r, t) = \frac{Q_0}{C\rho} J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right) \cdot \begin{cases} \frac{e^{-\alpha t} - e^{-\alpha_n t}}{\alpha_n - \alpha}, & \alpha \neq \alpha_n = \left(\frac{a \mu_{0n}}{r_0} \right)^2, \\ t e^{-\alpha t}, & \alpha = \alpha_n. \end{cases}$$

$$2.680. u(r, t) = \frac{Q_0}{C\rho} J_0 \left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0} \right) \cdot \begin{cases} \frac{e^{-\alpha t} - e^{-\alpha_n t}}{\alpha_n - \alpha}, & \alpha \neq \alpha_n = \left(\frac{a \mu_{0n}}{r_0} \right)^2, \\ t e^{-\alpha t}, & \alpha = \alpha_n. \end{cases}$$

$$2.681. u(r, t) = Q_0 J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right) \cdot \begin{cases} \frac{e^{-\alpha t} - e^{-\alpha_n t}}{\alpha_n - \alpha}, & \alpha \neq \alpha_n = \beta + \frac{D \mu_{0n}^2}{r_0^2}, \\ t e^{-\alpha t}, & \alpha = \alpha_n. \end{cases}$$

$$2.682. u(r, t) = Q_0 J_0 \left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0} \right) \cdot \begin{cases} \frac{e^{-\alpha t} - e^{-\alpha_n t}}{\alpha_n - \alpha}, & \alpha \neq \alpha_n = \beta + \frac{D \mu_{1n}^2}{r_0^2}, \\ t e^{-\alpha t}, & \alpha = \alpha_n. \end{cases}$$

$$\mathbf{2.683.} \quad u(r, t) = Q_0 J_m \left(\frac{\mu_{mn} r}{r_0} \right) \sin m\varphi \cdot \begin{cases} \frac{e^{-\alpha t} - e^{-\alpha_n t}}{\alpha_n - \alpha}, & \alpha \neq \alpha_n = \frac{D\mu_{mn}^2}{r_0^2}, \\ te^{-\alpha t}, & \alpha = \alpha_n. \end{cases}$$

$$\mathbf{2.684.} \quad u(r, t) = Q_0 J_m \left(\frac{\gamma_{mn} r}{r_0} \right) \cos m\varphi \cdot \begin{cases} \frac{e^{-\alpha t} - e^{-\alpha_n t}}{\alpha_n - \alpha}, & \alpha \neq \alpha_n = \frac{D\gamma_{mn}^2}{r_0^2}, \\ te^{-\alpha t}, & \alpha = \alpha_n. \end{cases}$$

$$\mathbf{2.685.} \quad u(r, t) = Q_0 J_m \left(\frac{\gamma_{mn} r}{r_0} \right) \sin m\varphi \cdot \begin{cases} \frac{e^{-\alpha t} - e^{-\alpha_n t}}{\alpha_n - \alpha}, & \alpha \neq \alpha_n = \beta + \frac{D\mu_{mn}^2}{r_0^2}, \\ te^{-\alpha t}, & \alpha = \alpha_n. \end{cases}$$

$$\mathbf{2.686.} \quad u(r, t) = Q_0 J_m \left(\frac{\mu_{mn} r}{r_0} \right) \cos m\varphi \cdot \begin{cases} \frac{e^{-\alpha t} - e^{-\alpha_n t}}{\alpha_n - \alpha}, & \alpha \neq \alpha_n = \beta + \frac{D\gamma_{mn}^2}{r_0^2}, \\ te^{-\alpha t}, & \alpha = \alpha_n. \end{cases}$$

$$\mathbf{2.687.} \quad 1) \quad u(r, t) = \frac{A}{4a^2} (r_0^2 - r^2) t - \frac{2Ar_0^3}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right) \cos \frac{\mu_{0n} at}{r_0}}{\mu_{0n}^4 J_1(\mu_{0n})};$$

$$2) \quad u(r, t) = \frac{A}{4a^2} (r_0^2 - r^2) t^2 - \frac{A}{32a^4} (r_0^2 - r^2) (3r_0^2 - r^2) + \frac{4Ar_0^4}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right) \cos \frac{\mu_{0n} at}{r_0}}{\mu_{0n}^5 J_1(\mu_{0n})};$$

$$3) \quad u(r, t) = \frac{A}{16a^2} (r_0^4 - r^4) t - \frac{2Ar_0^5}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_{0n}^2 - 4) J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right) \cos \frac{\mu_{0n} at}{r_0}}{\mu_{0n}^6 J_1(\mu_{0n})};$$

$$4) \quad u(r, t) = \frac{A}{16a^2} (r_0^4 - r^4) t^2 - \frac{A}{288a^4} (r_0^2 - r^2) (8r_0^4 - r_0^2 r^2 - r^4) + \\ + \frac{4Ar_0^6}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_{0n}^2 - 4) J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right) \cos \frac{\mu_{0n} at}{r_0}}{\mu_{0n}^7 J_1(\mu_{0n})};$$

$$5) \quad u(r, t) = \frac{A}{a^2} \left(1 - \frac{I_0 \left(\frac{\alpha r}{a} \right)}{I_0 \left(\frac{\alpha r_0}{a} \right)} \right) e^{-\alpha t} + \frac{2A}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right) \left(\frac{\alpha r_0}{a\mu_{0n}} \sin \frac{\mu_{0n} at}{r_0} - \cos \frac{\mu_{0n} at}{r_0} \right)}{\mu_{0n} \left(\frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} + \frac{\alpha^2}{a^2} \right) J_1(\mu_{0n})};$$

$$6) \quad u(r, t) = \frac{A}{a^2} \left(\frac{4a^2}{a^4} + r^2 - \frac{(4a^2 + \alpha^2 r_0^2) I_0 \left(\frac{\alpha r}{a} \right)}{\alpha^2 I_0 \left(\frac{\alpha r_0}{a} \right)} \right) e^{-\alpha t} - \\ + \frac{2Ar_0^2}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_{0n}^2 - 4) J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right) \left(\frac{\alpha r_0}{a\mu_{0n}} \sin \frac{\mu_{0n} at}{r_0} - \cos \frac{\mu_{0n} at}{r_0} \right)}{\mu_{0n}^3 \left(\frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} + \frac{\alpha^2}{a^2} \right) J_1(\mu_{0n})};$$

7) если $\beta \neq \frac{\mu_{0n}}{r_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2} (J_0(\beta r_0) - J_0(\beta r)) t - \frac{2r_0 A J_0(\beta r_0)}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right) \sin \frac{\mu_{0n} at}{r_0}}{\mu_{0n}^2 \left(\frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} - \beta^2 \right) J_1(\mu_{0n})},$$

если $\beta = \frac{\mu_{0m}}{r_0}$, то $u(r, t) = \frac{Ar_0^3}{a^3 \mu_{0m}^3} \left(\frac{a\mu_{0m} t}{r_0} - \sin \frac{a\mu_{0m} t}{r_0} \right) J_0 \left(\frac{\mu_{0m} r}{r_0} \right);$

$$8) u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2} (I_0(\beta r) - I_0(\beta r_0)) - \frac{2r_0 A I_0(\beta r_0)}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{0n} a t}{r_0}}{\mu_{0n}^2 \left(\frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} + \beta^2\right) J_1(\mu_{0n})};$$

$$9) \text{ если } \beta \neq \frac{\mu_{0n}}{r_0}, \text{ то } u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2 + \alpha^2} \left(J_0(\beta r) - \frac{J_0(\beta r_0)}{I_0\left(\frac{\alpha r_0}{a}\right)} I_0\left(\frac{\alpha r}{a}\right) \right) e^{-\alpha t} + \\ + \frac{2A J_0(\beta r_0)}{a^2 r_0^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_{0n} J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right) \left(\frac{\alpha r_0}{a \mu_{0n}} \sin \frac{\mu_{0n} a t}{r_0} - \cos \frac{\mu_{0n} a t}{r_0} \right)}{\left(\frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} + \frac{\alpha^2}{a^2} \right) \left(\frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} - \beta^2 \right) J_1(\mu_{0n})},$$

если $\beta = \frac{\mu_{0m}}{r_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{a^2 \left(\frac{\mu_{0m}^2}{r_0^2} + \frac{\alpha^2}{a^2} \right)} \left(\frac{\alpha r_0}{a \mu_{0m}} \sin \frac{a \mu_{0m} t}{r_0} - \cos \frac{a \mu_{0m} t}{r_0} + e^{-\alpha t} \right) J_0\left(\frac{\mu_{0m} r}{r_0}\right);$$

$$10) \text{ если } \beta \neq \frac{\alpha}{a}, \text{ то } u(r, t) = \frac{A}{\alpha^2 - \beta^2 a^2} \left(I_0(\beta r) - \frac{I_0(\beta r_0)}{I_0\left(\frac{\alpha r_0}{a}\right)} I_0\left(\frac{\alpha r}{a}\right) \right) e^{-\alpha t} - \\ - \frac{2A I_0(\beta r_0)}{a^2 r_0^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_{0n} J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right) \left(\frac{\alpha r_0}{a \mu_{0n}} \sin \frac{\mu_{0n} a t}{r_0} - \cos \frac{\mu_{0n} a t}{r_0} \right)}{\left(\frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} + \frac{\alpha^2}{a^2} \right) \left(\frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} - \beta^2 \right) J_1(\mu_{0n})},$$

если $\beta = \frac{\alpha}{a}$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{2\alpha a I_0\left(\frac{\alpha r_0}{a}\right)} \left(r_0 I_1\left(\frac{\alpha r_0}{a}\right) I_0\left(\frac{\alpha r}{a}\right) - r I_1\left(\frac{\alpha r}{a}\right) I_0\left(\frac{\alpha r_0}{a}\right) \right) e^{-\alpha t} - \\ - \frac{2A I_0\left(\frac{\alpha r_0}{a}\right)}{a^2 r_0^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_{0n} J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right) \left(\frac{\alpha r_0}{a \mu_{0n}} \sin \frac{\mu_{0n} a t}{r_0} - \cos \frac{\mu_{0n} a t}{r_0} \right)}{\left(\frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} + \frac{\alpha^2}{a^2} \right)^2 J_1(\mu_{0n})};$$

11) если $\beta \neq \frac{\omega}{a}$, $\beta \neq \frac{\mu_{0n}}{r_0}$, $\omega \neq \omega_n$, где $\omega_n = \frac{a \mu_{0n}}{r_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2 - \omega^2} \left(J_0(\beta r) - \frac{J_0(\beta r_0)}{J_0\left(\frac{\omega r_0}{a}\right)} J_0\left(\frac{\omega r}{a}\right) \right) \sin \omega t - \\ - \frac{2\omega A J_0(\beta r_0)}{a^3 r_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{0n} a t}{r_0}}{\left(\frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} - \frac{\omega^2}{a^2} \right) \left(\frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} - \beta^2 \right) J_1(\mu_{0n})},$$

если $\beta \neq \frac{\omega}{a} = \frac{\mu_{0m}}{r_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{A J_0(\beta r_0)}{a^2 \left(\beta^2 - \frac{\mu_{0m}^2}{r_0^2} \right)} \left(\frac{2\mu_{0m} J_0\left(\frac{\mu_{0m} r}{r_0}\right)}{r_0^2 \left(\beta^2 - \frac{\mu_{0m}^2}{r_0^2} \right) J_1(\mu_{0m})} + \frac{J_0(\beta r)}{J_0(\beta r_0)} - \frac{r J_1\left(\frac{\mu_{0m} r}{r_0}\right)}{r_0 J_1(\mu_{0m})} \right) \sin \frac{\mu_{0m} a t}{r_0} + \\ + \frac{A a J_0(\beta r_0) J_0\left(\frac{\mu_{0m} r}{r_0}\right) t \cos \frac{\mu_{0m} a t}{r_0}}{a^2 \left(\beta^2 - \frac{\mu_{0m}^2}{r_0^2} \right) r_0 J_1(\mu_{0m})} - \frac{2\mu_{0m} A J_0(\beta r_0)}{a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{0n} a t}{r_0}}{(\mu_{0n}^2 - \mu_{0m}^2) \left(\frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} - \beta^2 \right) J_1(\mu_{0n})},$$

если $\beta = \frac{\omega}{a} \neq \frac{\mu_{0n}}{r_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{2\omega a J_0\left(\frac{\omega r_0}{a}\right)} \left(r_0 J_1\left(\frac{\omega r_0}{a}\right) J_0\left(\frac{\omega r}{a}\right) - r J_1\left(\frac{\omega r}{a}\right) J_0\left(\frac{\omega r_0}{a}\right) \right) \sin \omega t - \\ - \frac{2\omega A J_0\left(\frac{\omega r_0}{a}\right)}{a^3 r_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{0n} a t}{r_0}}{\left(\frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} - \frac{\omega^2}{a^2}\right)^2 J_1(\mu_{0n})},$$

если $\beta = \frac{\mu_{0m}}{r_0} \neq \frac{\omega}{a}$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{\omega_m (\omega_m^2 - \omega^2)} (\omega_m \sin \omega t - \omega \sin \omega_m t),$$

если $\omega = \omega_m = \beta a$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{2\omega_m^2} (\sin \omega_m t - \omega_m t \sin \omega_m t) J_0\left(\frac{\mu_{0m} r}{r_0}\right);$$

12) если $\omega \neq \frac{a\mu_{0n}}{r_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2 + \omega^2} \left(\frac{I_0(\beta r_0)}{J_0\left(\frac{\omega r_0}{a}\right)} J_0\left(\frac{\omega r}{a}\right) - I_0(\beta r) \right) \sin \omega t - \\ - \frac{2\omega A I_0(\beta r_0) - I_0(\beta r)}{a^3 r_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{0n} a t}{r_0}}{\left(\frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} - \frac{\omega^2}{a^2}\right) \left(\frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} + \beta^2\right) J_1(\mu_{0n})};$$

если $\omega = \frac{a\mu_{0m}}{r_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{A I_0(\beta r_0)}{\beta^2 a^2 + \omega^2} \left[\frac{2\mu_{0m} J_0\left(\frac{\omega r_0}{a}\right)}{(\beta^2 r_0^2 + \mu_{0m}^2) J_1(\mu_{0m})} - \frac{I_0(\beta r)}{I_0(\beta r_0)} + \frac{r J_1\left(\frac{\omega r}{a}\right)}{r_0 J_1(\mu_{0m})} \right] \sin \omega t - \\ - \frac{a A I_0(\beta r_0) J_0\left(\frac{\omega r}{a}\right) t \cos \omega t}{(\beta^2 a^2 + \omega^2) r_0 J_1(\mu_{0m})} - \frac{2\mu_{0m} A I_0(\beta r_0)}{a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{0n} a t}{r_0}}{\left(\frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} - \frac{\omega^2}{r_0^2}\right) \left(\frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} + \beta^2\right) J_1(\mu_{0n})}.$$

2.688. Если $\omega \neq \frac{a\mu_{0n}}{r_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{p_0}{\rho \omega^2} \left(\frac{J_0\left(\frac{\omega r}{a}\right)}{J_0\left(\frac{\omega r_0}{a}\right)} - 1 \right) \sin \omega t - \frac{2p_0 \omega r_0}{\rho a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{0n} a t}{r_0}}{\mu_{0n}^2 \left(\frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} - \frac{\omega^2}{a^2}\right) J_1(\mu_{0n})},$$

если $\omega = \frac{a\mu_{0m}}{r_0 a}$, то $u(r, t) = \frac{p_0 r_0^2}{\rho a^2 \mu_{0m}^2} \left(\frac{2J_0\left(\frac{\mu_{0m} r}{r_0}\right)}{\mu_{0m} J_1(\mu_{0m})} - 1 + \frac{r J_1\left(\frac{\mu_{0m} r}{r_0}\right)}{J_1(\mu_{0m})} \right) \sin \frac{a\mu_{0m} t}{r_0} -$

$$- \frac{p_0 r_0 J_0\left(\frac{\mu_{0m} r}{r_0}\right) t \cos \frac{a\mu_{0m} t}{r_0}}{\rho a \mu_{0m}^2 J_1(\mu_{0m})} - \frac{2p_0 \mu_{0m} r_0^2}{\rho a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{0n} a t}{r_0}}{\mu_{0n}^2 \left(\frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} - \frac{\omega^2}{a^2}\right) J_1(\mu_{0n})}.$$

2.689. 1) $u(r, t) = A \int_0^t h(t - \tau) d\tau;$

$$2) u(r, t) = \frac{A}{8a^2} \left(r_0^2 r^2 - \frac{r^4}{2} - \frac{r_0^4}{3} \right) t + \frac{Ar_0^2 t^3}{6} - \frac{4Ar_0^5}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0} \right) \cos \frac{\mu_{1n} at}{r_0}}{\mu_{1n}^5 J_0(\mu_{1n})};$$

$$3) u(r, t) = \frac{Ar_0^2 t^4}{24} + \frac{A}{8a^2} \left(r_0^2 r^2 - \frac{r^4}{2} + \frac{r_0^4}{3} \right) t^2 + \frac{A}{16a^4} \left(\frac{r_0^4 r^2}{3} - \frac{r_0^2 r^4}{4} + \frac{r^6}{18} - \frac{7r_0^6}{72} \right) - \\ - \frac{8Ar_0^6}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0} \right) \cos \frac{\mu_{1n} at}{r_0}}{\mu_{1n}^6 J_0(\mu_{1n})};$$

$$4) u(r, t) = \frac{A}{\alpha^2} \left(\frac{4a^2}{\alpha^2} + r^2 - \frac{2ar_0 I_0 \left(\frac{\alpha r}{a} \right)}{\alpha I_1 \left(\frac{\alpha r_0}{a} \right)} \right) e^{-\alpha t} + \\ + \frac{4Ar_0^2}{a^2} \left(1 - \frac{\alpha^2 r_0^2}{8a^2} \right) (\alpha t - 1) + \frac{4Ar_0^2}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{\alpha r_0}{a \mu_{1n}} \sin \frac{\mu_{1n} at}{r_0} - \cos \frac{\mu_{1n} at}{r_0} \right) J_0 \left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0} \right)}{\mu_{1n}^2 \left(\frac{\mu_{1n}^2}{r_0^2} + \frac{\alpha^2}{a^2} \right) J_0(\mu_{1n})};$$

$$5) \text{ если } 0 \neq \beta \neq \frac{\mu_{1n}}{r_0}, \text{ то } u(r, t) = \frac{2A\beta r_0^2 J_1(\beta r_0)}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0} \right) \sin \frac{\mu_{1n} at}{r_0}}{\mu_{1n}^3 \left(\frac{\mu_{1n}^2}{r_0^2} - \beta^2 \right) J_0(\mu_{1n})} + \\ + \frac{AJ_1(\beta r_0)}{3\beta r_0} t^3 + \frac{A}{\beta^2 a^2} \left(J_0(\beta r) + \frac{\beta J_1(\beta r_0)}{2r_0} r^2 - \frac{2J_1(\beta r_0)}{\beta r_0} \left(1 + \frac{\beta^2 r_0^2}{8} \right) \right) t,$$

$$\text{если } \beta = \frac{\mu_{1m}}{r_0}, \text{ то } u(r, t) = \frac{Ar_0^3}{a^3 \mu_{1m}^3} \left(\frac{r_0 t}{a \mu_{1m}} - \sin \frac{a \mu_{1m} t}{r_0} \right) J_0 \left(\frac{\mu_{1m} r}{r_0} \right),$$

$$\text{если } \beta = 0, \text{ то } u(r, t) = \frac{At^3}{6},$$

6) если $\beta \neq 0$, то

$$u(r, t) = \frac{AI_1(\beta r_0)}{3\beta r_0} t^3 - \frac{2A\beta r_0^2 I_1(\beta r_0)}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0} \right) \sin \frac{\mu_{1n} at}{r_0}}{\mu_{1n}^3 \left(\frac{\mu_{1n}^2}{r_0^2} + \beta^2 \right) J_0(\mu_{1n})} + \\ + \frac{A}{\beta^2 a^2} \left(\frac{\beta I_1(\beta r_0)}{2r_0} r^2 - I_0(\beta r) + \frac{2I_1(\beta r_0)}{\beta r_0} \left(1 - \frac{\beta^2 r_0^2}{8} \right) \right) t,$$

$$\text{если } \beta = 0, \text{ то } u(r, t) = \frac{At^3}{6};$$

7) если $\beta \neq \frac{\mu_{1n}}{r_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{\alpha^2 + \beta^2 a^2} \left(J_0(\beta r) + \frac{\beta a J_1(\beta r_0)}{\alpha I_1 \left(\frac{\alpha r_0}{a} \right)} I_0 \left(\frac{\alpha r}{a} \right) \right) e^{-\alpha t} + \\ + \frac{2AJ_1(\beta r_0)}{\alpha^2 \beta r_0} (1 + \alpha t) - \frac{2A\beta J_1(\beta r_0)}{r_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{\alpha r_0}{a \mu_{1n}} \sin \frac{\mu_{1n} at}{r_0} - \cos \frac{\mu_{1n} at}{r_0} \right) J_0 \left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0} \right)}{\left(\frac{\mu_{1n}^2}{r_0^2} + \frac{\alpha^2}{a^2} \right) \left(\frac{\mu_{1n}^2}{r_0^2} - \beta^2 \right) J_0(\mu_{1n})},$$

если $\beta = \frac{\mu_{1m}}{r_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{\alpha^2 + \frac{a^2 \mu_{1n}^2}{r_0^2}} \left(\frac{\alpha r_0}{a \mu_{1m}} \sin \frac{a \mu_{1m} t}{r_0} - \cos \frac{a \mu_{1m} t}{r_0} + e^{-\alpha t} \right) J_0 \left(\frac{\mu_{1m} r}{r_0} \right);$$

8) если $\beta \neq \frac{\alpha}{a}$, то $u(r, t) = \frac{A}{\alpha^2 - \beta^2 a^2} \left(I_0(\beta r) - \frac{\beta a I_1(\beta r_0)}{\alpha I_1\left(\frac{\alpha r_0}{a}\right)} I_0\left(\frac{\alpha r}{a}\right) \right) e^{-\alpha t} +$
 $+\frac{2A I_1(\beta r_0)}{\alpha^2 \beta r_0} (1 + \alpha t) + \frac{2A \beta J_1(\beta r_0)}{r_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{\alpha r_0}{a \mu_{1n}} \sin \frac{\mu_{1n} a t}{r_0} - \cos \frac{\mu_{1n} a t}{r_0} \right) J_0\left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0}\right)}{\left(\frac{(\alpha r_0/a) \mu_{1n}^2}{r_0^2} + \frac{\alpha^2}{a^2} \right) \left(\frac{\mu_{1n}^2}{r_0^2} + \beta^2 \right) J_0(\mu_{1n})},$

если $\beta = \frac{\alpha}{a}$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{2\alpha^2} \left(\frac{\left(\frac{\alpha r_0}{a} I_0\left(\frac{\alpha r}{a}\right) I_1'\left(\frac{\alpha r_0}{a}\right) \right)}{I_1\left(\frac{\alpha r_0}{a}\right)} - \frac{\alpha r}{a} I_1\left(\frac{\alpha r}{a}\right) + I_0\left(\frac{\alpha r}{a}\right) \right) e^{-\alpha t} +$$

$$+\frac{2A a I_1\left(\frac{\alpha r_0}{a}\right)}{\alpha^3 r_0} (1 + \alpha t) + \frac{2A I_1\left(\frac{\alpha r_0}{a}\right)}{r_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{\alpha r_0}{a \mu_{1n}} \sin \frac{\mu_{1n} a t}{r_0} - \cos \frac{\mu_{1n} a t}{r_0} \right) J_0\left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0}\right)}{\left(\frac{\mu_{1n}^2}{r_0^2} + \frac{\alpha^2}{a^2} \right)^2 J_0(\mu_{1n})};$$

9) если $\beta \neq \frac{\omega}{a}$, $\beta \neq \frac{\mu_{0n}}{r_0}$, $\omega \neq \omega_n$, где $\omega_n = \frac{a \mu_{0n}}{r_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{2A J_1(\beta r_0)}{\beta \omega r_0} t + \frac{A J_1(\beta r_0)}{\beta^2 a^2 - \omega^2} \left(\frac{J_0(\beta r)}{J_1(\beta r_0)} - \frac{\beta a J_0\left(\frac{\omega r}{a}\right)}{\omega J_1\left(\frac{\omega r_0}{a}\right)} \right) \sin \omega t + \frac{2\beta \omega A J_1(\beta r_0)}{a^3} \times$$

$$\times \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{1n} a t}{r_0}}{\mu_{1n} \left(\frac{\mu_{1n}^2}{r_0^2} - \frac{\omega^2}{a^2} \right) \left(\frac{\mu_{1n}^2}{r_0^2} - \beta^2 \right) J_0(\mu_{1n})},$$

если $\beta \neq \frac{\omega}{a} = \frac{\mu_{1m}}{r_0}$, то $u(r, t) = \frac{A}{a^2 \left(\beta^2 - \frac{\mu_{1m}^2}{r_0^2} \right)} \times$

$$\times \left(J_0(\beta r) + \frac{\beta r_0 J_1(\beta r_0) (3\mu_{1m}^2 - \beta^2 r_0^2) J_0\left(\frac{\mu_{1m} r}{r_0}\right)}{\mu_{1m} (\mu_{1m}^2 - \beta^2 r_0^2) J_0(\mu_{1m})} + \frac{\beta r J_1(\beta r_0) J_1\left(\frac{\mu_{1m} r}{r_0}\right)}{\mu_{1m} J_0(\mu_{1m})} \right) \sin \frac{a \mu_{1m} t}{r_0} +$$

$$+\frac{2A J_1(\beta r_0)}{\beta a \mu_{1m}} t + \frac{2\beta \mu_{1m} r_0 A J_1(\beta r_0)}{a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{1n} a t}{r_0}}{\mu_{1m} (\mu_{1n}^2 - \mu_{1m}^2) \left(\frac{\mu_{1n}^2}{r_0^2} - \beta^2 \right) J_0(\mu_{1n})} +$$

$$+\frac{\beta A J_1(\beta r_0) J_0\left(\frac{\mu_{1m} r}{r_0}\right) t \cos \frac{a \mu_{1m} t}{r_0}}{a \mu_{1m} \left(\frac{\mu_{1m}^2}{r_0^2} - \beta^2 \right) J_0(\mu_{1m})},$$

если $\beta = \frac{\omega}{a} \neq \frac{\mu_{0n}}{r_0}$, то $u(r, t) = \frac{2a A J_1\left(\frac{\omega r_0}{a}\right)}{\omega^2 r_0} t - \frac{A}{2\omega a J_1\left(\frac{\omega r_0}{a}\right)} \times$

$$\times \left(r_0 J_0\left(\frac{\omega r_0}{a}\right) J_0\left(\frac{\omega r}{a}\right) - r J_1\left(\frac{\omega r}{a}\right) J_1\left(\frac{\omega r_0}{a}\right) \right) \sin \omega t + \frac{2\omega^2 A J_1\left(\frac{\omega r_0}{a}\right)}{a^4} \times$$

$$\times \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{1n} a t}{r_0}}{\mu_{1n} \left(\frac{\mu_{1n}^2}{r_0^2} - \frac{\omega^2}{a^2} \right)^2 J_0(\mu_{1n})},$$

если $\beta = \frac{\mu_{0m}}{r_0} \neq \frac{\omega}{a}$, то $u(r, t) = \frac{A}{\omega_m(\omega_m^2 - \omega^2)}(\omega_m \sin \omega t - \omega \sin \omega_m t) J_0\left(\frac{\mu_{1m} r}{r_0}\right)$,

если $\omega = \omega_m = \beta a$, то $u(r, t) = \frac{A}{2\omega_m^2}(\omega_m t \cos \omega_m t - \sin \omega_m t) J_0\left(\frac{\mu_{1m} r}{r_0}\right)$,

если $\beta = 0$, то $u(r, t) = \frac{A}{\omega^2}(\omega t - \sin \omega t)$;

$$10) \text{ если } \omega \neq \frac{a\mu_{1n}}{r_0}, \text{ то } u(r, t) = \frac{2AI_1(\beta r_0)}{\beta \omega r_0} t - \frac{AI_1(\beta r_0)}{\beta^2 a^2 + \omega^2} \left(\frac{I_0(\beta r)}{I_1(\beta r_0)} + \frac{\beta a J_0\left(\frac{\omega r}{a}\right)}{\omega J_1\left(\frac{\omega r_0}{a}\right)} \right) \times \\ \times \sin \omega t - \frac{2\beta \omega AI_1(\beta r_0)}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{1n} a t}{r_0}}{\mu_{1n} \left(\frac{\mu_{1n}^2}{r_0^2} - \frac{\omega^2}{a^2} \right) \left(\frac{\mu_{1n}^2}{r_0^2} + \beta^2 \right) J_0(\mu_{1n})},$$

$$\text{если } \omega = \frac{a\mu_{1m}}{r_0}, \text{ то } u(r, t) = \frac{A}{a^2 \left(\beta^2 + \frac{\mu_{1m}^2}{r_0^2} \right)} \times \\ \times \left(\frac{(\beta r_0 I_1(\beta r_0) (3\mu_{1m}^2 + \beta^2 r_0^2) J_0\left(\frac{\mu_{1m} r}{r_0}\right) - \beta r I_1(\beta r_0) J_1\left(\frac{\mu_{1m} r}{r_0}\right) - I_0(\beta r))}{\mu_{1m}^2 (\mu_{1m}^2 + \beta^2 r_0^2) J_0(\mu_{1m})} \sin \frac{a\mu_{1m} t}{r_0} + \right. \\ \left. + \frac{2AI_1(\beta r_0)}{\beta a \mu_{1m}} t - \frac{2\beta \mu_{1m} r_0 AI_1(\beta r_0)}{a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{1n} a t}{r_0}}{\mu_{1m} (\mu_{1n}^2 - \mu_{1m}^2) \left(\frac{\mu_{1n}^2}{r_0^2} + \beta^2 \right) J_0(\mu_{1n})} - \right. \\ \left. - \frac{\beta AI_1(\beta r_0) J_0\left(\frac{\mu_{1m} r}{r_0}\right) t \cos \frac{a\mu_{1m} t}{r_0}}{a \mu_{1m} \left(\frac{\mu_{1m}^2}{r_0^2} + \beta^2 \right) J_0(\mu_{1m})} \right),$$

если $\beta = 0$, то $u(r, t) = \frac{A}{\omega^2}(\omega t - \sin \omega t)$.

2.690. Здесь $\gamma_n > 0$ — корень уравнения $\gamma J_1(\gamma) = p J_0(\gamma)$, $p = hr_0$;

$$1) u(r, t) = \frac{Ar_0}{4pa^2}((p+2)r_0^2 - pr^2)t - \frac{2Apr_0^3}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) \sin \frac{\gamma_n a t}{r_0}}{\gamma_n^3 (\gamma_n^2 + p^2) J_0(\gamma_n)};$$

$$2) u(r, t) = \frac{Ar_0}{4a^2} \left(\left(1 + \frac{2}{p} \right) r_0^2 - r^2 \right) t^2 + \\ + \frac{Ar_0}{8a^4} \left[\left(1 + \frac{2}{p} \right) r_0^2 r^2 - \frac{r^4}{4} - \frac{r_0^4}{p} \left(3 + \frac{4}{p} + \frac{3p}{4} \right) \right] + \frac{4Apr_0^4}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) \cos \frac{\gamma_n a t}{r_0}}{\gamma_n^4 (\gamma_n^2 + p^2) J_0(\gamma_n)};$$

$$3) u(r, t) = \frac{A}{16a^2} \left(\left(1 + \frac{4}{p} \right) r_0^4 - r^4 \right) t - \frac{2Ar_0^5}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\gamma_n^2(p+2) - 4p) J_0\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) \sin \frac{\gamma_n a t}{r_0}}{\gamma_n^5 (\gamma_n^2 + p^2) J_0(\gamma_n)};$$

$$4) u(r, t) = \frac{A}{16a^2} \left(\left(1 + \frac{4}{p} \right) r_0^4 - r^4 \right) t^2 + \frac{A}{32a^4} \left(\frac{r^6}{9} - \left(1 + \frac{4}{p} \right) r_0^4 r^2 + \right. \\ \left. + 8 \left(\frac{2}{3p} + \frac{1}{9} + \frac{1}{p^2} \right) \right) + \frac{4Ar_0^6}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{((p+2)\gamma_n^2 - 4p) J_0\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) \cos \frac{a\gamma_n t}{r_0}}{\gamma_n^7 (\gamma_n^2 + p^2) J_0(\gamma_n)};$$

$$5) \text{ если } \beta \neq \frac{\gamma_n}{r_0}, \text{ то } u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2} (J_0(\beta r) - J_0(\beta r_0) + \frac{\beta r_0}{p} J_1(\beta r_0)) t - \\ - \frac{2Ar_0^3(\beta r_0 J_1(\beta r_0) - p J_0(\beta r_0))}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) \sin \frac{\gamma_n a t}{r_0}}{\gamma_n (\gamma_n^2 + p^2) \left(\frac{\gamma_n^2}{r_0^2} - \beta^2\right) J_0(\gamma_n)},$$

$$\text{если } \beta = \frac{\gamma_m}{r_0}, \text{ то } u(r, t) = \frac{Ar_0^3}{a^3 \gamma_m^3} \left(\frac{a \gamma_m t}{r_0} - \sin \frac{a \gamma_m t}{r_0} \right) J_0\left(\frac{\gamma_m r}{r_0}\right);$$

$$6) u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2} (I_0(\beta r) - I_0(\beta r_0) - \\ - \frac{\beta r_0}{p} I_1(\beta r_0)) t + \frac{2Ar_0^3(\beta r_0 I_1(\beta r_0) + p I_0(\beta r_0))}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) \sin \frac{\gamma_n a t}{r_0}}{\gamma_n (\gamma_n^2 + p^2) \left(\frac{\gamma_n^2}{r_0^2} + \beta^2\right) J_0(\gamma_n)}.$$

2.691. Здесь $\gamma_n > 0$ – корень уравнения $\gamma J_1'(\gamma) = p J_1(\gamma)$, $p = hr_0$;

$$1) u(r, t) = \frac{Ar}{8a^2} \left(\frac{p+3}{p+1} r_0^2 - r^2 \right) t - \frac{2A(p+1)r_0^4}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) \sin \frac{\gamma_n a t}{r_0}}{\gamma_n^3 (\gamma_n^2 + p^2 - 1) J_1(\gamma_n)};$$

$$2) u(r, t) = \frac{Ar_0}{4pa^2} \left(\left(1 + \frac{2}{p}\right) r_0^2 - r^2 \right) t^2 - \frac{Ar}{16a^4} \left(\frac{p^2 + 6p + 11}{3(p+1)^2} r_0^4 - \frac{p+3}{2(p+1)} r_0^2 r^2 + \frac{r^4}{6} \right) - \\ - \frac{4A(p+1)r_0^5}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) \cos \frac{\gamma_n a t}{r_0}}{\gamma_n^4 (\gamma_n^2 + p^2 - 1) J_1(\gamma_n)}.$$

$$\mathbf{2.692.} \quad 1) u(r, t) = \frac{Ar^\nu}{4a^2(\nu+1)} (r_0^2 - r^2) t - \frac{2Ar_0^{\nu+3}}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right) \cos \frac{\mu_{\nu n} a t}{r_0}}{\mu_{\nu n}^4 J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})};$$

$$2) u(r, t) = \frac{Ar^\nu (r_0^2 - r^2) 4a^2(\nu+1)^2}{t} - \frac{Ar^\nu (r_0^2 - r^2)}{16a^4(\nu+1)^2} \left(\frac{\nu+3}{\nu+1} r_0^2 - r^2 \right) + \\ + \frac{4Ar_0^{\nu+4}}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right) \cos \frac{\mu_{\nu n} a t}{r_0}}{\mu_{\nu n}^5 J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})};$$

$$3) u(r, t) = \frac{Ar_0^\nu}{\alpha^2} \left(\frac{I_\nu\left(\frac{\alpha r}{a}\right)}{I_\nu\left(\frac{\alpha r_0}{a}\right)} - \frac{r^\nu}{r_0^\nu} \right) e^{-\alpha t} + \\ + \frac{2Ar_0^\nu}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right) \left(\frac{\alpha r_0}{a \mu_{\nu n}} \sin \frac{\mu_{\nu n} a t}{r_0} - \cos \frac{\mu_{\nu n} a t}{r_0} \right)}{\mu_{\nu n} \left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} + \frac{\alpha^2}{a^2} \right)^2 J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})};$$

4) если $\beta \neq \frac{\mu_{\nu n}}{r_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2} \left(J_\nu(\beta r) - \frac{r^\nu}{r_0^\nu} J_\nu(\beta r_0) \right) - \frac{2r_0 A J_\nu(\beta r_0)}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{\nu n} a t}{r_0}}{\mu_{\nu n}^2 \left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} - \beta^2 \right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})},$$

$$\text{если } \beta = \frac{\mu_{\nu m}}{r_0}, \text{ то } u(r, t) = \frac{Ar_0^3}{a^3 \mu_{\nu n}^3} \left(\frac{a \mu_{\nu n} t}{r_0} - \sin \frac{a \mu_{\nu n} t}{r_0} \right) J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu m} r}{r_0}\right);$$

$$5) u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2} \left(\frac{r^\nu}{r_0^\nu} I_\nu(\beta r_0) - I_\nu(\beta r) \right) - \frac{2r_0 A I_\nu(\beta r_0)}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{0n} a t}{r_0}}{\mu_{\nu n}^2 \left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} + \beta^2 \right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})};$$

$$6) \text{ если } \beta \neq \frac{\mu_{\nu n}}{r_0}, \text{ то } u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2 + \alpha^2} \left(J_\nu(\beta r) - \frac{J_\nu(\beta r_0)}{I_\nu\left(\frac{\alpha r_0}{a}\right)} I_\nu\left(\frac{\alpha r}{a}\right) \right) e^{-\alpha t} + \\ + \frac{2A J_\nu(\beta r_0)}{a^2 r_0^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_{\nu n} J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right) \left(\frac{\alpha r_0}{a \mu_{\nu n}} \sin \frac{\mu_{\nu n} a t}{r_0} - \cos \frac{\mu_{\nu n} a t}{r_0} \right)}{\left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} + \frac{\alpha^2}{a^2} \right) \left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} - \beta^2 \right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})};$$

если $\beta = \frac{\mu_{\nu m}}{r_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{A r_0}{a \mu_{\nu m}} \left(\frac{\alpha r_0}{a \mu_{\nu m}} \sin \frac{a \mu_{\nu m} t}{r_0} - \cos \frac{a \mu_{\nu m} t}{r_0} + e^{-\alpha t} \right) J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu m} r}{r_0}\right);$$

$$7) \text{ если } \beta \neq \frac{\alpha}{a}, \text{ то } u(r, t) = \frac{A}{\alpha^2 - \beta^2 a^2} \left(I_\nu(\beta r) - \frac{I_\nu(\beta r_0)}{I_\nu\left(\frac{\alpha r_0}{a}\right)} I_\nu\left(\frac{\alpha r}{a}\right) \right) e^{-\alpha t} - \\ - \frac{2A I_\nu(\beta r_0)}{a^2 r_0^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_{\nu n} J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right) \left(\frac{\alpha r_0}{a \mu_{\nu n}} \sin \frac{\mu_{\nu n} a t}{r_0} - \cos \frac{\mu_{\nu n} a t}{r_0} \right)}{\left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} + \frac{\alpha^2}{a^2} \right) \left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} + \beta^2 \right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})},$$

если $\beta = \frac{\alpha}{a}$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{2\alpha a I_\nu\left(\frac{\alpha r_0}{a}\right)} \left(r I'_\nu\left(\frac{\alpha r}{a}\right) I_\nu\left(\frac{\alpha r_0}{a}\right) - r_0 I'_\nu\left(\frac{\alpha r_0}{a}\right) I_\nu\left(\frac{\alpha r}{a}\right) \right) e^{-\alpha t} - \\ - \frac{2A I_\nu\left(\frac{\alpha r_0}{a}\right)}{a^2 r_0^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_{\nu n} J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right) \left(\frac{\alpha r_0}{a \mu_{\nu n}} \sin \frac{\mu_{\nu n} a t}{r_0} - \cos \frac{\mu_{\nu n} a t}{r_0} \right)}{\left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} + \frac{\alpha^2}{a^2} \right)^2 J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})};$$

8) если $\omega \neq \frac{a \mu_{\nu n}}{r_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{A r_0^\nu}{\omega^2} \left(\frac{J_\nu\left(\frac{\omega r}{a}\right)}{J_\nu\left(\frac{\omega r_0}{a}\right)} - \frac{r^\nu}{r_0^\nu} \right) \sin \omega t - \frac{2A \omega r_0^{\nu+1}}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{\nu n} a t}{r_0}}{\mu_{\nu n}^2 \left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} - \frac{\omega^2}{a^2} \right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})};$$

если $\omega = \frac{a \mu_{\nu m}}{r_0 a}$, то

$$u(r, t) = \frac{A r_0^{\nu+2}}{a^2 \mu_{\nu m}^2} \left[\left(\frac{2J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu m} r}{r_0}\right)}{\mu_{\nu m} J_{\nu+1}(\mu_{\nu m})} - \frac{r^\nu}{r_0^\nu} - \frac{r J'_\nu\left(\frac{\mu_{\nu m} r}{r_0}\right)}{J_{\nu+1}(\mu_{\nu m})} \right) \sin \frac{a \mu_{\nu m} t}{r_0} - \right. \\ \left. - \frac{a t \cos \frac{a \mu_{\nu m} t}{r_0}}{r_0 J_{\nu+1}(\mu_{\nu m})} J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu m} r}{r_0}\right) \right] - \frac{2A \mu_{\nu m} r_0^\nu}{a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{\nu n} a t}{r_0}}{\mu_{\nu n}^2 \left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} - \frac{\omega^2}{a^2} \right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})};$$

9) если $\beta \neq \frac{\omega}{a}$, $\beta \neq \frac{\mu_{\nu n}}{r_0}$, $\omega \neq \omega_n$, где $\omega_n = \frac{a\mu_{\nu n}}{r_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{a}{\beta^2 a^2 - \omega^2} \left(J_\nu(\beta r) - \frac{J_\nu(\beta r_0)}{J_\nu\left(\frac{\omega r_0}{a}\right)} J_\nu\left(\frac{\omega r}{a}\right) \right) \sin \omega t - \\ - \frac{2\omega a J_\nu(\beta r_0)}{a^3 r_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{j_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{\nu n} a t}{r_0}}{\left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} - \frac{\omega^2}{a^2}\right) \left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} - \beta^2\right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})},$$

если $\beta \neq \frac{\omega}{a} = \frac{\mu_{\nu m}}{r_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{A J_\nu(\beta r_0) r_0^2}{a^2 (\beta^2 r_0^2 - \mu_{\nu m}^2)} \left(\frac{2\mu_{\nu m} J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu m} r}{r_0}\right)}{(\mu_{\nu m}^2 - \beta^2 r_0^2 J_{\nu+1}(\mu_{\nu m}))} + \frac{J_\nu(\beta r)}{J_\nu(\beta r_0)} + \frac{r J'_\nu\left(\frac{\mu_{\nu m} r}{r_0}\right)}{r_0 J_{\nu+1}(\mu_{\nu m})} \right) \times \\ \times \sin \frac{\mu_{\nu m} a t}{r_0} - \frac{A J_\nu(\beta r_0) J_0\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right) r_0 t \cos \frac{\mu_{\nu m} a t}{r_0}}{a (\beta^2 r_0^2 - \mu_{\nu m}^2) J_{\nu+1}(\mu_{\nu m})} - \\ - \frac{2\mu_{\nu m} A J_\nu(\beta r_0)}{a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{\nu n} a t}{r_0}}{(\mu_{\nu n}^2 - \mu_{\nu m}^2) \left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} - \beta^2\right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})},$$

если $\beta = \frac{\omega}{a} \neq \frac{\mu_{0n}}{r_0}$, то $u(r, t) = \frac{A}{2\omega a J_\nu\left(\frac{\omega r_0}{a}\right)} \left(r J'_\nu\left(\frac{\omega r}{a}\right) J_\nu\left(\frac{\omega r_0}{a}\right) - \right. \\ \left. - r J I'_\nu\left(\frac{\omega r_0}{a}\right) J_\nu\left(\frac{\omega r}{a}\right) \right) \sin \omega t - \frac{2\omega a J_\nu\left(\frac{\omega r_0}{a}\right)}{a^3 r_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{\nu n} a t}{r_0}}{\left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} - \frac{\omega^2}{a^2}\right)^2 J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})};$

если $\beta = \frac{\mu_{\nu m}}{r_0} \neq \frac{\omega}{a}$, то $u(r, t) = \frac{a}{\omega_m (\omega_m^2 - \omega^2)} (\omega_m \sin \omega t - \omega \sin \omega_m t) J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right),$

если $\omega = \omega_m = \beta a$, то $u(r, t) = \frac{a}{2\omega_m^2} (\sin \omega_m t - \omega_m t \sin \omega_m t) J_\nu\left(\frac{\mu_{0m} r}{r_0}\right).$

10) если $\omega \neq \frac{a\mu_{\nu n}}{r_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2 + \omega^2} \left(\frac{I_\nu(\beta r_0)}{J_\nu\left(\frac{\omega r_0}{a}\right)} J_\nu\left(\frac{\omega r}{a}\right) - I_\nu(\beta r) \right) \sin \omega t - \\ - \frac{2\omega a I_\nu(\beta r_0)}{a^3 r_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{\nu n} a t}{r_0}}{\left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} - \frac{\omega^2}{a^2}\right) \left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} + \beta^2\right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})},$$

если $\omega = \frac{a\mu_{\nu m}}{r_0}$, то $u(r, t) = \frac{A I_\nu(\beta r_0) J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu m}}{r_0} r\right) a t \cos \frac{a\mu_{\nu m} t}{r_0}}{a (\beta^2 r_0^2 + \mu_{\nu m}^2) J_{\nu+1}(\mu_{\nu m})} - \\ - \frac{2\mu_{\nu m} A I_\nu(\beta r_0)}{a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq n_0}}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{\nu n} a t}{r_0}}{(\mu_{\nu n}^2 - \mu_{\nu m}^2) \left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} + \beta^2\right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})} - \\ - \frac{A I_\nu(\beta r_0) r_0^2}{a^2 (\beta^2 r_0^2 + \mu_{\nu m}^2)} \left(\frac{2\mu_{\nu m} J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right)}{(\beta^2 r_0^2 + \mu_{\nu m}^2) J_{\nu+1}(\mu_{\nu m})} + \frac{I_\nu(\beta r)}{I_\nu(\beta r_0)} + \frac{r J'_\nu\left(\frac{\mu_{\nu m} r}{r_0}\right)}{r_0 J_{\nu+1}(\mu_{\nu m})} \right) \sin \frac{\mu_{\nu m} a t}{r_0}.$

2.693. Здесь $\gamma_n > 0$ — нуль функции $J'_\nu(\gamma)$.

$$1) u(r, t) = \frac{Ar^\nu}{4a^2(\nu+1)} \left(\frac{\nu+2}{\nu} r_0^2 - r^2 \right) t - \frac{2Ar_0^{\nu+3}}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu \left(\frac{\gamma_n r}{r_0} \right) \sin \frac{\gamma_n at}{r_0}}{\gamma_n^3 (\gamma_n^2 - \nu^2) (J_\nu(\gamma_n))};$$

$$2) u(r, t) = \frac{Ar^\nu}{4a^2(\nu+1)} \left(\frac{\nu+2}{\nu} r_0^2 - r^2 \right) t^2 - \left(\frac{\nu^3 + 7\nu^2 + 20\nu + 16}{2\nu^2(\nu+1)(\nu+2)} r_0^4 - \frac{(\nu+2)r_0^2 r^2}{\nu(\nu+1)} + \frac{r^4}{2(\nu+2)} \right) + \frac{4A\nu r_0^{\nu+4}}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu \left(\frac{\gamma_n r}{r_0} \right) \cos \frac{\gamma_n at}{r_0}}{\gamma_n^4 (\gamma_n^2 - \nu^2) J_\nu(\gamma_n)};$$

$$3) u(r, t) = \frac{A}{a^2} \left(r^\nu \frac{a\nu r_0^{\nu-1} I_\nu \left(\frac{\alpha r}{a} \right)}{I_\nu \left(\frac{\alpha r_0}{a} \right)} \right) e^{-\alpha t} + \frac{2A\nu r_0^\nu}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu \left(\frac{\gamma_n r}{r_0} \right) \left(\frac{\alpha r_0}{a\gamma_n} \sin \frac{\gamma_n at}{r_0} - \cos \frac{\gamma_n at}{r_0} \right)}{(\gamma_n^2 - \nu^2) \left(\frac{\gamma_n^2}{r_0^2} + \frac{\alpha^2}{a^2} \right) J_\nu(\gamma_n)};$$

$$4) \text{ если } \beta \neq \frac{\gamma_n}{r_0}, \text{ то } u(r, t) =$$

$$= \frac{A}{\beta^2 a^2} \left(J_\nu(\beta r) - \frac{\beta J'_\nu(\beta r_0) r^\nu}{\nu r_0^{\nu-1}} \right) t - \frac{2A\beta r_0^2 I'_\nu(\beta r_0)}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu \left(\frac{\gamma_n r}{r_0} \right) \sin \frac{\gamma_n at}{r_0}}{\gamma_n (\gamma_n^2 - \nu^2) \left(\frac{\gamma_n^2}{r_0^2} - \beta^2 \right) J_\nu(\gamma_n)},$$

$$\text{если } \beta = \frac{\gamma_m}{r_0}, \text{ то } u(r, t) = \frac{Ar_0^3}{\beta^3 \gamma_m^3} \left(\frac{a\gamma_m t}{r_0} - \sin \frac{a\gamma_m t}{r_0} \right) J_\nu \left(\frac{\gamma_m r}{r_0} \right);$$

$$5) u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2} \left(\frac{\beta I'_\nu(\beta r_0)}{\nu r_0^{\nu-1}} r^\nu - I_\nu(\beta r) \right) t - \frac{2Ar_0^2 \beta I'_\nu(\beta r_0)}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu \left(\frac{\gamma_n r}{r_0} \right) \sin \frac{\gamma_n at}{r_0}}{\gamma_n (\gamma_n^2 - \nu^2) \left(\frac{\gamma_n^2}{r_0^2} + \beta^2 \right) J_\nu(\gamma_n)}.$$

2.694. Здесь $\gamma_n > 0$ — корень уравнения $\gamma J_1(\gamma) = p J_0(\gamma)$, $p = hr_0$;

$$1) u(r, t) = \frac{Ar^\nu}{4a^2(\nu+1)} \left(\frac{p+\nu+2}{\nu+1} r_0^2 - r^2 \right) t - \frac{2A(p+\nu)r_0^{\nu+3}}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu \left(\frac{\gamma_n r}{r_0} \right) \sin \frac{\gamma_n at}{r_0}}{\gamma_n^3 (\gamma_n^2 + p^2 - \nu^2) J_\nu(\gamma_n)};$$

$$2) \text{ если } \nu \neq 0, \text{ то } u(r, t) = \frac{Ar_0^\nu}{\alpha^2} \left(\frac{r^\nu}{r_0^\nu} - \frac{(p+\nu)I_\nu \left(\frac{\alpha r}{a} \right)}{\frac{\alpha r_0}{a} I'_\nu \left(\frac{\alpha r_0}{a} \right) + p I_\nu \left(\frac{\alpha r_0}{a} \right)} \right) e^{-\alpha t} + \frac{2(\nu+p)r_0 q^\nu A}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu \left(\frac{\gamma_n r}{r_0} \right) \left(\frac{\alpha r_0}{a\gamma_n} \sin \frac{\gamma_n at}{r_0} - \cos \frac{\gamma_n at}{r_0} \right)}{(\gamma_n^2 + p^2 - \nu^2) \left(\frac{\gamma_n^2}{r_0^2} + \frac{\alpha^2}{a^2} \right) J_\nu(\gamma_n)}.$$

2.695. Если $\omega \neq a\mu_{0n}$, где $a = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{g}{l}}$, то

$$u(r, t) = u_0 \frac{J_0 \left(\frac{\omega}{a} \sqrt{1 - \frac{x}{l}} \right) \sin \omega t}{J_0 \left(\frac{\omega}{a} \right)} - \frac{2\omega}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\mu_{0n} \sqrt{1 - \frac{x}{l}} \right) \sin a\mu_{0n} t}{\left(\mu_{0n}^2 - \frac{\omega^2}{a^2} \right) J_1(\mu_{0n})},$$

если $\omega = a\mu_{0m}$, то

$$u(r, t) = \frac{u_0}{J_1(\mu_{0m})} \left[\sqrt{1 - \frac{x}{l}} J_1 \left(\mu_{0m} \sqrt{1 - \frac{x}{l}} \right) \sin a\mu_{0m}t - \right. \\ \left. - at \cos a\mu_{0m}t J_0 \left(\mu_{0m} \sqrt{1 - \frac{x}{l}} \right) \right] - 2u_0\mu_{0m} \sum_{n=1, n \neq n_0}^{\infty} \frac{J_0 \left(\mu_{0n} \sqrt{1 - \frac{x}{l}} \right) \sin a\mu_{0n}t}{(\mu_{0n}^2 - \mu_{0m}^2) J_1(\mu_{0n})}.$$

$$\mathbf{2.696.} \quad 1) \quad u(r, t) = \frac{Ar^2t^2}{2r_0} + \frac{Aa^2t^3}{3r_0} - \frac{Ar_0}{4} - \frac{2Ar_0^2}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{1n}r}{r_0} \right) \sin \frac{\mu_{1n}at}{r_0}}{\mu_{1n}^3 J_0(\mu_{1n})};$$

$$2) \quad u(r, t) = \frac{A}{2} \left[\frac{a^2t^4}{3r_0} + \left(\frac{r^2}{r_0} - \frac{r_0}{2} \right) t^2 + \frac{r_0}{4a^2} \left(\frac{r^4}{2r_0^2} - r^2 - \frac{r_0^2}{6} \right) \right] - \\ - \frac{4Ar_0^3}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{1n}r}{r_0} \right) \cos \frac{\mu_{1n}at}{r_0}}{\mu_{1n}^4 J_0(\mu_{1n})};$$

$$3) \quad u(r, t) = \frac{2Aa^2}{\alpha^2 r_0} (\alpha t - 1) + \frac{AaI_0 \left(\frac{\alpha r}{a} \right)}{I_1 \left(\frac{\alpha r_0}{a} \right)} + \\ + \frac{2A}{r_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{1n}r}{r_0} \right) \left(\frac{\alpha r_0}{a\mu_{1n}} \sin \frac{\mu_{1n}at}{r_0} - \cos \frac{\mu_{1n}at}{r_0} \right)}{\left(\frac{\mu_{1n}^2}{r_0^2} + \frac{\alpha^2}{a^2} \right) J_0(\mu_{1n})};$$

4) если $\omega \neq \frac{a\mu_{1n}}{r_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{2Aa^2t}{\omega r_0} - \frac{AaJ_0 \left(\frac{\omega r}{a} \right)}{\omega J_1 \left(\frac{\omega r_0}{a} \right)} - \frac{2A\omega}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{1n}r}{r_0} \right) \sin \frac{\mu_{1n}at}{r_0}}{\mu_{1n} \left(\frac{\mu_{1n}^2}{r_0^2} - \frac{\omega^2}{a^2} \right) J_0(\mu_{1n})},$$

если $\omega = \frac{a\mu_{1m}}{r_0a}$, то

$$u(r, t) = \frac{Ar_0}{\mu_{1m}^2 J_0(\mu_{1m})} \left(J_0 \left(\frac{\mu_{1n}r}{r_0} \right) + \frac{\mu_{1m}r}{r_0} J_1 \left(\frac{\mu_{1n}r}{r_0} \right) \right) \sin \frac{a\mu_{1m}t}{r_0} - \\ - \frac{AaJ_0 \left(\frac{\mu_{1m}r}{r_0} \right) t \cos \frac{a\mu_{1m}t}{r_0}}{\mu_{1m} J_0(\mu_{1m})} + \frac{2Aat}{\mu_{1m}} - 2A\mu_{1m}r_0 \sum \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{1n}r}{r_0} \right) \sin \frac{\mu_{1n}at}{r_0}}{\mu_{1n}(\mu_{1n}^2 - \mu_{1m}^2) J_0(\mu_{1n})}.$$

2.697. Здесь $\gamma_n > 0$ – корень уравнения $\gamma J_1(\gamma) = pJ_0(\gamma)$, $p = hr_0$,

$$f(r) = \frac{Ar_0}{2pa^2} \left(\left(1 + \frac{2}{p} \right) r_0^2 - r^2 \right), \quad g(r) = \frac{Ar_0}{pa^4} \left(\frac{r^4}{8} - \left(1 + \frac{2}{p} \right) \frac{r_0^2 r^2}{2} + \left(\frac{3}{6} + \frac{3}{2p} + \frac{2}{p} \right) r_0^4 \right).$$

$$1) \quad n = 1, \quad u(r, t) = \frac{ar_0t}{p} - \frac{2Ar_0^2}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\gamma_n r}{r_0} \right) \sin \frac{a\gamma_n t}{r_0}}{\gamma_n (\gamma_n^2 + p^2) J_0(\gamma_n)};$$

$$2) \quad n = 2, \quad u(r, t) = \frac{ar_0t^2}{p} - f(r) + \frac{4Ar_0^3}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\gamma_n r}{r_0} \right) \cos \frac{a\gamma_n t}{r_0}}{\gamma_n^2 (\gamma_n^2 + p^2) J_0(\gamma_n)};$$

$$3) n = 3, u(r, t) = \frac{Ar_0 t^3}{p} - 3f(r)t + \frac{12Ar_0^4}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) \sin \frac{a\gamma_n t}{r_0}}{\gamma_n^2(\gamma_n^2 + p^2)J_0(\gamma_n)};$$

$$4) n = 4, u(r, t) = \frac{Ar_0 t^4}{p} - 6f(r)t^2 + g(r) - \frac{48Ar_0^5}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) \cos \frac{a\gamma_n t}{r_0}}{\gamma_n^4(\gamma_n^2 + p^2)J_0(\gamma_n)};$$

$$5) n = 5, u(r, t) = \frac{Ar_0 t^5}{p} - 10f(r)t^3 + 5g(r)t - \frac{240Ar_0^6}{a^5} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) \sin \frac{a\gamma_n t}{r_0}}{\gamma_n^5(\gamma_n^2 + p^2)J_0(\gamma_n)}.$$

$$\mathbf{2.698.} \quad 1) u(r, t) = \frac{Ar^\nu t}{r_0^\nu} - \frac{2Ar_0}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{\nu n} at}{r_0}}{\mu_{\nu n}^2 J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})};$$

$$2) u(r, t) = \frac{Ar^\nu t^2}{r_0^\nu} - \frac{Ar^\nu(r_0^2 - r^2)}{2a^2(\nu+1)r_0^\nu} + \frac{4Ar_0^2}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right) \cos \frac{\mu_{\nu n} at}{r_0}}{\mu_{\nu n}^3 J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})};$$

$$3) u(r, t) = \frac{AI_\nu\left(\frac{\alpha r}{a}\right)}{I_\nu\left(\frac{\alpha r_0}{a}\right)} e^{-\alpha t} + \frac{2A\alpha}{ar_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\sin \frac{a\mu_{\nu n} t}{r_0} - \frac{a\mu_{\nu n}}{\alpha r_0} \cos \frac{a\mu_{\nu n} t}{r_0}\right) J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right)}{\left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} + \frac{\alpha^2}{a^2}\right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})};$$

$$4) \text{ если } \omega \neq \frac{a\mu_{\nu n}}{r_0}, \text{ то } u(r, t) = \frac{AJ_\nu\left(\frac{\omega r}{a}\right)}{J_\nu\left(\frac{\omega r_0}{a}\right)} \sin \omega t - \frac{2A\omega}{ar_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{\nu n} at}{r_0}}{\left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} - \frac{\omega^2}{a^2}\right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})},$$

если $\omega = \frac{a\mu_{\nu m}}{r_0 a}$, то

$$u(r, t) = -\frac{A}{J_{\nu+1}(\mu_{\nu m})} \left(\frac{at}{r_0} \cos \frac{a\mu_{\nu n} t}{r_0} J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right) + \frac{r}{r_0} J'_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right) \sin \frac{a\mu_{\nu n} t}{r_0} \right) - \\ - 2\mu_{\nu m} A \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{\nu n} at}{r_0}}{(\mu_{\nu n}^2 - \mu_{\nu m}^2) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})}.$$

2.699. Здесь $\gamma_n > 0$ — нуль функции $J'_\nu(\gamma)$.

$$1) u(r, t) = \frac{Ar^\nu t}{\nu r_0^{\nu-1}} - \frac{2Ar_0^2}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) \sin \frac{\gamma_n at}{r_0}}{\gamma_n(\gamma_n^2 - \nu^2)J_\nu(\gamma_n)};$$

$$2) u(r, t) = \frac{Ar^\nu t^2}{\nu r_0^{\nu-1}} - \frac{Ar^\nu}{2a^2\nu(\nu+1)r_0^{\nu-1}} \left(\frac{\nu+2}{\nu} + \frac{4Ar_0}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) \cos \frac{\gamma_n at}{r_0}}{\gamma_n^2(\gamma_n^2 - \nu^2)J_\nu(\gamma_n)} \right);$$

$$3) u(r, t) = \frac{AaI_\nu\left(\frac{\alpha r}{a}\right)}{\alpha I'_\nu\left(\frac{\alpha r_0}{a}\right)} e^{-\alpha t} + \frac{2A}{r_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\gamma_n^2 \left(\frac{\alpha r_0}{a\gamma_n} \sin \frac{a\gamma_n t}{r_0} - \cos \frac{a\gamma_n t}{r_0} \right) J_\nu\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right)}{(\gamma_n^2 - \nu^2) \left(\frac{\gamma_n^2}{r_0^2} + \frac{\alpha^2}{a^2} \right) J_\nu(\gamma_n)};$$

4) если $\omega \neq \frac{a\gamma_n}{r_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{AJ_\nu\left(\frac{\omega r}{a}\right)}{J_\nu\left(\frac{\omega r_0}{a}\right)} \sin \omega t - \frac{2A\omega}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) \sin \frac{\gamma_n at}{r_0}}{(\gamma_n^2 - \nu^2) \left(\frac{\gamma_n^2}{r_0^2} - \frac{\omega^2}{a^2} \right) J_\nu(\gamma_n)};$$

если $\omega = \frac{a\gamma_m}{r_0 a}$, то

$$u(r, t) = \frac{A\gamma_m}{(\gamma_m^2 - \nu^2)J_\nu(\gamma_m)} \left(\left(r_0 J_\nu\left(\frac{\gamma_m r}{r_0}\right) - r J'_\nu\left(\frac{\gamma_m r}{r_0}\right) \sin \frac{a\gamma_m t}{r_0} - \right. \right. \\ \left. \left. - a J_\nu\left(\frac{\gamma_m r}{r_0}\right) t \cos \frac{a\gamma_m t}{r_0} \right) - \gamma_m r_0 A \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{\gamma_n J_\nu\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) \sin \frac{\gamma_n a t}{r_0}}{(\gamma_n^2 - \nu^2)(\gamma_n^2 - \gamma_m^2)J_\nu(\gamma_n)} \right).$$

2.700. $u(r, t) = \frac{Ar^\nu t}{(p + \nu)r_0^{\nu-2}} - \frac{2Ar_0^2}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) \sin \frac{\gamma_n a t}{r_0}}{\gamma_n(\gamma_n^2 + p^2 - \nu^2)J_\nu(\gamma_n)}$, $\gamma_n > 0$ — корень уравнения $\gamma J_1(\gamma) = pJ_0(\gamma)$, $p = hr_0$.

$$\begin{aligned} \textbf{2.701. } u(r, \varphi, t) = \frac{Ar}{8a^2}(r_0^2 - r^2) \left(t^2 + \frac{r^2 - 2r_0^2}{12a^2} \right) \sin \varphi + \\ + \frac{4Ar_0^5}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0}\right) \cos \frac{a\mu_{1n} t}{l}}{\mu_{1n}^5 J_0(\mu_{1n})} \sin \varphi. \end{aligned}$$

$$\textbf{2.702. } u(r, \varphi, t) = \frac{Ar}{8a^2}(3r_0^2 - r^2) \cos \varphi - \frac{2Ar_0^4}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\mu_n r}{r_0}\right) \sin \frac{a\mu_n t}{r_0}}{\mu_n^4(\mu_n^2 - 1)J_0(\mu_n)} \cos \varphi,$$

где $\mu_n > 0$ — корень уравнения $J'_1(\mu) = 0$.

$$\textbf{2.703. } u(r, \varphi, t) = \frac{Atr}{r_0} \sin \varphi + \frac{2Ar_0}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_{1n} a t}{r_0}}{\mu_{1n}^2 J_0(\mu_{1n})} \sin \varphi.$$

$$\textbf{2.704. } u(r, \varphi, t) = \frac{Ar}{r_0} \left(t^2 - \frac{r_0^2 - r^2}{4a^2} \right) \sin \varphi - \frac{4Ar_0^2}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0}\right) \cos \frac{\mu_{1n} a t}{r_0}}{\mu_{1n}^3 J_0(\mu_{1n})} \sin \varphi.$$

$$\textbf{2.705. } u(r, \varphi, t) = Br \left(t^2 + \frac{r^2 - 3r_0^2}{8a^2} \right) \sin \varphi - \frac{4Br_0^3}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) \cos \frac{a\gamma_n t}{r_0}}{\gamma_n^3(\gamma_n^2 - 1)J_0(\gamma_n)} \sin \varphi,$$

$\gamma_n > 0$ — корень уравнения $J'_1(\gamma) = 0$.

$$\begin{aligned} \textbf{2.706. } u(r, \varphi, t) = \\ = A \left[\frac{I_1\left(\frac{\alpha r}{a}\right)}{I_1\left(\frac{\alpha r_0}{a}\right)} e^{-\alpha t} + \frac{2}{r_0^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0}\right) \left(\mu_{1n} \cos \frac{\mu_{1n} a t}{r_0} - \frac{\alpha r_0}{a} \sin \frac{\mu_{1n} a t}{r_0} \right)}{\left(\frac{\mu_{1n}^2}{r_0^2} + \frac{\alpha^2}{a^2} \right) J_0(\mu_{1n})} \right] \cos \varphi. \end{aligned}$$

$$\textbf{2.707. } u(r, \varphi, t) = A \left(rt - \frac{2r_0^2}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\mu_n r}{r_0}\right) \sin \frac{\mu_n a t}{r_0}}{\mu_n^2(\mu_n^2 - 1)J_0(\mu_n)} \right) \sin \varphi, \text{ где } \mu_n - \text{поло-}$$

жительный корень уравнения $J'_1(\mu) = 0$.

$$\textbf{2.708. } u(r, \varphi, t) = A \left[r \left(t^2 - \frac{3r_0^2 - r^2}{4a^2} \right) + \frac{4r_0^3}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\mu_n r}{r_0}\right) \cos \frac{\mu_n a t}{r_0}}{\mu_n^3(\mu_n^2 - 1)J_0(\mu_n)} \right] \sin \varphi,$$

$\mu_n > 0$ — нуль функции $J'_1(\mu)$.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.709.} \quad u(r, \varphi, t) = & A \frac{a I_1 \left(\frac{\alpha r}{a} \right)}{\alpha I_1' \left(\frac{\alpha r_0}{a} \right)} e^{-\alpha t} \cos \varphi + \\
 & + \frac{2A}{r_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1 \left(\frac{\mu_n r}{r_0} \right) \left(\frac{\alpha r_0}{a} \cos \frac{\mu_n a t}{r_0} - \mu_n \sin \frac{\mu_n a t}{r_0} \right)}{(\mu_n^2 - 1) \left(\frac{\mu_n^2}{r_0^2} + \frac{\alpha^2}{a^2} \right) J_0(\mu_n)} \cos \varphi, \\
 \mu_n > 0 - \text{ нуль функции } J_1'(\mu).
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{2.710.} \quad u(r, \varphi, t) = \frac{Ar(r_0^2 - r^2)t}{8a^2} \cos \varphi + \frac{2Ar_0^4}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1 \left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0} \right) \sin \frac{\mu_{1n} a t}{r_0}}{\mu_{1n}^4 J_0(\mu_{1n})} \cos \varphi.$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.711.} \quad u(r, \varphi, t) = & \frac{Ar}{8a^2} \left[(3r_0^2 - r^2)t - \frac{22r_0^4 - 9r_0^2 r^2 + r^4}{24a^2} \right] \cos \varphi + \\
 & + \frac{2Ar_0^5}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1 \left(\frac{\mu_n r}{r_0} \right) e^{-\left(\frac{\mu_n a}{r_0} \right)^2 t}}{\mu_n^5 (\mu_n^2 - 1) J_0(\mu_n)} \cos \varphi, \quad \mu_n > 0 - \text{ нуль функции } J_1'(\mu).
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{2.712.} \quad u(x, t) = \frac{A\sqrt{x}(l^2 - x^2)}{5a^2} + \frac{2Al^2 \sqrt[4]{lx}}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_{\frac{1}{4}} \left(\frac{\gamma_n x}{l} \right) \cos \frac{\gamma_n a t}{l}}{\gamma_n^3 J_{\frac{1}{4}}'(\gamma_n)}, \quad \gamma_n > 0 \text{ есть нуль функции } J_{\frac{1}{4}}(\gamma).$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.713.} \quad u(x, t) = & \frac{2A}{l} \sqrt[4]{\frac{x}{l}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_{\frac{1}{4}} \left(\frac{\gamma_n x}{l} \right) \left(\frac{\alpha}{a} \sin \omega_n t - \frac{\gamma_n}{l} \cos \omega_n t \right)}{\left(\frac{\gamma_n^2}{l^2} + \frac{\alpha^2}{4} \right) J_{\frac{1}{4}}'(\gamma_n)} + \\
 & + A \frac{I_{\frac{1}{4}} \left(\frac{\alpha x}{a} \right)}{I_{\frac{1}{4}} \left(\frac{\alpha l}{a} \right)} \sqrt[4]{\frac{x}{l}} e^{-\alpha t}, \quad \gamma_n > 0 - \text{ нуль функции } J_{\frac{1}{4}}(\gamma), \quad \omega_n = a \sqrt{\frac{\gamma_n^2}{l^2} + \frac{\alpha^2}{4}}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.714.} \quad 1) \quad u(r, t) = & \frac{A}{4a^2} (r_0^2 - r^2)t - \frac{A}{8a^4} (r_0^2 - r^2)(3r_0^2 - r^2) + \\
 & + \frac{2Ar_0^4}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right) e^{-\left(\frac{a\mu_{0n}}{r_0} \right)^2 t}}{\mu_{0n}^5 J_1(\mu_{0n})};
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \quad u(r, t) = & \frac{A}{4a^2} (r_0^2 - r^2)t^2 - \frac{A}{32a^4} (r_0^2 - r^2)(3r_0^2 - r_0^2) + \frac{A}{1152a^6} (r_0^2 - r^2) - \\
 & - (19r_0^4 - 8r_0^2 + r^4) - \frac{4Ar_0^6}{a^6} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right) e^{-\left(\frac{a\mu_{0n}}{r_0} \right)^2 t}}{\mu_{0n}^7 J_1(\mu_{0n})};
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3) \quad u(r, t) = & \frac{A}{4a^2} (r_0^4 - r^4)t^2 - \frac{A}{144a^4} (r_0^2 - r^2)(8r_0^4 + r_0^2 - r^4) + \\
 & + \frac{2Ar_0^6}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_{0n}^2 - 4) J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right) e^{-\left(\frac{a\mu_{0n}}{r_0} \right)^2 t}}{\mu_{0n}^7 J_1(\mu_{0n})};
 \end{aligned}$$

4) если $\alpha \neq \left(\frac{a\mu_{0n}}{r_0}\right)^2$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{a^2} \left(\frac{(\alpha r_0^2 - 4a^2) J_0\left(\frac{\sqrt{\alpha} r}{a}\right)}{J_0\left(\frac{\sqrt{\alpha} r_0}{a}\right)} - \alpha r^2 + 4a^2 \right) e^{-\alpha t} + \\ + \frac{2Ar_0^2}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_{0n}^2 - 4) J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{0n}}{r_0}\right)^2 t}}{\left(\frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2} - \frac{\alpha}{a^2}\right) J_1(\mu_{0n})},$$

если $\alpha = \left(\frac{a\mu_{0n}}{r_0}\right)^2$, то $u(r, t) = \frac{Ar_0^4}{a^2 \mu_m^4} \left(4 - \frac{\mu_{0m}^2 r^2}{r_0^2} + \right. \\ \left. + \frac{(\mu_{0m}^2 - 12) J_0\left(\frac{\mu_{0m} r}{r_0}\right)}{\mu_{0m} J_1(\mu_{0m})} + \frac{(\mu_{0m}^2 - 4) J_1\left(\frac{\mu_{0m} r}{r_0}\right)}{r_0 J_1(\mu_{0m})} \right) e^{-\left(\frac{a\mu_{0n}}{r_0}\right)^2 t} + \\ + \frac{2A(\mu_{0m}^2 - 4) r_0^2}{\mu_{0m}^3 J_1(\mu_{0m})} t e^{-\left(\frac{a\mu_{0m}}{r_0}\right)^2 t} - \frac{2Ar_0^4}{a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{(\mu_{0n}^2 - 4) J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{0n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{0n}^2 (\mu_{0n}^2 - \mu_{0m}^2) J_1(\mu_{0n})};$

$$5) u(r, t) = \frac{A}{\omega} \frac{bei \frac{\sqrt{\omega} r_0}{a} ber \frac{\sqrt{\omega} r}{a} + ber \frac{\sqrt{\omega} r_0}{a} bei \frac{\sqrt{\omega} r}{a}}{ber^2 \frac{\sqrt{\omega} r_0}{a} + bei^2 \frac{\sqrt{\omega} r_0}{a}} \cos \omega t - \\ - \frac{A}{\omega} \cos \omega t - \frac{A}{\omega} \frac{ber \frac{\sqrt{\omega} r_0}{a} bei \frac{\sqrt{\omega} r}{a} - bei \frac{\sqrt{\omega} r_0}{a} ber \frac{\sqrt{\omega} r}{a}}{ber^2 \frac{\sqrt{\omega} r_0}{a} + bei^2 \frac{\sqrt{\omega} r_0}{a}} \sin \omega t + \\ + \frac{2A\omega}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{0n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{0n} \left(\frac{\mu_{0n}^4}{r_0^4} + \frac{\omega^2}{a^4}\right) J_1(\mu_{0n})};$$

$$6) u(r, t) = \frac{A}{\omega^2 + \left(\frac{a\mu_{0n}}{r_0}\right)^4} \left(\left(\frac{a\mu_{0n}}{r_0}\right)^2 \sin \omega t - \omega \cos \omega t + \omega e^{-\left(\frac{a\mu_{0n}}{r_0}\right)^2 t} \right) J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right).$$

2.715. 1) $u(r, t) = \int_0^t h(\tau) d\tau;$

$$2) u(r, t) = \frac{Ar_0^2 t^2}{4} + \frac{A}{8a^2} \left(\frac{r_0^2}{3} + r_0^2 r^2 - \frac{r^4}{2} \right) t + \\ + \frac{Ar^2}{32a^4} \left(\frac{r^6}{18} - \frac{r_0^2 r^4}{4} + \frac{r_0^4 r^2}{3} - \frac{7r_0^6}{108} \right) + \frac{Ar_0^6}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{0n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{1n}^6 J_0(\mu_{1n})};$$

3) если $\beta \neq \frac{\mu_{1n}}{r_0}$, то $u(r, t) = \frac{A}{\beta a^2} \left(\frac{J_0(\beta r)}{\beta} + \frac{r^2 J_1(\beta r_0)}{2\beta^2 r_0} \right) t - \\ - \frac{A}{\beta a^4} \left(\frac{J_0(\beta r)}{\beta^3} - \frac{r^4 J_1(\beta r_0)}{32r_0} + \frac{J_1(\beta r_0)}{2\beta^2 a^2 r_0} \left(1 + \frac{\beta^2 r_0^2}{8} \right) r^2 \right) +$

$$+ \frac{AJ_1(\beta r_0)t^2}{\beta r_0} - \frac{2AJ_1(\beta r_0)}{\beta^3 a^2 r_0} \left(1 + \frac{\beta^2 r_0^2}{8}\right) + \frac{2AJ_1(\beta r_0)}{\beta a^4 r_0} \left(\frac{1}{\beta^4} + \frac{r_0^2}{8\beta^2} + \frac{r_0^4}{128}\right) -$$

$$- \frac{2A\beta r_0^3 J_1(\beta r_0)}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{1n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{1n}^4 \left(\frac{\mu_{1n}^2}{r_0^2} - \beta^2\right) J_0(\mu_{1n})},$$

если $\beta = \frac{\mu_{1m}}{r_0}$, то $u(r, t) = \frac{ar_0^2}{a^2 \mu_{1m}^2} t J_0\left(\frac{\mu_{1m} r}{r_0}\right)$;

$$4) u(r, t) = \frac{A}{\beta a^2} \left(\frac{r^2 I_1(\beta r_0)}{2\beta^2 r_0} - \frac{I_0(\beta r)}{\beta} \right) t -$$

$$- \frac{A}{\beta a^4} \left(\frac{I_0(\beta r)}{\beta^3} - \frac{r^4 I_1(\beta r_0)}{32 r_0} + \frac{I_1(\beta r_0)}{2\beta^2 a^2 r_0} \left(1 - \frac{\beta^2 r_0^2}{8}\right) r^2 \right) +$$

$$+ \frac{AI_1(\beta r_0)t^2}{\beta r_0} + \frac{2AI_1(\beta r_0)}{\beta^3 a^2 r_0} \left(1 - \frac{\beta^2 r_0^2}{8}\right) + \frac{2AI_1(\beta r_0)}{\beta a^4 r_0} \left(\frac{1}{\beta^4} - \frac{r_0^2}{8\beta^2} + \frac{r_0^4}{128}\right) +$$

$$+ \frac{2A\beta r_0^3 I_1(\beta r_0)}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{1n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{1n}^4 \left(\frac{\mu_{1n}^2}{r_0^2} + \beta^2\right) J_0(\mu_{1n})}.$$

2.716. Здесь γ_n — положительный корень уравнения $pJ_0(\gamma) = \gamma J_1(\gamma)$, $p = hr_0$.

$$1) u(r, t) = \frac{A}{16a^4} \left(\frac{p+2}{p} r_0^2 r^2 - \frac{r^4}{4} - \frac{3p^2 + 12p + 16}{4p^2} r_0^4 \right) +$$

$$+ \frac{A}{4a^2} \left(\frac{p+2}{p} r_0^2 - r^2 \right) t + \frac{2Apr_0^4}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{a\gamma_n}{r_0}\right)^2 t}}{\gamma_n^3 (\gamma_n^2 + p^2) J_0(\gamma_n)};$$

$$2) u(r, t) = \frac{A}{16a^2} \left(\left(1 + \frac{4}{p}\right) r_0^4 - r^4 \right) t - \frac{A}{32a^4} \left(\frac{r^6}{18} - \left(1 + \frac{4}{p}\right) \frac{r_0^4 r^2}{2} + \left(\frac{8}{3p} + \frac{4}{p^2} + \frac{4}{9}\right) \right) +$$

$$+ \frac{2Ar_0^6}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3\gamma_n^2 - 4) J_0\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{a\gamma_n}{r_0}\right)^2 t}}{\gamma_n^6 (\gamma_n^2 + p^2) J_0(\gamma_n)}.$$

2.717. Здесь $\gamma_n > 0$ — корень уравнения $\gamma J_1(\gamma) = J_0(\gamma)$.

$$u(r, t) = \frac{A}{4a^2} (3r_0^2 - r^2) t^2 - \frac{A}{8a^4} \left(\frac{r^4}{4} - 3r_0^2 r^2 + \frac{31r_0^4}{4} \right) t -$$

$$- \frac{A}{128a^6} \left(\frac{r^6}{9} - 3r_0^2 r^4 + 31r_0^4 r^2 - \frac{709}{9} r_0^6 \right) + \frac{2Ar_0^6}{a^6} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{a\gamma_n}{r_0}\right)^2 t}}{\gamma_n^7 (\gamma_n^2 + p^2) J_0(\gamma_n)}.$$

$$2.718. u(r, t) = \frac{A}{8a^2} \left(\left(1 + \frac{3}{p}\right) r_0^3 - r^3 \right) t - \frac{A}{24a^4} \left[\left(\frac{9}{2p} + \frac{7}{8} + \frac{6}{p^2}\right) r_0^5 - \right.$$

$$\left. - \left(1 + \frac{3}{p}\right) r_0^3 r^2 + \frac{r^5}{24} \right] + \frac{2A(1+p)r_0^5}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{a\gamma_n}{r_0}\right)^2 t}}{\gamma_n^4 (\gamma_n^2 + p^2 - 1) J_1(\gamma_n)},$$

$\gamma_n > 0$ — корень уравнения $\gamma J_1'(\gamma) + pJ_1(\gamma)$, $p = hr_0$.

2.719. $u(r, t) = \frac{Ar^2}{12a^2}(5 - r^2)t - \frac{Ar^2}{84a^4}\left(\frac{r^4}{8} - \frac{5r^2}{9} + \frac{137}{218}\right) + \frac{4A}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_2(\gamma_n r) e^{-a^2 \gamma_n^2 t}}{\gamma_n^4 (\gamma_n^2 - 3) J_2(\gamma_n)}$,
где $\gamma_n > 0$ — корень уравнения $\gamma J_2'(\gamma) + J_2(\gamma) = 0$.

2.720. 1) $u(r, t) = \frac{Ar^\nu(r^2 - r_0^2)}{32a^4(\nu + 1)(\nu + 2)}\left(\frac{\nu + 3}{\nu + 1}r_0^2 - r^2\right) +$
$$+ \frac{Ar^\nu}{4a^2(\nu + 1)}(r_0^2 - r^2)t + \frac{2Ar_0^{\nu+4}}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-\left(\frac{a\mu_{\nu n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{\nu n}^5 J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})};$$

2) если $\alpha \neq \left(\frac{a\mu_{\nu n}}{r_0}\right)^2$, то

$$u(r, t) = \frac{Ar_0^\nu}{\alpha} \left(\frac{J_\nu\left(\frac{\sqrt{\alpha}r}{a}\right)}{J_\nu\left(\frac{\sqrt{\alpha}r_0}{a}\right)} - \frac{r^\nu}{r_0^\nu} \right) e^{-\alpha t} - \frac{2Ar_0^\nu}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n}r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{\nu n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{\nu n}\left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} - \frac{\alpha}{a^2}\right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})},$$

при $\alpha = \left(\frac{a\mu_{\nu m}}{r_0}\right)^2$

$$u(r, t) = \left(\frac{3J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu m}r}{r_0}\right)}{2\mu_{\nu m}} - \frac{r}{r_0} J_\nu'\left(\frac{\mu_{\nu m}r}{r_0}\right) + \frac{2J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu m}r}{r_0}\right) a^2 \mu_{\nu m} t}{r_0^2} - \frac{r^\nu}{r_0^\nu} J_{\nu+1}(\mu_{\nu m}) \right) \times$$

$$\times \frac{Ar_0^{\nu+2} e^{-\left(\frac{a\mu_{\nu m}}{r_0}\right)^2 t}}{a^2 \mu_{\nu m}^2 J_{\nu+1}(\mu_{\nu m})} + \frac{2Ar_0^{\nu+2}}{a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n}r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{\nu n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{\nu n}(\mu_{\nu n}^2 - \mu_{\nu m}^2) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})};$$

3) если $\beta \neq \frac{\mu_{\nu n}}{r_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{AJ_\nu(\beta r_0)}{\beta^2 a^2} \left(\frac{J_\nu(\beta r)}{J_\nu(\beta r_0)} - \frac{r^\nu}{r_0^\nu} \right) t + \frac{AJ_\nu(\beta r_0)}{\beta^2 a^4} \left(\frac{(r_0^2 - r^2)r^\nu}{4\beta^2(\nu + 1)r_0^\nu} + \frac{r^\nu}{r_0^\nu} - \frac{J_\nu(\beta r)}{J_\nu(\beta r_0)} \right) -$$

$$- \frac{2ar_0 J_\nu(\beta r_0)}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n}r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{\nu n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{\nu n}^3 \left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} - \beta^2\right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})},$$

если $\beta = \frac{\mu_{\nu m}}{r_0}$, то $u(r, t) = \frac{Ar_0^2}{a^2 \mu_{\nu m}^2} \left(\frac{a\mu_{\nu m} t}{r_0} - 1 + e^{-\left(\frac{a\mu_{\nu m} t}{r_0}\right)^2} \right) J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu m} r}{r_0}\right);$

$$4) u(r, t) = \frac{AI_\nu(\beta r_0)}{\beta^2 a^2} \left(\frac{r^\nu}{r_0^\nu} - \frac{I_\nu(\beta r)}{I_\nu(\beta r_0)} \right) t + \frac{AI_\nu(\beta r_0)}{\beta^2 a^4} \left(\frac{(r_0^2 - r^2)r^\nu}{4\beta^2(\nu + 1)r_0^\nu} - \frac{r^\nu}{r_0^\nu} + \right.$$

$$\left. + \frac{I_\nu(\beta r)}{I_\nu(\beta r_0)} \right) - \frac{2ar_0 I_\nu(\beta r_0)}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n}r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{\nu n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{\nu n}^3 \left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} + \beta^2\right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})};$$

$$5) \text{ если } \alpha \neq \beta^2 a^2, \alpha \neq \frac{a^2 \mu_{\nu n}^2}{r_0^2}, \beta \neq \frac{\mu_{\nu n}}{r_0}, \text{ то } u(r, t) = \frac{AJ_\nu(\beta r_0)}{\alpha - \beta^2 a^2} \left(\frac{J_\nu\left(\frac{\sqrt{\alpha}r}{a}\right)}{J_\nu\left(\frac{\sqrt{\alpha}r_0}{a}\right)} - \right.$$

$$\left. - \frac{J_\nu(\beta r)}{J_\nu(\beta r_0)} \right) e^{-\alpha t} - \frac{2AJ_\nu(\beta r_0)}{a^2 r_0^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_{\nu n} J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu n}r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{\nu n}}{r_0}\right)^2 t}}{\left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} - \frac{\alpha}{a^2}\right) \left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} - \beta^2\right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})},$$

если $\alpha = \beta^2 a^2$, $\alpha \neq \frac{a^2 \mu_{\nu n}^2}{r_0^2}$, $\beta \neq \frac{\mu_{\nu n}}{r_0}$, то

$$u(r, t) = \frac{A r_0 J'_\nu \left(\frac{\sqrt{\alpha} r}{a} \right)}{2 \sqrt{\alpha} a} \left(\frac{J_\nu \left(\frac{\sqrt{\alpha} r}{a} \right)}{J_\nu \left(\frac{\sqrt{\alpha} r_0}{a} \right)} - \frac{r J'_\nu \left(\frac{\sqrt{\alpha} r}{a} \right)}{J'_\nu \left(\frac{\sqrt{\alpha} r_0}{a} \right)} \right) e^{-\alpha t} - \\ - \frac{2 A J_\nu \left(\frac{\sqrt{\alpha} r_0}{a} \right)}{a^2 r_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_{\nu n} J_\nu \left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0} \right) e^{-\left(\frac{a \mu_{\nu n}}{r_0} \right)^2 t}}{\left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} - \frac{\alpha}{a^2} \right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})},$$

если $\alpha = \frac{a^2 \mu_{\nu n}^2}{r_0^2}$, $\alpha \neq \beta^2 a^2$, то $u(r, t) = \frac{A J_\nu(\beta r_0)}{a^2 \left(\frac{\mu_{\nu m}^2}{r_0^2} - \beta^2 \right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu m})} \times$

$$\times \left(\frac{3 \mu_{\nu m}^2 a^2 - \beta^2 r_0^2}{2 \mu_{\nu m} (\mu_{\nu m}^2 - \beta^2 r_0^2)} J_\nu \left(\frac{\mu_{\nu m} r}{r_0} \right) - \frac{r}{r_0} J'_\nu \left(\frac{\mu_{\nu m} r}{r_0} \right) - \frac{J_\nu(\beta r)}{J_\nu(\beta r_0)} \right) e^{-\left(\frac{a \mu_{\nu m}}{r_0} \right)^2 t} - \\ - \frac{2 A J_\nu(\beta r_0)}{a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{\mu_{\nu n} J_\nu \left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0} \right) e^{-\left(\frac{a \mu_{\nu n}}{r_0} \right)^2 t}}{(\mu_{\nu n}^2 - \mu_{\nu m}^2) \left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} - \beta^2 \right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})},$$

если $\beta = \frac{\mu_{\nu m}}{r_0}$, $\alpha \neq \beta^2 a^2$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{\left(\frac{a \mu_{\nu m}}{r_0} \right)^2 - \alpha} \left(e^{-\alpha t} - e^{-\left(\frac{a \mu_{\nu m}}{r_0} \right)^2 t} \right) J_\nu \left(\frac{\mu_{\nu m} r}{r_0} \right),$$

если $\beta = \frac{\mu_{\nu m}}{r_0}$, $\alpha = \beta^2 a^2$, то $u(r, t) = A J_\nu \left(\frac{\mu_{\nu m} r}{r_0} \right) t e^{-\left(\frac{a \mu_{\nu m}}{r_0} \right)^2 t}$,

6) если $\alpha \neq \beta^2 a^2$, то $u(r, t) = \frac{A I_\nu(\beta r_0)}{\alpha + \beta^2 a^2} \left(\frac{J_\nu \left(\frac{\sqrt{\alpha} r}{a} \right)}{J_\nu \left(\frac{\sqrt{\alpha} r_0}{a} \right)} - \frac{I_\nu(\beta r)}{I_\nu(\beta r_0)} \right) e^{-\alpha t} -$

$$- \frac{2 A I_\nu(\beta r_0)}{a^2 r_0^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_{\nu n} J_\nu \left(\frac{\mu_{\nu n} r}{r_0} \right) e^{-\left(\frac{a \mu_{\nu n}}{r_0} \right)^2 t}}{\left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} - \frac{\alpha}{a^2} \right) \left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} + \beta^2 \right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})},$$

если $\alpha = \frac{a^2 \mu_{\nu n}^2}{r_0^2}$, то

$$u(r, t) = \frac{2 A I_\nu(\beta r_0)}{a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{2 a^2 \mu_{\nu m} J_\nu \left(\frac{\mu_{\nu m} r}{r_0} \right) e^{-\left(\frac{a \mu_{\nu m}}{r_0} \right)^2 t}}{(\mu_{\nu m}^2 - \mu_{\nu n}^2) \left(\frac{\mu_{\nu n}^2}{r_0^2} + \beta^2 \right) J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})} + \\ + \frac{A I_\nu(\beta r_0)}{a^2 \left(\frac{\mu_{\nu m}^2}{r_0^2} + \beta^2 \right)} \left(\frac{(4 \mu_{\nu m}^2 a^2 t - r_0^2) J_\nu \left(\frac{\mu_{\nu m} r}{r_0} \right)}{2 \mu_{\nu m} r_0^2 J_{\nu+1}(\mu_{\nu m})} - \frac{r J'_\nu \left(\frac{\mu_{\nu m} r}{r_0} \right)}{r_0 J_{\nu+1}(\mu_{\nu n})} - \frac{I_\nu(\beta r)}{I_\nu(\beta r_0)} \right) e^{-\left(\frac{a \mu_{\nu m}}{r_0} \right)^2 t}.$$

$$\mathbf{2.721.} \quad 1) u(r, t) = \frac{Ar^\nu t}{4a^2(\nu+1)} \left(\frac{\nu+2}{\nu} r_0^2 - r^2 \right) + \frac{Ar^\nu}{16a^4} \left(\frac{(\nu+2)r_0^2 r^2}{\nu(\nu+1)} - \right. \\ \left. - \frac{r^4}{2(\nu+2)} - \frac{(\nu^3+7\nu^2+20\nu+16)r_0^4}{\nu(\nu+1)(\nu+2)} \right) + \frac{2Avr_0^{\nu+4}}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu \left(\frac{\gamma_n r}{r_0} \right) e^{-\left(\frac{a\gamma_n}{r_0} \right)^2 t}}{\gamma_n^4 (\gamma_n^2 - \nu^2) J_\nu(\gamma_n)};$$

2) если $\alpha \neq \left(\frac{a\gamma_n}{r_0} \right)^2$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{\alpha} \left(\frac{\nu ar_0^{\nu-1} J_\nu \left(\frac{\sqrt{\alpha} r}{a} \right)}{\sqrt{\alpha} J'_\nu \left(\frac{\sqrt{\alpha} r_0}{a} \right)} - r^\nu \right) e^{-\alpha t} + \frac{2Avr_0^\nu}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu \left(\frac{\gamma_n r}{r_0} \right) e^{-\left(\frac{a\gamma_n}{r_0} \right)^2 t}}{(\gamma_n^2 - \nu^2) \left(\frac{\gamma_n^2}{r_0^2} - \frac{\alpha}{a^2} \right) J_\nu(\gamma_n)},$$

если $\alpha = \left(\frac{\gamma_m}{r_0} \right)^2$, то

$$u(r, t) = \frac{Ar_0^{\nu+2}}{a^2 \gamma_m^2} \left(\frac{\nu J_\nu \left(\frac{\gamma_m r}{r_0} \right)}{\gamma_m^2 (\gamma_m^2 - \nu^2)} - \frac{r^\nu}{r_0^\nu} - \frac{\nu \gamma_m r J'_\nu \left(\frac{\gamma_m r}{r_0} \right)}{(\gamma_m^2 - \nu^2) J_\nu(\gamma_m)} \right) e^{-\left(\frac{a\gamma_m}{r_0} \right)^2 t} - \\ - \frac{2Avr_0^\nu J_\nu \left(\frac{\gamma_m r}{r_0} \right)}{(\gamma_m^2 - \nu^2) J_\nu(\gamma_m)} t e^{-\left(\frac{a\gamma_m}{r_0} \right)^2 t} + \frac{2Avr_0^{\nu+2}}{a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{J_\nu \left(\frac{\gamma_n r}{r_0} \right) e^{-\left(\frac{a\gamma_n}{r_0} \right)^2 t}}{(\gamma_n^2 - \nu^2) (\gamma_n^2 - \gamma_m^2)};$$

3) если $\beta \neq \frac{\gamma_n}{r_0}$ то

$$u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2} \left(J_\nu(\beta r) - \frac{\beta J'_\nu(\beta r_0)}{\nu r_0^{\nu-1}} r^\nu \right) t + \frac{A J'_\nu(\beta r_0)}{\beta^3 a^4 \nu r_0^{\nu-1}} \times \\ \times \left[\left(1 - \frac{(\nu+2)\beta^2 r_0^2}{4\nu(\nu+1)} \right) r^\nu - \frac{\nu r_0^{\nu-1} J_\nu(\beta r)}{\beta J'_\nu(\beta r_0)} - \frac{\beta^2 r^{\nu+2}}{4(\nu+1)} \right] + \frac{2A\beta r_0^3 J'_\nu(\beta r_0)}{a^4} \times \\ \times \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu \left(\frac{\gamma_n r}{r_0} \right) e^{-\left(\frac{a\gamma_n}{r_0} \right)^2 t}}{\gamma_n^2 (\gamma_n^2 - \nu^2) \left(\frac{\gamma_n^2}{r_0^2} - \beta^2 \right) J_\nu(\gamma_n)},$$

если $\beta = \frac{\gamma_m}{r_0}$, то $u(r, t) = A \left(e^{-\left(\frac{a\gamma_m}{r_0} \right)^2 t} - 1 + t \right) J_\nu \left(\frac{\gamma_m r}{r_0} \right);$

$$4) u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2} \left(\frac{\beta r^\nu I'_\nu(\beta r_0)}{\nu r_0^{\nu-1}} - I_\nu(\beta r) \right) t + \\ + \frac{A I'_\nu(\beta r_0)}{\beta^3 a^4 \nu r_0^{\nu-1}} \left[\left(1 + \frac{(\nu+2)\beta^2 r_0^2}{4\nu(\nu+1)} \right) r^\nu + \frac{\nu r_0^{\nu-1} I_\nu(\beta r)}{\beta I'_\nu(\beta r_0)} + \frac{\beta^2 r^{\nu+2}}{4(\nu+1)} \right] + \\ + \frac{2A\beta r_0^3 J'_\nu(\beta r_0)}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu \left(\frac{\gamma_n r}{r_0} \right) e^{-\left(\frac{a\gamma_n}{r_0} \right)^2 t}}{\gamma_n^2 (\gamma_n^2 - \nu^2) \left(\frac{\gamma_n^2}{r_0^2} + \beta^2 \right) J_\nu(\gamma_n)}.$$

$$\mathbf{2.722.} \quad 1) u(r, t) = A \left(t - \frac{r_0^2 - r^2}{4a^2} \right) + \frac{2Ar_0^2}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right) e^{-\left(\frac{\mu_{0n} a}{r_0} \right)^2 t}}{\mu_{0n}^3 J_1(\mu_{0n})};$$

$$2) u(r, t) = At^2 - \frac{A}{2a^2}(r_0^2 - r^2)t + \frac{A}{32a^4}(r_0^2 - r^2)(3r_0^2 - r^2) - \frac{4Ar_0^4}{a^4} \times \\ \times \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n}r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{0n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{0n}^5 J_1(\mu_{0n})};$$

$$3) u(r, t) = A \frac{\operatorname{ber} \frac{\sqrt{\omega} r_0}{a} \operatorname{ber} \frac{\sqrt{\omega} r}{a} + \operatorname{bei} \frac{\sqrt{\omega} r_0}{a} \operatorname{bei} \frac{\sqrt{\omega} r}{a}}{\operatorname{ber}^2 \frac{\sqrt{\omega} r_0}{a} + \operatorname{bei}^2 \frac{\sqrt{\omega} r_0}{a}} \sin \omega t + \\ + A \frac{\operatorname{ber} \frac{\sqrt{\omega} r_0}{a} \operatorname{bei} \frac{\sqrt{\omega} r}{a} - \operatorname{bei} \frac{\sqrt{\omega} r_0}{a} \operatorname{ber} \frac{\sqrt{\omega} r}{a}}{\operatorname{ber}^2 \frac{\sqrt{\omega} r_0}{a} + \operatorname{bei}^2 \frac{\sqrt{\omega} r_0}{a}} \cos \omega t + \frac{2A\omega}{a^2 r_0^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_{0n} J_0\left(\frac{\mu_{0n}r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{0n}}{r_0}\right)^2 t}}{\left(\frac{\mu_{0n}^4}{r_0^4} + \frac{\omega^2}{a^4}\right) J_1(\mu_{0n})}.$$

$$\mathbf{2.723.} \quad 1) u(r, t) = \frac{Aa^2 t^2}{r_0} + \frac{A}{2} \left(\frac{r^2}{r_0} - \frac{r_0}{2} \right) t + \frac{A}{16a^2} \left(\frac{r^4}{2r_0} - \frac{r_0 r^2}{2} + \frac{r_0^3}{3} \right) + \\ + \frac{2Ar_0^3}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{1n}r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{0n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{1n}^4 J_0(\mu_{1n})};$$

$$2) u(r, t) = \frac{A}{32a^4} \left(\frac{r^6}{18r_0} - \frac{r_0 r^4}{4} + \frac{r_0^3 r^2}{3} - \frac{25r_0^5}{252} \right) + \frac{A}{8a^2} \left(\frac{r^4}{2r_0} - r_0 r^2 + \frac{r_0^3}{3} \right) t + \\ + \frac{A}{2} \left(\frac{r^2}{r_0} - \frac{r_0}{2} \right) t^2 + \frac{2Aa^2 t^3}{3r_0} + \frac{4Ar_0^5}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{1n}r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{a\mu_{0n}}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_{1n}^6 J_0(\mu_{1n})}.$$

$$\mathbf{2.724.} \quad u(r, t) = \frac{Ar_0 t^2}{p} - \frac{Ar_0}{2pa^2} \left(\left(1 + \frac{2}{p}\right) r_0^2 - r^2 \right) t + \\ + \frac{Ar_0}{4pa^4} \left(\frac{r^4}{8} - \left(1 + \frac{2}{p}\right) \frac{r_0^2 r^2}{2} + \left(\frac{3}{8} + \frac{3}{2p} + \frac{2}{p^2}\right) r_0^4 \right) - \frac{4Ar_0^5}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\gamma_n r}{r_0}\right) e^{-\left(\frac{a\gamma_n}{r_0}\right)^2 t}}{\gamma_n^5 (\gamma_n^2 + p^2) J_0(\gamma_n)},$$

где $\gamma_n > 0$ — корень уравнения $\gamma J_1(\gamma) = J_0(\gamma)$.

$$\mathbf{2.725.} \quad u(r, \varphi, z) = u_0 \frac{I_1\left(\frac{\pi r}{l}\right)}{I_1\left(\frac{\pi r_0}{l}\right)} \sin \frac{2\pi z}{l} \cos \varphi.$$

$$\mathbf{2.726.} \quad u(r, \varphi, z) = \frac{u_0}{2} \left[\frac{r}{r_0} + \frac{I_1\left(\frac{2\pi r}{l}\right)}{I_1\left(\frac{2\pi r_0}{l}\right)} \cos \frac{2\pi z}{l} \right] \sin \varphi.$$

$$\mathbf{2.727.} \quad u(r, \varphi, z) = \frac{q_0 r_0}{2D} \left[\frac{r^2}{2r_0^2} + \frac{l}{\pi r_0} \frac{I_2\left(\frac{\pi r}{l}\right)}{I_2'\left(\frac{\pi r_0}{l}\right)} \cos \frac{2\pi z}{l} \right] \cos 2\varphi.$$

$$\mathbf{2.728.} \quad u(r, z) = \frac{8u_0}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{I_0\left(\frac{(2n+1)\pi r}{2l}\right) \cos \frac{(2n+1)z}{2l}}{(2n+1)^2 I_0\left(\frac{(2n+1)\pi r_0}{2l}\right)}.$$

$$2.729. \quad u(r, z) = u_0 \frac{z}{l} + \frac{8q_0 l}{k\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n I_0 \left(\frac{(2n+1)\pi r}{2l} \right) \cos \frac{(2n+1)\pi z}{2l}}{(2n+1)^2 I_1 \left(\frac{(2n+1)\pi r_0}{2l} \right)}.$$

$$2.730. \quad u(r, \varphi, z) = \left[\frac{u_1 + u_2}{2r_0} r + \frac{2(u_2 - u_1)}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{I_1 \left(\frac{(2n+1)\pi r}{2l} \right) \sin \frac{(2n+1)\pi z}{2l}}{(2n+1) I_1 \left(\frac{(2n+1)\pi r_0}{2l} \right)} \right] \sin \varphi.$$

$$2.731. \quad u(r, z) = 2(p+1)u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{\mu_n^2 + p^2} I_0 \left(\frac{\mu_n r}{l} \right) \sin \frac{\mu_n z}{l}}{\mu_n (\mu_n^2 + p^2 + p) I_0 \left(\frac{\mu_n r_0}{l} \right)},$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{ctg} \mu = -p$, $p = hl$.

$$2.732. \quad u(r, \varphi, z) = u_0 \frac{I_1 \left(\frac{\pi r}{l} \right)}{I_1 \left(\frac{\pi r_0}{l} \right)} \cos \frac{\pi z}{l} \cos \varphi + \frac{2q_0 r_0}{k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right) \operatorname{ch} \frac{\mu_{0n}(l-z)}{r_0}}{\mu_{0n}^2 J_1(\mu_{0n}) \operatorname{sh} \frac{\mu_{0n} l}{r_0}}.$$

$$2.733. \quad u(r, z) = \frac{4pu_0}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{I_0 \left(\frac{\alpha_n r}{l} \right) \sin \frac{\alpha_n z}{l}}{(2n+1) \left[p I_0 \left(\frac{\alpha_n r_0}{l} \right) + \alpha_n I_1 \left(\frac{\alpha_n r_0}{l} \right) \right]},$$

где $\alpha_n = (2n+1)\pi$, $p = hl$.

2.734. Если $Q_0 r_0 = 2q_2$, то

$$u(r, \varphi, z) = C - \frac{Q_0 r^2}{4k} - \frac{2q_1 r_0}{k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1 \left(\frac{\gamma_n r}{r_0} \right) \operatorname{ch} \frac{\gamma_n(l-z)}{r_0}}{\gamma_n (\gamma_n^2 - 1) J_1(\gamma_n) \operatorname{sh} \frac{\gamma_n l}{r_0}} \cos \varphi, \text{ где } \gamma_n > 0 \text{ есть}$$

нуль функции $J_1'(\gamma)$, иначе задача не имеет решения.

$$2.735. \quad u(r, z) = \frac{4u_0}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{I_0 \left(\sqrt{\frac{\alpha}{D} + \frac{\pi^2 n^2}{l^2}} r \right) \sin \frac{(2k+1)\pi z}{l}}{I_0 \left(\sqrt{\frac{\alpha}{D} + \frac{\pi^2 n^2}{l^2}} r_0 \right) (2k+1)}.$$

$$2.736. \quad u(r, z) = \frac{8lq_0}{k\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n K_0 \left(\frac{\alpha_n r}{l} \right) \cos \frac{\alpha_n z}{l}}{(2n+1)^2 K_1 \left(\frac{\alpha_n r_0}{l} \right)}, \quad \alpha_n = \frac{(2n+1)\pi}{2}.$$

$$2.737. \quad u(r, \varphi, z) = \frac{4u_0}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n K_2 \left(\frac{\alpha_n r}{l} \right) \cos \frac{\alpha_n z}{l}}{(2n+1) K_2 \left(\frac{\alpha_n r_0}{l} \right)} \cos 2\varphi, \quad \alpha_n = \frac{(2n+1)\pi}{2}.$$

$$2.738. \quad u(r, \varphi, z) = \frac{u_0}{4} \left\{ 1 + \frac{r_0^2}{r^2} \cos 2\varphi + \left[\frac{K_0 \left(\frac{2\pi r}{l} \right)}{K_0 \left(\frac{2\pi r_0}{l} \right)} + \frac{K_2 \left(\frac{2\pi r}{l} \right)}{K_2 \left(\frac{2\pi r_0}{l} \right)} \cos 2\varphi \right] \cos \frac{2\pi z}{l} \right\}.$$

$$2.739. \quad u(r, z) = 2pu_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n K_0 \left(\frac{\alpha_n r}{l} \right) \cos \frac{\alpha_n z}{l}}{\alpha_n \left[p K_0 \left(\frac{\alpha_n r_0}{l} \right) + \alpha_n K_1 \left(\frac{\alpha_n r_0}{l} \right) \right]}, \quad \alpha_n = \frac{(2n+1)\pi}{2}, \quad p = hl.$$

$$2.740. \quad u(r, \varphi, z) = \frac{4lq_0}{k\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{K_0 \left(\frac{\alpha_n r_1}{l} \right) I_0 \left(\frac{\alpha_n r}{l} \right) - I_0 \left(\frac{\alpha_n r_1}{l} \right) K_0 \left(\frac{\alpha_n r}{l} \right) \sin \frac{\alpha_n z}{l}}{K_0 \left(\frac{\alpha_n r_1}{l} \right) I_1 \left(\frac{\alpha_n r_2}{l} \right) + I_0 \left(\frac{\alpha_n r_1}{l} \right) K_1 \left(\frac{\alpha_n r_2}{l} \right) (2n+1)^2},$$

где $\alpha_n = (2n+1)\pi$.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.741.} \quad u(r, \varphi, z) = 2u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\mu_{0n}) \operatorname{sh} \frac{\mu_{0n} z}{r_0}}{\mu_{0n} J_1(\mu_{0n}) \operatorname{sh} \frac{\mu_{0n} l}{r_0}} + \\
 + \frac{4u_1}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{I_1 \left(\frac{(2n+1)\pi r}{l} \right) \sin \frac{(2n+1)\pi z}{l}}{I_1 \left(\frac{(2n+1)\pi r_0}{l} \right) (2n+1)} \sin \varphi.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.742.} \quad u(r, \varphi, z) = -2u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\mu_{1n}) \operatorname{sh} \frac{\mu_{1n}(l-z)}{r_0}}{\mu_{1n} J_0(\mu_{1n}) \operatorname{sh} \frac{\mu_{1n} l}{r_0}} \sin \varphi + \\
 + \frac{4u_1}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{I_2 \left(\frac{(2n+1)\pi r}{l} \right) \sin \frac{(2n+1)\pi z}{l}}{I_2 \left(\frac{(2n+1)\pi r_0}{l} \right) (2n+1)} \cos 2\varphi.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.743.} \quad u(r, \varphi, z) = \frac{u_1 I_2 \left(\frac{\pi r}{l} \right)}{I_2 \left(\frac{\pi r_0}{l} \right)} \sin \frac{\pi z}{l} \sin 2\varphi + \\
 + 4u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left[4 - (4 + \mu_{2n}^2) J_0(\mu_{2n}) \right] J_2 \left(\frac{\mu_{2n} r}{r_0} \right) \operatorname{sh} \frac{\mu_{2n} z}{r_0}}{\mu_{2n}^4 J_0^2(\mu_{2n}) \operatorname{sh} \frac{\mu_{2n} l}{r_0}} \cos 2\varphi.
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{2.744.} \quad u(r, \varphi, z) = \frac{u_1 I_0 \left(\frac{3\pi r}{l} \right) \sin \frac{3\pi z}{l}}{I_0 \left(\frac{3\pi r_0}{l} \right)} - 2u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1 \left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0} \right) \operatorname{sh} \frac{\mu_{1n} z}{r_0}}{\mu_{1n} J_0(\mu_{1n}) \operatorname{sh} \frac{2\mu_{1n} l}{r_0}}.$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.745.} \quad u(r, \varphi, z) = 2u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu_{0n}^2 - 4) J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right) \operatorname{sh} \frac{\mu_{0n}(l-z)}{r_0}}{\mu_{0n}^3 J_1(\mu_{0n}) \operatorname{sh} \frac{2\mu_{0n} l}{r_0}} + \\
 + \frac{4u_1}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{I_1 \left(\frac{(2n+1)\pi r}{l} \right) \cos \frac{(2n+1)\pi z}{l}}{I_1 \left(\frac{(2n+1)\pi r_0}{l} \right) (2n+1)^2} \cos \varphi.
 \end{aligned}$$

2.746. Если $q_1 = 2lQ_0$, то

$$u(r, \varphi, z) = C - \frac{Q_0(l-z)^2}{2k} - \frac{q_2}{k} \cos \varphi - \frac{4q_1 r_0}{k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\mu_{1n}) \operatorname{ch} \frac{\mu_{1n}(l-z)}{r_0}}{\mu_{1n}^3 J_0(\mu_{1n}) \operatorname{sh} \frac{\mu_{1n} l}{r_0}},$$

в противном случае задача не имеет решения.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.747.} \quad u(r, \varphi, z) = \frac{Q_0(r_0^2 - r^2)}{4k} + \frac{u_0}{2} \left(\frac{r}{r_0} - \frac{I_1 \left(\frac{2\pi r}{l} \right)}{I_1 \left(\frac{2\pi r_0}{l} \right)} \cos \frac{2\pi z}{l} \right) - \\
 - \frac{2q_0 r_0}{k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0} \right) \operatorname{ch} \frac{\mu_{0n} z}{r_0}}{\mu_{0n}^2 J_1(\mu_{0n}) \operatorname{sh} \frac{\mu_{0n} l}{r_0}}.
 \end{aligned}$$

$$2.748. u(r, \varphi, z) = u_1 + \frac{Q_0(r_0^2 - r^2)}{4k} - \frac{2q_1 r_0}{k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\mu_{1n} r}{r_0}\right) \operatorname{sh} \frac{\mu_{1n}(l-z)}{r_0}}{\mu_{1n}^2 J_0(\mu_{1n}) \operatorname{ch} \frac{\mu_{1n} l}{r_0}} \cos \varphi - \\ - \frac{2}{k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{k u_1 \mu_{0n}^2 + r_0^2 Q_0}{\mu_{0n}^3} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right) \operatorname{ch} \frac{\mu_{0n} z}{r_0}}{J_1(\mu_{0n}) \operatorname{sh} \frac{\mu_{0n} l}{r_0}}.$$

$$2.749. u(r, \varphi, z) = \frac{Q_0 r(r_0^2 - r^2) \cos \varphi}{8k r_0} + \frac{u_0}{2} - \frac{u_0 I_0\left(\frac{\pi r}{l}\right) \cos \frac{\pi z}{l}}{2 I_0\left(\frac{\pi r}{l}\right)} + \\ + \frac{2 q_0 r_0}{k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right) \operatorname{sh} \frac{\mu_{0n}(l-z)}{r_0}}{\mu_{0n}^2 J_1(\mu_{0n}) \operatorname{sh} \frac{2 \mu_{0n} l}{r_0}}.$$

$$2.750. u(r, \varphi, z) = \frac{Q_0}{\alpha} + \frac{2(\alpha u_0 - Q_0)}{\alpha} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\mu_{0n} r}{r_0}\right) \operatorname{ch} \sqrt{\frac{\alpha}{D} + \frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2}}(l-z)}{\mu_{0n} J_1(\mu_{0n}) \operatorname{ch} \sqrt{\frac{\alpha}{D} + \frac{\mu_{0n}^2}{r_0^2}} l} + \\ + \frac{4(\alpha u_1 - Q_0)}{\pi \alpha} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{I_0\left(\sqrt{\frac{\alpha}{D} + \left(\frac{2n+1}{2l}\pi\right)^2} r\right) \sin \frac{(2n+1)\pi z}{2l}}{(2n+1) I_0\left(\sqrt{\frac{\alpha}{D} + \left(\frac{2n+1}{2l}\pi\right)^2} r_0\right)}.$$

$$2.751. u(r, \varphi, z) = \frac{u_0 z}{l} + \frac{2 u_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n K_0\left(\frac{\pi n r}{l}\right) \sin \frac{\pi n z}{l}}{n K_0\left(\frac{\pi n r_0}{l}\right)} + \\ + \frac{4 u_1}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} K_1\left(\frac{(2n+1)\pi r}{2l}\right) \cos \frac{(2n+1)\pi z}{2l}}{(2n+1) K_1\left(\frac{(2n+1)\pi r_0}{2l}\right)} \sin \varphi.$$

$$2.752. u(r, \varphi, z) = \frac{q_0(r^2 - r_0^2)}{4kl} - \frac{q_0 z^2}{2kl} + \frac{q_0 l}{6k} + \frac{u_0 r_0^3}{r^3} \sin 3\varphi + \\ + \frac{q_0 l}{k \pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n K_0\left(\frac{\pi n r}{l}\right) \cos \frac{\pi n z}{l}}{n^2 K_0\left(\frac{\pi n r_0}{l}\right)}.$$

$$2.753. u(r, \varphi, z) = \frac{Q_0}{\alpha} \left(1 - \frac{K_0\left(\sqrt{\frac{\alpha}{D}} r\right)}{K_0\left(\sqrt{\frac{\alpha}{D}} r_0\right)} \right) + \frac{u_0 p r_0 \cos \varphi}{1+p} \frac{1}{r}.$$

$$2.754. u(r, \varphi, z) = \frac{u_0 K_1\left(\frac{2\pi r}{l}\right) \sin \frac{2\pi z}{l}}{K_1\left(\frac{2\pi r_0}{l}\right)} + \\ + \frac{4 q_0 r_1}{k \pi} \cdot \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{K_0(\alpha_n r_1) [I_0(\alpha_n r) K_0(\alpha_n r_0) - I_0(\alpha_n r_0) K_0(\alpha_n r)]}{(2n+1) K_0(\alpha_n r_0)} \sin \alpha_n z, & r < r_1, \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{K_0(\alpha_n r) [I_0(\alpha_n r_1) K_0(\alpha_n r_0) - I_0(\alpha_n r_0) K_0(\alpha_n r_1)]}{(2n+1) K_0(\alpha_n r_0)} \sin \alpha_n z, & r_1 < r \end{cases}$$

где $\alpha_n = \frac{(2n+1)\pi}{l}$.

2.757. Решение. Волновая функция стационарного состояния с наименьшей энергией не зависит от φ и является собственной функцией следующей задачи на собственные значения:

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{d\psi}{dr} + k^2 \psi &= 0, \quad 0 < r < r_0, & \frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{d\psi}{dr} - (k_0^2 - k^2) \psi &= 0, \quad r_0 < r, \\ \psi(r_0 - 0) &= \psi(r_0 + 0), & \psi'(r_0 - 0) &= \psi'(r_0 + 0), \\ |\psi(0)| < \infty, & \int_0^\infty \psi^2 r dr < \infty, & k^2 &= \frac{2mE}{\hbar^2}, \quad k_0^2 = \frac{2mU_0}{\hbar^2}, \quad k_0^2 > k^2. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что

$$\psi(r) = \begin{cases} AJ_0(kr), & 0 \leq r < r_0, \\ BK_0(\sqrt{k_0^2 - k^2} r), & r_0 < r. \end{cases}$$

Граничные условия выполняются, если

$$\frac{\mu J_1(\mu)}{J_0(\mu)} = \frac{\sqrt{\mu_0^2 - \mu^2} K_1(\sqrt{\mu_0^2 - \mu^2})}{K_0(\sqrt{\mu_0^2 - \mu^2})}, \quad \mu = kr_0, \quad \mu_0 = k_0 r_0.$$

Левая часть уравнения — монотонно возрастающая функция от нуля до бесконечности на промежутке $(0; \mu_0)$, что следует из положительности производной,

$$\frac{d}{d\mu} \frac{\mu J_1(\mu)}{J_0(\mu)} = \mu \frac{J_0^2(\mu) + J_1^2(\mu)}{J_0^2(\mu)} > 0,$$

а правая часть — непрерывная неотрицательная функция, так как при вещественных значениях ν функция Макдональда $K_\nu(x)$ не имеет нулей и сохраняет знак плюс. Таким образом, при любом $\mu_0 > 0$ уравнение имеет хотя бы один корень.

2.758. Поле электрического типа: $\mathbf{E} = e^{i\omega t}(\mathcal{E}_r, \mathcal{E}_\varphi, \mathcal{E}_z)$, $\mathbf{H} = e^{i\omega t}(\mathcal{H}_r, \mathcal{H}_\varphi, 0)$,

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_r &= AJ'_\nu\left(\frac{\mu_{\nu s} r}{r_0}\right) e^{im\varphi} \sin \frac{\pi n z}{l}, & \mathcal{H}_r &= \frac{\omega_{\nu s n} m l r_0 A}{c \mu_{\nu s} \pi n r} J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu s} r}{r_0}\right) e^{im\varphi} \cos \frac{\pi n z}{l}, \\ \mathcal{E}_\varphi &= \frac{ir_0 m A}{\mu_{\nu s} r} J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu s} r}{r_0}\right) e^{im\varphi} \sin \frac{\pi n z}{l}, & \mathcal{H}_\varphi &= \frac{i \omega_{\nu s n}}{c \pi n} J'_\nu\left(\frac{\mu_{\nu s} r}{r_0}\right) e^{im\varphi} \cos \frac{\pi n z}{l}, \\ \mathcal{E}_z &= -\frac{\mu_{\nu s} l A}{\pi n r_0} J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu s} r}{r_0}\right) e^{im\varphi} \cos \frac{\pi n z}{l}, & \mathcal{H}_z &= 0; \end{aligned}$$

$$\omega_{\nu s n} = c \sqrt{\left(\frac{\mu_{\nu s}}{r_0}\right)^2 + \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2}, \quad \mu_{\nu s} > 0 \text{ — нуль функции } J_\nu(\mu), \quad \nu = |m|, \\ m \in \mathbf{Z}, \quad s \in \mathbf{N}, \quad n \in \mathbf{N}_0.$$

Поле магнитного типа: $\mathbf{E} = e^{i\omega t}(\mathcal{E}_r, \mathcal{E}_\varphi, 0)$, $\mathbf{H} = e^{i\omega t}(\mathcal{H}_r, \mathcal{H}_\varphi, \mathcal{H}_z)$,

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_r &= \frac{\omega_{\nu s n} m l r_0 B}{c \gamma_{\nu s} \pi n r} J_\nu\left(\frac{\gamma_{\nu s} r}{r_0}\right) e^{im\varphi} \sin \frac{\pi n z}{l}, & \mathcal{H}_r &= B J'_\nu\left(\frac{\gamma_{\nu s} r}{r_0}\right) e^{im\varphi} \cos \frac{\pi n z}{l}, \\ \mathcal{E}_\varphi &= \frac{i \omega_{\nu s n} l B}{c \pi n} J'_\nu\left(\frac{\gamma_{\nu s} r}{r_0}\right) e^{im\varphi} \sin \frac{\pi n z}{l}, & \mathcal{H}_\varphi &= \frac{ir_0 m B}{\gamma_{\nu s} r} J_\nu\left(\frac{\gamma_{\nu s} r}{r_0}\right) e^{im\varphi} \cos \frac{\pi n z}{l}, \\ \mathcal{E}_z &= 0, & \mathcal{H}_z &= \frac{\gamma_{\nu s} l B}{\pi n r_0} J_\nu\left(\frac{\gamma_{\nu s} r}{r_0}\right) e^{im\varphi} \sin \frac{\pi n z}{l}; \end{aligned}$$

$\omega_{\nu sn} = c\sqrt{\left(\frac{\gamma_{\nu s}}{r_0}\right)^2 + \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2}$, $\mu_{ms} > 0$ — нуль функции $J'_\nu(\mu)$, $\nu = |m|$,
 $m \in \mathbb{Z}$, $s, n \in \mathbb{N}$, J'_m — производная по всему аргументу.
 У к а з а н и е. См. задачу 1.470.

2.759. Поле электрического типа: $\mathbf{E} = e^{i\omega t}(\mathcal{E}_r, \mathcal{E}_\varphi, \mathcal{E}_z)$, $\mathbf{H} = e^{i\omega t}(\mathcal{H}_r, \mathcal{H}_\varphi, 0)$,
 $\mathcal{E}_r = A J'_\nu\left(\frac{\mu_{\nu s} r}{r_0}\right) \sin \nu \varphi \sin \frac{\pi n z}{l}$,
 $\mathcal{H}_r = -\frac{i\omega_{\nu sn} m l r_0 A}{c \alpha \mu_{\nu s} \pi n r} J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu s} r}{r_0}\right) \cos \nu \varphi \cos \frac{\pi n z}{l}$,
 $\mathcal{E}_\varphi = \frac{\nu r_0 A}{\mu_{\nu s} r} J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu s} r}{r_0}\right) \cos \nu \varphi \sin \frac{\pi n z}{l}$, $\mathcal{H}_\varphi = \frac{i\omega_{\nu sn} l A}{c \pi n} J'_\nu\left(\frac{\mu_{\nu s} r}{r_0}\right) \sin \nu \varphi \cos \frac{\pi n z}{l}$,
 $\mathcal{E}_z = -\frac{\mu_{\nu s} l A}{\pi n r_0} J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu s} r}{r_0}\right) \sin \nu \varphi \cos \frac{\pi n z}{l}$, $\mathcal{H}_z = 0$;

$\omega_{\nu sn} = c\sqrt{\left(\frac{\mu_{\nu s}}{r_0}\right)^2 + \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2}$, $\mu_{\nu s} > 0$ — нуль функции $J_\nu(\mu)$, $\nu = \frac{\pi n}{\alpha}$,
 $m, s \in \mathbb{N}_0$, $n \in \mathbb{N}$.

Поле магнитного типа: $\mathbf{E} = e^{i\omega t}(\mathcal{E}_r, \mathcal{E}_\varphi, 0)$, $\mathbf{H} = e^{i\omega t}(\mathcal{H}_r, \mathcal{H}_\varphi, \mathcal{H}_z)$,
 $\mathcal{E}_r = \frac{i\omega_{\nu sn} m l r_0 B}{c \gamma_{\nu s} \pi n r} J_\nu\left(\frac{\gamma_{\nu s} r}{r_0}\right) \sin \nu \varphi \sin \frac{\pi n z}{l}$, $\mathcal{H}_r = B J'_\nu\left(\frac{\gamma_{\nu s} r}{r_0}\right) \cos \nu \varphi \cos \frac{\pi n z}{l}$,
 $\mathcal{E}_\varphi = \frac{i\omega_{\nu sn} l B}{c \pi n} J'_\nu\left(\frac{\gamma_{\nu s} r}{r_0}\right) \cos \nu \varphi \sin \frac{\pi n z}{l}$, $\mathcal{H}_\varphi = -\frac{\nu r_0 B}{\gamma_{\nu s} r} J_\nu\left(\frac{\gamma_{\nu s} r}{r_0}\right) \sin \nu \varphi \cos \frac{\pi n z}{l}$,
 $\mathcal{E}_z = 0$, $\mathcal{H}_z = \frac{\gamma_{\nu s} l B}{\pi n r_0} J_\nu\left(\frac{\gamma_{\nu s} r}{r_0}\right) \cos \nu \varphi \sin \frac{\pi n z}{l}$;

$\omega_{\nu sn} = c\sqrt{\left(\frac{\gamma_{\nu s}}{r_0}\right)^2 + \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2}$, $\gamma_{\nu s} > 0$ — нуль функции $J'_\nu(\gamma)$, $\nu = \frac{\pi m}{\alpha}$,
 $m \in \mathbb{N}_0$, $s, n \in \mathbb{N}$. J'_m — производная по всему аргументу.
 У к а з а н и е. См. задачу 1.471.

2.760. TM_{0S} -моды: $\mathcal{E}_z(r) = A \cdot \begin{cases} \frac{J_0\left(\frac{qr}{r_0}\right)}{J_0(q)}, & 0 \leq r < r_0, \quad q = r_0 \sqrt{k^2 n_1^2 - \beta^2}, \\ \frac{K_0\left(\frac{pr}{r_0}\right)}{K_0(p)}, & r_0 \leq r, \quad p = r_0 \sqrt{\beta^2 - k^2 n_2^2}. \end{cases}$

Характеристическое уравнение: $\frac{q J_0(q)}{n_1^2 J_1(q)} + \frac{p K_0(p)}{n_2^2 K_1(p)} = 0$.

TE_{0S} -моды: $\mathcal{H}_z = B \cdot \begin{cases} \frac{J_0\left(\frac{qr}{r_0}\right)}{J_0(q)}, & 0 \leq r < r_0, \\ \frac{K_0\left(\frac{pr}{r_0}\right)}{K_0(p)}, & r_0 < r. \end{cases}$

Характеристическое уравнение: $\frac{q J_0(q)}{J_1(q)} + \frac{p K_0(p)}{K_1(p)} = 0$. Остальные компоненты поля определяются формулами, приведенными в ответе к задаче 1.478. Частоты отсечки для мод обоего типа: $\omega_{0j} = \frac{c \mu_{0j}}{r_0 \sqrt{n_1^2 - n_2^2}}$, $j \in \mathbb{N}$.

2.761. $\mathbf{E} = \mathcal{E} e^{i(\beta z + m\varphi - \omega t)}$, $\mathbf{H} = \mathcal{H} e^{i(\beta z + m\varphi - \omega t)}$, $m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$,

$$\mathcal{E}_z(r) = A \cdot \begin{cases} \frac{J_m\left(\frac{qr}{r_0}\right)}{J_m(q)}, & 0 \leq r < r_0, \\ \frac{K_m\left(\frac{pr}{r_0}\right)}{K_m(p)}, & r_0 \leq r, \end{cases}$$

$$\mathcal{H}_z(r) = B \mathcal{E}_z(r), \quad q = r_0 \sqrt{k^2 n_1^2 - \beta^2},$$

$$p = r_0 \sqrt{\beta^2 - k^2 n_2^2}, \quad s = k r_0 \sqrt{n_1^2 - n_2^2}. \quad (2.110)$$

Остальные компоненты поля определяются формулами (1.197). Существуют моды двух типов. Характеристическое уравнение

$$\frac{J_{m+1}(q)}{q J_m(q)} + \frac{K_{m+1}(p)}{p K_m(p)} = 0, \quad m \in \mathbb{N},$$

описывает так называемые EH -моды; для них $B = i n_1 \frac{m}{|m|} A$, частоты отсечки определяются уравнением $J_m(s) = 0$, $s > 0$. Характеристическое уравнение

$$\frac{J_{m-1}(q)}{q J_m(q)} - \frac{K_{m-1}(p)}{p K_m(p)} = 0, \quad m \in \mathbb{N},$$

описывает HE -моды, для которых $B = -i n_1 \frac{m}{|m|} A$, а уравнения $J_{m-2}(s) = 0$, $J_1(s) = 0$, $s > 0$, $m = 2, 4, 5, \dots$ определяют частоты отсечки.

У к а з а н и е. Компоненты $\mathcal{E}_z$, $\mathcal{H}_z$ являются решениями задач (1.196). Требование непрерывности компонент $\mathcal{E}_z$, $\mathcal{E}_\varphi$, $\mathcal{H}_z$, $\mathcal{H}_\varphi$ при $r = r_0$ приводит к однородной системе линейных алгебраических уравнений. Система имеет нетривиальное решение при условии

$$\left(\frac{J'_m(q)}{q J_m(q)} + \frac{K'_m(p)}{p K_m(p)} \right)^2 = \left(\frac{\beta m s^2}{k n_1 p^2 q^2} \right)^2,$$

которое представляет собой характеристическое уравнение. Оно распадается на два уравнения; каждое из них с помощью рекуррентных формул для цилиндрических функций преобразуется к виду, приведенному в ответе. При $B = k n_2$ характеристические уравнения определяют частоты отсечки.

2.762. **У к а з а н и е.** Частота отсечки моды с азимутальным числом $m = 0$ определяется уравнением $J_0(s) = 0$ (задача 2.760). Для мод с азимутальным числом $m \neq 0$ характеристическое уравнение имеет вид

$$\left(\frac{J'_m(q)}{q J_m(q)} + \frac{K'_m(p)}{p K_m(p)} \right) \left(\frac{n_1^2 J'_m(q)}{q J_m(q)} + \frac{n_2^2 K'_m(p)}{p K_m(p)} \right) = \left(\frac{m \beta s^2}{k p^2 q^2} \right)^2,$$

откуда вытекают уравнения $J_1(s) = 0$, $s \geq 0$, и $J_{m-2}(s) = -\frac{\Delta}{1 - \Delta} J_m(s)$, $s > 0$, для определения частот отсечки мод; q, p, s имеют вид (2.110).

2.763. Четные TE -моды: $\mathcal{E}_y(x) = A J_\nu \left(a_1 e^{-\frac{|x|}{2l}} \right)$,

четные TM -моды: $\mathcal{H}_y(x) = \frac{B}{n(x)} J_\nu \left(a_2 e^{-\frac{|x|}{2l}} \right)$,

$$\nu = 2l\sqrt{\beta^2 - k^2 n_1^2}, \quad a_1 = 2kl n_1 \sqrt{2\Delta}, \quad a_2 = 2\sqrt{\Delta(1 + 2k^2 l^2 n_1^2)}.$$

Характеристические уравнения: $\beta^2 = k^2 n_1^2 + \frac{\nu_{ij}^2}{4l^2}$, $j \in \mathbb{N}$, $\nu_{ij} > 0$ — корни уравнения $J'_\nu(a_i) = 0$, $i = 1, 2$.

Нечетные TE -моды: $\mathcal{E}_y(x) = A J_\nu \left(a_1 e^{-\frac{|x|}{2l}} \right) \operatorname{sign} x$;

нечетные TM -моды: $\mathcal{H}_y(x) = \frac{B}{n(x)} J_\nu \left(a_2 e^{-\frac{|x|}{2l}} \right) \operatorname{sign} x$.

Характеристические уравнения: $\beta^2 = k^2 n_1^2 + \frac{\nu_{ij}^2}{4l^2}$, $j \in \mathbb{N}$, $\nu_{ij} > 0$ — корень уравнения $J_\nu(a_i) = 0$, $i = 1, 2$.

Частоты отсечки для TE -мод: $\omega_{0j}^{(\alpha)} = \frac{c}{2n_1 l \sqrt{2\Delta}} \mu_{\alpha j}$, $\alpha = 0, 1$, $j \in \mathbb{N}$;

частоты отсечки для TM -мод: $\omega_{0j}^{(\alpha)} = \frac{c}{2n_1 l \sqrt{2\Delta}} \sqrt{\mu_{\alpha j}^2 - 4\Delta}$, $\alpha = 0, 1$, $j \in \mathbb{N}$;

$\alpha = 1$ относится к четным модам, $\alpha = 0$ — к нечетным.

Остальные компоненты поля определяются формулами, приведенными в ответе к задаче 1.477.

2.764. См. ответ к задаче 2.763 для нечетных мод.

2.765. $j(r, t) = j_0(r) e^{i\omega t}$,

$$j_0(r) = \frac{pI\sqrt{-i}}{\pi\sqrt{2}r_0} \cdot \frac{J_0(pr\sqrt{-2i})}{J_1(pr_0\sqrt{-2i})} \frac{pI\sqrt{-i}}{\pi\sqrt{2}r_0} \cdot \frac{\operatorname{ber}_0(p\sqrt{2}r) + i \operatorname{bei}_0(p\sqrt{2}r)}{\operatorname{ber}_1(p\sqrt{2}r_0) + i \operatorname{bei}_1(p\sqrt{2}r_0)},$$

$$w = \frac{I^2}{2r_0 c} \sqrt{\frac{\mu\omega}{2\pi\sigma}}, \quad \left| \frac{j_0(r)}{j_0(r_0)} \right| \approx \begin{cases} 1 + \left(\frac{pr}{2}\right)^4, & pr_0 \ll 1, \\ e^{-p(r_0-r)}, & pr_0 \gg 1. \end{cases}$$

2.766. $H = H_0 \operatorname{Re} \left(\frac{\operatorname{ber}_0(p\sqrt{2}r) + i \operatorname{bei}_0(p\sqrt{2}r)}{\operatorname{ber}_0(p\sqrt{2}r_0) + i \operatorname{bei}_0(p\sqrt{2}r_0)} e^{i\omega t} \right)$,

$$w = \pi\sigma \left(\frac{\mu\omega r_0^2 H_0}{4c} \right)^2, \quad A_j = \frac{pcH_0}{2\sqrt{2}\pi} \sqrt{\frac{\operatorname{ber}_0^2(p\sqrt{2}r) + \operatorname{bei}_0^2(p\sqrt{2}r)}{\operatorname{ber}_0^2(p\sqrt{2}r_0) + \operatorname{bei}_0^2(p\sqrt{2}r_0)}}.$$

2.767. $\mathbf{H}(\mathbf{r}, \varphi, \mathbf{t}) = \mathcal{H}(r, \varphi) e^{i\omega t}$,

$$\mathcal{H}_r(r, \varphi) = \frac{2H_0 J_1(kr)}{kr J_0(kr_0)} \cos \varphi, \quad \mathcal{H}_\varphi(r, \varphi) = \frac{2H_0 J'_1(kr)}{J_0(kr_0)} \cos \varphi, \quad \mathcal{H}_z(r, \varphi) = 0.$$

У к а з а н и е. Решения уравнений для $A(r, \varphi)$ и $u(r, \varphi)$ соответственно (см. ответ к задаче 1.486) имеют форму рядов:

$$A(r, \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} J_n(kr) (a_n \cos n\varphi + b_n \sin n\varphi), \quad r < r_0,$$

$$u(r, \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r} \right)^n (c_n \cos n\varphi + d_n \sin n\varphi), \quad r_0 < r.$$

Из условия при $r \rightarrow \infty$ следует, что не равны нулю лишь коэффициенты a_0 , c_0 , b_1 , c_1 . Коэффициенты b_1 и c_1 определяются из требования непрерывности функции $\mathbf{H}(r, \varphi)$ при $r = r_0$.

2.768. $Y_0(\alpha r_0) J_0(\alpha r_1) - Y_0(\alpha r_1) J_0(\alpha r_0) = 0$.

$$2.769. \frac{Y_0(\alpha \tilde{r}_1)}{J_0(\alpha \tilde{r}_1)} = \frac{Y_0(\alpha r_0) + \varepsilon \alpha Y_1(\alpha r_0)}{J_0(\alpha r_0) + \varepsilon \alpha J_1(\alpha r_0)}.$$

$$2.770. \frac{D_B I_0\left(\frac{r_0}{L_B}\right)}{L_B I_1\left(\frac{r_0}{L_B}\right)} = \alpha_C D_C \frac{J_0(\alpha_C \tilde{r}_1) Y_1(\alpha_C r_0) - Y_0(\alpha_C \tilde{r}_1) J_1(\alpha_C r_0)}{Y_0(\alpha_C \tilde{r}_1) J_0(\alpha_C r_0) - J_0(\alpha_C \tilde{r}_1) Y_0(\alpha_C r_0)},$$

$$L_B = \sqrt{\frac{D_B}{L_B^2}}, \quad D_B = \frac{1}{3\Sigma_s^B}, \text{ выражение для } \alpha_C \text{ дано в ответе к задаче 2.48.}$$

$$2.771. \alpha_C D_C \frac{J_1(\alpha_C r_0)}{J_0(\alpha_C r_0)} = \frac{D_R}{L_R} \frac{K_0\left(\frac{r_1}{L_R}\right) I_1\left(\frac{r_0}{L_R}\right) + I_0\left(\frac{r_1}{L_R}\right) K_1\left(\frac{r_0}{L_R}\right)}{I_0\left(\frac{r_1}{L_R}\right) K_0\left(\frac{r_0}{L_R}\right) - K_0\left(\frac{r_1}{L_R}\right) I_0\left(\frac{r_0}{L_R}\right)},$$

α_C и L_R те же, что в ответе к задаче 2.48.

$$2.772. \frac{Y_0(\mu r_1)}{J_0(\mu r_1)} = \frac{Y_0(\mu r_0) + \varepsilon \mu Y_1(\mu r_0)}{J_0(\mu r_0) + \varepsilon \mu J_1(\mu r_0)}, \quad \mu^2 = \alpha^2 - \left(\frac{\pi}{2l}\right)^2.$$

$$2.773. \mu_B D_B \frac{I_1(\mu_B r_0)}{I_0(\mu_B r_0)} = \mu_C D_C \frac{J_0(\mu_C \tilde{r}_1) Y_1(\mu_C r_0) - Y_0(\mu_C \tilde{r}_1) J_1(\mu_C r_0)}{Y_0(\mu_C \tilde{r}_1) J_0(\mu_C r_0) - J_0(\mu_C \tilde{r}_1) Y_0(\mu_C r_0)},$$

$$\text{где } \mu_C^2 = \alpha_C^2 - \left(\frac{\pi}{2l}\right)^2, \quad \mu_B^2 = \frac{1}{L_B^2} + \left(\frac{\pi}{2l}\right)^2.$$

$$2.774. \mu_C D_C \frac{J_1(\mu_C r_0)}{J_0(\mu_C r_0)} = \mu_R D_R \frac{K_0(\mu_R r_1) I_1(\mu_R r_0) + I_1(\mu_R r_1) K_1(\mu_R r_0)}{I_0(\mu_R r_1) K_0(\mu_R r_0) - K_0(\mu_R r_1) I_0(\mu_R r_0)},$$

$$\text{где } \mu_C^2 = \alpha_C^2 - \left(\frac{\pi}{2l}\right)^2, \quad \mu_R^2 = \frac{1}{L_R^2} + \left(\frac{\pi}{2l}\right)^2.$$

$$2.775. F_k = \frac{JE}{4l_0^2} \mu_1^2, \quad J = \frac{4l_1 l_2^3}{3} - \text{момент инерции основания } x = l_0, \quad \mu_1 > 0 - \text{наименьший корень уравнения}$$

$$\begin{aligned} 1) & J_0(\mu) Y_1(\alpha \mu) - Y_0(\mu) J_1(\alpha \mu) = 0, \\ 2) & J_1(\beta \mu) Y_2(\mu) - Y_1(\beta \mu) J_2(\mu) = 0, \end{aligned} \quad (2.111)$$

$$\alpha = \sqrt{1 - \frac{l}{l_0}}, \quad \beta = \sqrt{\frac{l_0}{l_0 - l}}.$$

У к а з а н и е. Требуется найти наименьшее собственное значение задачи

$$\begin{aligned} x^p u'' + \lambda u &= 0, \quad l_0 - l < x < l_0, \quad \lambda = \frac{Fl_0^p}{JE}, \\ u(l_0 - l) &= u'(l_0) = 0, \end{aligned}$$

где 1) $p = 1$; 2) $p = 3$. Дифференциальное уравнение — частный случай (2.53).

$$2.776. \text{ Собственные частоты } \omega_{mn} = \sqrt{\frac{T_0}{\rho_0}} \frac{\gamma_{mn}}{r_2}, \quad \gamma_{mn} > 0 - \text{корень уравнения } J_m(\alpha \mu) Y_m(\mu) - J_m(\mu) Y_m(\mu \alpha) = 0, \quad \alpha = \frac{r_1}{r_2}, \text{ амплитуды собственных колебаний } v_{mn}(r, \varphi) = \left[A_{mn} J_m\left(\frac{\gamma_{mn} r}{r_2}\right) + B_{mn} Y_m\left(\frac{\gamma_{mn} r}{r_2}\right) \right] \cos(m\varphi + \delta_m), \text{ где } m, n \in \mathbb{N}.$$

2.777. Собственные частоты $\omega_{mn} = \sqrt{\frac{T_0}{\rho_0} \frac{\gamma_{mn}}{r_2}}$, $\gamma_{mn} > 0$ — корень уравнения $J_{\nu(m)}(\alpha\mu)Y_{\nu(m)}(\mu) - J_{\nu(m)}(\mu)Y_{\nu(m)}(\mu\alpha) = 0$, $\alpha = \frac{r_1}{r_2}$, $\nu = \frac{\pi m}{\varphi_0}$, амплитуды собственных колебаний

$$v_{mn}(r, \varphi) = \left[A_{mn} J_{\nu(m)}\left(\frac{\gamma_{mn} r}{r_2}\right) + B_{mn} Y_{\nu(m)}\left(\frac{\gamma_{mn} r}{r_2}\right) \right] \sin \frac{\pi m \varphi}{\varphi_0}, \quad m \in \mathbb{N}.$$

2.778. $\omega_{mn} = \sqrt{\frac{g\gamma_{mn}}{2}}$, $\gamma_{mn} > 0$ — корень уравнения

$$J'_m(\gamma)Y'_m(\alpha\gamma) - J'_m(\alpha\gamma)Y_m(\gamma) = 0, \quad \alpha = \frac{r_1}{r_2}, \quad m \in \mathbb{N}_0, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (2.112)$$

У к а з а н и е. См. задачу 1.321.

2.779. 1) $\zeta(x, t) =$

$$= A \frac{Y_1(kd_1)J_0\left(k\left(d_1 + \frac{d_2 - d_1}{l}x\right)\right) - J_1(kd_1)Y_0\left(k\left(d_1 + \frac{d_2 - d_1}{l}x\right)\right)}{Y_1(kd_1)J_0(kd_2) - J_1(kd_1)Y_0(kd_2)} \cos \omega t,$$

$$k^2 = \frac{\omega^2 l^2}{gh(d_2 - d_1)^2};$$

$$2) \zeta(x, t) = A \frac{Y_1(2k\sqrt{h_1})J_0(2k\xi) - J_1(2k\sqrt{h_1})Y_0(2k\xi)}{Y_1(2k\sqrt{h_1})J_0(2k\sqrt{h_2}) - J_1(2k\sqrt{h_1})Y_0(2k\sqrt{h_2})} \cos \omega t,$$

$$k^2 = \frac{\omega^2 l^2}{gh_0(h_2 - h_1)^2}, \quad \xi = \sqrt{h_1 + \frac{h_2 - h_1}{l}}x.$$

У к а з а н и е. См. задачу 1.326.

2.780. $\omega_n = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{m_0 g}{Ml}} \mu_n$, $M = m + m_0$, $m_0 = \rho_0 l$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения

$$J_0(\mu)Y_2(\alpha\mu) - Y_0(\mu)J_2(\alpha\mu) = 0, \quad \alpha = \sqrt{\frac{m}{M}}. \quad (2.113)$$

2.781. $\Psi_{mn}(r, \varphi, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} R_{mn}(r) e^{i(m\varphi - \frac{E_{mn}}{\hbar}t)}$, $E_{mn} = \frac{\hbar^2}{2Mr_2^2} \gamma_{mn}^2$,

$$R_{mn}(r) = c_{mn} \left[Y_m(\gamma_{mn}) J_m\left(\frac{\gamma_{mn} r}{r_2}\right) - J_m(\gamma_{mn}) Y_m\left(\frac{\gamma_{mn} r}{r_2}\right) \right],$$

$c_{mn}^2 = \frac{\gamma_{mn}^2 J_m^2(\alpha\gamma_{mn})}{2r_2^2 (J_m^2(\alpha\gamma_{mn}) - J_m^2(\gamma_{mn}))}$, $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, $\gamma_{mn} > 0$ — корень уравнения

$$J_m(\alpha\gamma)Y_m(\gamma) - Y_m(\alpha\gamma)J_m(\gamma) = 0, \quad \alpha = \frac{r_1}{r_2}. \quad (2.114)$$

2.782. $\mathbf{E}(r, \varphi, z, t) = e^{i(\beta z - \omega t)} \mathcal{E}(r, \varphi)$, $\mathbf{H}(r, \varphi, z, t) = e^{i(\beta z - \omega t)} \mathcal{H}(r, \varphi)$;

ТЕМ-волна: $\mathcal{E} = (\frac{A}{r}, 0, 0)$, $\mathcal{H} = (0, \frac{A}{r}, 0)$, $\beta = \omega c$;

ТЕ-волна: $\mathcal{E} = (\mathcal{E}_r, \frac{r}{\mathcal{E}_\varphi}, 0)$, $\mathcal{H} = (\mathcal{H}_r, \frac{r}{\mathcal{H}_\varphi}, \mathcal{H}_z)$,

$$\mathcal{H}_z = A_{mn} \left[Y'_m(\gamma_{mn}) J_m\left(\frac{\gamma_{mn} r}{r_2}\right) - J'_m(\gamma_{mn}) Y_m\left(\frac{\gamma_{mn} r}{r_2}\right) \right] e^{im\varphi}, \quad \gamma_{mn} > 0$$

есть корень уравнения (2.112), $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, остальные компоненты определяются формулами (1.192);

ТМ-волна: $\mathcal{E}(\mathcal{E}_r, \mathcal{E}_\varphi, \mathcal{E}_z), \mathcal{H}(\mathcal{H}_r, \mathcal{H}_\varphi, 0)$,

$$\mathcal{E}_z = B_{mn} \left[Y_m(\gamma_{mn}) J_m \left(\frac{\gamma_{mn} r}{r_2} \right) - J_m(\gamma_{mn}) Y_m \left(\frac{\gamma_{mn} r}{r_2} \right) \right] e^{im\varphi}, \quad \gamma_{mn} > 0 -$$

корень уравнения (2.114), $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, остальные компоненты определяются формулами (1.190).

$$\mathbf{2.783.} \quad v(r, t) = \omega r_1 \left(\frac{r_2^2 - r^2}{r_2^2 - r_1^2} \cdot \frac{r_1}{r} - \pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\mu_n) J_1(\alpha \mu_n) R_n(r)}{J_1^2(\alpha \mu_n) - J_1^2(\mu_n)} e^{-\frac{\nu \mu_n^2}{r_2^2} t} \right), \quad \mu_n > 0$$

есть корень уравнения (2.57), функция $R_n(r)$ определена формулой (2.58).
У к а з а н и е. См. задачу 2.761.

$$\mathbf{2.784.} \quad u(r, t) = \frac{\pi p_0 r_2^2}{T_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\alpha \mu_n) R_n(r)}{\mu_n^2 (J_0(\alpha \mu_n) + J_0(\mu_n))} \cos \frac{\alpha \mu_n}{r_0} t, \quad \mu_n > 0 - \text{ корень уравнения}$$

$$Y_0(\mu) J_0(\alpha \mu) - J_0(\mu) Y_0(\alpha \mu) = 0, \quad \alpha = \frac{r_1}{r_2}, \quad (2.115)$$

$$R_n(r) = Y_0(\mu_n) J_0\left(\frac{\mu_n}{r_2} r\right) - J_0(\mu_n) Y_0\left(\frac{\mu_n}{r_2} r\right). \quad (2.116)$$

$$\mathbf{2.785.} \quad u(r, t) =$$

$$= \frac{g}{4a^2} \left[r_2^2 - r^2 - (r_2^2 - r_1^2) \frac{\ln r_2 - \ln r}{\ln r_2 - \ln r_1} - 4\pi r_2^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\alpha \mu_n) R_n(r) \cos \frac{\alpha \mu_n}{r_2} t}{\mu_n^2 (J_0(\alpha \mu_n) + J_0(\mu_n))} \right],$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения (2.115), $R_n(r)$ имеет вид (2.116).

$$\mathbf{2.786.} \quad Q = -\frac{2\pi k H(P_0 - P_1)}{\mu \ln \frac{r_2}{r_1}} \left[1 + 2 \ln \frac{r_2}{r_1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0^2(\gamma_n)}{J_0^2(\gamma_n) - J_0^2(\alpha \gamma_n)} e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_n}{r_2}\right)^2 t} \right],$$

$\gamma_n > 0$ — корень уравнения (2.115).

$$\mathbf{2.787.} \quad u(x, t) = \frac{l_0 F_0}{ES_0} \left[\alpha \ln \frac{l_0}{l_0 - x} + \pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\mu_n) J_1(\alpha \mu_n) X_n(x) \cos \frac{\alpha \mu_n}{l} t}{\mu_n (J_1^2(\alpha \mu_n) - J_0^2(\mu_n))} \right], \quad \text{где}$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения (2.111), в котором $\alpha = 1 - \frac{l}{l_0}$,

$$X_n(x) = Y_0(\mu_n) J_0 \left(\mu_n \left(1 - \frac{x}{l_0} \right) \right) - J_0(\mu_n) Y_0 \left(\mu_n \left(1 - \frac{x}{l_0} \right) \right).$$

$$\mathbf{2.788.} \quad u(x, t) = \frac{I}{m_0} t - \frac{I}{\rho S_0 a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1^2(\alpha \mu_n) X_n(x)}{J_1^2(\alpha \mu_n) - J_1^2(\mu_n)} \sin \frac{\alpha \mu_n}{l_0} t, \quad m_0 - \text{ масса}$$

стержня, $\mu_n > 0$ — корень уравнения (2.57), в котором $\alpha = 1 - \frac{l}{l_0}$,

$$X_n(x) = Y_1(\mu_n) J_0 \left(\mu_n \left(1 - \frac{x}{l_0} \right) \right) - J_1(\mu_n) Y_0 \left(\mu_n \left(1 - \frac{x}{l_0} \right) \right).$$

$$\mathbf{2.789.} \quad u(x, t) = 2\pi v_0 \sqrt{\frac{Ml}{m_0 g}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\mu_n) J_2(\mu_n \alpha) X_n(x)}{\mu_n (J_0^2(\mu_n) - J_2^2(\mu_n \alpha))} \sin \omega_n t,$$

$$\omega_n = \frac{\mu_n}{2} \sqrt{\frac{m_0 g}{Ml}}, \quad \mu_n > 0 - \text{ корень уравнения (2.113),}$$

$$X_n(x) = Y_0(\mu_n) J_0 \left(\mu_n \sqrt{1 - \frac{m_0 x}{Ml}} \right) - J_0(\mu_n) Y_0 \left(\mu_n \sqrt{1 - \frac{m_0 x}{Ml}} \right). \quad (2.117)$$

$$\mathbf{2.790.} \quad u(x, t) = \frac{4\pi MF_0}{mg\rho_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\mu_n)J_2\left(\mu_n\sqrt{\frac{m}{M}}\right)X_n(x)}{\mu_n^2\left[J_0^2(\mu_n) - J_2^2\left(\mu_n\sqrt{\frac{m}{M}}\right)\right]} \cos \omega_n t,$$

$\omega_n = \frac{\mu_n}{2} \sqrt{\frac{m_0 g}{Ml}}$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения (2.113), собственные функции $X_n(x)$ имеют вид (2.117).

$$\mathbf{2.791.} \quad u(x, t) = \frac{4\pi Mu_0}{m_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0^2\left(\mu_n\sqrt{\frac{m}{M}}\right)X_n(x)}{\mu_n^2\left[J_0^2(\mu_n) - J_2^2\left(\mu_n\sqrt{\frac{m}{M}}\right)\right]} \cos \omega_n t,$$

где $\omega_n = \frac{\mu_n}{2} \sqrt{\frac{m_0 g}{Ml}}$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения (2.113), собственные функции $X_n(x)$ имеют вид (2.117).

$$\mathbf{2.792.} \quad u(x, t) = \frac{F_0}{\rho_0 g} \left[4\pi \frac{M}{m} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\mu_n)J_2\left(\mu_n\sqrt{\frac{m}{M}}\right)X_n(x) \cos \omega_n t}{\mu_n^2\left[J_0^2(\mu_n) - J_2^2\left(\mu_n\sqrt{\frac{m}{M}}\right)\right]} - \ln\left(1 - \frac{mx}{Ml}\right) \right],$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения (2.113), $X_n(x)$ имеют вид (2.117).

$$\mathbf{2.793.} \quad u(r, t) = \pi u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\mu_n)J_0(\alpha\mu_n)R_n(r)}{J_1^2(\mu_n) - J_0^2(\alpha\mu_n)} e^{-\left(\frac{\alpha\mu_n}{r_2}\right)^2 t}, \quad \mu_n - \text{положительный корень уравнения}$$

$$Y_1(\mu)J_0(\alpha\mu) - J_1(\mu)Y_0(\alpha\mu) = 0, \quad \alpha = \frac{r_1}{r_2}, \quad (2.118)$$

$$R_n(r) = Y_1(\mu_n)J_0\left(\frac{\mu_n}{r_2}r\right) - J_1(\mu_n)Y_0\left(\frac{\mu_n}{r_2}r\right). \quad (2.119)$$

$$\mathbf{2.794.} \quad u(r, t) = \frac{q_0 r_1}{k} \left[\ln \frac{r_2}{r} + \frac{\pi r_2}{r_1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\alpha\mu_n)J_0(\mu_n)R_n(r)}{\mu_n(J_1^2(\alpha\mu_n) - J_0^2(\mu_n))} e^{-\left(\frac{\alpha\mu_n}{r_2}\right)^2 t} \right],$$

$R_n(r)$ имеет вид (2.116), $\mu_n > 0$ — корень уравнения (2.111), где $\alpha = \frac{r_1}{r_2}$.

$$\mathbf{2.795.} \quad P^2(r, t) = P_1^2 - \pi(P_0^2 - P_1^2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\alpha\gamma_n)R_n(r)}{J_0^2(\alpha\gamma_n) - J_1^2(\gamma_n)} e^{-\left(\frac{\alpha\gamma_n}{r_2}\right)^2 t}, \quad R_n(r) \text{ имеет вид (2.119), } \gamma_n > 0 - \text{корень уравнения (2.118).}$$

$$\mathbf{2.796.} \quad u(r, z) = \pi h r_2 u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\alpha\mu_n)R_n(r)}{J_0(\alpha\mu_n) + J_0(\mu_n)} \cdot \frac{e^{-\frac{\mu_n}{r_2}z}}{\mu_n + h r_2}, \quad \mu_n > 0 - \text{корень уравнения (2.115), } R_n(r) \text{ определяется формулой (2.116).}$$

$$\mathbf{2.797.} \quad u(r, z) = \frac{\pi r_2 q_0}{k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1^2(\alpha\mu_n)R_n(r)}{\mu_n(J_1^2(\alpha\mu_n) - J_0^2(\mu_n))} e^{-\frac{\mu_n}{r_2}z}, \quad \mu_n > 0 - \text{корень уравнения (2.111), } R_n(r) \text{ определяется формулой (2.116).}$$

$$\mathbf{2.798.} \quad u(r, z) = \pi u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\mu_n)J_0(\alpha\mu_n)R_n(r)}{J_1^2(\mu_n) - J_0^2(\alpha\mu_n)} \cdot \frac{\operatorname{sh} \frac{\mu_n}{r_2}z}{\operatorname{sh} \frac{\mu_n}{r_2}l}, \quad \mu_n > 0 - \text{корень уравнения (2.118), в котором } \alpha = \frac{r_1}{r_2}, \quad R_n(r) \text{ имеет вид (2.119).}$$

$$\mathbf{2.799.} \quad u(r, z) = u_0 \left[\frac{r_0^2 - r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} - \frac{\pi^2 r_0}{2r_2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n J_1^2(\alpha \mu_n) R'_n(r_0) R_n(r)}{J_1^2(\alpha \mu_n) - J_1^2(\mu_n)} \cdot \frac{\operatorname{ch} \frac{\mu_n}{r_2} (l - z)}{\operatorname{ch} \frac{\mu_n}{r_2} l} \right],$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения $J_1(\mu) Y_1(\alpha \mu) - Y_1(\mu) J_1(\alpha \mu) = 0$, $R_n(r) = Y_1(\mu_n) J_1\left(\frac{\mu_n r}{r_2}\right) - J_1(\mu_n) Y_1\left(\frac{\mu_n r}{r_2}\right)$, $R'_n(r)$ — производная по всему аргументу.

$$\mathbf{2.800.} \quad u(r, t) = \frac{r_0^2 F_0}{2\pi D} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{I_0(\mu_n) - J_0(\mu_n)}{\mu_n^4 I_0^2(\mu_n) J_0^2(\mu_n)} R_n(r) \cos \omega_n t, \quad \omega_n = \frac{a \mu_n^2}{r_0^2}, \quad \mu_n > 0 \text{ есть корень уравнения}$$

$$J_0(\mu) I_1(\mu) + J_1(\mu) I_0(\mu) = 0, \quad (2.120)$$

$$R_n(r) = I_0(\mu_n) J_0\left(\frac{\mu_n}{r_0} r\right) - J_0(\mu_n) I_0\left(\frac{\mu_n}{r_0} r\right), \quad (2.121)$$

Решение. Постановка задачи (см. задачу 1.168):

$$u_{tt} + a^2 \Delta^2 u = 0, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t,$$

$$u(r_0, t) = u_r(r_0, t) = 0,$$

$$|u(r, t)| < \infty, \quad u(r, 0) = u_0(r), \quad u_t(r, 0) = 0,$$

где $u_0(r)$ — решение стационарной задачи

$$\Delta^2 u_0 - \frac{F_0}{D} \frac{\delta(r)}{2\pi r} = 0, \quad 0 < r < r_0,$$

$$|u_0| < \infty, \quad u_0(r_0) = u'_0(r_0) = 0.$$

Согласно методу разделения переменных решение $u(r, t) = R(r)T(t)$; для функции $T(t)$ получается уравнение $T'' + a^2 \lambda T = 0$, а для функции $R(r)$ — задача на собственные значения

$$\Delta^2 R - \lambda R = 0, \quad 0 < r < r_0, \quad (2.122)$$

$$|R| < \infty, \quad R(r_0) = R'(r_0) = 0. \quad (2.123)$$

Эрмитовость оператора $\mathcal{L} = \Delta^2$ следует из его положительности. Доказательство последнего свойства основано на 2-ой формуле Грина,

$$\int_S [R \Delta^2 R - (\Delta R)^2] ds = \int_{\Gamma} \left(R \frac{d\Delta R}{dr} - \Delta R \frac{dR}{dr} \right) dl,$$

где S — круг радиуса r_0 , Γ — граница круга, откуда

$$\int_0^{r_0} R \Delta^2 R r dr = \int_0^{r_0} (\Delta R)^2 r dr \geq 0.$$

Функции $J_0(\sqrt[4]{\lambda} r)$, $Y_0(\sqrt[4]{\lambda} r)$, $I_0(\sqrt[4]{\lambda} r)$, $K_0(\sqrt[4]{\lambda} r)$ представляют собой фундаментальную систему решений обыкновенного дифференциального уравнения (2.122). Это становится очевидным, если уравнению придать форму $(\Delta + \sqrt{\lambda})(\Delta - \sqrt{\lambda})R = 0$. Таким образом,

$$R(r) = C_1 J_0(\sqrt[4]{\lambda} r) + C_2 I_0(\sqrt[4]{\lambda} r) + C_3 Y_0(\sqrt[4]{\lambda} r) + C_4 K_0(\sqrt[4]{\lambda} r).$$

Граничные условия выполняются, если $C_3 = C_4 = 0$,

$$\begin{cases} C_1 J_0(\sqrt[4]{\lambda} r_0) + C_2 I_0(\sqrt[4]{\lambda} r_0) = 0, \\ C_1 J_1(\sqrt[4]{\lambda} r_0) - C_2 I_1(\sqrt[4]{\lambda} r_0) = 0. \end{cases}$$

Следовательно, собственные значения $\lambda_n = \left(\frac{\mu_n}{r_0}\right)^4$, где μ_n — корень уравнения (2.120), а собственные функции $R_n(r)$ имеют вид (2.121).

Для вычисления нормы собственных функций пригоден способ, изложенный в примере 2.1. Пусть $R(r)$ — какое-нибудь решение уравнения (2.122), тогда

$$\begin{aligned}\Delta^2 R - \lambda R &= 0, \\ \Delta^2 R_n - \lambda_n R_n &= 0,\end{aligned}$$

откуда

$$\int_S (R_n \Delta^2 R - R \Delta^2 R_n) ds = (\lambda - \lambda_n) \int_S R R_n ds.$$

По второй формуле Грина

$$\begin{aligned}\int_S (R_n \Delta^2 R - \Delta R_n \Delta R + \Delta R \Delta R_n - R \Delta^2 R_n) ds &= \\ &= \int_{\Gamma} \left(R_n \frac{dR}{dr} - \Delta R \frac{dR_n}{dr} - R \frac{d\Delta R_n}{dr} + \Delta R_n \frac{dR}{dr} \right) dr.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\int_S R R_n ds = \frac{2\pi r_0 \left(\Delta R_n \frac{dR}{dr} - R \frac{d\Delta R_n}{dr} \right) \Big|_{r=r_0}}{\lambda - \lambda_n}.$$

Так как $R = R(\sqrt[4]{\lambda} r)$, то при $\lambda \rightarrow \lambda_n$

$$\begin{aligned}\|R_n\|^2 &= \int_0^{r_0} R_n^2 r dr = r_0 \left(\Delta R_n \frac{d}{dr} \left(\frac{r}{4\lambda_n} \frac{dR_n}{dr} \right) - \frac{r}{4\lambda} \frac{dR_n}{dr} \frac{d\Delta R_n}{dr} \right) \Big|_{r=r_0} = \\ &= \frac{r_0^2}{4\lambda_n} \Delta R_n = \frac{d^2 R_n}{dr^2} \Big|_{r=r_0}.\end{aligned}$$

Если учесть, что

$$\Delta R_n|_{r=r_0} = \left(\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dR}{dr} \right) \Big|_{r=r_0} = \frac{d^2 R}{dr^2} \Big|_{r=r_0},$$

то выражение для квадрата нормы приобретает вид

$$\begin{aligned}\|R_n\|^2 &= \frac{r_0^2}{4\lambda_n} (\Delta R_n(r_0))^2 = \\ &= \frac{r_0^2}{4\lambda_n} \left[\Delta \left(I_0(\mu_n) J_0\left(\frac{\mu_n}{r_0} r\right) - J_0(\mu_n) I_0\left(\frac{\mu_n}{r_0} r\right) \right) \right]^2 \Big|_{r=r_0} = \\ &= \frac{r_0^2}{4\lambda_n} \left[-\frac{\mu_n^2}{r_0^2} \left(I_0(\mu_n) J_0\left(\frac{\mu_n}{r_0} r\right) + J_0(\mu_n) I_0\left(\frac{\mu_n}{r_0} r\right) \right) \right]^2 \Big|_{r=r_0} = r_0^2 I_0^2(\mu_n) J_0^2(\mu_n).\end{aligned}$$

Решение задачи имеет форму ряда

$$u(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n R_n(r) \cos \omega_n t, \quad \omega_n = \frac{a\mu_n^2}{r_0^2}.$$

При $t = 0$

$$u_0(r) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n R_n(r),$$

где $A_n = \frac{1}{\|R_n\|^2} (u_0, R_n)$.

В силу эрмитовости оператора $\mathcal{L} = \Delta^2$

$$(u_0, R_n) = \frac{1}{\lambda_n}(u_0, \Delta^2 R_n) = \frac{1}{\lambda_n}(\Delta^2 u_0, R_n) = \frac{F_0 R_n(0)}{2\pi D \lambda_n} = \frac{r_0^4 F_0}{2\pi D} \frac{I_0(\mu_n) - J_0(\mu_n)}{\mu_n^4}.$$

2.801. $u(r, t) = \frac{aI}{2\pi D} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{I_0(\mu_n) - J_0(\mu_n)}{\mu_n^2 I_0^2(\mu_n) J_0^2(\mu_n)} R_n(r) \sin \frac{a\mu_n^2}{r_0} t$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения (2.120), $R_n(r)$ имеет вид (2.121).

2.802. $u(r, t) = \frac{r_0^2 F_0}{16\pi D} \left[1 - \frac{r^2}{r_0^2} + \frac{r^2}{r_0^2} \ln \frac{r^2}{r_0^2} - 8 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{I_0(\mu_n) - J_0(\mu_n)}{\mu_n^4 I_0^2(\mu_n) J_0^2(\mu_n)} R_n(r) \cos \frac{a\mu_n^2}{r_0} t \right]$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения (2.120), $R_n(r)$ имеет вид (2.121).

$$\mathbf{2.803.} \quad u(r, t) = \frac{2gr_0^4}{\pi a^2} \left[\frac{1}{128} \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2} \right)^2 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\mu_n) R_n(r) \cos \frac{a\mu_n^2}{r_0} t}{\mu_n^5 I_0(\mu_n) J_0^2(\mu_n)} \right],$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения (2.120), $R_n(r)$ имеет вид (2.121).

$$\mathbf{2.804.} \quad u(r, t) = \frac{F_0}{\rho h \omega^2} \left[\frac{I_1(kr_0)J_0(kr) + J_1(kr_0)I_0(kr)}{I_1(kr_0)J_0(kr_0) + J_1(kr_0)I_0(kr_0)} - 1 \right] \sin \omega t - \\ - \frac{2\omega r_0^2 F_0}{\rho h a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\mu_n) R_n(r) \sin \omega_n t}{\mu_n^5 (\omega_n^2 - \omega^2) I_0(\mu_n) J_0^2(\mu_n)},$$

где $k = \sqrt{\frac{\omega}{a}}$, $\omega_n = \frac{a\mu_n^2}{r_0^2}$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения (2.120), $R_n(r)$ имеет вид (2.121), величина a определена в задаче 1.168.

$$\mathbf{2.805.} \quad u(r, t) = A \frac{I_1(kr_0)J_0(kr) + J_1(kr_0)I_0(kr)}{I_1(kr_0)J_0(kr_0) + J_1(kr_0)I_0(kr_0)} \sin \omega t - \\ - \frac{2a\omega A}{r_0^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\mu_n) R_n(r) \sin \omega_n t}{\mu_n (\omega_n^2 - \omega^2) I_0(\mu_n) J_0^2(\mu_n)}.$$

Обозначения те же, что в задаче 2.804.

$$\mathbf{2.806.} \quad u(r, t) = \frac{A}{k} \frac{J_0(kr_0)I_0(kr) - I_0(kr_0)J_0(kr)}{J_0(kr_0)I_1(kr_0) + I_0(kr_0)J_1(kr_0)} \sin \omega t - \\ - \frac{2a\omega A}{r_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{R_n(r) \sin \omega_n t}{\mu_n^2 (\omega_n^2 - \omega^2) I_0(\mu_n) J_0(\mu_n)}.$$

Обозначения те же, что в задаче 2.804.

2.807. Здесь $R_n(r) = Y_0(\gamma_n)J_0\left(\frac{\gamma_n r}{r_2}\right) - J_0(\gamma_n)Y_0\left(\frac{\gamma_n r}{r_2}\right)$, $\gamma_n > 0$ — корень уравнения $J_0(\gamma)Y_0(\alpha\gamma) - Y_0(\gamma)J_0(\alpha\gamma) = 0$, $\alpha = \frac{r_1}{r_2}$.

1) Если $\beta \neq \frac{\gamma_n}{r_2}$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2 \ln \alpha} \left(J_0(\beta r) \ln \frac{r_1}{r_2} - J_0(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} - J_0(\beta r_2) \ln \frac{r_1}{r} \right) - \\ - \frac{\pi A}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\alpha\gamma_n)(J_0(\alpha\gamma_n)J_0(\beta r_2) - J_0(\gamma_n)J_0(\beta r_1))R_n(r) \cos \frac{\alpha\gamma_n t}{r_2}}{\left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} - \beta^2\right)(J_0^2(\alpha\gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))},$$

если $\beta = \frac{\gamma_m}{r_2}$, то

$$u(r, t) = \frac{Ar_2^2}{\gamma_m^2 a^2 \ln \alpha} \left(J_0 \left(\frac{\gamma_m r}{r_2} \right) \ln \frac{r_1}{r_2} - J_0(\alpha \gamma_m) \ln \frac{r}{r_2} - J_0(\gamma_m) \ln \frac{r_1}{r} \right) -$$

$$- \frac{\pi Ar_2 J_0(\alpha \gamma_m) (J_0(\alpha \gamma_m) J_1(\gamma_m) r_2 - J_0(\gamma_m) J_1(\alpha \gamma_m) r_1) R_m(r) \cos \frac{a \gamma_m t}{r_2}}{2 \gamma_m a^2 (J_0^2(\alpha \gamma_m) - J_0^2(\gamma_m))} -$$

$$- \frac{\pi Ar_2^2}{a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{J_0(\alpha \gamma_n) (J_0(\alpha \gamma_n) J_0(\gamma_n) - J_0(\gamma_n) J_0(\alpha \gamma_m)) R_n(r) \cos \frac{a \gamma_n t}{r_2}}{(\gamma_n^2 - \gamma_m^2) (J_0^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))};$$

2) если $\beta \neq \frac{\gamma_n}{r_2}$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2 \ln \alpha} \left(Y_0(\beta r) \ln \frac{r_1}{r_2} - Y_0(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} - Y_0(\beta r_2) \ln \frac{r_1}{r} \right) -$$

$$- \frac{\pi A}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\alpha \gamma_n) (J_0(\alpha \gamma_n) Y_0(\beta r_2) - J_0(\gamma_n) Y_0(\beta r_1)) R_n(r) \cos \frac{a \gamma_n t}{r_2}}{\left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} - \beta^2 \right) (J_0^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))},$$

если $\beta = \frac{\gamma_m}{r_2}$, то

$$u(r, t) = \frac{Ar_2^2}{\gamma_m^2 a^2 \ln \alpha} \left(Y_0 \left(\frac{\gamma_m r}{r_2} \right) \ln \frac{r_1}{r_2} - Y_0(\alpha \gamma_m) \ln \frac{r}{r_2} - Y_0(\gamma_m) \ln \frac{r_1}{r} \right) -$$

$$- \frac{\pi Ar_2 J_0(\alpha \gamma_m) (J_0(\alpha \gamma_m) Y_1(\gamma_m) r_2 - J_0(\gamma_m) Y_1(\alpha \gamma_m) r_1) R_m(r) \cos \frac{a \gamma_m t}{r_2}}{2 \gamma_m a^2 (J_0^2(\alpha \gamma_m) - J_0^2(\gamma_m))} -$$

$$- \frac{\pi Ar_2^2}{a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{J_0(\alpha \gamma_n) (J_0(\alpha \gamma_n) Y_0(\gamma_n) - J_0(\gamma_n) Y_0(\alpha \gamma_m)) R_n(r) \cos \frac{a \gamma_n t}{r_2}}{(\gamma_n^2 - \gamma_m^2) (J_0^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))};$$

$$3) u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2 \ln \alpha} \left(I_0(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} + I_0(\beta r_2) \ln \frac{r_1}{r} - I_0(\beta r) \ln \frac{r_1}{r_2} \right) -$$

$$- \frac{\pi A}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\alpha \gamma_n) (J_0(\alpha \gamma_n) I_0(\beta r_2) - J_0(\gamma_n) I_0(\beta r_1)) R_n(r) \cos \frac{a \gamma_n t}{r_2}}{\left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} + \beta^2 \right) (J_0^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))};$$

$$4) u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2 \ln \alpha} \left(K_0(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} + K_0(\beta r_2) \ln \frac{r_1}{r} - K_0(\beta r) \ln \frac{r_1}{r_2} \right) -$$

$$- \frac{\pi A}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\alpha \gamma_n) (J_0(\alpha \gamma_n) K_0(\beta r_2) - J_0(\gamma_n) K_0(\beta r_1)) R_n(r) \cos \frac{a \gamma_n t}{r_2}}{\left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} + \beta^2 \right) (J_0^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))};$$

5) Если $\beta \neq \frac{\gamma_n}{r_2}$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2 \ln \alpha} \left(J_0(\beta r) \ln \frac{r_1}{r_2} - J_0(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} - J_0(\beta r_2) \ln \frac{r_1}{r} \right) t -$$

$$- \frac{\pi Ar_2^2}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\alpha \gamma_n) (J_0(\alpha \gamma_n) J_0(\beta r_2) - J_0(\gamma_n) J_0(\beta r_1)) R_n(r) \sin \frac{a \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} - \beta^2 \right) (J_0^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))},$$

если $\beta = \frac{\gamma_m}{r_2}$, то

$$u(r, t) = \frac{Ar_2^2}{\gamma_m^2 a^2 \ln \alpha} \left(J_0 \left(\frac{\gamma_m r}{r_2} \right) \ln \frac{r_1}{r_2} - J_0(\alpha \gamma_m) \ln \frac{r}{r_2} - J_0(\gamma_m) \ln \frac{r_1}{r} \right) t -$$

$$- \frac{\pi Ar_2^2 J_0(\alpha \gamma_m) (J_0(\alpha \gamma_m) J_1(\gamma_m) r_2 - J_0(\gamma_m) J_1(\alpha \gamma_m) r_1) R_m(r) \sin \frac{\alpha \gamma_m t}{r_2}}{2 \gamma_m^2 a^3 (J_0^2(\alpha \gamma_m) - J_0^2(\gamma_m))} -$$

$$- \frac{\pi Ar_2^3}{a^3} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{J_0(\alpha \gamma_n) (J_0(\alpha \gamma_n) J_0(\gamma_m) - J_0(\gamma_n) J_0(\alpha \gamma_m)) R_n(r) \sin \frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_m (\gamma_n^2 - \gamma_m^2) (J_0^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))};$$

6) если $\beta \neq \frac{\gamma_n}{r_2}$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2 \ln \alpha} \left(Y_0(\beta r) \ln \frac{r_1}{r_2} - Y_0(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} - Y_0(\beta r_2) \ln \frac{r_1}{r} \right) t -$$

$$- \frac{\pi Ar_2}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\alpha \gamma_n) (J_0(\alpha \gamma_n) Y_0(\beta r_2) - J_0(\gamma_n) Y_0(\beta r_1)) R_n(r) \sin \frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} - \beta^2 \right) (J_0^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))},$$

если $\beta = \frac{\gamma_m}{r_2}$, то

$$u(r, t) = \frac{Ar_2^2}{\gamma_m^2 a^2 \ln \alpha} \left(Y_0 \left(\frac{\gamma_m r}{r_2} \right) \ln \frac{r_1}{r_2} - Y_0(\alpha \gamma_m) \ln \frac{r}{r_2} - Y_0(\gamma_m) \ln \frac{r_1}{r} \right) t -$$

$$- \frac{\pi Ar_2^2 J_0(\alpha \gamma_m) (J_0(\alpha \gamma_m) Y_1(\gamma_m) r_2 - J_0(\gamma_m) Y_1(\alpha \gamma_m) r_1) R_m(r) \sin \frac{\alpha \gamma_m t}{r_2}}{2 \gamma_m^2 a^3 (J_0^2(\alpha \gamma_m) - J_0^2(\gamma_m))} -$$

$$- \frac{\pi Ar_2^3}{a^3} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{J_0(\alpha \gamma_n) (J_0(\alpha \gamma_n) Y_0(\gamma_m) - J_0(\gamma_n) Y_0(\alpha \gamma_m)) R_n(r) \sin \frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n (\gamma_n^2 - \gamma_m^2) (J_0^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))};$$

$$7) u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2 \ln \alpha} \left(I_0(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} + I_0(\beta r_2) \ln \frac{r_1}{r} - I_0(\beta r) \ln \frac{r_1}{r_2} \right) t -$$

$$- \frac{\pi Ar_2}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\alpha \gamma_n) (J_0(\alpha \gamma_n) I_0(\beta r_2) - J_0(\gamma_n) I_0(\beta r_1)) R_n(r) \sin \frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} + \beta^2 \right) (J_0^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))};$$

$$8) u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2 \ln \alpha} \left(K_0(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} + K_0(\beta r_2) \ln \frac{r_1}{r} - K_0(\beta r) \ln \frac{r_1}{r_2} \right) t -$$

$$- \frac{\pi Ar_2}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\alpha \gamma_n) (J_0(\alpha \gamma_n) K_0(\beta r_2) - J_0(\gamma_n) K_0(\beta r_1)) R_n(r) \sin \frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} + \beta^2 \right) (J_0^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))}.$$

2.808. Здесь $R_n(r) = Y_0(\gamma_n) J_0 \left(\frac{\gamma_n r}{r_2} \right) - J_0(\gamma_n) Y_0 \left(\frac{\gamma_n r}{r_2} \right)$, $\gamma_n > 0$ — корень уравнения $J_0(\gamma) Y_1(\alpha \gamma) - Y(\gamma) J_1(\alpha \gamma) = 0$, $\alpha = \frac{r_1}{r_2}$.

1) Если $\beta \neq \frac{\gamma_n}{r_2}$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2} \left(J_0(\beta r) - J_0(\beta r_2) + \beta r_1 J_1(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} \right) +$$

$$+ \frac{\pi A}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n) (\beta r_2 J_1(\beta r_1) J_0(\gamma_n) - \gamma_n J_1(\alpha \gamma_n) J_0(\beta r_2)) R_n(r) \cos \frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} - \beta^2 \right) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_1^2(\gamma_n))},$$

$$\begin{aligned} \text{если } \beta = \frac{\gamma_m}{r_2}, \text{ то } u(r, t) = & \frac{Ar_2^2}{\gamma_m^2 a^2} \left(J_0\left(\frac{\gamma_m r}{r_2}\right) - J_0(\gamma_m) + \alpha \gamma_m J_1(\alpha \gamma_m) \ln \frac{r}{r_2} \right) - \\ & - \frac{\pi Ar_2^2 J_1(\alpha \gamma_m)(\alpha J_0(\gamma_m) J_0(\alpha \gamma_m) + J_1(\gamma_m) J_1(\alpha \gamma_m)) R_m(r) \cos \frac{\alpha \gamma_m t}{r_2}}{2 \gamma_m a^2 (J_1^2(\alpha \gamma_m) - J_0^2(\gamma_m))} + \\ & + \frac{\pi Ar_2^2}{a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}} \frac{J_1(\alpha \gamma_n)(\gamma_m J_1(\alpha \gamma_m) J_0(\gamma_n) - \gamma_n J_1(\alpha \gamma_n) J_0(\gamma_m)) R_n(r) \cos \frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n (\gamma_n^2 - \gamma_m^2) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \text{ если } \beta \neq \frac{\gamma_n}{r_2}, \text{ то } u(r, t) = & \frac{A}{\beta^2 a^2} \left(Y_0(\beta r) - Y_0(\beta r_2) + \beta r_1 Y_1(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} \right) + \\ & + \frac{\pi A}{a^2} \sum_{n=1} \frac{J_1(\alpha \gamma_n)(\beta r_2 Y_1(\beta r_1) J_0(\gamma_n) - \gamma_n J_1(\alpha \gamma_n) Y_0(\beta r_2)) R_n(r) \cos \frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} - \beta^2 \right) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{если } \beta = \frac{\gamma_m}{r_2}, \text{ то } u(r, t) = & \frac{Ar_2^2}{\gamma_m^2 a^2} \left(Y_0\left(\frac{\gamma_m r}{r_2}\right) - Y_0(\gamma_m) + \alpha \gamma_m Y_1(\alpha \gamma_m) \ln \frac{r}{r_2} \right) - \\ & - \frac{\pi Ar_2^2 J_1(\alpha \gamma_m)(\alpha J_0(\gamma_m) Y_0(\alpha \gamma_m) + Y_1(\gamma_m) J_1(\alpha \gamma_m)) R_m(r) \cos \frac{\alpha \gamma_m t}{r_2}}{2 \gamma_m a^2 (J_1^2(\alpha \gamma_m) - J_0^2(\gamma_m))} + \\ & + \frac{\pi Ar_2^2}{a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}} \frac{J_1(\alpha \gamma_n)(\gamma_m Y_1(\alpha \gamma_m) J_0(\gamma_n) - \gamma_n J_1(\alpha \gamma_n) Y_0(\gamma_m)) R_n(r) \cos \frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n (\gamma_n^2 - \gamma_m^2) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) u(r, t) = & \frac{A}{\beta^2 a^2} \left(\beta r_1 I_1(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} - I_0(\beta r) + I_0(\beta r_2) \right) - \\ & - \frac{\pi A}{a^2} \sum_{n=1} \frac{J_1(\alpha \gamma_n)(\beta r_2 I_1(\beta r_1) J_0(\gamma_n) + \gamma_n J_1(\alpha \gamma_n) I_0(\beta r_2)) R_n(r) \cos \frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} + \beta^2 \right) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4) u(r, t) = & \frac{A}{\beta^2 a^2} \left(\beta r_1 K_1(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} - K_0(\beta r) + K_0(\beta r_2) \right) - \\ & - \frac{\pi A}{a^2} \sum_{n=1} \frac{J_1(\alpha \gamma_n)(\beta r_2 K_1(\beta r_1) J_0(\gamma_n) + \gamma_n J_1(\alpha \gamma_n) K_0(\beta r_2)) R_n(r) \cos \frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} + \beta^2 \right) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5) \text{ если } \beta \neq \frac{\gamma_n}{r_2}, \text{ то } u(r, t) = & \frac{A}{\beta^2 a^2} \left(J_0(\beta r) - J_0(\beta r_2) + \beta r_1 J_1(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} \right) t + \\ & + \frac{\pi Ar_2}{a^3} \sum_{n=1} \frac{J_1(\alpha \gamma_n)(\beta r_2 J_1(\beta r_1) J_0(\gamma_n) - \gamma_n J_1(\alpha \gamma_n) J_0(\beta r_2)) R_n(r) \sin \frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n^2 \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} - \beta^2 \right) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{если } \beta = \frac{\gamma_m}{r_2}, \text{ то } u(r, t) = & \frac{Ar_2^2}{\gamma_m^2 a^2} \left(J_0\left(\frac{\gamma_m r}{r_2}\right) - J_0(\gamma_m) + \alpha \gamma_m J_1(\alpha \gamma_m) \ln \frac{r}{r_2} \right) t - \\ & - \frac{\pi Ar_2^3 J_1(\alpha \gamma_m)(\alpha J_0(\gamma_m) J_0(\alpha \gamma_m) + J_1(\gamma_m) J_1(\alpha \gamma_m)) R_m(r) \sin \frac{\alpha \gamma_m t}{r_2}}{2 \gamma_m^2 a^3 (J_1^2(\alpha \gamma_m) - J_0^2(\gamma_m))} + \\ & + \frac{\pi Ar_2^3}{a^3} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}} \frac{\gamma_m J_1(\alpha \gamma_m) J_0(\gamma_n) - \gamma_n J_1(\alpha \gamma_n) J_0(\gamma_m)) R_n(r) \sin \frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n^2 (\gamma_n^2 - \gamma_m^2) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))}; \end{aligned}$$

$$6) \text{ если } \beta \neq \frac{\gamma_n}{r_2}, \text{ то } u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2} \left(Y_0(\beta r) - Y_0(\beta r_2) + \beta r_1 Y_1(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} \right) t + \\ + \frac{\pi A r_2}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n) (\beta r_2 Y_1(\beta r_1) J_0(\gamma_n) - \gamma_n J_1(\alpha \gamma_n) Y_0(\beta r_2)) R_n(r) \sin \frac{a \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n^2 \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} - \beta^2 \right) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))},$$

$$\text{если } \beta = \frac{\gamma_m}{r_2}, \text{ то } u(r, t) = \frac{A r_2^2}{\gamma_m^2 a^2} \left(Y_0 \left(\frac{\gamma_m r}{r_2} \right) - Y_0(\gamma_m) + \alpha \gamma_m Y_1(\alpha \gamma_m) \ln \frac{r}{r_2} \right) t - \\ - \frac{\pi A r_2^3 J_1(\alpha \gamma_m) (\alpha J_0(\gamma_m) Y_0(\alpha \gamma_m) + Y_1(\gamma_m) J_1(\alpha \gamma_m)) R_m(r) \sin \frac{a \gamma_m t}{r_2}}{2 \gamma_m^2 a^3 (J_1^2(\alpha \gamma_m) - J_0^2(\gamma_m))} + \\ + \frac{\pi A r_2^3}{a^3} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n) (\gamma_m Y_1(\alpha \gamma_m) J_0(\gamma_n) - \gamma_n J_1(\alpha \gamma_n) Y_0(\gamma_m)) R_n(r) \sin \frac{a \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n^2 (\gamma_n^2 - \gamma_m^2) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))};$$

$$7) u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2} \left(\beta r_1 I_1(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} - I_0(\beta r) + I_0(\beta r_2) \right) t - \\ - \frac{\pi A r_2}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n) (\beta r_2 I_1(\beta r_1) J_0(\gamma_n) + \gamma_n J_1(\alpha \gamma_n) I_0(\beta r_2)) R_n(r) \sin \frac{a \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n^2 \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} + \beta^2 \right) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))};$$

$$8) u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2} \left(\beta r_1 K_1(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} - K_0(\beta r) + K_0(\beta r_2) \right) t - \\ - \frac{\pi A r_2}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n) (\beta r_2 K_1(\beta r_1) J_0(\gamma_n) + \gamma_n J_1(\alpha \gamma_n) K_0(\beta r_2)) R_n(r) \sin \frac{a \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n^2 \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} + \beta^2 \right) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))}.$$

2.809. Здесь $R_n(r) = Y_1(\gamma_n) J_0 \left(\frac{\gamma_n r}{r_2} \right) - J_1(\gamma_n) Y_0 \left(\frac{\gamma_n r}{r_2} \right)$, $\gamma_n > 0$ — корень уравнения $J_1(\gamma) Y_1(\alpha \gamma) - Y_1(\gamma) J_1(\alpha \gamma) = 0$, $\alpha = \frac{r_1}{r_2}$.

$$1) u(r, t) = \int_0^t h(t - \tau) \tau d\tau;$$

$$2) \text{ если } \beta \neq \frac{\gamma_n}{r_2}, \text{ то } u(r, t) = \frac{A}{\beta a^2} \left(\frac{J_0(\beta r)}{\beta} + 2(r_2 J_1(\beta r_2) - r_1 J_1(\beta r_1)) \right) + \\ + \frac{A r_1 r_2 (r_2 J_1(\beta r_1) - r_1 J_1(\beta r_2))}{\beta a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(\frac{r_2^2 \ln \frac{r}{r_2} - r_1^2 \ln \frac{r}{r_2}}{r_2^2 - r_1^2} + \frac{1}{2} \right) + \\ + \frac{A (r_2 J_1(\beta r_2) - r_1 J_1(\beta r_1))}{2 \beta a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(r^2 - \frac{r_1^2 + r_2^2}{2} \right) + \frac{A (r_2 J_1(\beta r_2) - r_1 J_1(\beta r_1)) t^2}{\beta (r_2^2 - r_1^2)} - \\ - \frac{2 \pi A \beta r_2}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n) (J_1(\alpha \gamma_n) J_1(\beta r_2) - J_1(\gamma_n) J_1(\beta r_1)) R_n(r) \cos \frac{a \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} - \beta^2 \right) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_1^2(\gamma_n))},$$

$$\text{если } \beta = \frac{\gamma_m}{r_2}, \text{ то } u(r, t) = \frac{A r_2}{\gamma_m a^2} \left(\frac{r_2}{\gamma_m} J_0 \left(\frac{\gamma_m r}{r_2} \right) + 2(r_2 J_1(\gamma_m) - r_1 J_1(\alpha \gamma_m)) \right) + \\ + \frac{A r_1 r_2 (r_2 J_1(\alpha \gamma_m) - r_1 J_1(\gamma_m))}{\gamma_m a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(\frac{r_2^2 \ln \frac{r}{r_2} - r_1^2 \ln \frac{r}{r_2}}{r_2^2 - r_1^2} + \frac{1}{2} \right) + \\ + \frac{A r_2 (r_2 J_1(\gamma_m) - r_1 J_1(\alpha \gamma_m))}{2 \gamma_m a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(r^2 - \frac{r_1^2 + r_2^2}{2} \right) + \frac{A r_2 ((r_2 J_1(\gamma_m) - r_1 J_1(\alpha \gamma_m)) t^2}{\gamma_m (r_2^2 - r_1^2)} -$$

$$\begin{aligned}
& - \frac{\pi A r_2 J_1(\alpha \gamma_m) (r_2 J_1(\alpha \gamma_m) J_1'(\gamma_m) - r_1 J_1(\gamma_m) J_1'(\alpha \gamma_m)) R_m(r) \cos \frac{\alpha \gamma_m t}{r_2}}{\gamma_m a^2 (J_1^2(\alpha \gamma_m) - J_0^2(\gamma_m))} - \\
& - \frac{2 \pi A \gamma_m r_2^2}{a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n) (J_1(\alpha \gamma_n) J_1(\gamma_m) - J_1(\gamma_n) J_1(\alpha \gamma_m)) R_n(r) \cos \frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n (\gamma_n^2 - \gamma_m^2) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_1^2(\gamma_n))};
\end{aligned}$$

3) если $\beta \neq \frac{\gamma_n}{r_2}$, то $u(r, t) = \frac{A}{\beta a^2} \left(\frac{Y_0(\beta r)}{\beta} + 2(r_2 Y_1(\beta r_2) - r_1 Y_1(\beta r_1)) \right) +$

$$\begin{aligned}
& + \frac{A r_1 r_2 (r_2 Y_1(\beta r_1) - r_1 Y_1(\beta r_2))}{\beta a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(\frac{r_2^2 \ln \frac{r}{r_2} - r_1^2 \ln \frac{r}{r_2}}{r_2^2 - r_1^2} + \frac{1}{2} \right) + \\
& + \frac{A r_2 (r_2 Y_1(\beta r_2) - r_1 Y_1(\beta r_1))}{2 \beta a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(r^2 - \frac{r_1^2 + r_2^2}{2} \right) + \frac{A (r_2 Y_1(\beta r_2) - r_1 Y_1(\beta r_1)) t^2}{\beta (r_2^2 - r_1^2)} - \\
& - \frac{2 \pi A \beta r_2}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n) (J_1(\alpha \gamma_n) Y_1(\beta r_2) - J_1(\gamma_n) Y_1(\beta r_1)) R_n(r) \cos \frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} - \beta^2 \right) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_1^2(\gamma_n))},
\end{aligned}$$

если $\beta = \frac{\gamma_m}{r_2}$, то $u(r, t) = \frac{A r_2}{\gamma_m a^2} \left(\frac{r_2}{\gamma_m} Y_0 \left(\frac{\gamma_m r}{r_2} \right) + 2(r_2 Y_1(\gamma_m) - r_1 Y_1(\alpha \gamma_m)) \right) +$

$$\begin{aligned}
& + \frac{A r_1 r_2 (r_2 Y_1(\alpha \gamma_m) - r_1 Y_1(\gamma_m))}{\gamma_m a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(\frac{r_2^2 \ln \frac{r}{r_2} - r_1^2 \ln \frac{r}{r_2}}{r_2^2 - r_1^2} + \frac{1}{2} \right) + \\
& + \frac{A r_2 (r_2 Y_1(\gamma_m) - r_1 Y_1(\alpha \gamma_m))}{2 \gamma_m a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(r^2 - \frac{r_1^2 + r_2^2}{2} \right) + \frac{A r_2 ((r_2 Y_1(\gamma_m)) - r_1 Y_1(\alpha \gamma_m)) t^2}{\gamma_m (r_2^2 - r_1^2)} - \\
& - \frac{\pi A r_2 J_1(\alpha \gamma_m) (r_2 J_1(\alpha \gamma_m) Y_1'(\gamma_m) - r_1 J_1(\gamma_m) Y_1'(\alpha \gamma_m)) R_m(r) \cos \frac{\alpha \gamma_m t}{r_2}}{\gamma_m a^2 (J_1^2(\alpha \gamma_m) - J_0^2(\gamma_m))} - \\
& - \frac{2 \pi A \gamma_m r_2^2}{a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n) (J_1(\alpha \gamma_n) Y_1(\gamma_m) - J_1(\gamma_n) Y_1(\alpha \gamma_m)) R_n(r) \cos \frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n (\gamma_n^2 - \gamma_m^2) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_1^2(\gamma_n))};
\end{aligned}$$

4) $u(r, t) = \frac{A}{\beta a^2} \left(2 r_2 I_1(\beta r_2) - 2 r_1 I_1(\beta r_1) - \frac{I_0(\beta r)}{\beta} \right) +$

$$\begin{aligned}
& + \frac{A r_1 r_2 (r_2 I_1(\beta r_1) - r_1 I_1(\beta r_2))}{\beta a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(\frac{r_2^2 \ln \frac{r}{r_2} - r_1^2 \ln \frac{r}{r_2}}{r_2^2 - r_1^2} + \frac{1}{2} \right) + \\
& + \frac{A (r_2 I_1(\beta r_2) - r_1 I_1(\beta r_1))}{2 \beta a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(r^2 - \frac{r_1^2 + r_2^2}{2} \right) + \frac{A (r_2 I_1(\beta r_2) - r_1 I_1(\beta r_1)) t^2}{\beta (r_2^2 - r_1^2)} - \\
& - \frac{2 \pi A \beta r_2}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n) (J_1(\alpha \gamma_n) I_1(\beta r_2) - J_1(\gamma_n) I_1(\beta r_1)) R_n(r) \cos \frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} + \beta^2 \right) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_1^2(\gamma_n))};
\end{aligned}$$

5) $u(r, t) = \frac{A}{\beta a^2} \left(2 r_2 K_1(\beta r_2) - 2 r_1 K_1(\beta r_1) - \frac{K_0(\beta r)}{\beta} \right) +$

$$\begin{aligned}
& + \frac{A r_1 r_2 (r_2 K_1(\beta r_1) - r_1 K_1(\beta r_2))}{\beta a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(\frac{r_2^2 \ln \frac{r}{r_2} - r_1^2 \ln \frac{r}{r_2}}{r_2^2 - r_1^2} + \frac{1}{2} \right) +
\end{aligned}$$

$$+ \frac{A(r_2 k_1(\beta r_2) - r_1 K_1(\beta r_1))}{2\beta a^2(r_2^2 - r_1^2)} \left(r^2 - \frac{r_1^2 + r_2^2}{2} \right) + \frac{A(r_2 K_1(\beta r_2) - r_1 K_1(\beta r_1))t^2}{\beta(r_2^2 - r_1^2)} -$$

$$- \frac{2\pi A\beta r_2}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\alpha\gamma_n)(J_1(\alpha\gamma_n)K_1(\beta r_2) - J_1(\gamma_n)K_1(\beta r_1))R_n(r) \sin \frac{\alpha\gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} + \beta^2 \right) (J_1^2(\alpha\gamma_n) - J_1^2(\gamma_n))};$$

6) если $\beta \neq \frac{\gamma_n}{r_2}$, то $u(r, t) = \frac{A}{\beta a^2} \left(\frac{J_0(\beta r)}{\beta} + 2(r_2 J_1(\beta r_2) - r_1 J_1(\beta r_1)) \right) t +$

$$+ \frac{Ar_1 r_2 (r_2 J_1(\beta r_1) - r_1 J_1(\beta r_2))}{\beta a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(\frac{r_2^2 \ln \frac{r}{r_2} - r_1^2 \ln \frac{r}{r_2}}{r_2^2 - r_1^2} + \frac{1}{2} \right) t +$$

$$+ \frac{A(r_2 J_1(\beta r_2) - r_1 J_1(\beta r_1))}{2\beta a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(r^2 - \frac{r_1^2 + r_2^2}{2} \right) t + \frac{A(r_2 J_1(\beta r_2) - r_1 J_1(\beta r_1))t^3}{3\beta(r_2^2 - r_1^2)} -$$

$$- \frac{2\pi A\beta r_2^2}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\alpha\gamma_n)(J_1(\alpha\gamma_n)J_1(\beta r_2) - J_1(\gamma_n)J_1(\beta r_1))R_n(r) \cos \frac{\alpha\gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n^2 \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} - \beta^2 \right) (J_1^2(\alpha\gamma_n) - J_1^2(\gamma_n))},$$

если $\beta = \frac{\gamma_m}{r_2}$, то $u(r, t) = \frac{Ar_2}{\gamma_m a^2} \left(\frac{r_2}{\gamma_m} J_0\left(\frac{\gamma_m r}{r_2}\right) + 2(r_2 J_1(\gamma_m) - r_1 J_1(\alpha\gamma_m)) \right) t +$

$$+ \frac{Ar_1 r_2 (r_2 J_1(\alpha\gamma_m) - r_1 J_1(\gamma_m))}{\gamma_m a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(\frac{r_2^2 \ln \frac{r}{r_2} - r_1^2 \ln \frac{r}{r_2}}{r_2^2 - r_1^2} + \frac{1}{2} \right) t +$$

$$+ \frac{Ar_2 (r_2 J_1(\gamma_m) - r_1 J_1(\alpha\gamma_m))}{2\gamma_m a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(r^2 - \frac{r_1^2 + r_2^2}{2} \right) t + \frac{Ar_2 ((r_2 J_1(\gamma_m)) - r_1 J_1(\alpha\gamma_m))t^3}{3\gamma_m (r_2^2 - r_1^2)} -$$

$$- \frac{\pi Ar_2^2 J_1(\alpha\gamma_m)(r_2 J_1(\alpha\gamma_m)J_1'(\gamma_m) - r_1 J_1(\gamma_m)J_1'(\alpha\gamma_m))R_m(r) \sin \frac{\alpha\gamma_m t}{r_2}}{\gamma_m^2 a^3 (J_1^2(\alpha\gamma_m) - J_0^2(\gamma_m))} -$$

$$- \frac{2\pi A\gamma_m r_2^3}{a^3} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{J_1(\alpha\gamma_n)(J_1(\alpha\gamma_n)J_1(\gamma_m) - J_1(\gamma_n)J_1(\alpha\gamma_m))R_n(r) \cos \frac{\alpha\gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n^2 (\gamma_n^2 - \gamma_m^2) (J_1^2(\alpha\gamma_n) - J_1^2(\gamma_n))};$$

7) если $\beta \neq \frac{\gamma_n}{r_2}$, то $u(r, t) = \frac{A}{\beta a^2} \left(\frac{Y_0(\beta r)}{\beta} + 2(r_2 Y_1(\beta r_2) - r_1 Y_1(\beta r_1)) \right) t +$

$$+ \frac{Ar_1 r_2 (r_2 Y_1(\beta r_1) - r_1 Y_1(\beta r_2))}{\beta a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(\frac{r_2^2 \ln \frac{r}{r_2} - r_1^2 \ln \frac{r}{r_2}}{r_2^2 - r_1^2} + \frac{1}{2} \right) t +$$

$$+ \frac{A(r_2 Y_1(\beta r_2) - r_1 Y_1(\beta r_1))}{2\beta a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(r^2 - \frac{r_1^2 + r_2^2}{2} \right) t + \frac{A(r_2 Y_1(\beta r_2) - r_1 Y_1(\beta r_1))t^3}{3\beta(r_2^2 - r_1^2)} -$$

$$- \frac{2\pi A\beta r_2^2}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\alpha\gamma_n)(J_1(\alpha\gamma_n)Y_1(\beta r_2) - J_1(\gamma_n)Y_1(\beta r_1))R_n(r) \sin \frac{\alpha\gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n^2 \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} - \beta^2 \right) (J_1^2(\alpha\gamma_n) - J_1^2(\gamma_n))},$$

если $\beta = \frac{\gamma_m}{r_2}$, то $u(r, t) = \frac{Ar_2}{\gamma_m a^2} \left(\frac{r_2}{\gamma_m} Y_0\left(\frac{\gamma_m r}{r_2}\right) + 2(r_2 Y_1(\gamma_m) - r_1 Y_1(\alpha\gamma_m)) \right) t +$

$$+ \frac{Ar_1 r_2 (r_2 Y_1(\alpha\gamma_m) - r_1 Y_1(\gamma_m))}{\gamma_m a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(\frac{r_2^2 \ln \frac{r}{r_2} - r_1^2 \ln \frac{r}{r_2}}{r_2^2 - r_1^2} + \frac{1}{2} \right) t +$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{A(r_2(r_2 Y_1(\gamma_m)) - r_1 Y_1(\alpha \gamma_m))}{2\gamma_m a^2(r_2^2 - r_1^2)} \left(r^2 - \frac{r_1^2 + r_2^2}{2} \right) t + \frac{Ar_2((r_2 Y_1(\gamma_m)) - r_1 Y_1(\alpha \gamma_m))t^3}{3\gamma_m(r_2^2 - r_1^2)} - \\
& - \frac{\pi Ar_2^2 J_1(\alpha \gamma_m)(r_2 J_1(\alpha \gamma_m) Y_1'(\gamma_m) - r_1 J_1(\gamma_m) Y_1'(\alpha \gamma_m)) R_m(r) \sin \frac{\alpha \gamma_m t}{r_2}}{\gamma_m^2 a^3 (J_1^2(\alpha \gamma_m) - J_0^2(\gamma_m))} - \\
& - \frac{2\pi A \gamma_m r_2^3}{a^3} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n)(J_1(\alpha \gamma_n) Y_1(\gamma_m) - J_1(\gamma_n) Y_1(\alpha \gamma_m)) R_n(r) \sin \frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n^2 (\gamma_n^2 - \gamma_m^2) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_1^2(\gamma_n))};
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
8) \ u(r, t) = & \frac{A}{\beta a^2} \left(2r_2 I_1(\beta r_2) - 2r_1 I_1(\beta r_1) - \frac{I_0(\beta r)}{\beta} \right) t + \\
& + \frac{Ar_1 r_2 (r_2 I_1(\beta r_1) - r_1 I_1(\beta r_2))}{\beta a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(\frac{r_2^2 \ln \frac{r}{r_2} - r_1^2 \ln \frac{r}{r_2}}{r_2^2 - r_1^2} + \frac{1}{2} \right) t + \\
& + \frac{A(r_2 I_1(\beta r_2) - r_1 I_1(\beta r_1))}{2\beta a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(r^2 - \frac{r_1^2 + r_2^2}{2} \right) t + \frac{A(r_2 I_1(\beta r_2) - r_1 I_1(\beta r_1))t^3}{3\beta (r_2^2 - r_1^2)} - \\
& - \frac{2\pi A \beta r_2^2}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n)(J_1(\alpha \gamma_n) I_1(\beta r_2) - J_1(\gamma_n) I_1(\beta r_1)) R_n(r) \sin \frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n^2 \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} + \beta^2 \right) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_1^2(\gamma_n))};
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
9) \ u(r, t) = & \frac{A}{\beta a^2} \left(2r_2 K_1(\beta r_2) - 2r_1 K_1(\beta r_1) - \frac{K_0(\beta r)}{\beta} \right) t + \\
& + \frac{Ar_1 r_2 (r_2 K_1(\beta r_1) - r_1 K_1(\beta r_2))}{\beta a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(\frac{r_2^2 \ln \frac{r}{r_2} - r_1^2 \ln \frac{r}{r_2}}{r_2^2 - r_1^2} + \frac{1}{2} \right) t + \\
& + \frac{A(r_2 K_1(\beta r_2) - r_1 K_1(\beta r_1))}{2\beta a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(r^2 - \frac{r_1^2 + r_2^2}{2} \right) t + \frac{A(r_2 K_1(\beta r_2) - r_1 K_1(\beta r_1))t^3}{3\beta (r_2^2 - r_1^2)} - \\
& - \frac{2\pi A \beta r_2^2}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n)(J_1(\alpha \gamma_n) K_1(\beta r_2) - J_1(\gamma_n) K_1(\beta r_1)) R_n(r) \sin \frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}}{\gamma_n^2 \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} + \beta^2 \right) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_1^2(\gamma_n))}.
\end{aligned}$$

$$2.810. \ 1) \ u(r, t) = \frac{A}{4a^2(\nu+1)} \left(\frac{r_1^{2\nu} r_2^{2\nu} (r_1^2 - r_2^2) r^{-\nu} + (r_2^{2\nu+2} - r_1^{2\nu+2}) r^\nu}{r_2^{2\nu} - r_1^{2\nu}} - r^{\nu+2} \right) -$$

$$- \frac{A\pi r_2^{\nu+2}}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu(\alpha \gamma_n)(J_\nu(\alpha \gamma_n) - \alpha^\nu J_\nu(\gamma_n)) R_n(r) \cos \frac{\gamma_n \alpha t}{r_2}}{\gamma_n^2 (J_\nu^2(\alpha \gamma_n) - J_\nu^2(\gamma_n))}$$

$$\begin{aligned}
2) \ u(r, t) = & \frac{A}{4a^2(\nu+1)} \left(\frac{r_1^{2\nu} r_2^{2\nu} (r_1^2 - r_2^2) r^{-\nu} + (r_2^{2\nu+2} - r_1^{2\nu+2}) r^\nu}{r_2^{2\nu} - r_1^{2\nu}} - r^{\nu+2} \right) t - \\
& - \frac{A\pi r_2^{\nu+3}}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu(\alpha \gamma_n)(J_\nu(\alpha \gamma_n) - \alpha^\nu J_\nu(\gamma_n)) R_n(r) \sin \frac{\gamma_n \alpha t}{r_2}}{\gamma_n^3 (J_\nu^2(\alpha \gamma_n) - J_\nu^2(\gamma_n))},
\end{aligned}$$

где собственные функции $R_n(r) = Y_\nu(\gamma_n) J_\nu\left(\frac{\gamma_n r}{r_2}\right) - J_\nu(\gamma_n) Y_\nu\left(\frac{\gamma_n r}{r_2}\right)$, γ_n — положительный корень уравнения $J_\nu(\gamma) Y_\nu(\alpha \gamma) - Y_\nu(\gamma) J_\nu(\alpha \gamma) = 0$, $\alpha = \frac{r_1}{r_2}$.

$$\begin{aligned}
 2.811. \quad 1) u(r, t) = & \frac{A}{4a^2(\nu+1)} \left(\frac{\left(r_2^{2\nu+2} + \frac{\nu+2}{\nu} r_1^{2\nu+2} \right) r^\nu + r_1^{2\nu} r_2^{2\nu} \left(r_2^2 - \frac{\nu+2}{\nu} r_1^2 \right) r^{-\nu}}{r_1^{2\nu} + r_2^{2\nu}} - r^{\nu+2} \right) - \\
 & - \frac{A\pi r_2^{\nu+1}}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J'_\nu(\alpha\gamma_n) \left(J'_\nu(\alpha\gamma_n) - \frac{\nu\alpha^{\nu-1}}{\gamma_n} J_\nu(\gamma_n) \right) R_n(r) \cos \frac{\gamma_n \alpha t}{r_2}}{\gamma_n^2 \left(J_\nu'^2(\alpha\gamma_n) - \left(1 - \frac{\nu^2}{\alpha^2 \gamma_n^2} \right) J_\nu^2(\gamma_n) \right)}; \\
 2) u(r, t) = & \frac{A}{4a^2(\nu+1)} \left(\frac{\left(r_2^{2\nu+2} + \frac{\nu+2}{\nu} r_1^{2\nu+2} \right) r^\nu + r_1^{2\nu} r_2^{2\nu} \left(r_2^2 - \frac{\nu+2}{\nu} r_1^2 \right) r^{-\nu}}{r_1^{2\nu} + r_2^{2\nu}} - r^{\nu+2} \right) t - \\
 & - \frac{A\pi r_2^{\nu+2}}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J'_\nu(\alpha\gamma_n) \left(J'_\nu(\alpha\gamma_n) - \frac{\nu\alpha^{\nu-1}}{\gamma_n} J_\nu(\gamma_n) \right) R_n(r) \sin \frac{\gamma_n \alpha t}{r_2}}{\gamma_n^3 \left(J_\nu'^2(\alpha\gamma_n) - \left(1 - \frac{\nu^2}{\alpha^2 \gamma_n^2} \right) J_\nu^2(\gamma_n) \right)},
 \end{aligned}$$

где собственные функции $R_n(r) = Y_\nu(\gamma_n) J_\nu\left(\frac{\gamma_n r}{r_2}\right) - J_\nu(\gamma_n) Y_\nu\left(\frac{\gamma_n r}{r_2}\right)$, γ_n — положительный корень уравнения $J_\nu(\gamma) Y'_\nu(\alpha\gamma) - Y_\nu(\gamma) J'_\nu(\alpha\gamma) = 0$, $\alpha = \frac{r_1}{r_2}$.

$$\begin{aligned}
 2.812. \quad 1) u(r, t) = & \frac{A(\nu+2)}{4a^2\nu(\nu+1)} \left(\frac{\left(r_2^{2\nu+2} - r_1^{2\nu+2} \right) r^\nu + r_1^{2\nu} r_2^{2\nu} \left(r_2^2 - r_1^2 \right) r^{-\nu}}{r_2^{2\nu} - r_1^{2\nu}} - r^{\nu+2} \right) - \\
 & - \frac{A\pi\nu r_2^{\nu+2}}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J'_\nu(\alpha\gamma_n) \left(J'_\nu(\alpha\gamma_n) - \alpha^{\nu-1} J'_\nu(\gamma_n) \right) R_n(r) \cos \frac{\gamma_n \alpha t}{r_2}}{\gamma_n^3 \left[\left(1 - \frac{\nu^2}{\gamma_n^2} \right) J_\nu'^2(\alpha\gamma_n) - \left(1 - \frac{\nu^2}{\alpha^2 \gamma_n^2} \right) J_\nu'^2(\gamma_n) \right]}; \\
 2) u(r, t) = & \frac{A(\nu+2)}{4a^2\nu(\nu+1)} \left(\frac{\left(r_2^{2\nu+2} - r_1^{2\nu+2} \right) r^\nu + r_1^{2\nu} r_2^{2\nu} \left(r_2^2 - r_1^2 \right) r^{-\nu}}{r_2^{2\nu} - r_1^{2\nu}} - r^{\nu+2} \right) t - \\
 & - \frac{A\pi\nu r_2^{\nu+3}}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J'_\nu(\alpha\gamma_n) \left(J'_\nu(\alpha\gamma_n) - \alpha^{\nu-1} J'_\nu(\gamma_n) \right) R_n(r) \sin \frac{\gamma_n \alpha t}{r_2}}{\gamma_n^4 \left[\left(1 - \frac{\nu^2}{\gamma_n^2} \right) J_\nu'^2(\alpha\gamma_n) - \left(1 - \frac{\nu^2}{\alpha^2 \gamma_n^2} \right) J_\nu'^2(\gamma_n) \right]},
 \end{aligned}$$

где собственные функции $R_n(r) = Y'_\nu(\gamma_n) J_\nu\left(\frac{\gamma_n r}{r_2}\right) - J'_\nu(\gamma_n) Y_\nu\left(\frac{\gamma_n r}{r_2}\right)$, γ_n — положительный корень уравнения $J'_\nu(\gamma) Y'_\nu(\alpha\gamma) - Y'_\nu(\gamma) J'_\nu(\alpha\gamma) = 0$, $\alpha = \frac{r_1}{r_2}$.

2.813. Здесь $R_n(r) = Y_0(\gamma_n) J_0\left(\frac{\gamma_n r}{r_2}\right) - J_0(\gamma_n) Y_0\left(\frac{\gamma_n r}{r_2}\right)$, $\gamma_n > 0$ — корень уравнения $J_0(\gamma) Y_0(\alpha\gamma) - Y_0(\gamma) J_0(\alpha\gamma) = 0$, $\alpha = \frac{r_1}{r_2}$.

1) Если $\beta \neq \frac{\gamma_n}{r_2}$, то

$$\begin{aligned}
 u(r, t) = & \frac{A}{\beta^2 a^2 \ln \alpha} \left(J_0(\beta r) \ln \frac{r_1}{r_2} - J_0(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} - J_0(\beta r_2) \ln \frac{r_1}{r} \right) - \\
 & - \frac{\pi A}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\alpha\gamma_n) (J_0(\alpha\gamma_n) J_0(\beta r_2) - J_0(\gamma_n) J_0(\beta r_1)) R_n(r) e^{-\left(\frac{\alpha\gamma_n t}{r_2}\right)^2 t}}{\left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} - \beta^2 \right) (J_0^2(\alpha\gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))},
 \end{aligned}$$

если $\beta = \frac{\gamma_m}{r_2}$, то

$$u(r, t) = \frac{Ar_2^2}{\gamma_m^2 a^2 \ln \alpha} \left(J_0\left(\frac{\gamma_m r}{r_2}\right) \ln \frac{r_1}{r_2} - J_0(\alpha \gamma_m) \ln \frac{r}{r_2} - J_0(\gamma_m) \ln \frac{r_1}{r} \right) -$$

$$- \frac{\pi Ar_2 J_0(\alpha \gamma_m) (J_0(\alpha \gamma_m) J_1(\gamma_m) r_2 - J_0(\gamma_m) J_1(\alpha \gamma_m) r_1) R_m(r) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_m t}{r_2}\right)^2 t}}{2 \gamma_m a^2 (J_0^2(\alpha \gamma_m) - J_0^2(\gamma_m))} -$$

$$- \frac{\pi Ar_2^2}{a^2} \sum_{n \neq m}^{\infty} \frac{J_0(\alpha \gamma_n) (J_0(\alpha \gamma_n) J_0(\gamma_m) - J_0(\gamma_n) J_0(\alpha \gamma_m)) R_n(r) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}\right)^2 t}}{(\gamma_n^2 - \gamma_m^2) (J_0^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))};$$

2) если $\beta \neq \frac{\gamma_n}{r_2}$, то

$$u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2 \ln \alpha} \left(Y_0(\beta r) \ln \frac{r_1}{r_2} - Y_0(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} - Y_0(\beta r_2) \ln \frac{r_1}{r} \right) -$$

$$- \frac{\pi A}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\alpha \gamma_n) (J_0(\alpha \gamma_n) Y_0(\beta r_2) - J_0(\gamma_n) Y_0(\beta r_1)) R_n(r) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}\right)^2 t}}{\left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} - \beta^2\right) (J_0^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))},$$

если $\beta = \frac{\gamma_n}{r_2}$, то

$$u(r, t) = \frac{Ar_2^2}{\gamma_m^2 a^2 \ln \alpha} \left(Y_0\left(\frac{\gamma_m r}{r_2}\right) \ln \frac{r_1}{r_2} - Y_0(\alpha \gamma_m) \ln \frac{r}{r_2} - Y_0(\gamma_m) \ln \frac{r_1}{r} \right) -$$

$$- \frac{\pi Ar_2 J_0(\alpha \gamma_m) (J_0(\alpha \gamma_m) Y_1(\gamma_m) r_2 - J_0(\gamma_m) Y_1(\alpha \gamma_m) r_1) R_m(r) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_m t}{r_2}\right)^2 t}}{2 \gamma_m a^2 (J_0^2(\alpha \gamma_m) - J_0^2(\gamma_m))} -$$

$$- \frac{\pi Ar_2^2}{a^2} \sum_{n \neq m}^{\infty} \frac{J_0(\alpha \gamma_n) (J_0(\alpha \gamma_n) Y_0(\gamma_m) - J_0(\gamma_n) Y_0(\alpha \gamma_m)) R_n(r) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}\right)^2 t}}{(\gamma_n^2 - \gamma_m^2) (J_0^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))};$$

$$3) u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2 \ln \alpha} \left(I_0(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} + I_0(\beta r_2) \ln \frac{r_1}{r} - I_0(\beta r) \ln \frac{r_1}{r_2} \right) -$$

$$- \frac{\pi A}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\alpha \gamma_n) (J_0(\alpha \gamma_n) I_0(\beta r_2) - J_0(\gamma_n) I_0(\beta r_1)) R_n(r) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}\right)^2 t}}{\left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} + \beta^2\right) (J_0^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))};$$

$$4) u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2 \ln \alpha} \left(K_0(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} + K_0(\beta r_2) \ln \frac{r_1}{r} - K_0(\beta r) \ln \frac{r_1}{r_2} \right) -$$

$$- \frac{\pi A}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\alpha \gamma_n) (J_0(\alpha \gamma_n) K_0(\beta r_2) - J_0(\gamma_n) K_0(\beta r_1)) R_n(r) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}\right)^2 t}}{\left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} + \beta^2\right) (J_0^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))}.$$

2.814. Здесь $R_n(r) = Y_0(\gamma_n) J_0\left(\frac{\gamma_n r}{r_2}\right) - J_0(\gamma_n) Y_0\left(\frac{\gamma_n r}{r_2}\right)$, $\gamma_n > 0$ — корень уравнения $J_0(\gamma) Y_1(\alpha \gamma) - Y(\gamma) J_1(\alpha \gamma) = 0$, $\alpha = \frac{r_1}{r_2}$.

$$1) \text{ Если } \beta \neq \frac{\gamma_n}{r_2}, \text{ то } u(r, t) = \frac{A}{\beta^2 a^2} \left(J_0(\beta r) - J_0(\beta r_2) + \beta r_1 J_1(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} \right) +$$

$$+ \frac{\pi A}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n) (\beta r_2 J_1(\beta r_1) J_0(\gamma_n) - \gamma_n J_1(\alpha \gamma_n) J_0(\beta r_2)) R_n(r) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}\right)^2 t}}{\gamma_n \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} - \beta^2\right) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))},$$

$$\begin{aligned} \text{если } \beta = \frac{\gamma_m}{r_2}, \text{ то } u(r, t) = & \frac{Ar_2^2}{\gamma_m^2 a^2} \left(J_0\left(\frac{\gamma_m r}{r_2}\right) - J_0(\gamma_m) + \alpha \gamma_m J_1(\alpha \gamma_m) \ln \frac{r}{r_2} \right) - \\ & - \frac{\pi Ar_2^2 J_1(\alpha \gamma_m)(\alpha J_0(\gamma_m) J_0(\alpha \gamma_m) + J_1(\gamma_m) J_1(\alpha \gamma_m)) R_m(r) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_m t}{r_2}\right)^2 t}}{2 \gamma_m a^2 (J_1^2(\alpha \gamma_m) - J_0^2(\gamma_m))} + \\ & + \frac{\pi Ar_2^2}{a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n)(\gamma_m J_1(\alpha \gamma_m) J_0(\gamma_n) - \gamma_n J_1(\alpha \gamma_n) J_0(\gamma_m)) R_n(r) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}\right)^2 t}}{\gamma_n (\gamma_n^2 - \gamma_m^2) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \text{ если } \beta \neq \frac{\gamma_n}{r_2}, \text{ то } u(r, t) = & \frac{A}{\beta^2 a^2} \left(Y_0(\beta r) - Y_0(\beta r_2) + \beta r_1 Y_1(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} \right) + \\ & + \frac{\pi A}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n)(\beta r_2 Y_1(\beta r_1) J_0(\gamma_n) - \gamma_n J_1(\alpha \gamma_n) Y_0(\beta r_2)) R_n(r) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}\right)^2 t}}{\gamma_n \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} - \beta^2 \right) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{если } \beta = \frac{\gamma_m}{r_2}, \text{ то } u(r, t) = & \frac{Ar_2^2}{\gamma_m^2 a^2} \left(Y_0\left(\frac{\gamma_m r}{r_2}\right) - Y_0(\gamma_m) + \alpha \gamma_m Y_1(\alpha \gamma_m) \ln \frac{r}{r_2} \right) - \\ & - \frac{\pi Ar_2^2 J_1(\alpha \gamma_m)(\alpha J_0(\gamma_m) Y_0(\alpha \gamma_m) + Y_1(\gamma_m) J_1(\alpha \gamma_m)) R_m(r) \cos \frac{\alpha \gamma_m t}{r_2}}{2 \gamma_m a^2 (J_1^2(\alpha \gamma_m) - J_0^2(\gamma_m))} + \\ & + \frac{\pi Ar_2^2}{a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n)(\gamma_m Y_1(\alpha \gamma_m) J_0(\gamma_n) - \gamma_n J_1(\alpha \gamma_n) Y_0(\gamma_m)) R_n(r) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}\right)^2 t}}{\gamma_n (\gamma_n^2 - \gamma_m^2) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) u(r, t) = & \frac{A}{\beta^2 a^2} \left(\beta r_1 I_1(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} - I_0(\beta r) + I_0(\beta r_2) \right) - \\ & - \frac{\pi A}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n)(\beta r_2 I_1(\beta r_1) J_0(\gamma_n) + \gamma_n J_1(\alpha \gamma_n) I_0(\beta r_2)) R_n(r) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}\right)^2 t}}{\gamma_n \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} + \beta^2 \right) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4) u(r, t) = & \frac{A}{\beta^2 a^2} \left(\beta r_1 K_1(\beta r_1) \ln \frac{r}{r_2} - K_0(\beta r) + K_0(\beta r_2) \right) - \\ & - \frac{\pi A}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n)(\beta r_2 K_1(\beta r_1) J_0(\gamma_n) + \gamma_n J_1(\alpha \gamma_n) K_0(\beta r_2)) R_n(r) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}\right)^2 t}}{\gamma_n \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} + \beta^2 \right) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_0^2(\gamma_n))}. \end{aligned}$$

2.815. $R_n(r) = Y_1(\gamma_n) J_0\left(\frac{\gamma_n r}{r_2}\right) - J_1(\gamma_n) Y_0\left(\frac{\gamma_n r}{r_2}\right)$, $\gamma_n > 0$ — корень уравнения $J_1(\gamma) Y_1(\alpha \gamma) - Y_1(\gamma) J_1(\alpha \gamma) = 0$, $\alpha = \frac{r_1}{r_2}$.

$$1) u(r, t) = \int_0^t h(t - \tau) \tau d\tau;$$

$$\begin{aligned} 2) \text{ если } \beta \neq \frac{\gamma_n}{r_2}, \text{ то } u(r, t) = & \frac{A}{\beta a^2} \left(\frac{J_0(\beta r)}{\beta} + 2(r_2 J_1(\beta r_2) - r_1 J_1(\beta r_1)) \right) + \\ & + \frac{Ar_1 r_2 (r_2 J_1(\beta r_1) - r_1 J_1(\beta r_2))}{\beta a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(\frac{r_2^2 \ln \frac{r}{r_2} - r_1^2 \ln \frac{r}{r_2}}{r_2^2 - r_1^2} + \frac{1}{2} \right) + \\ & + \frac{A(r_2 J_1(\beta r_2) - r_1 J_1(\beta r_1))}{2 \beta a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(r^2 - \frac{r_1^2 + r_2^2}{2} \right) + \frac{A(r_2 J_1(\beta r_2) - r_1 J_1(\beta r_1)) t^2}{\beta (r_2^2 - r_1^2)} - \\ & - \frac{2 \pi A \beta r_2}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n)(J_1(\alpha \gamma_n) J_1(\beta r_2) - J_1(\gamma_n) J_1(\beta r_1)) R_n(r) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}\right)^2 t}}{\gamma_n \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} - \beta^2 \right) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_1^2(\gamma_n))}, \end{aligned}$$

$$\text{если } \beta = \frac{\gamma_m}{r_2}, \text{ то } u(r, t) = \frac{Ar_2}{\gamma_m a^2} \left(\frac{r_2}{\gamma_m} J_0\left(\frac{\gamma_m r}{r_2}\right) + 2(r_2 J_1(\gamma_m) - r_1 J_1(\alpha \gamma_m)) \right) +$$

$$+ \frac{Ar_1 r_2 (r_2 J_1(\alpha \gamma_m) - r_1 J_1(\gamma_m))}{\gamma_m a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(\frac{r_2^2 \ln \frac{r}{r_2} - r_1^2 \ln \frac{r}{r_2}}{r_2^2 - r_1^2} + \frac{1}{2} \right) +$$

$$+ \frac{Ar_2 (r_2 J_1(\gamma_m) - r_1 J_1(\alpha \gamma_m))}{2 \gamma_m a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(r^2 - \frac{r_1^2 + r_2^2}{2} \right) + \frac{Ar_2 ((r_2 J_1(\gamma_m)) - r_1 J_1(\alpha \gamma_m)) t^2}{\gamma_m (r_2^2 - r_1^2)} -$$

$$- \frac{\pi Ar_2 J_1(\alpha \gamma_m) (r_2 J_1(\alpha \gamma_m) J_1'(\gamma_m) - r_1 J_1(\gamma_m) J_1'(\alpha \gamma_m)) R_m(r) \cos \frac{\alpha \gamma_m t}{r_2}}{\gamma_m a^2 (J_1^2(\alpha \gamma_m) - J_0^2(\gamma_m))} -$$

$$- \frac{2 \pi A \gamma_m r_2^2}{a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n) (J_1(\alpha \gamma_n) J_1(\gamma_m) - J_1(\gamma_n) J_1(\alpha \gamma_m)) R_n(r) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_m t}{r_2}\right)^2 t}}{\gamma_n (\gamma_n^2 - \gamma_m^2) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_1^2(\gamma_n))};$$

$$3) \text{ если } \beta \neq \frac{\gamma_n}{r_2}, \text{ то } u(r, t) = \frac{A}{\beta a^2} \left(\frac{Y_0(\beta r)}{\beta} + 2(r_2 Y_1(\beta r_2) - r_1 Y_1(\beta r_1)) \right) +$$

$$+ \frac{Ar_1 r_2 (r_2 Y_1(\beta r_1) - r_1 Y_1(\beta r_2))}{\beta a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(\frac{r_2^2 \ln \frac{r}{r_2} - r_1^2 \ln \frac{r}{r_2}}{r_2^2 - r_1^2} + \frac{1}{2} \right) +$$

$$+ \frac{A(r_2 Y_1(\beta r_2) - r_1 Y_1(\beta r_1))}{2 \beta a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(r^2 - \frac{r_1^2 + r_2^2}{2} \right) + \frac{A(r_2 Y_1(\beta r_2) - r_1 Y_1(\beta r_1)) t^2}{\beta (r_2^2 - r_1^2)} -$$

$$- \frac{2 \pi A \beta r_2}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n) (J_1(\alpha \gamma_n) Y_1(\beta r_2) - J_1(\gamma_n) Y_1(\beta r_1)) R_n(r) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_m t}{r_2}\right)^2 t}}{\gamma_n \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} - \beta^2 \right) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_1^2(\gamma_n))},$$

$$\text{если } \beta = \frac{\gamma_m}{r_2}, \text{ то } u(r, t) = \frac{Ar_2}{\gamma_m a^2} \left(\frac{r_2}{\gamma_m} Y_0\left(\frac{\gamma_m r}{r_2}\right) + 2(r_2 Y_1(\gamma_m) - r_1 Y_1(\alpha \gamma_m)) \right) +$$

$$+ \frac{Ar_1 r_2 (r_2 Y_1(\alpha \gamma_m) - r_1 Y_1(\gamma_m))}{\gamma_m a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(\frac{r_2^2 \ln \frac{r}{r_2} - r_1^2 \ln \frac{r}{r_2}}{r_2^2 - r_1^2} + \frac{1}{2} \right) +$$

$$+ \frac{Ar_2 (r_2 Y_1(\gamma_m) - r_1 Y_1(\alpha \gamma_m))}{2 \gamma_m a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(r^2 - \frac{r_1^2 + r_2^2}{2} \right) + \frac{Ar_2 ((r_2 Y_1(\gamma_m)) - r_1 Y_1(\alpha \gamma_m)) t^2}{\gamma_m (r_2^2 - r_1^2)} -$$

$$- \frac{\pi Ar_2 J_1(\alpha \gamma_m) (r_2 J_1(\alpha \gamma_m) Y_1'(\gamma_m) - r_1 J_1(\gamma_m) Y_1'(\alpha \gamma_m)) R_m(r) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_m t}{r_2}\right)^2 t}}{\gamma_m a^2 (J_1^2(\alpha \gamma_m) - J_0^2(\gamma_m))} -$$

$$- \frac{2 \pi A \gamma_m r_2^2}{a^2} \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n) (J_1(\alpha \gamma_n) Y_1(\gamma_m) - J_1(\gamma_n) Y_1(\alpha \gamma_m)) R_n(r) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_m t}{r_2}\right)^2 t}}{\gamma_n (\gamma_n^2 - \gamma_m^2) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_1^2(\gamma_n))};$$

$$4) u(r, t) = \frac{A}{\beta a^2} \left(2r_2 I_1(\beta r_2) - 2r_1 I_1(\beta r_1) - \frac{I_0(\beta r)}{\beta} \right) +$$

$$+ \frac{Ar_1 r_2 (r_2 I_1(\beta r_1) - r_1 I_1(\beta r_2))}{\beta a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(\frac{r_2^2 \ln \frac{r}{r_2} - r_1^2 \ln \frac{r}{r_2}}{r_2^2 - r_1^2} + \frac{1}{2} \right) +$$

$$+ \frac{A(r_2 I_1(\beta r_2) - r_1 I_1(\beta r_1))}{2 \beta a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(r^2 - \frac{r_1^2 + r_2^2}{2} \right) + \frac{A(r_2 I_1(\beta r_2) - r_1 I_1(\beta r_1)) t^2}{\beta (r_2^2 - r_1^2)} -$$

$$- \frac{2 \pi A \beta r_2}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n) (J_1(\alpha \gamma_n) I_1(\beta r_2) - J_1(\gamma_n) I_1(\beta r_1)) R_n(r) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_m t}{r_2}\right)^2 t}}{\gamma_n \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} + \beta^2 \right) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_1^2(\gamma_n))};$$

$$\begin{aligned}
5) \quad u(r, t) = & \frac{A}{\beta a^2} \left(2r_2 K_1(\beta r_2) - 2r_1 K_1(\beta r_1) - \frac{K_0(\beta r)}{\beta} \right) + \\
& + \frac{Ar_1 r_2 (r_2 K_1(\beta r_1) - r_1 K_1(\beta r_2))}{\beta a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(\frac{r_2^2 \ln \frac{r}{r_2} - r_1^2 \ln \frac{r}{r_1}}{r_2^2 - r_1^2} + \frac{1}{2} \right) + \\
& + \frac{A(r_2 k_1(\beta r_2) - r_1 K_1(\beta r_1))}{2\beta a^2 (r_2^2 - r_1^2)} \left(r^2 - \frac{r_1^2 + r_2^2}{2} \right) + \frac{A(r_2 K_1(\beta r_2) - r_1 K_1(\beta r_1)) t^2}{\beta (r_2^2 - r_1^2)} - \\
& - \frac{2\pi A \beta r_2}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\alpha \gamma_n) (J_1(\alpha \gamma_n) K_1(\beta r_2) - J_1(\gamma_n) K_1(\beta r_1)) R_n(r) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}\right)^2}}{\gamma_n \left(\frac{\gamma_n^2}{r_2^2} + \beta^2 \right) (J_1^2(\alpha \gamma_n) - J_1^2(\gamma_n))}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2.816. \quad 1) \quad u(r, t) = & \frac{A}{4a^2(\nu+1)} \left(\frac{r_1^{2\nu} r_2^{2\nu} (r_1^2 - r_2^2) r^{-\nu} + (r_2^{2\nu+2} - r_1^{2\nu+2}) r^\nu}{r_2^{2\nu} - r_1^{2\nu}} - r^{\nu+2} \right) - \\
& - \frac{A\pi r_2^{\nu+2}}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu(\alpha \gamma_n) (J_\nu(\alpha \gamma_n) - \alpha^\nu J_\nu(\gamma_n)) R_n(r) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_n t}{r_2}\right)^2}}{\gamma_n^2 (J_\nu^2(\alpha \gamma_n) - J_\nu^2(\gamma_n))}; \\
2) \quad u(r, t) = & \frac{A}{4a^2(\nu+1)} \left(\frac{r_1^{2\nu} r_2^{2\nu} (r_1^2 - r_2^2) r^{-\nu} + (r_2^{2\nu+2} - r_1^{2\nu+2}) r^\nu}{r_2^{2\nu} - r_1^{2\nu}} - r^{\nu+2} \right) t - \\
& - \frac{A\pi r_2^{\nu+3}}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_\nu(\alpha \gamma_n) (J_\nu(\alpha \gamma_n) - \alpha^\nu J_\nu(\gamma_n)) R_n(r) \sin \frac{\gamma_n \alpha t}{r_2}}{\gamma_n^3 (J_\nu^2(\alpha \gamma_n) - J_\nu^2(\gamma_n))},
\end{aligned}$$

где собственные функции $R_n(r) = Y_\nu(\gamma_n) J_\nu\left(\frac{\gamma_n r}{r_2}\right) - J_\nu(\gamma_n) Y_\nu\left(\frac{\gamma_n r}{r_2}\right)$, γ_n — положительный корень уравнения $J_\nu(\gamma) Y_\nu(\alpha \gamma) - Y_\nu(\gamma) J_\nu(\alpha \gamma) = 0$, $\alpha = \frac{r_1}{r_2}$.

$$2.817. \quad u(r, t) = \frac{A(r_0^2 - r^2)^2 t}{64a^2} - \frac{2Ar_0^6}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\mu_n) R_n(r) \sin \omega_n t}{\mu_n^9 I_0(\mu_n) J_0^2(\mu_n)}.$$

Обозначения те же, что в задаче 2.804.

$$2.818. \quad u(r, t) = \frac{A(r_0^2 - r^2)^2 (r^2 - 7r_0^2) t}{576a^2} - \frac{4Ar_0^8}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{R_n(r) \sin \omega_n t}{\mu_n^{10} I_0(\mu_n) J_0(\mu_n)}.$$

Обозначения те же, что в задаче 2.804.

$$2.819. \quad u(r, t) = \frac{A(r_0^2 - r^2)^2 (r^4 - 6r_0^2 r^2 + 29r_0^4) t}{2304a^2} - \frac{128Ar_0^{10}}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\mu_n) R_n(r) \sin \omega_n t}{\mu_n^{13} I_0(\mu_n) J_0^2(\mu_n)}.$$

Обозначения те же, что в задаче 2.804.

$$\begin{aligned}
2.820. \quad u(r, t) = & \frac{A(r_0^2 - r^2)^2}{64a^2} \left[\frac{(r^4 - 6r_0^2 r^2 + 23r_0^4) t^2}{64a^2} + 1 \right] + \\
& + \frac{4Ar_0^8}{a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\mu_n) R_n(r) \cos \omega_n t}{\mu_n^{11} I_0(\mu_n) J_0^2(\mu_n)}.
\end{aligned}$$

Обозначения те же, что в задаче 2.804.

$$2.821. \quad u(r, t) = At - \frac{2Ar_0^2}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_1(\mu_n) R_n(r) \sin \omega_n t}{\mu_n^5 I_0(\mu_n) J_0^2(\mu_n)}.$$

Обозначения те же, что в задаче 2.804.

$$2.822. \quad u(r, t) = \frac{A(r_0^2 - r^2)t}{2r_0} - \frac{2Ar_0^3}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{R_n(r) \sin \omega_n t}{\mu_n^6 I_0(\mu_n) J_0(\mu_n)}.$$

Обозначения те же, что в задаче 2.804.

$$2.823. \quad u(r, \theta) = \frac{u_0}{5} \left[8 \left(\frac{r_0}{r} \right)^4 P_3(\cos \theta) - 3 \left(\frac{r_0}{r} \right)^2 P_1(\cos \theta) \right].$$

$$2.824. \quad \sigma(\theta) = \frac{3E_0}{4\pi} \cos \theta.$$

$$2.825. \quad u(\mathbf{r}) = \begin{cases} \frac{4\pi P}{3} r \cos \theta, & 0 \leq r \leq r_0, \\ \frac{4\pi P r_0^3}{3} \frac{\cos \theta}{r^2}, & r_0 < r. \end{cases}$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \begin{cases} \frac{4\pi}{3} \mathbf{P}, & 0 \leq r \leq r_0, \\ \frac{4\pi P r_0^3}{3r^3} (2 \cos \theta \mathbf{e}_r - \sin \theta \mathbf{e}_\theta), & r_0 < r. \end{cases}$$

$$2.826. \quad \mathbf{E} = \frac{3\mathbf{E}_0}{\varepsilon + 2}, \quad \mathbf{P} = \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 1} r_0^3 \mathbf{E}_0.$$

$$2.827. \quad \mathbf{H} = \frac{9\mu \mathbf{H}_0}{(\mu + 2)(2\mu + 1) - 2(\mu - 1)^2 \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^3}, \quad \mathbf{M} = \frac{(2\mu + 1)(\mu - 1)(r_2^3 - r_1^3) \mathbf{H}_0}{(\mu + 2)(2\mu + 1) - 2(\mu - 1)^2 \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^3}.$$

$$2.828. \quad P(\theta) = P_0 + \frac{\rho_0 V_0^2}{8} (9 \cos^2 \theta - 5).$$

$$2.829. \quad P(\theta) = P_0 + \frac{\rho_0 V(t)^2}{8} (9 \cos^2 \theta - 5) + \frac{\rho_0 r_0}{2} \frac{dV(t)}{dt} \cos \theta.$$

$$2.830. \quad u(r, \theta) = \frac{u_0 r}{5} \left[3P_1(\cos \theta) + \frac{2r^2}{3r_0^2} P_3(\cos \theta) \right].$$

$$2.831. \quad u(r, \theta) = \frac{A \ln r}{3r^2} \cos \theta - \frac{u_0 r_0}{3r} \left[1 - 4 \frac{r_0^2}{r^2} P_2(\cos \theta) \right].$$

2.832. Если $Ar_0^2 = 8v_0$, то $u(r, \theta) = \frac{Ar_2}{3} \left[\frac{r}{12} + \left(\frac{r}{3} - \frac{5}{8} r_0 \right) P_2(\cos \theta) \right]$; если $Ar_0^2 \neq 8v_0$, то задача не имеет решения.

$$2.833. \quad u(r, \theta) = \frac{A}{3r^2} \left[1 - \frac{2r}{r_0} + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{2r_0}{3r} \right) P_2(\cos \theta) \right].$$

$$2.834. \quad u(r, \theta) = \frac{A}{5} \left[1 + \frac{20hr^2}{7(2 + hr_0)r_0} P_2(\cos \theta) + \frac{8hr^4}{7(4 + hr_0)r_0^3} P_4(\cos \theta) \right].$$

$$2.835. \quad u(r, \theta) = \frac{A}{r} \left(\ln \frac{r_0}{r} - \frac{1}{1 + p} \right) - \frac{3pu_0 r_0^2}{5(2 + p)r^2} P_2(\cos \theta) + \frac{8pu_0 r_0^4}{5(4 + p)r^4} P_3(\cos \theta).$$

$$2.836. \quad u(r, \theta) = \frac{A_2 r_2^2}{r_1 + hr_2(r_2 - r_1)} \left(1 - \frac{r_1}{r} \right) + \frac{A_1 r_1^2 r}{(2 - hr_2)r_1^3 + (1 + hr_2)r_2^3} \left[2 - hr_2 + (1 + hr_2) \frac{r_2^3}{r^3} \right] P_2(\cos \theta).$$

2.837. Если $A_2 = 3 \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 A_1$, то

$$u(r, \theta) = C - \frac{Ar_1^2}{r} + \frac{Ar_1^2 r_2^2 r^2}{r_2^5 - r_1^5} \left(1 + \frac{r_1^5}{3r^5} \right) P_2(\cos \theta).$$

2.838. Если $-3B_0 = r_1^2 v_1 = 2r_2^2 v_2$, то $u(r, \theta) = C + \frac{Ar^4 \cos \theta}{r} + \frac{B}{r} - \frac{Ar}{4}(r_1^3 + r_2^3) \cos \theta - \frac{Ar_1^3 r_2^3}{8r^2} \cos \theta + \left[\frac{r^2}{3} \frac{v_1 r_1^4 + v_2 r_2^4}{r_1^5 - r_2^5} + \frac{2}{9r^2} \frac{r_1^4 r_2^4 (r_1 v_2 - r_2 v_1)}{r_1^5 - r_2^5} \right] P_2(\cos \theta)$, если $r_1^2 v_1 \neq 2r_2^2 v_2$, то задача не имеет решения.

2.839.
$$u(r, \theta) = \frac{Q_0}{12\pi k} \left\{ 1 - \frac{r^2}{r_0^2} - 6 \frac{r^2}{r_0^2} \ln \frac{r}{r_0} \cdot P_2(\cos \theta) + \right.$$

$$\left. + 3 \frac{r^2}{r_0^2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{4n+1}{(n-1)(2n+3)} \left[1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2n-2} \right] P_{2n}(\cos \theta) \right\}.$$

2.840.
$$u(r, \theta) = \frac{Q_0}{4\pi k} \left[(r_1^2 + r^2 - 2r_1 r \cos \theta)^{-\frac{1}{2}} - \left(r^2 + \frac{r_0^4}{r_1^2} - 2 \frac{r_0^2 r}{r_1} \cos \theta \right)^{-\frac{1}{2}} \right].$$

У к а з а н и е. Решение представить в виде

$$u(r, \theta) = v(r, \theta) + \frac{Q_0}{4\pi k \sqrt{r^2 + r_1^2 - 2rr_1 \cos \theta}}$$

и применить разложение для производящей функции.

2.841.
$$\sigma(\theta) = \frac{Q_0 + Q}{4\pi r_0^2} - \frac{Q}{4\pi r_0^2} \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1) \left(\frac{r_1}{r_0} \right)^{2n} P_n(\cos \theta) =$$

$$= \frac{Q_0 + Q}{4\pi r_0^2} - \frac{Q}{4\pi r_0} \frac{r_0^2 - r_1^2}{(r_0^2 + r_1^2 - 2r_0 r_1 \cos \theta)^{\frac{3}{2}}}, \quad \mathbf{p} = -Q\mathbf{r}_1, \quad \mathbf{F} = Q^2 \frac{r_0 \mathbf{r}_1}{(r_0^2 - r_1^2)^2}.$$

2.842.
$$u(r, \theta) = \frac{Q_0}{4\pi \rho_0 r_0} \left[\ln \frac{r(1 + \cos \theta)}{r_{MP_1} - \frac{r_0^2}{r_1} + r \cos \theta} - \frac{r_0}{r_{MP}} - \frac{r_0^2}{r_1 r_{MP_1}} \right],$$

где $r_{MP} = (r^2 + r_1^2 - 2rr_1 \cos \theta)^{\frac{1}{2}}$, $r_{MP_1} = \left(r^2 + \left(\frac{r_0^2}{r_1} \right)^2 - 2 \frac{r_0^2 r}{r_1} \cos \theta \right)^{\frac{1}{2}}$.

2.843.
$$Q' = \frac{r_0}{r_1^2} p, \quad \mathbf{p}' = 2 \left(\frac{r_0}{r_1} \right)^3 \mathbf{p}, \quad \mathbf{F} = -2p \frac{r_0 r_1 (r_0^2 + 2r_1^2)}{(r_1^2 - r_0^2)^4} \cdot \frac{\mathbf{r}_1}{r_1}, \quad \sigma(\theta) = \frac{p}{4\pi r_1^3} \times$$

$$\times \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(2n+1) \left(\frac{r_0}{r_1} \right)^{n-1} P_n(\cos \theta) = \frac{p}{4\pi r_0} \frac{r_1 (r_1^2 - 5r_0^2) + r_0 (r_1^2 + 3r_0^2) \cos \theta}{(r_1^2 + r_0^2 - 2r_1 r_0 \cos \theta)^{\frac{5}{2}}}.$$

2.844.
$$\mathbf{F} = -\frac{Q^2}{r_1^2} (\varepsilon - 1) \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r_1} \right)^{2n+1} \frac{n(n+1)}{n(\varepsilon+1)+1} \frac{\mathbf{r}_1}{r_1}.$$

2.845.
$$u(r, \theta) = 2q \ln \frac{r_0}{r} + q \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n+1}{n(2n+1)} \left[1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2n+1} \right] P_{2n}(\cos \theta).$$

$$2.846. \quad u(r, \theta) = 2\pi Q \cdot \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2n} P_{2n}(0)P_{2n}(\cos \theta), & r < r_0, \\ \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{2n+1} P_{2n}(0)P_{2n}(\cos \theta), & r_0 < r. \end{cases}$$

Решение. Потенциал $u(r, \theta)$ удовлетворяет условиям

$$\Delta u = -\frac{4\pi q}{r_0} \delta(r - r_0) \cdot \frac{\delta\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)}{\sin \theta}, \quad (2.124)$$

$$|u|_{r=0} < \infty, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} u = 0.$$

Как и в примере 2.26,

$$u(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(r) P_n(\cos \theta),$$

где $P_n(\cos \theta)$ — собственная функция однородной задачи (см. пример 2.25), а $u_n(r)$ — решение задачи

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} r^2 \frac{du_n}{dr} - \frac{n(n+1)}{r^2} u_n = -\frac{2\pi q(2n+1)P_n(0)}{r_0} \delta(r - r_0), \quad (2.125)$$

$$|u_n(0)| < \infty, \quad u_n(\infty) = 0. \quad (2.126)$$

Решение уравнения (2.125) при условиях (2.126) запишется в виде

$$u_n(r) = \begin{cases} A_n r^n, & r < r_0, \\ B_n r^{-(n+1)}, & r_0 < r. \end{cases}$$

Так как $[u_n]_{r_0} = 0$, $[u'_n]_{r_0} = -2\pi q(2n+1)P_n(0)$, (см. (10.15), т. 2), то коэффициенты $B_n = A_n r_0^{2n+1} = 2\pi q r_0^{n+1} P_n(0)$. Остается учесть, что $P_{2n+1}(0) = 0$.

$$2.847. \quad \mathbf{F} = \frac{M^2}{r_0^4} (\mu - 1) \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2n-3} \frac{n^2(n^2 - 1)}{n(\mu + 1) + \mu} \frac{\mathbf{r}_1}{r_1}.$$

$$2.848. \quad \mathbf{H} = \text{rot } \mathbf{A}, \quad A_r = A_\theta = 0,$$

$$A_\varphi(r, \theta) = \frac{\pi \mu I}{c} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{2n+2} \frac{4n+3}{(2n+1)(\mu+1)+\mu} \cdot \frac{P_{2n+1}^1(0)P_{2n+1}^1(\cos \theta)}{(n+1)(2n+1)}.$$

$$2.849. \quad \text{Поле } H \text{ уменьшается в } k = 1 + \frac{2(\mu-1)}{\mu+2} \left(\frac{r_0}{r_1}\right)^3 \text{ раз.}$$

$$2.851. \quad \omega_1 = \frac{1}{l} \sqrt{2gh_0}, \quad \omega_2 = \frac{1}{l} \sqrt{6gh}. \quad \text{У к а з а н и е. См. задачу 1.325.}$$

$$2.852. \quad \mathbf{V} = \nabla u, \quad u(r, \theta) = -\frac{V_0 r_0^3}{2r^2} \cos \theta, \quad \mathbf{V}|_S = -\frac{V_0 r_0^3}{2r^3} \mathbf{e}_g. \quad \text{У к а з а н и е. Методом продолжений получить внешнюю краевую задачу для шара.}$$

$$2.853. \quad u(x, t) = \frac{2u_0}{5} \left[P_1\left(\frac{x}{l}\right) \cos \omega_0 t - P_3\left(\frac{x}{l}\right) \cos \sqrt{6} \omega_0 t \right]. \quad \text{У к а з а н и е. Продолжить начальные данные на промежуток } (-l, l) \text{ нечетным образом.}$$

$$2.854. \quad u(x, t) = \frac{v_0}{2\omega_0} \left[-3P_1\left(\frac{x}{l}\right) \sin \omega_0 t + \frac{5}{\sqrt{6}} P_3\left(\frac{x}{l}\right) \sin \sqrt{6} \omega_0 t \right].$$

$$2.855. \quad u(x, t) = \frac{2h}{3} \left[1 - P_2\left(\frac{x}{l}\right) \cos \sqrt{3} \omega_0 t \right].$$

$$2.856. u(x, t) = \frac{F_0}{\rho} P_{2n+1}\left(\frac{x}{l}\right) \begin{cases} \frac{\omega_n \sin \omega t - \omega \sin \omega_n t}{\omega_n(\omega_n^2 - \omega^2)}, & \omega \neq \omega_n = \sqrt{(n+1)(2n+1)} \omega_0, \\ \frac{\sin \omega t - \omega t \cos \omega t}{2\omega^2}, & \omega = \omega_n. \end{cases}$$

$$2.857. u(x, t) = \frac{F_0}{\rho} P_{2n}\left(\frac{x}{l}\right) \begin{cases} \frac{\cos \omega t - \cos \omega_n t}{\omega_n^2 - \omega^2}, & \omega \neq \omega_n = \sqrt{n(2n+1)} \omega_0, \\ \frac{t \sin \omega t}{2\omega}, & \omega = \omega_n. \end{cases}$$

$$2.858. \text{ В ответе к задаче 2.856 } \omega_n = \sqrt{\frac{k}{\rho} + (n+1)(2n+1)} \omega_0^2.$$

$$2.859. \text{ В ответе к задаче 2.857 } \omega_n = \sqrt{\frac{k}{\rho} + n(2n+1)} \omega_0^2.$$

2.860. Если $(\omega - \omega_0)(\omega - \sqrt{6}\omega_0) \neq 0$, то

$$u(x, t) = \frac{F_0}{5\rho} \left[\frac{3x}{l} \frac{\cos \omega t - \cos \omega_0 t}{\omega_0^2 - \omega^2} + 2P_3\left(\frac{x}{l}\right) \frac{\cos \omega t - \cos \sqrt{6}\omega_0 t}{6\omega_0^2 - \omega^2} \right],$$

если $\omega = \omega_0$, то

$$u(x, t) = \frac{F_0}{5\rho} \left[\frac{3x}{2l} \frac{t \sin \omega_0 t}{\omega_0} + 2P_3\left(\frac{x}{l}\right) \frac{\cos \omega_0 t - \cos \sqrt{6}\omega_0 t}{5\omega_0^2} \right],$$

если $\omega = \sqrt{6}\omega_0$, то

$$u(x, t) = \frac{F_0}{5\rho} \left[\frac{3x}{l} \frac{\cos \omega_0 t - \cos \sqrt{6}\omega_0 t}{5\omega_0^2} + P_3\left(\frac{x}{l}\right) \frac{t \sin \sqrt{6}\omega_0 t}{\sqrt{6}\omega_0} \right].$$

2.861. Если $\omega \neq \sqrt{3}\omega_0$, то

$$u(x, t) = \frac{F_0}{3\rho} \left[\frac{\omega t - \sin \omega t}{\omega^2} + 2P_2\left(\frac{x}{l}\right) \frac{\sqrt{3}\omega_0 \sin \omega t - \omega \sin \sqrt{3}\omega_0 t}{\sqrt{3}\omega_0(3\omega_0^2 - \omega^2)} \right],$$

если $\omega = \sqrt{3}\omega_0$, то

$$u(x, t) = \frac{F_0}{3\rho} \left[\frac{\omega t - \sin \omega t}{\omega^2} + P_2\left(\frac{x}{l}\right) \frac{\sin \omega t - \omega t \cos \omega t}{\omega^2} \right].$$

$$2.862. u(r, \theta) = u_0 + \frac{u_1 - u_0}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n+3}{n+1} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2n+1} P_{2n}(0) P_{2n+1}(\cos \theta).$$

$$2.863. u(r, \theta) = C - \frac{I}{2\pi\sigma r} + \frac{I}{4\pi\sigma r_0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n+1}{n} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2n} P_{2n}(\cos \theta), \quad \mathbf{j} = -\sigma \nabla u.$$

$$2.864. u(r, \theta) = \frac{J}{2\pi\sigma r_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n+3}{2n+1} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2n+1} P_{2n+1}(\cos \theta), \quad \mathbf{j} = -\sigma \nabla u.$$

$$2.865. u(r, \theta) = u_0 - \frac{q_0 r_0}{k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n+3}{(2n+1)^2} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2n+1} P_{2n+2}(0) P_{2n+1}(\cos \theta).$$

$$2.866. u(r, \theta) = u_0 + p(u_0 - u_1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(4n+3) \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1+p)} P_{2n+2}(0) P_{2n+1}(\cos \theta),$$

где $p = hr_0$.

$$2.867. u(r, \theta) = u_0 - \frac{q_0 r}{k} \cos \theta - \frac{q_0 r_0}{2k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(4n+1) \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2n}}{(n+1)(2n-1)} P_{2n}(0) P_{2n}(\cos \theta).$$

$$\mathbf{2.868.} \quad u(r, \theta) = u_0 - \frac{q_0 r_0}{k} \left[\frac{r}{r_0} \cos \theta + \frac{p+1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2n} \frac{(4n+1)P_{2n}(0)P_{2n}(\cos \theta)}{(n+1)(2n-1)(n+p)} \right],$$

где $p = hr_0$.

$$\mathbf{2.869.} \quad u(r, \theta) = u_0 - \frac{Q_0 r^2}{2k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(4n+3) \left(1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2n-1} \right)}{(4n^2-1)(n+2)} P_{2n+2}(0) P_{2n+1}(\cos \theta).$$

$$\mathbf{2.870.} \quad u(r, \theta) = \frac{q}{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(4n+3) \left(1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2n+1} \right)}{(n+1)(2n+1)} P_{2n+1}(\cos \theta).$$

$$\mathbf{2.871.} \quad 1) \quad u(r, \theta) = u_0 + \frac{Q_0}{4\pi k} \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(4n+3) \left(1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2n-1} \right)}{(2n+1)(n+1)} P_{2n+1}(\cos \theta);$$

$$2) \quad u(r, \theta) = u_0 + \frac{Q_0}{2\pi k} \cdot \frac{r}{r_0} \left[\ln \frac{r}{r_0} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4n+3) \left(1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2n} \right)}{n(2n+3)} P_{2n+1}(\cos \theta) \right].$$

$$\mathbf{2.872.} \quad u(r, \theta) = u_0 \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2} \right) + \frac{3u_0 r^2}{2r_0^2} \cos^2 \theta + \sum_{k=0}^{\infty} A_k \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2k+1} P_{2k}(\cos \theta), \quad \text{где:}$$

$$1) \quad A_k = u_0 \frac{(4k+3)P_{2k}(0)}{(2k-1)(k+2)}; \quad 2) \quad A_k = \frac{u_0}{2} \frac{(4k+3)[2(k+1)(2k+1)+3p]P_{2k}(0)}{(2k-1)(k+1)(k+2)(2k+1+p)}.$$

У к а з а н и е. Четное продолжение $U(r, \theta)$ решения представляет собой ряд вида $U(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} U_n(r) P_n(\cos \theta)$, коэффициенты которого являются ограниченными решениями уравнения

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr^2} r^2 \frac{dU_n}{dr} - \frac{n(n+1)}{r^2} U_n = -\frac{q(2n+1)}{kr_0} P_n(0), \quad 0 < r < r_0,$$

при условии: 1) $U_n(r_0) = 0$; 2) $\left(\frac{dU_n}{dr} + hU \right) \Big|_{r=r_0} = 0$.

$$\mathbf{2.873.} \quad 1) \quad u(r, \theta) = \frac{q}{2k} \left[\frac{r_0}{3} \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2} \right) + \frac{r^2}{r_0} \ln \frac{r}{r_0} P_2(\cos \theta) + \right. \\ \left. + \frac{r^2}{r_0} \sum_{m=2}^{\infty} a_m \left(1 - \frac{r}{r_0} \right)^{2m-2} P_{2m}(\cos \theta) \right], \quad \text{где } a_m = \frac{(4m+1)P_{2m}(0)}{(m-1)(2m+3)};$$

$$2) \quad u(r, \theta) = \frac{qr_0}{2k} \left(1 + \frac{2}{p} - \frac{r^2}{r_0^2} \right) + \frac{qr^2}{2kr_0} \ln \left(\frac{r}{r_0} - \frac{1}{p+2} \right) P_2(\cos \theta) + \\ + \frac{qr^2}{2kr_0} \sum_{m=2}^{\infty} \left(1 - \frac{2+p}{2m+p} \frac{r}{r_0} \right)^{2m-2} \frac{(4m+1)P_{2m}(0)P_{2m}(\cos \theta)}{(m-1)(2m+3)}.$$

Здесь k — коэффициент теплопроводности, $p = hr_0$, $h = \frac{\alpha}{k}$, α — коэффициент теплообмена.

У к а з а н и е. Четное продолжение $U(r, \theta)$ решения $u(r, \theta)$ представляет собой ряд вида $U(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} U_n(r) P_n(\cos \theta)$, коэффициенты которого являются ограниченными решениями уравнения

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr^2} r^2 \frac{dU_n}{dr} - \frac{n(n+1)}{r^2} U_n = -\frac{q(2n+1)}{kr_0} P_n(0), \quad 0 < r < r_0,$$

при условии: 1) $U_n(r_0) = 0$; 2) $\left(\frac{dU_n}{dr} + hU \right) \Big|_{r=r_0} = 0$.

$$2.874. 1) u(r, \theta) = C - \frac{qr^2}{6kr_0} + \frac{qr^2}{2kr_0} \left(\ln \frac{r}{r_0} - \frac{1}{2} \right) P_2(\cos \theta) + v(r, \theta);$$

$$2) u(r, \theta) = C - \frac{qr^2}{6kr_0} + \frac{qr^2}{2kr_0} \left(\ln \frac{r}{r_0} - \frac{7}{6} \right) P_2(\cos \theta) + v(r, \theta),$$

$$\text{где } v(r, \theta) = \frac{qr^2}{2kr_0} \sum_{m=2}^{\infty} \left(1 - \frac{r}{r_0} \right)^{2m-2} \frac{(4m+1)P_{2m}(0)P_{2m}(\cos \theta)}{(m-1)(2m+3)}.$$

У к а з а н и е. Фурье-компонента $U_n(r)$ четного продолжения решения удовлетворяет уравнению, приведенному в указании к решению предыдущей задачи при условиях ограниченности и: 1) $U'_n(r_0) = -\frac{q}{3k}\delta_{n0}$; 2) $U'_n(r_0) = -\frac{q}{3k}(\delta_{n0} + 2\delta_{n2})$.

$$2.875. 1) u(r, \theta) = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{C_k(2\nu_k+1)P_{\nu_k}(\cos \theta)}{P'_{\nu_k}(\cos \alpha) \frac{\partial P_{\nu}(\cos \theta)}{\partial \nu} \Big|_{\nu=\nu_k}} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\nu_k};$$

$$2) u(r, \theta) = -\frac{1}{\sin^2 \alpha} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{C_k(2\nu_k+1)P_{\nu_k}(\cos \theta)}{P_{\nu_k}(\cos \alpha) \frac{\partial P'_{\nu}(\cos \theta)}{\partial \nu} \Big|_{\nu=\nu_k}} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\nu_k},$$

$C_k = \int_0^{\alpha} f(\theta) P_{\nu_k}(\cos \theta) \sin \theta d\theta$, $\nu_k > 0$ — корень уравнения: 1) $P'_{\nu}(\cos \alpha) = 0$, 2) $P_{\nu}(\cos \alpha) = 0$, где $P_{\nu}(x)$ — функция Лежандра первого рода, $P'_{\nu}(x)$ есть производная по x .

$$2.876. 1) u(r, \theta) = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{C_k(2\nu_k+1)P_{\nu_k}(\cos \theta)}{P'_{\nu_k}(\cos \alpha) \frac{\partial P_{\nu}(\cos \theta)}{\partial \nu} \Big|_{\nu=\nu_k}} \left(\frac{r_0}{r} \right)^{\nu_k+1};$$

$$2) u(r, \theta) = -\frac{1}{\sin^2 \alpha} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2\nu_k+1)P_{\nu_k}(\cos \theta)}{P_{\nu_k}(\cos \alpha) \frac{\partial P'_{\nu}(\cos \theta)}{\partial \nu} \Big|_{\nu=\nu_k}} \left(\frac{r_0}{r} \right)^{\nu_k+1},$$

$\nu_k > 0$ — корень уравнения: 1) $P'_{\nu}(\cos \alpha) = 0$, 2) $P_{\nu}(\cos \alpha) = 0$; остальные обозначения даны в ответе к предыдущей задаче.

$$2.877. u(r) = \frac{D}{2r^3} P_2(\cos \theta).$$

$$2.878. \mathbf{H} = -\frac{4\pi\mathbf{M}}{3}, \quad \mathbf{B} = \frac{8\pi\mathbf{M}}{3}.$$

$$2.879. u(r, \theta) = \begin{cases} \frac{8\pi\omega M}{9c}(r^2 - r_0^2) - \frac{4\pi\omega M}{9c}r^2(3\cos^2 \theta - 1), & r < r_0, \\ -\frac{4\pi\omega r_0^5 M}{9cr^3}(3\cos^2 \theta - 1), & r_0 < r; \end{cases}$$

$D_{xx} = D_{yy} = -\frac{1}{2}D_{zz}$, $D_{xy} = D_{yz} = D_{zx} = 0$, $D_{zz} = -\frac{4(2\varepsilon+1)}{3c(2\varepsilon+3)}\omega r_0^2 \mathcal{M}$, где $\mathcal{M}$ есть полный магнитный момент шара.

$$2.880. \sigma(\theta) = \frac{\omega r_0 V}{3c}(3 - 5\cos^2 \theta).$$

$$2.881. 1) u(r, \theta, \varphi) = \frac{u_0}{5} \left[\frac{8}{3} \left(\frac{r}{r_0} \right)^3 Y_3^1(\theta, \varphi) - 3 \frac{r}{r_0} Y_1^1(\theta, \varphi) \right];$$

$$2) u(r, \theta, \varphi) = \frac{4u_0}{7} \left[\frac{2}{3} \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 Y_2^{-1}(\theta, \varphi) - \frac{1}{5} \left(\frac{r}{r_0} \right)^4 Y_4^{-1}(\theta, \varphi) \right];$$

- 3) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{2v_0 r_0}{5} \left[2 \frac{r}{r_0} Y_1^{-1}(\theta, \varphi) - \frac{1}{9} \left(\frac{r}{r_0} \right)^3 Y_3^{-1}(\theta, \varphi) \right] + C;$
- 4) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{v_0 r_0}{14} \left[\left(\frac{r}{r_0} \right)^2 Y_2^1(\theta, \varphi) + \frac{1}{5} \left(\frac{r}{r_0} \right)^4 Y_4^1(\theta, \varphi) \right] + C;$
- 5) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{2v_0 r_0}{21} \left[\left(\frac{r}{r_0} \right)^2 Y_2^2(\theta, \varphi) + \frac{1}{5} \left(\frac{r}{r_0} \right)^4 Y_4^2(\theta, \varphi) \right] + C;$
- 6) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{u_0 h r_0}{2 + h r_0} \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \sin^2 \theta \sin 2\varphi;$
- 7) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{4u_0}{7} \left[\frac{5}{3} \frac{h r_0}{2 + h r_0} \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 Y_2^1(\theta, \varphi) + \frac{1}{5} \frac{h r_0}{4 + h r_0} \left(\frac{r}{r_0} \right)^4 Y_4^1(\theta, \varphi) \right];$
- 8) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{A}{8} r_0^3 \left(\frac{r^4}{r_0^4} - \frac{r^3}{r_0^3} \right) \sin^3 \theta \cos 3\varphi +$
 $+ v_0 r_0 \left(\frac{r}{r_0} Y_1^1(\theta, \varphi) - \frac{r^2}{6 r_0^2} Y_2^2(\theta, \varphi) \right) + C;$
- 9) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{A}{4} r (r - r_0) \sin \theta \sin \varphi + u_0 \left(\frac{r}{r_0} \right)^4 \sin^4 \theta \sin 4\varphi;$
- 10) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{A}{10} r (r^2 - r_0^2) \cos \theta + u_0 \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \sin 2\theta \sin \varphi;$
- 11) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{A r_0^5}{28} \left[\left(\frac{r}{r_0} \right)^5 - \frac{r}{r_0} \right] \sin \theta \cos \varphi +$
 $+ u_0 \left[\frac{r}{r_0} Y_1^1(\theta, \varphi) + \frac{1}{6} \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 Y_2^2(\theta, \varphi) \right];$
- 12) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{A}{7} r^3 \ln \frac{r}{r_0} \sin^3 \theta \cos 3\varphi + u_0 \left(\frac{r}{r_0} \right)^4 \cos \theta \sin^3 \theta \sin 3\varphi;$
- 13) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{A}{5} r^2 \ln \frac{r}{r_0} \sin 2\theta \cos \varphi + u_0 \left(\frac{r}{r_0} \right)^4 \sin^4 \theta \cos 4\varphi;$
- 14) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{A}{7} r^2 \left(\frac{r^2}{2} - r_0^2 \right) \sin^2 \theta \cos 2\varphi + \frac{v_0 r_0}{2} \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \sin 2\theta \sin \varphi + C;$
- 15) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{A}{18} r (r^3 - r_0^3) \sin \theta \cos \varphi + \frac{v_0 r_0}{3} \left(\frac{r}{r_0} \right)^3 \sin^3 \theta \cos 3\varphi + C;$
- 16) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{2A}{15} r^2 \left(\ln \frac{r}{r_0} - \frac{1}{2 + h r_0} \right) P_2(\cos \theta) +$
 $+ \frac{A}{18} (r^2 - r_0^2) - \frac{A r_0}{9h} + \frac{u_0 h r^3}{(3 + h r_0) r_0^2} \sin^3 \theta \cos 3\varphi;$
- 17) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{A}{21} r^2 \left(r^2 - \frac{4 + h r_0}{2 + h r_0} r_0^2 \right) P_2(\cos \theta) +$
 $+ \frac{A}{60} (r^4 - r_0^4) - \frac{A r_0^3}{15h} + \frac{u_0 h r}{1 + h r_0} \sin \theta \sin \varphi.$

2.882. 1) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{u_0}{5} \left[\left(\frac{r_0}{r} \right)^2 Y_1^1(\theta, \varphi) + \frac{2}{3} \left(\frac{r_0}{r} \right)^4 Y_3^1(\theta, \varphi) \right];$

2) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{4u_0}{7} \left[\frac{4}{5} \left(\frac{r_0}{r} \right)^5 Y_4^1(\theta, \varphi) - \frac{1}{3} \left(\frac{r_0}{r} \right)^3 Y_2^1(\theta, \varphi) \right];$

- 3) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{2u_0}{7} \left[\left(\frac{r_0}{r} \right)^3 Y_2^2(\theta, \varphi) - \frac{1}{15} \left(\frac{r_0}{r} \right)^5 Y_4^2(\theta, \varphi) \right];$
- 4) $u(r, \theta, \varphi) = -\frac{v_0 r_0}{7} \left[\left(\frac{r_0}{r} \right)^3 Y_2^1(\theta, \varphi) - \frac{8}{25} \left(\frac{r_0}{r} \right)^5 Y_4^1(\theta, \varphi) \right];$
- 5) $u(r, \theta, \varphi) = -\frac{v_0 r_0}{21} \left[\frac{5}{3} \left(\frac{r_0}{r} \right)^3 Y_2^{-2}(\theta, \varphi) - \frac{4}{25} \left(\frac{r_0}{r} \right)^5 Y_4^2(\theta, \varphi) \right];$
- 6) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{u_0 h r_0}{3 + h r_0} \left(\frac{r_0}{r} \right)^3 \sin 2\theta \sin \varphi;$
- 7) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{4u_0 r_0}{7} \left[\frac{2}{3} \frac{r_0 h}{3 + r_0 h} \left(\frac{r_0}{r} \right)^3 Y_2^1(\theta, \varphi) - \frac{1}{5} \frac{r_0 h}{5 + r_0 h} \left(\frac{r_0}{r} \right)^5 Y_4^1(\theta, \varphi) \right];$
- 8) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{A}{2r} \left(\frac{r_0}{r} - 1 \right) \sin \theta \sin \varphi;$
- 9) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{A}{6r} \left[\left(\frac{r_0}{r} \right)^2 - 1 \right] \sin^2 \theta \cos 2\varphi + u_0 \left(\frac{r_0}{r} \right)^3 \sin 2\theta \sin \theta \sin 2\varphi;$
- 10) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{A}{4r^2} \left(\frac{r_0}{r} - 1 \right) \sin^2 \theta \cos 2\varphi +$
 $+ \frac{u_0}{3} \left[2 \left(\frac{r_0}{r} \right)^3 Y_2^1(\theta, \varphi) + \frac{1}{5} \left(\frac{r_0}{r} \right)^4 Y_3^2(\theta, \varphi) \right];$
- 11) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{A}{r} \ln \frac{r_0}{r} + u_0 \left(\frac{r_0}{r} \right)^3 \sin 2\theta \sin \varphi;$
- 12) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{A}{3r^2} \ln \frac{r_0}{r} \sin \theta \cos \varphi + u_0 \left(\frac{r_0}{r} \right)^3 \sin^2 \theta \sin 2\varphi;$
- 13) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{A}{3r^2} \ln \frac{r_0}{r} \cos \theta + u_0 \left(\frac{r_0}{r} \right)^4 \sin^3 \theta \cos 3\varphi;$
- 14) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{A}{2r} \left(\frac{r_0}{2r} - 1 \right) \cos \theta + \frac{v_0 r_0}{5} \left(\frac{r_0}{r} \right)^5 \sin^4 \theta \cos 4\varphi;$
- 15) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{A}{12r} \left[\frac{1}{4} \left(\frac{r_0}{r} \right)^3 - 1 \right] \sin^2 \theta \cos \theta \sin 2\varphi +$
 $+ \frac{v_0 r_0}{5} \left(\frac{r_0}{r} \right)^5 \sin^3 \theta \cos \theta \cos^3 \varphi;$
- 16) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{A}{3r^2} \left(\ln \frac{r_0}{r} - \frac{1}{2} \right) \sin \theta \sin \varphi +$
 $+ \frac{v_0 r_0}{3} \left(\frac{r_0}{r} \right)^3 \sin \theta \sin \varphi (\cos \theta - \sin \theta \cos \varphi).$

- 2.883.** 1) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{u_1 r_1}{r_2 - r_1} \left(\frac{r_2}{r} - 1 \right) + \frac{u_2 r_1^2 r_2^3}{r_2^5 - r_1^5} \left[\left(\frac{r}{r_1} \right)^2 - \left(\frac{r_1}{r} \right)^3 \right] \sin^2 \theta \cos 2\varphi;$
- 2) $u(r, \theta, \varphi) = \frac{r_1 r_2}{r_2^3 - r_1^3} \left[\left(\left(\frac{r_2}{r} \right)^2 - \frac{r}{r_2} \right) u_1 r_1 \cos \theta + \right.$
 $\left. + \left(\frac{r}{r_1} - \left(\frac{r_1}{r} \right)^2 \right) u_2 r_2 \sin \theta \sin \varphi \right];$
- 3) $u(r, \theta, \varphi) = u_1 \left[\frac{r_1^2 r_2}{r_2^3 - r_1^3} \left(\frac{r}{r_2} - \left(\frac{r_2}{r} \right)^2 \right) + \right.$
 $\left. + \frac{r_1^3 r_2^2}{r_2^5 - r_1^5} \left(\left(\frac{r_2}{r} \right)^3 - \left(\frac{r}{r_2} \right)^2 \right) \cos \theta \right] \sin \theta \sin \varphi;$

$$\begin{aligned}
4) \quad u(r, \theta, \varphi) &= -\frac{u_1}{3} + \frac{4u_1 r_1^3 r_2^2}{2r_2^5 + 3r_1^5} \left[\left(\frac{r}{r_2} \right)^2 + \frac{2}{3} \left(\frac{r_2}{r} \right)^3 \right] P_2(\cos \theta) + \\
&\quad + \frac{v_2 r_1 r_2^3}{2r_1^3 + r_2^3} \left[\frac{r}{r_1} - \left(\frac{r_1}{r} \right)^2 \right] \sin \theta \sin \varphi; \\
5) \quad u(r, \theta, \varphi) &= -\frac{2v_1 r_1^2}{3r_2} \left(1 - \frac{r_2}{r} \right) - \frac{2v_1 r_1^4 r_2^2}{3(2r_1^5 + 3r_2^5)} \left[\left(\frac{r_2}{r} \right)^3 - \left(\frac{r}{r_2} \right)^2 \right] P_2(\cos \theta) + \\
&\quad + \frac{3u_2 r_1^2 r_2^3}{2r_1^5 + 3r_2^5} \left[\left(\frac{r}{r_1} \right)^2 + \frac{2}{3} \left(\frac{r_1}{r} \right)^3 \right] \sin 2\theta \sin \varphi; \\
6) \quad u(r, \theta, \varphi) &= \frac{v_1 r_1^3 r_2}{r_2^3 - r_1^3} \left[\frac{r}{r_2} + \frac{1}{2} \left(\frac{r_2}{r} \right)^2 \right] \cos \theta + \\
&\quad + \frac{v_2 r_1 r_2^3}{r_2^3 - r_1^3} \left[\frac{r}{r_1} + \frac{1}{2} \left(\frac{r_1}{r} \right)^2 \right] \sin \theta \sin \varphi + C; \\
7) \quad u(r, \theta, \varphi) &= \frac{A}{4} \left[r^2 - \frac{(r_1^2 + r_2^2)(r_1 + r_2)r^3 - r_1^3 r_2^3}{(r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2)r^2} \right] \sin \theta \sin \varphi + \\
&\quad + \frac{u_1 r_1}{r_2 - r_1} \left(\frac{r_2}{r} - 1 \right) + \frac{u_2 r_1^2 r_2^3}{r_2^5 - r_1^5} \left[\left(\frac{r}{r_1} \right)^2 - \left(\frac{r_1}{r} \right)^3 \right] \sin 2\theta \sin \varphi; \\
8) \quad u(r, \theta, \varphi) &= \frac{A}{21} \left[r^4 - \frac{(4r_1^7 + 3r_2^7)r^5 + 2r_1^5 r_2^5 (r_2^2 - 2r_1^2)}{(2r_1^5 + 3r_2^5)r^3} \right] P_2(\cos \theta) + \\
&\quad + \frac{A}{60} \left(r^4 + \frac{4r_1^5}{r} - \frac{4r_1^5 + r_2^5}{r_2} \right) + \frac{u_2 r_1^2 r_2^3}{2r_1^5 + 3r_2^5} \left(\frac{3r^2}{r_1^2} + 2 \frac{2r_1^3}{r^3} \right) \sin 2\theta \cos \varphi; \\
9) \quad u(r, \theta, \varphi) &= A \left(\frac{1}{r} \ln \frac{r_2}{r} - \frac{1}{r_1} \ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r} \right) + \\
&\quad + \frac{u_1 r_1^3 r_2^2}{3r_1^5 + 2r_2^5} \left(3 \frac{r^2}{r_2^2} + \frac{r_2^3}{r^3} \right) \sin 2\theta \sin \varphi + \frac{v_2 r_1 r_2^3}{2r_1^3 + r_2^3} \left(\frac{r}{r_1} - \frac{r_1^2}{r^2} \right) \cos \theta; \\
10) \quad u(r, \theta, \varphi) &= C + \frac{A}{5} \left[\left(\frac{r_1^5 \ln r_1 - r_2^5 \ln r_2}{r_2^5 - r_1^5} - \frac{1}{2} \right) r^2 + \frac{2r_1^5 r_2^5}{3r^3} \cdot \frac{\ln \frac{r_1}{r_2}}{r_2^5 - r_1^5} + r^2 \ln r \right] + \\
&\quad + \frac{v_1 r_1^3 r_2}{r_2^3 - r_1^3} \left(\frac{r_2^2}{2r^2} + \frac{r}{r_2} \right) \sin \theta \sin \varphi + \frac{v_2 r_1^2 r_2^4}{2(r_2^5 - r_1^5)} \left(\frac{r^2}{r_1^2} + \frac{2r_1^3}{3r^3} \right) \sin^2 \theta \cos 2\varphi.
\end{aligned}$$

2.884. $E_l = \frac{\hbar^2}{2I} l(l+1)$, $\psi_{lm}(r, \theta, \varphi) = (-1)^m \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \cdot \frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}} P_l^{|m|}(\cos \theta) e^{im\varphi}$, $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$, $l \in \mathbb{N}$, энергетический уровень E_l имеет кратность вырождения $2l+1$. У к а з а н и е. См. задачу 1.180.

2.885. $\Psi(\theta, \varphi, t) = \frac{\sqrt{14}}{8} \psi_{22}(\theta, \varphi) e^{-\frac{iE_2}{\hbar} t} + \frac{5\sqrt{2}}{8} \psi_{32}(\theta, \varphi) e^{-\frac{iE_3}{\hbar} t}$, $\psi_{lm}(\theta, \varphi)$ и E_l даны в ответе к задаче 2.884.

2.886. Внутри сферы $\mathbf{H} = \frac{2\omega Q}{3cr_0} \mathbf{e}_z$ (однородное поле), а вне сферы поле $\mathbf{H} = \frac{M}{r^3} (2 \cos \theta \cdot \mathbf{e}_r + \sin \theta \cdot \mathbf{e}_\theta)$ (оно эквивалентно полю диполя с магнитным моментом $\mathbf{M} = \frac{Q\omega r_0^2}{3c} \mathbf{e}_z$).

$$2.887. \mathbf{A}(\mathbf{r}) = A(r, \theta) \mathbf{e}_\varphi, \quad A(r, \theta) = \frac{2\pi\rho\omega \sin \theta}{c} \begin{cases} \frac{r_0^2 r}{3} - \frac{r^3}{15}, & 0 \leq r \leq r_0, \\ \frac{2r_0^5}{15r^2}, & r_0 < r. \end{cases}$$

У к а з а н и е. См. задачу 1.428.

$$2.888. 1) u(r, \theta, \varphi) = 4u_0 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k} \frac{P_{2k}^2(\cos \theta)}{\|P_{2k}^2\|^2} \cos 2\varphi;$$

$$2) u(r, \theta, \varphi) = 2Ar_0 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k} \frac{P_{2k}^2(\cos \theta)}{k\|P_{2k}^2\|^2} \cos 2\varphi;$$

$$3) u(r, \theta, \varphi) = 4pu_0 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k} \frac{P_{2k}^2(\cos \theta)}{(2k+p)\|P_{2k}^2\|^2} \cos 2\varphi.$$

$$2.889. 1) u(r, \theta, \varphi) = 16u_0 \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} \frac{(k-1)(2k+3)P_{2k}^4(\cos \theta)}{\|P_{2k}^4\|^2} \sin 4\varphi;$$

$$2) u(r, \theta, \varphi) = 16Ar_0 \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} \frac{(k-1)(2k+3)P_{2k}^4(\cos \theta)}{(2k+1)\|P_{2k}^4\|^2} \sin 4\varphi;$$

$$3) u(r, \theta, \varphi) = 16pu_0 \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} \frac{(k-1)(2k+3)P_{2k}^4(\cos \theta)}{(2k+p+1)\|P_{2k}^4\|^2} \sin 4\varphi;$$

$$2.890. 1) u(r, \theta, \varphi) = 4u_0 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k} \frac{P_{2k}^2(\cos \theta)}{\|P_{2k}^2\|^2} \sin 2\varphi - u_0 \left(\frac{r}{r_0}\right)^2 \sin^2 \theta \sin 2\varphi;$$

$$2) u(r, \theta, \varphi) = 16u_0 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} \frac{P_{2k+1}^3(\cos \theta)}{\|P_{2k+1}^3\|^2} \cos 3\varphi - u_0 \left(\frac{r}{r_0}\right)^3 \sin^3 \theta \cos 3\varphi;$$

$$3) u(r, \theta, \varphi) = 192Ar_0 \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k} \frac{P_{2k}^4(\cos \theta)}{\|P_{2k}^4\|^2} \cos 4\varphi - Ar_0 \left(\frac{r}{r_0}\right)^4 \sin^4 \theta \cos 4\varphi + C;$$

$$4) u(r, \theta, \varphi) = 768pu_0 \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} \frac{P_{2k+1}^5(\cos \theta)}{(2k+1+p)\|P_{2k+1}^5\|^2} \cos 5\varphi - \\ - \frac{pu_0}{p+5} \left(\frac{r}{r_0}\right)^5 \sin^5 \theta \cos 5\varphi;$$

$$5) u(r, \theta, \varphi) = 7680pu_0 \sum_{k=3}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k} \frac{P_{2k}^6(\cos \theta)}{\|P_{2k}^6\|^2} \cos 6\varphi - \frac{pu_0}{p+6} \left(\frac{r}{r_0}\right)^6 \sin^6 \theta \cos 6\varphi.$$

$$2.891. 1) u(r, \theta, \varphi) = u_0 \sum_{k=2}^{\infty} a_k \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} P_{2k+1}^5(\cos \theta) \sin 5\varphi;$$

$$2) u(r, \theta, \varphi) = Ar_0 \sum_{k=2}^{\infty} \frac{a_k}{2k+1} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} P_{2k+1}^5(\cos \theta) \cos 5\varphi;$$

$$3) u(r, \theta, \varphi) = pu_0 \sum_{k=2}^{\infty} \frac{a_k}{2k+1+p} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} P_{2k+1}^5(\cos \theta) \sin 5\varphi;$$

$$\text{где } a_k = \frac{96(k-1)(2k+5)}{\|P_{2k}^5\|^2}, \quad p = hr.$$

$$2.892. 1) u(r, \theta, \varphi) = u_0 \sum_{k=3}^{\infty} a_k \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} P_{2k}^5(\cos \theta) \cos 5\varphi;$$

$$2) u(r, \theta, \varphi) = Ar_0 \sum_{k=3}^{\infty} \frac{a_k}{2k+1} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} P_{2k}^5(\cos \theta) \sin 5\varphi;$$

$$3) u(r, \theta, \varphi) = pu_0 \sum_{k=3}^{\infty} \frac{a_k}{2k+1+p} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} P_{2k}^5(\cos \theta) \cos 5\varphi;$$

$$\text{где } a_k = \frac{192(k-2)(2k+5)}{\|P_{2k}^5\|^2}, \quad p = hr.$$

$$\begin{aligned} \mathbf{2.893.} \quad 1) u(r, \theta, \varphi) = 32u_1 \sum_{k=2}^{\infty} \frac{r_1^{2k+1} r_2^{2k} \left[\left(\frac{r}{r_2}\right)^{2k} - \left(\frac{r_2}{r}\right)^{2k+1} \right]}{(r_1^{4k+1} - r_2^{4k+1}) \|P_{2k}^3\|^2} P_{2k}^3(\cos \theta) \sin 3\varphi - \\ - \frac{u_2 r_1^2 r_2^3}{r_1^5 - r_2^5} \left(\frac{r^2}{r_1^2} - \frac{r^3}{r_1^3}\right) \sin^2 \theta \sin 2\varphi; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) u(r, \theta, \varphi) = 16A \sum_{k=1}^{\infty} \frac{r_1^{2k+3} r_2^{2k+1} \left[\left(\frac{r}{r_2}\right)^{2k+1} - \left(\frac{r_2}{r}\right)^{2k+2} \right]}{[(2k+1)r_1^{4k+3} + 2(k+1)r_2^{4k+3}] \|P_{2k+1}^3\|^2} P_{2k+1}^3(\cos \theta) \sin 3\varphi + \\ + \frac{u_0 r_1 r_2^2}{r_1^3 + 2r_2^3} \left(\frac{2r}{r_1} + \frac{r_1^2}{r^2}\right) \sin \theta \sin \varphi; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) u(r, \theta, \varphi) = A_2 \sum_{k=2}^{\infty} \frac{r_1^{2k+1} r_2^{2k+2} \left[\frac{1}{2k+1} \left(\frac{r}{r_1}\right)^{2k+1} + \frac{1}{2k+2} \left(\frac{r_1}{r}\right)^{2k+2} \right]}{(r_2^{4k+2} - 2r_1^{4k+2}) \|P_{2k}^2\|^2} \times \\ \times P_{2k}^2(\cos \theta) \sin 2\varphi + \frac{4A_1 r_1^6 r_2^4}{r_1^9 - 2r_2^9} \left[\frac{1}{4} \frac{r^4}{r_1^4} + \frac{1}{5} \frac{r_2^5}{r^5} \right] \sin^4 \theta \cos 4\varphi. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{2.894.} \quad 1) u(r, \theta, \varphi) = 4u_1 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{r_1^{2k+1} r_2^{2k} P_{2k}^2(\cos \theta)}{(r_1^{4k+1} - r_2^{4k+1}) \|P_{2k}^2\|^2} \left[\left(\frac{r_2}{r}\right)^{2k+1} - \left(\frac{r}{r_2}\right)^{2k} \right] \cos 2\varphi + \\ + 16u_2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{r_1^{2k+1} r_2^{2k+2} P_{2k+1}^3(\cos \theta)}{(r_1^{4k+2} - r_2^{4k+2}) \|P_{2k}^4\|^2} \left[\left(\frac{r_1}{r}\right)^{2k+2} - \left(\frac{r}{r_1}\right)^{2k+1} \right] \sin 3\varphi; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) u(r, \theta, \varphi) = 16u_0 \times \\ \times \sum_{k=2}^{\infty} \frac{r_1^{2k+1} r_2^{2k+2} (2k^2 + 2 - 9) [(2k+1) \left(\frac{r}{r_2}\right)^{2k} + 2k \left(\frac{r_2}{r}\right)^{2k+1}] P_{2k}^4(\cos \theta)}{(2(k+1)r_1^{4k+1} + 2kr_2^{4k+1}) \|P_{2k}^4\|^2} \cos 4\varphi + \\ + 96Ar_2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{r_1^{2k+1} r_2^{2k+2} (k-1)(2k+5) P_{2k+1}^5(\cos \theta)}{[2(k+1)r_1^{4k+3} + (2k+1)r_2^{4k+3}] \|P_{2k}^5\|^2} \left[\left(\frac{r}{r_1}\right)^{2k+1} - \left(\frac{r_1}{r}\right)^{2k+2} \right] \sin 5\varphi. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) u(r, \theta, \varphi) = 7680u_1 r_1 \times \\ \times \sum_{k=3}^{\infty} \frac{(r_1 r_2)^{2k} \left[(2k+1-p) \left(\frac{r}{r_2}\right)^{2k} + (2k+p) \left(\frac{r_2}{r}\right)^{2k+1} \right] P_{2k+1}^6(\cos \theta)}{[(2k+1-p)r_1^{4k+1} + (2k+p)r_2^{4k+1}] \|P_{2k}^6\|^2} \cos 6\varphi + \\ + 768pu_2 \sum_{k=2}^{\infty} \frac{r_1^{2k} r_2^{2k+2} \left[\left(\frac{r}{r_1}\right)^{2k} - \left(\frac{r_1}{r}\right)^{2k+1} \right] P_{2k}^5(\cos \theta)}{[(2k+1-p)r_1^{4k+1} + (2k+p)r_2^{4k+1}] \|P_{2k}^5\|^2} \cos 5\varphi; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4) u(r, \theta, \varphi) = 16pu_0 \times \\ \times \sum_{k=2}^{\infty} \frac{r_1^{2k+1} r_2^{2k} \left[(2k+1) \left(\frac{r}{r_2}\right)^{2k} + 2k \left(\frac{r_2}{r}\right)^{2k+1} \right] P_{2k}^3(\cos \theta)}{[(2k+1)(2k-p)r_1^{4k+1} - 2k(2k+1-p)r_2^{4k+1}] \|P_{2k}^3\|^2} \cos 3\varphi + 15160A \times \end{aligned}$$

$$\times \sum_{k=3}^{\infty} \frac{r_1^{2k+1} r_2^{2k+3} \left[(2k+2+p) \left(\frac{r}{r_1} \right)^{2k+1} - (2k+1-p) \left(\frac{r_1}{r} \right)^{2k+1} \right] P_{2k+1}^6(\cos \theta)}{\left[(2k+1)(2k+2+p) r_2^{4k+3} + (2k+2)(2k+1-p) r_1^{4k+3} \right] \|P_{2k+1}^6\|^2} \sin 6\varphi;$$

$$\begin{aligned} 5 \ u(r, \theta, \varphi) = & C - \frac{A}{2r} - \frac{Ar_1^2 r_2^2}{(r_2^5 - r_1^5)} \left(\frac{r^2}{2r_1^2} + \frac{r_1^3}{3r^3} \right) P_2(\cos \theta) - \\ & - 2A \sum_{k=1}^{\infty} \frac{r_1^{2k} r_2^{2k} P_{2k}^2(\cos \theta)}{(r_1^{4k+1} - r_2^{4k+1}) \|P_{2k}^2\|^2} \left[\frac{1}{2k} \left(\frac{r}{r_2} \right)^{2k} + \frac{1}{2k+1} \left(\frac{r_2}{r} \right)^{2k+1} \right] \cos 2\varphi + \\ & + 72A \sum_{k=1}^{\infty} \frac{r_1^{2k} r_2^{2k} P_{2k}^4(\cos \theta)}{(r_1^{4k+1} - r_2^{4k+1}) \|P_{2k}^4\|^2} \left[\frac{1}{2k} \left(\frac{r}{r_1} \right)^{2k+2} + \frac{1}{2k+1} \left(\frac{r_1}{r} \right)^{2k+1} \right] \cos 4\varphi; \end{aligned}$$

2.895. Если $m = 1$, то:

$$\begin{aligned} 1) \ u &= \left[-\frac{qr}{2k} \ln \frac{r}{r_0} \sin \theta + \frac{qr}{4k} \sum_{n=1}^{\infty} A_n(\theta) \left(1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2n} \right) \right] \sin \varphi; \\ 2) \ u &= \left[\frac{qr}{2k} \left(\left(1 - \ln \frac{r}{r_0} \right) \sin \theta + \frac{qr}{4k} \sum_{n=1}^{\infty} A_n(\theta) \left(1 - \frac{1}{2n+1} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2n} \right) \right) \right] \sin \varphi; \\ 3) \ u &= \left[\frac{qr}{2k} \left(\frac{1}{1+p} - \ln \frac{r}{r_0} \right) \sin \theta + \frac{qr}{4k} \sum_{n=1}^{\infty} A_n(\theta) \left(1 - \frac{1}{2n+1} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2n} \right) \right] \sin \varphi, \end{aligned}$$

$$\text{где } A_n(\theta) = \frac{(4n+3)P_{2n}(0)P_{2n+1}^1(\cos \theta)}{n(n+1)(2n+3)}. \text{ Если } m \geq 2, \text{ то:}$$

$$\begin{aligned} 1) \ u &= \frac{2qr}{k} \sum_{n=1}^{\infty} B_n(\theta) \left(1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2n+m-1} \right) \sin m\varphi; \\ 2) \ u &= \frac{2qr}{k} \sum_{n=1}^{\infty} B_n(\theta) \left(1 - \frac{1}{2n+m} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2n+m-1} \right) \sin m\varphi; \\ 3) \ u &= \frac{2qr}{k} \sum_{n=1}^{\infty} B_n(\theta) \left(1 - \frac{p+1}{p+2n+m} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2n+m-1} \right) \sin m\varphi, \end{aligned}$$

$$\text{где } B_n(\theta) = \frac{P_{m+2n}^m(0)P_{m+2n}^m(\cos \theta)}{(m+2n-1)(m+2n+2)\|P_{m+2n}^m\|^2}.$$

$$\mathbf{2.896.} \ 1) \ u(r, \theta, \varphi) = 32u_0 \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2k} \frac{P_{2k}^3(\cos \theta)}{\|P_{2k}^3\|^2} \sin 3\varphi;$$

$$2) \ u(r, \theta, \varphi) = 16Ar_0 \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2k} \frac{P_{2k}^3(\cos \theta)}{k\|P_{2k}^3\|^2} \sin 3\varphi;$$

$$3) \ u(r, \theta, \varphi) = 32pu_0 \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2k} \frac{P_{2k}^3(\cos \theta)}{(2k+p)\|P_{2k}^3\|^2} \sin 3\varphi.$$

$$\mathbf{2.897.} \ 1) \ u(r, \theta, \varphi) = u_0 \sum_{k=3}^{\infty} a_k \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2k} P_{2k}^6(\cos \theta) \cos 6\varphi;$$

$$2) \ u(r, \theta, \varphi) = \frac{Ar_0}{2} \sum_{k=3}^{\infty} \frac{a_k}{k} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2k} P_{2k}^6(\cos \theta) \cos 6\varphi;$$

$$3) \ u(r, \theta, \varphi) = pu_0 \sum_{k=3}^{\infty} \frac{a_k}{2k+p} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2k} P_{2k}^6(\cos \theta) \cos 6\varphi,$$

$$\text{где } a_k = \frac{48(k-1)(k-2)(2k+3)(2k+5)}{\|P_{2k}^6\|^2}, \ p = hr_0.$$

- 2.898.** 1) $u(r, \theta, \varphi) = 16u_0 \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} \frac{(k-1)(2k+5)P_{2k+1}^4(\cos \theta)}{\|P_{2k+1}^4\|^2} \cos 4\varphi;$
- 2) $u(r, \theta, \varphi) = 16u_0 \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} \frac{(2k^2+3k-11)P_{2k+1}^4(\cos \theta)}{\|P_{2k+1}^4\|^2} \cos 4\varphi;$
- 3) $u(r, \theta, \varphi) = 192u_0 \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} \frac{P_{2k+1}^4(\cos \theta)}{\|P_{2k+1}^4\|^2} \cos 4\varphi;$
- 4) $u(r, \theta, \varphi) = 192u_0 \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k} \frac{(k-2)(2k+5)P_{2k}^5(\cos \theta)}{\|P_{2k}^5\|^2} \cos 4\varphi;$
- 5) $u(r, \theta, \varphi) = 768Ar_0 \sum_{k=3}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k} \frac{P_{2k}^5(\cos \theta)}{k\|P_{2k}^5\|^2} \sin 5\varphi;$
- 6) $u(r, \theta, \varphi) = 48Ar_0 \sum_{k=3}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k} \frac{(2k^2+k-18)P_{2k}^5(\cos \theta)}{k\|P_{2k}^5\|^2} \sin 5\varphi;$
- 7) $u(r, \theta, \varphi) = 768Ar_0 \sum_{k=3}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} \frac{(k-2)(2k+7)P_{2k+1}^6(\cos \theta)}{(2k+1)\|P_{2k+1}^3\|^6} \sin 6\varphi;$
- 8) $u(r, \theta, \varphi) = 48Ar_0 \sum_{k=3}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} \frac{(k-2)(2k+7)(2r^2+3k-21)P_{2k+1}^6(\cos \theta)}{(2k+1)\|P_{2k+1}^6\|^2} \sin 6\varphi;$
- 9) $u(r, \theta, \varphi) = 7680Ar_0 \sum_{k=3}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} \frac{P_{2k+1}^6(\cos \theta)}{(2k+1)\|P_{2k+1}^3\|^6} \sin 6\varphi;$
- 10) $u(r, \theta, \varphi) = 4pu_0 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} \frac{P_{2k+1}^2(\cos \theta)}{(p+2k+1)\|P_{2k+1}^2\|^2} \cos 2\varphi, \quad p = hr_0;$
- 11) $u(r, \theta, \varphi) = 48pu_0 \sum_{k=3}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} \frac{(k-1)(k-2)(2k+5)(2k+7)P_{2k+1}^6(\cos \theta)}{(2k+1+p)\|P_{2k+1}^6\|^2} \cos 6\varphi,$
 где $p = hr_0;$
- 12) $u(r, \theta, \varphi) = 4pu_0 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k} \frac{P_{2k}^3(\cos \theta)}{(2k+p)\|P_{2k}^3\|^2} \sin 3\varphi, \quad p = hr_0;$
- 13) $u(r, \theta, \varphi) = 1536pu_0 \sum_{k=3}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} \frac{(2k^2+3k-24)P_{2k+1}^6(\cos \theta)}{(2k+1+p)\|P_{2k}^6\|^2} \cos 6\varphi, \quad p = hr_0.$
- 2.899.** 1) $u(r, \theta, \varphi) = 4u_0 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k} \frac{P_{2k}^2(\cos \theta)}{\|P_{2k}^2\|^2} \sin 2\varphi;$
- 2) $u(r, \theta, \varphi) = 16u_0 \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} \frac{P_{2k+1}^3(\cos \theta)}{\|P_{2k+1}^3\|^2} \sin 3\varphi;$
- 3) $u(r, \theta, \varphi) = 16u_0 \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k} \frac{(2k^2+k-9)P_{2k}^4(\cos \theta)}{\|P_{2k}^4\|^2} \cos 4\varphi;$
- 4) $u(r, \theta, \varphi) = 96u_0 \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k} \frac{P_{2k}^4(\cos \theta)}{\|P_{2k}^4\|^2} \sin 4\varphi;$
- 5) $u(r, \theta, \varphi) = 768Ar_0 \sum_{k=3}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} \frac{P_{2k+1}^5(\cos \theta)}{(2k+1)\|P_{2k+1}^5\|^2} \sin 5\varphi = C;$
- 6) $u(r, \theta, \varphi) = 96Ar_0 \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k+1} \frac{(2k^2+3k-13)P_{2k+1}^5(\cos \theta)}{(2k+1)\|P_{2k+1}^5\|^2} \sin 5\varphi;$

$$7) u(r, \theta, \varphi) = 384Ar_0 \sum_{k=3}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k} \frac{(k-2)(2k+5)P_{2k}^6(\cos\theta)}{k\|P_{2k}^3\|^6} \cos 6\varphi + C;$$

$$8) u(r, \theta, \varphi) = 3840Ar_0 \sum_{k=3}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k} \frac{P_{2k}^6(\cos\theta)}{k\|P_{2k}^6\|^2} \sin 6\varphi;$$

$$9) u(r, \theta, \varphi) = 3072pu_0 \sum_{k=3}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k} \frac{(2k^2+2-20)P_{2k}^6(\cos\theta)}{(2k+p)\|P_{2k}^6\|^6} \sin 6\varphi, \quad p = hr_0;$$

$$10) u(r, \theta, \varphi) = 48pu_0 \sum_{k=3}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k} \frac{(k-2)(2k+5)(2k^2+k-19)P_{2k}^6(\cos\theta)}{(2k+p)\|P_{2k}^6\|^2} \sin 6\varphi, \\ p = hr_0;$$

$$11) u(r, \theta, \varphi) = 48pu_0 \sum_{k=3}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k} \frac{(k-1)(k-2)(2k+3)(2k+5)P_{2k}^6(\cos\theta)}{(2k+p)\|P_{2k}^6\|^2} \cos 6\varphi, \\ \text{где } p = hr_0;$$

$$12) u(r, \theta, \varphi) = 7680pu_0 \sum_{k=3}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k} \frac{P_{2k}^6(\cos\theta)}{(2k+p)\|P_{2k}^6\|^2} \cos 6\varphi, \quad p = hr_0.$$

$$\mathbf{2.900.} \quad u(r, \theta, \varphi) = 2u_0 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k} \frac{a_k P_{2k}^2(\cos\theta)}{\|P_{2k}^2\|^2} \sin 2\varphi,$$

$$\text{где } a_k = 2 - \frac{(2k^2+3k+2)P_{2k}(0)}{k+1}.$$

$$\mathbf{2.901.} \quad u(r, \theta, \varphi) = Ar_0 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2k} \frac{a_k P_{2k}^2(\cos\theta)}{k\|P_{2k}^2\|^2} \cos 2\varphi,$$

$$\text{где } a_k = 2 + \frac{(2k^2+k+2)P_{2k}(0)}{(2k-1)(k+1)}.$$

$$\mathbf{2.902.} \quad A_\theta = A_r = 0,$$

$$A_\varphi = \frac{\pi I}{c} \cdot \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2n+1} \frac{P_{2n+1}^1(0)P_{2n+1}^1(\cos\theta)}{(n+1)(2n+1)}, & r < r_0, \\ \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{2n+2} \frac{P_{2n+1}^1(0)P_{2n+1}^1(\cos\theta)}{(n+1)(2n+1)}, & r_0 < r; \end{cases}$$

в предельном случае $A_\varphi = \frac{M}{r^2} \sin \theta$. У к а з а н и е. Так как поле обладает аксиальной симметрией, то решение уравнения

$$\Delta \mathbf{A} = -\mathbf{e}_\varphi \frac{4\pi I}{cr_0} \delta(r-r_0) \cdot \delta\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)$$

следует искать в виде $\mathbf{A}(r, \theta, \varphi) = A_\varphi(r, \theta) \mathbf{e}_\varphi$. Для $A_\varphi(r, \theta)$ получается задача

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial A_\varphi}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial A_\varphi}{\partial \theta} - \frac{A_\varphi}{r^2 \sin^2 \theta} = -\frac{4\pi I}{cr_0} \delta(r-r_0) \cdot \delta\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right), \\ |A|_{r=0} < \infty, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} A = 0.$$

Собственные функции — присоединенные функции Лежандра $P_n^1(\cos \theta)$.

$$\mathbf{2.903.} \quad 1) r_k = \pi \sqrt{\frac{3D}{\beta}}; \quad 2) r_k = \mu \sqrt{\frac{D}{\beta}}, \quad \text{где } \mu > 0 \text{ — наименьший корень уравнения } \frac{1}{\mu} - \operatorname{ctg} \mu = \frac{1}{2\sqrt{\beta D}}.$$

$$2.904. E_{nk} = \frac{\hbar^2}{2mr_0^2} \mu_{n+\frac{1}{2},k}^2, \quad n \in \mathbb{N}_0, \quad k \in \mathbb{N}.$$

$$2.905. U_0 \geq \frac{\pi^2 \hbar^2}{8mr_0^2}.$$

2.906. $U_0 > \frac{\hbar^2}{8mr_0} \mu_{01}^2$. Решение. Стационарное состояние частицы с наименьшей энергией описывается сферически симметричной волновой функцией, которая удовлетворяет уравнению

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi(r) + U(r) \psi(r) = E \psi(r), \quad 0 < r,$$

$$\text{и условиям } |\psi(0)| < \infty, \quad \int_0^\infty \psi^2 r^2 dr = 1.$$

Замена переменных $u(r) = r \psi(r)$, $\xi = e^{-\frac{r}{2r_0}}$ приводит к задаче

$$u'' + \frac{1}{\xi} u' + \left(\alpha^2 - \frac{\nu^2}{\xi^2} \right) u = 0, \quad 0 < \xi < 1, \quad \alpha^2 = \frac{8mU_0}{\hbar^2} r_0^2, \quad \nu = \frac{2r_0}{\hbar} \sqrt{2mE},$$

$$u(1) = 0, \quad \int_0^1 u^2(\xi) \frac{d\xi}{\xi} < \infty.$$

Условию нормировки удовлетворяет $u(\xi) = A J_\nu(\alpha \xi)$. Так как нули функции $J_\nu(\alpha)$ растут с ростом ν , то при $\alpha \leq \mu_{01}$ уравнение $J_\nu(\alpha) = 0$ не имеет корней ни при каком $\nu > 0$.

$$2.907. E_{nk} = \frac{\hbar^2}{2mr_0^2} \mu_{nk}^2, \quad \psi_{nkm}(r, \theta, \varphi) = \frac{R_{nk}(r) Y_n^m(\theta, \varphi)}{\|R_{nk}\| \|Y_n^m\|}, \quad n \in \mathbb{N}_0, \quad k \in \mathbb{N},$$

$$\mu_{nk} > 0 \text{ — корень уравнения } Y_{n+\frac{1}{2}}(\mu) J_{n+\frac{1}{2}}(\alpha \mu) - J_{n+\frac{1}{2}}(\mu) Y_{n+\frac{1}{2}}(\alpha \mu) = 0,$$

$$\alpha = \frac{r_1}{r_2}, \quad R_{nk}(r) = \frac{1}{\sqrt{r}} \left[Y_{n+\frac{1}{2}}(\mu_{nk}) J_{n+\frac{1}{2}}\left(\frac{\mu_{nk}}{r_2} r\right) - J_{n+\frac{1}{2}}(\mu_{nk}) Y_{n+\frac{1}{2}}\left(\frac{\mu_{nk}}{r_2} r\right) \right],$$

$$\text{функции } Y_n^m(\theta, \varphi) \text{ имеют вид (2.67), } \|R_{nk}\|^2 = \frac{2r_2^2}{\pi^2 \mu_{nk}^2} \left(1 - \frac{J_{n+\frac{1}{2}}^2(\mu_{nk})}{J_{n+\frac{1}{2}}^2(\alpha \mu_{nk})} \right).$$

2.908. Поле электрического типа: $\mathbf{E} = e^{i\omega t}(\mathcal{E}_r, \mathcal{E}_\theta, \mathcal{E}_\varphi)$, $\mathbf{H} = e^{i\omega t}(0, \mathcal{H}_\theta, \mathcal{H}_\varphi)$, компоненты векторов $\mathcal{E}$ и $\mathcal{H}$ выражаются через функцию u по приведенным выше формулам (1.186), где

$$u(r, \theta, \varphi) = A \sqrt{r} J_{n+\frac{1}{2}}\left(\frac{\gamma_{ns} r}{r_0}\right) Y_n^m(\theta, \varphi),$$

$\gamma_{ns} > 0$ — корень уравнения $2\gamma J'_{n+\frac{1}{2}}(\gamma) + J_{n+\frac{1}{2}}(\gamma) = 0$, $n \in \mathbb{N}_0$, $s \in \mathbb{N}$, частоты колебаний $\omega_{ns} = c\gamma_{ns}$.

Поле магнитного типа: $\mathbf{E} = e^{i\omega t}(0, \mathcal{E}_\theta, \mathcal{E}_\varphi)$, $\mathbf{H} = e^{i\omega t}(\mathcal{H}_r, \mathcal{H}_\theta, \mathcal{H}_\varphi)$, компоненты векторов $\mathcal{E}$ и $\mathcal{H}$ выражаются через функцию u по формулам (1.187), где

$$v(r, \theta, \varphi) = B \sqrt{r} J_{n+\frac{1}{2}}\left(\frac{\mu_{n+\frac{1}{2},s} r}{r_0}\right) Y_n^m(\theta, \varphi),$$

$n \in \mathbb{N}_0$, $s \in \mathbb{N}$, частоты колебаний $\omega_{ns} = c\mu_{n+\frac{1}{2},s}$.

$$\mathbf{2.909.} \quad u(r, \theta, \varphi, t) = u_1 \left(1 + \frac{2r_0}{\pi r} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin \frac{n\pi r}{r_0}}{n} e^{-\left(\frac{n\pi a}{r_0}\right)^2 t} \right) - \\ - 2u_0 \sqrt{\frac{r_0}{r}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_{\frac{3}{2}}\left(\frac{\mu_n}{r_0} r\right)}{\mu_n J_{\frac{1}{2}}(\mu_n)} e^{-\left(\frac{\mu_n a}{r_0}\right)^2 t} \sin \theta \sin \varphi, \quad \mu_n > 0 - \text{ нуль функции } J_{\frac{3}{2}}(\mu).$$

$$\mathbf{2.910.} \quad u(r, \theta, \varphi, t) = 4u_0 \sqrt{\frac{r_0}{r}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_{\frac{3}{2}}\left(\frac{\mu_n}{r_0} r\right) e^{-\left(\frac{\mu_n a}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_n (\mu_n^2 - 2) J_{\frac{1}{2}}(\mu_n)} \sin \theta \cos \varphi, \quad \mu_n > 0 - \text{ корень уравнения}$$

$$2\mu J_{\frac{1}{2}}(\mu) = J_{\frac{3}{2}}(\mu). \quad (2.127)$$

$$\mathbf{2.911.} \quad u(r, \theta, t) = w_0 \left[rt - \frac{4r_0^2}{a} \sqrt{\frac{r_0}{r}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_{\frac{3}{2}}\left(\frac{\mu_n}{r_0} r\right) \sin \frac{a\mu_n t}{r_0}}{\mu_n (\mu_n^2 - 2) J_{\frac{1}{2}}(\mu_n)} \right] \cos \theta,$$

где $\mu_n > 0$ — корень уравнения (2.127).

$$\mathbf{2.912.} \quad u(r, \theta, t) = 4v_0 r_0 \sqrt{\frac{r_0}{r}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_{\frac{3}{2}}\left(\frac{\mu_n}{r_0} r\right)}{\mu_n (\mu_n^2 - 2) J_{\frac{1}{2}}(\mu_n)} \times \\ \times \left\{ 1 - \cos \frac{a\mu_n}{r_0} t - \eta(t - t_0) \left[1 - \cos \frac{a\mu_n}{r_0} (t - t_0) \right] \right\} \cos \theta,$$

$\mu_n > 0$ — корень уравнения (2.127).

$$\mathbf{2.913.} \quad 1) \quad u(r, \theta, \varphi, t) = 2a \sqrt{\frac{r_0}{r}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\gamma_{nk} J_{n+\frac{1}{2}}\left(\frac{\gamma_{nk}}{r_0} r\right)}{\left[\gamma_{nk}^2 - n(n+1)\right] J_{n+\frac{1}{2}}(\gamma_{nk})} \times \\ \times \int_0^t f(\tau) \sin \frac{a\gamma_{nk}}{r_0} (t - \tau) d\tau Y_n^m(\theta \varphi);$$

$$2) \quad u(r, \theta, t) = \frac{3a^2 A_0}{r_0} \cdot \frac{\omega t - \sin \omega t}{\omega^2} + \\ + 2a \sqrt{\frac{r_0}{r}} \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A_n \gamma_{nk} J_{n+\frac{1}{2}}\left(\frac{\gamma_{nk}}{r_0} r\right) P_n(\cos \theta)}{\left[\gamma_{nk}^2 - n(n+1)\right] J_{n+\frac{1}{2}}(\gamma_{nk})} \cdot \frac{\omega \sin \omega_{nk} t - \omega_{nk} \sin \omega t}{\omega^2 - \omega_{nk}^2}, \\ \omega_{nk} = \frac{a\gamma_{nk}}{r_0}, \quad A_n = \frac{2n+1}{2} \int_0^\pi f(\theta) P_n(\cos \theta) \sin \theta d\theta.$$

Если частота ω совпадает с одной из собственных частот, т.е. $\omega = \omega_{n_0 k_0}$, то в слагаемом с номерами n_0, k_0 временной множитель имеет вид $\frac{\sin \omega t - \omega t \cos \omega t}{2\omega}$. В п. 1, п. 2 величина $\gamma_{nk} > 0$ — корень уравнения

$$(n+1)J_{n+\frac{1}{2}}(\gamma) = \gamma J_{n-\frac{1}{2}}(\gamma). \quad (2.128)$$

$$\mathbf{2.914.} \quad u(r, \theta, t) = 2u_0(p+1) \sqrt{\frac{r_0}{r}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_{\frac{3}{2}}\left(\frac{\mu_n}{r_0} r\right) e^{-\left(\frac{a\mu_n}{r_0}\right)^2 t}}{\left[\mu_n^2 + (p+1)(p-2)\right] J_{\frac{3}{2}}(\mu_n)} \cos \theta,$$

$p = hr_0, \mu_n > 0$ — корень уравнения

$$\mu J_{\frac{1}{2}}(\mu) + (p-2)J_{\frac{3}{2}}(\mu) = 0. \quad (2.129)$$

$$\mathbf{2.915.} \quad u(r, \theta, t) = \frac{4u_0}{3} \left[\frac{r^2}{r_0^2} - \frac{1}{4} + \frac{r_0}{2\pi r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{n\pi r}{r_0}}{n} e^{-\left(\frac{n\pi a}{r_0}\right)^2 t} + \right. \\ \left. + 2\sqrt{\frac{r_0}{r}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_{\frac{5}{2}}\left(\frac{\mu_n}{r_0} r\right) e^{-\left(\frac{a\mu_n}{r_0}\right)^2 t}}{\mu_n J_{\frac{3}{2}}(\mu_n)} P_2(\cos \theta) \right], \quad \mu_n > 0 - \text{ нуль функции } J_{\frac{5}{2}}(\mu).$$

$$\mathbf{2.916.} \quad u(r, \theta, t) = \frac{2a^2}{r_0 \sqrt{r_0 r}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n J_{\frac{3}{2}}\left(\frac{\mu_n}{r_0} r\right)}{J_{\frac{1}{2}}} \int_0^t \mu(\tau) e^{-\left(\frac{a\mu_n}{r_0}\right)^2 (t-\tau)} d\tau \cos \theta, \\ \mu_n > 0 - \text{ нуль функции } J_{\frac{3}{2}}(\mu).$$

$$\mathbf{2.917.} \quad u(r, \theta, \varphi, t) = \left[\sum_{n=1}^{\infty} f_n \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^n P_n^1(\cos \theta) + \right. \\ \left. + 2\sqrt{\frac{r_0}{r}} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{f_n \cdot J_{n+\frac{1}{2}}\left(\frac{\mu_{nk}}{r_0} r\right) P_n^1(\cos \theta)}{\mu_{nk} J_{n-\frac{1}{2}}(\mu_{nk})} e^{-\left(\frac{a\mu_{nk}}{r_0}\right)^2 t} \right] \sin \varphi, \\ f_n = \frac{1}{\|P_n^1\|^2} \int_0^\pi f(\theta) P_n^1(\cos \theta) \sin \theta d\theta, \quad \mu_{nk} > 0 - \text{ нуль функции } J_{n+\frac{1}{2}}(\mu).$$

$$\mathbf{2.918.} \quad u(r, \theta, \varphi, t) = \\ = \frac{q_0 r_0}{kn} \left[\left(\frac{r}{r_0}\right)^n - 2n\sqrt{\frac{r_0}{r}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{J_{n+\frac{1}{2}}\left(\frac{\mu_k}{r_0} r\right) e^{-\left(\frac{a\mu_k}{r_0}\right)^2 t}}{\left[\mu_k^2 - n(n+1)\right] J_{n+\frac{1}{2}}(\mu_k)} \right] Y_n^m(\theta\varphi), \\ \mu_k > 0 - \text{ корень уравнения (2.128).}$$

$$\mathbf{2.919.} \quad u(r, \theta, \varphi) = \frac{4q_0 r_0 \cos \theta}{k} \sqrt{\frac{r_0}{r}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_{\frac{3}{2}}\left(\frac{\mu_n}{r_0} r\right)}{\mu_n (\mu_n^2 - 2) J_{\frac{1}{2}}(\mu_n)} \times \\ \times \left[1 - e^{-\left(\frac{a\mu_n}{r_0}\right)^2 t} - \left(1 - e^{-\left(\frac{a\mu_n}{r_0}\right)^2 (t-t_0)} \right) \eta(t-t_0) \right], \\ \mu_n > 0 - \text{ корень уравнения (2.126).}$$

$$\mathbf{2.920.} \quad u(r, \theta, \varphi, t) = \frac{r_0}{k} \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n}{n} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^n P_n^1(\cos \theta) - \right. \\ \left. - 2\sqrt{\frac{r_0}{r}} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{f_n \cdot J_{n+\frac{1}{2}}\left(\frac{\mu_{nm}}{r_0} r\right) P_n^1(\cos \theta)}{\left[\mu_{nm}^2 - n(n+1)\right] J_{n+\frac{1}{2}}(\mu_{nm})} e^{-\left(\frac{a\mu_{nm}}{r_0}\right)^2 t} \right] \cos \varphi, \\ f_n = \frac{1}{\|P_n^1\|^2} \int_0^\pi f(\theta) P_n^1(\cos \theta) \sin \theta d\theta, \quad \mu_{nm} > 0 - \text{ корень уравнения (2.128).}$$

$$\mathbf{2.921.} \quad u(r, \theta, t) = \frac{2a^2 h u_0}{\sqrt{r_0 r}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu_n^2 J_{\frac{3}{2}}\left(\frac{\mu_n}{r_0} r\right)}{\left[\mu_n^2 + (p+1)(p-2)\right] J_{\frac{3}{2}}(\mu_n)} \cdot \frac{e^{-\alpha t} - e^{-\left(\frac{a\mu_n}{r_0}\right)^2 t}}{\left(\frac{a\mu_n}{r_0}\right)^2 - \alpha} \cos \theta, \\ \mu_n > 0 - \text{ корень уравнения (2.129).}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.922.} \quad u(r, \theta, \varphi, t) = \frac{2a^2 h}{\sqrt{r_0 r}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\gamma_{nk}^2 J_{n+\frac{1}{2}} \left(\frac{\gamma_{nk}}{r_0} r \right)}{\left([\gamma_{nk}^2 + (p+n)(p-n-1)] J_{n+\frac{1}{2}}(\gamma_{nk}) \right)} \times \\
 \times \int_0^t \mu(\tau) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_{nk}}{r_0} \right)^2 (t-\tau)} d\tau Y_n^m(\theta \varphi), \\
 \gamma_{nk} > 0 - \text{корень уравнения } \mu J_{n-\frac{1}{2}} + (p-n-1) J_{n+\frac{1}{2}}(\mu) = 0.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{2.923.} \quad u(r, \theta, \varphi, t) = \pi u_0 \sqrt{r_2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{J_{n+\frac{1}{2}}(\alpha \gamma_{nk}) \left[J_{n+\frac{1}{2}}(\alpha \gamma_{nk}) - \alpha^{n+\frac{1}{2}} J_{n+\frac{1}{2}}(\gamma_{nk}) \right]}{J_{n+\frac{1}{2}}^2(\alpha \gamma_{nk}) - J_{n+\frac{1}{2}}^2(\gamma_{nk})} \times \\
 \times R_k(r) e^{-\left(\frac{\alpha \gamma_{nk}}{r_0} \right)^2 t} Y_n(\theta \varphi), \\
 R_k(r) = \frac{1}{\sqrt{r}} \left[Y_{n+\frac{1}{2}}(\gamma_{nk}) J_{n+\frac{1}{2}} \left(\frac{\gamma_{nk}}{r_0} r \right) - J_{n+\frac{1}{2}}(\gamma_{nk}) Y_{n+\frac{1}{2}} \left(\frac{\gamma_{nk}}{r_0} r \right) \right], \quad \gamma_{nk} > 0 \\
 \text{есть корень уравнения} \\
 Y_{n+\frac{1}{2}}(\mu) J_{n+\frac{1}{2}}(\alpha \mu) - J_{n+\frac{1}{2}}(\mu) Y_{n+\frac{1}{2}}(\alpha \mu) = 0, \quad \alpha = \frac{r_1}{r_2}.
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{2.924.} \quad \mathbf{H}(r, \theta, t) = \mathcal{H}(r, \theta) e^{i\omega t}, \quad \mathcal{H}_r(r, \theta) = \frac{3H_0}{J_{\frac{1}{2}}(kr_0)} \sqrt{\frac{r_0}{r}} \frac{J_{\frac{3}{2}}(kr)}{kr} \cos \theta,$$

$$\mathcal{H}_\theta(r, \theta) = \frac{3H_0}{2J_{\frac{1}{2}}(kr_0)} \sqrt{\frac{r_0}{r}} \left(\frac{J_{\frac{3}{2}}(kr)}{kr} - J_{\frac{1}{2}}(kr) \right) \sin \theta, \quad \mathcal{H}_\varphi(r, \theta) = 0.$$

У к а з а н и е. Решения уравнений для функций $A(r, \theta)$ и $u(r, \theta)$ (см. ответ к задаче 1.487) имеют форму рядов:

$$\begin{aligned}
 A(r, \theta) &= \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{J_{n+\frac{1}{2}}(kr)}{\sqrt{kr}} P_n^1(\cos \theta), \quad r < r_0, \\
 u(r, \theta) &= \sum_{n=0}^{\infty} C_n \left(\frac{r_0}{r} \right)^{n+1} P_n(\cos \theta), \quad r_0 < r.
 \end{aligned}$$

Из условия на бесконечности вытекает, что $B_n = C_n = 0$ при $n \geq 2$. Коэффициенты B_1 и C_1 следует выбрать так, чтобы магнитное поле было непрерывным на поверхности шара.

$$\mathbf{2.925.} \quad I = \frac{1}{2} \pi a \rho_0 r_0 A^2 \omega^2.$$

$$\mathbf{2.926.} \quad I = \frac{1}{2} \pi^2 \rho_0 r_0^2 A^2 \omega^3.$$

$$\mathbf{2.927.} \quad I = \pi a \rho_0 r_0 A^2 \omega^2.$$

$$\mathbf{2.928.} \quad I = \frac{2\pi}{3} \frac{a \rho_0 r_0^6 A^2 \omega^6}{4a^4 + r_0^4 \omega^4}.$$

$$\mathbf{2.929.} \quad I = 2\pi \frac{a \rho_0 r_0^4 A^2 \omega^4}{a^2 + r_0^2 \omega^2}.$$

$$\mathbf{2.930.} \quad p(r, \varphi) = -P_0 \left[\frac{J_1(kr_0)}{H_1^{(2)}(kr_0)} H_0^{(2)}(kr) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-i)^n J_n'(kr_0)}{(H_n^{(2)}(kr_0))'} H_n^{(2)}(kr) \cos n\varphi \right].$$

Решение. Давление в газе $P_0 e^{i(\omega t - kr \cos \varphi)} + p e^{i\omega t}$, где p — давление в рассеянной волне. Функция $p(r, \varphi)$ — решение задачи (см. задачу 1.310):

$$\Delta p + k^2 p = 0, \quad r_0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad (2.130)$$

$$\left. \frac{\partial p}{\partial r} \right|_{r=r_0} = -P_0 \frac{\partial}{\partial r} e^{-ikr \cos \varphi} \Big|_{r=r_0}. \quad (2.131)$$

Подстановка $p = R(r)\Phi(\varphi)$ в уравнение (2.130) приводит к задаче на собственные значения

$$\Phi'' + \lambda \Phi = 0, \quad \Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi),$$

решение которой (см. пример 2.12.) $\Phi_n(\varphi) = A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi$, и к уравнению Бесселя, $R'' + \frac{1}{r}R' + \left(k^2 - \frac{n^2}{r^2}\right)R = 0$. В качестве фундаментальной системы решений последнего уравнения целесообразно взять функции Ганкеля $H_n^{(1)}(kr)$ и $H_n^{(2)}(kr)$, асимптотические представления которых при $r \rightarrow \infty$ описывают цилиндрические волны. Условию излучения удовлетворяет функция $H_n^{(2)}(kr)$, поэтому

$$p(r, \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi) H_n^{(2)}(kr).$$

Граничное условие (2.131), правая часть которого преобразуется посредством разложения плоской волны, представляет собой равенство двух разложений по собственным функциям $\Phi_n(\varphi)$:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi) \left(H_n^{(2)}(kr_0) \right)' k = \\ = -P_0 J'_0(kr_0) k - 2P_0 k \sum_{n=1}^{\infty} (-i)^n J'_n(kr_0) \cos n\varphi, \end{aligned}$$

откуда

$$B_n = 0, \quad A_0 = -P_0 \frac{J_1(kr_0)}{H_1^{(2)}(kr_0)}, \quad A_n = -2P_0 \frac{(-i)^n J'_n(kr_0)}{\left(H_n^{(2)}(kr_0) \right)' }.$$

На единицу длины цилиндра действует сила

$$\mathbf{F} = \mathbf{k} \int_0^{2\pi} \operatorname{Re} \left(P_0 e^{i(\omega t - kr \cos \varphi)} + p(r, \varphi) e^{i\omega t} \right) \cos \varphi r_0 d\varphi.$$

$$\mathbf{2.931.} \quad I(r, \varphi) = \frac{\pi k^3 r_0^4 P_0^2}{16a\rho_0 r} (1 - 2 \cos \varphi)^2, \quad I = \frac{3\pi^2 k^3 r_0^4 P_0^2}{8a\rho_0}.$$

$$\mathbf{2.932.} \quad 1) \mathbf{F}(t) = 2\pi k r_0^2 P_0 \sin \omega t \mathbf{k};$$

$$2) \mathbf{F}(t) = -2P_0 \sqrt{\frac{2\pi r_0}{k}} \sin(\omega t + kr_0 - \pi/4) \mathbf{k}.$$

$$\mathbf{2.933.} \quad \mathcal{E}_z = -\mathcal{E}_0 \left[\frac{J_0(kr_0)}{H_0^{(2)}(kr_0)} H_0^{(2)}(kr) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{J_n(kr_0)}{H_n^{(2)}(kr_0)} H_n^{(2)}(kr) \cos n\varphi \right];$$

$$I = \frac{\pi c \mathcal{E}_0^2}{8k \ln^2 kr_0}.$$

2.934. Давление в рассеянной волне

$$p(r, t) = -P_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i)^n (2n+1) j'_n(kr_0)}{h'_n(kr_0)} h_n(kr) P_n(\cos \theta),$$

$$\text{где } j_n(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} x J_{n+\frac{1}{2}}(x), \quad h_n(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} H_{n+\frac{1}{2}}^{(2)}(x).$$

$$2.935. I(r, \theta) = \frac{k^2 r_0^6 P_0^2}{18 a \rho_0 r^2} \left(1 - \frac{3}{2} \cos \theta\right)^2, \quad I = \frac{7 \pi k^4 r_0^6 P_0^2}{18 a \rho_0}.$$

$$2.936. 1) \mathbf{F}(t) = \mathbf{k} 2 \pi r_0^3 \sin \omega t;$$

$$2) \mathbf{F} = \mathbf{k} \frac{4 \pi P_0 r_0}{k^2} \sin \left(\omega t + k r_0 - \frac{3 \pi}{4} \right).$$

У к а з а н и е. Представить плоскую волну в виде ряда.

2.937. Диполь с моментом $\mathbf{p} = p \mathbf{e}_z$ расположен в начале сферической системы координат;

$$\mathbf{E}(r, \theta, t) = \mathcal{E}(r, \theta) e^{i \omega t}, \quad \mathbf{H}(r, \theta, t) = \mathcal{H}(r, \theta) e^{i \omega t},$$

$$\mathcal{E}_r = \frac{2 p_0}{r^2} e^{-i k r} \left(i k + \frac{1}{r} \right) \cos \theta, \quad \mathcal{E}_\theta = \frac{p_0}{r} \left(\frac{i k}{r} + \frac{1}{r^2} - k^2 \right) e^{-i k r} \sin \theta, \quad \mathcal{E}_\varphi = 0,$$

$$\mathcal{H}_r = \mathcal{H}_\theta = 0, \quad \mathcal{H}_\varphi = \frac{i k p_0}{r} e^{-i k r} \left(\frac{1}{r} + i k \right) \sin \theta; \quad w = \frac{2 p_0^2 \omega^4}{3 c^3}.$$

У к а з а н и е. Потенциал магнитного поля $A e^{i \omega t} \mathbf{e}_z$ и скалярный потенциал $u e^{i \omega t}$ удовлетворяют уравнениям

$$\Delta A + k^2 A = -\frac{4 \pi p_0}{c} i \omega \delta(\mathbf{r}),$$

$$\Delta u + k^2 u = 4 \pi p_0 \delta'_z(\mathbf{r})$$

и условиям излучения (задача 1.481). Решения уравнений имеют вид

$$A(\mathbf{r}) = i k p_0 \frac{e^{-i k r}}{r}, \quad u(\mathbf{r}) = \frac{p_0}{r} \left(i k + \frac{1}{r} \right) e^{-i k r} \cos \theta.$$

Поля определяются формулами $\mathcal{H} = \text{rot } \mathbf{A}$, $\mathcal{E} = -\frac{1}{c} \mathbf{A}_t - \nabla u$ (пример 1.28), в которых $A_r = A \cos \theta$, $A_\theta = -A \sin \theta$, $A_\varphi = 0$. В волновой зоне

$$\mathcal{E}_r = \mathcal{E}_\varphi = \mathcal{H}_r = \mathcal{H}_\varphi = 0, \quad \mathcal{E}_\theta = \mathcal{H}_\varphi = -p_0 \frac{k^2}{r} e^{-i k r} \sin \theta.$$

Поток энергии

$$S = \frac{c}{4 \pi} |[\mathbf{Re}(\mathcal{E} e^{i \omega t}) \cdot \mathbf{Re}(\mathcal{H} e^{i \omega t})]| = \frac{c}{4 \pi} p_0^2 \frac{k^4}{r^2} \sin^2 \theta \cos^2(\omega t - k r).$$

Мощность излучения есть результат усреднения потока энергии S по времени и интегрирования по сфере, радиус которой r .

2.938. Координаты диполя: $x = 0$, $y = 0$, $z = l$; $\mathbf{E}(x, y, z, t) = \mathcal{E}(x, y, z) e^{i \omega t}$, $\mathbf{H}(x, y, z, t) = \mathcal{H}(x, y, z) e^{i \omega t}$, $\mathcal{E} = -\frac{i}{k} \text{rot rot } \mathcal{A}$, $\mathcal{H} = \text{rot } \mathcal{A}$, $k = \frac{\omega}{c}$.

$$\begin{cases} r_{MP} = \sqrt{x^2 + y^2 + (z - l)^2}, & 1) \mathcal{A}(x, y, z) = i k p_0 \left(\frac{e^{-i k r_{MP}}}{r_{MP}} + \frac{e^{-i k r_{MQ}}}{r_{MQ}} \right) \mathbf{e}_z; \\ r_{MQ} = \sqrt{x^2 + y^2 + (z + l)^2}; & 2) \mathcal{A}(x, y, z) = i k p_0 \left(\frac{e^{-i k r_{MP}}}{r_{MP}} - \frac{e^{-i k r_{MQ}}}{r_{MQ}} \right) \mathbf{e}_x. \end{cases}$$

2.939. Диполь с моментом $\mathbf{M} = M \mathbf{e}_z$ расположен в начале сферической системы координат; $\mathbf{E}(r, \theta, t) = \mathcal{E}(r, \theta) e^{i \omega t}$, $\mathbf{H}(r, \theta, t) = \mathcal{H}(r, \theta) e^{i \omega t}$,

$$\mathcal{E} = -\frac{i}{k} \text{rot rot } \mathcal{A}, \quad \mathcal{H} = \text{rot } \mathcal{A}, \quad \mathcal{A} = \mathbf{e}_\varphi \frac{3 M_0 \sin \theta}{8 \pi} \frac{d}{dr} \frac{e^{-i k r}}{r}, \quad k = \frac{\omega}{c}.$$

2.940. Координаты диполя: $x = 0$, $y = 0$, $z = l$; $\mathbf{E}(x, y, z, t) = \mathcal{E}(x, y, z) e^{i \omega t}$, $\mathbf{H}(x, y, z, t) = \mathcal{H}(x, y, z) e^{i \omega t}$, $\mathcal{E} = -\frac{i}{k} \text{rot rot } \mathcal{A}$, $\mathcal{H} = \text{rot } \mathcal{A}$,

$$1) \mathcal{A}(x, y, z) = \frac{3 M_0}{8 \pi} \left[\left(\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \frac{e^{-i k r}}{r} \right) \Big|_{r=r_{MP}} - \left(\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \frac{e^{-i k r}}{r} \right) \Big|_{r=r_{MQ}} \right] (-y \mathbf{e}_x + x \mathbf{e}_y);$$

$$2) \mathcal{A}(x, y, z) = \frac{3M_0}{8\pi} \left[\left(\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \frac{e^{-ikr}}{r} \right) \Big|_{r=r_{MP}} (y\mathbf{e}_z - (z-l)\mathbf{e}_y) - \right. \\ \left. - \left(\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \frac{e^{-ikr}}{r} \right) \Big|_{r=r_{MQ}} (y\mathbf{e}_z - (z+l)\mathbf{e}_y) \right]; \\ r_{MP} = \sqrt{x^2 + y^2 + (z-l)^2}, \quad r_{MQ} = \sqrt{x^2 + y^2 + (z+l)^2}, \quad k = \frac{\omega}{c}.$$

$$\mathbf{2.941.} \quad \zeta(r, \varphi, t) = A_{nm} r^m P_n^{(m,0)} \left(1 - 2 \frac{r^2}{r_0^2} \right) \cos(m\varphi + \delta_m) \cos(\omega_{nm}t + \delta_{nm}),$$

$$\omega_{nm} = \frac{\sqrt{g h_0}}{r_0} \sqrt{4n(n+m+1) + 2m}, \quad 4n(n+m+1) + 2m \ll 4\pi^2 \frac{r_0^2}{h_0^2}, \\ n+m > 0, \quad n, m \in \mathbb{N}_0, \quad \text{У к а з а н и е.} \quad \text{Функция } \zeta(r, \varphi, t) \text{ удовлетворяет} \\ \text{уравнению (1.90) и условию } |\zeta| < \infty. \text{ После подстановки } \zeta = R(r)\Phi(\varphi)T(t) \\ \text{и замены } 2r^2 = r_0^2(1 - \xi) \text{ для } R(r) \text{ получается уравнение типа (2.73).}$$

$$\mathbf{2.942.} \quad E_n = -\frac{E_0}{2n^2}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad E_0 = \frac{Ze^2}{r_0}, \quad r_0 = \frac{\hbar^2}{mZe^2}, \quad \text{кратность вырождения } n^2,$$

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{r} R_{nl}(r) \frac{Y_l^m(\theta, \varphi)}{\|Y_l^m\|}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l, \quad l \in \mathbb{N}_0;$$

$$\text{функция } R_{nl}(r) = \frac{1}{n\sqrt{r_0}} \sqrt{\frac{(n-l-1)!}{(n+l)!}} \left(\frac{2r}{nr_0} \right)^{l+1} e^{-\frac{r}{nr_0}} L_{n-l-1}^{2l+1} \left(\frac{2r}{nr_0} \right).$$

$$\text{У к а з а н и е. Волновая функция } \psi(r) = \frac{1}{r} R(r) \frac{Y_l^m(\theta, \varphi)}{\|Y_l^m\|}, \quad R(r) - \text{решение за-} \\ \text{дачи, которая в безразмерных переменных } r = r_0\xi, \quad E = -E_0\varepsilon \text{ имеет вид}$$

$$R'' + \left(-2\varepsilon + \frac{2}{\xi} - \frac{l(l+1)}{\xi^2} \right) R = 0, \quad 0 < \xi,$$

$$R(0) = 0, \quad \int_0^\infty R^2(\xi) d\xi < \infty.$$

$$\mathbf{2.943.} \quad E_n = \hbar\omega(n+1), \quad \psi_{nk}(r, \varphi) = R_{nk}(r) \frac{e^{ik\varphi}}{\sqrt{2\pi}},$$

$$R_{nk}(r) = r_0 \sqrt{\frac{2s!}{(s+|k|)!}} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{|k|} e^{-\frac{r^2}{2r_0^2}} L_s^{|k|} \left(\frac{r^2}{r_0^2} \right), \quad r_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}, \quad \text{кратность вы-} \\ \text{рождения уровня } n+1; \quad 2s+|k|=n, \quad k, n \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{У к а з а н и е. Функция } R(r) \text{ является решением задачи, которая в безразмер-} \\ \text{ных переменных } r = r_0\xi, \quad E = E_0\varepsilon, \text{ где } E_0 = \hbar\omega, \text{ имеет вид}$$

$$R'' + \frac{1}{\xi} R' + \left(2\varepsilon - \frac{k^2}{\xi^2} - \xi^2 \right) R = 0, \quad 0 < \xi,$$

$$|R| < \infty, \quad \int_0^\infty R^2 \xi d\xi < \infty.$$

$$\text{Посредством замены } \xi^2 = \eta \text{ получается уравнение типа (2.73).}$$

$$\mathbf{2.944.} \quad E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{3}{2} \right), \quad \psi_{nlk}(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{r} R_{nl}(r) \frac{Y_l^k(\theta, \varphi)}{\|Y_l^k\|},$$

$$R_{nl}(r) = \frac{1}{r_0} \sqrt{\frac{2s!}{r_0 \Gamma(s+l+\frac{3}{2})}} \left(\frac{r}{r_0} \right)^l e^{-\frac{r^2}{2r_0^2}} L_s^{l+\frac{1}{2}} \left(\frac{r^2}{r_0^2} \right), \quad r_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}},$$

$$2s+l=n, \quad n, l \in \mathbb{N}_0, \quad \text{кратность вырождения уровня } \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

У к а з а н и е. Волновая функция $\psi = \frac{1}{r}(r) \frac{Y_l^k(\theta\varphi)}{\|Y_l^k\|}$, $R(r)$ — решение задачи, которая в безразмерных переменных $r = r_0\xi$, $E = -E_0\varepsilon$, $E_0 = \hbar\omega$, имеет вид

$$R'' + \left(2\varepsilon - \xi^2 - \frac{l(l+1)}{\xi^2}\right) R = 0, \quad 0 < \xi,$$

$$R(0) = 0, \quad \int_0^\infty R^2(\xi) d\xi < \infty.$$

Уравнение для $R(r)$ сводится к уравнению вида (2.73) заменой $\xi^2 = \eta$.

2.945. $E_{nl} = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\beta\right)$, $\omega = \frac{4}{r_0} \sqrt{\frac{U_0}{2m}}$, $\beta = \left[\left(l + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{2m\alpha U_0 r_0^2}{\hbar^2}\right]^{\frac{1}{2}}$,

$$\psi_{nlk}(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{r} R_{nl}(r) \frac{Y_l^k(\theta\varphi)}{\|Y_l^k\|}, \quad R_{nl}(r) = \sqrt{\frac{2n!}{a\Gamma(n+\beta+l)}} \left(\frac{r}{a}\right)^{\beta+\frac{1}{2}} e^{-\frac{r^2}{2a^2}} L_n^\beta\left(\frac{r^2}{a^2}\right),$$

$n, l \in \mathbb{N}$.

У к а з а н и е. Компонента $R(r)$ функции $\psi(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{r} R(r) \frac{Y_l^k(\theta\varphi)}{\|Y_l^k\|}$ является решением задачи на собственные значения

$$R'' + \left(\frac{2mE}{\hbar^2} - \frac{l(l+1)\hbar^2 + 2m\alpha r_0^2 U_0}{\hbar^2 r^2} - \frac{2mU_0}{\hbar^2 r_0^2} r^2\right) R = 0, \quad 0 < r,$$

$$R(0) = 0, \quad \int_0^\infty R^2 dr = 1.$$

Замена $r = a\sqrt{\xi}$, $E = E_0\varepsilon$, где $E_0 = \frac{\hbar}{r_0} \sqrt{\frac{U_0}{2m}}$, приводит к уравнению (2.73).

2.946. $E_n = \frac{p_z^2}{2m} + \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right)$, $\psi_{sk}(r, \varphi, z) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\hbar}} e^{i(\frac{p_z}{\hbar}z + k\varphi)} R_{sk}(r)$,

$$R_{sk}(r) = \frac{1}{a} \sqrt{\frac{s!}{(s+|k|)!}} \left(\frac{r^2}{2a^2}\right)^{\frac{|k|}{2}} e^{-\frac{r^2}{4a^2}} L_s^{|k|}\left(\frac{r^2}{2a^2}\right), \quad p_z - \text{любое действительное}$$

число, $2s + k + |k| = 2n$, $n, k \in \mathbb{N}_0$, $\omega = \frac{eB}{mc}$, $a = \sqrt{\frac{\hbar c}{eB}}$.

У к а з а н и е. В цилиндрической системе координат с осью Oz , параллельной вектору $\mathbf{B}$, волновая функция удовлетворяет уравнению

$$\Delta\psi + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E\psi + \frac{eB}{2mc} \frac{\hbar}{i} \frac{\partial\psi}{\partial\varphi} - \frac{e^2 B^2 r^2}{8mc} \psi\right) = 0, \quad e > 0.$$

Функция ψ представляет собой произведение

$$\psi(r, \varphi, z) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\hbar}} e^{i(\frac{p_z}{\hbar}z + k\varphi)} R(r),$$

в котором множитель $\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} p_z z\right)$ нормирован на δ -функцию (см. задачу 3.29.), $R(r)$ — решение задачи на собственные значения

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{dR}{dr} + \left(\frac{2mE}{\hbar^2} - \frac{p_z^2}{\hbar^2} + \frac{eB}{\hbar c} k - \frac{e^2 B^2 r^2}{4\hbar^2 c^2} - \frac{k^2}{r^2}\right) R = 0, \quad 0 < r,$$

$$|R| < \infty, \quad \int_0^\infty R^2 r dr = 1.$$

В результате замены $r^2 = 2a^2\xi$ получается уравнение вида (2.73).

2.947. $E_n = -\frac{\hbar^2 \alpha_n^2}{2ma^2}$, $\alpha_n = -n - \frac{1}{2} + \sqrt{\beta^2 + \frac{1}{4}} > 0$, $\beta^2 = \frac{2mU_0 a^2}{\hbar^2}$, $n \in \mathbb{N}$,
 $\psi_n(x) = \frac{C_n}{\operatorname{ch}^\alpha \frac{x}{a}} P_n^{(\alpha, \alpha)}\left(\operatorname{th} \frac{x}{a}\right)$, $\alpha = \alpha_n$, $P_n^{(\alpha, \alpha)}(x)$ — полином Якоби. Потенци-

альная яма имеет конечное число уровней, а при $a^2 U_0 \leq \frac{\hbar^2}{m}$ — только один уровень.

У к а з а н и е. Волновая функция стационарного состояния удовлетворяет уравнению Шредингера,

$$\psi'' + \left(-\frac{2m}{\hbar^2} |E| + \frac{2mU_0}{\hbar^2} \frac{1}{\operatorname{ch}^2 \frac{x}{a}} \right) \psi = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad E < 0,$$

и условию нормировки $\int_{-\infty}^{\infty} \psi^2 dx$. Замена $\xi = \operatorname{th} \frac{x}{a}$ преобразует уравнение к виду (2.73).

2.948. $E_n = -\frac{\hbar^2}{2mr_0^2} s_n^2$, $s_n = \frac{b^2 - (n+1)^2}{2(n+1)} > 0$, $b = \frac{\sqrt{2mU_0}}{\hbar} r_0$,
 $n = 0, 1, 2, \dots, -\left[\frac{1-b}{2}\right]$, при $2mr_0^2 U_0 < \hbar^2$ нет ни одного уровня;
 $\psi_n(r) = \frac{1}{r} R_n(r)$, $R_n = C_n(1+\xi)(1-\xi)^{s_n} P_n^{(2s_n, 1)}(\xi)$, $\xi = 1 - 2e^{-\frac{r}{r_0}}$.

У к а з а н и е. Волновая функция $\psi(r) = \frac{1}{r} R(r)$, где $R(r)$ — решение задачи на собственные значения

$$R'' + \left(-\frac{s^2}{r_0^2} + \frac{b^2}{r_0^2 \left(e^{\frac{r}{r_0}} - 1 \right)} \right) R = 0, \quad 0 < \xi < \infty, \quad s = \frac{\sqrt{2m|E|}}{\hbar} r_0,$$

$$R(0) = 0, \quad \int_0^\infty R^2 dr = 1.$$

Посредством замены $1 - 2 \exp\left(-\frac{r}{r_0}\right) = \xi$ получается уравнение типа (2.73).

2.949. $E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right)$, $\psi_n(x) = \left(\frac{1}{\pi 2^n n!} \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\right)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{m\omega^2 x^2}{2\hbar}} H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x\right)$,
 $n \in \mathbb{N}$.

У к а з а н и е. Волновые функции — собственные функции задачи

$$\psi'' + \left(\frac{2mE}{\hbar^2} - \frac{m^2 \omega^2}{\hbar^2} x^2 \right) \psi = 0, \quad -\infty < x < \infty,$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi^2 dx = 1, \quad (2.132)$$

которая в безразмерных переменных $x = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \xi$, $E = \hbar\omega \varepsilon$ принимает вид

$$\psi'' + (2\varepsilon - \xi^2) \psi = 0, \quad -\infty < \xi < \infty, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \psi^2 d\xi.$$

Полученное уравнение принадлежит типу (2.73); ему соответствуют

$$\pi(\xi) = -\xi, \quad \tau(\xi) = -2\xi, \quad \varphi(\xi) = \exp\left(-\frac{\xi^2}{2}\right), \quad \rho(\xi) = \exp(-\xi^2), \quad \lambda = 2\varepsilon - 1.$$

2.950. $E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right) - \frac{e^2 \varepsilon^2}{2m\omega^2}$, $\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n! 2^n \pi \alpha}} e^{-\alpha^2 (x-x_0)^2} H_n(\alpha(x - x_0))$, $\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$, $x_0 = \frac{e\varepsilon}{m\omega^2}$, $n \in \mathbb{N}_0$.

У к а з а н и е. Волновая функция удовлетворяет уравнению Шредингера,

$$-\frac{\hbar}{2m}\psi'' + \left(\frac{m\omega^2}{2}x^2 - e\mathcal{E}x\right)\psi = E\psi, \quad -\infty < x < \infty,$$

и условию нормировки $\int_{-\infty}^{\infty} \psi^2 dx = 1$.

2.951. $|\Psi(x, t)|^2 = \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} e^{-\alpha^2(x-x_0 \cos \omega t)^2}$, т.е. волновой пакет колеблется без изменения формы около точки $x = 0$ с амплитудой $|x_0|$ и классической частотой ω . Если $|x_0| \ll \frac{1}{\alpha}$, то $\Psi(x, t) \approx \psi_0(x) \exp\left(-\frac{i\omega t}{2}\right)$, т.е. осциллятор находится в основном состоянии. Если $|x_0| \gg \frac{1}{\alpha}$, то энергия осциллятора в наиболее вероятном состоянии равна энергии классического осциллятора $\frac{m\omega x_0^2}{2}$, который колеблется с амплитудой $|x_0|$.

Р е ш е н и е. Задача для определения волновой функции

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} \Psi, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t,$$

$$\Psi(x, 0) e^{-\frac{1}{2}\alpha^2(x-x_0)^2}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dx = 1, \quad A = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}},$$

сводится посредством разделения переменных $\Psi(x, t) = \psi(x, t)T(t)$ к уравнению $T' + \frac{iE}{\hbar}T = 0$ и к задаче на собственные значения (2.132). Таким образом, решение приобретает форму ряда по собственным функциям:

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \psi_n(x) e^{-\frac{iE_n}{\hbar}t}.$$

При $t = 0$

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n \psi_n(x) = \Psi(x, 0).$$

Вычисление коэффициентов C_n основано на разложении производящей функции в ряд и ортогональности собственных функций $\psi_n(x)$:

$$C_n = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x, 0) \psi_n(x) dx = \frac{1}{\sqrt{\pi n! 2^n}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\xi^2 + \xi \xi_0 - \xi_0^2/2} H_n(\xi) d\xi =$$

$$= \frac{e^{-\xi_0^2/4}}{\sqrt{\pi n! 2^n}} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{\xi_0}{2}\right)^n \frac{1}{n!} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\xi^2} H_n(\xi) H_m(\xi) d\xi = \frac{\xi_0^n}{\sqrt{n! 2^n}} e^{-\xi_0^2/4}, \quad \xi = \alpha x.$$

Следовательно,

$$\Psi(x, t) = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} \exp\left(-\frac{\xi^2}{2} - \frac{\xi_0^2}{4} - \frac{i\omega t}{2}\right) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(\xi)}{n!} \left(\frac{\xi_0}{2} e^{-i\omega t}\right)^n.$$

Ряд можно просуммировать с помощью разложения для производящей функции, что дает

$$\Psi(x, t) = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} \exp\left(-\frac{\xi^2}{2} - \frac{\xi_0^2}{4} - \frac{i\omega t}{2} - \frac{\xi_0^2}{4} e^{-2i\omega t} + \xi \xi_0 e^{-i\omega t}\right). \quad (2.133)$$

Для $|\Psi(x, t)|^2$ получается выражение, данное в ответе. Если $|x_0| \ll \frac{1}{\alpha}$, то $|\xi| \ll 1$ и функция (2.133) становится равной $\psi_0(x) \exp\left(-\frac{i\omega t}{2}\right)$;

осциллятор находится в n -м состоянии с вероятностью

$$C_n^2 = \left(\frac{\xi_0^2}{2}\right)^n \frac{e^{-\xi_0^2/2}}{n!}.$$

Если $|x_0| = \frac{1}{\alpha}\xi_0 \gg \frac{1}{\alpha}$, то $n \gg 1$ и наиболее вероятное состояние определяется условием

$$\frac{dC_n^2}{dn} = 0, \quad \text{или} \quad \ln \frac{\xi_0^2}{2} \psi(n+1),$$

где $\psi(x)$ — логарифмическая производная Γ -функции. Поскольку $n \gg 1$, то

$$\psi(n+1) = \psi(n) + \frac{1}{n} = \ln n + O\left(\frac{1}{n}\right),$$

откуда $n_0 = \xi_0^2/2$. Энергия осциллятора в наиболее вероятном состоянии

$$E_{n_0} = \hbar\omega \left(n_0 + \frac{1}{2}\right) = \hbar\omega \frac{\xi_0^2}{2} = \frac{1}{2}m\omega x_0^2.$$

2.952. $E_n = -U_0 + \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right) - \frac{\hbar\omega}{b} \left(n + \frac{1}{2}\right)^2$, $n = 0, 1, 2, \dots, -\left[\frac{1-b}{2}\right]$,

$\omega = \frac{\kappa}{r_0} \sqrt{\frac{2u_0}{m}}$. Второе слагаемое в выражении для E_n характеризует энергию гармонических колебаний (задача 2.950), третье учитывает ангармоничность, при этом для всех допустимых n

$$\frac{\hbar\omega}{b} \left(n + \frac{1}{2}\right)^2 < \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right).$$

Для низких уровней ($n \ll b$)

$$E_n \approx -U_0 + \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right).$$

Этот результат естествен, так как при малых значениях $|r - r_0|$ функция $U(r)$ представляет собой осцилляторный потенциал

$$U(r) \approx -U_0 - \frac{m\omega^2}{2}(r - r_0)^2.$$

Решение. Задача на собственные значения для оператора энергии

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + U(r)\psi = E\psi, \quad 0 < r < \infty, \quad E < 0,$$

$$4\pi \int_0^\infty \psi^2(r) r^2 dr = 1$$

заменой переменных $\psi = \frac{1}{r}R(r)$, $\xi = b e^{-\kappa \frac{r-r_0}{r_0}}$, $s = \frac{\sqrt{2m|E|}}{\hbar\kappa} r_0$ преобразуется к виду

$$\xi^2 R'' + \xi R' + \left(-\frac{\xi^2}{4} + \frac{b\xi}{2} - s^2\right) R = 0, \quad 0 < \xi < \xi_0^\kappa, \quad (2.134)$$

$$u(\xi_0) = 0, \quad \int_0^{\xi_0} u^2(\xi) \frac{d\xi}{\xi} < \infty.$$

В данном случае (см. пример 2.30)

$$\pi = \pm \left(\frac{\xi}{2} \pm s\right), \quad \varphi = \xi^{\pm s} e^{\pm \frac{\xi}{2}}, \quad \rho = \xi^{\pm 2s} e^{\pm \xi}, \quad R = \xi^{\pm s} e^{\pm \frac{\xi}{2}} u(\xi), \quad k = \frac{b}{2} \mp s.$$

Условия (2.84) для $\rho(\xi)$, $\xi \in [0; \xi_0]$, не выполняются при $\xi = \xi_0$, поэтому формулы (2.85) и (2.86), а также правила (2.87) неприменимы. Выбор знаков

основан на исследовании поведения решений уравнения (2.134) при малых и больших значениях ξ . Если $\xi \rightarrow 0$, то в этом случае уравнение принимает вид $\xi^2 R'' + \xi R' - s^2 R = 0$ и имеет линейно независимые решения ξ^s , ξ^{-s} , из которых условию нормировки удовлетворяет ξ^s . При $\xi \rightarrow \infty$ следует взять решение, которое ведет себя как $e^{-\xi/2}$. Таким образом,

$$k = \frac{b}{2} - \xi, \quad \pi(\xi) - \frac{\xi}{2} + 2s, \quad \lambda = \frac{b}{2} - s - \frac{1}{2}, \quad \rho(\xi) = \xi^{2s} e^{-\xi}, \quad R(\xi) = \xi^s e^{-\xi/2}.$$

Функция $u(\xi)$ удовлетворяет уравнению (2.80), которое является вырожденным гипергеометрическим уравнением

$$\xi u'' + (\gamma - \xi)u' - \alpha u = 0$$

с параметрами $\alpha = s + \frac{1}{2} - b$, $\gamma = 2s + 1$ и условиями

$$u(\xi_0) = 0, \quad \int_0^{\xi_0} \xi^{2s+1} e^{-\xi} u^2(\xi) d\xi < \infty.$$

Фундаментальной системой решений служат

$$u_1(\xi) = \Phi(\alpha, \gamma, \xi), \quad u_2(\xi) = \xi^{1-\gamma} \Phi(\alpha - \gamma + 1, 2 - \gamma, \xi).$$

Функция $u_2(\xi)$ не удовлетворяет условию нормировки, так как интеграл от функции $\xi^{2s-1} e^{-\xi} u_2^2(\xi) = \xi^{-1-2s} e^{-\xi} \Phi(\alpha - \gamma + 1, 2 - \gamma, \xi)$ расходится в нуле. Решением является $u_1(\xi) = A\Phi(\alpha, \gamma, \xi)$, а уравнение $\Phi(\alpha, \gamma, \xi_0) = 0$ определяет собственные значения. Для построения приближенного решения следует учесть, что $-E > -U_0$ (связанные состояния), поэтому

$$0 < s = \frac{\sqrt{2m|E|}}{\hbar^2 \kappa} r_0 < \frac{\sqrt{2mu_0}}{\hbar^2 \kappa} r_0 = \frac{b}{2}, \quad (2.135)$$

откуда $1 < \gamma < b + 1 < b \ln b \ll be^\kappa = \xi_0$; наряду с этим выполняются неравенства $|\alpha| \leq \frac{b+1}{2} < b \ll be^\kappa = \xi_0$. Приведенные оценки позволяют применить асимптотическую формулу

$$\Phi(\alpha, \gamma, \xi_0) = e^{-i\pi\alpha} \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\gamma-\alpha)} \xi_0^{-\alpha} + \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\alpha)} e^{\xi_0} \xi_0^{\alpha-\gamma},$$

с помощью которой уравнение для собственных значений запишется в виде

$$\Gamma\left(s + \frac{1}{2} - \frac{b}{2}\right) - e^{i\pi(s+\frac{1}{2}-\frac{b}{2})} \Gamma\left(s + \frac{1}{2} + \frac{b}{2}\right) e^{b(\exp \kappa - \kappa - \ln b)}.$$

Отсюда следует неравенство

$$\left| \Gamma\left(s + \frac{1}{2} - \frac{b}{2}\right) \right| = \Gamma\left(s + \frac{1}{2} + \frac{b}{2}\right) e^{b(\exp \kappa - \kappa - \ln b)} > \Gamma\left(\frac{b+1}{2}\right) e^b \gg 1,$$

основанное на оценках $\ln b \ll e^\kappa$, $e^\kappa > 1 + \kappa$. С другой стороны, в силу соотношений (2.135) $s + \frac{1}{2} - \frac{b}{2} < \frac{1}{2}$, что означает близость величины $s + \frac{1}{2} - \frac{b}{2}$ к полюсу гамма-функции, т. е. $s + \frac{1}{2} - \frac{b}{2} = -n$, $n \in \mathbb{N}_0$. Таким образом,

$$\frac{\sqrt{2m|E_n|}}{\hbar \kappa} r_0 = s_n, \quad s_n = \frac{b-1}{2} - n > 0,$$

а волновые функции стационарных состояний

$$\psi_n(r) = \frac{B_n}{r} e^{-\kappa s_n} \frac{r-r_0}{r_0} \exp\left(-\frac{b}{2} e^{-\kappa} \frac{r-r_0}{r_0}\right) \Phi\left(s_n + \frac{1}{2} - \frac{b}{2}, 2s_n + 1, e^{-\kappa} \frac{r-r_0}{r_0}\right).$$

2.953. Собственные значения $E_n < 0$ — корни уравнения

$$\operatorname{tg} \left(k_2 r_0 - \frac{\pi^2}{3} k_1 k_2 a^2 \right) = -\frac{k_2}{k_1}, \quad k_1 = \frac{\sqrt{2m|E|}}{\hbar}, \quad k_2 = \frac{\sqrt{2m(U_0 - |E|)}}{\hbar}.$$

Решение. Для определения собственных значений оператора энергии требуется решить задачу

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} r^2 \frac{d\psi}{dr} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - U(r)) \psi = 0, \quad 0 < r, \quad E < 0,$$

$$|\psi| < \infty, \quad 4\pi \int_0^\infty |\psi|^2 r^2 dr = 1.$$

В переменных $R = r\psi$, $\xi = \left(1 + e^{\frac{r-r_0}{a}}\right)^{-1}$ эта задача принимает форму

$$R'' + \frac{1-2\xi}{\xi(1-\xi)} R' + \frac{b^2 \xi - s_1^2}{\xi^2 (1-\xi)^2} R = 0, \quad 0 < \xi < \xi_0 = \left(1 - e^{-\frac{r_0}{a}}\right)^{-1}, \quad (2.136)$$

$$R(\xi_0) = 0, \quad \int_0^{\xi_0} |R|^2 \frac{d\xi}{\xi(1-\xi)} < \infty, \quad s_{1,2} = a k_{1,2}, \quad b = \frac{\sqrt{2mU_0}}{\hbar} a.$$

Уравнение (2.136) имеет структуру (2.73) и нужно взять то решение (см. задачу 2.952), которое ведет себя как ξ^{s_1} при $\xi \rightarrow 0$ и как $(1-\xi)^{i s_2}$ при $\xi \rightarrow 1$. Тогда $k = -(s_1 + i s_2)^2$, $\pi(\xi) = s_1 - (s_1 + i s_2)\xi$, $\lambda = -(s_1 + i s_2)(s_1 + i s_2 + 1)$, $\varphi(\xi) = \xi^{s_1} (1 - \xi)^{i s_2}$, $R(\xi) = \xi^{s_1} (1 - \xi)^{i s_2} u(\xi)$. Функция $u(\xi)$ удовлетворяет уравнению (2.80), которое представляет собой гипергеометрическое уравнение

$$\xi(1-\xi) u'' + [\gamma - (\alpha + \beta + 1)\xi] u' - \alpha\beta u = 0, \quad 0 < \xi < \xi_0,$$

с параметрами $\alpha = s_1 + i s_2$, $\beta = s_1 + i s_2 + 1$, $\gamma = 2s_1 + 1$ и условиями

$$u(\xi_0) = 0, \quad \int_0^{\xi_0} |u(\xi)|^2 \frac{\xi^{2s_1-1}}{1-\xi} d\xi < \infty.$$

Общее решение уравнения Гаусса выражается через гипергеометрические функции:

$$u(\xi) = A F(s_1 + i s_2, s_1 + i s_2 + 1, 2s_1 + 1, \xi) + \\ + B \xi^{-2s_1} F(-s_1 + i s_2, -s_1 + i s_2 + 1, -2s_2 + 1, \xi).$$

Оно удовлетворяет условию нормировки при $B = 0$, следовательно, собственные значения являются корнями уравнения

$$F(s_1 + i s_2, s_1 + i s_2 + 1, 2s_1 + 1, \xi_0) = 0. \quad (2.137)$$

Чтобы найти значения гипергеометрической функции $F(\alpha, \beta, \gamma, \xi)$ в окрестности точки $\xi_0 = \left(1 - e^{-\frac{r_0}{a}}\right)^{-1} \approx 1$, следует осуществить аналитическое продолжение этой функции на круг $|\xi - 1| < 1$ с помощью соотношения

$$F(\alpha, \beta, \gamma, z) = \frac{\Gamma(\gamma)\Gamma(\gamma - \alpha - \beta)}{\Gamma(\gamma - \alpha)\Gamma(\gamma - \beta)} F(\alpha, \beta, \alpha + \beta - \gamma + 1, 1 - z) + \\ + \frac{\Gamma(\gamma)\Gamma(\alpha + \beta - \gamma)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} (1 - z)^{\gamma - \alpha - \beta} F(\gamma - \alpha, \gamma - \beta, \gamma - \alpha - \beta + 1, 1 - z).$$

На основе этого соотношения левая часть уравнения (2.137) может быть записана в виде суммы двух комплексно сопряженных величин, поэтому

$$\arg \left[\frac{\Gamma(2is_2)(1 - \xi_0)^{-is_2}}{(s_1 + is_2)\Gamma^2(s_1 + is_2)} F(s_1 - is_2, s_1 - is_2 + 1, -2is_2 + 1, 1 - \xi_0) \right] = \pi \left(n + \frac{1}{2} \right),$$

или (в приближении $\xi_0 = 1 - e^{-\frac{r_0}{a}} \approx 1$, $F(\alpha, \beta, \gamma, \xi_0) \approx 1$)

$$\frac{r_0 s_2}{a} + \arg \Gamma(2is_2) - 2 \arg \Gamma(s_1 + i s_2) - \arg \frac{s_2}{s_1} = \pi \left(n + \frac{1}{2} \right). \quad (2.138)$$

Из разложения $\ln \Gamma(1+z) = -Cz + \sum_{m=2}^{\infty} (-1)^m \zeta(m) \frac{z^m}{m}$, $|z| < 1$, где C — постоянная Эйлера, $\zeta(m)$ — дзета-функция Римана, следует, что

$$\arg \Gamma(z) = -\arg z + \operatorname{Im} \left(-Cz + \sum_{m=2}^{\infty} (-1)^m \zeta(m) \frac{z^m}{m!} \right).$$

Если сохранить величины второго порядка малости относительно a/r_0 , то

$$\arg \Gamma(2is_2) = -\frac{\pi}{2} - 2Cs_2 = -\frac{\pi}{2} - 2Ck_2a,$$

$$\arg \Gamma(s_1 + i s_2) = -\operatorname{arctg} \frac{s_1}{s_2} - Cs_2 + \zeta(2)s_1s_2 = -\operatorname{arctg} \frac{k_2}{k_1} - Ck_2a + \frac{\pi^2}{6}k_1k_2a^2,$$

а (2.138) приобретает форму $k_2r_0 - \frac{\pi^2}{3}k_1k_2a^2 = \pi(n+1) - \operatorname{arctg} \frac{k_2}{k_1}$. При $a=0$ получается уравнение для уровней энергии в прямоугольной потенциальной яме (задача 2.905)

2.954. TE -моды: $\mathcal{E}_y(x) = A_N H_N \left(\frac{x}{a} \right) e^{\frac{x^2}{2a^2}}$, $k^2 n_1^2 = \beta^2 + \frac{2N+1}{a^2}$, $N \in \mathbb{N}_0$,

$$a = \left(\frac{l}{kn_1 \sqrt{\Delta}} \right)^{\frac{1}{2}}.$$

$$TM\text{-моды: } \mathcal{H}_y(x) \frac{B_N}{n(x)} H_N \left(\frac{x}{a} \right) e^{-\frac{x^2}{2a^2}}, \quad n(x) = n_1 \left(1 - \Delta \frac{x^2}{l^2} \right),$$

$$a = l [2\Delta(k^2 n_1^2 l^2 + 5\Delta)]^{-\frac{1}{4}}, \quad k^2 n_1^2 = \beta^2 + \frac{2\Delta}{k^2} + \frac{2N+1}{a^2}, \quad N \in \mathbb{N}_0.$$

Остальные компоненты определяются формулами, приведенными в ответе к задаче 1.476.

У к а з а н и е. При больших частотах моды концентрируются в сердцевине волновода (задача 2.61), поэтому задачи (1.194), (1.195) можно решать в предположении, что $n(x) = n_1 \left(1 - \Delta \frac{x^2}{l^2} \right)$ на $(0, \infty)$. Уравнение задачи (1.195) упрощается введением новой функции посредством соотношения $\mathcal{H}_y = (x)n(x)f(x)$ с последующей заменой $1/n(x)$ приближенным выражением. См. также задачу 2.949.

2.955. Амплитуды полей выражаются через функцию (см. задачу 1.481)

$$\psi_j(r) = C_j r^{|m \pm 1|} e^{-\frac{s}{2} \left(\frac{r}{r_0} \right)^2} L_N^{|m \pm 1|} \left(\frac{sr^2}{r_0^2} \right), \quad m \in \mathbb{Z}, \quad N \in \mathbb{N}_0, \quad j = 1, 2,$$

$$\beta = \left[k^2 n_1^2 - \frac{2k}{r_0} \sqrt{n_1^2 - n_2^2} (2N + 1 + |m \pm 1|) \right]^{\frac{1}{2}}.$$

У к а з а н и е. Функция $\psi_j(r)$ является решением уравнения (1.131) при условии $\int_0^\infty r \psi_j^2(r) dr < \infty$. Замена переменной $r = \sqrt{\xi}$ преобразует уравнение (1.131) к виду (2.73).

2.956. Электромагнитная волна имеет вид (1.132), компоненты электромагнитного поля $\mathcal{E}_z \psi_1$, $\mathcal{H}_z = \psi_2$ выражаются через полиномы Чебышева–Эрмита:

$$\psi_{1,2} = C_{1,2} e^{-\frac{v}{r_0^2} (x^2 + y^2)} H_M \left(\frac{\sqrt{v}}{r_0} x \right) H_N \left(\frac{\sqrt{v}}{r_0} y \right),$$

где $v = kr_0\sqrt{n_1^2 - n_2^2}$, $\beta^2 = k^2 n_1^2 - 2(M + N + 1)$, $M, N \in \mathbb{N}_0$, а остальные компоненты определяются соотношениями (1.133).

2.957. $\mathbf{E} = e^{i(\beta z - \omega t)}(0, \mathcal{E}_y(x), 0)$, $\mathbf{H} = e^{i(\beta z - \omega t)}(\mathcal{H}_s(\xi), 0, \mathcal{H}_z(x))$,

$$\mathcal{E}_y(x) = \frac{A_N P_N^{p,p} \left(\operatorname{th} \frac{x}{l} \right)}{\operatorname{ch}^p \frac{x}{l}}, \quad \mathcal{H}_x(x) = -\frac{\beta}{k} \mathcal{E}_y, \quad \mathcal{H}_z(x) = -\frac{i}{k} \frac{d\mathcal{E}_y(x)}{dx},$$

$p = p_N = l\sqrt{\beta_N^2 - k^2 n_2^2}$, β_N — корень характеристического уравнения

$$\beta^2 = k^2 n_2^2 + \frac{(\sqrt{1 + 4s^2} - 2N - 1)^2}{4l^2}, \quad N \in \mathbb{N}_0, \quad s^2 = k^2 l^2 (n_1^2 - n_2^2).$$

Если $N = 0$, то $\mathcal{E}_y(x) = \frac{A_0}{\operatorname{ch}^p \frac{x}{l}}$, если $N = 1$, то $\mathcal{E}_y(x) = \frac{A_1 \operatorname{sh} \frac{x}{l}}{\operatorname{ch}^{p+1} \frac{x}{l}}$.

У к а з а н и е. См. задачу 2.947.

2.958. $\mathbf{E} = e^{i(\beta z - \omega t)}(0, \mathcal{E}_y(x), 0)$, $\mathbf{H} = e^{i(\beta z - \omega t)}(\mathcal{H}_x(x), 0, \mathcal{H}_z(x))$,

$$\mathcal{E}_y(x) = A_N e^{\frac{rx}{l}} \left(1 + e^{\frac{2x}{l}} \right)^{\nu} F \left(\nu + \frac{r+p}{2}, \nu + \frac{r-p}{2}, r+1, -e^{\frac{2x}{l}} \right),$$

$$\mathcal{H}_x(x) = -\frac{\beta}{k} \mathcal{E}_y, \quad \mathcal{H}_z(x) = -\frac{i}{k} \frac{d\mathcal{E}_y(x)}{dx},$$

где $r = r_N = l\sqrt{\beta_N^2 - k^2 n_3^2}$, $p = p_N = l\sqrt{\beta_N^2 - k^2 n_2^2}$, β_N — корень ха-

рактеристического уравнения $\beta^2 = k^2 \frac{n_2^2 + n_3^2}{2} + \frac{(\sqrt{1 + 2v^2(2 + a^2)} - 2N - 1)^2}{4l^2} +$

$+\frac{a^4 v^4}{4l^2(\sqrt{1 + 2v^2(2 + a^2)} - 2N - 1)^2}$, $N \in \mathbb{N}_0$, $\nu > 0$ — корень уравнения

$\nu^2 - \nu - v^2(1 + \frac{a^2}{2}) = 0$, $a^2 = \frac{n_2^2 - n_3^2}{n_1^2 - n_2^2}$ — параметр асимметричности,

$v^2 = k^2 l^2 (n_1^2 - n_2^2)$.

Если $N = 0$, то $\mathcal{E}_y(x) = \frac{A_0 e^{\frac{rx}{l}}}{\left(1 + e^{\frac{2x}{l}} \right)^{\frac{r+p}{2}}}$, $r \pm p = \sqrt{1 + 2v^2(2 + a^2)} - 1$.

У к а з а н и е. Компонента $\mathcal{E}_y(x)$ — решение задачи

$$\mathcal{E}_y'' + \frac{1}{l^2} \left[\frac{v^2 e^{\frac{2x}{l}}}{1 + e^{\frac{2x}{l}}} \left(a^2 + \frac{2(2 + a^2)}{1 + e^{\frac{2x}{l}}} \right) - r^2 \right] \mathcal{E}_y = 0, \quad -\infty < x < \infty,$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{E}_y^2 dx < \infty.$$

Замена $\xi = -e^{\frac{2x}{l}}$ преобразует уравнение к виду (2.73) для $\psi(\xi) = \mathcal{E}_y(x)$, а подстановка $\psi(\xi) = \xi^{\frac{r}{2}}(1 - \xi)^{\nu} u(\xi)$ приводит к уравнению Гаусса с параметрами $\frac{r+p}{2} + \nu$, $\frac{r-p}{2} + \nu$, $r+1$ для функции $u(\xi)$. Условию интегрируемости $\mathcal{E}_y^2(x)$ при $x \rightarrow -\infty$ ($\xi \rightarrow +0$) удовлетворяет решение

$$\psi(\xi) = C \xi^{\frac{r}{2}} (1 - \xi)^{\nu} F \left(\frac{r+p}{2} + \nu, \frac{r-p}{2} + \nu, r+1, \xi \right).$$

Условие интегрируемости $\mathcal{E}_y^2(x)$ при $x \rightarrow \infty$ ($\xi \rightarrow -\infty$) получается с помощью асимптотической формулы для гипергеометрической функции.

Глава 3

МЕТОД ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Метод разделения переменных основан на разложении решения в ряд по собственным функциям дифференциального оператора, обладающего дискретным спектром. Если спектр непрерывен, то в ряде случаев решение имеет вид интеграла и получается с помощью интегрального преобразования. Аппарат интегрального преобразования должен содержать прямое преобразование, которое каждой функции $u(x, y)$ некоторого класса ставит в соответствие ее образ

$$U(\lambda, y) = \int_X K(\lambda, x) u(x, y) dx \quad (3.1)$$

и обратное преобразование

$$u(x, y) = \int_\Lambda M(x, \lambda) U(\lambda, y) d\lambda, \quad (3.2)$$

восстанавливающее прообраз $u(x, y)$ по известному образу $U(\lambda, y)$. Функции $K(\lambda, x)$, $M(x, \lambda)$ фиксированы и называются ядрами соответствующих интегральных преобразований. Если функция $u(x, y)$ — решение задачи математической физики для линейного дифференциального уравнения с частными производными, то интегральное представление (3.2) ассоциируется с рядом Фурье по собственным функциям. Ядро интегрального преобразования (3.1) выбирается так, чтобы образ дифференциального уравнения для $u(x, y)$ не содержал производных по x . Решение задач осуществляется по единой схеме: 1) выбор интегрального преобразования; 2) переход от задачи для функции $u(x, y)$ к задаче для образа $U(\lambda, y)$; 3) определение функции $U(x, y)$; 4) восстановление прообраза $u(x, y)$ посредством обратного преобразования.

В данной главе предлагаются задачи, которые могут быть решены с помощью интегральных преобразований Фурье, Лапласа, Меллина, Ганкеля.

Литература к главе 3

1. *Лаврентьев М.А., Шабат Б.В.* Методы теории функций комплексного переменного. — М.: Дань, 2002.
2. *Шелковников Ф.А., Такайшвили К.Г.* Сборник упражнений по операционному исчислению. Изд. 4-ое, стереотип. — М.: 2006.
3. *Владимиров В.С., Жаринов В.В.* Уравнения математической физики. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.

3.1. Преобразование Фурье

Пример 3.1. Если функция $f(x)$, $x \in \mathbb{R}$, — кусочно-гладкая на каждом конечном промежутке и абсолютно интегрируема на $\mathbb{R}$, то существует интеграл

$$\mathcal{F}[f](\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{i\lambda x} dx, \quad (3.3)$$

называемый преобразованием Фурье функции $f(x)$. При указанных условиях определено обратное преобразование Фурье

$$\mathcal{F}^{-1}[g](x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda, \quad (3.4)$$

где $g(\lambda) = \mathcal{F}[f](\lambda)$, при этом (см. [39], т. 2)

$$\mathcal{F}^{-1}[g](x) = \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[f]] = f, \quad \mathcal{F}[f] = \mathcal{F}[\mathcal{F}^{-1}[g]] = g. \quad (3.5)$$

Таким образом,

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda. \quad (3.6)$$

В случае если $f(x)$ — четная функция, правые части формул (3.3), (3.4) можно преобразовать в интегралы от 0 до ∞ с множителем $2 \cos \lambda x$ вместо экспоненты (косинус-интеграл Фурье):

$$\begin{aligned} g(\lambda) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} f(x) \cos \lambda x \, dx, \\ f(x) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} g(\lambda) \cos \lambda x \, d\lambda, \end{aligned} \quad (3.7)$$

а в случае нечетной функции множитель будет $2 \sin \lambda x$ (синус-интеграл Фурье):

$$\begin{aligned} g(\lambda) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} f(x) \sin \lambda x \, dx, \\ f(x) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} g(\lambda) \sin \lambda x \, d\lambda. \end{aligned} \quad (3.8)$$

Преобразование Фурье функции $f(x)$, $x \in \mathbb{R}^n$, определяется формулой

$$\mathcal{F}[f](\lambda) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{i(\lambda, x)} dx, \quad (3.9)$$

где (λ, x) — скалярное произведение векторов λ и x , а обратное преобразование имеет вид

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{F}[f](\lambda) e^{-i(\lambda, x)} d\lambda. \quad (3.10)$$

Функция $f(x) = (x^2 + a^2)^{-1}$ удовлетворяет достаточным условиям существования преобразования (3.3): по определению

$$\begin{aligned} F[f(x)](\lambda) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\lambda x} dx}{x^2 + a^2} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos \lambda x dx}{x^2 + a^2} + \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin \lambda x dx}{x^2 + a^2}. \end{aligned}$$

Второй интеграл, пределы которого симметричны, а подынтегральная функция нечетна, сходится; следовательно, равен нулю. Для вычисления первого интеграла можно воспользоваться комплексной плоскостью (z), выбрав вспомогательную функцию $f(z) = \frac{\exp(i|\lambda|z)}{\sqrt{2\pi}(x^2 + a^2)}$ и замкнутый контур, состоящий из полуокружности $C_R = \{r, \varphi: r = R, 0 \leq \varphi \leq \pi\}$ и отрезка $[-R; R]$ вещественной оси. По теореме Коши о вычетах

$$\int_{C_R} f(z) dz + \int_{-R}^R f(z) dz = 2\pi i \operatorname{res} f(i|a|),$$

где $z = i|a|$ — особая точка функции $f(z)$. При $R \rightarrow \infty$ интеграл по C_R стремится к нулю (по лемме Жордана), так что

$$F[f] = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-|\alpha\lambda|}}{|a|}.$$

3.1. Найти преобразования Фурье функций:

1) $\eta(x)\eta(|a| - x)$; 2) $e^{-\alpha x}\eta(x)$, $\alpha > 0$; 3) $\frac{1}{x^4 + a^4}$; 4) $\frac{1}{x^6 + a^6}$, $x \in \mathbb{R}$.

3.2. Найти функции, преобразования Фурье которых:

1) $e^{-\alpha|\lambda|}$, $\alpha > 0$; 2) $e^{-\alpha\lambda^2}$, $\alpha > 0$; 3) $\frac{1}{\operatorname{ch}^2 \lambda}$, где $\lambda \in \mathbb{R}$.

3.3. Найти косинус-преобразования Фурье функций:

1) $\eta(|a| - |x|)$; 2) $(|a| - |x|)\eta(|a| - |x|)$; 3) $e^{-\alpha|x|}$, $\alpha > 0$; 4) $\frac{x}{\operatorname{sh} x}$.

3.4. Найти синус-преобразования Фурье функций:

1) $\eta(|a| - |x|) \operatorname{sign} x$; 2) $e^{-\alpha|x|} \operatorname{sign} x$, $\alpha > 0$; 3) $\frac{x}{x^4 + a^4}$.

3.5. Найти преобразование Фурье функции $\frac{\sin ax}{x}$.

3.6. Найти косинус-преобразование Фурье функций: 1) $\cos \frac{x^2}{2}$;

2) $\sin \frac{x^2}{2}$.

3.7. Найти: 1) косинус-преобразование Фурье функции $\frac{1}{|x|^p}$;

2) синус-преобразование Фурье функции $\frac{1}{|x|^p} \operatorname{sign} x$, $0 < p < 1$.

3.8. Найти: 1) косинус-преобразование Фурье функции $\text{ci } |x|$; 2) синус-преобразование Фурье функции $\text{si } x - \frac{\pi}{2} \text{sign } x$.

3.9. Показать, что

$$\int_0^{\infty} \frac{J_n(\lambda) \cos \lambda x}{\lambda^n} d\lambda = \frac{(1-x^2)^{n-\frac{1}{2}} \eta(1-|x|)}{(2n-1)!!}, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

3.10. Пусть $\varphi \in \mathcal{J}(R^n)$; доказать, что

$$D^\alpha \mathcal{F}[\varphi(x)] = \mathcal{F}[(ix)^\alpha \varphi], \quad (3.11)$$

$$\mathcal{F}[D^\alpha \varphi](\lambda) = (-i\lambda)^\alpha \mathcal{F}[\varphi](\lambda). \quad (3.12)$$

3.11. Найти преобразования Фурье функций:

$$1) e^{-x^2}; \quad 2) x^n e^{-x^2}; \quad 3) D^n e^{-x^2}.$$

3.12. Каждая функция $\varphi \in \mathcal{J}(R^n)$ имеет преобразование Фурье $\mathcal{F}[\varphi]$, т.е. на пространстве $\mathcal{J}(R^n)$ задан оператор $\mathcal{F}$. Доказать, что этот оператор: 1) линейен; 2) взаимно однозначно отображает $\mathcal{J}(R^n)$ в себя; 3) непрерывен на $\mathcal{J}(R^n)$.

3.13. Пусть $\varphi \in \mathcal{J}(R)$, $y \geq 0$; установить формулу

$$\mathcal{F}^{-1} \left[e^{-|\lambda|y} \mathcal{F}[\varphi] \right] = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y\varphi(\xi) d\xi}{(x-\xi)^2 + y^2}. \quad (3.13)$$

Пример 3.2. Если $f(x)$ — абсолютно интегрируемая функция, то интеграл (3.9) равномерно сходится в R^n , следовательно, представляет собой непрерывную ограниченную функцию $\mathcal{F}[f](\lambda)$, определенную для $\lambda \in R^n$. Этой функции соответствует регулярный функционал из $\mathcal{J}'$ (см. задачи 10.250, 10.253), действующий по правилу

$$(\mathcal{F}[f], \varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{F}[f](\lambda) \varphi d\lambda, \quad \varphi \in \mathcal{J}. \quad (3.14)$$

Повторный интеграл в правой части (3.14) допускает изменение порядка интегрирования, поэтому соотношению (3.14) можно придать форму

$$(\mathcal{F}[f], \varphi) = (f, \mathcal{F}[\varphi]), \quad \varphi \in \mathcal{J}. \quad (3.15)$$

Преобразованием Фурье обобщенной функции $f \in \mathcal{J}'$ называется функционал $\mathcal{F}[f]$, действующий по правилу (3.15).

Если $f(x, y) \in \mathcal{J}'(\mathbb{R}^{m+n})$, $x \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}^m$, то преобразованием Фурье функции $f(x, y)$ по переменной x называется функционал $\mathcal{F}_x[f]$, определенный формулой

$$(\mathcal{F}_x[f], \varphi) = (f, \mathcal{F}_\lambda[\varphi]), \quad \varphi(x, y) \in \mathcal{J}(R^{m+n}). \quad (3.16)$$

Пусть $f = \delta(x - x_0)$, тогда

$$\begin{aligned} (\mathcal{F}[\delta(x - x_0)](\lambda), \varphi(\lambda)) &= (\delta(x - x_0), \mathcal{F}[\varphi](x)) = \mathcal{F}[\varphi](x_0) = \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\lambda) e^{i(\lambda, x_0)} d\lambda = \left(\frac{e^{i(\lambda, x_0)}}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}, \varphi(\lambda) \right), \end{aligned}$$

откуда

$$\mathcal{F}[\delta(x - x_0)](\lambda) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} e^{i(\lambda, x_0)}. \quad (3.17)$$

Отсюда явствует, что $\mathcal{F}[\delta(x)](\lambda) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}$. Обратное преобразование, записанное в виде интеграла ($\delta(x)$ — четная функция)

$$\delta(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{i(\lambda, x)} d\lambda, \quad (3.18)$$

называется разложением δ -функции по плоским волнам. При $n = 1$ формула (3.18) преобразуется к виду

$$\delta(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \cos \lambda x d\lambda. \quad (3.19)$$

3.14. Доказать, что преобразование $\mathcal{F}^{-1}$, определенное формулой

$$\mathcal{F}^{-1}[f(x)] = \mathcal{F}[f(-x)], \quad f \in \mathcal{J}'(R^n), \quad (3.20)$$

является обратным преобразованием Фурье.

3.15. Показать, что оператор $\mathcal{F}$ взаимно однозначно отображает $\mathcal{J}'(\mathbb{R}^n)$ на $\mathcal{J}'(\mathbb{R}^n)$ и является непрерывным на $\mathcal{J}'(\mathbb{R}^n)$.

3.16. Показать, что функционал, действующий по правилу (3.16), принадлежит $\mathcal{J}'$.

3.17. Доказать, что

$$(\delta(y), \mathcal{F}_x[\varphi](\lambda, y)) = \mathcal{F}_x[\varphi](\lambda, 0).$$

3.18. Пусть $f(x) \in \mathcal{J}'(\mathbb{R}^m)$, $\delta(y) \in \mathcal{J}'(\mathbb{R}^n)$. Доказать, что

$$\mathcal{F}_x[f(x) \cdot \delta(y)] = \mathcal{F}_x[f] \cdot \delta(y).$$

3.19. Доказать, что в $\mathcal{J}'(R)$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^k \cos \lambda x \, d\lambda = \delta(x).$$

3.20. Установить следующие свойства преобразования Фурье функций $f \in \mathcal{J}'(R^n)$:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2] &= \alpha_1 \mathcal{F}[f_1] + \alpha_2 \mathcal{F}[f_2]; \\ D^\alpha \mathcal{F}[f(x)] &= \mathcal{F}[(ix)^\alpha f(x)]; \\ \mathcal{F}[D^\alpha f](\lambda) &= (-i\lambda)^\alpha \mathcal{F}[f](\lambda). \end{aligned} \quad (3.21)$$

3.21. Найти преобразования Фурье функций:

$$1) \frac{1}{\operatorname{ch} x}; \quad 2) \frac{x}{\operatorname{ch} x}; \quad 3) \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch}^2 x}; \quad 4) x \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch}^2 x}; \quad 5) x e^{-\alpha|x|}, \quad \alpha > 0; \quad 6) \frac{x}{x^4 + a^4}.$$

3.22. Функция $f \in \mathcal{J}'(R^n)$. Доказать, что

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(x - x_0)] &= e^{i(x_0, \lambda)} \mathcal{F}[f]; \\ \mathcal{F}[f](\lambda + \lambda_0) &= \mathcal{F}[e^{i(x_0, \lambda)} f]; \\ \mathcal{F}[f(cx)](\lambda) &= \frac{1}{|c|^n} \mathcal{F}[f]\left(\frac{\lambda}{c}\right), \quad c \neq 0. \end{aligned}$$

3.23. Найти преобразования Фурье функций:

$$1) \frac{1}{\operatorname{ch}(x - x_0)}; \quad 2) \frac{e^{i\lambda_0 x}}{\operatorname{ch} x}; \quad 3) \frac{1}{\operatorname{ch} cx}.$$

3.24. Вывести формулу

$$\mathcal{F} \left[\mathcal{P}_x^1 \right] = i \sqrt{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sign} \lambda. \quad (3.22)$$

3.25. Найти преобразования Фурье функций:

$$1) 1; \quad 2) x^m; \quad 3) D^m \delta(x); \quad 4) D^m \delta(x - x_0); \quad 5) e^{-i\lambda_0 x}; \quad 6) x^m e^{-i\lambda_0 x}; \quad 7) h(x) D^m \delta(x - x_0), \quad \text{где } x \in R, \quad h(x) \in C^\infty, \quad m \in \mathbb{N}_0.$$

3.26. Найти функцию $f(x)$, где $x \in R^n$, если

$$\mathcal{F}[f] = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} (\lambda^2 + k^2)}, \quad k > 0, \quad n = 1, 2, 3.$$

3.27. Найти функцию $f(x)$, $x \in R^n$, преобразование Фурье которой

$$\mathcal{F}[f](\lambda) = \frac{\sin a|\lambda|t}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} a|\lambda|} \eta(t), \quad a > 0, \quad n = 1, 2, 3.$$

3.28. Пусть $f(x)$ — локально интегрируемая ограниченная в R функция; убедиться в том, что при $y \geq 0$

$$\mathcal{F}^{-1} \left[e^{-|\lambda|y} \mathcal{F}[f](x) \right] = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{yf(\xi) d\xi}{(x - \xi)^2 + y^2}. \quad (3.23)$$

3.29. Собственными функциями оператора импульса $-i\hbar \nabla$ в квантовой механике являются функции

$$\psi_p(x) = C e^{\frac{i}{\hbar}(p, x)}, \quad p, x \in \mathbb{R}^3,$$

которые нормируются по правилу

$$\int_{\mathbb{R}^3} \psi_p(x) \psi_{p'}(x) dx = \delta(p - p').$$

Определить C .

3.30. Показать, что волновая функция $\psi(x)$ (см. предыдущую задачу), где $x \in \mathbb{R}^3$, имеет в p -представлении вид

$$h^{-\frac{3}{2}} \mathcal{F}[\psi(x)] \left(\frac{p}{\hbar} \right).$$

3.31. Свободная частица имеет импульс $p_0 \in \mathbb{R}^3$. Определить ее волновую функцию в p -представлении.

3.32. Частица, локализованная в точке $x_0 \in \mathbb{R}^3$, описывается в x -представлении волновой функцией $\psi_{x_0}(x) = \delta(x - x_0)$. Найти волновую функцию в p -представлении.

Пример 3.3. Решить задачу Дирихле для полуплоскости

$$\begin{aligned} \Delta u(x, y) &= 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < y, \\ u(x, 0) &= f(x), \quad |u(x, y)| \leq M. \end{aligned}$$

Рассмотреть частный случай:

$$u(x, 0) = \begin{cases} u_0, & x \in (a, b), \\ 0, & x \notin (a, b). \end{cases}$$

Пусть $\mathcal{F}_x[u] = U(\lambda, y)$, $\mathcal{F}[f] = F(\lambda)$; преобразование Фурье задачи Дирихле, основанное на свойстве (3.21), имеет вид

$$\begin{aligned} U_{yy} - \lambda^2 U &= 0, \quad 0 < y, \\ U(\lambda, 0) &= \mathcal{F}(\lambda), \quad U \in \mathcal{J}'. \end{aligned}$$

Так как $e^{|\lambda|y} \notin \mathcal{F}'$ (задача 10.254 п. 1), то $U(\lambda, y) = e^{-|\lambda|y} \mathcal{F}[f]$. Таким образом (см. (3.23)),

$$u(x, y) = \mathcal{F}^{-1} \left[e^{-|\lambda|y} F[f] \right] (x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y f(\xi) d\xi}{(x - \xi)^2 + y^2}.$$

В частном случае

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \frac{u_0}{\pi} \int_a^b \frac{y d\xi}{(x - \xi)^2 + y^2} = -\frac{u_0}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{x - \xi}{y} \Big|_a^b = \\ &= \frac{u_0}{\pi} \left(\operatorname{arctg} \frac{x - a}{y} - \operatorname{arctg} \frac{x - b}{y} \right) = \frac{u_0}{\pi} \gamma, \end{aligned}$$

где γ — угол, под которым виден из точки (x, y) отрезок $[a, b]$. Так как $\gamma \in [0, \pi]$, то

$$u(x, y) = \frac{u_0}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{(x - a)(x - b) + y^2}{(b - a)y}.$$

3.33. Определить стационарную температуру двугранного угла ($0 < x, 0 < y$), грань $x = 0$ которого поддерживается при температуре u_0 , а другая грань — при температуре $u_1 \eta(l - x)$, $l > 0$.

3.34. Определить стационарную температуру двугранного угла ($0 < x, 0 < y$), грань $y = 0$ которого теплоизолирована, а другая грань ($x = 0$) поддерживается при постоянной температуре: 1) $u_0 \eta(l - y)$; 2) $u_0 \eta(y - l)$.

3.35. Грань $x = 0$ двугранного угла ($0 < x, 0 < y$) имеет постоянную температуру, а грань $y = 0$ теплоизолирована, кроме полосы ($l_1 < x < l_2$) на этой грани, через которую внутрь угла поступает тепловой поток плотности q_0 . Найти стационарную плотность потока через грань $x = 0$.

3.36. Определить электростатический потенциал в пространстве между параллельными плоскостями $y = \pm l$, потенциал каждой из которых равен $u_0 \operatorname{sign} x$.

3.37. Найти стационарное распределение температуры в однородном слое $\{x, y, z: -\infty < x < \infty, 0 < y < l, -\infty < z < \infty\}$ с теплоизолированной поверхностью $y = 0$, если температура поверхности $y = l$

$$u(x, l) = \begin{cases} u_1, & x < 0, \\ u_2, & x > 0. \end{cases}$$

3.38. Определить температуру пространства в момент $t > 0$, если при $t = 0$ она равна $u_0(r)$. Решить задачу в частном случае, когда $u_0(r) = u_0 e^{-\alpha r}$, $\alpha > 0$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

3.39. Нить ($x = 0, y = y_0, -\infty < z < \infty$) с зарядом q на единицу длины расположена между проводящими заземленными плоскостями $y = \pm l$. Найти потенциал электростатического поля и плотность заряда на плоскостях.

3.40. В среде, магнитная проницаемость которой $\mu \gg 1$, имеется зазор, ограниченный плоскостями $y = \pm l$. Прямой ток J параллелен плоскостям и расположен на расстоянии $y_0 + l$ ($-l < y_0 < l$) от плоскости $y = -l$. Найти векторный потенциал магнитного поля в зазоре.

3.41. В слое $\{x, y, z: -\infty < x < \infty, 0 < y < l, -\infty < z < \infty\}$ на расстоянии y_0 от плоскости $y = 0$ расположен прямолинейный проводник с током, с единицы длины которого выделяется тепловая мощность q_0 ; температура поверхности $y = 0$ равна нулю, а поверхность $y = l$ теплоизолирована. При условии стационарности теплового режима найти температуру теплоизолированной поверхности.

3.42. В слое $\{x, y, z: -\infty < x < \infty, 0 < y < H, -\infty < z < \infty\}$ действует линейный источник тепла, расположенный на прямой $\{x, y, z: x = 0, y = h, -\infty < z < \infty\}$, мощность единицы длины источника q_0 ; температура поверхностей $y = 0$ и $y = l$ равна нулю. При условии стационарности теплового режима найти плотность $\mathbf{q}$ теплового потока через границу $y = 0$ и тепловой поток Q через поверхность $\{x, y, z: 0 < x < \infty, y = 0, l_1 < z < l_2\}$.

3.43. Внутри однородного изотропного слоя $\{x, y, z: -\infty < x < \infty, 0 < y < l, -\infty < z < \infty\}$, проводимость которого σ , находится заряженная нить, с единицы длины которой в единицу времени стекает заряд J . При условиях задачи 1.437 найти плотность тока в слое.

3.44. Между проводящими заземленными плоскостями $y = \pm l$ помещена нить ($x = 0, y = y_0, -\infty < z < \infty$), на которой расположены диполи с моментом $\mathbf{p}$ на единицу длины. Определить плотность заряда на плоскостях, если: 1) $\mathbf{p} = p \mathbf{e}_x$; 2) $\mathbf{p} = p \mathbf{e}_y$.

3.45. Решить задачу Дирихле для полупространства $z > 0$.

3.46. На плоской границе $y = 0$ раздела двух сред с магнитными проницаемостями μ_1 (при $y < 0$), μ_2 (при $y > 0$) расположен прямой ток $\mathbf{J} = J \mathbf{e}_z$. Найти индукцию магнитного поля.

3.47. В сечении $x = 0$ стержня $(-\infty < x < \infty)$ с теплоизолированной поверхностью действует с момента $t = 0$ источник тепла постоянной мощности Q_0 . Найти температуру стержня при $t > 0$, если при $t = 0$ она равна нулю.

3.48. Решить в линейном приближении задачу о колебаниях бесконечной струны $(-\infty < x < \infty)$ под действием поперечной сосредоточенной силы F_0 , которая начинает двигаться по струне из точки $x = 0$ с момента $t = 0$ со скоростью v $(0 < v \ll a)$; начальные условия нулевые.

3.49. Решить задачу о движении полубесконечной струны $(0 < x)$, конец которой движется по закону $\mu(t)\eta(t)$, $\mu(0) = 0$; начальные условия нулевые.

3.50. Изучить движение полуограниченной струны $(0 < x)$, которая начинает двигаться под действием поперечной силы $F(t)$, приложенной с момента $t = 0$ к концу струны.

3.51. Торцы однородного полуограниченного стержня $(0 < x)$ с теплоизолированной боковой поверхностью имеет заданную температуру $\mu(t)$. Найти распределение температуры в стержне при $t > 0$, если его начальная температура равна нулю. Рассмотреть частный случай $\mu(t) = u_0$.

3.52. Решить задачу теплопроводности для бесконечного стержня $(-\infty < x < \infty)$ с теплоизолированной поверхностью, если начальная температура $u_0(x)$.

3.53. Проводник с магнитной проницаемостью μ и большой проводимостью σ (токами смещения можно пренебречь) заполняет полупространство $z > 0$. В момент времени $t = 0$ в области $z < 0$ включается постоянное магнитное поле $\mathbf{H}_0$, параллельное плоскости $z = 0$. Определить магнитное поле в проводнике.

3.54. Лазерный луч проникает в жидкость через прозрачную неподвижную пластинку, находящуюся на ее поверхности (см. задачу 1.312). Применяя преобразование Фурье

$$\Phi(z, \omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} V(z, t) e^{i\omega t} dt,$$

определить звуковое поле в жидкости на больших расстояниях от поверхности $z = 0$ в следующих случаях: 1) $\omega \ll \alpha c_0$ (длинный импульс, сильное поглощение света); 2) звук возбуждается мгновенным импульсом $I\delta\left(\frac{t}{t_0}\right)$.

3.55. На свободную поверхность идеальной жидкости падает лазерный луч, поглощение которого сопровождается возбуждением звуковой волны (см. задачу 1.311). Определить звуковое поле в жидкости при условиях 1) и 2) предыдущей задачи.

3.56. Найти стационарную температуру канала с прямоугольным поперечным сечением ($|x| < l, 0 < y$), стенки которого имеют нулевую температуру, а дно — температуру u_0 .

3.57. Определить стационарную температуру однородного полуограниченного цилиндра ($r < r_0, 0 < \varphi \leq 2\pi, 0 < z$), торец которого поддерживается при нулевой температуре, а температура боковой поверхности равна $u_0 \cos m\varphi \cdot \eta(l - z)$, $l > 0, m \in \mathbb{N}_0$.

3.58. Определить стационарную температуру полубесконечного цилиндра ($r < r_0, 0 < \varphi < 2\pi, 0 < z$) с теплоизолированным торцом, боковая поверхность которого поддерживается при температуре $u_0 \sin m\varphi \cdot \eta(l - z)$, $l > 0, m \in \mathbb{N}$.

3.59. Через боковую поверхность полуограниченного цилиндра ($r < r_0, 0 < \varphi < 2\pi, 0 < z$) поступает тепловой поток, плотность которого $-e_r q_0 \cos m\varphi \cdot \eta(l - z)$, $l > 0, m \in \mathbb{N}_0$, а торец поддерживается при нулевой температуре. Решить стационарную задачу теплопроводности

3.60. Найти электростатический потенциал внутри полого цилиндра ($r < r_0, 0 < \varphi < 2\pi, -\infty < z < \infty$), потенциал поверхности которого

$$u(r_0, z) = \begin{cases} u_1, & z < 0, \\ u_2, & z > 0. \end{cases}$$

3.61. Определить потенциал точечного заряда в цилиндрических координатах, применяя преобразование (3.7) к уравнению Пуассона

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -4\pi q \frac{\delta(r)}{2\pi r} \cdot \delta(z).$$

Используя полученный результат, показать, что

$$\int_0^\infty K_0(\lambda r) \cos \lambda z d\lambda = \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sqrt{r^2 + z^2}}, \quad \int_0^\infty \frac{\cos \lambda z dz}{\sqrt{r^2 + z^2}} = K_0(\lambda r).$$

3.62. Получить следующее выражение для потенциала точечного заряда, помещенного на оси полого проводящего заземленного цилиндра, радиус которого r_0 :

$$u(r, z) = \frac{q}{\sqrt{r^2 + z^2}} - \frac{2q}{\pi} \int_0^\infty \frac{K_0(\lambda r_0)}{I_0(\lambda r_0)} I_0(\lambda r) \cos \lambda z d\lambda.$$

3.63. Найти потенциал точечного диполя в цилиндрических координатах, применяя преобразование (3.8) к соответствующему уравнению Пуассона, и показать, что

$$\int_0^\infty K_0(\lambda r) \sin \lambda z \lambda d\lambda = \frac{\pi}{2} \frac{z}{(r^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

3.64. Круглый виток с током J надет на длинный цилиндр, радиус которого r_0 , магнитная проницаемость μ (см. задачу 1.414). Показать, что магнитное поле на оси цилиндра равно

$$\mathbf{H}|_{r=0} = \mathbf{e}_z \frac{4J}{c} \int_0^\infty \frac{K_1(\lambda r_0) \cos \lambda z d\lambda}{I_0(\lambda r_0) K_1(\lambda r_0) + \mu I_1(\lambda r_0) K_0(\lambda r_0)}.$$

3.65. В массивном теле из железа с бесконечно большой магнитной проницаемостью имеется зазор, внутри которого находится прямой ток (см. задачу 1.431). Определить магнитное поле в зазоре и силу, действующую на единицу длины тока.

3.66. В оболочку ($r = r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $-\infty < z < \infty$) втекает постоянный ток. При условиях задачи 1.451 найти плотность тока в оболочке.

3.67. По оболочке ($r = r_0$, $0 < \varphi < \pi$, $-\infty < z < \infty$) течет постоянный ток. При условиях задачи 1.452 найти плотность тока в оболочке.

3.68. В оболочку ($r = r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $-\infty < z < \infty$) втекает постоянный ток. При условиях задачи 1.453 найти плотность тока в оболочке.

3.69. Определить потенциал кольца $\{x, y, x: x^2 + y^2 = r_0^2, z = 0\}$, линейная плотность заряда которого q_0 .

3.70. Решить предыдущую задачу для кольца, линейная плотность заряда которого $q_0 \sin \varphi$.

3.71. Найти потенциал кольца $\{x, y, x: x^2 + y^2 = r_0^2, z = 0\}$, дипольный момент единицы длины которого $p_0 \mathbf{e}_z$.

3.72. Решить предыдущую задачу для кольца, дипольный момент единицы длины которого $p_0 \mathbf{e}_r$.

3.2. Преобразование Лапласа

Пример 3.4. Функция $f(t)$, $t \in (-\infty, \infty)$, называется оригиналом, если: 1) $f(t) = 0$ при $t < 0$, 2) $f(t)$ — кусочно-гладкая на каждом конечном промежутке области определения, 3) существует такое вещественное число σ_0 (показатель роста), что при любом $\sigma > \sigma_0$ функция $f(t)e^{-\sigma t}$ абсолютно интегрируема на $(0, \infty)$. Преобразованием Лапласа, или изображением оригинала $f(t)$, называется функция комплексного переменного $p = \sigma + i\lambda$

$$\mathcal{L}[f](p) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt. \quad (3.24)$$

Обратное преобразование определяется формулой Меллина

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma - i\infty}^{\sigma + i\infty} F(p) e^{pt} dp, \quad \operatorname{Re} p = \sigma > \sigma_0, \quad (3.25)$$

где $F(p) = \mathcal{L}[f](p)$. Функция $F(p)$ является аналитической в полуплоскости $\operatorname{Re} p > \sigma_0$ и $F(p) \rightarrow 0$, если $\operatorname{Re} p \rightarrow +\infty$. Взаимно однозначное соответствие между оригиналом $f(t)$ и изображением $F(p)$ записывают в виде $f \doteq F$.

Найти изображение единичной функции $\eta(t)$. По определению

$$\int_0^{\infty} \eta(t)e^{-pt} dt = \int_0^{\infty} e^{-pt} dt = -\frac{1}{p} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{p}.$$

З а м е ч а н и е 1. Во многих случаях можно избежать вычисления интегралов (3.24), (3.25), применяя свойства преобразования Лапласа, вывод которых приведен в [44]. Часть из этих свойств далее оформлена в виде задач для самостоятельного решения.

З а м е ч а н и е 2. В обозначении оригинала $\eta(t)f(t)$ обычно опускают множитель $\eta(t)$ и пишут 1 вместо $\eta(t)$ или e^t вместо $\eta(t)e^t$ и т. д.

3.73. Доказать: 1) свойство линейности интегрального преобразования Лапласа: если $f_1(t) \doteq F_1(p)$, $f_2(t) \doteq F_2(p)$, то

$$\alpha_1 f_1(t) + \alpha_2 f_2(t) \doteq \alpha_1 F_1(p) + \alpha_2 F_2(p);$$

2) теорему запаздывания:

$$f(t) \doteq F(p) \implies F(t - \tau) \doteq F(p)e^{-p\tau}, \quad \tau > 0;$$

3) теорему подобия:

$$f(t) \doteq F(p) \implies f(at) \doteq \frac{1}{a} F\left(\frac{p}{a}\right), \quad a > 0;$$

4) свойство линейной замены переменной в оригинале:

$$f(t) \doteq F(p) \implies f(at + b) \doteq \frac{1}{a} F\left(\frac{p}{a}\right) e^{\frac{pb}{a}}, \quad a > 0.$$




Рис. 3.1




Рис. 3.2

3.74. Функция $f(t)$ равна: 1) $\eta(t - \tau)$, $\tau > 0$; 2) представляет собой бесконечную последовательность «прямоугольных» импульсов (рис. 3.2). Найти изображения этих функций.

3.75. Доказать теорему смещения:

$$F(p) \doteq f(t) \implies F(p - p_0) \doteq f(t)e^{p_0 t}.$$

3.76. Найти изображения функций:

- 1) e^{bt} ; 2) $\sin \omega t$; 3) $\cos \omega t$; 4) $\operatorname{sh} at$; 5) $\operatorname{ch} at$; 6) $e^{bt} \sin \omega t$;
7) $e^{-bt} \cos \omega t$; 8) $\sin^2 \omega t$.

3.77. Дифференцирование оригинала. Доказать, что

$$F(p) \doteq f(t) \implies f'(t) \doteq pF(p) - f(+0).$$

3.78. Найти изображения функций f , f' , f'' , где:

- 1) $f = \cos^3 t$; 2) $f = \operatorname{sh}^3 t$; 3) $e^t \sin t$; 4) $\sin t \operatorname{sh} t$.

3.79. Функция $u(t)$ — решение задачи Коши

$$\begin{aligned} u'' - 2u' + u &= 1 - \cos t, \quad 0 < t, \\ u(0) &= 1, \quad u'(0) = -2. \end{aligned}$$

Найти уравнение, которому удовлетворяет изображение $U(p)$ функции $u(t)$.

3.80. Дифференцирование изображения. Доказать, что

$$F(p) \doteq f(t) \implies F'(p) \doteq -tf(t).$$

3.81. Найти изображения функций

$$1) t^m, \quad m \in \mathbb{N}_0; \quad 2) \frac{t^2}{2} e^{bt}; \quad 3) t \sin t; \quad 4) t \operatorname{ch} t; \quad 5) t(\operatorname{sh} t - \sin t).$$

3.82. Вычислить интегралы: 1) $\int_0^\infty e^{-3t} \cos 4t \, dt$; 2) $\int_0^\infty e^{-2t} \sin 3t \, dt$;

$$3) \int_0^\infty e^{-4t} \operatorname{ch} 3t \, dt; \quad 4) \int_0^\infty e^{-2t} \operatorname{ch} 3t \, dt.$$

3.83. Найти изображение многочлена Чебышева–Лагерра $L_n(x)$.

3.84. Интегрирование изображения. Доказать, что

$$F(p) \doteq f(t) \implies \int_p^\infty F(p) dp \doteq \frac{f(t)}{t}.$$

3.85. Найти изображения функций

$$1) \frac{\sin t}{t}; \quad 2) \frac{\operatorname{sh} t}{t}; \quad 3) \frac{1 - \cos t}{t}; \quad 4) \frac{1 - e^t}{t}.$$

3.86. Интегрирование оригинала. Доказать, что

$$f(t) \doteq F(p) \implies \int_0^t f(\tau) d\tau \doteq \frac{F(p)}{p}.$$

3.87. Найти изображения функций:

$$1) \int_0^t \frac{e^{at} - e^{bt}}{t}; \quad 2) \int_0^t \frac{1 - \cos t}{t}; \quad 3) \operatorname{si} t; \quad 4) \int_0^t \frac{\operatorname{sh} t}{t}.$$

3.88. Функция $f(t)$ представляет собой бесконечную последовательность «треугольных» импульсов (рис. 3.1). Найти изображение этой функции.

3.89. Ток $i(x, t)$ и потенциал $u(x, t)$ линии ($0 < x$) с параметрами L, C ($R = G = 0$) удовлетворяют системе телеграфных уравнений и дополнительным условиям

$$u_x + Li_t = 0, \quad 0 < x, \quad 0 < t,$$

$$i_x + Cu_t = 0,$$

$$-u(0, t) + E_0 = \frac{1}{C_0} \int_0^t i(0, \tau) d\tau, \quad i(x, 0) = u(x, 0) = 0.$$

Решением какой задачи будет являться изображение $U(x, p)$ функции $u(x, t)$?

3.90. Функция $u(t)$ — решение задачи Коши

$$u'' + tu' + u = 1, \quad 0 < t,$$

$$u(0) = u_t(0) = 0.$$

Получить уравнение, которому удовлетворяет изображение $U(p)$ функции $u(t)$.

3.91. Найти оригиналы, изображения которых:

- 1) $\frac{1}{p - \ln a}$; 2) $\frac{p}{(p+a)^2}$; 3) $\frac{p+\alpha}{(p+a)^2}$; 4) $\frac{p}{(p+a)^3}$; 5) $\frac{1}{(p^2+a^2)^2}$;
 6) $\frac{1}{p^2+p+1}$; 7) $\frac{p}{p^2+2p+5}$; 8) $\frac{1}{p^2(p^2-a^2)}$; 9) $\frac{p}{(p+a)^2+b^2}$;
 10) $\ln \frac{p+1}{p-1}$; 11) $\ln \left(1 + \frac{a^2}{p^2}\right)$; 12) $\operatorname{arccctg} \frac{1}{p+1}$.

3.92. Найти изображения цилиндрических функций: 1) $Y_0(at)$; 2) $K_0(at)$.

3.93. Найти изображения функций:

$$1) \sin t - \frac{\pi}{2} t Y_0(t); \quad 2) - \left(\frac{\pi}{2} t Y_1(t) + \cos t \right);$$

$$3) \operatorname{sh} t + t K_0(t); \quad 4) \operatorname{ch} t - t K_1(t).$$

3.94. Функция $f(t) = \ln t$. Найти $F(p)$.

3.95. Найти изображение интегрального косинуса $\operatorname{ci} t$.

3.96. Установить соответствия:

$$1) \cos t^2 \doteq \sqrt{\frac{\pi}{2}} \left[\cos \frac{p^2}{4} \left(\frac{1}{2} - S\left(\frac{p}{2}\right) \right) - \sin \frac{p^2}{4} \left(\frac{1}{2} - C\left(\frac{p}{2}\right) \right) \right];$$

$$2) \sin t^2 \doteq \sqrt{\frac{\pi}{2}} \left[\cos \frac{p^2}{4} \left(\frac{1}{2} - C\left(\frac{p}{2}\right) \right) - \sin \frac{p^2}{4} \left(\frac{1}{2} - S\left(\frac{p}{2}\right) \right) \right].$$

3.97. Используя предельную теорему

$$F(p) \doteq f(t) \implies F(0) = \int_0^{\infty} f(t) dt,$$

доказать, что:

$$\begin{aligned} 1) \int_0^{\infty} \frac{\sin kt}{t} dt &= \frac{\pi}{2} \operatorname{sign} k; \\ 2) \int_0^{\infty} \frac{J_1(kt)}{t} dt &= \operatorname{sign} k. \end{aligned} \quad (3.26)$$

3.98. Доказать теорему умножения: изображение свертки классических оригиналов равно произведению их изображений ¹⁾, т. е.

$$f * g \doteq FG \iff \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau = F(p)G(p). \quad (3.27)$$

3.99. Получить соотношение (интеграл Дюамеля)

$$pF(p)G(p) \doteq g(0)f(t) + \int_0^t f(\tau)g'(t-\tau)d\tau, \quad (3.28)$$

где $f \doteq F$, $g \doteq G$.

3.100. Применяя теорему умножения (3.27), вычислить следующие интегралы:

$$\begin{aligned} 1) \int_0^t \sin \omega \tau \cos \omega_0(t-\tau) d\tau; \quad 2) \int_0^t \tau^4 \cos \omega(t-\tau) d\tau; \\ 3) \int_0^t J_1(\tau)J_1(t-\tau) d\tau; \quad 4) \int_0^t \operatorname{ch} \tau I_0(t-\tau) \tau d\tau. \end{aligned}$$

3.101. Найти оригиналы, изображения которых:

$$1) \frac{1}{p(p+1)\dots(p+n)}; \quad 2) \frac{1}{(p^2+1)(p^2+3^2)\dots(p^2+(2n+1)^2)}.$$

¹⁾ Доказательство теоремы для обобщенных функций см. в [15]

3.102. Установить соответствие

$$t^z \doteq \frac{\Gamma(z+1)}{p^{z+1}}, \quad \operatorname{Re} z > -1. \quad (3.29)$$

3.103. Применяя теорему умножения (3.27), получить соотношение, связывающее B - и Γ -функции Эйлера,

$$B(z, \zeta) = \frac{\Gamma(z)\Gamma(\zeta)}{\Gamma(z+\zeta)},$$

где z и ζ — комплексные переменные.

Пример 3.5. Построение изображения функции e^{-t^2} . Так как $e^{-t^2} \leq 1$, то показатель роста $\sigma_0 = 0$. Следовательно, $F(p)$ будет аналитической функцией в полуплоскости $\operatorname{Re} p > 0$. Пусть $p > 0$, тогда по определению (3.24)

$$F(p) = \int_0^\infty e^{-t^2-pt} dt = e^{\frac{p^2}{4}} \int_0^\infty e^{-(t+\frac{p}{2})^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{\frac{p^2}{4}} \operatorname{Erf} \left(\frac{p}{2} \right).$$

Это равенство, установленное при $p > 0$, будет справедливо в области аналитичности правой и левой части, т.е. в полуплоскости $\operatorname{Re} p > 0$.

3.104. Получить изображения функций: 1) $\frac{\sin 2\sqrt{t}}{\sqrt{\pi t}}$; 2) $\frac{2}{\sqrt{\pi}} \sin 2\sqrt{t}$.

3.105. Найти изображения функций:

$$1) \operatorname{erf} t; \quad 2) \operatorname{Erf} \sqrt{t}; \quad 3) e^{-2\sqrt{t}}/\sqrt{\pi t}.$$

3.106. Установить соответствие

$$\frac{e^{-\frac{\tau^2}{4t}}}{\sqrt{\pi t}} \doteq \frac{e^{-\tau\sqrt{p}}}{\sqrt{p}}, \quad \tau \geq 0. \quad (3.30)$$

3.107. Найти изображения функций: 1) $\frac{1}{\sqrt{t}}$; 2) $\frac{e^{\alpha t}}{\sqrt{t}}$; 3) $\frac{2sh \alpha t}{\sqrt{\pi t}}$.

3.108. Найти оригиналы, изображения которых:

$$1) e^{-p} \left[\frac{1}{(p-1)^{\frac{3}{2}}} + \frac{1}{(p+1)^{\frac{3}{2}}} \right]; \quad 2) \frac{p^2}{(p+1)^{\frac{5}{2}}}; \quad 3) \frac{1}{p(p+1)^{\frac{3}{2}}}.$$

3.109. Найти оригиналы, которым соответствуют изображения:

- 1) $e^{p^2} \operatorname{Erf} p$; 2) $\sqrt{\frac{\pi}{p}} e^p \operatorname{Erf} \sqrt{p}$; 3) $\frac{1}{\sqrt{p}} e^{\frac{1}{p}} \operatorname{Erf} \left(\frac{1}{\sqrt{p}} \right)$;
4) $\frac{1}{p} e^p \operatorname{Erf} \sqrt{p}$.

Пример 3.6. Найти оригинал, изображение которого

$$F(p) = \frac{e^{-\tau\sqrt{p^2-1}}}{\sqrt{p^2-1}}, \quad \tau \geq 0, \quad \operatorname{Re} p > 1, \quad \arg \sqrt{p^2-1} \Big|_{p=2} = 0.$$

Пусть $\Phi(p) = F(p)e^{\tau p}$; по формуле (3.25)

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} F(p)e^{pt} dp = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} \Phi(p)e^{p(t-\tau)} dp, \quad \sigma > 1.$$

Для вычисления интеграла с помощью вычетов нужно построить такой замкнутый вспомогательный контур, чтобы в ограниченной им области существовала однозначная ветвь функции $\sqrt{p^2-1}$. При $t < \tau$ следует взять замкнутый контур, состоящий из дуги C_{2R} и хорды L_R (рис. 3.3). Подынтегральная




Рис. 3.3

функция аналитична в области, ограниченной этим контуром, и согласно теореме Коши $\int_{C_{2R}} + \int_{L_R} = 0$. Если $R \rightarrow \infty$, то, в силу леммы Жордана, интеграл по дуге C_{2R} стремится к нулю, а второй интеграл — к $2\pi i f(t)$. Таким образом, функция $f(t) = 0$. При $t > \tau$ нужно выбрать контур, состоящий из дуги C_{1R} ,

хорды L_R , окружностей C_{1r} , C_{2r} и двух берегов L_{1R} , L_{2R} разреза по отрезку $[-1; 1]$ оси $O\sigma$. По теореме Коши

$$\int_{C_{1R}} + \int_{L_R} + \int_{C_{1r}} + \int_{C_{2r}} + \int_{L_{1r}} + \int_{L_{2r}} = 0.$$

При $r \rightarrow 0$, $R \rightarrow \infty$ интегралы по C_{1r} , C_{2r} , C_{1R} стремятся к нулю (последний — по лемме Жордана); таким образом,

$$f(t) = -\frac{1}{2\pi i} \int_L \Phi(p) e^{p(t-\tau)} dp,$$

где L — замкнутый контур, состоящий из двух берегов разреза $[-1; 1]$ оси $O\sigma$. Замена переменной $z = p - \sqrt{p^2 - 1}$ ($z(p)$ — обратная функция Жуковского) позволяет перевести контур L в окружность $|z| = 1$, так что

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=1} e^{\tau z + \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)(t-\tau)} \frac{dz}{z}.$$

Подынтегральная функция имеет в круге $|z| < 1$ одну особую точку $z = 0$, вычет в которой равен $I_0(\sqrt{t^2 - \tau^2})$, что становится очевидным, если показатель степени преобразовать к виду

$$\frac{\sqrt{t^2 - \tau^2}}{2} \left(z \sqrt{\frac{t+\tau}{t-\tau}} + \frac{1}{z} \sqrt{\frac{t-\tau}{t+\tau}} \right).$$

Итак,

$$I_0(\sqrt{t^2 - \tau^2}) \eta(t - \tau) \Leftrightarrow \frac{e^{-\tau \sqrt{p^2 - 1}}}{\sqrt{p^2 - 1}}. \quad (3.31)$$

Полученный результат эквивалентен следующему соотношению: при $\tau \geq 0$, $\operatorname{Re} p > 1$, $\arg \sqrt{p^2 - 1} \Big|_{p=2} = 0$,

$$\int_{\tau}^{\infty} I_0(\sqrt{t^2 - \tau^2}) e^{-pt} dt = \frac{e^{-\tau \sqrt{p^2 - 1}}}{\sqrt{p^2 - 1}}. \quad (3.32)$$

3.110. Показать, что

$$\int_{\tau}^{\infty} J_0(\sqrt{t^2 - \tau^2}) e^{-pt} dt = \frac{e^{-\tau \sqrt{p^2 + 1}}}{\sqrt{p^2 + 1}} \quad (3.33)$$

при $\tau \geq 0$, $\operatorname{Re} p \geq 0$, $p \neq \pm i$, $\arg \sqrt{p^2 + 1} \Big|_{p=1} = 0$.

Пример 3.7. *Первая теорема разложения.* Если $F(p)$ — однозначная аналитическая функция с устранимой особой точкой $p = \infty$, то оригинал можно найти с помощью ряда Лорана в окрестности $p = \infty$ по правилу

$$F(p) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{p^{n+1}} \doteq f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} t^n; \quad (3.34)$$

при этом $f(t)$ — целая функция. Справедливо обратное утверждение. Если оригинал $f(t)$ — целая функция, то в этом случае она представима рядом Тейлора в окрестности $t = 0$. Тогда изображение определяется формулой

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n t^n \doteq F(p) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n n!}{p^{n+1}}.$$

Приложения теоремы: 1) Найти оригинал, изображение которого будет $\frac{1}{p^{n+1}} e^{\frac{1}{p}}$, $n \in \mathbb{N}_0$.

$$\begin{aligned} F(p) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k! p^{k+n+1}} \doteq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{k+n}}{k! \Gamma(k+n+1)} = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{2\sqrt{t}}{2}\right)^{2k+n} t^{\frac{n}{2}}}{r! \Gamma(k+n+1)} = t^{\frac{n}{2}} I_n(2\sqrt{t}). \end{aligned}$$

2) Найти изображение, оригинал которого $I_0(t)$,

$$I_0(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k}}{2^{2k} k! k!} \doteq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\Gamma(2k+1)}{2^{2k} k! k! p^{2k+1}}.$$

Необходимо преобразовать коэффициент ряда Лорана сначала по формуле удвоения для $\Gamma(z)$ при $z = k + \frac{1}{2}$

$$\sqrt{\pi} \Gamma(2k+1) = 2^{2k} \Gamma(k+1) \Gamma\left(k + \frac{1}{2}\right),$$

затем по формуле дополнения для $\Gamma(z)$

$$\Gamma\left(k + \frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{\Gamma\left(\frac{1}{2} - k\right) \sin\left(k + \frac{1}{2}\right)\pi} = \frac{(-1)^k \pi}{\Gamma\left(\frac{1}{2} - k\right)},$$

так что

$$\frac{\Gamma(2k+1)}{2^{2k}k!k!} = \frac{(-1)^k\Gamma\left(k+\frac{1}{2}\right)}{\sqrt{\pi}k!} = \frac{(-1)^{-k}\sqrt{\pi}}{k!\Gamma\left(\frac{1}{2}-k\right)} = \frac{(-1)^k\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{k!\Gamma\left(\frac{1}{2}-k\right)}.$$

На этом этапе уместно ввести обозначения, используемые в математической литературе. Биномиальный ряд

$$(1+x)^\gamma = 1 + \frac{\gamma x}{1!} + \frac{\gamma(\gamma-1)x^2}{2!} + \dots + \frac{\gamma(\gamma-1)\dots(\gamma-k+1)x^k}{k!} + \dots$$

обретет более «привычный» вид

$$(1+x)^\gamma = \sum_{k=0}^{\infty} C_\gamma^k x^k$$

в обозначениях

$$C_\gamma^k = \frac{\gamma(\gamma-1)\dots(\gamma-k+1)x^k}{k!} = \frac{\Gamma(\gamma+1)}{k!\Gamma(\gamma+1-k)}.$$

Кстати, $C_\gamma^k = C_\gamma^{\gamma-k}$, а если $\gamma = n \in \mathbb{N}$, то $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. Теперь соответствие $F(p) \doteq f(t)$ примет форму

$$I_0(t) \doteq \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{\infty} C_{-\frac{1}{2}}^k \left(-\frac{1}{p^2}\right)^k = \frac{1}{p} \left(1 - \frac{1}{p^2}\right)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{p^2-1}}.$$

3.111. Доказать, что

$$\frac{1}{\sqrt{p^2+1}} \doteq J_0(t) \iff \int_0^{\infty} J_0(t) e^{-pt} dt = \frac{1}{\sqrt{p^2+1}}. \quad (3.35)$$

3.112. Найти изображения функций:

$$\begin{aligned} &1) tJ_0(t); \quad 2) J_1(\alpha t); \quad 3) tJ_1(t); \quad 4) \frac{J_1(\alpha t)}{t}; \quad 5) I_1(\alpha t); \\ &6) t^2 I_2(t); \quad 7) \frac{J_1(\sqrt{t})}{\sqrt{t}}; \quad 8) \frac{I_0(\alpha t) - \cos \beta t}{t^2}; \quad 9) \operatorname{ber}_2 \sqrt{t}. \end{aligned}$$

3.113. Просуммировать ряды:

$$1) \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\cos \theta) \frac{t^n}{n!}; \quad 2) \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\cos \theta) \frac{(-1)^n t^n}{n!}.$$

3.114. Получить соответствие

$$f(t) = J_\nu(2\alpha\sqrt{t})J_\nu(2\beta\sqrt{t}) \doteq F(p) = \frac{1}{p} e^{-\frac{\alpha^2+\beta^2}{p}} I_\nu\left(\frac{2\alpha\beta}{p}\right), \quad \nu > -1.$$

3.115. Если $f_1(t)$, $f_2(t)$ — оригиналы с показателями роста σ_1 , σ_2 соответственно и $f_1 \doteq F_1$, $f_2 \doteq F_2$, то

$$f_1(t)f_2(t) \doteq \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} F_1(q)F_2(p-q) dq,$$

где $\sigma > \sigma_1$, $\Re p > \sigma + \sigma_2$. Используя приведенное соответствие, найти изображения произведений:

$$1) \sqrt{\frac{2}{\pi t}} \operatorname{sh} t; \quad 2) \sqrt{\frac{2}{\pi t}} \cos t; \quad 3) I_0(t) \sin t; \quad 4) J_1(t) \cos t.$$

Пример 3.8. Правило дробных показателей. Пусть $F(p) \rightarrow 0$ при $p \rightarrow \infty$, $\Re p < a$ (a — некоторое положительное число) и имеет в конечной p -плоскости единственную особенность, а именно: $p = 0$ — точку ветвления конечного порядка. Если $F(p)$ представима обобщенным степенным рядом

$$F(p) = p^\alpha \sum_{k=0}^{\infty} c_k p^{k\beta},$$

где β — положительное рациональное число, то оригиналом является ряд

$$f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k}{\Gamma(-\alpha - k\beta) t^{k\beta + \alpha + 1}},$$

в котором вычеркнуты все члены с целыми неотрицательными $\alpha + k\beta$.

Найти оригинал функции $F(p) = \frac{1}{p\sqrt{p}} e^{-\frac{\tau}{p}}$. Пусть $p = \lambda + \sigma$, тогда при фиксированном $a > 0$ и при условии $\Re p < a$

$$|F(p)| = \frac{e^{-\frac{\lambda\tau}{|p|^2}}}{|p|^{\frac{3}{2}}} \leq \frac{e^{\frac{\lambda\tau}{\lambda^2 + \sigma^2}}}{|p|^{\frac{3}{2}}} \xrightarrow{p \rightarrow \infty} 0,$$

что доказывает применимость правила дробных показателей. Итак,

$$F(p) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-\tau)^k}{k! p^{\frac{3}{2}}} \doteq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-\tau)^k t^{k+\frac{1}{2}}}{k! \Gamma\left(k + \frac{3}{2}\right)}.$$

По формуле удвоения для $\Gamma(z)$ при $z = k + 1$

$$k! \Gamma\left(k + \frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi} k! \Gamma(2k + 2)}{2^{2k+1} \Gamma(k + 1)} = \frac{\sqrt{\pi} (2k + 1)!}{2^{2k+1}},$$

следовательно,

$$f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k 2^{2k+1} \tau^k t^{k+\frac{1}{2}}}{\sqrt{\pi} (2k + 1)!} = \frac{1}{\sqrt{\pi \tau}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2\sqrt{t\tau})^{2k+1}}{(2k + 1)!} = \frac{\sin 2\sqrt{t\tau}}{\sqrt{\pi \tau}}.$$

3.116. Доказать, что при $\tau \geq 0$:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \frac{\cos 2\sqrt{t\tau}}{\sqrt{\pi t}} \doteq \frac{e^{-\frac{\tau}{t}}}{\sqrt{p}}; \\ 2) \quad & \left(\frac{t}{\tau}\right)^{\frac{\nu}{2}} J_{\nu}(2\sqrt{t\tau}) \doteq \frac{e^{-\frac{\tau}{t}}}{p^{\nu+1}}, \quad \nu > -1; \\ 3) \quad & \left(\frac{t}{\tau}\right)^{\frac{\nu}{2}} I_{\nu}(2\sqrt{t\tau}) \doteq \frac{e^{\frac{\tau}{t}}}{p^{\nu+1}}, \quad \nu > -1. \end{aligned} \quad (3.36)$$

3.117. Вычислить интеграл

$$\int_0^{\infty} \sqrt{\tau^{\mu}(t - \tau)^{\nu}} J_{\mu}(\alpha\sqrt{\tau}) J_{\nu}(\beta\sqrt{t - \tau}) d\tau, \quad \mu > -1, \nu > -1.$$

3.118. Найти оригиналы, которым соответствуют изображения (при условии $\operatorname{Re} \nu > -1$):

$$\begin{aligned} 1) \quad & \frac{1}{p^{\nu+1}} \sin\left(\frac{1}{p} + \frac{3\pi\nu}{4}\right); \quad 2) \quad \frac{1}{p^{\nu+1}} \cos\left(\frac{1}{p} + \frac{3\pi\nu}{4}\right); \\ 3) \quad & \frac{1}{p^{\nu+1}} e^{\frac{1}{p}}; \quad 4) \quad \frac{2}{p^{\nu+1}} sh \frac{1}{p}; \quad 5) \quad \frac{2}{p^{\nu+1}} ch \frac{1}{p}. \end{aligned}$$

3.119. Изображение $F(p) = \frac{1}{p\sqrt{p}} e^{\frac{1}{4p}} \left(1 + \frac{1}{2p}\right)$. Найти оригинал.

3.120. Найти оригиналы, соответствующие изображениям:

$$1) \quad \frac{1}{\sqrt{p}} e^{-\frac{1}{\sqrt{p}}} \sin \sqrt{p}; \quad 2) \quad \frac{1}{\sqrt{p}} e^{-\frac{1}{\sqrt{p}}} \cos \sqrt{p}.$$

3.121. Показать, что при $\nu > 0$:

$$1) \quad t^{\frac{\nu}{2}} J_{\nu}(2\sqrt{t}) \doteq \gamma\left(\nu, \frac{1}{p}\right); \quad 2) \quad (-1)^{\nu} t^{\frac{\nu}{2}} I_{\nu}(2\sqrt{t}) \doteq \gamma\left(\nu, -\frac{1}{p}\right).$$

3.122. Применяя правило дробных показателей, найти оригиналы функций:

$$1) F(p) = \frac{1}{\sqrt{p}} e^{\frac{1}{p}} I_{\nu} \left(\frac{1}{p} \right), \quad \nu > -\frac{1}{2}; \quad 2) F(p) = \frac{1}{\sqrt{p}} e^{-\frac{1}{p}} I_{\nu} \left(\frac{1}{p} \right), \quad \nu > -\frac{1}{2}.$$

3.123. Найти изображения, оригиналы которых:

$$1) \frac{\sin \sqrt{t}}{t}; \quad 2) \sqrt{t} \cos \sqrt{t}.$$

3.124. Найти изображения функций: 1) $\frac{sh 2\sqrt{t}}{\sqrt{\pi}}$; 2) $\frac{ch 2\sqrt{t}}{\sqrt{\pi t}}$.

Пример 3.9. Обобщенная теорема умножения: если $F(p) \doteq f(t)$ и $G(p)e^{-\tau\varphi(p)} \doteq g(t, \tau)$, $\tau \geq 0$, то

$$F(\varphi(p)) G(p) \doteq \int_0^{\infty} f(\tau) g(t, \tau) d\tau. \quad (3.37)$$

Пусть, в частности, $F(p) \doteq f(t)$, $G(p) = \frac{1}{p\sqrt{p}}$, $\varphi(p) = \frac{1}{p}$. Тогда (см. пример 3.6)

$$G(p)e^{-\tau\varphi(p)} = \frac{1}{p\sqrt{p}} e^{-\frac{\tau}{p}} \doteq \frac{\sin 2\sqrt{t\tau}}{\sqrt{\pi\tau}}.$$

Следовательно,

$$\int_0^{\infty} f(\tau) \frac{\sin 2\sqrt{t\tau}}{\sqrt{\pi\tau}} d\tau \doteq \frac{1}{p\sqrt{p}} F \left(\frac{1}{p} \right).$$

3.125. Установить соответствия:

$$\begin{aligned} 1) & \int_0^{\infty} f(\tau) \frac{\cos 2\sqrt{t\tau}}{\sqrt{\pi\tau}} d\tau \doteq \frac{1}{\sqrt{p}} F \left(\frac{1}{p} \right); \\ 2) & \int_0^{\infty} f(\tau) \left(\frac{t}{\tau} \right)^{\frac{n}{2}} J_n(2\sqrt{t\tau}) d\tau \doteq \frac{1}{p^{n+1}} F \left(\frac{1}{p} \right); \\ 3) & \int_0^{\infty} f(\tau) \frac{e^{-\frac{\tau^2}{4t}}}{\sqrt{\pi t}} d\tau \doteq \frac{1}{\sqrt{p}} F(\sqrt{p}). \end{aligned} \quad (3.38)$$

3.126. Показать, что

$$\frac{e^{-\alpha\sqrt{p}}}{p} \doteq \operatorname{Erf} \frac{\alpha}{2\sqrt{t}}. \quad (3.39)$$

3.127. Известно, что $u(t) \doteq U(p)$; установить соотношение

$$U(p) e^{-\frac{\sqrt{p}}{a}x} \doteq \frac{1}{a\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{u(\tau) e^{-\frac{x^2}{4a(t-\tau)}}}{(t-\tau)^{\frac{3}{2}}} d\tau. \quad (3.40)$$

3.128. Показать, что если $f(t) \doteq F(p)$, то:

$$1) \int_0^t J_0\left(2\sqrt{(t-\tau)\tau}\right) f(\tau) d\tau \doteq \frac{1}{p} F\left(p + \frac{1}{p}\right); \quad (3.41)$$

$$2) \int_0^t J_0(\sqrt{t^2 - \tau^2}) f(\tau) d\tau \doteq \frac{F(\sqrt{p^2 + 1})}{\sqrt{p^2 + 1}}; \quad (3.42)$$

$$3) \int_0^t I_0(\sqrt{t^2 - \tau^2}) f(\tau) d\tau \doteq \frac{F(\sqrt{p^2 - 1})}{\sqrt{p^2 - 1}}. \quad (3.43)$$

3.129. Доказать, что

$$\frac{e^{-\alpha\sqrt{p}}}{\sqrt{p}(\sqrt{p} + a)} \doteq e^{\alpha a + a^2 t} \operatorname{Erf} \left(\frac{\alpha}{2\sqrt{t}} + a\sqrt{t} \right), \quad \alpha \geq 0. \quad (3.44)$$

3.130. Найти оригиналы, изображения которых (при $\alpha > 0$):

$$\begin{aligned} 1) \frac{1}{p\sqrt{p}} e^{-\alpha\sqrt{p}}; \quad 2) \frac{1}{p^2} e^{-\alpha\sqrt{p}}; \quad 3) e^{-\alpha\sqrt{p}}; \quad 4) \frac{\sqrt{a}}{p\sqrt{p+a}}; \\ 5) \frac{\sqrt{p+a}}{p}; \quad 6) \frac{e^{-\alpha\sqrt{p}}}{\sqrt{p}+a}; \quad 7) \frac{ae^{-\alpha\sqrt{p}}}{p(\sqrt{p}+a)}; \quad 8) \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{p}(p+a)}. \end{aligned}$$

3.131. Доказать, что при $\rho > 0$

$$\frac{K_0(\rho\sqrt{p})}{pK_0(\sqrt{p})} \doteq 1 - \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{J_0(\xi)Y_0(\rho\xi) - Y_0(\xi)J_0(\rho\xi)}{J_0^2(\xi) + Y_0^2(\xi)} \cdot \frac{e^{-\xi^2 t}}{\xi} d\xi, \quad (3.45)$$

$$\frac{K_0(\rho\sqrt{p})}{\sqrt{p}K_1(\sqrt{p})} \doteq \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{J_1(\xi)Y_0(\rho\xi) - Y_1(\xi)J_0(\rho\xi)}{J_1^2(\xi) + Y_1^2(\xi)} \cdot e^{-\xi^2 t} d\xi. \quad (3.46)$$

3.132. Применяя равенство Парсеваля

$$\int_0^{\infty} f(t)G(t)dt = \int_0^{\infty} F(p)g(p)dp,$$

где $f \doteq F$, $g \doteq G$, вычислить интегралы:

$$1) \int_0^{\infty} \frac{(1 - e^{-\alpha t})^2}{t^2} dt, \quad \alpha > 0; \quad 2) \int_0^{\infty} \frac{J_0(\alpha t) - \cos(\beta t)}{t^2} dt.$$

3.133. Установить соответствие

$$\frac{a}{t^2 + a^2} \doteq \text{ci}(ap) \sin(ap) - \left(\frac{\pi}{2} - \text{si}(ap) \right) \cos(ap), \quad a > 0.$$

3.134. Показать, что

$$\int_0^{\infty} e^{-t} t^{n+\frac{\alpha}{2}} J_{\alpha}(2\sqrt{tx}) dt = n! x^{\frac{\alpha}{2}} e^{-x} L_n^{\alpha}(x), \quad \alpha \geq 0, \quad n \in \mathbb{N}.$$

3.135. При $t > 0$ решить задачи Коши:

$$1) \quad u_t + a^2 \lambda u = f(t), \quad 2) \quad u_{tt} + a^2 \lambda u = f(t), \\ u(0) = 0; \quad u(0) = u'(0) = 0.$$

3.136. Пусть $u(t)$ — решение задачи Коши для линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами

$$\sum_{m=0}^n a_m u^{(m)}(t) = f(t), \quad t > 0, \quad (3.47) \\ u(0) = u'(0) = \dots = u^{(m-1)}(0) = 0,$$

а $v(t)$ — решение задачи (3.47) при $f(t) = 1$. Применяя интеграл Дюамеля (3.28), показать, что

$$u(t) = \int_0^t f(\tau) v'(t - \tau) d\tau = f(0) v(t) + \int_0^t v(\tau) f'(t - \tau) d\tau. \quad (3.48)$$

3.137. Решить задачу Коши

$$u'' - a^2 u(t) = A \operatorname{erf} t, \quad t > 0, \\ u(0) = u'(0) = 0,$$

руководствуясь формулой (3.48).

Пример 3.10. Преобразования Лапласа и Фурье связаны между собой:

$$\mathcal{L}[f](p) = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}[f e^{-\sigma t}](\lambda), \quad \sigma > \sigma_0. \quad (3.49)$$

Пусть $\mathcal{D}'_+(\sigma_0)$ — множество обобщенных функций $f(t) \in \mathcal{D}'(R)$, таких что $f(t) = 0$ при $t < 0$ и $f(t)e^{\sigma t} \in \mathcal{J}'(R)$ при $\sigma > \sigma_0$. Преобразованием Лапласа обобщенной функции $f(t) \in \mathcal{D}'_+(\sigma_0)$ мы называем функционал, определенный соотношением (3.49). В частности

$$\mathcal{L}[\delta(t)](p) = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}[\delta(t)e^{-\sigma t}](\lambda) = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}[\delta](\lambda) = 1.$$

Ряд свойств изображений преобразования Лапласа верны для обобщенных функций, что следует из соотношения (3.49) и свойств преобразования Фурье.

3.138. Найти изображение обобщенной функции $D^m \delta(t - \tau)$, $\tau \geq 0$.

3.139. Доказать, что

$$D^m f(t) \doteq p^m F(p), \quad (3.50)$$

где D^m — оператор обобщенного дифференцирования.

3.140. Пусть $f(t) \in C^m(t \geq 0)$, показать, что:

$$\{D^m f\} \doteq p^m F(p) - \sum_{k=1}^m p^{m-k} f^{(k-1)}(0),$$

где $f^{(k)}(0) = \lim_{t \rightarrow +0} f^{(k)}(t)$.

3.141. Доказать, что

$$\mathcal{L}[f * D^m \delta] = \mathcal{L}[f] \mathcal{L}[D^m \delta].$$

Пример 3.11. Конец полуограниченной линии ($0 < x$) с параметрами R, C ($L = G = 0$) подключается к батарее с э.д.с. E_0 через конденсатор C_0 . Определить потенциал линии.

Решение. Потенциал $u(x, t)$ и ток $i(x, t)$ удовлетворяют условиям

$$u_x + iR = 0, \quad 0 < x, \quad 0 < t,$$

$$i_x + u_t C = 0,$$

$$u(0, t) = E_0 - \frac{1}{C_0} \int_0^t i(0, \tau) d\tau, \quad u(x, 0) = i(x, 0) = 0.$$

Для изображений $U(x, p) \doteq u(x, t)$, $I(x, p) \doteq i(x, t)$ получается задача

$$\begin{aligned} U_x + IR &= 0, \quad 0 < x, \\ I_x + pCU &= 0, \\ U(0, p) &= \frac{E_0}{p} - \frac{1}{C_0} \frac{I(0, p)}{p}, \quad |U(x, p)| < \infty. \end{aligned}$$

Из первого уравнения системы следует, что

$$RI(x, p) = -U_x(x, p), \quad RI(0, p) = -U_x(0, p).$$

Подстановка этих выражений во второе уравнение системы и в граничное условие приводит к задаче для функции $U(x, p)$:

$$\begin{aligned} U_{xx} - pRCU &= 0, \quad 0 < x, \\ U(0, p) - \frac{U_x(0, p)}{pRC_0} &= \frac{E_0}{p}, \quad |U(x, p)| < \infty, \end{aligned}$$

решение которой

$$U(x, p) = \frac{E_0 e^{-\sqrt{pRC}x}}{\sqrt{p} \left(\sqrt{p} + \frac{1}{C_0} \sqrt{\frac{C}{R}} \right)}.$$

Оригинал восстанавливается по формуле (3.44):

$$u(x, t) = E_0 e^{\frac{Cx}{C_0} + \frac{Ct}{RC_0^2}} \operatorname{Erf} \left(\frac{x}{2} \sqrt{\frac{RC}{t}} + \frac{1}{C_0} \sqrt{\frac{Ct}{R}} \right).$$

3.142. Решить задачу 2.498, где $0 < l \leq \infty$ (если $l = \infty$, то $|u(x, t)| < \infty$), применяя интегральное преобразование Лапласа.

3.143. В точке ($x = 0$) неограниченной струны ($-\infty < x < \infty$), находящейся в покое, имеется шарик, масса которого M . На шарик действует пружинка, перпендикулярная к струне, с коэффициентом упругости k и сила трения, пропорциональная скорости шарика (коэффициент пропорциональности α задан). В момент $t = 0$ шарик получает импульс $I\mathbf{e}_u$ в результате удара в точку $x = 0$. Решить задачу о движении струны.

3.144. В точке ($x = 0$) неограниченной струны ($-\infty < x < \infty$), находящейся в покое, имеется шарик, на который действует пружинка в направлении, перпендикулярном к струне (коэффициент упругости пружинки k дан). С момента $t = 0$ на шарик действует постоянная сила $F_0\mathbf{e}_u$. Решить задачу о движении струны, если масса шарика равна M .

3.145. В точке ($x = 0$) неограниченной струны ($-\infty < x < \infty$) имеется шарик, к которому присоединена пружинка с коэффициентом упругости k . С момента времени $t = 0$ свободный конец A пружинки движется по закону $\mu(t)$ вдоль оси Ox относительно своего начального положения. Решить задачу о колебаниях струны при нулевых начальных условиях, если масса шарика равна M .

3.146. Найти потенциал и ток в полубесконечной линии ($0 < x$) с параметрами L, C ($R = G = 0$), конец которой подключается к батарее с э.д.с. $E(t)$ через: 1) сосредоточенное сопротивление R_0 ; 2) сосредоточенную индуктивность L_0 ; 3) конденсатор C_0 . Рассмотреть случай постоянной э.д.с. E_0 .

3.147. К концу линии ($0 < x < \infty$) без искажения ($RC = LG$) подключается через сосредоточенное сопротивление R_0 батарея с э.д.с. $E(t)$. Найти ток и потенциал линии.

3.148. Найти потенциал полубесконечной линии ($0 < x$) без искажения ($LC = RG$), конец которой заземляется через конденсатор C_0 , заряженный до потенциала u_0 .

3.149. Точечная масса M движется по оси Ox с постоянной скоростью $v_0 \mathbf{e}_x$, и в момент времени $t = 0$ в результате удара прилипает к свободному концу полуограниченного стержня ($0 < x$). Решить задачу о движении этой механической системы, если до соударения стержень находился в статическом равновесии.

3.150. На конце полуограниченной трубки ($0 < x$), заполненной идеальным газом, находится поршень, на который при движении действует сила трения, пропорциональную скорости. В момент времени $t = 0$ в результате продольного удара поршень приобретает скорость v_0 в положительном направлении оси Ox . Определить в акустическом приближении отклонение $u(x, t)$ от положения равновесия тонкого слоя газа с начальной координатой x ; масса поршня M , коэффициент трения α .

3.151. В сечении $x = 0$ стержня ($-\infty < x < \infty$) с прямоугольным поперечным сечением (см. рис. 1.12) имеется тонкая прокладка, масса которой m . В момент времени $t = 0$ в результате поперечного удара в точку $x = 0$ стержень получает импульс I . Найти закон движения прокладки.

3.152. Определить потенциал полубесконечной линии ($0 < x$) с параметрами R, C ($L = G = 0$), конец которой подключается к батарее с э.д.с. $E(t)$. Рассмотреть случай постоянной э.д.с. E_0 .

3.153. К концу полуограниченной линии ($0 < x$) через сосредоточенное сопротивление R_0 подключается батарея с постоянной э.д.с. E_0 . Найти ток в линии, если ее параметры R, C ($L = G = 0$).

3.154. К концу полубесконечной линии ($0 < x$) в момент времени $t = 0$ подключается батарея с э.д.с. $E(t) = kt\eta(t - t_0)$, $t_0 > 0$. Определить ток, протекающий через батарею, если параметры линии R, C ($L = G = 0$).

3.155. К концу полуограниченной линии ($0 < x$) без утечки подключается батарея с постоянной э.д.с. E_0 . Найти ток через батарею.

3.156. Найти потенциал линии ($-\infty < x < \infty$), параметры которой следующие:

$$L = G = 0, \quad R(x) = \begin{cases} R_1, & x < 0, \\ R_2, & 0 < x, \end{cases} \quad C(x) = \begin{cases} C_1, & x < 0, \\ C_2, & 0 < x, \end{cases}$$

если в момент времени $t = 0$ потенциал и ток соответственно равны $u_0 \operatorname{sign} x$ и нулю.

3.157. Найти потенциал линии ($-\infty < x < \infty$), параметры которой следующие:

$$R = G = 0, \quad L(x) = \begin{cases} L_1, & x < 0, \\ L_2, & 0 < x, \end{cases} \quad C(x) = \begin{cases} C_1, & x < 0, \\ C_2, & 0 < x, \end{cases}$$

если начальное распределение потенциала $u_0 \operatorname{sign} x$.

3.158. Конец полуограниченной линии ($x > 0$) с параметрами R, C ($L = G = 0$) заземлен через конденсатор, емкость которого C_0 , заряд q_0 . Найти зависимость заряда конденсатора от времени после замыкания линии.

3.159. В полуограниченную трубку ($0 < x$) через конец $x = 0$ поступает поток частиц плотности q_0 . Определить концентрацию частиц в процессе диффузии при нулевых начальных условиях.

3.160. Неограниченная трубка ($-\infty < x < \infty$) заполнена веществом, коэффициент диффузии которого D_1 при $x < 0$, и D_2 при $x > 0$. В трубке диффундирует неустойчивый газ, распад которого пропорционален концентрации (коэффициент пропорциональности β дан). В сечении $x = 0$ расположена полупроницаемая перегородка, плотность потока газа через которую пропорциональна разности концентраций по обе ее стороны (коэффициент

пропорциональности α известен). В момент $t = 0$ концентрация газа равна u_0 при $x < 0$ и нулю при $x > 0$. Определить концентрацию газа в процессе диффузии при $x > 0$.

3.161. Полуограниченный стержень ($0 < x$) с теплоизолированной боковой поверхностью имеет постоянную температуру u_0 . Какой плотности тепловой поток надо подавать на торец стержня, чтобы температура торца менялась со временем по закону $\mu(t)$?

3.162. Решить предыдущую задачу, если $u_0 = 0$, а температура торца меняется по закону: 1) At^β , $\beta \geq 0$; 2) $u_1(e^{\alpha t} - 1)$, $\alpha \geq 0$.

3.163. Через торец $x = 0$ стержня ($0 < x$) с теплоизолированной боковой поверхностью происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой u_0 . Решить задачу теплопроводности, если начальная температура стержня равна нулю.

3.164. Через торец стержня ($0 < x$) с теплоизолированной боковой поверхностью происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой $\theta(t)$. Какой должна быть функция $\theta(t)$, чтобы температура торца менялась со временем по заданному закону $\mu(t)$? Начальная температура стержня равна нулю. Рассмотреть случаи: 1) $\mu(t) = At$; 2) $\mu(t) = A\sqrt{t}$.

3.165. Температура торца $x = 0$ полуограниченного стержня ($0 < x$) с теплоизолированной боковой поверхностью меняется по закону $u_0 e^{\alpha t} \eta(t - t_0)$. Найти температуру стержня в момент времени $t = t_0$, если начальная температура равна нулю.

3.166. В полуограниченный стержень ($0 < x$) с теплоизолированной боковой поверхностью через торец $x = 0$ поступает тепловой поток, плотность которого $q_0 e^{\alpha t} \eta(t - t_0)$. Найти температуру стержня в момент времени $t = t_0$, если начальная температура равна нулю.

3.167. Через торец стержня ($0 < x$) с теплоизолированной боковой поверхностью происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой $u_0 e^{\alpha t} \eta(t - t_0)$. Найти температуру торца $x = 0$ в момент времени $t = t_0$, если начальная температура равна нулю.

3.168. В тонкой неограниченной трубке ($-\infty < x < \infty$) с полупроницаемой перегородкой в сечении $x = 0$ диффундирует газ. Решить задачу диффузии, если начальная концентрация газа равна u_1 при $x < 0$, u_2 при $x > 0$.

3.169. Найти температуру бесконечного стержня с теплоизолированной поверхностью, составленного из двух различных однородных стержней с параметрами ρ_i, k_i, C_i ($i = 1, 2$), если их начальная температура равна u_1 и u_2 соответственно.

3.170. Часть ($x > 0$) поверхности бесконечного цилиндрического стержня ($-\infty < x < \infty$) теплоизолирована, а через остальную поверхность происходит теплообмен со средой, температура которой u_0 . Найти температуру в сечении $x = 0$ и плотность теплового потока через это сечение, если начальная температура стержня равна нулю.

3.171. Определение концентрации частиц в неоднородном слое (задачи 2.210, 2.211) основано на разных моделях граничных условий при $x = 0$, которые обеспечивают правильное распределение частиц при $t \rightarrow \infty$. Для более полного исследования этих моделей необходимо проанализировать процесс диффузии при $t \rightarrow +0$. Выражения для концентрации, полученные методом Фурье, для этой цели мало пригодны из-за медленной сходимости рядов при малых t . Применяя интегральное преобразование Лапласа, показать, что при условиях задачи (2.210)

$$\lim_{t \rightarrow +0} u_i(0, t) = c_i \frac{u_1 \sqrt{D_1} + u_2 \sqrt{D_2}}{c_1 \sqrt{D_1} + c_2 \sqrt{D_2}}, \quad i = 1, 2,$$

т. е. на границе $x = 0$ в момент времени $t = 0$ происходит скачок концентрации, а плотность потока в этот момент неограничена. Используя результаты, полученные при решении задачи 2.66, показать, что

$$\begin{aligned} u_i(0, t) &\rightarrow u_i(0, \infty) + 0, & \gamma(\delta_1 - \delta_2) &> 0, \\ u_i(0, t) &\rightarrow u_i(0, \infty) - 0, & \gamma(\delta_1 - \delta_2) &< 0, \end{aligned} \quad (3.51)$$

где $\gamma = \frac{u_2}{c_2} - \frac{u_1}{c_1}$, $\delta_i = \frac{l_i}{\sqrt{D_i}}$, $i = 1, 2$.

3.172. Показать, что при условиях задачи 2.211 концентрация частиц и плотность потока на границе $x = 0$ имеют при $t \rightarrow +0$ вид

$$\begin{aligned} u_{1,2}(0, t) &= u_{1,2} \pm \frac{4\alpha\gamma}{\sqrt{\pi D_{1,2}}} \sqrt{t} + o(\sqrt{t}), \\ q(0, t) &= \alpha\gamma \left(1 + \frac{4\alpha}{\sqrt{\pi}} \frac{c_2 \sqrt{D_2} - c_1 \sqrt{D_1}}{c_1 c_2 \sqrt{D_1 D_2}} \sqrt{t} \right) + o(\sqrt{t}), \end{aligned}$$

т. е. при $t = 0$ концентрация непрерывна на границе, а плотность потока имеет конечное значение. Будут ли в данном случае выполняться соотношения (3.51)?

3.173. Полуограниченный стержень ($0 < x$) с теплоизолированной боковой поверхностью, составленный из двух однородных стержней — конечного ($0 < x < l$), физические характеристики которого k_1 , ρ_1 , C_1 , и полубесконечного ($l < x$) с характеристиками κ_2 , ρ_2 , C_2 , имеет нулевую температуру. Определить температуру полубесконечного стержня ($l < x$), если торец $x = 0$ начиная с момента времени $t = 0$ поддерживается при температуре u_0 .

3.174. На струну ($0 < x < l$) с закрепленными концами действует сила, линейная плотность которой $f_0 \sin \frac{3\pi x}{l} \mathbf{e}_u$. Решить при нулевых начальных условиях задачу о колебаниях: 1) однородной струны; 2) струны с шариком, масса которого M , в точке $x = l/3$.

3.175. В стержне ($0 < x < l$), торец $x = 0$ и боковая поверхность которого теплоизолированы, а торец $x = l$ поддерживается при нулевой температуре, действуют тепловые источники, мощность которых в единице объема $f_0 \cos \frac{\pi x}{l} e^{-\alpha t}$, $\alpha > 0$. Решить при нулевых начальных условиях задачу теплопроводности, если: 1) стержень однороден; 2) в сечении с координатой $x = l/2$ имеется сосредоточенная теплоемкость C_0 .

3.176. Недеформированный упругий стержень ($0 < x < l$) выводится из состояния статического равновесия постоянной силой $F_0 \mathbf{e}_x$, приложенной к свободному торцу $x = l$ начиная с момента $t = 0$. Найти закон движения торца $x = 0$, если на него действует сила трения, пропорциональная скорости. При каком условии отсутствует отраженная волна? Как движется торец $x = 0$ в этом случае?

3.177. Найти форму поверхности жидкости в канале (см. задачу 1.323), если начальное отклонение имеет форму тонкого вертикального слоя (вдоль оси Oy), возвышающегося над горизонтальной поверхностью (объем жидкости на единицу длины слоя равен Q), а начальные скорости равны нулю. Дать также приближенное решение при условии $x^2/t \gg 1$.

3.178. Жидкость в канале (см. задачу 1.323) возбуждается в результате мгновенного изменения давления на узкой полоске, расположенной вдоль оси Oy на поверхности жидкости. Найти

форму поверхности, если начальные отклонения равны нулю, а импульс давления равен I . Получить также приближенное решение при условии $x^2/t \gg 1$.

3.179. В начальный момент времени поверхность жидкости в канале (см. задачу 1.323) имеет форму

$$\zeta(x, 0) = \frac{Q}{\pi} \frac{a}{a^2 + x^2},$$

а начальные скорости равны нулю. Исследовать движение жидкости в сечении $x = 0$.

3.180. Боковая поверхность и торец $x = l$ стержня ($0 < x < l$) теплоизолированы, а через торец $x = 0$ поступает тепловой поток, плотность которого постоянна и равна $q_0 \mathbf{e}_x$. Решить задачу теплопроводности, если начальная температура стержня равна нулю.

3.181. Боковая поверхность и торец $x = l$ стержня ($0 < x < l$) теплоизолированы, а через торец $x = 0$ происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой равна нулю. Решить задачу теплопроводности при нулевой начальной температуре.

3.182. Решить задачу теплопроводности для однородного стержня ($0 < x < l$) с теплоизолированной боковой поверхностью, температура торцов $x = 0$ и $x = l$ которого равна нулю и u_0 соответственно. Получить ответ в двух формах: 1) в виде ряда, который сходится тем быстрее, чем больше t ; 2) в виде ряда, который сходится тем быстрее, чем меньше t .

3.183. Торец $x = 0$ однородного стержня ($0 < x < l$) закреплен, а торец $x = l$ с сосредоточенной массой M свободен. С момента времени $t = 0$ на свободный торец действует постоянная сила $F_0 \mathbf{e}_x$. Решить задачу о движении стержня при нулевых начальных условиях.

3.184. Торец $x = 0$ упругого стержня ($0 < x < l$) закреплен, а другой свободен. В момент времени $t = 0$ происходит удар в торец $x = l$ тела, масса которого M , движущегося вдоль оси Ox в отрицательном направлении. Показать, что время соударения $\tau > \frac{2l}{a}$. При каких $\mu = \frac{m}{M}$, где m — масса стержня, значение $\tau \in \left(\frac{2l}{a}, \frac{4l}{a}\right)$? Каково это значение?

3.185. Решить предыдущую задачу для стержня со свободным торцом $x = 0$, находящегося на гладкой горизонтальной поверхности.

3.186. Два упругих стержня, отличающиеся только длинами l_1 и l_2 , расположены на оси Ox и движутся вдоль нее с различными скоростями. В момент времени $t = 0$ стержни сталкиваются. Определить время τ , в течение которого происходит соударение.

3.187. Два упругих стержня одинаковой формы (длина каждого l) с физическими характеристиками ρ_1, E_1 и ρ_2, E_2 расположены на оси Ox и движутся вдоль нее с различными скоростями. В момент времени $t = 0$ стержни сталкиваются. Определить время τ , в течение которого происходит соударение.

3.188. Стержень, длина которого l , расположенный на оси Ox , движется вдоль нее и в момент времени $t = 0$ сталкивается с неподвижным полуограниченным стержнем ($0 < x$). Определить время τ , в течение которого длится соударение, если физические характеристики первого стержня ρ_1, E_1 , второго — ρ_2, E_2 , а их поперечные сечения одинаковы.

3.189. Замедлитель с поглощением ($\Sigma_c \ll \Sigma_s$) занимает полупространство ($z > 0$) и граничит с вакуумом ($z < 0$). В точке с координатами $x = y = 0, z = z_0 > 0$ действует изотропный источник, испускающий Q_0 быстрых нейтронов в единицу времени с летаргией $u = 0$. Определить плотность замедления нейтронов при условии, что они из вакуума не возвращаются.

3.190. Шар, радиус которого r_0 , помещен в однородную неограниченную среду с начальной температурой u_1 . Найти распределение температуры в среде, если шар поддерживается при постоянной температуре u_0 .

3.191. В пространстве, температура которого равна нулю, имеется сферическая полость. С момента $t = 0$ через границу $r = r_0$ полости во внешнее пространство поступает радиальный тепловой поток, плотность которого $q(t)$. При какой плотности потока температура сферической поверхности будет меняться со временем по закону $\mu(t)$? Рассмотреть случаи: 1) $\mu(t) = At$; 2) $\mu(t) = A\sqrt{t}$.

3.192. В однородной неограниченной среде имеется сферическая полость, радиус которой r_0 ; температура полости $\theta(t)$, начальная температура внешней среды равна нулю. На сферической поверхности $r = r_0$ происходит теплообмен по закону Ньютона. Известно, что температура этой поверхности $\mu(t)$. Определить темпе-

ратуру $\theta(t)$ полости. Рассмотреть частные случаи: 1) $\mu(t) = At$; 2) $\mu(t) = A\sqrt{t}$.

3.193. Шар, радиус которого r_0 , находится в среде с характеристиками ρ , C , k . Через поверхность шара происходит теплообмен по закону Ньютона. Начальная температура среды равна нулю, температура шара — заданная функция времени $u_0(t)$. Какое количество тепла теряет шар в единицу времени? Рассмотреть частный случай $u_0(t) = u_0$.

3.194. В однородной неограниченной среде с коэффициентом диффузии D находится шар с полупроницаемой поверхностью, радиус которого r_0 . Начальная концентрация нейтронов во внешней среде равна нулю, их концентрация в шаре при любом $t > 0$ постоянна и равна u_0 . Найти поток нейтронов через поверхность шара, если диффузия во внешней среде сопровождается поглощением нейтронов, пропорциональным их концентрации (коэффициент пропорциональности α задан).

3.195. В однородной неограниченной среде с характеристиками ρ , C , k находится шар с характеристиками ρ_0 , C_0 , k_0 , радиус которого r_0 ; теплопроводность шара много больше теплопроводности среды, начальные температуры шара и среды равна нулю. При условии $4\rho_0 C_0 \leq 3\rho C$ решить задачу об остывании шара после мгновенного выделения в нем равномерно распределенного по объему количества тепла Q ; получить асимптотическое представление температуры шара при $t \rightarrow \infty$.

3.196. Найти температуру, обусловленную камуфлетным ядерным взрывом в однородном изотропном массиве (см. задачу 1.215), если начальная температура массива u_1 , газовой полости u_0 , источники тепла в полости отсутствуют.

3.197. Решить предыдущую задачу при условии, что с момента $t = 0$ в полости действуют источники, мощности которых в единице объема: 1) q_0 ; 2) $b/\sqrt{t}$.

3.198. Найти температуру полости (см. задачу 3.196), если с момента $t = 0$ в ней действуют источники тепла, мощность которых в единице объема $q_0 \exp(\beta t)$, $\beta > 0$.

3.199. В бесконечном однородном замедлителе с поглощением ($\Sigma_c \ll \sigma_s$) находится шар, радиус которого r_0 и в котором в результате деления рождается (равномерно по объему) Q_0 быстрых нейтронов в единицу времени с летаргией $u = 0$. Найти

плотность замедления нейтронов вне шара, если их замедлением в шаре можно пренебречь.

3.200. Найти установившийся ток в линии ($0 < x$) с параметрами L, G ($R = C = 0$), подключенной к батарее с э.д.с. $E_0 \sin \omega t$.

3.201. Линия ($0 < x$) с параметрами L, G ($R = C = 0$) подключается к батарее с э.д.с. $E_0 \sin \omega t$ через сосредоточенную индуктивность L_0 . Найти установившийся ток через батарею.

3.202. Найти установившийся ток в полубесконечной линии ($0 < x$) с параметрами R, C ($L = G = 0$), к концу которой подключена батарея с э.д.с. $E_0 \sin \omega t$.

3.203. Линия ($0 < x$) с параметрами R, C ($L = G = 0$) подключается к батарее с э.д.с. $E_0 \sin \omega t$ через конденсатор C_0 . Найти установившийся ток через батарею.

3.204. Найти установившуюся температуру в полубесконечном стержне с теплоизолированной боковой поверхностью, конец которого имеет температуру $u_0 \sin \omega t$.

3.205. Основания круглой шайбы, радиус которой r_0 , теплоизолированы, а боковая поверхность поддерживается при температуре u_0 . Определить температуру шайбы в момент времени $t > 0$, если при $t = 0$ она имела нулевую температуру.

3.206. Решить предыдущую задачу при условии, что на боковой поверхности шайбы происходит теплообмен по закону Ньютона со средой, температура которой u_0 .

3.207. В полуограниченную трубу ($r < r_0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < z$) втекает вязкая несжимаемая жидкость, скорость которой в сечении $z = 0$ постоянна и равна $u_0 e_z$. При условиях задачи 1.338 найти скорость жидкости, если ее течение стационарно.

3.208. В неограниченной среде имеется цилиндрический канал, радиус которого r_0 . В момент времени $t = 0$ в канал вводится длинный радиоактивный стержень. Определить концентрацию нейтронов в среде в процессе диффузии, если их начальная концентрация равна нулю, а концентрация на поверхности канала $u_0(t)$. Рассмотреть случай $u_0(t) \equiv u_0$.

3.209. Решить предыдущую задачу для канала с полупроницаемой поверхностью, если радиус стержня равен радиусу канала, а концентрация нейтронов в стержне постоянна и равна u_0 .

3.210. Бесконечный цилиндрический стержень, радиус которого r_0 , находится в неограниченной среде. Теплоемкость единицы длины стержня C_0 , его теплопроводность много больше теплопроводности среды. Найти температуру стержня, если его начальная температура u_0 , а температура среды при любом t равна нулю.

3.211. В однородной неограниченной пластине с теплоизолированными гранями имеется цилиндрический канал, радиус которого r_0 . Определить температуру пластины при $t > 0$, если ее начальная температура равна нулю, а поверхность канала поддерживается при постоянной температуре u_0 .

3.212. В неограниченной пластине, толщина которой l , просверлен цилиндрический канал, радиус которого r_0 . Пластина имеет нулевую температуру. С момента $t = 0$ на поверхность канала подается радиальный тепловой поток плотности q_0 . Найти распределение температуры в пластине, если ее грани поддерживаются при нулевой температуре.

3.213. Недеформированный упругий стержень ($0 < x < l$), торцы $x = 0$ которого закреплен посредством пружинки с коэффициентом жесткости k , выводится из состояния статического равновесия постоянной силой $F_0 \mathbf{e}_x$, приложенной к свободному торцу $x = l$. Показать, что скорость торца ($x = 0$)

$$v(0, t) = \frac{2aF_0}{ES} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-ah(t-t_n)} L_n(2ah(t-t_n)) \eta(t-t_n),$$

где $h = \frac{k}{ES}$, $t_n = \frac{l}{a}(2n+1)$, $L_n(x)$ — многочлен Чебышева–Лагерра.

3.3. Преобразование Меллина

Пример 3.12. Пусть функция $f(r)$ определена на $(0, \infty)$ и является кусочно-гладкой на каждом конечном промежутке $(0, r_0)$. Если существуют такие вещественные числа $\sigma_1 < \sigma_2$, что

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f| r^{\sigma-1} dr < \infty, \quad \sigma > \sigma_1, \\ \int_1^{\infty} |f| r^{\sigma-1} dr < \infty, \quad \sigma < \sigma_2, \end{aligned} \tag{3.52}$$

то интеграл

$$\mathcal{M}[f](p) = \int_0^{\infty} f(r) r^{p-1} dr, \quad p = \sigma + i\lambda, \quad (3.53)$$

называемый преобразованием Меллина функции $f(r)$, сходится в полосе ($\sigma_1 < \operatorname{Re} p < \sigma_2$) и представляет собой аналитическую функцию в этой полосе. Прообраз $f(r)$ выражается через образ $\mathcal{M}[f](p)$ посредством обратного преобразования

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma - i\infty}^{\sigma + i\infty} \mathcal{M}[f](p) r^{-p} dp, \quad \sigma_1 < \operatorname{Re} p = \sigma < \sigma_2. \quad (3.54)$$

Соответствие $f(r) \leftrightarrow \mathcal{M}[f](p)$ является взаимно однозначным.

Функция

$$f(r) = \frac{r r_0 \sin \varphi_0}{r^2 + r_0^2 - 2r r_0 \cos \varphi_0}$$

при $\sigma_1 = -1$, $\sigma_2 = 1$ удовлетворяет условиям (3.52), поэтому

$$\begin{aligned} \mathcal{M}[f](p) &= r_0 \sin \varphi_0 \int_0^{\infty} \frac{r^p dr}{r^2 + r_0^2 - 2r r_0 \cos \varphi_0} = \\ &= r_0^p \sin \varphi_0 \int_0^{\infty} \frac{\xi^p d\xi}{1 + \xi^2 - 2\xi \cos \varphi_0} = r_0^p \sin \varphi_0 I(p). \end{aligned}$$

Пусть $p \in (-1; 1)$. Вычисление интеграла $I(p)$ на комплексной плоскости $\zeta = \xi + i\eta$ осуществляется с помощью замкнутого контура, составленного из двух concentрических окружностей $|\zeta| = \rho$, $|\zeta| = R$ и двух берегов разреза L_1 и L_2 по отрезку $[\rho, R]$ вещественной оси (рис. 3.4). Выделение однозначной ветви степенной функции ζ^p (следовательно, подынтегральной функции) определяется выбором аргумента ζ :




Рис. 3.4

$0 < \arg \zeta < 2\pi$. По теореме Коши о вычетах

$$\int_{\rho}^R \frac{\rho e^{2\pi i}}{R e^{2\pi i}} + \int_{R e^{2\pi i}}^{\rho} + \int_{C_R} + \int_{C_{\rho}} = 2\pi i \sum_{k=1}^2 \operatorname{res} \left(\frac{\zeta^p}{1 + \zeta^2 - 2\zeta \cos \varphi_0} \right) \Big|_{\zeta=\zeta_k}, \quad (3.55)$$

где $\zeta_{1,2} = \cos \varphi_0 \pm i \sin \varphi_0$, или согласно выбору однозначной ветви подынтегральной функции $\zeta_1 = \exp(i\varphi_0)$, $\zeta_2 = \exp(i(2\pi - \varphi_0))$ есть простые полюсы подынтегральной функции. Так как $-1 < \cos \varphi_0 < 1$ то интегралы по окружностям C_{ρ} и C_R

$$\int_{C_{\rho}} \cdot = O(\rho^{p+1}), \quad \rho \rightarrow 0, \quad \int_{C_R} \cdot = O(R^{p-1}), \quad R \rightarrow \infty,$$

стремятся к нулю при $\rho \rightarrow 0$ и $R \rightarrow \infty$ соответственно, а второй интеграл в (3.55) заменой $\zeta = z e^{2\pi i}$ преобразуется в $-I(p) e^{2\pi i}$, то соотношение (3.55) запишется в виде

$$I(p) (1 - e^{2\pi i p}) = 2\pi i \left(\frac{e^{ip\varphi_0}}{2i \sin \varphi_0} + \frac{e^{ip(2\pi - \varphi_0)}}{-2i \sin \varphi_0} \right).$$

В результате

$$I(p) = \frac{\pi \sin p(\pi - \varphi_0)}{\sin \varphi_0 \sin \pi p},$$

т. е. две функции, аналитические в полосе $-1 < \operatorname{Re} p < 1$, принимают одинаковые значения на промежутке $(-1; 1)$. Поэтому они равны в любой точке полосы. Таким образом, при $-1 < \operatorname{Re} p < 1$

$$\frac{r r_0 \sin \varphi_0}{r^2 + r_0^2 - 2r r_0 \cos \varphi_0} \leftrightarrow \frac{\pi r_0^p \sin p(\pi - \varphi_0)}{\sin \pi p}. \quad (3.56)$$

3.214. Установить соответствие:

$$\frac{r_0^2 \sin \varphi_0}{r^2 + r_0^2 + 2r r_0 \cos \varphi_0} \leftrightarrow \frac{\pi r_0^p \sin(1-p)\varphi_0}{\sin \pi p}, \quad (3.57)$$

где $-\pi < \varphi_0 < \pi$, $0 < \operatorname{Re} p < 2$.

3.215. Потенциал равномерно заряженной прямой (заряд q на единицу длины) на расстоянии r от нее равен $C - 2q \ln r$ и одинаков в любой плоскости, перпендикулярной прямой. Следовательно, можно говорить о точечном заряде в $\mathbb{R}^2$, расположенном в одной из плоскостей с координатными осями Ox и Oy . Таким

образом, потенциал в точке с полярными координатами (r, φ) заряда q , полярные координаты которого $(r_0 > 0, 0)$,

$$u(r, \varphi) = 2q \ln \frac{1}{\sqrt{r^2 - 2rr_0 \cos \varphi + r_0^2}} + C.$$

1) Убедиться в том, что преобразование Меллина функции $u(r, \varphi)$ не существует, если $C \neq 2q \ln r_0$; 2) показать, что при $C = 2q \ln r_0$ функция $u(r, \varphi)$ имеет преобразование Меллина, определенное в полосе $\sigma_1 < \operatorname{Re} p < \sigma_2$, и найти $\sigma_1, \sigma_2, \mathcal{M}[f](p, \varphi)$.

3.216. Найти $\mathcal{M}[f](p)$ следующих функций:

1) $\eta(r_0 - r)$; 2) $\eta(r - r_0)$; 3) $\frac{1}{1+r}$; 4) $\frac{1}{(1+r)^2}$.

3.217. Установить соответствие: $e^{-r} \leftrightarrow \Gamma(p)$.

3.218. Найти преобразования Меллина функций:

1) $\sin ar$; 2) $\cos ar$, где $a > 0$.

3.219. Доказать, что:

1) $\mathcal{M}[\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2](p) = \alpha_1 \mathcal{M}[f_1](p) + \alpha_2 \mathcal{M}[f_2](p)$;

2) $f(ar) \leftrightarrow a^{-p} \mathcal{M}[f](p)$, $a > 0$

3) $r^\alpha f(r) \leftrightarrow \mathcal{M}[f](p + \alpha)$;

4) $f(r^\beta) \leftrightarrow \frac{1}{\beta} \mathcal{M}[f]\left(\frac{p}{\beta}\right)$.

3.220. Найти $\mathcal{M}[f](p)$, следующих функций при $a > 0$:

1) e^{-ar} ; 2) re^{-r} ; 3) e^{-r^2} ; 4) re^{-ar^2} ; 5) $a\sqrt{r}e^{-\sqrt{r}}$; 6) $e^{-a\sqrt{r}}$.

3.221. Найти образ $\mathcal{M}[f](p)$ следующих функций при $a > 0$:

1) $r \sin r$; 2) $\frac{\sin r}{r}$; 3) $\sin a\sqrt{r}$; 4) $\cos r^2$; 5) $r^2 \cos ar^2$; 6) $\cos \frac{\sqrt{r}}{a}$.

3.222. Найти $\mathcal{M}[f](p)$ следующих функций при $a > 0$:

1) $r^\alpha \eta(r_0 - r)$; 2) $r^\alpha \eta(r - r_0)$; 3) $\frac{ar}{1+r}$; 4) $\frac{a\sqrt[4]{r}}{1+a\sqrt{r}}$;
 5) $\frac{1}{1+r^2}$; 6) $\frac{r}{1+ar^2}$; 7) $\frac{1}{r+\sqrt{r}}$; 8) $\frac{1}{\sqrt{r}+\sqrt[3]{r}}$.

3.223. Найти образ $\mathcal{M}[f](p)$ следующих функций при $a > 0$:

$$\begin{aligned} & 1) \frac{1}{(1 + \sqrt{r})^2}; \quad 2) \frac{\sqrt{r}}{(\sqrt{a} + \sqrt{r})^2}; \quad 3) \frac{1}{(1 + r^2)^2}; \quad 4) \frac{r}{(1 + r^2)^2}; \\ & 5) \frac{r^2}{(a^2 + r^2)^2}; \quad 6) \frac{a}{(1 + r\sqrt{r})^2}; \quad 7) \frac{r\sqrt{r}}{(1 + ar)^2}; \quad 8) \frac{1}{(\sqrt[4]{r} + \sqrt{r})^2}. \end{aligned}$$

3.224. Найти $\mathcal{M}[f](p)$, где функция $f(r)$ равна:

$$\begin{aligned} & 1) \ln(r + 1); \quad 2) \ln|r - 1|; \quad 3) \ln(r^2 + 1); \quad 4) r \ln(r^2 - 1); \\ & 5) \ln(\sqrt{r} + 1); \quad 6) r \ln|\sqrt{r} - 1|; \quad 7) \ln \frac{r^2 + 1}{|r^2 - 1|}; \quad 8) \ln \frac{\sqrt{r} + 1}{|\sqrt{r} - 1|}. \end{aligned}$$

3.225. Пусть существует $\mathcal{M}[f](p)$; показать, что $\mathcal{M}[f](p)$ определяет регулярную обобщенную функцию в $\mathbf{Z}'_+$ (см. задачи 10.262, 10.263), при этом

$$(\mathcal{M}[f](p), \psi(p)) = (f(r), (r^{p-1}, \psi(p))), \quad \psi(p) \in \mathbf{Z}'_+. \quad (3.58)$$

3.226. Преобразованием Меллина функции $f \in \mathcal{D}'_+$ называется функционал, действующий по правилу (3.58) (см. [10]). Показать, что:

$$\begin{aligned} & 1) \mathcal{M}[D^k \delta(r - r_0)](p) = (-1)^k \frac{\Gamma(p)}{\Gamma(p - k)} r_0^{p-k-1}, \quad r_0 > 0, \quad k \in \mathbb{N}_0; \\ & 2) \mathcal{M}[(\ln r)^k f(r)](p) = D^k \mathcal{M}[f](p). \end{aligned}$$

3.227. Найти $\mathcal{M}[f](p)$ при $r_0 > 0$, $a > 0$, где $f(r) \in \mathcal{D}'_+$:

$$\begin{aligned} & 1) \delta(r - r_0); \quad 2) \delta(ar - 1); \quad 3) \delta(r^2 - 1); \quad 4) r \delta(r^2 - r_0^2); \\ & 5) \delta'(r - 1); \quad 6) r \delta'(r - 1); \quad 7) \delta'(r^2 - 1); \quad 8) r^2 \delta'(r - 1). \end{aligned}$$

3.228. Найти $\mathcal{M}[f](p)$ при $r_0 > 0$ для следующих функций:

$$\begin{aligned} & 1) \ln \frac{1}{r} \eta(1 - r); \quad 2) \frac{\ln r}{1 + r}; \quad 3) \frac{\ln^2 r}{r^2 + 1}; \quad 4) \ln r \delta(r - r_0); \\ & 5) \ln^2 \frac{1}{r} \eta(r - 1); \quad 6) \ln r \ln(1 + r); \quad 7) e^{-r} \ln r; \quad 8) \ln r \delta'(r - r_0). \end{aligned}$$

3.229. Преобразование Меллина функций $f(r)$ и $g(r)$ определено в полосе $\sigma_1 < \operatorname{Re} p < \sigma_2$. Доказать теорему умножения

$$\int_0^\infty f(\rho) g\left(\frac{r}{\rho}\right) \frac{d\rho}{\rho} \leftrightarrow \mathcal{M}[f](p) \mathcal{M}[g](p). \quad (3.59)$$

3.230. Преобразование Меллина функции $f(r)$ определено в полосе Ω_f , а функции $u(r)$ — в полосе Ω_u , пересечение $\Omega_f \cap \Omega_u$ не пусто. Найти преобразования Меллина функций:

$$\begin{aligned} 1) & \int_0^\infty \frac{ru(\rho) d\rho}{r^2 + \rho^2}; & 2) & \int_0^\infty \frac{\rho^2 u(\rho) d\rho}{(r^2 + \rho^2)^2}; & 3) & \int_0^\infty \ln \frac{\sqrt{r} + \sqrt{\rho}}{|\sqrt{r} - \sqrt{\rho}|} \frac{u(\rho)}{\rho} d\rho; \\ 4) & \int_0^\infty \frac{(\ln r - \ln \rho)u(\rho)}{\rho + r} d\rho; & 5) & \int_r^\infty \ln \frac{\rho}{r} \frac{u(\rho)}{\rho} d\rho; & 6) & \int_0^r \ln^2 \frac{\rho}{r} \frac{u(\rho)}{\rho} d\rho. \end{aligned}$$

3.231. Найти преобразования Меллина следующих функций:

$$\begin{aligned} 1) & \int_0^\infty \frac{e^{-\rho} d\rho}{r + \rho}; & 2) & \int_0^\infty \frac{e^{-\rho} d\rho}{r^2 + \rho^2}; & 3) & \int_0^\infty \frac{\ln\left(\frac{r}{\rho} + 1\right) d\rho}{r + \rho}; & 4) & \int_0^\infty \frac{\sin \sqrt{r} d\rho}{\sqrt{\rho} + \sqrt{r}}; \\ 5) & \int_0^\infty \frac{\cos \sqrt{r} d\rho}{\sqrt{\rho}(\sqrt{\rho} + \sqrt{r})}; & 6) & \int_0^r \frac{\sin \rho d\rho}{\rho}; & 7) & \int_r^\infty \frac{\rho d\rho}{(r + \rho)^2}; & 8) & \int_r^\infty \frac{\cos \rho d\rho}{\rho}. \end{aligned}$$

3.232. Известно, что функция $\mathcal{M}[f](p) = F(p)$ аналитична в полосе $\sigma_1 < \operatorname{Re} p < \sigma_2$, а функция $\mathcal{M}[u](p) = U(p)$ — в полосе $1 - \sigma_2 < \operatorname{Re} p < 1 - \sigma_1$; показать, что

$$\int_0^\infty f(r\rho)u(\rho) d\rho \leftrightarrow F(p)U(1-p). \quad (3.60)$$

3.233. При условиях предыдущей задачи найти преобразования Меллина следующих функций:

$$\begin{aligned} 1) & \int_0^\infty e^{-r\rho} u(\rho) d\rho; & 2) & \int_0^\infty \ln |r\rho - 1| u(\rho) d\rho; & 3) & \int_0^{\frac{1}{r}} u(\rho) d\rho; \\ 4) & \int_0^\infty \cos(r\rho) u(\rho) d\rho; & 5) & \int_0^\infty \rho \sin(r\rho) u(\rho) d\rho; & 6) & \int_0^{\frac{1}{r}} u(\rho) d\rho. \end{aligned}$$

3.234. Найти $f(r)$ для следующих $\mathcal{M}[f](p)$:

$$\begin{aligned} 1) & \frac{1}{p^n}, \operatorname{Re} p > 0, n \in \mathbb{N}_0; & 2) & \frac{1}{p^n}, \operatorname{Re} p < 0, n \in \mathbb{N}_0; \\ 3) & \frac{\pi}{\sin \pi p}, -2 < \operatorname{Re} p < -1; & 4) & \frac{\pi}{\cos \pi p}, -\frac{1}{2} < \operatorname{Re} p < \frac{1}{2}; \\ 5) & \frac{\pi}{p \sin \frac{\pi p}{2}}, -2 < \operatorname{Re} p < 0; & 6) & \frac{\pi \operatorname{ctg} \pi p}{p+1}, 0 < \operatorname{Re} p < 1; \\ 7) & \Gamma(p+1), \operatorname{Re} p > -1; & 8) & p(2p+1)\Gamma(p), \operatorname{Re} p > -1. \end{aligned}$$

3.235. Установить соответствие

$$r \frac{d}{dr} r \frac{df}{dr} \leftrightarrow r^p (r f' - p f) \Big|_0^\infty + p^2 \mathcal{M}[f](p). \quad (3.61)$$

Пример 3.13. Найти стационарное распределение температуры внутри двугранного угла ($0 < \varphi < \alpha < 2\pi$), грань $\varphi = \alpha$ которого поддерживается при нулевой температуре, а температура грани $\varphi = 0$ равна $u_0 \eta(r - r_0)$.

Решение задачи

$$r \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0, \quad 0 < r, \quad 0 < \varphi < \alpha,$$

$$u(r, 0) = u_0 \eta(r - r_0), \quad u(r, \alpha) = 0, \quad |u| < \infty,$$

посредством преобразования Меллина возможно, если выполняются условия (3.52). Для их проверки надо оценить поведение функции $u(r, \varphi)$ при $r \rightarrow 0$ и $r \rightarrow \infty$. Необходимые оценки вытекают из представления решения в форме рядов

$$u(r, \varphi) = C_1 \sin \frac{\pi \varphi}{\alpha} r^{\frac{\pi}{\alpha}} + C_2 \sin \frac{2\pi \varphi}{\alpha} r^{\frac{2\pi}{\alpha}} + \dots, \quad r \rightarrow 0,$$

$$u(r, \varphi) = u_0 \left(1 - \frac{\varphi}{\alpha}\right) + D_1 \sin \frac{\pi \varphi}{\alpha} r^{-\frac{\pi}{\alpha}} + \dots, \quad r \rightarrow \infty,$$

которые получаются методом Фурье. Действительно, при $r < r_0$ функция $u(r, \varphi)$ удовлетворяет уравнениям

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < \varphi < \alpha,$$

$$u(r, 0) = u(r, \alpha) = 0,$$

$$|u| < \infty, \quad u(r_0, \varphi) = f(\varphi),$$

последнее из которых содержит неизвестную функцию $f(\varphi)$. Подстановка произведения $u(r, \varphi) = R(r)\Phi(\varphi)$ в уравнение и граничные условия сводит задачу к задаче на собственные значения для $\Phi(\varphi)$ и уравнению для $R(r)$:

$$\Phi'' + \lambda \Phi = 0, \quad 0 < \varphi < \alpha, \quad R'' + \frac{1}{r} R' + \frac{\lambda}{r^2} R = 0, \quad 0 < r < r_0,$$

$$\Phi(0) = \Phi(\alpha) = 0, \quad |R| < \infty.$$

Отсюда следует, что

$$\lambda_n = \left(\frac{\pi n}{\alpha}\right)^2, \quad \Phi_n(\varphi) = \sin \frac{\pi n \varphi}{\alpha}, \quad R_n(r) = C_n r^{\frac{\pi n}{\alpha}}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Таким образом, при $r < r_0$ функция $u(r, \varphi)$ представима первым рядом. Асимптотика определяется первым членом ряда, находить коэффициенты которого не нужно, так что $f(\varphi)$ не используется.

Если $r > r_0$, то $u(r, \varphi)$ — решение задачи

$$\begin{aligned}\Delta u &= 0, \quad r_0 < r, \quad 0 < \varphi < \alpha, \\ u(r, 0) &= u_0, \quad u(r, \alpha) = 0, \\ |u| &< \infty, \quad u(r_0, \varphi) = f(\varphi)\end{aligned}$$

с неоднородным граничным условием. Чтобы применить метод Фурье, нужно освободиться от неоднородности в граничном условии. Это достигается заменой $u(r, \varphi) = v(r, \varphi) + w(r, \varphi)$, где w — частное решение уравнения, удовлетворяющее граничным условиям

$$\begin{aligned}\Delta w &= 0, \quad r_0 < r, \quad 0 < \varphi < \alpha, \\ w(r, 0) &= u_0, \quad w(r, \alpha) = 0, \quad |w| < \infty.\end{aligned}$$

Решение, не зависящее от r , имеет вид $w = u_0 \left(1 - \frac{\varphi}{\alpha}\right)$. Функция $v(r, \varphi)$ является решением однородной задачи и представима рядом по собственным функциям

$$v(r, \varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} D_n r^{-\frac{\pi n}{\alpha}} \sin \frac{\pi n \varphi}{\alpha}.$$

В результате формируется второй ряд из приведенных выше рядов. Если $\sigma_1 = -\frac{\pi}{\alpha}$, $\sigma_2 = 0$, то условия (3.52) для функции $u(r, \varphi)$ выполняются, при этом подстановка в (3.61) обращается в нуль. Переход к $\mathcal{M}[u] \equiv U$ определяет задачу

$$\begin{aligned}U_{\varphi\varphi} + p^2 U &= 0, \quad 0 < \varphi < \alpha, \\ U(p, 0) &= -u_0 \frac{r_0^p}{p}, \quad U(p, \alpha) = 0.\end{aligned}$$

Общее решение $U(p, \varphi) = A \cos p(\alpha - \varphi) + B \sin p(\alpha - \varphi)$ уравнения для U удовлетворяет граничному условию при $\varphi = \alpha$, если $A = 0$, а из граничного условия при $\varphi = 0$ следует $A = -\frac{u_0 r_0^p}{p \sin p\alpha}$. Таким образом,

$$U(p, \varphi) = -u_0 \frac{r_0^p}{p} \frac{\sin p(\alpha - \varphi)}{\sin p\alpha}, \quad -\frac{\pi}{\alpha} < \operatorname{Re} p < 0.$$

Прообраз $u(r, \varphi)$ восстанавливается по формуле обращения

$$u(r, \varphi) = -\frac{u_0}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^p \frac{\sin p(\alpha - \varphi)}{p \sin p\alpha} dp, \quad -\frac{\pi}{\alpha} < \sigma < 0,$$

в которой контур интегрирования — прямая L , расположенная в выделенной полосе аналитичности функции $U(p, \varphi)$ (рис. 3.5)




Рис. 3.5

Особыми точками функции $U(p, \varphi)$ являются простые полюсы $p_n = \frac{\pi n}{\alpha}$, $n \in \mathbb{Z}$. Если $r < r_0$, то множитель $\left(\frac{r_0}{r}\right)^p = e^{p \ln \frac{r_0}{r}}$ есть экспонента с положительным показателем, поэтому для вычисления интеграла следует взять замкнутый контур, включающий дугу C_{1R} и хорду L_R , затем применить теорему Коши о вычетах. При $R \rightarrow \infty$ интеграл по дуге C_{1R} стремится к нулю (по лемме Жордана), $L_R \rightarrow L$ так что

$$\begin{aligned} u(r, \varphi) &= -u_0 \sum_{n=-1}^{-\infty} e^{\frac{\pi n}{\alpha} \ln \frac{r_0}{r}} \frac{\sin \frac{\pi n}{\alpha} (\alpha - \varphi)}{\pi n \cos \pi n} = \\ &= u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{\pi n}{\alpha}} \frac{\sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi}{\pi n} = \frac{u_0}{\pi} \operatorname{Im} S, \end{aligned}$$

где $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n}$, $t = \rho e^{i\psi}$, $\rho = \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{\pi}{\alpha}}$, $\psi = \frac{\pi \varphi}{\alpha}$, при этом $|t| < 1$.

Так как $S'(t) = \frac{d}{dt} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} t^{n-1} = \frac{1}{1-t}$, то сумма степенного ряда $S = -\ln(1-t) + C$.

Если определить однозначную ветвь логарифма условием $\ln 1 = 0$, то $S(0) = -\ln 1 + C$, т. е. $C = 0$. Поскольку $\ln(1-t) = \ln|1-t| + i \arg(1-t)$, то

$$u(r, \varphi) = -\frac{u_0}{\pi} \arg(1-t) = -\frac{u_0}{\pi} \arg(a+ib) = -\frac{u_0}{\pi},$$

где $a = 1 - \rho \cos \psi$, $b = -\rho \sin \psi$. Здесь $\psi = \frac{\pi \varphi}{\alpha} \in (0; \pi)$, поэтому $b < 0$, $a > 0$ (при любом ψ), следовательно, $\gamma \in \left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$, т. е. со-

держится в области главных значений арктангенса, поэтому

$$u(r, \varphi) = -\operatorname{arctg} \frac{-\rho \sin \psi}{1 - \rho \cos \psi} = \operatorname{arctg} \frac{\rho \sin \psi}{1 - \rho \cos \psi}.$$

Угол, представленный арктангенсом в окончательном выражении для $u(r, \varphi)$, расположен в первой четверти и его можно выразить через арккотангенс:

$$u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{1 - \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi \varphi}{\alpha}}{\left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \sin \frac{\pi \varphi}{\alpha}}.$$

Такой же результат получается при $r > r_0$; в этом случае нужно интегрировать по замкнутому контуру, содержащему дугу C_{2R} и отрезок L_R ; вычисление интеграла осуществляется точно так же, как и в предыдущем случае. Впрочем, эту выкладку можно опустить, если заметить, что найденное при $r < r_0$ решение удовлетворяет условиям задачи и при $r \geq r_0$.

3.236. Найти стационарное распределение температуры внутри клина ($0 < \varphi < \alpha$), грань $\varphi = 0$ которого имеет нулевую температуру, а грань $\varphi = \alpha$ — температуру $u_0 \eta(r_0 - r)$.

3.237. Найти стационарную температуру клина ($-\alpha < \varphi < \alpha$), где $0 < \alpha < \pi$, если температура граней $u(r, \pm\alpha) = u_0 \eta(r_0 - r)$.

3.238. Полуплоскость ($0 < r, \varphi = \pi$) поддерживается при температуре $u_0 \eta(r_0 - r)$. Найти стационарное распределение температуры в пространстве.

3.239. Методом преобразования Меллина решить задачу Дирихле для полуплоскости (см. пример 3.3).

3.240. Решить задачу Дирихле

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r < \infty, \quad 0 < \varphi < \alpha \leq 2\pi, \\ u(r, 0) = u_0 \frac{r}{r_0} \eta(r_0 - r), \quad r_0 > 0, \quad u(r, \alpha) = 0.$$

3.241. Решить предыдущую задачу для значений α , равных:

1) $\frac{\pi}{2}$; 2) π ; 3) $\frac{3\pi}{2}$; 4) 2π .

3.242. Решить задачу Дирихле

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r < \infty, \quad 0 < \varphi < \frac{\pi}{4}, \\ u(r, 0) = u_0 \frac{r}{r_0} \eta(r_0 - r), \quad r_0 > 0, \quad u\left(r, \frac{\pi}{4}\right) = 0.$$

3.243. Решить задачу Дирихле

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r < \infty, \quad 0 < \varphi < \alpha \leq 2\pi,$$

$$u(r, 0) = u_0 \frac{r_0}{r} \eta(r - r_0), \quad r_0 > 0, \quad u(r, \alpha) = 0.$$

3.244. Решить предыдущую задачу для значений α , равных:

$$1) \frac{\pi}{4}; \quad 2) \pi; \quad 3) \frac{5\pi}{2}; \quad 4) 2\pi.$$

3.245. Грань $\varphi = 0$ клина ($0 < r < \infty, 0 < \varphi < \alpha \leq 2\pi$) поддерживается при температуре $\frac{u_0}{r_0}(r_0 - r)\eta(r_0 - r)$, $r_0 > 0$, а температура грани $\varphi = \alpha$ равна нулю. Найти стационарный тепловой поток Q через полосу (r_0, ∞) единичной ширины, расположенной на грани $\varphi = 0$.

3.246. Решить предыдущую задачу для значений α , равных:

$$1) \frac{\pi}{6}; \quad 2) \frac{\pi}{3}; \quad 3) \pi; \quad 4) \frac{4\pi}{3}.$$

3.247. Грань $\varphi = 0$ клина ($0 < r < \infty, 0 < \varphi < \alpha \leq 2\pi$), диэлектрическая проницаемость которого $\varepsilon = 1$, имеет потенциал $r_0 u_0 \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r} \right) \eta(r - r_0)$, $r_0 > 0$, а грань $\varphi = \alpha$ поддерживается при нулевом потенциале. Найти плотность заряда на внутренней стороне ($\varphi \rightarrow +0$) грани $\varphi = 0$.

3.248. При условиях предыдущей задачи найти заряд полосы $(0, r_0)$ единичной ширины на внутренней стороне ($\varphi \rightarrow \alpha + 0$) грани $\varphi = \alpha$.

3.249. При условиях задачи 3.248 найти заряд полосы $(0, r_0)$ единичной ширины на внутренней стороне ($\varphi \rightarrow \alpha + 0$) грани $\varphi = \alpha$ для следующих значений α : 1) $\frac{\pi}{6}$; 2) $\frac{\pi}{3}$; 3) π ; 4) $\frac{4\pi}{3}$.

3.250. Решить задачу Дирихле

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r < \infty, \quad 0 < \varphi < \alpha \leq 2\pi,$$

$$u(r, 0) = u_0 \left(\frac{r}{r_0} \right)^\beta \eta(r_0 - r), \quad u(r, \alpha) = 0,$$

где $r_0 > 0$, $\beta > 0$, $\alpha\beta \neq \pi n$, $n \in \mathbb{N}$.

3.251. Решить предыдущую задачу, если: 1) $\alpha\beta = \pi$; 2) $\alpha\beta = 2\pi$.

3.252. Решить задачу Дирихле

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r < \infty, \quad 0 < \varphi < \alpha \leq 2\pi,$$

$$u(r, 0) = 0, \quad u(r, \alpha) = u_0 \left(\frac{r_0}{r} \right)^\beta \eta(r - r_0),$$

где $r_0 > 0$, $\beta > 0$, $\alpha\beta \neq \pi n$, $n \in \mathbb{N}$.

3.253. Решить предыдущую задачу, если: 1) $\alpha\beta = \pi$; 2) $\alpha\beta = 2\pi$.

3.254. Внутри двугранного угла ($0 < \varphi < \alpha$) параллельно ребру расположен проводник с током, координаты которого (r_0, φ_0) ; с единицы длины проводника выделяется тепловая мощность q_0 . Найти стационарное распределение температуры внутри угла, если его грани поддерживаются при нулевой температуре.

3.255. Бесконечная нить расположена параллельно краю проводящей заземленной полуплоскости ($0 < x, y = 0$). Координаты нити (r_0, φ_0) , заряд единицы длины q . Найти электростатический потенциал этой системы.

3.256. Параллельно ребру двугранного угла ($0 < \varphi < \alpha$) с проводящими заземленными гранями расположена нить, заряд единицы длины которой q , координаты $(r = r_0, \varphi = \alpha/2)$. Определить плотность заряда на гранях угла.

3.257. В массивном теле из железа с бесконечно большой магнитной проницаемостью имеется полость в форме двугранного угла ($0 < r, 0 < \varphi < \alpha$). Внутри угла параллельно ребру расположен прямой ток J , координаты которого $r = r_0, \varphi = \varphi_0$. Определить магнитное поле в полости.

3.258. В среде с диэлектрической проницаемостью

$$\varepsilon(x, y) = \begin{cases} \varepsilon_1, & x > 0, -\infty < y < \infty, \\ \varepsilon_2, & x < 0, -\infty < y < \infty \end{cases}$$

перпендикулярно плоскости xOy расположена нить, заряд единицы длины которой q , координаты $(r_0 > 0, 0)$ (точечный заряд в $\mathbb{R}^2$, задача 3.215). Определить потенциал электрического поля в пространстве.

3.259. При условиях предыдущей задачи найти силу, действующую на единицу длины нити.

3.260. В среде с магнитной проницаемостью

$$\mu(x, y, z) = \begin{cases} \mu_1, & x > 0, -\infty < y, z < \infty, \\ \mu_2, & x < 0, -\infty < y, z < \infty \end{cases}$$

течет прямой ток $\mathbf{J} = J\mathbf{e}_z$, $\mathbf{e}_z = [\mathbf{e}_x\mathbf{e}_y]$, пересекающий ось Ox в точке $P(r_0 > 0, 0)$. Найти магнитное поле тока.

3.261. При условиях предыдущей задачи найти силу, действующую на единицу длины тока J .

3.262. Источником постоянного тока является прямая, с единицы длины которой в единицу времени перпендикулярно прямой равномерно по направлениям выделяется заряд J . Прямая расположена в среде с проводимостью

$$\sigma(x, y, z) = \begin{cases} \sigma_1, & x > 0, \quad -\infty < y, z < \infty, \\ \sigma_2, & x < 0, \quad -\infty < y, z < \infty \end{cases}$$

параллельно оси Oz и пересекает ось Ox в точке $x = r_0 > 0$. Найти плотность тока в пространстве.

3.263. Параллельно ребру двугранного угла $(-\alpha < \varphi < \alpha)$, образованного проводящими заземленными полуплоскостями, расположена нить, координаты которой $(r = r_0, \varphi = 0)$, дипольный момент единицы длины которой $\mathbf{p}$. Определить плотность заряда на гранях угла, если $\mathbf{p} = p\mathbf{e}_x$.

3.264. Решить предыдущую задачу, если линейная плотность дипольного момента нити $\mathbf{p} = p\mathbf{e}_y$.

3.265. В среде с диэлектрической проницаемостью, определенной в задаче 3.258, перпендикулярно плоскости xOy расположена нить, дипольный момент единицы длины которой $\mathbf{p} = p_0\mathbf{e}_y$, координаты $(r_0 > 0, 0)$. Определить потенциал электрического поля в пространстве.

3.266. При условиях предыдущей задачи найти силу, действующую на единицу длины нити.

3.267. В диэлектрике с диэлектрической проницаемостью, определенной в задаче 3.258, перпендикулярно плоскости xOy расположена нить, дипольный момент единицы длины которой $\mathbf{p} = p_0\mathbf{e}_y$, координаты $(r_0 > 0, 0)$. Определить потенциал электрического поля диполя.

3.268. При условиях предыдущей задачи найти силу, действующую на единицу длины нити.

Пример 3.14. Через полосу $(0 < r < r_0 < \infty)$ грани $\varphi = \alpha$ двугранного угла $(0 < r, 0 < \varphi < \alpha < 2\pi)$ внутрь угла поступает тепловой поток, плотность которого $q_0\left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta-1}$, $\beta > 0$, а остальная часть грани — полоса $(r_0 < r < \infty)$ — теплоизолирована, грань $\varphi = 0$ поддерживается при нулевой температуре. Найти стационарную температуру двугранного угла, если: 1) $\alpha\beta \neq \frac{(2n+1)\pi}{2}$, $n \in \mathbb{N}_0$; 2) $\alpha\beta = \frac{\pi}{2}$.

Решение. В полярных координатах (r, φ) функция $u(r, \varphi)$ — стационарная температура — удовлетворяет уравнениям

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r, \quad 0 < \varphi < \alpha,$$

$$u(r, 0) = 0, \quad \frac{k}{r} \frac{\partial u}{\partial \varphi} = q_0 \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\beta-1} \eta(r_0 - r), \quad |u| < \infty.$$

Существование преобразования Меллина зависит от формы решения $u(r, \varphi)$ при $r \rightarrow 0$ и $r \rightarrow \infty$, т. е. в окрестностях особых точек уравнения Лапласа. Получить соответствующую асимптотику можно, применяя метод разделения переменных. Пусть выполнено условие 1). При $r < r_0$ частное решение уравнения Лапласа следует отыскивать в виде произведения $Cr^\beta \Phi(\varphi)$. Подстановка в уравнение превращает его в тождество $Cr^{\beta-2}(\Phi'' + \beta^2 \Phi) = 0$, откуда $\Phi(\varphi) = A \sin \beta \varphi + B \cos \beta \varphi$. Функция $Ar^\beta \sin \beta \varphi$ удовлетворяет уравнению Лапласа и условию при $\varphi = 0$, граничное условие при $\varphi = \alpha$ будет выполнено, если $Ak\beta r_0^{\beta-1} \cos \alpha \beta = q_0$. Найденное частное решение определяет замену переменной

$$u(r, \varphi) = v(r, \varphi) + \frac{q_0 r_0}{k\beta} \left(\frac{r}{r_0} \right)^\beta \frac{\sin \beta \varphi}{\cos \alpha \beta},$$

которая преобразует исходную задачу с неоднородными граничными условиями при $\varphi = 0$ в однородную задачу для $v(r, \varphi)$:

$$\Delta v = 0, \quad 0 < r, \quad 0 < \varphi < \alpha,$$

$$v(r, 0) = 0, \quad v_\varphi(r, \alpha) = 0,$$

$$|v| < \infty, \quad v(r_0, \varphi) = f(\varphi)$$

с неизвестной функцией $f(\varphi)$. Решение этой задачи, построенное методом разделения переменных, имеет вид ряда по собственным функциям $\Phi_n(\varphi)$:

$$v(r, \varphi) = \sum_{m=0}^{\infty} R_m(r) \Phi_m(\varphi),$$

$$\Phi_m(\varphi) = \sin \sqrt{\lambda_m} \varphi, \quad \lambda_m = \left(\frac{(2m+1)\pi}{2\alpha} \right)^2, \quad R_m(r) = C_m r^{\frac{(2m+1)\pi}{2\alpha}}.$$

Цель проводимых действий — найти зависимость решения от r при $r \rightarrow 0$, т. е. достаточно знать вид функции $v(r, \varphi)$ с точностью до коэффициентов. Поэтому функция $f(\varphi)$ не используется. Таким образом, при $r \rightarrow 0$

$$u(r, \varphi) = a(\varphi) r^\beta + C_0 \Phi_0(\varphi) r^{\frac{\pi}{2\alpha}} + \dots$$

Необходимым условием существования преобразования Меллина функции $u(r, \varphi)$ является сходимость интеграла

$$\int_0^{r_0} (a(\varphi)r^\beta + C_0\Phi_0(\varphi)r^{\frac{\pi}{2\alpha}})r^{p-1}dr,$$

т. е. необходимо, чтобы $\operatorname{Re} p > -\beta$ и $\operatorname{Re} p > -\frac{\pi}{2\alpha}$.

При $r \rightarrow \infty$ решение также представимо рядом по уже найденным собственным функциям:

$$v(r, \varphi) = \sum_{m=0}^{\infty} D_m r^{-\frac{(2m+1)\pi}{2\alpha}} \Phi_m(\varphi).$$

Для существования преобразования Меллина функции $u(r, \varphi)$ необходимо, чтобы сходиллся интеграл

$$\int_{r_0}^{\infty} r^{-\frac{\pi}{2\alpha} + \beta - 1} dr,$$

т. е. чтобы $\operatorname{Re} p < \frac{\pi}{2\alpha}$. Итак, преобразование $U(p, \varphi) = \mathcal{M}[u]$ определено в полосе $\sigma_1 < \operatorname{Re} p < \frac{\pi}{2\alpha}$, где $\sigma_1 = \max \left\{ -\beta; -\frac{\pi}{2\alpha} \right\}$, и представляет собой аналитическую функцию аргумента p ; при этом выполняется соответствие (3.61), в котором подстановка равна нулю. Чтобы перейти к задаче для $U(p, \varphi)$, остается найти образы функций $u(r, 0)$ и $u_\varphi(r, \alpha)$:

$$U(p, 0) = 0, \quad U_\varphi(p, \alpha) = \int_0^{r_0} \frac{q_0}{k\beta} \left(\frac{r}{r_0}\right)^\beta r^{p-1} dr = \frac{q_0 r_0^p}{k(p+\beta)}.$$

В результате формируется задача

$$\begin{aligned} U_{\varphi\varphi} + p^2 U &= 0, \quad 0 < \varphi < \alpha, \\ U(p, 0) &= 0, \quad U_\varphi(p, \alpha) = \frac{q_0 r_0^p}{k(p+\beta)}, \end{aligned}$$

решение которой

$$U(p, \varphi) = \frac{q_0 r_0^p \sin p\varphi}{k(p+\beta) \cos \alpha p}. \quad (3.62)$$

Особыми точками функции $U(p, \varphi)$ будут простые полюсы $p = -\beta$, $p_m = \frac{2m+1}{2\alpha}$, $m \in \mathbb{Z}$. Образ восстанавливается по формуле обращения

$$u(r, \varphi) = \frac{q_0 r_0}{k 2\pi i} \int_{-i\infty}^{i\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^p \frac{\sin p\varphi}{(p+\beta) \cos \alpha p} dp. \quad (3.63)$$

Далее (так же, как и в примере 3.13) при $\frac{r_0}{r} < 1$ следует выбрать замкнутый контур, содержащий дугу C_2 и хорду L_R (рис. 3.5). В этом случае

$$u(r, \varphi) = \frac{4\alpha q_0 r_0}{k\pi^2} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{(2m+1)\pi}{2\alpha}} \frac{(-1)^m \sin \frac{(2m+1)\pi\varphi}{2\alpha}}{(2m+1)\left(2m+1 + \frac{2\alpha\beta}{\pi}\right)}.$$

Если $\frac{r_0}{r} > 1$, то

$$u(r, \varphi) = \frac{q_0 r_0}{k} \times \left[\left(\frac{r_0}{r}\right)^{\beta} \frac{\sin \beta\varphi}{\beta \cos \alpha\beta} - \frac{4\alpha}{\pi^2} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{(2m+1)\pi}{2\alpha}} \frac{(-1)^m \sin \frac{(2m+1)\pi\varphi}{2\alpha}}{(2m+1)\left(2m+1 - \frac{2\alpha\beta}{\pi}\right)} \right].$$

Задача при условии 1) решена.

Полученные выражения не являются решением задачи в случае 2). Для оценки решения при $r \rightarrow 0$ задачу следует поставить в другой форме (см. пример 2.18):

$$\Delta u = -\frac{q_0 r}{k} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta-1} \delta(\alpha - \varphi) \quad 0 < r, \quad 0 < \varphi < \alpha, \\ u(r, 0) = u_{\varphi}(r, \alpha) = 0, \quad u(r_0, \varphi) = f(\varphi).$$

Согласно процедуре метода разделения переменных решение представляет собой ряд по собственным функциям,

$$\sum_{m=0}^{\infty} u_m(r) \Phi_m(\varphi), \quad \Phi_m(\varphi) = \sin \frac{(2m+1)\pi\varphi}{2\alpha},$$

в котором неизвестные коэффициенты — ограниченные решения уравнений

$$u_m'' + \frac{1}{r} u_m' - \frac{\lambda_m}{r^2} u_m = -\frac{q_0}{k r_0} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta-2}, \quad \lambda_m = \left(\frac{(2m+1)\pi}{2\alpha}\right)^2, \quad m \in \mathbb{N}_0.$$

В зависимости от m получаются решения

$$u_0(r) = C_0 r^{\frac{\pi}{2\alpha}} + M_0 r^\beta \ln r = C_0 r^\beta + M_0 r^\beta \ln r,$$

$$u_m(r) = C_m r^{\frac{(2m+1)\pi}{2\alpha}} + M_m r^\beta, \quad m \in \mathbb{N}.$$

Следовательно,

$$u(r, \varphi) = M_0 \Phi_0(\varphi) r^\beta \ln r + C_0 \Phi_0(\varphi) r^\beta + \dots$$

Преобразование Меллина существует, если сходится интеграл

$$\int_0^{r_0} r^{\beta+p-1} \ln r dr, \quad \text{т. е., если } \operatorname{Re} p > -\beta.$$

Оценка решения при $r \rightarrow \infty$ такая же, как и в первом случае, так что функция $U(p, \varphi)$ определена в полосе $-\frac{\pi}{2\alpha} < \operatorname{Re} p < \frac{\pi}{2\alpha}$ и имеет вид (3.62). В отличие от первого случая изменилось качество особых точек функции $U(p, \varphi)$: появился полюс $p = -\frac{\pi}{2\alpha} = -\beta$, кратность которого равна двум, остальные особые точки — простые полюсы. При $\frac{r_0}{r} < 1$ из формулы (3.63) следует, что решение $u(r, \varphi)$ имеет ту же конструкцию, что и при условии 1):

$$u(r, \varphi) = \frac{4\alpha q_0 r_0}{k\pi^2} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{(2m+1)\pi}{2\alpha}} \frac{(-1)^m \sin \frac{(2m+1)\pi\varphi}{2\alpha}}{(2m+1)(2m+2)}, \quad \frac{r_0}{r} < 1.$$

При $\frac{r_0}{r} > 1$ нужно обратиться к формуле (3.63), откуда

$$u(r, \varphi) = \frac{2q_0 r_0}{k\pi} \left(\frac{r}{r_0}\right)^\beta \left(\frac{2\alpha}{\pi} \sin \frac{\pi\varphi}{2\alpha} + \ln \frac{r_0}{r} \sin \frac{\pi\varphi}{2\alpha} - \varphi \cos \frac{\pi\varphi}{2\alpha} \right) -$$

$$- \frac{4\alpha q_0 r_0}{k\pi^2} \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{(2m+1)\pi}{2\alpha}} \frac{(-1)^m \sin \frac{(2m+1)\pi\varphi}{2\alpha}}{(2m+1)2m}, \quad \frac{r_0}{r} > 1.$$

Решение $u(r, \varphi)$ выражается через элементарные функции в результате суммирования рядов. Если $\frac{r_0}{r} < 1$, то в обозначениях

$$t = \rho e^{i\psi}, \quad \rho = \left(\frac{r_0}{r}\right)^\beta, \quad \psi = \frac{\pi\varphi}{2\alpha}$$

$$u(r, \varphi) = \frac{4\alpha q_0 r_0}{k\pi^2} \operatorname{Im} S, \quad S = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m t^{2m+1}}{(2m+1)(2m+2)}.$$

Сумма

$$S = S_1 - S_2, \quad S_1 = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m t^{2m+1}}{2m+1}, \quad S_2 = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m t^{2m+1}}{2m+2}.$$

Так как

$$S'_1 = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m t^{2m} = \frac{1}{1+t^2}, \quad \text{то } S_1 = \operatorname{arctg} t = -\frac{i}{2} \ln \frac{1+it}{1-it}.$$

Сумма

$$\begin{aligned} S_2 &= \frac{1}{t} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m t^{2m+2}}{2m+2} = \frac{1}{t} \int_0^t \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m t^{2m+1} = \\ &= \frac{1}{t} \int_0^t \frac{\tau d\tau}{1+\tau^2} = \frac{1}{2t} \ln(1+t^2). \end{aligned}$$

В итоге $S = -\frac{i}{2} \ln \frac{1+it}{1-it} - \frac{1}{2t} \ln(1+t^2)$, так что

$$\begin{aligned} u(r, \varphi) &= \frac{\alpha q_0 r_0}{k\pi^2} \ln \frac{r^{2\beta} + 2r^\beta r_0^\beta \cos \psi + r_0^{2\beta}}{r^{2\beta} - 2r^\beta r_0^\beta \cos \psi + r_0^{2\beta}} + \\ &+ \frac{\alpha q_0 r_0}{k\pi^2} \left(\frac{r_0}{r}\right)^\beta \sin \psi \ln \left(1 + 2\left(\frac{r_0}{r}\right)^{2\beta} \cos 2\psi + \left(\frac{r_0}{r}\right)^{4\beta}\right) - \\ &- \frac{2\alpha q_0 r_0}{k\pi^2} \left(\frac{r}{r_0}\right)^\beta \cos \psi \operatorname{arctg} \frac{r_0^{2\beta} \sin 2\psi}{r^{2\beta} + r_0^{2\beta} \cos 2\psi}. \end{aligned}$$

При $\frac{r_0}{r} > 1$ в аналогичных обозначениях $t = \rho e^{i\psi}$, $\rho = \left(\frac{r}{r_0}\right)^\beta$,

$$\psi = \frac{\pi\varphi}{2\alpha}$$

$$S = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m t^{2m+1}}{(2m+1)2m} = -\frac{t}{2} \ln(1+t^2) + t + \frac{i}{2} \ln \frac{1+it}{1-it},$$

откуда

$$\begin{aligned} u(r, \varphi) &= \frac{\alpha q_0 r_0}{k\pi^2} \ln \frac{r^{2\beta} + 2r^\beta r_0^\beta \cos \psi + r_0^{2\beta}}{r^{2\beta} - 2r^\beta r_0^\beta \cos \psi + r_0^{2\beta}} + \\ &+ \frac{\alpha q_0 r_0}{k\pi^2} \left(\frac{r_0}{r}\right)^\beta \sin \psi \ln \left(1 + 2\left(\frac{r_0}{r}\right)^{2\beta} \cos 2\psi + \left(\frac{r_0}{r}\right)^{4\beta}\right) - \\ &- \frac{2\alpha q_0 r_0}{k\pi^2} \left(\frac{r}{r_0}\right)^\beta \cos \psi \operatorname{arctg} \frac{r_0^{2\beta} + r^{2\beta} \cos 2\psi}{r^{2\beta} \sin 2\psi}. \end{aligned}$$

Угол $\gamma = 2\psi - \operatorname{arctg} \frac{r_0^{2\beta} + r^{2\beta} \cos 2\psi}{r^{2\beta} \sin 2\psi}$ может принадлежать интервалу $(-\pi; \pi)$. Поскольку

$$\sin \gamma = \frac{\sin 2\psi}{\sqrt{1 + 2\left(\frac{r_0}{r}\right)^{2\beta} \cos 2\psi + \left(\frac{r_0}{r}\right)^{4\beta}}} > 0,$$

то $\gamma \in (0; \pi)$. А так как

$$\operatorname{ctg} \gamma = \frac{r^{2\beta} + r_0^{2\beta} \cos 2\psi}{r_0^{2\beta} \sin 2\psi}, \quad \text{то} \quad \gamma = \operatorname{arctg} \frac{r^{2\beta} + r_0^{2\beta} \cos 2\psi}{r_0^{2\beta} \sin 2\psi}.$$

С другой стороны, в решении при $\frac{r_0}{r} < 1$ содержится угол в виде $\operatorname{arctg} x$, принадлежащий интервалу $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$, поэтому этот угол можно представить как $\operatorname{arctg} \frac{1}{x}$. А это значит, что выражения, полученные для решения при $\frac{r_0}{r} < 1$ и при $r > r_0$, одинаковы и решение задачи можно представить в виде

$$\begin{aligned} u(r, \varphi) = & \frac{\alpha q_0 r_0}{k\pi^2} \ln \frac{r^{2\beta} + 2r^\beta r_0^\beta \cos \frac{\pi\varphi}{2\alpha} + r_0^{2\beta}}{r^{2\beta} - 2r^\beta r_0^\beta \cos \frac{\pi\varphi}{2\alpha} + r_0^{2\beta}} + \\ & + \frac{\alpha q_0 r_0}{k\pi^2} \left(\frac{r_0}{r}\right)^\beta \sin \frac{\pi\varphi}{2\alpha} \ln \left(1 + 2\left(\frac{r_0}{r}\right)^{2\beta} \cos \frac{\pi\varphi}{\alpha} + \left(\frac{r_0}{r}\right)^{4\beta}\right) - \\ & - \frac{2\alpha q_0 r_0}{k\pi^2} \left(\frac{r}{r_0}\right)^\beta \cos \frac{\pi\varphi}{2\alpha} \operatorname{arctg} \frac{r^{2\beta} + r_0^{2\beta} \cos \frac{\pi\varphi}{\alpha}}{r_0^{2\beta} \sin \frac{\pi\varphi}{\alpha}}. \end{aligned}$$

З а м е ч а н и е. Если в случае 2) в выражении для решения при $r_0 < r$ сразу заменить $\operatorname{arctg} x$ на $\operatorname{arctg} \frac{1}{x}$ и убедиться в том, что преобразованное таким образом решение удовлетворяет всем условиям задачи, то суммирование ряда при $r_0 > r$ станет хотя и не бесполезным, но не обязательным делом.

3.269. Грань $\varphi = \alpha$ однородного клина ($0 < \varphi < \alpha$) теплоизолирована, а грань $\varphi = 0$ поддерживается при температуре $u_0 \eta(r - r_0)$. Найти стационарную температуру клина.

3.270. Найти стационарное распределение температуры в полупространстве $y > 0$, часть границы ($x < 0$) которого теплоизолирована, а другая часть ($x > 0$) имеет температуру $u_0 \eta(r - r_0)$.

3.271. Найти стационарную температуру полупространства $y > 0$, если на границе задан следующий тепловой режим: часть ($x < 0$)

границы поддерживается при нулевой температуре, через полосу ($0 < x < l$) поступает тепловой поток, плотность которого равна $q_0 e_y$, а остальная часть ($x > l$) теплоизолирована.

3.272. Грань $y = 0$ двугранного угла ($0 < x, 0 < y$) поддерживается при нулевой температуре, а грань $x = 0$ теплоизолирована, кроме полосы ($0 < y < l$), через которую извне поступает тепловой поток, плотность которого q_0 . Внутри угла устанавливается стационарный тепловой режим. Какова температура грани $x = 0$?

3.273. В клин ($0 < \varphi < \frac{\pi}{4}$) через грань $\varphi = 0$ поступает тепловой поток, плотность которого $q_0 \eta(r_0 - r)$, столь долго, что в клине устанавливается стационарный тепловой режим. Найти плотность потока через грань $\varphi = \frac{\pi}{4}$, если ее температура постоянна.

3.274. Решить краевую задачу

$$\begin{aligned} \Delta u &= 0, \quad 0 < r < \infty, \quad 0 < \varphi < \alpha \leq 2\pi, \\ u(r, 0) &= u_0 \left(\frac{r_0}{r} \right)^\beta \eta(r - r_0), \quad u_\varphi(r, \alpha) = 0, \\ r_0 > 0, \quad \beta > 0, \quad \alpha\beta &\neq \frac{(2n+1)\pi}{2}, \quad n \in \mathbb{N}_0. \end{aligned}$$

3.275. Решить предыдущую задачу, если: 1) $\alpha\beta = \frac{\pi}{2}$; 2) $\alpha\beta = \pi$;

3) $\alpha\beta = \frac{\pi}{4}$; 4) $\alpha\beta = \frac{3\pi}{4}$; 5) $\alpha\beta = \frac{3\pi}{2}$.

3.276. Грань $\varphi = 0$ клина ($0 < \varphi < \alpha$) имеет нулевую температуру, а грань $\varphi = \alpha$ теплоизолирована, кроме линии, параллельной ребру и отстоящей от него на расстоянии l , через которую извне поступает тепловой поток, линейная плотность которого q_0 . Найти стационарное распределение температуры в клине.

3.277. Внутри двугранного угла ($0 < \varphi < \alpha$) параллельно ребру расположен линейный источник идеальной несжимаемой жидкости, мощность которого на единицу длины равна q_0 , а координаты (r_0, φ_0) . Определить потенциал скоростей жидкости.

3.278. Источником постоянного тока является прямая, с единицы длины которой в единицу времени перпендикулярно прямой равномерно по направлениям выделяется заряд J . Прямая расположена в среде с проводимостью

$$\begin{cases} \sigma_1, & x < 0, \quad -\infty < y, z < \infty, \\ \sigma_2, & 0 < x, \quad -\infty < y, z < \infty \end{cases}$$

параллельно оси Oz и пересекает ось Ox в точке $x = r_0 > 0$ (рис. 3.6, б). Найти плотность тока в пространстве.




Рис. 3.6

3.279. Через пластинку в форме клина протекает постоянный ток J , контактные линии которого расположены на разных гранях (см. задачу 1.442.) Определить плотность тока в пластинке.

3.280. Через пластинку в форме клина протекает постоянный ток J , контактные линии которого расположены на одной грани (см. задачу 1.443.) Определить плотность тока в пластинке, если ее проводимость σ .

3.281. Решить краевую задачу

$$\begin{aligned} \Delta u &= 0, \quad 0 < r < \infty, \quad 0 < \varphi < \alpha \leq 2\pi, \\ -\frac{k}{r} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \Big|_{\varphi=0} &= q_0 \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\beta-1} \eta(r_0 - r), \quad u(r, \alpha) = 0, \\ r_0 > 0, \quad \beta > 0, \quad \alpha(\beta) &\neq \frac{(2n+1)\pi}{2}, \quad n \in \mathbb{N}_0. \end{aligned}$$

3.282. Решить предыдущую задачу, если:

$$1) \alpha\beta = \frac{\pi}{2}; \quad 2) \alpha\beta = \pi.$$

3.283. Внутри двугранного угла ($0 < r, 0 < \varphi < \alpha < 2\pi$) через полосу ($0 < r_0 < r < \infty$) грани $\varphi = \alpha$ входит тепловой поток, плотность которого $q_0 \left(\frac{r_0}{r} \right)^{\beta+1}$, $\beta > 0, \alpha\beta \neq \frac{(2n+1)\pi}{2}, n \in \mathbb{N}_0$, а остальная часть грани — полоса $(0, r_0)$ — теплоизолирована. Найти стационарную температуру двугранного угла, если грань $\varphi = 0$ поддерживается при нулевой температуре.

3.284. Решить предыдущую задачу, если: 1) $2\alpha\beta = \pi$; 2) $\alpha\beta = \pi$.

3.285. Решить задачу из примера 3.14, если: 1) $\alpha\beta = \pi$; 2) $2\alpha\beta = 3\pi$.

3.286. Двугранный угол ($0 < r, 0 < \varphi < \alpha < 2\pi$) представляет собой однородную среду с коэффициентом диффузии D . Через

полосу $(0, r_0)$ грани $\varphi = 0$ внутрь угла проникают частицы, плотность потока которых q_0 , а через полосу $(0, r_0)$ грани $\varphi = \alpha$ выходит поток частиц такой же плотности; остальная поверхность непроницаема для частиц. Найти стационарную концентрацию диффундирующего вещества, если $2\alpha \neq \pi$.

3.287. Решить предыдущую задачу, если: 1) $\alpha = \pi$; 2) $\alpha = 2\pi$.

3.288. Решить задачу 3.286, в которой плотность потока $\beta > 0$, $\alpha \neq \pi$, при равна $q_0 \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta-1}$.

3.289. Решить предыдущую задачу, если: 1) $\alpha\beta = \pi$; 2) $\alpha\beta = 2\pi$.

3.290. Температура грани $\varphi = 0$ клина $(0 < r < \infty, 0 < \varphi < \alpha \leq 2\pi)$ равна $u_0 \left(\frac{r}{r_0}\right)^\beta \ln \frac{r_0}{r} \eta(r_0 - r)$, $r_0 > 0$, $\beta > 0$, $\alpha\beta \neq \pi n$, $n \in \mathbb{N}$, а грань $\varphi = \alpha$ поддерживается при нулевой температуре. Найти стационарную температуру клина.

3.291. Решить предыдущую задачу, если $\alpha\beta = \pi$.

3.292. При условиях задачи 3.290 найти плотность потока через грань $\varphi = \alpha$, если $\alpha\beta = \pi$; чему равна плотность потока в точке $r = r_0$ грани $\varphi = \alpha$?

3.293. Температура грани $\varphi = \alpha$ клина $(0 < r < \infty, 0 < \varphi < \alpha \leq 2\pi)$ равна $u_0 \left(\frac{r_0}{r}\right)^\beta \ln \frac{r}{r_0} \eta(r - r_0)$, $r_0 > 0$, $\beta > 0$, $\alpha\beta \neq \pi n$, $n \in \mathbb{N}$, а грань $\varphi = 0$ поддерживается при нулевой температуре. Найти стационарную температуру клина.

3.294. Решить предыдущую задачу, если $\alpha\beta = \pi$.

3.295. При условиях задачи 3.293 вычислить плотность теплового потока $\mathbf{q}(r, 0)$ через грань $\varphi = 0$ в случае $\alpha\beta = \pi$. Найти также величину $\mathbf{q}(r_0, 0)$.

3.296. Внутри двугранного угла $(0 < r, 0 < \varphi < \alpha < 2\pi)$ через грань $\varphi = 0$ проходит тепловой поток, плотность которого $\mathbf{q}(r) = q_0 \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta-1}$, $\beta > 0$, $2\alpha\beta \neq \frac{(2n+1)\pi}{2}$, $n \in \mathbb{N}_0$, а температура грани $\varphi = \alpha$ равна нулю. Найти стационарную температуру двугранного угла.

3.297. При условиях предыдущей задачи, где $2\alpha\beta = \pi$, найти: 1) плотность потока $\mathbf{q}(r, \alpha)$ через грань $\varphi = \alpha$, в частности, $\mathbf{q}(r_0, \alpha)$; 2) температуру $u(r, 0)$ грани $\varphi = 0$, а также $u(r_0, 0)$.

3.298. Внутри двугранного угла ($0 < r, 0 < \varphi < \alpha < 2\pi$) через грань $\varphi = \alpha$ поступает тепловой поток, плотность которого $q_0 \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\beta+1}$, $\beta > 0, \alpha\beta \neq \frac{(2n+1)\pi}{2}$, $n \in \mathbb{N}_0$, а грань $\varphi = 0$ имеет нулевую температуру. Найти стационарную температуру двугранного угла.

3.299. При условиях предыдущей задачи, где $2\alpha\beta = \pi$, найти:
1) температуру $u(r, \alpha)$ грани $\varphi = \alpha$ и, в частности, $u(r_0, \alpha)$;
2) плотность потока $\mathbf{q}(r, 0)$ через грань $\varphi = 0$, а также $\mathbf{q}(r_0, 0)$.

3.300. Внутри двугранного угла ($0 < r, 0 < \varphi < \alpha < 2\pi$) через полосу ($0 < r < r_0 < \infty$) грани $\varphi = \alpha$ входит тепловой поток, плотность которого $q_0 \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta-1} \ln \frac{r_0}{r}$, где $\beta > 0, \alpha\beta \neq \frac{(2n+1)\pi}{2}$, $n \in \mathbb{N}_0$, а через полосу ($0 < r < r_0$) грани $\varphi = 0$ поток такой же плотности выходит; остальная часть поверхности теплоизолирована. Найти стационарную температуру двугранного угла.

3.301. При условиях предыдущей задачи, где $\alpha\beta = \pi$, найти температуру граней и, в частности, температуру каждой грани при $r = r_0$.

3.302. Внутри двугранного угла ($0 < r, 0 < \varphi < \alpha < 2\pi$) через полосу ($0 < r_0 < r < \infty$) грани $\varphi = 0$ входит тепловой поток, плотность которого $q_0 \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\beta+1}$, $\beta > 0, \alpha\beta \neq \frac{(2n+1)\pi}{2}$, $n \in \mathbb{N}_0$, а через полосу ($0 < r_0 < r < \infty$) грани $\varphi = \alpha$ поток такой же плотности выходит; остальная часть поверхности теплоизолирована. Найти стационарную температуру двугранного угла.

3.303. При условиях предыдущей задачи, где $\alpha\beta = \pi$, найти температуру граней. Чему равна температура каждой грани при $r = r_0$?

3.304. Внутри двугранного угла ($0 < r, 0 < \varphi < \alpha < 2\pi$) через полосу ($0 < r < r_0 < \infty$) грани $\varphi = 0$ втекает идеальная несжимаемая жидкость, плотность потока которой V_0 , а плотность потока жидкости через остальную часть поверхности равна нулю (рис. 3.6, а). Найти скорость жидкости при потенциальном течении, если $\alpha \neq \pi$.

3.305. Решить предыдущую задачу, если $\alpha = \pi$. Определить скорость в точках $(r, 0)$ и (r, α) .

3.306. В однородное полупространство ($y > 0$) через полосу ($-r_0 < x < r_0, y = 0, -\infty < z < \infty$) втекает постоянный ток J

на единицу длины вдоль полосы, равномерно распределенный по ее ширине. Найти плотность тока в среде, если ее проводимость σ .

3.307. В однородную пластинку ($0 < r, 0 < \varphi < \alpha < 2\pi, |z| < d$) втекает через полосу ($0 < r < r_0$) грани $\varphi = 0$ постоянный ток J на единицу длины вдоль полосы, равномерно распределенный по ее ширине, и такой же ток втекает через полосу ($0 < r < r_0$) грани $\varphi = \alpha$. Определить плотность тока в пластинке, если ее проводимость σ .

3.4. Преобразование Ганкеля

Пример 3.15. Если $f(r)$, $r \in (0, \infty)$ — кусочно-гладкая функция на каждом конечном промежутке $(0, r_0)$ и абсолютно интегрируема с весом $\sqrt{r}$, т. е.

$$\int_0^{\infty} |f(r)| \sqrt{r} dr < \infty,$$

то существует интеграл

$$\mathcal{H}_\nu[f](\lambda) = \int_0^{\infty} f(r) J_\nu(\lambda r) r dr, \quad \nu \geq -\frac{1}{2}, \quad (3.64)$$

называемый преобразованием Ганкеля функции $f(r)$; прообраз $f(r)$ выражается через $\mathcal{H}[f](\lambda)$ посредством обратного преобразования

$$f(r) = \int_0^{\infty} \mathcal{H}_\nu[f](\lambda) J_\nu(\lambda r) \lambda d\lambda. \quad (3.65)$$

Функция

$$f(r) = \frac{e^{-x\sqrt{r^2-k^2}}}{\sqrt{r^2-k^2}}, \quad x > 0, \quad k > 0, \quad \arg \sqrt{r^2-k^2} = \frac{\pi}{2} \eta(k-r),$$

удовлетворяет условиям существования интегрального преобразования Ганкеля $\mathcal{H}_\nu[f](\lambda)$. Для его построения можно исходить из интеграла (3.33), который после введения параметров $x > 0$, $r > 0$, $k \geq 0$ по формулам $xr = \tau$, $pr = ik$ и переменной λ по формуле $t = r\sqrt{x^2 + \lambda^2}$ принимает вид

$$\int_0^{\infty} J_0(\lambda r) \frac{e^{-ik\sqrt{\lambda^2+x^2}}}{\sqrt{\lambda^2+x^2}} \lambda d\lambda = \frac{e^{-x\sqrt{r^2-k^2}}}{\sqrt{r^2-k^2}}.$$

Полученное равенство, трактуемое как обратное преобразование (3.65) функции $f(r)$, трансформируется посредством формулы (3.64) в

$$\mathcal{H}_\nu[f](\lambda) \equiv \int_0^\infty J_0(\lambda r) \frac{e^{-x\sqrt{r^2-k^2}}}{\sqrt{r^2-k^2}} r dr = \frac{e^{-ik\sqrt{\lambda^2+x^2}}}{\sqrt{\lambda^2+x^2}}, \quad (3.66)$$

где $x > 0$, $k > 0$, $\arg \sqrt{r^2-k^2} = \frac{\pi}{2}\eta(k-r)$. Это соотношение называется формулой Зоммерфельда.

3.308. Доказать, что

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_\nu \left[\frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{df}{dr} - \frac{\nu^2}{r^2} f \right] (\lambda) = \\ = r (f' J_\nu - f J'_\nu)|_0^\infty - \lambda^2 \mathcal{H}_\nu[f](\lambda). \end{aligned} \quad (3.67)$$

3.309. Доказать, что:

$$1) \int_0^\infty J_0(\lambda r) \frac{\sin k\sqrt{r^2+1}}{\sqrt{r^2+1}} r dr = \frac{\cos \sqrt{k^2-\lambda^2}}{\sqrt{k^2-\lambda^2}} \eta(r-\lambda); \quad (3.68)$$

$$2) \int_0^\infty J_0(\lambda r) \frac{\sin k\sqrt{r^2-1}}{\sqrt{r^2-1}} r dr = \frac{ch \sqrt{k^2-\lambda^2}}{\sqrt{k^2-\lambda^2}} \eta(k-\lambda), \quad (3.69)$$

где $k > 0$, $\arg \sqrt{r^2-1} = \frac{\pi}{2}\eta(1-r)$.

3.310. Найти преобразование $\mathcal{H}_0[f](\lambda)$, если

$$f(r) = \frac{r_0}{(r_0^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad r_0 > 0.$$

3.311. Найти функцию $\mathcal{H}_1[f](\lambda)$, где

$$f(r) = \frac{r}{(r_0^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad r_0 > 0.$$

3.312. Определить функцию $\mathcal{H}_0[f](\lambda)$, где:

$$1) f(r) = \frac{1}{r} e^{-\alpha r^2}; \quad 2) f(r) = e^{-\alpha r^2}, \quad \alpha > 0.$$

3.313. Определить функцию $\mathcal{H}_1[f](\lambda)$, где $f(r) = e^{-\alpha r^2}$, $\alpha > 0$.

3.314. Найти преобразование Ганкеля $\mathcal{H}_0[f](\lambda)$ следующих функций: 1) $\sin \alpha r^2$; 2) $\cos \alpha r^2$, где $\alpha > 0$.

3.315. Определить преобразование Ганкеля $\mathcal{H}_1[f](\lambda)$ функции $f(r) = \sin \alpha r^2$.

3.316. Определить $f(r)$, если

$$\mathcal{H}_0[f](\lambda) = J_0(\lambda r) e^{-a^2 \lambda^2 t}, \quad r \geq 0, \quad t > 0.$$

3.317. Найти изображение $\mathcal{H}_0[f](\lambda)$, где:

$$1) f(r) = \frac{\sin a r^2}{r}; \quad 2) f(r) = \frac{\cos a r^2}{r}.$$

3.318. Найти изображение $\mathcal{H}_0[f](\lambda)$, где:

$$1) f(r) = \sin a r^2; \quad 2) f(r) = \cos a r^2.$$

3.319. Найти изображение $\mathcal{H}_1[f](\lambda)$, где:

$$1) f(r) = \frac{\sin a r^2}{r^2}; \quad 2) f(r) = \frac{\cos a r^2}{r}.$$

3.320. Найти изображение $\mathcal{H}_1[f](\lambda)$, где:

$$1) f(r) = \sin a r^2; \quad 2) f(r) = \cos a r^2.$$

3.321. Найти преобразование Ганкеля $\mathcal{H}_0[f](\lambda)$ следующих функций:

$$1) \frac{\sin kr}{r}; \quad 2) \frac{\cos kr}{r}; \quad 3) \frac{\sin kr}{r^2}, \quad k > 0.$$

3.322. Определить $f(r)$, если:

$$1) \mathcal{H}_0[f](\lambda) = \frac{\sin \alpha \lambda^2}{\lambda^2}; \quad 2) \mathcal{H}_0[f](\lambda) = \cos \alpha \lambda^2.$$

3.323. Функция $f(r)$ удовлетворяет условиям существования преобразования Ганкеля; доказать, что для $\varphi(\lambda) \in \mathcal{D}_+$

$$(\mathcal{H}_n[f](\lambda), \varphi(\lambda)) = \left(f(r), r \mathcal{H}_n \left[\frac{\varphi(\lambda)}{\lambda} \right] (r) \right), \quad n \in \mathbb{N}_0. \quad (3.70)$$

3.324. Преобразованием Ганкеля $\mathcal{H}[f](\lambda)$, $n \in \mathbb{N}_0$, обобщенной функции $f(r) \in \mathcal{D}'_+$ называется функционал, действующий по правилу (3.70). Доказать, что

$$\mathcal{H}_n \left[\frac{\delta(r - r_0)}{r} \right] (\lambda) = J_n(\lambda r_0), \quad r_0 \geq 0. \quad (3.71)$$

Пример 3.16. Решения задач Дирихле и Неймана для полупространства методом интегрального преобразования Ганкеля основано на соотношении (3.67). Если в задаче Дирихле функция f кусочно-непрерывна и ограничена, то подстановка в (3.67) обращается в нуль, что вытекает из оценок (5.47) в примере 5.11. Если в задаче Неймана функция f ограничена, кусочно-непрерывна и удовлетворяет условию $|f| \leq \frac{A}{r^{1+\alpha}}$, где $A > 0$, $\alpha > \frac{1}{2}$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, то подстановка в (3.67) равна нулю. Это следует из оценок (5.66) в решении задачи 5.209.

Найти стационарное распределение температуры в полупространстве $z > 0$, граница которого имеет температуру

$$u_0(r) = u_0 \frac{r_0}{\sqrt{r^2 + r_0^2}}, \quad r_0 > 0.$$

Решение. Вследствие аксиальной симметрии температурного поля задачу естественно поставить в цилиндрических координатах,

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} &= 0, \quad 0 < r, \quad 0 < z, \\ u(r, 0) &= u_0(r), \quad |u(r, z)| < \infty, \end{aligned}$$

и решать, используя интегральное преобразование $\mathcal{H}_0[u](\lambda)$. В данном случае функция $U = \mathcal{H}_0[u]$ удовлетворяет уравнению $U_{zz} - \lambda^2 U = 0$, а из (3.35) явствует, что

$$\mathcal{H}_0[u_0](\lambda) \equiv U(\lambda, 0) = \frac{u_0 r_0}{\lambda} e^{-\lambda r_0}.$$

Таким образом,

$$U(\lambda, z) = C e^{-\lambda z} = \frac{u_0 r_0}{\lambda} e^{-\lambda(r_0 + z)}.$$

Прообраз восстанавливается с помощью формул (3.65) и (3.35):

$$u(r, z) = u_0 r_0 \int_0^\infty e^{-\lambda(r_0 + z)} J_0(\lambda r) d\lambda = \frac{u_0 r_0}{\sqrt{r^2 + (r_0 + z)^2}}.$$

3.325. Решить задачу Дирихле для полупространства

$$\begin{aligned} \Delta u &= 0, \quad 0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < z, \\ u|_{z=0} &= \frac{u_0 r_0^3}{(r^2 + r_0^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad |u| < \infty. \end{aligned}$$

3.326. Решить задачу Дирихле для полупространства

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < z,$$

$$u|_{z=0} = \frac{u_0 r_0^2 r \cos \varphi}{(r^2 + r_0^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad |u| < \infty.$$

3.327. Решить задачу Неймана для полупространства

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < z,$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{z=0} = -\frac{A r_0}{(r^2 + r_0^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad |u| < \infty.$$

3.328. Решить задачу Неймана для полупространства

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < z,$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{z=0} = -\frac{A r \cos \varphi}{(r^2 + r_0^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad |u| < \infty.$$

3.329. На плоской поверхности ($z = 0$) диэлектрика, занимающего полупространство ($z < 0$), находится точечный заряд Q . Найти потенциал электростатического поля.

3.330. В неограниченной среде с коэффициентом диффузии D , имеется цилиндрический канал, радиус которого r_0 . В среде диффундируют частицы примеси, концентрация которых u_0 . Канал заполнили чистым веществом (без примеси) с тем же коэффициентом диффузии D . Решить задачу диффузии.

3.331. В неограниченную пластину ($0 < z < l$), расположенную на идеально проводящем основании $z = 0$, втекает через точечный контакт на поверхности $z = l$ постоянный ток J . Определить потенциал электростатического поля и плотность тока в пластине, если ее проводимость σ .

3.332. Определить стационарную температуру полупространства $z > 0$, граница которого поддерживается при температуре, равной u_0 внутри круга, радиус которого r_0 , и нулю вне этого круга.

3.333. Найти стационарное распределение температуры в полупространстве $z > 0$, на границу которого падает сосредоточенный в точке тепловой поток $Q_0 \mathbf{e}_z$; при этом через границу осуществляется теплообмен по закону Ньютона со средой нулевой температуры.

3.334. В полупространство $z > 0$ по цилиндрическому проводнику, радиус которого r_0 , втекает постоянный ток $J \mathbf{e}_z$; провод-

ник перпендикулярен плоскости $z = 0$. Определить плотность тока в полупространстве, если: 1) проводник сплошной, а ток равномерно распределен по поперечному сечению проводника; 2) проводник полый, а ток равномерно распределен по периметру поперечного сечения проводника.

3.335. Неограниченная пластина ($0 < z < l$), коэффициент теплопроводности которой k_1 , расположена на плоской поверхности массивного тела ($z > l$), коэффициент теплопроводности которого k_2 . Грань $z = 0$ теплоизолирована, кроме точки на этой грани, через которую поступает тепловой поток $Q_0 \mathbf{e}_z$. Считая тепловой режим стационарным, определить температуру поверхности $z = l$. Рассмотреть случай $k_1 = k_2$.

3.336. Точечный заряд Q расположен между проводящими заземленными плоскостями $z = -l$ и $z = l$ на одинаковом расстоянии от каждой. Получить следующее выражение для потенциала:

$$u(r, z) = \frac{q}{\sqrt{r^2 + r^2}} - q \int_0^\infty e^{-\lambda l} \frac{ch \lambda z}{ch \lambda l} J_0(\lambda r) d\lambda.$$

3.337. Поверхность $z = 0$ слоя ($0 < z < l$) имеет нулевую температуру, а поверхность $z = l$ теплоизолирована. В точке с координатами $(0, 0, l/2)$ находится источник тепла мощности Q_0 . Найти стационарное распределение температуры в слое.

3.338. Определить плотность заряда на тонком проводящем диске, радиус которого r_0 , а потенциал u_0 .

3.339. Полупространство $z < 0$ заполнено идеальной несжимаемой жидкостью. Определить форму поверхности жидкости, если начальное отклонение представляет собой тонкий цилиндр (радиус цилиндра много меньше его высоты), объем которого Q , расположенный вертикально над поверхностью, а начальная скорость жидкости равна нулю. Получить приближенное решение для $r \gg 1$, $(t^2/r) \gg 1$.

3.340. Решить предыдущую задачу для жидкости, равновесие которой нарушается из-за мгновенного изменения давления в пределах круга, радиус которого много меньше отношения давления I к его поверхностной плотности. Найти приближенное решение при $r \gg 1$, $(t^2/r) \gg 1$.

3.341. В результате высоковольтного разряда в газе мгновенно выделилось Q единиц тепла, равномерно распределенных по

цилиндру, высота которого $2l$, а радиус много меньше высоты. Найти температуру газа, если до разряда он находился при нулевой температуре.

3.342. Решить предыдущую задачу для газа, движущегося с постоянной скоростью v , разряд в котором направлен перпендикулярно скорости.

3.343. Бесконечная невозбужденная мембрана, расположенная в плоскости xOy , получает в момент $t = 0$ импульс $I\mathbf{e}_u$ в результате удара в точку $(0, 0)$. Решить задачу о движении мембраны.

3.344. Установить соотношение

$$K_0(ar) = \int_0^{\infty} \frac{J_0(\lambda r) \lambda d\lambda}{a^2 + \lambda^2}, \quad r > 0, \quad a > 0, \quad (3.72)$$

решив задачу 6.65 посредством преобразования Ганкеля.

3.345. Получить соотношение

$$\int_0^{\infty} J_0(\lambda r) e^{-\lambda^2 \tau} \lambda d\lambda = \frac{e^{-\frac{r^2}{4\tau}}}{2\tau} \quad r > 0, \quad \tau > 0, \quad (3.73)$$

решив задачу 6.68 с помощью преобразования Ганкеля. Соотношение (3.73) вытекает также из (3.36).

3.346. В однородной среде с поглощением ($\Sigma_c \ll \sigma_s$) действует линейный источник, расположенный на оси Oz , с единицы длины которого в единицу времени испускается Q_0 быстрых нейтронов с летаргией $u = 0$. Найти в диффузионно-возрастном приближении плотность потока тепловых нейтронов.

3.347. В пространстве действует бесконечный линейный источник газа, мощность (количество газа в единицу времени) единицы длины которого $q_0 \cos \beta z$. Найти концентрацию газа в процессе стационарной диффузии.

3.348. С единицы длины бесконечного линейного источника в единицу времени выделяется количество q_0 неустойчивого газа (распад пропорционален концентрации, коэффициент пропорциональности α). Решить стационарную задачу диффузии.

3.349. Решить предыдущую задачу для источника, мощность единицы длины которого $q_0 \cos \beta z$.

3.350. В пространстве действует бесконечный линейный источник тепла, с единицы длины которого в единицу времени выделяется количества тепла q_0 . Решить задачу теплопроводности при нулевой начальной температуре.

3.351. Перпендикулярно проводящей плоскости $z = 0$ расположен луч $\{x, y, z: x = y = 0, 0 < h < z\}$, заряд единицы длины которого q_0 . Определить плотность заряда, индуцированного на плоскости.

3.352. Перпендикулярно проводящей плоскости $z = 0$ расположен отрезок $\{x, y, z: x = y = 0, 0 < a \leq z \leq b < \infty\}$, заряд единицы длины которого q_0 . Найти силу, действующую на отрезок.

3.353. На неограниченную мембрану, расположенную в плоскости $z = 0$, с момент $t = 0$ действует сила $F(t)I\mathbf{e}_z$ приложенная в точку $x = y = 0$. Решить задачу о движении мембраны при нулевых начальных условиях.

3.354. Неограниченная упругая пластинка, толщина которой h , расположенная в плоскости $z = 0$, получает в момент $t = 0$ импульс $I\mathbf{e}_u$ в результате удара в точку $x = y = 0$. Решить задачу о движении пластинки при нулевых начальных условиях.

3.355. На упругую неограниченную пластинку, толщина которой h , действует с момента $t = 0$ сосредоточенная сила F_0 , приложенная в точке $x = y = 0$. Найти прогиб пластинки при нулевых начальных условиях.

3.356. Решить предыдущую задачу, если на пластинку действует сосредоточенная сила $F(t)$.

3.357. Решить задачу Дирихле в полупространстве $z > 0$, на границе которого решение $u(r, z)$ равно $\frac{u_0 r}{r_1} K_1(ar)$, $a > 0$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Найти значения функции $u(r, z)$ на оси Oz и плотность теплового потока через границу $z = 0$.

3.358. Решить задачу Дирихле в полупространстве $z > 0$, если решение $u(r, z)$ на границе равно $u_0 \cos ar^2$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Найти значения функции $u(r, z)$ на оси Oz .

3.359. Решить стационарную задачу теплопроводности в полупространстве $z > 0$, температура границы которого $u_0 e^{-\alpha r^2}$. Какова температура на оси Oz ? Найти также плотность теплового потока через границу $z = 0$. Как зависит плотность потока от r при $r \rightarrow 0$ и $r \rightarrow \infty$?

3.360. Решить стационарную задачу теплопроводности в полупространстве $z > 0$, температура границы которого $\frac{u_0 r_0}{r} \sin \alpha r^2 \cos \varphi$.

Найти плотность теплового потока через границу $z = 0$ и температуру на оси Oz и на плоскости $z = 0$.

3.361. В полупространство $z > 0$ через границу $z = 0$ поступает тепловой поток, плотность которого $\frac{q_0 a^2}{r^2 + a^2} \mathbf{e}_z$. Найти стационарную температуру полупространства и температуру на оси Oz .

3.362. Через границу $z = 0$ в полупространство $z > 0$ поступает тепловой поток, плотность которого $q_0 e^{-\alpha r^2} \mathbf{e}_z$, $\alpha > 0$. Найти стационарную температуру полупространства, а также температуру на границе $z = 0$ и на оси Oz .

3.5. Ответы

- 3.1.** 1) $\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin \frac{\lambda|a|}{2}}{\lambda} e^{\frac{i\lambda|a|}{2}}$; 2) $\frac{\alpha + i\lambda}{\sqrt{2\pi}(\alpha^2 + \lambda^2)}$; 3) $\sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-\frac{|\lambda a|}{\sqrt{2}}}}{|a|^3} \sin\left(\frac{|\lambda a|}{\sqrt{2}} + \frac{\pi}{4}\right)$;
 4) $\frac{\sqrt{2\pi}}{6|a|^5} e^{-|\lambda a|} + \frac{\sqrt{2\pi}}{3|a|^5} e^{-\frac{|\lambda a|}{2}} \sin\left(\frac{|\lambda a|\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{6}\right)$.
- 3.2.** 1) $\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\alpha}{\alpha^2 + \lambda^2}$; 2) $\frac{1}{\sqrt{2\alpha}} e^{-\frac{x^2}{4\alpha}}$; 3) $\sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\operatorname{sh} \frac{\pi x}{2}}$.




Рис. 3.7

Решение. Вычисление интеграла $I = \int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda) d\lambda$, где $f(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i\lambda x} \frac{1}{\operatorname{ch}^2 \lambda}$, проводится на комплексной плоскости (λ) . Исходным является интеграл по границе прямоугольника (рис. 3.7). Так как $\operatorname{ch}(\lambda + i\pi) = -\operatorname{ch} \lambda$, то интеграл по верхней стороне прямоугольника отличается от интеграла по нижней стороне множителем $e^{-\pi x}$, а интегралы по боковым сторонам стремятся к нулю при $\Delta \rightarrow \infty$. В результате

$$I(1 - e^{-\pi x}) = 2\pi i \operatorname{res} f\left(\frac{\pi i}{2}\right),$$

точка $\lambda = \frac{\pi i}{2}$ — полюс второго порядка функции $f(\lambda)$.

$$3.3. \quad 1) \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin |a|\lambda}{\lambda}; \quad 2) \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{2 \sin^2 \frac{\lambda a}{2}}{\lambda^2}; \quad 3) \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\alpha}{\alpha^2 + \lambda^2}; \quad 4) \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{4\pi^2}{\operatorname{ch}^2 \frac{\pi \lambda}{2}}.$$

$$3.4. \quad 1) \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1 - \cos a\lambda}{\lambda}; \quad 2) \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\lambda}{\alpha^2 + \lambda^2}; \quad 3) \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \frac{|a|\lambda}{\sqrt{2}}}{\lambda^2} e^{-\frac{|a|\lambda}{\sqrt{2}}}.$$




Рис. 3.8

3.5. $\sqrt{\frac{\pi}{2}} \eta(|a| - |\lambda|) \operatorname{sign} a$. З а м е ч а н и е. Функция не удовлетворяет достаточным условиям существования преобразования (3.3).

$$3.6. \quad 1) \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\cos \frac{\lambda^2}{2} + \sin \frac{\lambda^2}{2} \right); \quad 2) \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\cos \frac{\lambda^2}{2} - \sin \frac{\lambda^2}{2} \right).$$

$$3.7. \quad 1) \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{|\lambda|^{p-1}}{\Gamma(p) \cos \frac{\pi p}{2}}; \quad 2) \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{|\lambda|^{p-1} \operatorname{sign} \lambda}{\Gamma(p) \sin \frac{\pi p}{2}}.$$

См. замечание в ответе к задаче 3.5.

У к а з а н и е. При вычислении интегралов на комплексной плоскости следует взять вспомогательную функцию $f(z) = z^{-p} e^{-\lambda z}$ и замкнутый контур, изображенный на рис. 3.8.

$$3.8. \quad 1) -\sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{|\lambda|} \eta(|\lambda| - 1); \quad 2) -\sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\lambda} \eta(|\lambda| - 1). \quad \text{См. замечание в ответе к задаче 3.5.}$$

3.9. Р е ш е н и е. Интеграл представляет собой косинус-преобразование Фурье функции

$$f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{(1-x^2)^{n-\frac{1}{2}} \eta(1-|x|)}{(2n-1)!!} \implies f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty \mathcal{F}(\lambda) \cos \lambda x d\lambda.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f] &= \frac{2}{\pi(2n-1)!!} \int_0^1 (1-x^2)^{n-\frac{1}{2}} \cos \lambda x dx = \\ &= \frac{2}{\pi(2n-1)!!} \int_0^1 (1-x^2)^{n-\frac{1}{2}} \sum_0^\infty \frac{(-1)^k (\lambda x)^{2k}}{(2k)!} dx = \\ &= \frac{2}{\pi(2n-1)!!} \sum_0^\infty \frac{(-1)^k \lambda^{2k}}{(2k)!} \int_0^1 (1-x^2)^{n-\frac{1}{2}} x^{2k} dx. \end{aligned}$$

Вычисление интеграла:

$$\int_0^1 (1-x^2)^{n-\frac{1}{2}} x^{2k} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (1-t)^{n-\frac{1}{2}} t^{k-\frac{1}{2}} dt = \frac{1}{2} B\left(n + \frac{1}{2}, k + \frac{1}{2}\right).$$

Таким образом,

$$\mathcal{F}[f] = \sum_0^\infty (-1)^k \lambda^{2k} 2^{n+2k} \Gamma(n+k+1) = \frac{J_n(\lambda)}{\lambda^n}.$$

3.10. Р е ш е н и е. Соотношение (3.11) — результат дифференцирования интеграла по параметру. Вывод формулы (3.12) основан на интегрировании по частям: пусть $x \in \mathbb{R}$, тогда

$$\mathcal{F}[\varphi'](\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty \varphi_x e^{i\lambda x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \varphi e^{i\lambda x} \Big|_{-\infty}^\infty - \frac{i\lambda}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty \varphi e^{i\lambda x} dx = -i\lambda \mathcal{F}[\varphi].$$

$$\mathbf{3.11.} \quad 1) \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\frac{\lambda^2}{4}}; \quad 2) \frac{i^n}{\sqrt{2}} \frac{d^n}{dx^n} e^{-\frac{\lambda^2}{4}}; \quad 3) \frac{(i\lambda)^n}{\sqrt{2}} e^{-\frac{\lambda^2}{4}}.$$

У к а з а н и е. Решение п. 1 получается интегрированием, п. 2 и п. 3 — с помощью формул (3.11) и (3.12).

3.12. Решение. Равномерная по λ оценка

$$|\lambda^\beta D^\alpha \mathcal{F}[\varphi](\lambda)| = |(-i)^{|\alpha|+|\beta|} \mathcal{F}[D^\beta(x^\alpha \varphi)](\lambda)| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |D^\beta(x^{|\alpha|} \varphi)| dx, \quad (3.74)$$

вытекающая из свойств (3.11), (3.12), означает, что $\mathcal{F}[\varphi] \in \mathcal{J}'$. Любая функция $\varphi \in \mathcal{J}$ является преобразованием Фурье некоторой функции ψ , так как (см. (3.5)) $\varphi = \mathcal{F}[\mathcal{F}^{-1}[\varphi]] = \mathcal{F}[\psi]$. Если бы $\varphi = \mathcal{F}[\psi_1] = \mathcal{F}[\psi_2]$, то $\mathcal{F}[\psi_1 - \psi_2] = 0$, откуда $\mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[\psi_1 - \psi_2]] = \psi_1 - \psi_2 = 0$. Для доказательства непрерывности оператора $\mathcal{F}$ использовать оценку

$$|\lambda^\beta D^\alpha \mathcal{F}[\varphi](\lambda)| \leq \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \left(|D^\beta(x^\alpha \varphi)| (1 + |x|^{n+1}) \int_{\mathbb{R}^n} \frac{dx}{1 + |x|^{n+1}} \right),$$

которая следует из (3.74) (см. [15]).

3.19. Решение. Пусть $\psi(\lambda) = \mathcal{F}[\varphi](\lambda)$, тогда

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-k}^k \cos \lambda x d\lambda, \varphi \right) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) dx \int_{-k}^k e^{i\lambda x} d\lambda = \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-k}^k \psi(\lambda) d\lambda = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(\lambda) d\lambda = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda|_{x=0} = \\ &= \varphi(0) = (\delta, \varphi). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{3.20.} \quad \text{Решение п. 2. } \left(\frac{d}{d\lambda} \mathcal{F}[f](\lambda), \varphi(\lambda) \right) &= -(\mathcal{F}[f], \varphi') = \\ &= -(f, \mathcal{F}[\varphi'](\lambda)) = -(f, -ix\mathcal{F}[\varphi]) = (ixf, \mathcal{F}[\varphi]) = (\mathcal{F}[ixf], \varphi). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{3.21.} \quad 1) \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\operatorname{ch} \frac{\pi\lambda}{2}}; \quad 2) i \left(\frac{\pi}{2} \right)^{\frac{3}{2}} \frac{\operatorname{sh} \frac{\pi\lambda}{2}}{\operatorname{ch}^2 \frac{\pi\lambda}{2}}; \quad 3) i \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\lambda}{\operatorname{ch} \frac{\pi\lambda}{2}}; \\ 4) \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{d}{d\lambda} \frac{\lambda}{\operatorname{ch} \frac{\pi\lambda}{2}}; \quad 5) i \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{2\alpha\lambda}{(\alpha^2 + \lambda^2)^2}; \quad 6) i \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \frac{|a|\lambda}{\sqrt{2}}}{\lambda^2} e^{-\frac{|a\lambda|}{\sqrt{2}}}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{3.22.} \quad \text{Решение п. 1. } (\mathcal{F}[f(x - x_0)], \varphi) &= (f(x - x_0), \mathcal{F}[\varphi]) = \\ &= (f, \mathcal{F}[e^{i(x_0, \lambda)} \varphi]) = (\mathcal{F}[f], e^{i(x_0, \lambda)} \varphi) = (e^{i(x_0, \lambda)} \mathcal{F}[f], \varphi). \end{aligned}$$

$$\mathbf{3.23.} \quad 1) \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-x_0\lambda}}{\operatorname{ch} \frac{\pi\lambda}{2}}; \quad 2) \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\operatorname{ch} \frac{\pi(\lambda + \lambda_0)}{2}}; \quad 3) \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{|c| \operatorname{ch} \frac{\pi\lambda}{2c}}.$$

$$\begin{aligned} \mathbf{3.24.} \quad \text{Решение. } \left(\mathcal{F} \left[\mathcal{P} \frac{1}{x} \right], \varphi \right) &= \left(\mathcal{P} \frac{1}{x}, \mathcal{F}[\varphi] \right) = \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_{-\varepsilon}^{-\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^{\varepsilon} \right) \frac{dx}{x} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(\lambda)}{\sqrt{2\pi}} e^{i\lambda x} d\lambda = i \sqrt{\frac{2}{\pi}} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{dx}{x} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\lambda) \sin \lambda x d\lambda = \\ &= i \sqrt{\frac{2}{\pi}} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{dx}{x} \left[-\frac{\varphi(\lambda) \cos \lambda x}{x} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi'(\lambda) \cos \lambda x}{x^2} d\lambda \right] = \\ &= i \sqrt{\frac{2}{\pi}} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{dx}{x^2} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi'(\lambda) \cos \lambda x d\lambda = i \sqrt{\frac{2}{\pi}} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi'(\lambda) d\lambda \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{\cos \lambda x}{x^2} dx = \\ &= i \sqrt{\frac{2}{\pi}} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\varphi(\lambda) \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{\cos \lambda x}{x^2} dx \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\lambda) d\lambda \frac{\partial}{\partial \lambda} \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{\cos \lambda x}{x^2} dx \right] = \end{aligned}$$

$$= i\sqrt{\frac{2}{\pi}} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\lambda) \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{\sin \lambda x}{x} dx = i\sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\lambda) d\lambda \int_0^{\infty} \frac{\sin \lambda x}{x} dx = \\ = \left(i\sqrt{\frac{2}{\pi}} \operatorname{sign} \lambda, \varphi(\lambda) \right).$$

Для завершения решения предстоит обосновать: 1) изменение порядка интегрирования по x и по λ ; 2) дифференцирование по параметру λ внутреннего интеграла, 3) переход к пределу при $\varepsilon \rightarrow 0$. 1) Выполнены достаточные условия. Интегралы

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi'(\lambda) \cos \lambda x}{x^2} d\lambda, \quad \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{\varphi'(\lambda) \cos \lambda x}{x^2} d\lambda$$

равномерно сходятся: первый по $x \in [\varepsilon; \infty)$ (мажоранта $\frac{|\varphi'(\lambda)|}{\varepsilon^2}$), второй по $\lambda \in (-\infty; +\infty)$ (мажоранта $\frac{M}{x^2}$). 2) Дифференцирование под знаком интеграла допустимо, если интеграл сходится, т. е.

$$\forall \lambda : \left| \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{\cos \lambda x}{x^2} dx \right| < \infty,$$

а интеграл от производной равномерно сходится, т. е.

$$\forall \varepsilon_0 > 0, \quad \forall \lambda \quad \exists A_0 > 0, \quad \forall A \geq A_0 : \left| \int_A^{\infty} \frac{\sin \lambda x}{x} dx \right| < \varepsilon_0.$$

Сходимость интеграла обусловлена мажорантой $1/x^2$. Доказательство равномерной сходимости. Так как интеграл сходится при любом значении λ , то (при $\lambda = 1$)

$$\forall \varepsilon_0 > 0 \quad \exists A_0 > 0, \quad \forall A \geq A_0 : \left| \int_A^{\infty} \frac{\sin t}{t} dt \right| < \varepsilon_0.$$

Следовательно,

$$\left| \int_A^{\infty} \frac{\sin \lambda x}{x} dx \right| = \left| \int_{A|\lambda|}^{\infty} \frac{\sin t}{t} dt \right| < \varepsilon_1, \quad \text{если } A \geq \frac{A_0}{\varepsilon_0}.$$

3) Предельный переход основан на оценке

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\lambda) d\lambda \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{\sin \lambda x}{x} dx - \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\lambda) d\lambda \int_0^{\infty} \frac{\sin \lambda x}{x} dx \right| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\lambda) d\lambda \int_0^{\varepsilon} \frac{\sin \lambda x}{x} dx \right| \leq \\ \leq \int_{-\infty}^{\infty} |\varphi(\lambda)| d\lambda \int_0^{\varepsilon} \frac{|\sin \lambda x|}{x} dx \leq \int_{-\infty}^{\infty} |\varphi(\lambda)| d\lambda \int_0^{\varepsilon} |\lambda| dx = \varepsilon \int_{-\infty}^{\infty} |\lambda| |\varphi(\lambda)| d\lambda.$$

$$\begin{aligned} \mathbf{3.25.} \quad & 1) \sqrt{2\pi} \delta(\lambda); \quad 2) (-i)^m \sqrt{2\pi} D^m \delta(\lambda); \quad 3) \frac{(-i\lambda)^m}{\sqrt{2\pi}}; \\ & 4) \frac{(-i\lambda)^m}{\sqrt{2\pi}} e^{i\lambda x_0}; \quad 5) \sqrt{2\pi} \delta(\lambda - \lambda_0); \quad 6) (-i)^m \sqrt{2\pi} D^m \delta(\lambda - \lambda_0); \\ & 7) \frac{(-1)^m}{\sqrt{2\pi}} e^{i\lambda x_0} \sum_{k=0}^m (i\lambda)^k C_m^k D^{m-k} h(x_0). \end{aligned}$$

Решение п. 1. По формулам (3.17) при $x_0 = 0$, $n = 1$, (3.20) и в силу линейности,

$$\mathcal{F}[\delta(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \implies \delta(x) = \mathcal{F}^{-1}\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right] = \mathcal{F}\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right] \implies \mathcal{F}[1] = \sqrt{2\pi} \delta(\lambda).$$

У к а з а н и е п. 7. Представить обобщенную функцию в форме

$$h(x) D^m \delta(x - x_0) = (-1)^m \sum_{k=0}^m (-1)^k C_m^k D^{m-k} h(x_0) D^k \delta(x - x_0).$$

$$3.26. \quad n = 1, \quad f(x) = \frac{1}{2} e^{-k|x|};$$

$$n = 2, \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} K_0(k|x|);$$

$$n = 3, \quad f(x) = \frac{e^{-k|x|}}{4\pi|x|}.$$

$$3.27. \quad n = 1, \quad f(x) = \frac{1}{2a} \eta \left(t - \frac{|x|}{a} \right);$$

$$n = 2, \quad f(x) = \frac{1}{2\pi a} \frac{\eta \left(t - \frac{|x|}{a} \right)}{\sqrt{(at)^2 - x^2}};$$

$$n = 3, \quad f(x) = \frac{\delta \left(t - \frac{|x|}{a} \right)}{4\pi a^2 x}.$$

У к а з а н и е к задаче 3.27. При $n = 1$ применить соответствие (3.26); при $n = 2$ провести вычисление интеграла в полярных координатах, используя интегральное представление функции Бесселя и формулу (3.82), а при $n = 3$ — в сферических координатах с помощью формулы (3.17).

3.28. Р е ш е н и е. На основании формул (3.20), (3.13), (3.16)

$$\begin{aligned} & \left(\mathcal{F}_\lambda^{-1} [\eta(y) e^{-|\lambda|y} \mathcal{F}[f(\xi)](\lambda)](x), \varphi(x, y) \right) = \\ & = \left(\mathcal{F}_\lambda [\eta(y) e^{-|\lambda|y} \mathcal{F}[f(\xi)](-\lambda)](x), \varphi(x, y) \right) = \\ & = \left(f(\xi), \mathcal{F}_\lambda [e^{-|\lambda|y} \eta(y) \mathcal{F}_x[\varphi(x, y)](-\lambda)](\xi) \right) = \\ & = \left(f(\xi), \mathcal{F}_\lambda^{-1} [\eta(y) e^{-|\lambda|y} \mathcal{F}_x[\varphi(x, y)](\lambda)](\xi) \right) = \\ & = \left(f(\xi), \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y \varphi(x, y) dx}{(\xi - x)^2 + y^2} \eta(y) \right) = \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y f(\xi) d\xi}{(\xi - x)^2 + y^2} \eta(y), \varphi(x, y) \right). \end{aligned}$$

$$3.29. \quad C = (2\pi\hbar)^{-\frac{3}{2}}.$$

3.30. Р е ш е н и е. Волновой функцией в p -представлении называется такая функция $\chi(p)$, что (см. задачу 3.29)

$$\psi(x) = \int \chi(p) \psi_p(x) dp = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \chi(p) e^{\frac{i}{\hbar}(p, x)} dp,$$

$$\text{откуда } \chi(p) = \hbar^{-\frac{3}{2}} \mathcal{F}^{-1}[\psi(x)] \left(-\frac{p}{\hbar} \right) = \hbar^{-\frac{3}{2}} \mathcal{F}[\psi(x)] \left(\frac{p}{\hbar} \right).$$

$$3.31. \quad \chi(p) = \delta(p - p_0).$$

$$3.32. \quad \chi(p) = (2\pi\hbar)^{-\frac{3}{2}} e^{-\frac{i}{\hbar}(p, x_0)}.$$

$$3.33. \quad u(r, \varphi) = \frac{1}{\pi} \left(2u_0\varphi + u_1 \operatorname{arctg} \frac{r^2 + l^2 \cos 2\varphi}{l^2 \sin 2\varphi} \right).$$

$$3.34. \quad 1) u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{r^2 - l^2}{2rl \cos \varphi}; \quad 2) u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{l^2 - r^2}{2rl \cos \varphi}.$$

$$3.35. \quad \mathbf{q}(y) = -\mathbf{e}_x \frac{q_0}{\pi} \ln \frac{y^2 + l_2^2}{y^2 + l_1^2}.$$

$$3.36. \quad u(x, y) = \frac{2u_0}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\operatorname{sh} \frac{\pi x}{2l} \sec \frac{\pi y}{2l} \right).$$

У к а з а н и е. Применить формулу (3.22).

$$3.37. \quad u(x, y) = \frac{u_1 + u_2}{2} + \frac{u_2 - u_1}{2} \operatorname{arctg} \left(sh \frac{\pi x}{2l} \sec \frac{\pi y}{2l} \right).$$

У к а з а н и е. Методом продолжений перейти к задаче в полосе $(-l < y < l)$.

$$3.38. \quad u(r, t) = \frac{1}{2ar\sqrt{\pi t}} \int_0^\infty \left[e^{-\frac{(r-\rho)^2}{4a^2t}} - e^{-\frac{(r+\rho)^2}{4a^2t}} \right] u_0(\rho) \rho d\rho;$$

$$u(r, t) = \frac{u_0}{2r} e^{a^2\alpha^2 t} \left[(r - 2a^2\alpha t) e^{-\alpha r} \operatorname{Erf} \left(a\alpha\sqrt{t} - \frac{r}{2a\sqrt{t}} \right) - \right. \\ \left. - (r + 2a^2\alpha t) e^{\alpha r} \operatorname{Erf} \left(a\alpha\sqrt{t} + \frac{r}{2a\sqrt{t}} \right) \right].$$

$$3.39. \quad u(x, y) = q \ln \frac{ch \frac{\pi x}{2l} + \cos \frac{\pi(y+y_0)}{2l}}{ch \frac{\pi x}{2l} - \cos \frac{\pi(y-y_0)}{2l}}, \quad \sigma|_{y=\pm l} = \frac{q}{4l} \frac{\cos \frac{\pi y_0}{2l}}{ch \frac{\pi x}{2l} \mp \sin \frac{\pi y_0}{2l}}.$$

Р е ш е н и е. Потенциал определен условиями

$$\Delta u(x, y) = -4\pi q \delta(x) \cdot \delta(y - y_0), \quad -\infty < x < \infty, \quad -l < y < l, \\ u(x, \pm l) = 0.$$

Переход к задаче для фурье-образа

$$U_{yy} - \lambda^2 U = -2q\sqrt{2\pi} \delta(y - y_0), \quad -l < y < l, \\ U(\lambda, \pm l) = 0$$

осуществляется по формулам (3.17), (3.21). Функция $U(\lambda, y)$ имеет вид

$$U(\lambda, y) = \frac{q\sqrt{2\pi}}{\lambda \operatorname{sh} 2\lambda l} [\operatorname{ch} \lambda(2l - |y - y_0|) - \operatorname{ch} \lambda(y + y_0)].$$

По формуле обратного преобразования (3.6)

$$u(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty U(\lambda, y) e^{-i\lambda x} d\lambda = \frac{2\pi i}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=0}^\infty \operatorname{res} (U(\lambda_n, y) e^{-i\lambda_n |x|}) = \\ = 2q \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left[\cos \frac{\pi n}{2l} (y + y_0) - \cos \frac{\pi n}{2l} (2l - |y - y_0|) \right] e^{-\frac{\pi n |x|}{2l}}.$$

Суммирование ряда проводится с помощью разложения

$$\ln \frac{1}{\sqrt{1 + \rho^2 - 2\rho \cos \varphi}} = \sum_{n=1}^\infty \frac{\rho^n \cos n\varphi}{n}, \quad 0 \leq \rho \leq 1. \quad (3.75)$$

$$\text{Плотность заряда } \sigma|_{y=\pm l} = -\frac{1}{4\pi} \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{y=\pm l}.$$

$$3.40. \quad A(x, y) = \frac{2J}{c} \left[\frac{\pi|x|}{2l} + \ln \frac{1}{\sqrt{\left(ch \frac{\pi x}{2l} - \cos \frac{\pi(y-y_0)}{2l} \right) \left(ch \frac{\pi x}{2l} + \cos \frac{\pi(y+y_0)}{2l} \right)}} \right] + C.$$

$$3.41. \quad u(x, l) = \frac{q_0}{2\pi k} \ln \frac{ch \frac{\pi x}{2l} + \sin \frac{\pi y_0}{2l}}{ch \frac{\pi x}{2l} - \sin \frac{\pi y_0}{2l}}.$$

$$3.42. \quad \mathbf{q} = -\frac{q_0 \sin \frac{\pi h}{H}}{2H \left(ch \frac{\pi x}{H} - \cos \frac{\pi h}{H} \right)} \mathbf{e}_y, \quad Q = q_0(l_2 - l_1) \left(1 - \frac{h}{H} \right).$$

$$3.43. \mathbf{j} = -\sigma \nabla u, \quad u(x, y) = -\frac{J}{4\pi\sigma} \ln \left(\operatorname{ch} \frac{\pi x}{l} + \cos \frac{\pi(y-y_0)}{l} \right) \left(\operatorname{ch} \frac{\pi x}{l} + \cos \frac{\pi(y+y_0)}{l} \right).$$

$$3.44. 1) \sigma|_{y=\pm l} = \pm \frac{\pi p}{8l^2} \frac{\operatorname{sh} \frac{\pi x}{2l} \cos \frac{\pi y_0}{2l}}{\left(\operatorname{ch} \frac{\pi x}{2l} \mp \sin \frac{\pi y_0}{2l} \right)^2}; \quad 2) \sigma|_{y=\pm l} = -\frac{\pi p}{8l^2} \frac{1 \mp \operatorname{ch} \frac{\pi x}{2l} \sin \frac{\pi y_0}{2l}}{\left(\operatorname{ch} \frac{\pi x}{2l} \mp \sin \frac{\pi y_0}{2l} \right)^2}.$$

$$3.45. u(x, y, z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int \frac{z f(\xi, \eta) d\xi d\eta}{[(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + z^2]^{\frac{3}{2}}}.$$

$$3.46. \mathbf{B} = \frac{4J\mu_1\mu_2 \mathbf{e}_\varphi}{c(\mu_1 + \mu_2)r}.$$

$$3.47. u(x, t) = \frac{Q_0}{kS_0} \left[a\sqrt{\frac{t}{\pi}} e^{-\frac{x^2}{4a^2t}} - \frac{|x|}{2} \operatorname{Erf} \left(\frac{|x|}{2a\sqrt{t}} \right) \right].$$

$$3.48. u(x, t) = \begin{cases} 0, & at \leq |x|, \\ \frac{F_0}{2a\rho_0} \frac{at-x}{a-v}, & vt \leq x < at, \\ \frac{F_0}{2a\rho_0} \frac{x+at}{a+v}, & -at \leq x < vt. \end{cases}$$

$$3.49. u(x, t) = \mu \left(t - \frac{x}{a} \right) \eta \left(t - \frac{x}{a} \right). \text{ Р е ш е н и е. Постановка задачи:}$$

$$\begin{aligned} u_{tt} &= a^2 u_{xx} \quad 0 < x, \quad 0 < t, \\ u(0, t) &= \mu(t), \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0. \end{aligned} \quad (3.76)$$

Если освободиться от неоднородности в граничном условии и перейти к задаче Коши посредством нечетного продолжения решения на всю ось Ox , то к такой задаче применимо преобразование Фурье (3.8). Это же преобразование можно использовать для решения задачи (3.76), не меняя ее формы. Пусть

$$U(\lambda, t) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty u(x, t) \sin \lambda x dx.$$

Так как возмущение распространяется по струне с конечной скоростью a , то при $x \rightarrow \infty$ функции u , u_x , u_{xx} стремятся к нулю. Поэтому для $\mathcal{F}_x[u_{xx}]$ (см. (3.16)) после интегрирования по частям получается выражение

$$\mathcal{F}_x[u_{xx}] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty u_{xx} \sin \lambda x dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \lambda \mu(t) - \lambda^2 U(\lambda, t).$$

Функция $U(\lambda, t)$ является решением задачи

$$\begin{aligned} U_{tt} + a^2 \lambda^2 U &= a^2 \sqrt{\frac{2}{\pi}} \mu(t), \quad 0 < t, \\ U(\lambda, 0) &= U_t(\lambda, 0) = 0, \end{aligned}$$

откуда $U(\lambda, t) = a\sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^t \mu(t-\tau) \sin a\lambda\tau d\tau$. Применение обратного преобразования и формулы (3.19) дает

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{2a}{\pi} \int_0^t \mu(t-\tau) d\tau \int_0^\infty \sin a\lambda\tau \sin \lambda x d\lambda = \\ &= \frac{a}{\pi} \int_0^t \mu(t-\tau) d\tau \int_0^\infty [\cos \lambda(x-a\tau) - \cos \lambda(x+a\tau)] d\lambda = \\ &= a \int_0^t \mu(t-\tau) [\delta(x-at) - \delta(x+at)] d\tau = \mu \left(t - \frac{x}{a} \right) \eta \left(t - \frac{x}{a} \right). \end{aligned}$$

$$3.50. \quad u(z, t) = \frac{a}{T_0} \int_0^{t-\frac{x}{a}} F(\tau) d\tau \cdot \eta \left(t - \frac{x}{a} \right).$$

У к а з а н и е. Применить косинус-преобразование Фурье (3.7).

$$3.51. \quad u(x, t) = \frac{x}{2a\sqrt{t}} \int_0^t \mu(t-\tau) e^{-\frac{x^2}{4a^2\tau}} \frac{d\tau}{\tau\sqrt{\tau}}; \quad u(x, t) = u_0 \operatorname{Erf} \left(\frac{x}{2a\sqrt{t}} \right).$$

$$3.52. \quad u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} u_0(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}} d\xi.$$

$$3.53. \quad H(z, t) = H_0 \operatorname{Erf} \left(\frac{z}{c} \sqrt{\frac{\pi\mu\sigma}{t}} \right).$$

$$3.54. \quad 1) V(z, t) = c_0 N f \left(t - \frac{z}{c_0} \right); \quad 2) V(z, t) = \frac{\alpha t_0 c_0^2 N}{2} e^{-\alpha c_0 |t - \frac{z}{c_0}|}.$$

$$3.55. \quad 1) V(z, t) = \frac{N}{\alpha} f' \left(t - \frac{z}{c_0} \right); \quad 2) V(z, t) = \frac{t_0 c_0 N}{2} \frac{d}{dt} e^{-\alpha c_0 |t - \frac{z}{c_0}|}.$$

$$3.56. \quad u(x, y) = \frac{2u_0}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\cos \frac{\pi x}{2l} \operatorname{cosech} \frac{\pi y}{2l} \right).$$

$$3.57. \quad u(r, \varphi, z) = \frac{2u_0 \cos m\varphi}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{I_m(\lambda r)}{I_m(\lambda r_0)} \frac{1 - \cos \lambda l}{\lambda} \sin \lambda z d\lambda.$$

У к а з а н и е. Сделать замену $u(r, \varphi, z) = v(r, z) \sin m\varphi$ и применить преобразование (3.8).

$$3.58. \quad u(r, \varphi, z) = \frac{2u_0 \sin m\varphi}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{I_m(\lambda r)}{I_m(\lambda r_0)} \frac{\sin \lambda l}{\lambda} \cos \lambda z d\lambda.$$

$$3.59. \quad u(r, \varphi, z) = \frac{2q_0 \cos m\varphi}{\pi k} \int_0^{\infty} \frac{I_m(\lambda r)}{I'_m(\lambda r_0)} \frac{1 - \cos \lambda l}{\lambda^2} \sin \lambda z d\lambda.$$

$$3.60. \quad u(r, z) = \frac{u_1 + u_2}{2} + \frac{u_2 - u_1}{2} \int_0^{\infty} \frac{I_0(\lambda r)}{I_0(\lambda r_0)} \frac{\sin \lambda z}{\lambda} d\lambda.$$

$$3.65. \quad H_x(x, y) = -\frac{\pi J}{hc} \left[\frac{\sin \frac{\pi(y-y_0)}{h}}{\operatorname{ch} \frac{\pi x}{h} - \cos \frac{\pi(y-y_0)}{h}} + \frac{\sin \frac{\pi(y+y_0)}{h}}{\operatorname{ch} \frac{\pi x}{h} - \cos \frac{\pi(y+y_0)}{h}} \right],$$

$$H_y(x, y) = \frac{\pi J sh \frac{\pi x}{h}}{hc} \left[\frac{1}{\operatorname{ch} \frac{\pi x}{h} - \cos \frac{\pi(y-y_0)}{h}} + \frac{1}{\operatorname{ch} \frac{\pi x}{h} - \cos \frac{\pi(y+y_0)}{h}} \right];$$

$$\mathbf{F} = -\frac{\pi J^2}{c^2 h} \operatorname{ctg} \frac{\pi y_0}{h} \mathbf{e}_y.$$

У к а з а н и е. $\mathbf{H} = \operatorname{rot} \mathbf{A}$, $\mathbf{A} = A(x, y) \mathbf{e}_z$, уравнения, которым удовлетворяет $A(x, y)$, даны в ответе к задаче 1.431. Функцию $A(x, y)$ следует отыскивать в виде $A(x, y) = w(x, y) - \frac{2\pi J|x|}{hc}$. Фурье-образ $W(\lambda, y)$ функции $w(x, y)$ имеет вид

$$W(\lambda, y) = \frac{\sqrt{2\pi} J}{c} \left[\frac{\operatorname{ch} \lambda(h-y-y_0) + \operatorname{ch} \lambda(h-|y-y_0|)}{\lambda \operatorname{sh} \lambda h} - \frac{2}{h\lambda^2} \right].$$

Вычисление интеграла в обратном преобразовании проводится так же, как в решении задачи 3.39; в результате

$$A(x, y) = -\frac{J}{c} \ln \left[\left(\operatorname{ch} \frac{\pi x}{h} - \cos \frac{\pi(y+y_0)}{h} \right) \left(\operatorname{ch} \frac{\pi x}{h} - \cos \frac{\pi(y-y_0)}{h} \right) \right].$$

$$3.66. u(\varphi, z) = \frac{J}{4\pi\sigma} \ln \frac{1}{\operatorname{ch} \frac{z}{r_0} - \cos \varphi} + C.$$

$$3.67. u(\varphi, z) = \frac{J}{4\pi\sigma} \ln \frac{1}{\operatorname{ch} \frac{2z}{r_0} - \cos 2\varphi} + C.$$

$$3.68. u(\varphi, z) = \frac{J}{4\pi\sigma} \ln \frac{\operatorname{ch} \frac{z}{r_0} - \sin \varphi}{\operatorname{ch} \frac{z}{r_0} + \sin \varphi} + C.$$

$$3.69. u(r, z) = 4q_0 r_0 \cdot \begin{cases} \int_0^\infty K_0(\lambda r_0) I_0(\lambda r) \cos \lambda z d\lambda, & r < r_0, \\ \int_0^\infty I_0(\lambda r_0) K_0(\lambda r) \cos \lambda z d\lambda, & r > r_0. \end{cases}$$

Решение (фрагменты). В цилиндрических координатах объемная плотность заряда кольца $\rho = q_0 \delta(r - r_0) \cdot \delta(z)$ (задача 10.283, т. 2), стало быть потенциал $u(M)$ — решение задачи для уравнения Пуассона:

$$\Delta u = -4\pi q_0 \delta(r - r_0) \cdot \delta(z), \quad 0 < r < \infty, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad -\infty < z < \infty, \\ |u|_{r=0} < \infty, \quad u(M) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0.$$

Потенциал $u(r, z)$ — четная функция z , поэтому естественно применить косинус-преобразование Фурье

$$u(r, z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} U(r, \lambda) \cos \lambda z d\lambda.$$

Для образа $U(r, z)$ получается задача

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial U}{\partial r} - \lambda^2 U = -\frac{4\pi q_0}{\sqrt{2\pi}} \delta(r - r_0), \\ |U(0, \lambda)| < \infty, \quad U(r, \lambda) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0.$$

Отсюда следует, что $U(r, z)$ удовлетворяет модифицированному уравнению Бесселя

$$U'' + \frac{1}{r} U' - \lambda^2 U = 0, \quad r \in (0; r_0) \cup (r_0; \infty)$$

и условиям

$$|U(0, \lambda)| < \infty, \quad U(r, \lambda) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0, \\ U(r_0 + 0, \lambda) - U(r_0 - 0, \lambda) = 0, \\ U_r(r_0 + 0, \lambda) - U_r(r_0 - 0, \lambda) = -\frac{4\pi q_0}{\sqrt{2\pi}}.$$

Таким образом,

$$U(r, z) = \begin{cases} A I_0(\lambda r), & r < r_0, \\ B K_0(\lambda r), & r > r_0, \end{cases}$$

где постоянные A и B — решение системы

$$\begin{cases} A K_0(\lambda r_0) - B I_0(\lambda r_0) = 0, & r < r_0, \\ A K'_0(\lambda r_0) - B I'_0(\lambda r_0) = -\frac{4\pi}{\lambda \sqrt{2\pi}}, & r > r_0; \end{cases}$$

штрих означает дифференцирование по всему аргументу.

$$3.70. u(r, z) = 4q_0 r_0 \sin \varphi \cdot \begin{cases} \int_0^\infty K_1(\lambda r_0) I_1(\lambda r) \cos \lambda z d\lambda, & r < r_0, \\ \int_0^\infty I_1(\lambda r_0) K_1(\lambda r) \cos \lambda z d\lambda, & r > r_0. \end{cases}$$

$$3.71. u(r, z) = 4p_0 r_0 \cdot \begin{cases} \int_0^\infty K_0(\lambda r_0) I_0(\lambda r) \lambda \sin \lambda z d\lambda, & r < r_0, \\ \int_0^\infty I_0(\lambda r_0) K_0(\lambda r) \lambda \sin \lambda z d\lambda, & r > r_0. \end{cases}$$

$$3.72. u(r, z) = 4p_0 r_0 \cdot \begin{cases} (-1) \int_0^\infty K_1(\lambda r_0) I_0(\lambda r) \lambda \cos \lambda z d\lambda, & r < r_0, \\ \int_0^\infty I_1(\lambda r_0) K_0(\lambda r) \lambda \cos \lambda z d\lambda, & r > r_0. \end{cases}$$

$$3.73. \text{Решение п. 2. } f(t - \tau) \doteq \int_0^\infty f(t - \tau) \eta(t - \tau) e^{-pt} dt = \\ = \int_\tau^\infty f(t - \tau) e^{-pt} dt = \int_0^\infty f(\xi) e^{-p(\tau + \xi)} d\xi = e^{-p\tau} F(p).$$

$$3.74. 1) \frac{1}{p} e^{-p\tau}; 2) \frac{f_0}{p} \operatorname{th} \frac{pt_0}{2}.$$

$$\text{Решение п. 2. } \frac{f(t)}{f_0} = \eta(t) + 2 \sum_{k=1}^\infty (-1)^k \eta(t - kt_0) \doteq \frac{1}{p} + \frac{2}{p} \sum_{k=1}^\infty (-e^{-pt_0})^k = \\ = \frac{1}{p} - \frac{2e^{-pt_0}}{p(1 + e^{-pt_0})} = \frac{1}{p} \operatorname{th} \frac{pt_0}{2}.$$

$$3.76. 1) \frac{1}{p-b}; 2) \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}; 3) \frac{p}{p^2 + \omega^2}; 4) \frac{a}{p^2 - a^2}; 5) \frac{p}{p^2 - a^2}; \\ 6) \frac{\omega}{(p-b)^2 + \omega^2}; 7) \frac{p+b}{(p+b)^2 - a^2}; 8) \frac{2\omega^2}{p(p^2 + 4\omega^2)}.$$

$$3.78. 1) \frac{p(p^2 + 7)}{(p^2 + 1)(p^2 + 9)}, -\frac{3(p^2 + 3)}{((p^2 + 1)(p^2 + 9))}, -\frac{3p(p^2 + 3)}{((p^2 + 1)(p^2 + 9))}; \\ 2) \frac{6}{((p^2 - 1)(p^2 - 9))}, \frac{6p}{((p^2 - 1)(p^2 - 9))}, \frac{6p^2}{((p^2 - 1)(p^2 - 9))}; \\ 3) \frac{1}{(p-1)^2 + 1}, \frac{p}{(p-1)^2 + 1}, \frac{2(p-1)}{(p-1)^2 + 1}; 4) \frac{2p}{p^4 + 4}, \frac{2p^2}{p^4 + 4}, \frac{2p^3}{p^4 + 4}.$$

$$3.79. U(p^2 - 1) = p + \frac{1}{p(p^2 + 1)}.$$

$$3.81. 1) \frac{m!}{p^{m+1}}; 2) \frac{1}{(p-b)^3}; 3) \frac{2p}{(p^2 + 1)^2}; 4) \frac{p^2 + 1}{(p^2 - 1)^2}; 5) \frac{8p^2}{(p^4 - 1)^2}.$$

$$3.82. 1) \frac{4}{25}; 2) \frac{12}{169}; 3) \frac{3}{7}; 4) \text{расходится}.$$

$$3.83. \frac{1}{p} \left(1 - \frac{1}{p}\right)^n.$$

$$3.85. 1) \operatorname{arccotg} p; 2) \ln \frac{p+1}{p-1}; 3) \frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{1}{p^2}\right); 4) \ln \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

$$3.87. 1) \frac{1}{p} \ln \frac{p-b}{p-a}; 2) \frac{1}{2p} \ln \left(1 + \frac{1}{p^2}\right); 3) \frac{\operatorname{arccotg} p}{p}; 4) \frac{1}{2p} \ln \frac{p+a}{p-a}.$$

$$3.88. \frac{f_0}{p^2} \operatorname{th} \frac{pt_0}{2}. \text{ У к а з а н и е. Применить изображение, полученное в решении задачи 3.74, п. 2.}$$

$$3.89. U_{xx} = p^2 LCU, \quad 0 < x, \quad |U| < \infty, \quad U(0, p) - \frac{U_x(0, p)}{p^2 L C_0} = \frac{E_0}{p}.$$

$$3.90. U' - pU = -\frac{1}{p^2}.$$

$$3.91. \quad 1) a^t; \quad 2) (1 - at)e^{-at}; \quad 3) [1 + (\alpha - a)t]e^{-at}; \quad 4) t\left(1 - \frac{1}{2}at\right)e^{-at};$$

$$5) \frac{1}{2a^3}(\sin at - at \cos at); \quad 6) \frac{2}{\sqrt{3}}e^{-\frac{t}{2}}\sin \frac{\sqrt{3}t}{2}; \quad 7) \cos 2t - \frac{1}{2}\sin 2t;$$

$$8) \frac{1}{a^3}(\operatorname{sh} at - at); \quad 9) \left(\cos bt - \frac{a}{b}\sin bt\right)e^{-at}; \quad 10) \frac{2\operatorname{sh} t}{t}; \quad 11) 2\frac{1 - \cos at}{t};$$

$$12) e^{-t}\frac{\sin t}{t}.$$

У к а з а н и е п. 5. Применить тождество

$$\frac{1}{(p^2 + a^2)^2} = \frac{1}{2a^2} \left(\frac{1}{p^2 + a^2} + \frac{a^2 - p^2}{(p^2 + a^2)^2} \right).$$

Р е ш е н и е п. 6

$$\frac{1}{p^2 + p + 1} = \frac{1}{\left(p + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} = \frac{2}{\sqrt{3}}e^{-\frac{t}{2}}\sin \frac{\sqrt{3}t}{2}.$$

$$3.92. \quad 1) -\frac{2}{\pi} \frac{\ln \frac{p + \sqrt{p^2 + a^2}}{a}}{\sqrt{p^2 + a^2}}; \quad 2) \begin{cases} \frac{\arccos \frac{p}{a}}{\sqrt{a^2 - p^2}}, & \operatorname{Re} p < a, \\ \frac{\ln \frac{p + \sqrt{p^2 - a^2}}{a}}{\sqrt{p^2 - a^2}}, & \operatorname{Re} p > a. \end{cases}$$

У к а з а н и е. Применить интегральные представления цилиндрических функций, приведенные в разделе Основные формулы.

$$3.93. \quad 1) \frac{p \ln(p + \sqrt{p^2 + 1})}{(p^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}; \quad 2) \frac{\ln(p + \sqrt{p^2 + 1})}{(p^2 + 1)^{\frac{3}{2}}};$$

$$3) \frac{p \ln(p + \sqrt{p^2 - 1})}{(p^2 - 1)^{\frac{3}{2}}}; \quad 4) \frac{\ln(p + \sqrt{p^2 - 1})}{(p^2 - 1)^{\frac{3}{2}}}.$$

$$3.94. -\frac{1}{p} \ln(pe^C), \quad C = \Gamma'(1).$$

У к а з а н и е. Вычислить производную $\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt$ при $z = 1$.

$$3.95. \frac{1}{p} \ln \frac{1}{\sqrt{p^2 + 1}}. \quad \text{У к а з а н и е. Либо употребить соответствие (см [44])}$$

$$\int_t^\infty \frac{f(\tau)}{\tau} d\tau = \frac{1}{p} \int_0^p F(p) dp,$$

либо воспользоваться представлением

$$\operatorname{ci} t = \ln \gamma t - \int_0^t \frac{1 - \cos \tau}{\tau} d\tau, \quad \gamma = e^C, \quad C = \Gamma'(1).$$

3.96. У к а з а н и е. Исходным является интеграл $\int_C e^{iz^2 - pz}$, где C — граница сектора $\left\{r, \varphi: 0 \leq r \leq R, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}\right\}$.

3.97. Решение п. 1. По теореме интегрирования изображения (см. задачу 3.84)

$$\frac{\sin kt}{t} = \operatorname{sign} k \frac{\sin |k|t}{t} \doteq F(p) = \operatorname{sign} k \int_p^\infty \frac{|k|dp}{p^2 + k^2} = \operatorname{sign} k \operatorname{arcctg} \frac{p}{|k|},$$

откуда $F(0) = \frac{\pi}{2} \operatorname{sign} k$.

3.100. 1) Если $\omega_0 \neq \omega$, то $\frac{2\omega \sin \frac{\omega_0 - \omega}{2} \sin \frac{\omega_0 + \omega}{2}}{\omega_0^2 - \omega^2}$, если $\omega_0 = \omega$, то $-\frac{t \sin \omega t}{2}$;

$$2) \frac{24}{\omega^2} \left(\frac{t^3}{6} - \frac{t}{\omega^2} + \frac{\sin \omega t}{\omega^3} \right); 3) 2J_1(t) - \sin t; 4) tI_1(t) + \frac{2}{3}t^2 I_2(t).$$

3.101. 1) $\frac{1}{n!} (1 - e^{-t})$; 2) $\frac{\sin^{2n+1} t}{(2n+1)!}$.

У к а з а н и е п. 1. $F_n(p) = \frac{1}{p(p+1) \dots (p+n)} \doteq f_n(t)$, $F_n(p) = \frac{F_{n-1}(p)}{p+n} \implies$

$\implies f_n(t) = \int_0^t f_{n-1}(\tau) e^{-(t-\tau)} d\tau$; для $g_n(t) = f_n(t) e^{n\tau}$ получается рекуррентная формула

$$g_n(t) = \int_0^t g_{n-1}(\tau) e^\tau d\tau, \quad g_0 = 1.$$

3.102. Решение. Изображением функции t^z является интеграл, который заменой $pt = \tau$, где $p > 0$, сводится к интегралу Эйлера

$$\int_0^\infty t^z e^{-pt} dt = \frac{1}{p^{z+1}} \int_0^\infty \tau^z e^{-\tau} d\tau = \frac{\Gamma(z+1)}{p^{z+1}};$$

это соотношение, полученное при $p > 0$, справедливо для всех p , при которых левая и правая части аналитичны, т. е. при $\operatorname{Re} p > 0$.

3.103. У к а з а н и е. Вычислить интеграл

$$t^{z-1} * t^{\zeta-1} = \int_0^t \tau^{z-1} (t-\tau)^{\zeta-1} d\tau, \text{ затем подставить } t = 1.$$

$$\mathbf{3.104.} \quad 1) \frac{2e^{-\frac{1}{p}}}{\sqrt{\pi p}} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{p}}} e^{x^2} dx = \frac{1}{i\sqrt{p}} e^{-\frac{1}{p}} \operatorname{erf} \frac{i}{\sqrt{p}};$$

$$2) \frac{2e^{-\frac{1}{p}}}{p\sqrt{\pi p}} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{p}}} e^{x^2} dx = \frac{1}{p\sqrt{p}i} e^{-\frac{1}{p}} \operatorname{erf} \frac{i}{\sqrt{p}}.$$

$$\mathbf{3.105.} \quad 1) \frac{1}{p} e^{\frac{p^2}{4}} \operatorname{Erf} \left(\frac{p}{2} \right); 2) \frac{1}{p} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{p+1}} \right); 3) \frac{1}{\sqrt{p}} e^{\frac{1}{p}} \operatorname{Erf} \left(\frac{1}{\sqrt{p}} \right).$$

3.106. Решение. По определению

$$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{\tau^2}{4t}} \doteq F(p) = \frac{1}{\sqrt{p}} \int_0^\infty e^{-\frac{\tau^2}{4t} - p\tau} \frac{d\tau}{\sqrt{t}} = \frac{2}{\sqrt{\pi t}} \int_0^\infty e^{-\xi^2 - \frac{a^2}{\xi^2}} d\xi = \frac{2}{\sqrt{\pi t}} I(a),$$

где $a^2 = \frac{p\tau^2}{4}$; преобразование интеграла получено подстановкой $t = \frac{\xi^2}{p}$, в которой $p > 0$. Отсюда следует, что

$$I'(a) = -2a \int_0^\infty e^{-\xi^2 - \frac{a^2}{\xi^2}} \frac{d\xi}{\xi^2} = -2 \int_0^\infty e^{-\xi^2 - \frac{a^2}{\xi^2}} d\xi, \quad \xi = \frac{a}{\zeta}.$$

Итак, $I' = -2I$, стало быть $I = Ce^{-2a}$, где постоянная $C = I(0) = \int_0^{\infty} e^{-\zeta^2} d\zeta = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. Ясно, что $F(p) = \frac{1}{\sqrt{p}} e^{-\tau\sqrt{p}}$. Результат получен при $p > 0$, однако он имеет место при условии $\operatorname{Re} p > 0$ (см. решение задачи 3.102).

3.107. 1) $\sqrt{\frac{\pi}{p}}$; 2) $\sqrt{\frac{\pi}{p-\alpha}}$; 3) $\frac{1}{\sqrt{p-\alpha}} - \frac{1}{\sqrt{p+\alpha}}$.

У к а з а н и е. Применить соответствие (3.29).

3.108. 1) $4\sqrt{\frac{t-1}{\pi}} \operatorname{ch}(t-1)\eta(t-1)$; 2) $\frac{t\sqrt{t}}{\sqrt{\pi}} \left(1 - 4t + \frac{4}{3}t^2\right)e^{-t}$;

3) $\operatorname{erf} \sqrt{t} - 2\sqrt{\frac{t}{\pi}}$.

3.109. 1) $\frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{t^2}{4}}$; 2) $\frac{1}{\sqrt{1+t}}$; 3) $\frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-2\sqrt{t}}$; 4) $\frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \sqrt{t}$.

У к а з а н и е п. 1. $F'(p) = 2pF(p) - \frac{2}{\sqrt{\pi}}$, $f(0) = \lim_{p \rightarrow \infty} pF(p)$, поэтому $2f' = -tf$.

3.112. 1) $\frac{p}{(p^2+1)^{\frac{3}{2}}}$; 2) $\frac{1}{\alpha} \left(1 - \frac{p}{\sqrt{p^2+\alpha^2}}\right)$; 3) $\frac{1}{(p^2+1)^{\frac{3}{2}}}$; 4) $\frac{\alpha^2}{p + \sqrt{p^2+\alpha^2}}$;

5) $\frac{1}{\alpha} \left(\frac{p}{\sqrt{p^2-\alpha^2}} - 1\right)$; 6) $\frac{3}{(p^2-1)^{\frac{3}{2}}}$; 7) $2 \left(1 - e^{-\frac{1}{4p}}\right)$;

8) $p - \sqrt{p^2-\alpha^2} + |\beta| \operatorname{arctg} \frac{p}{|\beta|} + p \ln \frac{p + \sqrt{p^2-\alpha^2}}{2\sqrt{p^2+\beta^2}}$; 9) $4 \sin \frac{1}{4p} - \frac{1}{p} \cos \frac{1}{p}$.

3.113. 1) $e^{t \cos \theta} J_0(t \sin \theta)$, 2) $e^{-t \cos \theta} I_0(t \sin \theta)$.

3.114. Решение. Пригодна та же схема, что и в примере 3.7: оригинал представить степенным рядом и применить теорему разложения. Итак,

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{n+\nu} \sum_{k=0}^n \frac{\sqrt{\alpha}^{2k+\nu} \sqrt{\beta}^{2n-2k+\nu}}{k! \Gamma(k+\nu+1)(n-k)! \Gamma(n-k+\nu+1)}.$$

Если ввести коэффициент C_{γ}^k (см. пример 3.7), то оригинал примет форму

$$f(t) = (\alpha\beta)^{\frac{\nu}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\Gamma^2(n+\nu+1)} \sum_{k=0}^n C_{n+\nu}^k C_{n+\nu}^{n-k} \alpha^k \beta^{n-k}.$$

По теореме разложения

$$\begin{aligned} F(p) &= (\alpha\beta)^{\frac{\nu}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\Gamma(n+\nu+1)p^{n+\nu+1}} \sum_{k=0}^n C_{n+\nu}^k C_{n+\nu}^{n-k} \beta^{n-k} = \\ &= \frac{1}{p} (ab)^{\frac{\nu}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\Gamma(n+\nu+1)} \sum_{k=0}^n C_{n+\nu}^k C_{n+\nu}^{n-k} a^k b^{n-k}, \quad a = \frac{\alpha}{p}, \quad b = \frac{\beta}{p}. \end{aligned}$$

Ряд удастся просуммировать посредством преобразования внутренней суммы. Из сравнения коэффициентов при x^n в левой и правой частях тождества

$$(1+ax)^{n+\nu} (1+bx)^{n+\nu} = (1+\mu x + \sigma x^2)^{n+\nu}, \quad \mu = a+b, \quad \sigma = ab$$

получается соотношение

$$\sum_{k=0}^n C_{n+\nu}^k C_{n+\nu}^{n-k} a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^{2k \leq n} C_{n+\nu}^{n-k} C_{n-k}^k \mu^{n-2k} \sigma^k.$$

Подстановка в ряд и изменение порядка суммирования завершают решение задачи:

$$\begin{aligned} F(p) &= \frac{1}{p} \sigma^{\frac{\nu}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\Gamma(n+\nu+1)} \sum_{k=0}^{2k \leq n} C_{n+\nu}^{n-k} C_{n-k}^k \mu^{n-2k} \sigma^k = \\ &= \frac{1}{p} \sigma^{\frac{\nu}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{2k \leq n} \frac{(-1)^n \mu^{n-2k} \sigma^k}{k! \Gamma(k+\nu+1)(n-2k)!} = \\ &= \frac{1}{p} \sigma^{\frac{\nu}{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=2k}^{\infty} \frac{(-1)^n \mu^{n-2k} \sigma^k}{k! \Gamma(k+\nu+1)(n-2k)!} = \frac{1}{p} \sigma^{\frac{\nu}{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \mu^m \sigma^k}{m! k! \Gamma(k+\nu+1)} = \\ &= \frac{1}{p} \sigma^{\frac{\nu}{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sigma^k}{k! \Gamma(k+\nu+1)} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \mu^m}{m!} = \frac{1}{p} I_{\nu}(2\sqrt{\sigma}) e^{-\mu}. \end{aligned}$$

3.115. 1) $\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{p-1}} - \frac{1}{\sqrt{p+1}} \right)$; 2) $\frac{\sqrt{p+\sqrt{p^2+1}}}{\sqrt{2+1}}$; 3) $\frac{\sqrt{\sqrt{r^2+4}-p^2+2}}{\sqrt{2(p^4+4)}}$;
4) $1 - \frac{1}{\sqrt{2p(p^2+4)}} \left(p\sqrt{\sqrt{p^2+4}+p} + \sqrt{\sqrt{p^2+4}-p} \right)$.

3.117. $\frac{2\alpha^{\mu}\beta^{\nu}}{(\alpha^2+\beta^2)^{\frac{\mu+\nu+1}{2}}} J_{\mu}(\sqrt{\alpha^2+\beta^2}t).$

У к а з а н и е. Применить (3.36), (3.27).

3.118. 1) $t^{\frac{\nu}{2}} \text{bei}_{\nu}(2\sqrt{t})$; 2) $t^{\frac{\nu}{2}} \text{ber}_{\nu}(2\sqrt{t})$; 3) $t^{\frac{\nu}{2}} I_{\nu}(2\sqrt{t})$;
4) $t^{\frac{\nu}{2}} [J_{\nu}(2\sqrt{t}) - I_{\nu}(2\sqrt{t})]$; 5) $t^{\frac{\nu}{2}} [J_{\nu}(2\sqrt{t}) + I_{\nu}(2\sqrt{t})]$.

3.119. $2\sqrt{\frac{t}{\pi}} \text{ch} \sqrt{t}.$

3.120. 1) $\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \sin \frac{1}{2t}$; 2) $\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \cos \frac{1}{2t}$. Задача решена в [44], гл. 6, §1.

3.122. 1) $\frac{I_{2\nu}(\sqrt{8t})}{\sqrt{\pi t}}$; 2) $\frac{J_{2\nu}(\sqrt{8t})}{\sqrt{\pi t}}$. Решение п. 1. Разложение изображения в обобщенный степенной ряд сопряжено с техническими трудностями, которых можно избежать, если выразить функцию $F(p)$ через вырожденную гипергеометрическую функцию. Дифференциальное уравнение Куммера

$$zu'' + (\gamma - z)u' - \alpha u = 0,$$

в котором параметр $\gamma \neq 0, -1, \dots$ имеет фундаментальную систему решений

$$u_1(z) = \Phi(\alpha, \gamma, z), \quad u_2(z) = z^{1-\gamma} \Phi(\alpha - \gamma + 1, 2 - \gamma, z),$$

где вырожденная гипергеометрическая функция

$$\Phi(\alpha, \gamma, z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha_k z^k}{\gamma_k k!}, \quad (\lambda)_k = \lambda(\lambda+1)\dots(\lambda+k-1) = \frac{\Gamma(\lambda+k)}{\Gamma(\lambda)}.$$

Так как $I_{\nu}(x) \sim x^{\nu}$ при $x \rightarrow 0$ и $I_{\nu}(x) \sim \frac{1}{\sqrt{x}} e^x$ при $x \rightarrow +\infty$, то кажется оправданной замена $u(z) = z^s e^{mz} w(z)$, которую лучше сделать в два этапа. Если $u = e^{mz} v$, то для $v(z)$ получается уравнение

$$zv'' + [(2m-1)z + \gamma]v' + [m(m-1)z + \gamma m - \alpha]v = 0.$$

В результате подстановки $v = z^s w$ уравнение Куммера преобразуется к виду

$$w'' + A(z)w' + B(z)w = 0,$$

где $A(z) = 2m - 1 + \frac{2s + \gamma}{z}$, $B(z) = m(m - 1) + \frac{(2m - 1)s + m\gamma - \alpha}{x} + \frac{(\gamma + s - 1)s}{x^2}$. Если $m = \frac{1}{2}$, $2s + \gamma = 1$, $\alpha = m\gamma$, то последнее уравнение оказывается модифицированным уравнением Бесселя

$$w'' + \frac{1}{z}w' - \left(\frac{1}{4} + \frac{r^2}{x^2}\right)w = 0,$$

одно из решений которого $w(z) = I_\nu\left(\frac{z}{2}\right)$, а функция $u(z) = z^s e^{\frac{z}{2}} I_\nu\left(\frac{z}{2}\right)$ есть решение уравнения Куммера с параметрами $\alpha = \frac{1}{2} - s$, $\gamma = 1 - 2s$. Поскольку решения $u(z)$, $u_2(z)$ и $u_1(z)$ линейно зависимы, то

$$z^s e^{\frac{z}{2}} I_\nu\left(\frac{z}{2}\right) = C_1 \Phi\left(\frac{1}{2} - s, 1 - 2s, z\right) + C_2 z^{2s} \Phi\left(s + \frac{1}{2}, 2s + 1, z\right), \quad s = \nu > 0,$$

откуда при $z \rightarrow 0$ следует, что $C_1 = 0$, $C_2 = \frac{1}{2^s \Gamma(s + 1)}$. В итоге

$$I_\nu(z) = \frac{1}{2^\nu \Gamma(\nu + 1)} z^\nu e^{-z} \Phi\left(\nu + \frac{1}{2}, 2\nu + 1, 2z\right).$$

На основании принципа аналитического продолжения можно утверждать, что полученное соотношение справедливо при $\nu > -\frac{1}{2}$. Теперь следует проверить выполнение условий применимости правила дробных показателей. Изображение $F(p) = \frac{1}{\sqrt{p}} e^{\frac{1}{p}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2p)^{2k+\nu} k! \Gamma(k + \nu + 1)}$ равно произведению однозначной функции $f(p)$ и $p^{-(\nu + \frac{1}{2})}$. Пусть $\nu + 1$ — положительное рациональное число $\frac{m}{n}$ (дробь можно считать несократимой). Неоднозначность $F(p)$ определяется множителем

$$p^{\nu + \frac{1}{2}} = p^{\frac{m}{n}} = e^{\frac{m}{n} (\ln |p| + 2\pi k i)},$$

который принимает конечное число различных значений при $k = 0, 1, \dots, n - 1$, т.е. $p = 0$ — точка ветвления конечного порядка. Функция $\Phi\left(\nu + \frac{1}{2}, 2\nu + 1, 2z\right)$ мажорируется степенным рядом

$$\left|\Phi\left(\alpha, \gamma, \frac{1}{p}\right)\right| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|\alpha_k|}{|\gamma_k| k! |p|^k},$$

который сходится при любом значении $|p| \neq 0$, а производная по аргументу $|p|$ отрицательна; это говорит о том, что Φ ограничена в окрестности $p = \infty$. Следовательно, при $\operatorname{Re} p < a$ (a — любое фиксированное положительное число) $F(p) \rightarrow 0$, если $p \rightarrow \infty$. Итак, изображение представимо обобщенным степенным рядом

$$\begin{aligned} F(p) &= \frac{1}{2^\nu \Gamma(\nu + 1) p^{\nu + \frac{1}{2}}} \Phi\left(\nu + \frac{1}{2}, 2\nu + 1, \frac{2}{p}\right) = \\ &= \frac{\Gamma(2\nu + 1)}{2^\nu \Gamma(\nu + 1) \Gamma\left(\nu + \frac{1}{2}\right)} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^s \Gamma\left(s + \nu + \frac{1}{2}\right)}{k! \Gamma(s + 2\nu + 1) p^{s + \nu + \frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^{k+\nu} \Gamma\left(k + \nu + \frac{1}{2}\right)}{k! \Gamma(k + 2\nu + 1) p^{k + \nu + \frac{1}{2}}}, \end{aligned}$$

при выводе которого на последнем шаге применена формула удвоения для гамма-функции. По правилу дробных показателей

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^{k+\nu} t^{k + \nu + \frac{1}{2}}}{k! \Gamma(k + 2\nu + 1)} = \frac{1}{\sqrt{\pi t}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{\sqrt{8t}}{2}\right)^{2k+2\nu}}{k! \Gamma(k + 2\nu + 1)} = \frac{I_{2\nu}(\sqrt{8t})}{\sqrt{\pi t}}.$$

Соответствие установлено. Оно выполняется для всех ν , удовлетворяющих указанному неравенству. Это вытекает из принципа аналитического продолжения, примененного к полученному соответствию, записанному в виде равенства в интегральной форме.

У к а з а н и е к п. 2. Употребить формулу $\Phi(\alpha, \gamma, x) = e^x \Phi(\gamma - \alpha, \gamma - x)$.

$$3.123. \quad 1) \pi \operatorname{erf} \frac{1}{2\sqrt{p}}; \quad 2) l \frac{\sqrt{\pi}}{2p\sqrt{p}} \left(1 - \frac{1}{2p}\right) e^{-\frac{1}{4p}}.$$

$$3.124. \quad 1) \frac{1}{p\sqrt{p}} e^{\frac{1}{p}}; \quad 2) \frac{1}{\sqrt{p}} e^{\frac{1}{p}}.$$

$$3.129. \quad \text{У к а з а н и е . Изображение записать в виде } \frac{F(\sqrt{p})}{\sqrt{p}}, \text{ где } F(p) = \frac{e^{-\alpha p}}{p + \alpha}, \text{ и применить (3.38).}$$

$$3.130. \quad 1) 2\sqrt{\frac{t}{\pi}} e^{-\frac{\alpha^2}{4t}} - \alpha \operatorname{Erf}\left(\frac{\alpha}{2\sqrt{t}}\right); \quad 2) \left(t + \frac{\alpha^2}{2}\right) \operatorname{Erf} \frac{\alpha}{2\sqrt{t}} - \alpha \sqrt{\frac{t}{\pi}} e^{-\frac{\alpha^2}{4t}};$$

$$3) \frac{\alpha}{2t\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{\alpha^2}{4t}}; \quad 4) \operatorname{erf}(a\sqrt{t}); \quad 5) \frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-at} + \sqrt{a} \operatorname{erf}(a\sqrt{t});$$

$$6) \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{4t}}}{\sqrt{\pi t}} - a e^{a^2 t + a\alpha} \operatorname{Erf}\left(a\sqrt{t} + \frac{\alpha}{2\sqrt{t}}\right)$$

$$7) \operatorname{Erf}\left(\frac{\alpha}{2\sqrt{t}}\right) - e^{\alpha a + a^2 t} \operatorname{Erf}\left(\frac{\alpha}{2\sqrt{t}} + a\sqrt{t}\right); \quad 8) e^{at} \operatorname{erf}(\sqrt{at}).$$




Рис. 3.9

3.131. У к а з а н и е . Для вычисления интеграла (3.25) используется контур, изображенный на рис. 3.9. При $R \rightarrow \infty$ интеграл по C_R стремится к нулю (по лемме Жордана), поэтому

$$f(t) = -\frac{1}{2\pi i} \left[\int_{C_r} + \int_{\infty e^{i\pi}}^0 + \int_0^{\infty e^{-i\pi}} \right].$$

Теперь нужно перейти к пределу при $r \rightarrow 0$, сделать замены $p = \xi^2 e^{i\pi}$ в первом, $p = \xi^2 e^{-i\pi}$ — во втором интеграле и применить формулу $K_0(iz) = -\frac{i\pi}{2} H_0^{(2)}(z)$.

$$3.132. \quad 1) 2\alpha \ln 2; \quad 2) \frac{\pi}{2} |\beta| - |\alpha|.$$

3.133. У к а з а н и е . Применить равенство Парсеваля (см. задачу 3.132).

$$3.135. \quad 1) u(t) = f(t) e^{-a^2 \lambda t} = \int_0^t f(\tau) e^{-a^2 \lambda(t-\tau)} d\tau;$$

$$2) u(t) = \frac{1}{a\sqrt{\lambda}} f(t) * \sin a\sqrt{\lambda} t = \frac{1}{a\sqrt{\lambda}} \int_0^t f(\tau) \sin a\sqrt{\lambda}(t-\tau) d\tau.$$

3.136. У к а з а н и е . Изображение $U(p)$ является решением алгебраического уравнения $A(p)U(p) = F(p)$, а $V(p)$ — решением уравнения $A(p)V(p) = 1/p$, откуда $U(p) = pF(p)V(p)$.

$$3.137. \quad u(t) = \frac{A}{2a^2} e^{\frac{a^2}{4}} \left[e^{at} \operatorname{erf}\left(t + \frac{a}{2}\right) + e^{-at} \operatorname{erf}\left(t - \frac{a}{2}\right) - 2 \operatorname{erf} \frac{a}{2} \operatorname{sh} at \right] -$$

$$- \frac{2A}{a^2 \sqrt{\pi}} e^{-t^2}.$$

$$3.138. \quad p^m e^{-p\tau}.$$

3.140. У к а з а н и е. Применить соответствие (3.50).

3.142. Решение. Пусть $u(x, t) \doteq U(x, p)$, $v(x, t) \doteq V(x, p)$, $\mu(t) \doteq M(p)$, $F_1(x, p)$ и $F_2(x, p)$ — фундаментальная система решений линейного дифференциального уравнения 2-го порядка, которому удовлетворяет $U(x, p)$ (а также $V(x, p)$), и $l < \infty$. Изображение $U(x, p)$ определяется системой уравнений

$$U(x, p) = A_1(p)F_1(x, p) + A_2(p)F_2(x, p), \quad 0 < x < l,$$

$$\alpha_1 U_x(0, p) - \beta_1 U(0, p) = M(p),$$

$$\alpha_2 U_x(l, p) + \beta_2 U(l, p) = 0,$$

откуда $U(x, p) = H(x, p)M(p)$, где $H(x, p)$ не зависит от $M(p)$. Если $\mu(t) \equiv 1$, то $M(p) = \frac{1}{p}$ и $V(x, p) = \frac{1}{p}H(x, p)$. Таким образом, $U(x, p) = pM(p)V(x, p)$ и остается применить интеграл Дюамеля (3.28). При $l = \infty$ решение задачи проводится аналогично.

$$\mathbf{3.143.} \quad u(x, t) = v_0 e^{-\beta(t - \frac{|x|}{a})} \eta\left(t - \frac{|x|}{a}\right) \cdot \begin{cases} \frac{1}{\omega} \sin \omega\left(t - \frac{|x|}{a}\right), & \omega^2 = \frac{k}{M} - \beta^2 > 0, \\ t - \frac{|x|}{a}, & \frac{k}{M} = \beta^2, \beta = \frac{1}{M}\left(\frac{\alpha}{2} - \frac{T_0}{a}\right), \\ \frac{1}{\gamma} \operatorname{sh} \gamma\left(t - \frac{|x|}{a}\right), & \gamma^2 = \beta^2 - \frac{k}{M} > 0. \end{cases}$$

$$\mathbf{3.144.} \quad u(x, t) = \frac{F_0}{k} \eta\left(t - \frac{|x|}{a}\right) \times \\ \times \begin{cases} 1 - \left[\frac{\beta}{\omega} \sin \omega\left(t - \frac{|x|}{a}\right) + \cos \omega\left(t - \frac{|x|}{a}\right)\right] e^{-\beta(t - \frac{|x|}{a})}, & \omega^2 = \frac{k}{M} - \beta^2 > 0, \\ 1 - \left[1 + \beta\left(t - \frac{|x|}{a}\right)\right] e^{-\beta(t - \frac{|x|}{a})}, & \frac{k}{M} = \beta^2, \beta = \frac{T_0}{Ma}, \\ 1 - \left[\frac{\beta}{\gamma} \operatorname{sh} \gamma\left(t - \frac{|x|}{a}\right) + \operatorname{ch} \gamma\left(t - \frac{|x|}{a}\right)\right] e^{-\beta(t - \frac{|x|}{a})}, & \gamma^2 = \beta^2 - \frac{k}{M} > 0. \end{cases}$$

$$\mathbf{3.145.} \quad u(x, t) = \frac{k}{M} \eta\left(t - \frac{|x|}{a}\right) \times \\ \times \begin{cases} \frac{1}{\omega} \int_0^{t - \frac{|x|}{a}} \mu\left(t - \tau - \frac{|x|}{f}\right) \sin \omega \tau e^{-\beta \tau} d\tau, & \omega^2 = \frac{k}{M} - \beta^2 > 0, \\ \int_0^{t - \frac{|x|}{a}} \mu\left(t - \tau - \frac{|x|}{f}\right) \tau e^{-\beta \tau} d\tau, & \frac{k}{M} = \beta^2, \beta = \frac{T_0}{Ma}, \\ \frac{1}{\gamma} \int_0^{t - \frac{|x|}{a}} \mu\left(t - \tau - \frac{|x|}{f}\right) \operatorname{sh} \gamma \tau e^{-\beta \tau} d\tau, & \gamma^2 = \beta^2 - \frac{k}{M} > 0. \end{cases}$$

$$\mathbf{3.146.} \quad i(x, t) = \sqrt{\frac{C}{L}} u(x, t), \quad u(x, t) = v(x, t) \eta(t - \sqrt{LC} x),$$

где: 1) $v(x, t) = \frac{E(t - \sqrt{LC} x)}{1 + R_0 \sqrt{\frac{C}{L}}};$

2) $v(x, t) = \frac{1}{L_0} \sqrt{\frac{L}{C}} \int_{\sqrt{LC} x}^t E(t - \tau) e^{\frac{L}{L_0} x - \frac{1}{L_0} \sqrt{\frac{L}{C}} \tau} d\tau;$

$$3) v(x, t) = E(t - \sqrt{LC}x) - \frac{1}{C_0} \sqrt{\frac{C}{L}} \int_{\sqrt{LC}x}^t E(t - \tau) e^{\frac{C}{C_0}x - \frac{1}{C_0}\sqrt{\frac{C}{L}}\tau} d\tau.$$

Если $E(t) = E_0$, то: 1) $v(x, t) = \frac{E_0}{1 + R_0\sqrt{\frac{C}{L}}}$;

$$2) v(x, t) = E_0 \left(1 - e^{-\frac{1}{L_0}\sqrt{\frac{L}{C}}(t-x\sqrt{LC})} \right); \quad 3) v(x, t) = E_0 e^{-\frac{1}{C_0}\sqrt{\frac{C}{L}}(t-x\sqrt{LC})}.$$

$$3.147. u(x, t) = \frac{1}{1 + \sqrt{\frac{C}{L}} R_0} e^{-R\sqrt{\frac{C}{L}}x} E(t - x\sqrt{LC}) \eta(t - x\sqrt{LC});$$

$$i(x, t) = \sqrt{\frac{C}{L}} u(x, t).$$

$$3.148. u(x, t) = u_0 e^{-R\sqrt{\frac{C}{L}}x - \frac{1}{C_0}\sqrt{\frac{C}{L}}(t-x\sqrt{LC})} \eta(t - x\sqrt{LC}).$$

$$3.149. u(x, t) = \frac{Mav_0}{ES} \left(1 - e^{-\frac{ES}{Ma}(t-\frac{x}{a})} \right) \eta\left(t - \frac{x}{a}\right).$$

$$3.150. u(x, t) = \frac{v_0}{h} \left(1 - e^{-h(t-\frac{x}{a})} \right) \eta\left(t - \frac{x}{a}\right), \quad h = \frac{\alpha + a\rho_0 S}{m}.$$

$$3.151. u(x, t) = \frac{1}{\alpha^2} \left[2\alpha\sqrt{\frac{t}{\pi}} - 1 + e^{\alpha^2 t} \operatorname{Erf}(\alpha\sqrt{t}) \right], \quad \alpha = \frac{2\sqrt{2}\rho S\sqrt{a}}{m}, \quad a^2 = \frac{EJ}{\rho S}.$$

$$3.152. u(x, t) = \frac{x}{2} \sqrt{\frac{CR}{\pi}} \int_0^t E(t - \tau) e^{-\frac{CRx^2}{4\tau}} \frac{d\tau}{\tau\sqrt{\tau}}; \quad u(x, t) = E_0 \operatorname{Erf}\left(\frac{x}{2} \sqrt{\frac{CR}{t}}\right).$$

$$3.153. i(x, t) = \frac{E_0}{R_0} r^{\frac{R}{R_0}x + \frac{R}{R_0^2}Ct} \operatorname{Erf}\left(\frac{x}{2} \sqrt{\frac{CR}{t}} + \frac{1}{R_0} \sqrt{\frac{Rt}{C}}\right).$$

$$3.154. i(0, t) = 2k\sqrt{\frac{C}{\pi R}} (\sqrt{t} - \sqrt{t-t_0}) \eta(t - t_0).$$

$$3.155. i(0, t) = E_0 \sqrt{\frac{C}{L}} e^{-\frac{Rt}{2L}} I_0\left(\frac{Rt}{2L}\right).$$

$$3.156. u(x, t) = u_0 \times \begin{cases} \frac{2\sqrt{R_1 C_2}}{\sqrt{R_1 C_2} + \sqrt{R_2 C_1}} \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2} \sqrt{\frac{R_1 C_1}{t}}\right) + \frac{\sqrt{R_1 C_2} - \sqrt{R_2 C_1}}{\sqrt{R_1 C_2} + \sqrt{R_1 C_2}}, & x < 0, \\ \frac{2\sqrt{R_2 C_1}}{\sqrt{R_1 C_2} + \sqrt{R_2 C_1}} \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2} \sqrt{\frac{R_1 C_1}{t}}\right) + \frac{\sqrt{R_1 C_2} - \sqrt{R_2 C_1}}{\sqrt{R_1 C_2} + \sqrt{R_1 C_2}}, & 0 < x. \end{cases}$$

$$3.157. u(x, t) = u_0 \cdot \begin{cases} \frac{2\sqrt{L_1 C_2}}{\sqrt{L_1 C_2} + \sqrt{L_2 C_1}} \eta(t + x\sqrt{L_1 C_1}) - 1, & x < 0, \\ -\frac{2\sqrt{L_2 C_1}}{\sqrt{L_1 C_2} + \sqrt{L_2 C_1}} \eta(t + x\sqrt{L_2 C_2}) + 1, & 0 < x. \end{cases}$$

$$3.158. q(t) = q_0 e^{-\frac{1}{C_0}\sqrt{\frac{C}{L}}t}.$$

$$3.159. u(x, t) = 2q_0 \sqrt{\frac{t}{\pi D}} e^{-\frac{x^2}{4DT}} - \frac{q_0 x}{D} \operatorname{Erf} \left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}} \right).$$

$$u(x, t) = \frac{u_0}{\gamma} e^{-\beta t} \left[\operatorname{Erf} \frac{x}{2\sqrt{D_2 t}} + e^{\frac{\alpha \gamma}{D_2} (x + \alpha \gamma t)} \operatorname{Erf} \left(\frac{x}{2\sqrt{D_2 t}} + \alpha \gamma \sqrt{\frac{t}{D_2}} \right) \right],$$

$$\text{где } \gamma = 1 + \sqrt{\frac{D_2}{D_1}}.$$

$$3.161. q(t) = \frac{k}{a\sqrt{\pi}} \left[\frac{d}{dt} \int_0^t \frac{\mu(\tau) d\tau}{\sqrt{t-\tau}} - 2u_0 \sqrt{t} \right].$$

$$3.162. 1) q(t) = \frac{kA}{a} \frac{\Gamma(\beta+1)}{\Gamma(\beta+\frac{1}{2})} t^{\beta-\frac{1}{2}}; \quad 2) q(t) = \frac{k\sqrt{\alpha} u_1}{a} e^{\alpha t} \operatorname{erf}(\sqrt{\alpha t}).$$

$$3.163. u(x, t) = u_0 \left[\operatorname{Erf} \left(\frac{x}{2a\sqrt{t}} \right) - e^{hx+h^2 a^2 t} \operatorname{Erf} \left(\frac{x}{2a\sqrt{t}} + ha\sqrt{t} \right) \right].$$

$$3.164. \theta(t) = \mu(t) + \frac{1}{ah} \frac{d}{dt} \int_0^t \frac{\mu(\tau) d\tau}{\sqrt{t-\tau}};$$

$$1) \theta(t) = A \left(t + \frac{2}{ah} \sqrt{\frac{t}{\pi}} \right); \quad 2) \theta(t) = A \left(\sqrt{t} + \frac{\sqrt{\pi}}{2ah} \right).$$

$$3.165. u(x, t_0) = \frac{u_0 e^{\alpha t_0}}{2} \times \\ \times \left[e^{-\frac{x\sqrt{\alpha}}{a}} \operatorname{Erf} \left(\frac{x}{2a\sqrt{t_0}} - \alpha\sqrt{t_0} \right) + e^{\frac{x\sqrt{\alpha}}{a}} \operatorname{Erf} \left(\frac{x}{2a\sqrt{t_0}} + \alpha\sqrt{t_0} \right) \right].$$

$$3.166. u(x, t_0) = \frac{aq_0 e^{\alpha t_0}}{2k\sqrt{\alpha}} \times \\ \times \left[e^{-\frac{x\sqrt{\alpha}}{a}} \operatorname{Erf} \left(\frac{x}{2a\sqrt{t_0}} - \alpha\sqrt{t_0} \right) - e^{\frac{x\sqrt{\alpha}}{a}} \operatorname{Erf} \left(\frac{x}{2a\sqrt{t_0}} + \alpha\sqrt{t_0} \right) \right].$$

$$3.167. \text{Если } \alpha \neq a^2 h^2, \text{ где } h = \frac{\beta}{k}, \beta - \text{коэффициент теплообмена, то } u(x, t_0) = \\ = \frac{ahu_0}{\alpha - h^2 a^2} \left[hae^{a^2 h^2 t_0} \operatorname{Erf} (ah\sqrt{t_0}) + (\sqrt{\alpha} - ah)e^{\alpha t_0} - \sqrt{\alpha} e^{\alpha t_0} \operatorname{Erf} (\sqrt{\alpha t_0}) \right];$$

$$\text{если } \alpha = ah, \text{ то } u(x, t_0) = \frac{u_0 e^{\alpha t_0}}{2} \left[2\sqrt{\frac{\alpha t_0}{\pi}} - 2\alpha t \operatorname{Erf} (\sqrt{\alpha t_0}) + \operatorname{erf} (\sqrt{\alpha t_0}) \right].$$

$$3.168. u(x, t) = \frac{u_1 + u_2}{2} - \frac{(u_1 - u_2)x}{2|x|} \times \\ \times \left[\operatorname{erf} \frac{|x|}{2\sqrt{Dt}} + e^{2h|x|+4h^2 Dt} \operatorname{Erf} \left(\frac{|x|}{2\sqrt{Dt}} + 2h\sqrt{Dt} \right) \right].$$

$$3.169. u(x, t) = \frac{\alpha u_1 + u_2}{1 + \alpha} + \frac{u_2 - u_1}{1 + \alpha} \cdot \begin{cases} \operatorname{erf} \left(\frac{x}{2a\sqrt{t}} \right), & x < 0, \\ \alpha \operatorname{erf} \left(\frac{x}{2a\sqrt{t}} \right), & x > 0, \end{cases} \quad \alpha = \sqrt{\frac{k_1 \rho_1 C_1}{k_2 \rho_2 C_2}}.$$

$$3.170. u(x, t) = u_0 \left[1 - I_0 \left(\frac{ht}{2} \right) e^{-\frac{ht}{2}} \right], \quad q(0, t) = \frac{ku_0}{a\sqrt{\pi t}} (1 - e^{-ht}).$$

3.172. Да.

$$3.173. u(x, t) = \frac{2u_0 k_1 a_2}{k_2 a_1 + k_1 a_2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r_2 a_1 - k_1 a_2}{k_2 a_1 + k_1 a_2} \right)^n \operatorname{Erf} \left[\frac{1}{2\sqrt{t}} \left(\frac{x-l}{a_2} + \frac{(2n+1)l}{a_1} \right) \right].$$

$$3.174. \quad 1), 2) \quad u(x, t) = \frac{f_0}{\rho} \sin \frac{3\pi x}{l} \cdot \begin{cases} \frac{\omega \sin \omega_0 t - \omega_0 \sin \omega t}{\omega_0(\omega^2 - \omega_0^2)}, & \omega \neq \omega_0 = \left(\frac{3\pi a}{l}\right)^2, \\ \frac{\sin \omega_0 t - t\omega_0 \cos \omega_0 t}{2\omega_0}, & \omega = \omega_0. \end{cases}$$

$$3.175. \quad 1), 2) \quad u(x, t) = \frac{f_0}{C\rho} \cos \frac{\pi x}{2l} \cdot \begin{cases} \frac{e^{-\alpha_0 t} - e^{-\alpha}}{\alpha - \alpha_0}, & \alpha \neq \alpha_0 = \left(\frac{\pi a}{2l}\right)^2, \\ te^{-\alpha_0 t}, & \alpha = \alpha_0. \end{cases}$$

$$3.176. \quad u(l, t) = \frac{2aF_0}{ES_0 + \alpha a} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{ES_0 - \alpha a}{ES_0 + \alpha a} \right)^n \left[t - \frac{l}{a}(2n+1) \right] \cdot \eta \left(t - \frac{l}{a}(2n+1) \right).$$

Отраженной волны нет при $\alpha = \sqrt{\rho_0 S_0 E}$, $u(l, t) = \frac{aF_0}{ES_0} \left(t - \frac{l}{a} \right) \eta \left(t - \frac{l}{a} \right)$.

$$3.177. \quad \zeta(x, t) = \frac{Qt}{|x|} \sqrt{\frac{g}{2\pi|x|}} \left(\cos \frac{gt^2}{4x} \cdot C \left(\sqrt{\frac{g}{2\pi|x|}} t \right) + \sin \frac{gt^2}{4|x|} \cdot S \left(\sqrt{\frac{g}{2\pi|x|}} t \right) \right).$$

Приближенное решение: $\zeta(x, t) = \frac{Qt}{2|x|} \sqrt{\frac{g}{\pi|x|}} \sin \left(\frac{gt^2}{4|x|} + \frac{\pi}{4} \right)$.

У к а з а н и е. Начальное отклонение моделировать δ -функцией.

$$3.178. \quad \zeta_0 = \frac{\partial \zeta(x, t)}{\partial t}, \quad \zeta(x, t) - \text{решение предыдущей задачи, где } Qg \rightarrow \frac{I}{\rho}.$$

$$\text{Приближенное решение: } \zeta(x, t) = \frac{Igt^2}{4\rho|x|} \sqrt{\frac{g}{\pi|x|}} \cos \left(\frac{\pi}{4} + \frac{gt^2}{4|x|} \right).$$

У к а з а н и е. Потенциал скоростей $\psi_0 = \frac{\partial \psi}{\partial t}$, ψ — решение задачи

$$\psi_{xx} + \psi_{zz} = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad z < 0, \quad 0 < t,$$

$$\left(\psi_z + \frac{1}{g} \psi_{tt} \right) \Big|_{z=0} = 0,$$

$$\psi|_{z=0, t=0} = 0, \quad \psi_t|_{z=0, t=0} = -\frac{I}{\rho} \delta(x).$$

$$3.179. \quad \zeta(0, t) = \frac{Q}{\pi a} \left(1 - t \sqrt{\frac{g}{a}} e^{-\frac{gt^2}{4a}} \int_0^{\frac{t}{2}\sqrt{\frac{g}{a}}} e^{x^2} dx \right); \quad \zeta(0, t) = -\frac{2Q}{\pi gt^2} \left(1 + O\left(\frac{1}{t^2}\right) \right),$$

функция $\zeta(0, t)$ имеет один нуль. У к а з а н и е. Использовать формулы

$$\int_0^{\xi} e^{-x^2} \sin 2\xi x dx = e^{-\xi^2} \int_0^{\xi} e^{x^2} dx,$$

$$2\xi e^{-\xi^2} \int_0^{\xi} e^{x^2} dx = 1 + \frac{1}{2\xi^2} + O\left(\frac{1}{\xi^4}\right), \quad \xi \rightarrow \infty.$$

$$3.180. \quad u(x, t) = \frac{q_0}{kl} \left[\frac{(l-x)^2}{2} + a^2 t - \frac{l^2}{6} \right] - \frac{2q_0 l}{k\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{\pi n x}{l} e^{-\frac{\pi^2 a n^2}{l^2} t}}{n^2}.$$

Р е ш е н и е (фрагменты). Постановка задачи:

$$u_t = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$-ku_x(0, t) = q_0, \quad u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = 0.$$

Задача для изображения $U(x, p) = \mathcal{L}[u](x, p)$:

$$U_{xx} - \frac{p^2}{a^2} U = 0, \quad 0 < x < l,$$

$$U_x(0, p) = -\frac{q_0}{kp}, \quad U_x(l, p) = 0.$$

Изображение

$$U(x, p) = \frac{q_0 a \operatorname{ch} \frac{(l-x)\sqrt{p}}{a}}{\operatorname{sh} \frac{l\sqrt{p}}{a}}$$

— однозначная мероморфная функция с простыми полюсами $p_n = -\left(\frac{\pi a n}{l}\right)^2$, $n \in \mathbb{N}$, и полюсом 2-го порядка $p_0 = 0$. Оригинал восстанавливается с помощью 2-й теоремы разложения:

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{res}_{p_n} [U(p) e^{pt}].$$

Замечание. Метод Лапласа приводит к той же форме ответа, что и метод Фурье, однако при этом нет речи о собственных функциях, о вычислении коэффициентов Фурье, о переходе к задаче с однородными граничными условиями и т. п.

3.181. $u(x, t) = 2\alpha u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{\mu_n^2 + \alpha^2} \cos \frac{\mu_n(l-x)}{l} e^{-\frac{\alpha \mu_n}{l} t}}{\mu_n^2 + \alpha^2 + \alpha}$, $\mu_n > 0$ — корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = \alpha$, $\alpha = hl$.

3.182. 1) $u(x, t) = u_0 \left[\frac{x}{l} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{\pi n x}{l} e^{-\frac{\pi^2 a n^2}{l^2} t}}{n} \right]$;
 2) $u(x, t) = u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \left[\operatorname{Erf} \frac{(2n+1)l-x}{2a\sqrt{t}} - \operatorname{Erf} \frac{(2n+1)l+x}{2a\sqrt{t}} \right]$.

У к а з а н и е. Для получения 1-й формы ответа применить 2-ю теорему разложения к изображению

$$U(x, p) = \frac{u_0 \operatorname{sh} \frac{\sqrt{p} x}{a}}{p \operatorname{sh} \frac{\sqrt{p} l}{a}}.$$

Для получения 2-й формы представить функцию $U(x, p)$ в виде ряда

$$U(x, p) = \frac{u_0}{p} \frac{e^{\frac{(x-l)\sqrt{p}}{a}} - e^{-\frac{(x+l)\sqrt{p}}{a}}}{1 - e^{-\frac{2l\sqrt{p}}{a}}} = \frac{u_0}{p} \left(e^{\frac{(x-l)\sqrt{p}}{a}} - e^{-\frac{(x+l)\sqrt{p}}{a}} \right) \sum_0^{\infty} e^{-\frac{2nl\sqrt{p}}{a}}$$

и применить первую теорему разложения.

3.183. $u(x, t) = \frac{F_0}{ES} \left[x - 2\alpha l \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sqrt{\mu_n^2 + \alpha^2} \sin \frac{\mu_n x}{l} \cos \frac{\mu_n a t}{l}}{\mu_n^2 (\mu_n^2 + \alpha^2 + \alpha)} \right]$, $\mu_n > 0$

есть корень уравнения $\mu \operatorname{tg} \mu = \alpha$, $\alpha = \frac{m}{M}$, где m — масса стержня.

У к а з а н и е. Постановка задачи:

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t,$$

$$u(0, t) = 0, \quad -ES u_x(l, t) + F_0 = M u_{tt}(l, t), \quad u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0.$$

Изображение $U(x, p) = \mathcal{L}[u](x, p)$ — решение задачи

$$U_{xx} - \frac{p^2}{a^2} U = 0, \quad 0 < x < l,$$

$$U(0, p) = 0, \quad -ES U_x(l, p) + \frac{F_0}{p} = M p^2 U(l, p) = 0.$$

Функция

$$U(x, p) = \frac{F_0 \operatorname{sh} \frac{px}{a}}{p^2 \left(M p \operatorname{sh} \frac{pl}{a} + ES \operatorname{ch} \frac{pl}{a} \right)}$$

является мероморфной с простыми полюсами $p_0 = 0$, $p_{\pm n} = \pm i \frac{a\mu n}{l}$, $n \in \mathbb{N}^+$. Оригинал восстанавливается с помощью 2-й теоремы разложения

$$u(x, t) = \operatorname{res}_{p=0} (U(x, p)e^{pt}) + 2\operatorname{Re} \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{res}_{p=p_n} (U(x, p)e^{pt}).$$

3.184. $\tau = \frac{l}{2\mu a} (4\mu + 2 - e^{-\alpha\mu}) \in \left(\frac{2l}{a}, \frac{4l}{a}\right)$ при $\mu \geq \mu_0$, где μ_0 — корень уравнения $4\mu - e^{-2\mu} = 2$. У к а з а н и е. Постановка задачи:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0, t) &= 0, \quad -ESu_x(l, t) = Mu_{tt}(l, t), \\ u(x, 0) &= 0, \quad u_t(x, 0) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < l, \\ -v, & x = l. \end{cases} \end{aligned}$$

Для изображения $U(x, p) = \mathcal{L}[u](x, p)$ получается задача

$$\begin{aligned} U_{xx} - \frac{p^2}{a^2} U &= 0, \quad 0 < x < l, \\ U(0, p) &= 0, \quad -ESU_x(l, p) = M(p^2 U(l, p) + v). \end{aligned}$$

Общее решение уравнения

$$U(x, p) = A \operatorname{sh} \frac{px}{a} + B \operatorname{ch} \frac{px}{a},$$

частное решение, удовлетворяющее граничным условиям, запишется в виде

$$U(x, p) = -\frac{Mv \operatorname{sh} \frac{px}{a}}{p \left(Mp \operatorname{sh} \frac{pl}{a} + \frac{ES}{a} \operatorname{ch} \frac{pl}{a} \right)}.$$

При $t < \tau$ элемент стержня, примыкающий к торцу $x = l$, находится в сжатом состоянии, поэтому натяжение $T(l, t) = ESu_x(l, t) < 0$; в момент $t = \tau$ отрыва массы M от стержня $T(l, t) = 0$. Чтобы найти производную $u_x(l, t)$, следует представить функцию $U_x(l, p)$ в виде

$$\begin{aligned} U_x(l, p) &= -\frac{v}{a} \frac{\operatorname{ch} \alpha p}{p(p \operatorname{sh} \alpha p + \beta \operatorname{ch} \alpha p)} = -\frac{v}{a} \frac{1 - e^{-2\alpha p}}{(p + \beta) \left[1 - \frac{p - \beta}{p + \beta} e^{-2\alpha p} \right]} = \\ &= -\frac{v}{a} \frac{1 - e^{-2\alpha p}}{p + \beta} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{p - \beta}{p + \beta} \right)^n e^{-2\alpha n p}, \quad \text{где } \alpha = \frac{l}{a}, \quad \beta = \mu \frac{a}{l}. \end{aligned}$$

Отсюда (см. задачу 3.83)

$$\begin{aligned} u_x(l, t) &= -\frac{v}{a} \eta(t) - \frac{v}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \left[L_n \left(\frac{2\mu a t}{l} - 4\mu(n+1) \right) + L_{n+1} \left(\frac{2\mu a t}{l} - 4\mu(n+1) \right) \right] \times \\ &\quad \times e^{2\mu(n+1)} \eta \left(t - \frac{2l}{a} (n+1) \right). \end{aligned}$$

3.185. $\tau = \frac{l}{2\mu a} (4\mu + 2 - e^{-\alpha\mu}) \in \left(\frac{2l}{a}, \frac{4l}{a}\right)$ при $\mu \geq \mu_0$, где μ_0 — корень уравнения $4\mu + e^{-2\mu} = 2$.

3.186. $\tau = \frac{2}{a} \min\{l_1; l_2\}$.

3.187. $\tau = \frac{2}{a} \min \left\{ \sqrt{\frac{\rho_1}{E_1}}; \sqrt{\frac{\rho_2}{E_2}} \right\}$.

3.188. Если $\rho_1 E_1 = \rho_2 E_2$, то $\tau = \frac{2l}{a_1}$; в противном случае $\tau = \infty$.

$$\mathbf{3.189.} \quad q(\mathbf{r}, u) = \varphi(u) \frac{e^{-\frac{x^2+y^2}{4\tau}}}{4\pi\tau} \left[\frac{e^{-\frac{(z-z_0)^2}{4\tau}} - e^{-\frac{(z+z_0)^2}{4\tau}}}{4\pi\tau} - \frac{1}{2D} e^{\frac{z+z_0}{D} + \frac{\tau}{4D^2}} \operatorname{Erf} \left(\frac{z+z_0}{2\sqrt{\tau}} + \frac{\sqrt{\tau}}{2D} \right) \right],$$

где $\varphi(u)$ имеет вид (1.149), а возраст $\tau = \tau(u)$ определен формулой (1.66).

$$\mathbf{3.190.} \quad u(r, t) = u_1 + (u_0 - u_1) \frac{r_0}{r} \operatorname{Erf} \left(\frac{(r - r_0)}{2a\sqrt{t}} \right).$$

$$\mathbf{3.191.} \quad q(t) = \frac{k}{r_0} \left(\mu(t) + \frac{r_0}{a\sqrt{\pi}} \frac{d}{dt} \int_0^t \frac{\mu(\tau) d\tau}{\sqrt{t-\tau}} \right). \quad 1) \quad q(t) = \frac{kA}{r_0} \left(t + \frac{2r_0}{a} \sqrt{\frac{t}{\pi}} \right);$$

$$2) \quad q(t) = \frac{kA}{r_0} \left(\sqrt{t} + \frac{r_0\sqrt{\pi}}{2a} \right).$$

$$\mathbf{3.192.} \quad \theta(t) = \frac{1+hr_0}{hr_0} \mu(t) + \frac{1}{ah\sqrt{\pi}} \frac{d}{dt} \int_0^t \frac{\mu(\tau) d\tau}{\sqrt{t-\tau}};$$

$$1) \quad \theta(t) = A \left(\frac{1+hr_0}{hr_0} t + \frac{2}{ah} \sqrt{\frac{t}{\pi}} \right); \quad 2) \quad \theta(t) = A \left(\frac{1+hr_0}{hr_0} \sqrt{t} + \frac{\sqrt{\pi}}{2ah} \right).$$

$$\mathbf{3.193.} \quad Q(t) = 4\pi r_0^2 kh \left[u_0(t) - ah \int_0^t \left(\frac{1}{\sqrt{b\tau}} - be^{b^2\tau} \operatorname{Erf} b\sqrt{\tau} \right) u_0(t-\tau) d\tau \right],$$

$$\text{если } u_0(t) = u_0, \text{ то } Q(t) = \frac{4\pi r_0^2 kh u_0}{1+hr_0} \left(1 + hr_0 e^{b^2 t} \operatorname{Erf} b\sqrt{t} \right), \quad b = a \left(h + \frac{1}{r_0} \right).$$

$$\mathbf{3.194.} \quad \text{Если } \sqrt{\alpha} \neq b = \left(h + \frac{1}{r_0} \right) \sqrt{D}, \text{ то}$$

$$u(r, t) = 4\pi r_0^2 h \sqrt{D} u_0 \left\{ 1 - \frac{b}{b^2 - \alpha} e^{-b^2 t} \operatorname{Erf} b\sqrt{t} - \frac{1}{2} e^{-\alpha t} h \sqrt{D} \left[\frac{e^{-\alpha t} \operatorname{Erf}(-\sqrt{\alpha t})}{b + \sqrt{\alpha}} + \frac{e^{\alpha t} \operatorname{Erf}(\sqrt{\alpha t})}{b - \sqrt{\alpha}} \right] \right\};$$

$$\text{если } \sqrt{\alpha} = b, \text{ то } u(r, t) = 4\pi r_0^2 h \sqrt{D} u_0 \times \\ \times \left\{ 1 - \frac{h}{4} \sqrt{\frac{D}{\alpha}} e^{-\alpha t} [e^{-\alpha t} \operatorname{Erf}(-\sqrt{\alpha t}) - (1 + 4\alpha t) e^{\alpha t} \operatorname{Erf}(\sqrt{\alpha t})] + 4 \sqrt{\frac{\alpha t}{\pi}} \right\}.$$

$$\mathbf{3.195.} \quad \text{Если } 3\rho C > 4\rho_0 C_0, \text{ то}$$

$$u(t) = \frac{3Q}{4\pi r_0^3 \rho_0 C_0} \frac{1}{\alpha_1 - \alpha_2} \left[\alpha_1 e^{\alpha_1^2 t} \operatorname{Erf}(\alpha_1 \sqrt{t}) - \alpha_2 e^{\alpha_2^2 t} \operatorname{Erf}(\alpha_2 \sqrt{t}) \right], \text{ где}$$

$$\alpha_{1,2} = \frac{3k}{2a\rho_0 C_0 r_0} \pm \frac{1}{r_0} \sqrt{\frac{3k}{\rho_0 C_0} \left(\frac{3\rho C}{4\rho_0 C_0} - 1 \right)}, \quad (3.77)$$

$$\text{если } 3\rho C = 4\rho_0 C_0, \text{ то } u(t) = \frac{3Q}{4\pi r_0^3 \rho_0 C_0} \left[(1 + 2\alpha^2 t) e^{\alpha^2 t} \operatorname{Erf} \left(\alpha \sqrt{t} - 2\alpha \sqrt{\frac{t}{\pi}} \right) \right],$$

$$\text{где } \alpha = \frac{3k}{2a\rho_0 C_0 r_0}; \text{ при } t \rightarrow \infty \text{ функция } u(t) \text{ имеет в обоих случаях следующее асимптотическое представление: } u(t) = \frac{Q}{8\pi\sqrt{\pi}ka} \left[\frac{1}{t\sqrt{t}} + O\left(\frac{1}{t^2\sqrt{t}}\right) \right].$$

$$\mathbf{3.196.} \quad \text{Если } r > r_0, \text{ то } u(r, t) = u_1 + \frac{r}{r_0} \frac{u_0 - u_1}{\alpha_2 - \alpha_1} \times$$

$$\times \left[\alpha_2 e^{\alpha_2^2 t + \frac{\alpha_2}{a}(r-r_0)} \operatorname{Erf} \left(\frac{r-r_0}{2a\sqrt{t}} + \alpha_2 \sqrt{t} \right) - \alpha_1 e^{\alpha_1^2 t + \frac{\alpha_1}{a}(r-r_0)} \operatorname{Erf} \left(\frac{r-r_0}{2a\sqrt{t}} + \alpha_1 \sqrt{t} \right) \right],$$

$$\text{если } r \leq r_0, \text{ то } u(t) = u(r_0, t), \text{ где } \alpha_{1,2} \text{ определены формулой (3.77).}$$

3.197. Если $r > r_0$, то $u(r, t) = u_1 + \frac{r_0}{(\alpha_2 - \alpha_1)r} \times$
 $\times \left[\left(u_0 - u_1 - \frac{q_0}{\alpha_2^2 C_0 \rho_0} \right) \alpha_2 e^{\alpha_2^2 t + \frac{\alpha_2}{a}(r-r_0)} \operatorname{Erf} \left(\frac{r-r_0}{2a\sqrt{t}} + \alpha_2 \sqrt{t} \right) - \right.$
 $\left. - \left(u_0 - u_1 - \frac{q_0}{\alpha_2^2 C_0 \rho_0} \right) \alpha_1 e^{\alpha_1^2 t + \frac{\alpha_1}{a}(r-r_0)} \operatorname{Erf} \left(\frac{r-r_0}{2a\sqrt{t}} + \alpha_1 \sqrt{t} \right) \right] -$
 $- \frac{r_0}{r} \frac{q_0}{\alpha_1 \alpha_2 C_0 \rho_0} \operatorname{Erf} \left(f \frac{r-r_0}{2a\sqrt{t}} \right),$
 если $r \leq r_0$, то $u(t) = u(r_0, t)$, где $\alpha_{1,2}$ определены формулой (3.77).

3.198. 1) Если $r \geq r_0$, то

$$u(r, t) = u_1 + \frac{r_0}{(\alpha_2 - \alpha_1)r} \left[(\alpha_1(u_0 - u_1) + d) e^{\alpha_1^2 t + \frac{\alpha_1}{a}(r-r_0)} \operatorname{Erf} \left(\frac{r-r_0}{2a\sqrt{t}} + \alpha_1 \sqrt{t} \right) - \right.$$

$$\left. - \alpha_2(u_0 - u_1) + d) e^{\alpha_2^2 t + \frac{\alpha_2}{a}(r-r_0)} \operatorname{Erf} \left(\frac{r-r_0}{2a\sqrt{t}} + \alpha_2 \sqrt{t} \right) \right],$$

если $r < r_0$, то $u(t) = u(r_0, t)$, $d = \frac{b\sqrt{\pi}}{\rho_0 C_0}$;

$$2) u(t) = u_1 + \frac{\alpha_2}{\alpha_2 - \alpha_1} \left[u_0 - u_1 - \frac{q_0}{\rho_0 C_0 (\alpha_2^2 - \beta)} \right] e^{\alpha_2^2 t} \operatorname{Erf}(\alpha_2 \sqrt{t}) -$$

$$- \frac{\alpha_1}{\alpha_2 - \alpha_1} \left[u_0 - u_1 - \frac{q_0}{\rho_0 C_0 (\alpha_1^2 - \beta)} \right] e^{\alpha_1^2 t} \operatorname{Erf}(\alpha_1 \sqrt{t}) -$$

$$- \frac{q_0 e^{\beta t}}{\rho_0 C_0 (\alpha_1^2 - \beta)(\alpha_2^2 - \beta)} [\beta + \alpha_1 \alpha_2 + (\alpha_1 + \alpha_2)] \sqrt{\beta} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta} t),$$

величины $\alpha_{1,2}$ даны в ответе к задаче 3.196.

3.199. $q(r, t) = \frac{Q_0 \varphi(u)}{Vr} \left[\frac{r_0}{\sqrt{\pi \tau}} e^{-\frac{(r-r_0)^2}{4\tau}} - e^{\frac{\tau}{r_0} + \frac{r-r_0}{r_0}} \operatorname{Erf} \left(\frac{\sqrt{\tau}}{r_0} + \frac{r_0-r}{\sqrt{\tau}} \right) \right]$, где

$V = \frac{4\pi r_0^3}{3}$, $\varphi(u)$ дана в ответе к задаче 1.266, а функция $u = u(\tau)$ определена формулой (1.65). У к а з а н и е. См. задачу 1.267.

3.200. $i(x, t) = E_0 \sqrt{\frac{G}{\omega L}} e^{-\sqrt{\frac{LG\omega}{2}} x} \sin \left(\omega t - \sqrt{\frac{LG\omega}{2}} x - \frac{\pi}{4} \right).$

Р е ш е н и е. После применения преобразования Лапласа к задаче

$$u_x + Li_t = 0, \quad i_x + Gu = 0, \quad 0 < x, \quad 0 < t,$$

$$u(0, t) = E_0 \sin \omega t, \quad u(x, 0) = i(x, 0) = 0,$$

получается задача для $I(x, p)$

$$I_{xx} - pLGI = 0, \quad 0 < x,$$

$$I_x(0, p) = -\frac{E_0 G \omega}{p^2 + \omega^2},$$

решение которой

$$I(x, p) = E_0 \sqrt{\frac{G}{L}} \frac{\omega e^{-\sqrt{pLG} x}}{\sqrt{p}(p^2 + \omega^2)}.$$

По формуле (3.25)

$$i(x, t) = E_0 \sqrt{\frac{G}{L}} \frac{\omega}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+\infty} \frac{e^{\sqrt{pLG} x}}{(r^2 + \omega^2)\sqrt{p}} dp, \quad \sigma > 0.$$

при $t \rightarrow \infty$ (см. [44])

$$i(x, t) = E_0 \sqrt{\frac{G}{L}} \frac{\omega}{2\pi i} \sum_k \operatorname{res} \frac{e^{-\sqrt{p_k L G} x + p_k t}}{(p_k^2 + \omega^2) \sqrt{p_k}}, \quad \operatorname{Re} p > 0,$$

откуда следует выражение, приведенное в ответе.

$$\mathbf{3.201.} \quad i(0, t) = E_0 \sqrt{\frac{2G}{\omega L}} \cos \delta \cdot \sin(\omega t - \delta), \quad \operatorname{tg} \delta = 1 + L_0 \sqrt{\frac{2\omega G}{L}}.$$

$$\mathbf{3.202.} \quad i(x, t) = E_0 \sqrt{\frac{\omega C}{R}} e^{-\sqrt{\frac{\omega C R}{2}} x} \sin \left(\omega t - \sqrt{\frac{\omega R C}{2}} x + \frac{\pi}{4} \right).$$

$$\mathbf{3.203.} \quad i(0, t) = E_0 \sqrt{\frac{2\omega C}{R}} \sin \delta \cdot \cos(\omega t - \delta), \quad \operatorname{ctg} \delta = 1 + \frac{1}{C_0} \sqrt{\frac{2C}{\omega R}}.$$

$$\mathbf{3.204.} \quad u(x, t) = u_0 e^{-\frac{x}{a} \sqrt{\frac{\omega}{2}}} \sin \left(\omega t - \frac{x}{a} \sqrt{\frac{\omega}{2}} \right).$$

$$\mathbf{3.205.} \quad u(r, t) = u_0 \left[1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{Y_0 \left(\frac{\mu_n}{r_0} r \right) e^{-\left(\frac{\alpha \mu_n}{r_0} \right)^2 t}}{\mu_n J_1(\mu_n)} \right], \quad \mu_n > 0 - \text{ нуль } J_0(\mu).$$

Решение. Так как температура боковой поверхности не зависит ни от φ , ни от z , то тепловые потоки вдоль $\mathbf{e}_\varphi$ и $\mathbf{e}_z$ отсутствуют. Таким образом, температура зависит от r, t и определяется условиями

$$u_t = a^2 \Delta u, \quad 0 < r < r_0, \quad 0 < t,$$

$$u(r_0, t) = u_0,$$

$$|u(r, t)| < \infty, \quad u(r, 0) = 0.$$

Для изображения $U(r, p)$ получается задача

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{dU}{dr} - \frac{p}{a^2} U = 0, \quad 0 < r < r_0,$$

$$U(r_0, p) = \frac{u_0}{p}, \quad |U(0, p)| < \infty.$$

Ее решение

$$U(r, p) = \frac{u_0}{p} \frac{I_0 \left(\frac{\sqrt{p}}{a} r \right)}{I_0 \left(\frac{\sqrt{p}}{a} r_0 \right)}$$

— однозначная аналитическая функция, особыми точками которой являются простые полюсы $p_0 = 0, p_n = - \left(\frac{\mu_n a}{r_0} \right)^2, n \in \mathbb{N}$. Оригинал восстанавливается с помощью 2-й теоремы разложения $u(r, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{res}_{p=p_n} (U(r, p) e^{pnt})$, что эквивалентно выражению, приведенному в ответе.

$$\mathbf{3.206.} \quad u(r, t) = u_0 \left[1 - 2\alpha \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_n r}{r_0} \right) e^{-\left(\frac{\alpha \mu_n}{r_0} \right)^2 t}}{(\alpha^2 + \mu_n^2) J_0(\mu_n)} \right], \quad \mu_n > 0 - \text{ корень уравнения } \alpha J_0(\mu) - \mu J_1(\mu) = 0, \quad \alpha = r_0 h.$$

$$\mathbf{3.207.} \quad u(r, z) = 2u_0 \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0 \left(\frac{\mu_{2n} r}{r_0} \right) - J_0(\mu_{2n})}{\mu_{2n}^2 J_0(\mu_{2n})} e^{-\frac{\nu \mu_{2n}^2}{u_0 r_0^2} z} \right), \quad \mu_{2n} > 0 - \text{ нуль функции } J_2(\mu).$$

3.208. $u(r, t) = u_0(t) - \frac{\partial}{\partial t} \int_0^t u_0(\tau) d\tau \int_0^\infty f(\xi) e^{-\left(\frac{a\xi}{r_0}\right)^2 (t-\tau)} d\xi$; если $u_0(t) = u_0$, то $u(r, t) = u_0 \left[1 - \int_0^\infty f(\xi) e^{-\left(\frac{a\xi}{r_0}\right)^2 t} d\xi \right]$, $f(\xi) = \frac{2}{\pi\xi} \frac{J_0(\xi)Y_0\left(\frac{r}{r_0}\xi\right) - Y_0(\xi)J_0\left(\frac{r}{r_0}\xi\right)}{J_0^2(\xi) + Y_0^2(\xi)}$.

У к а з а н и е . Использовать соответствие (3.45).

3.209. $u(r, t) = u_0 - \frac{2h}{\pi} \int_0^\infty \frac{(hJ_0(\xi r_0) + \xi J_1(\xi r_0))Y_0(\xi r) - (hY_0(\xi r_0) + \xi Y_1(\xi r_0))J_0(\xi r)}{(hJ_0(\xi r_0) + \xi J_1(\xi r_0))^2 + (hY_0(\xi r_0) + \xi Y_1(\xi r_0))^2} \frac{e^{-D\xi^2 t}}{\xi} d\xi$.

3.210. $u(t) = \frac{8ku_0}{a^2 C_0} \int_0^\infty \frac{e^{-a^2 \xi^2 t}}{(\xi Y_0(\xi r_0) - \alpha Y_1(\xi r_0))^2 + (\xi J_0(\xi r_0) - \alpha J_1(\xi r_0))^2} \frac{d\xi}{\xi}$,

где $\alpha = \frac{2\pi k r_0}{a^2 C_0}$.

3.211. $u(r, t) = u_0 \left[1 - \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{J_0(\xi)Y_0\left(\frac{r}{r_0}\xi\right) - Y_0(\xi)J_0\left(\frac{r}{r_0}\xi\right)}{J_0^2(\xi) + Y_0^2(\xi)} \frac{e^{-\left(\frac{a\xi}{r_0}\right)^2 t}}{\xi} d\xi \right]$.

3.212. $u(r, z, t) = \frac{8r_0 q_0}{k\pi^2} \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n \cos \frac{\alpha_n z}{l}}{2n+1} \int_0^\infty \frac{1 - e^{-\left(\frac{a}{r_0}\right)^2 \left(\xi^2 + \left(\frac{\alpha_n r_0}{l}\right)^2\right) t}}{\xi^2 + \left(\frac{\alpha_n r_0}{l}\right)^2} f(\xi) d\xi$,
 $f(\xi) = \frac{J_1(\xi)Y_0\left(\frac{r}{r_0}\xi\right) - Y_1(\xi)J_0\left(\frac{r}{r_0}\xi\right)}{J_1^2(\xi) + Y_1^2(\xi)}, \quad \alpha_n = \frac{2n+1}{2}$.

У к а з а н и е . Применить преобразование Лапласа и полученную задачу решать методом Фурье. Для восстановления оригинала воспользоваться соответствием (3.46).

3.215. $\mathcal{M}[f](p, \varphi) = -\frac{2q\pi r_0^p \cos p(\pi - \varphi)}{p \sin p\pi}, \quad -1 < \operatorname{Re} p < 0$.

3.216. 1) $\frac{r_0^p}{p}$, $\operatorname{Re} p > 0$; 2) $-\frac{r_0^p}{p}$, $\operatorname{Re} p < 0$;
 3) $\frac{\pi}{\sin p\pi}$, $0 < \operatorname{Re} p < 1$; 4) $\frac{\pi(1-p)}{\sin p\pi}$, $0 < \operatorname{Re} p < 2$.

У к а з а н и е . п. 3, п. 4. При интегрировании на комплексной плоскости взять вспомогательный контур, изображенный на рис. 3.4.

3.218. 1) $\frac{\Gamma(p)}{a^p} \sin \frac{\pi p}{2}$, $-1 < \operatorname{Re} p < 1$; 2) $\frac{\Gamma(p)}{a^p} \cos \frac{\pi p}{2}$, $0 < \operatorname{Re} p < 1$.

У к а з а н и е . При интегрировании на комплексной плоскости взять вспомогательный контур, изображенный на рис. 3.10, а и перейти к пределам при $\rho \rightarrow 0$ и $R \rightarrow \infty$. Для оценки интеграла по дуге C_R воспользоваться неравенством $\cos \varphi \geq 1 - \frac{2}{\pi} \varphi$, $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$, геометрическое доказательство которого дано на рис. 3.10, б.




Рис. 3.10

- 3.220.** 1) $\frac{\Gamma(p)}{a^p}$, $0 < \operatorname{Re} p$; 2) $\Gamma(p+1)$, $-1 < \operatorname{Re} p$;
 3) $\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{p}{2}\right)$, $0 < \operatorname{Re} p$; 4) $\frac{1}{2a^{\frac{p+1}{2}}}\Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right)$, $-1 < \operatorname{Re} p$;
 5) $2a\Gamma(2p+1)$, $-\frac{1}{2} < \operatorname{Re} p$; 6) $\frac{2\Gamma(2p)}{a^{2p}}$, $0 < \operatorname{Re} p$.

У к а з а н и е. К соответствию, приведенному в задаче 3.217, применить свойства, сформулированные в задаче 3.219.

- 3.221.** 1) $\Gamma(p+1)\cos\frac{\pi p}{2}$, $-2 < \operatorname{Re} p < 0$; 2) $-\Gamma(p-1)\cos\frac{\pi p}{2}$, $0 < \operatorname{Re} p < 2$;
 3) $\frac{2\Gamma(2p)}{a^{2p}}\sin\pi p$, $-\frac{1}{2} < \operatorname{Re} p < \frac{1}{2}$; 4) $\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{p}{2}\right)\cos\frac{\pi p}{4}$, $0 < \operatorname{Re} p < 2$;
 5) $-\frac{1}{2a^{\frac{p}{2}+1}}\Gamma\left(\frac{p}{2}+1\right)\sin\frac{\pi p}{4}$, $-2 < \operatorname{Re} p < 0$;
 6) $2a^{2p}\Gamma(2p)\cos\pi p$, $0 < \operatorname{Re} p < 2$.

У к а з а н и е. К соответствиям, приведенным в ответе к задаче 3.218, применить свойства, сформулированные в задаче 3.219.

- 3.222.** 1) $\frac{r_0^{\alpha+p}}{\alpha+p}$, $\operatorname{Re} p > -\alpha$; 2) $-\frac{r_0^{\alpha+p}}{\alpha+p}$, $\operatorname{Re} p < -\alpha$;
 3) $-\frac{\pi a}{\sin\pi p}$, $-1 < \operatorname{Re} p < 0$; 4) $\frac{2\pi}{a^{2p-\frac{1}{2}}\cos 2\pi p}$, $-\frac{1}{4} < \operatorname{Re} p < \frac{1}{4}$;
 5) $\frac{\pi}{2\sin\frac{\pi p}{2}}$, $0 < \operatorname{Re} p < 2$; 6) $\frac{\pi}{2a^{\frac{p+1}{2}}\cos\frac{\pi p}{2}}$, $-1 < \operatorname{Re} p < 1$;
 7) $-\frac{2\pi}{\sin 2\pi p}$, $\frac{1}{2} < \operatorname{Re} p < 1$; 8) $\frac{6\pi}{\sin 6\pi p}$, $\frac{1}{3} < \operatorname{Re} p < \frac{1}{2}$.

У к а з а н и е. К соответствию для функции п. 3 из задачи 3.216 применить свойства, сформулированные в задаче 3.219.

- 3.223.** 1) $\frac{2\pi(1-2p)}{\sin 2\pi p}$, $0 < \operatorname{Re} p < 1$; 2) $\frac{4a^{\frac{p-1}{2}}\pi p}{\sin 2\pi p}$, $-\frac{1}{2} < \operatorname{Re} p < \frac{1}{2}$;
 3) $\frac{\pi(2-p)}{4\sin\frac{\pi p}{2}}$, $0 < \operatorname{Re} p < 2$; 4) $\frac{\pi(1-p)}{4\cos\frac{\pi p}{2}}$, $-1 < \operatorname{Re} p < 3$;

$$\begin{aligned}
 & 5) \frac{a^{p-2} \pi p}{4 \sin \frac{\pi p}{2}}, \quad -2 < \operatorname{Re} p < 2; & 6) \frac{2 \pi a(3-2p)}{9 \sin \frac{2 \pi p}{3}}, \quad 0 < \operatorname{Re} p < 3; \\
 & 7) \frac{\pi(2p+1)}{2 a^{p+\frac{3}{2}} \cos \pi p}, \quad -\frac{3}{2} < \operatorname{Re} p < \frac{1}{2}; & 8) \frac{4 \pi(3-4p)}{\sin 4p}, \quad \frac{1}{2} < \operatorname{Re} p < 1.
 \end{aligned}$$

У к а з а н и е. К соответствию для функции п. 4 из задачи 3.216 применить свойства, сформулированные в задаче 3.219.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{3.224.} \quad & 1) \frac{\pi}{p \sin \pi p}, \quad -1 < \operatorname{Re} p < 0; & 2) \frac{\pi}{p} \operatorname{ctg} \pi p, \quad -1 < \operatorname{Re} p < 0; \\
 & 3) \frac{\pi}{p \sin \frac{\pi p}{2}}, \quad -2 < \operatorname{Re} p < 0; & 4) -\frac{\pi}{p+1} \operatorname{ctg} \frac{\pi p}{2}, \quad -3 < \operatorname{Re} p < -1; \\
 & 5) \frac{\pi}{p \sin 2 \pi p}, \quad -\frac{1}{2} < \operatorname{Re} p < 0; & 6) \frac{\pi}{p+1} \operatorname{ctg} 2 \pi p, \quad -\frac{3}{2} < \operatorname{Re} p < -1; \\
 & 7) \frac{\pi}{p} \operatorname{tg} \frac{\pi p}{4}, \quad -2 < \operatorname{Re} p < 0; & 8) \frac{\pi}{p} \operatorname{tg} \pi p, \quad -\frac{1}{2} < \operatorname{Re} p < 0.
 \end{aligned}$$

У к а з а н и я. 1) Интегрирование по частям преобразует интеграл в аналогичный интегралу в решении п. 3 задачи 3.216; 2) При интегрировании по частям получается интеграл $\int_0^\infty \frac{r^p dr}{1-r}$. Можно воспользоваться контуром, изображенным на рис. 3.4, который (для обхода точки $r=1$) следует дополнить двумя полукругностями с центрами в точке $r=1$.

$$\mathbf{3.227.} \quad 1) r_0^p; \quad 2) a^p; \quad 3) \frac{1}{2}; \quad 4) -\frac{1}{2} r_0^{p+1}; \quad 5) 1-p; \quad 6) -p; \quad 7) \frac{2-p}{4}; \quad 8) -\frac{p}{4}.$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{3.228.} \quad & 1) \frac{1}{p^2}, \quad \operatorname{Re} p > 0; & 2) -\frac{\pi^2 \cos \pi p}{\sin^2 \pi p}, \quad 0 < \operatorname{Re} p < 1; \\
 & 3) -\frac{\pi^2 \cos \frac{\pi p}{2}}{4 \sin^2 \frac{\pi p}{2}}, \quad 0 < \operatorname{Re} p < 2; & 4) r_0^p \ln r_0; \\
 & 5) \frac{2}{p^3}, \quad \operatorname{Re} p < 0; & 6) -\frac{\pi}{p^2} \frac{\sin \pi p + \pi p \cos \pi p}{\sin^2 \pi p}, \quad -1 < \operatorname{Re} p < 0; \\
 & 7) \Gamma'(p), \quad 0 < \operatorname{Re} p; & 8) -r_0^p(1+p \ln r_0).
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{3.230.} \quad & 1) \frac{\pi U(p)}{2 \sin \frac{\pi p}{2}}, \quad \Omega_f = (0 < \operatorname{Re} p < 2); \\
 & 2) \frac{\pi(2-p)}{\sin \frac{\pi p}{2}} U(p-1), \quad \Omega_f = (0 < \operatorname{Re} p < 4); \\
 & 3) \frac{\pi}{p} \operatorname{tg} \pi p U(p), \quad \Omega_f = (-\frac{1}{2} < \operatorname{Re} p < 0); \\
 & 4) -\frac{\pi^2 \cos \pi p}{\sin^2 \pi p} U(p), \quad \Omega_f = (0 < \operatorname{Re} p < 2); \\
 & 5) \frac{U(p)}{p^2}, \quad \Omega_f = (0 < \operatorname{Re} p); \quad 6) \frac{2U(p)}{p^3}, \quad \Omega_f = (\operatorname{Re} p < 0).
 \end{aligned}$$

У к а з а н и я. Применить теорему умножения (задача 3.229). В интегралах п. 5 и п. 6 распространить интегрирование на $(0; \infty)$, введя единичные функции $\eta\left(1-\frac{r}{\rho}\right)$ и $\eta\left(\frac{r}{\rho}-1\right)$.

- 3.231.** 1) $\frac{\pi\Gamma(p)}{\sin \pi p}$, $0 < \operatorname{Re} p < 1$; 2) $\frac{\Gamma(p-1)}{2 \sin \frac{\pi p}{2}}$, $0 < \operatorname{Re} p < 2$;
 3) $\frac{\pi^2}{p \sin^2 \pi p}$, $0 < \operatorname{Re} p < 2$; 4) не существует;
 5) $\frac{2\Gamma(2p)}{\sin \pi p}$, $0 < \operatorname{Re} p < \frac{1}{2}$; 6) $\frac{\Gamma(p)}{p} \sin \frac{\pi p}{2}$, $-1 < \operatorname{Re} p < 0$;
 7) $\left(\frac{1}{p} - 1\right) \frac{\pi}{\sin \pi p}$, $0 < \operatorname{Re} p < 2$; 8) $\frac{2\Gamma(p)}{p^3} \cos \frac{\pi p}{2}$, $0 < \operatorname{Re} p < 1$.

У к а з а н и я. Применить теорему умножения (задача 3.229). Интегралы п. 6, п. 7, п. 8 преобразовать, как рекомендовано в ответе к предыдущей задаче.

- 3.233.** 1) $\Gamma(p)U(1-p)$, $\operatorname{Re} p > 0$; 2) $\frac{\pi \operatorname{ctg} \pi p}{p} U(1-p)$, $-1 < \operatorname{Re} p < 0$;
 3) $\frac{U(1-p)}{p}$, $\operatorname{Re} p > 0$; 4) $\Gamma(p) \cos \frac{\pi p}{2} U(1-p)$, $0 < \operatorname{Re} p < 1$;
 5) $\Gamma(p) \sin \frac{\pi p}{2} U(2-p)$, $-1 < \operatorname{Re} p < 1$; 6) $-\frac{U(1-p)}{p}$, $\operatorname{Re} p < 0$.

У к а з а н и е. Интегралы п. 3, п. 6 преобразовать как рекомендовано в ответе к задаче 3.230.

- 3.234.** 1) $\frac{(-1)^n}{n!} \ln^n r \eta(1-r)$; 2) $\frac{(-1)^{n+1}}{n!} \ln^n r \eta(r-1)$; 3) $\frac{r^2}{1+r}$; 4) $\frac{\sqrt{r}}{1+r}$;
 5) $\ln(r^2+1)$; 6) $r \ln |1-r|$; 7) re^{-r} ; 8) $\frac{1}{4} re^{-\sqrt{r}}$.

$$\mathbf{3.236.} \quad u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \operatorname{arcctg} \frac{1 + \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi \varphi}{\alpha}}{\left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \sin \frac{\pi \varphi}{\alpha}}.$$

$$\mathbf{3.237.} \quad u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \operatorname{arcctg} \frac{r^{\frac{\pi}{\alpha}} - r_0^{\frac{\pi}{\alpha}}}{2r_0^{\frac{\pi}{2\alpha}} r^{\frac{\pi}{2\alpha}} \cos \frac{\pi \varphi}{2\alpha}}.$$

$$\mathbf{3.238.} \quad u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \operatorname{arcctg} \frac{r - r_0}{2\sqrt{rr_0} \cos \frac{\varphi}{2}}.$$

3.239. У к а з а н и е. Для восстановления прообраза применить теорему умножения (3.59) и соответствие (3.56).

$$\mathbf{3.240.} \quad u(r, \varphi) = \begin{cases} \frac{u_0}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi k}{\alpha}} \frac{\sin \frac{\pi k \varphi}{\alpha}}{k + \frac{\pi}{\alpha}}, & r > r_0, \\ u_0 \left[\frac{r \sin(\alpha - \varphi)}{r_0 \sin \alpha} - \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{\pi k}{\alpha}} \frac{\sin \frac{\pi k \varphi}{\alpha}}{k - \frac{\pi}{\alpha}} \right], & r < r_0. \end{cases}$$

$$\mathbf{3.241.} \quad 1) u(r, \varphi) = \frac{u_0 r}{\pi r_0} \left(\frac{1}{2} \sin \varphi \cdot \ln \frac{r^2 - 2rr_0 \cos \varphi + r_0^2}{r^2 + 2rr_0 \cos \varphi + r_0^2} + \cos \varphi \cdot \operatorname{arcctg} \frac{r^2 - r_0^2}{2rr_0 \sin \varphi} \right). \\ 2) u(r, \varphi) = \frac{u_0 r}{\pi r_0} \left[\frac{1}{2} \sin \varphi \cdot \ln \left(1 - 2 \frac{r_0}{r} \cos \varphi + \left(\frac{r_0}{r}\right)^2 \right) + \cos \varphi \cdot \operatorname{arcctg} \frac{r - r_0 \cos \varphi}{r_0 \sin \varphi} \right].$$

$$3) u(r, \varphi) = \frac{u_0 r}{\pi r_0} \left(2 \left(\frac{r_0}{r} \right)^{\frac{1}{3}} \sin \frac{2\varphi}{3} + \frac{1}{2} \sin \varphi \cdot \ln \frac{r^{\frac{2}{3}} - 2r^{\frac{1}{3}} r_0^{\frac{1}{3}} \cos \frac{\varphi}{3} + r_0^{\frac{2}{3}}}{r^{\frac{2}{3}} + 2r^{\frac{1}{3}} r_0^{\frac{1}{3}} \cos \frac{\varphi}{3} + r_0^{\frac{2}{3}}} + \right. \\ \left. + \cos \varphi \cdot \operatorname{arctg} \frac{r^{\frac{2}{3}} - r_0^{\frac{2}{3}}}{2r^{\frac{1}{3}} r_0^{\frac{1}{3}} \sin \frac{\varphi}{3}} \right).$$

$$4) u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \sqrt{\frac{r}{r_0}} \left[\sin \frac{\varphi}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{r}{r_0}} \sin \varphi \cdot \ln \left(1 - 2\sqrt{\frac{r_0}{r}} \cos \frac{\varphi}{2} + \frac{r_0}{r} \right) + \right. \\ \left. + \sqrt{\frac{r}{r_0}} \cos \varphi \cdot \operatorname{arctg} \frac{1 - \sqrt{\frac{r_0}{r}} \cos \frac{\varphi}{2}}{\sqrt{\frac{r_0}{r}} \sin \frac{\varphi}{2}} \right].$$

$$\mathbf{3.242.} \quad u(r, \varphi) = \frac{u_0 r}{\pi r_0} \left(\frac{1}{2} \sin \varphi \cdot \ln \frac{r^2 - 2rr_0 \sin \varphi + r_0^2}{r^2 + 2rr_0 \sin \varphi + r_0^2} - \frac{1}{2} \cos \varphi \times \right. \\ \left. \times \ln \frac{r^2 - 2rr_0 \cos \varphi + r_0^2}{r^2 + 2rr_0 \cos \varphi + r_0^2} + \cos \varphi \cdot \operatorname{arctg} \frac{r^2 - r_0^2}{2rr_0 \sin \varphi} - \sin \varphi \cdot \operatorname{arctg} \frac{r^2 - r_0^2}{2rr_0 \cos \varphi} \right).$$

$$\mathbf{3.243.} \quad u(r, \varphi) = \begin{cases} \frac{u_0}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{\pi k}{\alpha}} \frac{\sin \frac{\pi k \varphi}{\alpha}}{k + \frac{\alpha}{\pi}}, & r < r_0, \\ u_0 \left[\frac{r_0}{r} \frac{\sin(\alpha - \varphi)}{\sin \alpha} - \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r} \right)^{\frac{\pi k}{\alpha}} \frac{\sin \frac{\pi k \varphi}{\alpha}}{k - \frac{\alpha}{\pi}} \right], & r > r_0. \end{cases}$$

$$\mathbf{3.244.} \quad 1) u(r, \varphi) = \frac{u_0 r_0}{\pi r} \left(\frac{1}{2} \sin \varphi \cdot \ln \frac{r^2 - 2rr_0 \cos \varphi + r_0^2}{r^2 + 2rr_0 \cos \varphi + r_0^2} - \frac{1}{2} \cos \varphi \times \right. \\ \left. \times \ln \frac{r^2 - 2rr_0 \sin \varphi + r_0^2}{r^2 + 2rr_0 \sin \varphi + r_0^2} + \cos \varphi \cdot \operatorname{arctg} \frac{r_0^2 - r^2}{2rr_0 \sin \varphi} - \sin \varphi \cdot \operatorname{arctg} \frac{r_0^2 - r^2}{2rr_0 \cos \varphi} \right).$$

$$2) u(r, \varphi) = \frac{u_0 r_0}{\pi r} \left[\frac{1}{2} \sin \varphi \cdot \ln \left(1 - 2\frac{r}{r_0} \cos \varphi + \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right) + \cos \varphi \cdot \operatorname{arctg} \frac{r_0 - r}{r \sin \varphi} \right].$$

$$3) u(r, \varphi) = \frac{u_0 r_0}{\pi r} \left(\frac{1}{2} \sin \varphi \cdot \ln \frac{r^{\frac{2}{5}} - 2r^{\frac{1}{5}} r_0^{\frac{1}{5}} \cos \frac{\varphi}{5} + r_0^{\frac{2}{5}}}{r^{\frac{2}{5}} + 2r^{\frac{1}{5}} r_0^{\frac{1}{5}} \cos \frac{\varphi}{5} + r_0^{\frac{2}{5}}} - \frac{1}{2} \cos \varphi \times \right. \\ \left. \times \ln \frac{r^{\frac{2}{5}} - 2r^{\frac{1}{5}} r_0^{\frac{1}{5}} \sin \frac{\varphi}{5} + r_0^{\frac{2}{5}}}{r^{\frac{2}{5}} + 2r^{\frac{1}{5}} r_0^{\frac{1}{5}} \sin \frac{\varphi}{5} + r_0^{\frac{2}{5}}} + \cos \varphi \cdot \operatorname{arctg} \frac{r_0^{\frac{2}{5}} - r^{\frac{2}{5}}}{2r^{\frac{1}{5}} r_0^{\frac{1}{5}} \sin \frac{\varphi}{5}} - \sin \varphi \cdot \operatorname{arctg} \frac{r_0^{\frac{2}{5}} - r^{\frac{2}{5}}}{2r^{\frac{1}{5}} r_0^{\frac{1}{5}} \cos \frac{\varphi}{5}} \right).$$

$$4) u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \sqrt{\frac{r_0}{r}} \left[\sin \frac{\varphi}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{r_0}{r}} \sin \varphi \cdot \ln \left(1 - 2\sqrt{\frac{r}{r_0}} \cos \frac{\varphi}{2} + \frac{r}{r_0} \right) + \right. \\ \left. + \sqrt{\frac{r_0}{r}} \cos \varphi \cdot \operatorname{arctg} \frac{1 - \sqrt{\frac{r}{r_0}} \cos \frac{\varphi}{2}}{\sqrt{\frac{r}{r_0}} \sin \frac{\varphi}{2}} \right].$$

3.245. $Q = \frac{ku_0}{\pi} \lim_{t \rightarrow 1+0} [\ln(1-t) + \int_0^t \frac{t^{\frac{\alpha}{\pi}} dt}{1-t}]$. Решение (фрагменты). Постановка задачи:

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r < \infty, \quad 0 < \varphi < \alpha \leq 2\pi,$$

$$u(r, 0) = \frac{u_0}{r_0}(r_0 - r)\eta(r_0 - r), \quad u(r, \alpha) = 0.$$

Образ $U(p, \varphi)$ удовлетворяет уравнениям

$$U_{\varphi\varphi} + p^2 U = 0, \quad 0 < \varphi < \alpha,$$

$$U(p, 0) = \frac{U_0 r_0 p}{p(p+1)} \frac{\sin p(\alpha - \varphi)}{\sin p\alpha}, \quad U(p, \alpha) = 0, \quad \operatorname{Re} p > 0.$$

Восстановление прообраза осуществляется по формуле

$$u(r, \varphi) = \frac{u_0}{2\pi i} \int_{-i\infty}^{i\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^p \frac{\sin p(\alpha - \varphi)}{p(p+1) \sin p\alpha} = \frac{u_0}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi k}{\alpha}} \frac{\sin \frac{\pi k \varphi}{\alpha}}{k(k+1)}, \quad r_0 < r.$$

Плотность теплового потока через грань $\varphi = 0$ равна $q(r) = -\frac{k}{r} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \big|_{\varphi=0}$, а поток через полосу ($r_0 < r_1 \leq r < \infty$) единичной ширины равен

$$Q(t) = \int_{r_1}^{\infty} q(r) dr = -\frac{ku_0}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi k}{\alpha}} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k + \frac{\alpha}{\pi}}\right) = \\ = \frac{ku_0}{\pi} \left[\ln(1-t) + t^{-\frac{\alpha}{\pi}} \int_0^t \frac{\tau^{\frac{\alpha}{\pi}} d\tau}{1-\tau} \right], \quad t = \left(\frac{r_0}{r_1}\right)^{\frac{\pi}{\alpha}}.$$

В результате $Q = \lim_{t \rightarrow 1+0} Q(t)$. Суммирование рядов проводится так же, как в примере 3.13.

$$\mathbf{3.246.} \quad 1) \frac{ku_0}{\pi} \left(\frac{\pi\sqrt{3}}{2} + \ln 12\sqrt{3} - 6 \right); \quad 2) \frac{ku_0}{\pi} \left(\frac{\pi\sqrt{3}}{6} + \ln 3\sqrt{3} - 3 \right);$$

$$3) -\frac{ku_0}{\pi}; \quad 4) \frac{ku_0}{\pi} \left(\frac{\pi\sqrt{3}}{6} + \frac{3}{2} \ln 3 - \frac{15}{4} \right).$$

$$\mathbf{3.247.} \quad \sigma(r) = \frac{u_0}{4\pi^2 r} \cdot \begin{cases} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{\pi k}{\alpha}} \frac{(-1)^k}{k + \frac{\alpha}{\pi}}, & r < r_0, \\ \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi k}{\alpha}} \frac{(-1)^k}{k - \frac{\alpha}{\pi}} - \frac{r_0}{r \sin \alpha} + \frac{1}{\alpha}, & r > r_0. \end{cases}$$

$$\mathbf{3.248.} \quad q = \frac{u_0}{4\pi^2} \left(\int_0^1 \frac{t^{\frac{2}{3}} dt}{1+t} - \ln 2 \right).$$

$$\mathbf{3.249.} \quad 1) q = \frac{u_0}{4\pi^2} \left(\frac{3}{2} - \frac{\pi}{\sqrt{3}} \right); \quad 2) q = \frac{u_0}{4\pi^2} (1 - 2 \ln 2);$$

$$3) q = \frac{u_0}{4\pi^2} \left(\frac{\sqrt{3}\pi}{3} - \frac{9}{4} \right); \quad 4) q = \frac{u_0}{4\pi^2} \left(\frac{\pi}{\sqrt{3}} - \frac{9}{10} - 2 \ln 2 \right).$$

$$\mathbf{3.250.} \quad u(r, \varphi) = \begin{cases} \frac{u_0}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi k}{\alpha}} \frac{\sin \frac{\pi k \varphi}{\alpha}}{k + \frac{\alpha}{\pi}}, & r > r_0, \\ u_0 \left[\left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta} \frac{\sin \beta(\alpha - \varphi)}{\sin \alpha \beta} - \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{\pi k}{\alpha}} \frac{\sin \frac{\pi k \varphi}{\alpha}}{k - \frac{\alpha}{\pi}} \right], & r < r_0. \end{cases}$$

$$\mathbf{3.251.} \quad 1) \quad u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \left(\frac{r}{r_0} \right)^\beta \left[\frac{1}{2} \sin \beta \varphi \cdot \ln \left(1 - 2 \left(\frac{r_0}{r} \right)^\beta \cos \beta \varphi + \left(\frac{r_0}{r} \right)^{2\beta} \right) + \right. \\ \left. + \cos \beta \varphi \cdot \operatorname{arccctg} \frac{r^\beta - r_0^\beta \cos \beta \varphi}{r_0^\beta \sin \beta \varphi} \right].$$

$$2) \quad u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \left(\frac{r}{r_0} \right)^\beta \left[\left(\frac{r_0}{r} \right)^{\frac{\beta}{2}} \sin \frac{\beta \varphi}{2} + \frac{1}{2} \sin \beta \varphi \times \right. \\ \left. \times \ln \left(1 - 2 \left(\frac{r_0}{r} \right)^{\frac{\beta}{2}} \cos \frac{\beta \varphi}{2} + \left(\frac{r_0}{r} \right)^\beta \right) + \cos \beta \varphi \cdot \operatorname{arccctg} \frac{r^{\frac{\beta}{2}} - r_0^{\frac{\beta}{2}} \cos \frac{\beta \varphi}{2}}{r_0^{\frac{\beta}{2}} \sin \frac{\beta \varphi}{2}} \right].$$

$$\mathbf{3.252.} \quad u(r, \varphi) = \begin{cases} -\frac{u_0}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{\pi k}{\alpha}} \frac{(-1)^k \sin \frac{\pi k \varphi}{\alpha}}{k + \frac{\alpha \beta}{\pi}}, & 0 \leq r < r_0, \\ u_0 \left[\left(\frac{r_0}{r} \right)^\beta \frac{\sin \beta \varphi}{\sin \alpha \beta} - \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r} \right)^{\frac{\pi k}{\alpha}} \frac{(-1)^k \sin \frac{\pi k \varphi}{\alpha}}{k - \frac{\alpha \beta}{\pi}} \right], & r_0 < r. \end{cases}$$

$$\mathbf{3.253.} \quad 1) \quad u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \left(\frac{r_0}{r} \right)^\beta \left[\frac{1}{2} \sin \beta \varphi \cdot \ln \left(1 + 2 \left(\frac{r}{r_0} \right)^\beta \cos \beta \varphi + \left(\frac{r}{r_0} \right)^{2\beta} \right) - \right. \\ \left. - \cos \beta \varphi \cdot \operatorname{arccctg} \frac{r_0^\beta + r^\beta \cos \beta \varphi}{r^\beta \sin \beta \varphi} \right].$$

$$2) \quad u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \left(\frac{r_0}{r} \right)^\beta \left[\left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{\beta}{2}} \sin \frac{\beta \varphi}{2} - \frac{1}{2} \sin \beta \varphi \times \right. \\ \left. \times \ln \left(1 + 2 \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{\beta}{2}} \cos \frac{\beta \varphi}{2} + \left(\frac{r}{r_0} \right)^\beta \right) + \cos \beta \varphi \cdot \operatorname{arccctg} \frac{r_0^{\frac{\beta}{2}} + r^{\frac{\beta}{2}} \cos \frac{\beta \varphi}{2}}{r^{\frac{\beta}{2}} \sin \frac{\beta \varphi}{2}} \right].$$

$$\mathbf{3.254.} \quad u(r, \varphi) = \frac{q_0}{4\pi k} \ln \frac{1 + \left(\frac{r_0}{r} \right)^{\frac{2\pi}{\alpha}} - 2 \left(\frac{r_0}{r} \right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi}{\alpha} (\varphi + \varphi_0)}{1 + \left(\frac{r_0}{r} \right)^{\frac{2\pi}{\alpha}} - 2 \left(\frac{r_0}{r} \right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi}{\alpha} (\varphi - \varphi_0)}.$$

$$\mathbf{3.255.} \quad u(r, \varphi) = q \ln \frac{r + r_0 - 2\sqrt{rr_0} \cos \frac{\varphi + \varphi_0}{2}}{r + r_0 - 2\sqrt{rr_0} \cos \frac{\varphi - \varphi_0}{2}}.$$

$$\mathbf{3.256.} \quad \sigma_{1,2}(r) = -\frac{q}{\alpha r} \frac{1}{\left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{\pi}{\alpha}} + \left(\frac{r_0}{r} \right)^{\frac{\pi}{\alpha}}}.$$

$$\mathbf{3.257.} \quad \mathbf{H} = \operatorname{rot} \mathbf{A}, \quad \mathbf{A} = A \mathbf{e}_J, \quad A(r, \varphi) = -\frac{J}{c} \ln \rho_1 \rho_2 + C, \quad \text{где } \rho_{1,2} = r_0^{\frac{2\pi}{\alpha}} + r^{\frac{2\pi}{\alpha}} - \\ - 2(r_0 r)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi}{\alpha} (\varphi \pm \varphi_0). \quad \text{У к а з а н и е.} \quad \text{См. задачу 1.422.}$$

$$\mathbf{3.258.} \quad u(x, y) = \begin{cases} \frac{2q\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \ln \frac{1}{r_2} + \frac{2q}{\varepsilon_1} \ln \frac{1}{r_1} + C, & x > 0, \\ \frac{4q}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} \ln \frac{1}{r_1} + C, & x < 0, \end{cases}$$

$$r_{1,2} = \sqrt{(x \mp r_0)^2 + y^2}.$$

Решение (фрагменты). Постановка задачи в полярных координатах:

$$\begin{aligned} \Delta u &= -\frac{4\pi q}{\varepsilon_1} \frac{\delta(r-r_0) \cdot \delta(\varphi)}{r}, & \Delta u &= 0, \\ 0 < r, \quad |\varphi| &< \frac{\pi}{2}, & 0 < r, \quad \frac{\pi}{2} < |\varphi| < \pi, \\ u(r, \pm \frac{\pi}{2} - 0) &= u(r, \pm \frac{\pi}{2} + 0), \quad \varepsilon_1 u_\varphi(r, \pm \frac{\pi}{2} - 0) = \varepsilon_2 u_\varphi(r, \pm \frac{\pi}{2} + 0) \\ u(r, \pi - 0) &= u(r, -\pi + 0), \quad u_\varphi(r, \pi - 0) = u_\varphi(r, -\pi + 0). \end{aligned}$$

Поведение решения определяется потенциалом заряда Q

$$u_0(r, \varphi) = \frac{2q}{\varepsilon_1} \ln \frac{r_0}{\sqrt{r^2 - 2rr_0 \cos \varphi + r_0^2}}$$

с фиксированной аддитивной постоянной. Функция $u_0(r, \varphi)$ является частным решением задачи. К решению, полученному посредством преобразования Меллина, следует прибавить произвольную постоянную C . Образ $U(p, \varphi)$ удовлетворяет системе уравнений

$$\begin{aligned} U_{\varphi\varphi} + p^2 U &= -\frac{4\pi q}{\varepsilon_1} r_0^p \delta(\varphi) & U_{\varphi\varphi} + p^2 U &= 0, \\ |\varphi| &< \frac{\pi}{2}, & \frac{\pi}{2} < |\varphi| < \pi, \\ U(p, \pm \frac{\pi}{2} - 0) &= U(p, \pm \frac{\pi}{2} + 0), \quad \varepsilon_1 U_\varphi(p, \pm \frac{\pi}{2} - 0) = \varepsilon_2 U_\varphi(p, \pm \frac{\pi}{2} + 0) \\ U(p, \pi - 0) &= U(p, -\pi + 0), \quad U_\varphi(p, \pi - 0) = U_\varphi(p, -\pi + 0). \end{aligned}$$

Решение системы уравнений:

$$U(p, \varphi) = \begin{cases} K\varepsilon_2 \frac{\sin p(\frac{\pi}{2} - |\varphi|)}{\cos \frac{\pi p}{2}} - K\varepsilon_1 \frac{\cos p(\frac{\pi}{2} - |\varphi|)}{\sin \frac{\pi p}{2}}, & |\varphi| < \frac{\pi}{2}, \\ -2K\varepsilon_1 \frac{\cos p(\pi - |\varphi|)}{\sin \pi p}, & \frac{\pi}{2} < |\varphi| < \pi, \end{cases}$$

где $K = \frac{2\pi q r_0^p}{\varepsilon_1(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)}$, $-1 < \operatorname{Re} p < 0$.

Прообраз восстанавливается по формуле обратного преобразования

$$u(r, \varphi) = \begin{cases} \frac{4q\varepsilon_2}{\varepsilon_1(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{2k+1} \frac{\cos(2k+1)\varphi}{2k+1} + \\ + \frac{4q}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{2k} \frac{\cos 2k\varphi}{2k}, & |\varphi| < \frac{\pi}{2}, \\ \frac{4q}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} \left[\ln \frac{r_0}{r} + \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^k \frac{\cos k\varphi}{k} \right], & \frac{\pi}{2} < |\varphi| < \pi. \end{cases}$$

Суммирование рядов (см. пример 3.13) завершает решение задачи.

3.259. $\mathbf{F} = \frac{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)q^2}{2\varepsilon_1(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)r_0} \mathbf{e}_x.$

3.260. $\mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \operatorname{rot} \mathbf{A}, \quad \mathbf{A} = A\mathbf{e}_z, \quad r_{1,2} = \sqrt{(x \mp r_0)^2 + y^2}, \quad \text{где}$

$$u(x, y) = \begin{cases} \frac{2J\mu_1(\mu_2 - \mu_1)}{c(\mu_1 + \mu_2)} \ln \frac{1}{r_1} + \frac{2J\mu_1}{c} \ln \frac{1}{r_2} + C, & x > 0; \\ \frac{4J\mu_1\mu_2}{c(\mu_1 + \mu_2)} \ln \frac{1}{r_1} + C, & x < 0. \end{cases}$$

$$3.261. \mathbf{F} = \frac{\mu_1(\mu_1 - \mu_2)J^2}{2c^2(\mu_1 + \mu_2)r_0} \mathbf{e}_x.$$

$$3.262. \mathbf{j} = -\frac{1}{\sigma} \nabla u, \quad r_{1,2} = \sqrt{(x \mp r_0)^2 + y^2}, \quad \text{где}$$

$$u(x, y) = \begin{cases} \frac{J(\sigma_1 - \sigma_2)}{2\pi\sigma_1(\sigma_1 + \sigma_2)} \ln \frac{1}{r_2} + \frac{J}{2\pi\sigma_1} \ln \frac{1}{r_1} + C, & x > 0; \\ \frac{J}{2\pi(\sigma_1 + \sigma_2)} \ln \frac{1}{r_1} + C, & x < 0. \end{cases}$$

$$3.263. \sigma(r) = -\frac{\pi p}{2\alpha^2} \frac{(rr_0)^{\frac{\pi}{\alpha}-1} \left(r^{\frac{\pi}{\alpha}} - r_0^{\frac{\pi}{\alpha}} \right)}{\left(r^{\frac{\pi}{\alpha}} + r_0^{\frac{\pi}{\alpha}} \right)^2}.$$

$$3.264. \sigma(r) = \frac{\pi p}{2\alpha^2} \frac{(rr_0)^{\frac{\pi}{\alpha}-1}}{\left(r^{\frac{\pi}{\alpha}} + r_0^{\frac{\pi}{\alpha}} \right)^2}.$$

$$3.265. u(r, \varphi) = \begin{cases} \frac{2p_0 r \sin \varphi}{\varepsilon_1(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \left(\frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{r^2 + 2rr_0 \cos \varphi + r_0^2} + \right. \\ \quad \left. + \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{r^2 - 2rr_0 \cos \varphi + r_0^2} \right) + C, & |\varphi| < \frac{\pi}{2}, \\ \frac{4p_0 r \sin \varphi}{(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)(r^2 - 2rr_0 \cos \varphi + r_0^2)} + C, & \frac{\pi}{2} < |\varphi| < \pi. \end{cases}$$

Решение (фрагменты). Постановка задачи в полярных координатах:

$$\Delta u = \frac{4\pi p_0}{\varepsilon_1} \frac{\delta(r - r_0) \cdot \delta'(\varphi)}{r^2},$$

$$\Delta u = 0,$$

$$0 < r, \quad |\varphi| < \frac{\pi}{2},$$

$$0 < r, \quad \frac{\pi}{2} < |\varphi| < \pi,$$

$$u(r, \pm \frac{\pi}{2} - 0) = u(r, \pm \frac{\pi}{2} + 0), \quad \varepsilon_1 u_\varphi(r, \pm \frac{\pi}{2} - 0) = \varepsilon_2 u_\varphi(r, \pm \frac{\pi}{2} + 0)$$

$$u(r, \pi - 0) = u(r, -\pi + 0), \quad u_\varphi(r, \pi - 0) = u_\varphi(r, -\pi + 0).$$

Образ $U(p, \varphi)$ удовлетворяет системе уравнений

$$U_{\varphi\varphi} + p^2 U = -\frac{4\pi p_0}{\varepsilon_1} r_0^{p-1} \delta'(\varphi)$$

$$U_{\varphi\varphi} + p^2 U = 0,$$

$$|\varphi| < \frac{\pi}{2},$$

$$\frac{\pi}{2} < |\varphi| < \pi,$$

$$U(p, \pm \frac{\pi}{2} - 0) = U(p, \pm \frac{\pi}{2} + 0), \quad \varepsilon_1 U_\varphi(p, \pm \frac{\pi}{2} - 0) = \varepsilon_2 U_\varphi(p, \pm \frac{\pi}{2} + 0)$$

$$U(p, \pi - 0) = U(p, -\pi + 0), \quad U_\varphi(p, \pi - 0) = U_\varphi(p, -\pi + 0).$$

Техника решения системы упрощается, если учесть, что функция $U(p, \varphi)$ — нечетна по φ :

$$U(p, \varphi) = \frac{2\pi p_0 r_0^p}{\varepsilon_1(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \begin{cases} (\varepsilon_1 \operatorname{tg} \frac{\pi}{2} - \varepsilon_2 \operatorname{ctg} \frac{\pi}{2}) \sin p\varphi + \\ \quad + (\varepsilon_1 + \varepsilon_2) \cos p\varphi, & 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}, \\ \frac{2\varepsilon_1 \sin p(\pi - \varphi)}{\sin \pi p}, & \frac{\pi}{2} < \varphi < \pi, \end{cases}$$

где $-1 < \operatorname{Re} p < 0$, при $\varphi < 0$ функция $U(p, -\varphi) = -U(p, \varphi)$. Прообраз восстанавливается по формуле обратного преобразования. Суммирование рядов (см. пример 3.13) завершает решение задачи. Роль постоянной C обсуждена в решении задачи 3.258.

$$3.266. \mathbf{F} = \frac{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)p_0^2}{2\varepsilon_1(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)r_0^3} \mathbf{e}_x.$$

У к а з а н и е. Точечный диполь $\mathbf{p}$ в $\mathbb{R}^2$ представляет собой прямую в $\mathbb{R}^3$, линейная плотность дипольного момента которой $\mathbf{p}$, где вектор $\mathbf{p}$ перпендикулярен прямой. Сила, действующая на диполь — это сила, действующая на единицу длины прямой.

$$3.267. u(r, \varphi) = \begin{cases} \frac{2p_0(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)}{\varepsilon_1(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \frac{r + r_0 \cos \varphi}{r^2 + 2rr_0 \cos \varphi + r_0^2} + \\ + \frac{2p_0}{\varepsilon_1} \frac{r_0 - r \cos \varphi}{r^2 - 2rr_0 \cos \varphi + r_0^2} + C, & |\varphi| < \frac{\pi}{2}, \\ \frac{4p_0}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} \frac{r_0 - r \cos \varphi}{r^2 - 2rr_0 \cos \varphi + r_0^2} + C, & \frac{\pi}{2} < |\varphi| < \pi. \end{cases}$$

У к а з а н и е. Потенциал поля диполя в полярных координатах удовлетворяет уравнениям

$$\begin{aligned} \Delta u &= \frac{4\pi p_0}{\varepsilon_1} \frac{1}{r} \delta'(r - r_0) \cdot \delta(\varphi), & \Delta u &= 0, \\ 0 < r, |\varphi| &< \frac{\pi}{2}, & 0 < r, \frac{\pi}{2} < |\varphi| < \pi, \\ u\left(r, \pm \frac{\pi}{2} - 0\right) &= u\left(r, \pm \frac{\pi}{2} + 0\right), & \varepsilon_1 u_\varphi\left(r, \pm \frac{\pi}{2} - 0\right) &= \varepsilon_2 u_\varphi\left(r, \pm \frac{\pi}{2} + 0\right) \\ u(r, \pi - 0) &= u(r, -\pi + 0), & u_\varphi(r, \pi - 0) &= u_\varphi(r, -\pi + 0). \end{aligned}$$

$$3.268. \mathbf{F} = \frac{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)p_0^2}{2\varepsilon_1(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)r_0^3} \mathbf{e}_x.$$

$$3.269. u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{r \frac{\pi}{\alpha} - r_0^{\frac{\pi}{\alpha}}}{2r_0^{\frac{\pi}{2\alpha}} r^{\frac{\pi}{2\alpha}} \sin \frac{\pi \varphi}{2\alpha}}.$$

$$3.270. u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{r_0 - r}{2\sqrt{rr_0} \sin \frac{\varphi}{2}}.$$

$$3.271. u(r, \varphi) = \frac{q_0 l}{\pi k} \left[\frac{1}{2} \left(1 - \frac{r}{l} \cos \varphi \right) \ln \frac{1 + \frac{l}{r} + 2\sqrt{\frac{l}{r}} \cos \frac{\varphi}{2}}{1 + \frac{l}{r} - 2\sqrt{\frac{l}{r}} \cos \frac{\varphi}{2}} - \right. \\ \left. - \frac{r}{l} \sin \varphi \cdot \operatorname{arctg} \frac{1 - \frac{r}{l}}{2\sqrt{\frac{l}{r}} \sin \frac{\varphi}{2}} + 2\sqrt{\frac{\pi}{l}} \cos \frac{\varphi}{2} \right].$$

$$3.272. u(0, y) = \frac{q_0 l}{\pi k} \left[\left(1 - \frac{y}{l} \right) \ln \frac{1 + \frac{y}{l}}{\left| 1 - \frac{y}{l} \right|} - \frac{y}{l} \ln \frac{y}{l} \right].$$

$$3.273. q\left(r, \frac{\pi}{4}\right) = \frac{q_0}{\pi\sqrt{2}} \left(\ln \frac{r_0^2 + \sqrt{2}r_0r + r^2}{r_0^2 - \sqrt{2}r_0r + r^2} + 2 \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}r_0r}{r_0^2 - r^2} \right).$$

$$3.274. u(r, \varphi) = u_0 \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{(2k-1)\pi}{2\alpha}} \frac{\sin \frac{(2k-1)\pi\varphi}{2\alpha}}{2k-1 + \frac{2\alpha\beta}{\pi}}, & r < r_0, \\ \left(\frac{r_0}{r} \right)^{\beta} \frac{\cos \beta(\alpha - \varphi)}{\cos \alpha\beta} - \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r} \right)^{\frac{(2k+1)\pi}{2\alpha}} \frac{\sin \frac{(2k+1)\pi\varphi}{2\alpha}}{2k+1 - \frac{2\alpha\beta}{\pi}}, & r > r_0. \end{cases}$$

$$\mathbf{3.275.} \quad 1) \quad u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \left(\frac{r_0}{r} \right)^\beta \left[\frac{1}{2} \sin \beta \varphi \cdot \ln \left(1 - 2 \left(\frac{r_0}{r} \right)^{2\beta} \cos 2\beta \varphi + \left(\frac{r_0}{r} \right)^{4\beta} \right) + \right. \\ \left. + \cos \beta \varphi \cdot \operatorname{arccctg} \frac{r_0^{2\beta} - r^{2\beta}}{r^{2\beta} \sin 2\beta \varphi} \right];$$

$$2) \quad u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \left[2 \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{\beta}{2}} \sin \frac{\beta \varphi}{2} + \frac{1}{2} \sin \beta \varphi \cdot \ln \frac{r^\beta - 2r^{\frac{\beta}{2}} r_0^{\frac{\beta}{2}} \cos \frac{\beta \varphi}{2} + r_0^\beta}{r^\beta + 2r^{\frac{\beta}{2}} r_0^{\frac{\beta}{2}} \cos \frac{\beta \varphi}{2} + r_0^\beta} + \right. \\ \left. + \cos \beta \varphi \cdot \operatorname{arccctg} \frac{r_0^\beta - r^\beta}{2r_0^{\frac{\beta}{2}} r^{\frac{\beta}{2}} \sin \frac{\beta \varphi}{2}} \right].$$

$$3) \quad u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \left(\frac{r_0}{r} \right)^\beta \left[\frac{\sqrt{2}}{2} \sin \left(\beta \varphi - \frac{\pi}{4} \right) \cdot \ln \frac{r^{2\beta} - 2r^\beta r_0^\beta \cos \beta \varphi + r_0^{2\beta}}{r^{2\beta} + 2r^\beta r_0^\beta \cos \beta \varphi + r_0^{2\beta}} + \right. \\ \left. + \sqrt{2} \sin \left(\beta \varphi + \frac{\pi}{4} \right) \cdot \operatorname{arccctg} \frac{r^{2\beta} - r_0^{2\beta}}{2r_0^\beta r^\beta \sin \beta \varphi} \right].$$

$$4) \quad u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \left(\frac{r_0}{r} \right)^\beta \left[4 \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{\beta}{3}} \sin \frac{2\beta \varphi}{3} + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \left(\beta \varphi + \frac{\pi}{4} \right) \times \right. \\ \left. \times \ln \frac{1 + \rho + 2\sqrt{\rho} \cos \frac{\beta \varphi}{3}}{1 + \rho - 2\sqrt{\rho} \cos \frac{\beta \varphi}{3}} - \sin \left(\beta \varphi - \frac{\pi}{4} \right) \cdot \operatorname{arccctg} \frac{1 - \rho}{2\sqrt{\rho} \sin \frac{\beta \varphi}{3}} \right], \quad \rho = \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{2\beta}{3}}.$$

$$5) \quad u(r, \varphi) = \frac{u_0}{\pi} \left(\frac{r_0}{r} \right)^\beta \left[\rho \sin \frac{\beta \varphi}{3} + \frac{1}{2} \sin \beta \varphi \cdot \ln \left(1 + \rho^2 - 2\rho \cos \frac{2\beta \varphi}{3} \right) + \right. \\ \left. + \cos \beta \varphi \cdot \operatorname{arccctg} \frac{1 - \rho \cos \frac{2\beta \varphi}{3}}{\sqrt{\rho} \sin \frac{2\beta \varphi}{3}} \right], \quad \rho = \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{2\beta}{3}}.$$

$$\mathbf{3.276.} \quad u(r, \varphi) = \frac{q_0}{2\pi k} \ln \frac{1 + \left(\frac{r}{l} \right)^{\frac{\pi}{\alpha}} + 2 \left(\frac{r}{l} \right)^{\frac{\pi}{2\alpha}} \sin \frac{\pi \varphi}{2\alpha}}{1 + \left(\frac{r}{l} \right)^{\frac{\pi}{\alpha}} - 2 \left(\frac{r}{l} \right)^{\frac{\pi}{2\alpha}} \sin \frac{\pi \varphi}{2\alpha}}.$$

$$\mathbf{3.277.} \quad \psi(r, \varphi) = \frac{q_0}{4\pi} \ln \rho_{1,2}, \text{ где } \rho_{1,2} \text{ те же, что в ответе к задаче 3.257.}$$

$$\mathbf{3.278.} \quad \mathbf{j} = -\sigma \nabla u, \quad u(r, \varphi) = \frac{J}{2\pi \sigma_1} \left(\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2} \ln \frac{1}{r_2} + \ln \frac{1}{r_1} \right) + C, \quad x > 0, \\ u(r, \varphi) = \frac{J}{2\pi(\sigma_1 + \sigma_2)} \ln \frac{1}{r_1} + C, \quad x < 0, \\ r_1 = \sqrt{r^2 + r_0^2 - 2rr_0 \cos \varphi}, \quad r_2 = \sqrt{r^2 + r_0^2 + 2rr_0 \cos \varphi}.$$

$$\mathbf{3.279.} \quad \mathbf{j} = -\sigma \nabla u, \quad u(r, \varphi) = \frac{J}{2\pi d \sigma} \ln \frac{1 + \left(\frac{r}{a} \right)^{\frac{2\pi}{\alpha}} - 2 \left(\frac{r}{a} \right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi \varphi}{\alpha}}{1 + \left(\frac{r}{b} \right)^{\frac{2\pi}{\alpha}} + 2 \left(\frac{r}{b} \right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi \varphi}{\alpha}} + C.$$

$$\mathbf{3.280.} \quad \mathbf{j} = -\sigma \nabla u, \quad u(r, \varphi) = \frac{J}{2\pi d \sigma} \ln \frac{1 + \left(\frac{r}{a} \right)^{\frac{2\pi}{\alpha}} - 2 \left(\frac{r}{a} \right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi \varphi}{\alpha}}{1 + \left(\frac{r}{b} \right)^{\frac{2\pi}{\alpha}} - 2 \left(\frac{r}{b} \right)^{\frac{\pi}{\alpha}} \cos \frac{\pi \varphi}{\alpha}} + C.$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{3.281.} \quad u(r, \varphi) &= \frac{4\alpha q_0 r_0}{\pi^2 k} \times \\
 &\times \begin{cases} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{(2m+1)\pi}{2\alpha}} \frac{\cos \frac{(2m+1)\pi\varphi}{2\alpha}}{(2m+1)\left(2m+1+\frac{2\alpha\beta}{\pi}\right)}, & r > r_0, \\ \frac{\pi^2}{4\alpha} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta} \frac{\sin \beta(\alpha - \varphi)}{\beta \cos \alpha\beta} - \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{(2m+1)\pi}{2\alpha}} \frac{\cos \frac{(2k+1)\pi\varphi}{2\alpha}}{(2m+1)\left(2m+1-\frac{2\alpha\beta}{\pi}\right)}, & r < r_0. \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{3.282.} \quad 1) \quad u(r, \varphi) &= \frac{2\alpha q_0 r_0}{\pi^2 k} \left[\frac{1}{2} \ln \frac{r^{2\beta} + 2r^{\beta} r_0^{\beta} \cos \beta\varphi + r_0^{2\beta}}{r^{2\beta} - 2r^{\beta} r_0^{\beta} \cos \beta\varphi + r_0^{2\beta}} + \frac{1}{2} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta} \cos \beta\varphi \times \right. \\
 &\times \ln \left(1 - 2 \left(\frac{r_0}{r}\right)^{2\beta} \cos 2\beta\varphi + \left(\frac{r_0}{r}\right)^{4\beta} \right) - \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta} \sin \beta\varphi \operatorname{arctg} \frac{r^{2\beta} - r_0^{2\beta} \cos 2\beta\varphi}{2r_0^{2\beta} \sin 2\beta\varphi} \left. \right];
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \quad u(r, \varphi) &= \frac{2\alpha q_0 r_0}{\pi^2 k} \left[\left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{\beta}{2}} \cos \frac{\beta\varphi}{2} + \frac{1}{4} \left(1 - \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta} \cos \beta\varphi\right) \times \right. \\
 &\times \ln \frac{r^{\beta} + 2r^{\frac{\beta}{2}} r_0^{\frac{\beta}{2}} \cos \frac{\beta\varphi}{2} + r_0^{\beta}}{r^{\beta} - 2r^{\frac{\beta}{2}} r_0^{\frac{\beta}{2}} \cos \frac{\beta\varphi}{2} + r_0^{\beta}} - \frac{1}{2} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta} \sin \beta\varphi \operatorname{arctg} \frac{r^{\beta} - r_0^{\beta}}{r^{\beta} \sin \beta\varphi} \left. \right].
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{3.283.} \quad u(r, \varphi) &= \frac{4\alpha q_0 r_0}{k\pi^2} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{(2m+1)\pi}{2\alpha}} \frac{(-1)^m \sin \frac{(2m+1)\pi\varphi}{2\alpha}}{(2m+1)\left(2m+1+\frac{2\alpha\beta}{\pi}\right)}, \quad \frac{r_0}{r} > 1; \\
 u(r, \varphi) &= \frac{q_0 r_0}{k} \left[\left(\frac{r_0}{r}\right)^{\beta} \frac{\sin \beta\varphi}{\beta \cos \alpha\beta} - \frac{4\alpha}{\pi^2} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{(2m+1)\pi}{2\alpha}} \frac{(-1)^m \sin \frac{(2m+1)\pi\varphi}{2\alpha}}{(2m+1)\left(2m+1-\frac{2\alpha\beta}{\pi}\right)} \right], \\
 r_0/r &< 1.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{3.284.} \quad 1) \quad u(r, \varphi) &= \frac{\alpha q_0 r_0}{k\pi^2} \left[\ln \frac{1 + 2\rho \sin \psi + \rho^2}{1 - 2\rho \sin \psi + \rho^2} + \frac{\sin \psi}{\rho} \ln(1 + 2\rho^2 \cos 2\psi + \rho^4) - \right. \\
 &- 2 \frac{\cos \psi}{\rho} \operatorname{arctg} \frac{1 + \rho^2 \cos 2\psi}{\rho^2 \sin 2\psi} \left. \right], \quad \rho = \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta}, \quad \psi = \beta\varphi;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \quad u(r, \varphi) &= \frac{\alpha q_0 r_0}{k\pi^2} \left[\frac{1}{2} \left(1 - \frac{\cos 2\psi}{\rho^2}\right) \ln \frac{1 + 2\rho \sin \psi + \rho^2}{1 - 2\rho \sin \psi + \rho^2} + \frac{2 \sin \psi}{\rho} - \right. \\
 &- \frac{\sin 2\psi}{\rho^2} \operatorname{arctg} \frac{1 - \rho^2}{2\rho \cos \psi} \left. \right], \quad \rho = \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{\beta}{2}}, \quad \psi = \frac{\beta\varphi}{2}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{3.285.} \quad 1) \quad u(r, \varphi) &= \frac{\alpha q_0 r_0}{k\pi^2} \left[\frac{1}{2} \left(1 + \frac{\cos 2\psi}{\rho^2}\right) \ln \frac{1 + 2\rho \sin \psi + \rho^2}{1 - 2\rho \sin \psi + \rho^2} + \frac{2 \sin \psi}{\rho} - \right. \\
 &- \frac{\sin 2\psi}{\rho^2} \operatorname{arctg} \frac{1 - \rho^2}{2\rho \cos \psi} \left. \right], \quad \rho = \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{\beta}{2}}, \quad \psi = \frac{\beta\varphi}{2}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \quad u(r, \varphi) &= \frac{\alpha q_0 r_0}{3k\pi^2} \left[\ln \frac{1 + 2\rho \sin \psi + \rho^2}{1 - 2\rho \sin \psi + \rho^2} - 2 \frac{\sin \psi}{\rho} - \frac{\sin 3\psi}{\rho^3} \ln(1 + 2\rho^2 \cos 2\psi + \rho^4) + \right. \\
 &+ 2 \frac{\cos 3\psi}{\rho^3} \operatorname{arctg} \frac{1 + \rho^2 \cos 2\psi}{\rho^2 \sin 2\psi} \left. \right], \quad \rho = \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{\beta}{3}}, \quad \psi = \frac{\beta\varphi}{3}.
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{3.286.} \quad u(r, \varphi) = \frac{2\alpha q_0 r_0}{D\pi^2} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{(2m+1)\pi}{\alpha}} \frac{\cos \frac{(2m+1)\pi\varphi}{\alpha}}{(2m+1)\left(2m+1+\frac{\alpha}{\pi}\right)}, \quad \frac{r_0}{r} < 1.$$

$$u(r, \varphi) = \frac{q_0}{D} \left[\frac{r \sin\left(\frac{\alpha}{2} - \varphi\right)}{\cos \frac{\alpha}{2}} - \frac{2\alpha r_0}{\pi^2} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{(2m+1)\pi}{\alpha}} \frac{\cos \frac{(2m+1)\pi\varphi}{\alpha}}{(2m+1)\left(2m+1-\frac{\alpha}{\pi}\right)} \right], \quad \frac{r_0}{r} > 1.$$

$$\mathbf{3.287.} \quad 1) \quad u(r, \varphi) = \frac{q_0 r_0}{\pi D} \left[\ln \frac{r^2 + r_0^2 + 2rr_0 \cos \varphi}{r^2 + r_0^2 - 2rr_0 \cos \varphi} + \right. \\ \left. + \frac{r}{2r_0} \cos \varphi \ln \left(1 + \frac{r_0^4}{r^4} - 2\frac{r_0^2}{r^2} \cos 2\varphi\right) - \frac{r}{r_0} \sin \varphi \operatorname{arctg} \frac{r^2 - r_0^2 \cos 2\varphi}{r_0^2 \sin 2\varphi} \right] + C;$$

$$2) \quad u(r, \varphi) = \frac{q_0 r_0}{\pi D} \left[\frac{1}{2} \left(1 - \frac{r}{r_0} \cos \varphi\right) \ln \frac{r + r_0 + 2\sqrt{rr_0} \cos \frac{\varphi}{2}}{r + r_0 - 2\sqrt{rr_0} \cos \frac{\varphi}{2}} + \sqrt{\frac{r}{r_0}} \cos \frac{\varphi}{2} - \right. \\ \left. - \frac{r}{2r_0} \sin \varphi \operatorname{arctg} \frac{r - r_0}{2\sqrt{rr_0} \sin \frac{\varphi}{2}} \right] + C.$$

$$\mathbf{3.288.} \quad u(r, \varphi) = \frac{2\alpha q_0 r_0}{D\pi^2} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{(2m+1)\pi}{\alpha}} \frac{\cos \frac{(2m+1)\pi\varphi}{\alpha}}{(2m+1)\left(2m+1+\frac{\alpha\beta}{\pi}\right)} + C, \quad \frac{r_0}{r} < 1.$$

$$u(r, \varphi) = \frac{q_0 r_0}{D} \left[\left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta} \frac{\sin \beta\left(\frac{\alpha}{2} - \varphi\right)}{\beta \cos \frac{\alpha\beta}{2}} - \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{(2m+1)\pi}{\alpha}} \frac{\cos \frac{(2m+1)\pi\varphi}{\alpha}}{(2m+1)\left(2m+1-\frac{\alpha\beta}{\pi}\right)} \right] + \\ + C, \quad \frac{r_0}{r} > 1.$$

$$\mathbf{3.289.} \quad 1) \quad u(r, \varphi) = \frac{2\alpha q_0 r_0}{\pi^2 D} \left[\frac{1}{2} \ln \frac{r^{2\beta} + 2r^{\beta} r_0^{\beta} \cos \beta\varphi + r_0^{2\beta}}{r^{2\beta} - 2r^{\beta} r_0^{\beta} \cos \beta\varphi + r_0^{2\beta}} + \frac{1}{2} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta} \cos \beta\varphi \times \right. \\ \left. \times \ln \left(1 - 2\left(\frac{r_0}{r}\right)^{2\beta} \cos 2\beta\varphi + \left(\frac{r_0}{r}\right)^{4\beta}\right) - \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta} \sin \beta\varphi \operatorname{arctg} \frac{r^{2\beta} - r_0^{2\beta} \cos 2\beta\varphi}{2r_0^{2\beta} \sin 2\beta\varphi} \right] + C;$$

$$2) \quad u(r, \varphi) = \frac{\alpha q_0 r_0}{\pi^2 D} \left[\left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{\beta}{2}} \cos \frac{\beta\varphi}{2} + \frac{1}{4} \left(1 - \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta} \cos \beta\varphi\right) \times \right. \\ \left. \times \ln \frac{r^{\beta} + 2r^{\frac{\beta}{2}} r_0^{\frac{\beta}{2}} \cos \frac{\beta\varphi}{2} + r_0^{\beta}}{r^{\beta} - 2r^{\frac{\beta}{2}} r_0^{\frac{\beta}{2}} \cos \frac{\beta\varphi}{2} + r_0^{\beta}} - \frac{1}{2} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta} \sin \beta\varphi \operatorname{arctg} \frac{r^{\beta} - r_0^{\beta}}{r^{\beta} \sin \beta\varphi} \right] + C.$$

$$\mathbf{3.290.} \quad u(r, \varphi) = \frac{\alpha u_0}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi k}{\alpha}} \frac{\sin \frac{\pi k \varphi}{\alpha}}{\left(k + \frac{\alpha\beta}{\pi}\right)^2}, \quad r_0 < r;$$

$$u(r, \varphi) = u_0 \left[\left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta} \ln \frac{r_0}{r} \frac{\sin \beta(\alpha - \varphi)}{\sin \alpha\beta} - \right. \\ \left. - \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta} \frac{(\alpha - \varphi) \cos \beta(\alpha - \varphi) \sin \alpha\beta - \alpha \sin \beta(\alpha - \varphi) \cos \alpha\beta}{\sin^2 \alpha\beta} + \right. \\ \left. + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{\pi k}{\alpha}} \frac{\sin \frac{\pi k \varphi}{\alpha}}{\left(k - \frac{\alpha\beta}{\pi}\right)^2} \right], \quad r_0 > r.$$

$$\begin{aligned} \mathbf{3.291.} \quad u(r, \varphi) &= \frac{\alpha u_0 \rho}{\pi^2} \left[\frac{1}{2} \sin \psi \ln^2 \rho + (\pi - \psi) \ln \rho - \frac{1}{2} (\pi - \psi)^2 \sin \psi + \right. \\ &+ \left. \frac{\pi^2}{6} \sin \psi - \frac{1}{2} \sin \psi \int_0^\rho \ln(1 - 2\xi \cos \psi + \xi^2) \frac{d\xi}{\xi} + \cos \psi \int_0^\rho \operatorname{arctg} \frac{\xi \sin \psi}{1 - \xi \cos \psi} \frac{d\xi}{\xi} \right], \\ \rho &= \left(\frac{r}{r_0} \right)^\alpha, \quad \psi = \frac{\pi \varphi}{\pi}, \quad r < r_0, \quad u(r, \varphi) = \frac{\alpha u_0}{\rho \pi^2} \left[\frac{1}{2} \sin \psi \int_0^\rho \ln(1 - 2\xi \cos \psi + \right. \\ &+ \left. \xi^2) \frac{d\xi}{\xi} \cos \psi \int_0^\rho \operatorname{arctg} \frac{\xi \sin \psi}{1 - \xi \cos \psi} \frac{d\xi}{\xi} \right], \quad \rho = \left(\frac{r_0}{r} \right)^\alpha, \quad \psi = \frac{\pi \varphi}{\alpha}, \quad r > r_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{3.292.} \quad \mathbf{q}(r, \alpha) &= \mathbf{e}_\varphi \frac{r \rho u_0}{\pi r} \left[\frac{1}{2} \ln^2 \rho + \frac{\pi^2}{6} - \int_0^\rho \frac{\ln(1 + \xi)}{\xi} d\xi \right], \quad \rho = \left(\frac{r}{r_0} \right)^\alpha, \quad r < r_0 \\ \mathbf{q}(r, \alpha) &= \mathbf{e}_\varphi \frac{r \rho u_0}{\pi r} \left[\int_0^\rho \frac{\ln(1 + \xi)}{\xi} d\xi - \ln \rho \right], \quad \rho = \left(\frac{r_0}{r} \right)^\alpha, \quad r > r_0, \quad \mathbf{q}(r_0, \alpha) = \frac{\pi k u_0}{12 r_0} \mathbf{e}_\varphi. \end{aligned}$$

У к а з а н и е. Для вычисления интеграла $\int_0^1 \frac{\ln(1 + \xi)}{\xi} d\xi$ следует разложить подынтегральную функцию в ряд по степеням ξ .

$$\begin{aligned} \mathbf{3.293.} \quad u(r, \varphi) &= -\frac{\alpha u_0}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{\pi k}{\alpha}} \frac{(-1)^k \sin \frac{\pi k \varphi}{\alpha}}{\left(k + \frac{\alpha \beta}{\pi} \right)^2}, \quad r_0 > r; \\ u(r, \varphi) &= u_0 \left[\left(\frac{r_0}{r} \right)^\beta \ln \frac{r}{r_0} \frac{\sin \beta \varphi}{\sin \alpha \beta} - \left(\frac{r_0}{r} \right)^\beta \frac{\varphi \sin \alpha \beta \cos \beta \varphi - \alpha \sin \beta \varphi \cos \alpha \beta}{\sin^2 \alpha \beta} - \right. \\ &\quad \left. - \frac{\alpha}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{\pi k}{\alpha}} \frac{(-1)^k \sin \frac{\pi k \varphi}{\alpha}}{\left(k - \frac{\alpha \beta}{\pi} \right)^2} \right], \quad r_0 < r. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{3.294.} \quad u(r, \varphi) &= \frac{\alpha u_0 \rho}{\pi^2} \left[-\frac{1}{2} \psi^2 \sin \psi + \frac{\pi^2}{6} \sin \psi + \frac{1}{2} \ln^2 \rho \sin \psi + \psi \cos \psi \ln \rho - \right. \\ &- \left. \frac{1}{2} \rho \sin \psi \int_0^\rho \ln(1 + 2\xi \cos \psi + \xi^2) \frac{d\xi}{\xi} - \rho \cos \psi \int_0^\rho \operatorname{arctg} \frac{\xi \sin \psi}{1 + \xi \cos \psi} \frac{d\xi}{\xi} \right], \\ \rho &= \left(\frac{r_0}{r} \right)^\alpha, \quad \psi = \frac{\pi \varphi}{\alpha}, \quad r > r_0 \quad u(r, \varphi) = \frac{\alpha u_0}{\rho \pi^2} \left[\frac{1}{2} \sin \psi \int_0^\rho \ln(1 - 2\xi \cos \psi + \right. \\ &+ \left. \xi^2) \frac{d\xi}{\xi} \cos \psi \int_0^\rho \operatorname{arctg} \frac{\xi \sin \psi}{1 - \xi \cos \psi} \frac{d\xi}{\xi} \right], \quad \rho = \left(\frac{r_0}{r} \right)^\alpha, \quad \psi = \frac{\pi \varphi}{\pi}, \quad r > r_0, \\ u(r, \varphi) &= \frac{\alpha u_0}{\rho \pi^2} \left[\frac{1}{2} \sin \psi \int_0^\rho \ln(1 - 2\xi \cos \psi + \xi^2) \frac{d\xi}{\xi} - \rho \cos \psi \int_0^\rho \operatorname{arctg} \frac{\xi \sin \psi}{1 + \xi \cos \psi} \frac{d\xi}{\xi} \right], \\ \rho &= \left(\frac{r}{r_0} \right)^\alpha, \quad \psi = \frac{\pi \varphi}{\alpha}, \quad r < r_0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{3.295.} \quad \mathbf{q}(r, 0) &= -\mathbf{e}_\varphi \frac{k \rho u_0}{\pi r} \left[\frac{1}{2} \ln^2 \rho + \frac{\pi^2}{6} - \int_0^\rho \frac{\ln(1 + \xi)}{\xi} d\xi \right], \quad \rho = \left(\frac{r_0}{r} \right)^\alpha, \quad r > r_0, \\ \mathbf{q}(r, 0) &= \mathbf{e}_\varphi \frac{k u_0}{\pi r \rho} \left[\int_0^\rho \frac{\ln(1 + \xi)}{\xi} d\xi - \ln \rho \right], \quad \rho = \left(\frac{r}{r_0} \right)^\alpha, \quad r < r_0, \quad \mathbf{q}(r_0, \alpha) = -\frac{\pi k u_0}{12 r_0} \mathbf{e}_\varphi. \end{aligned}$$

$$3.296. u(r, \varphi) = \frac{8\alpha^2 q_0 r_0}{k\pi^3} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{(2m+1)\pi}{\alpha}} \frac{\cos \frac{(2m+1)\pi\varphi}{\alpha}}{(2m+1)\left(2m+1+\frac{\alpha\beta}{\pi}\right)^2}, \quad \frac{r_0}{r} < 1,$$

$$u(r, \varphi) = \frac{q_0 r_0}{k} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta} \frac{1}{\beta \cos^2 \alpha\beta} \left[\left(\ln \frac{r_0}{r} + \frac{1}{\beta} \right) \sin \beta(\alpha - \varphi) \times \right. \\ \left. \times \cos \alpha\beta - (\alpha - \varphi) \cos \beta(\alpha - \varphi) \cos \alpha\beta - \alpha \sin \beta(\alpha - \varphi) \sin \alpha\beta + \right. \\ \left. + \frac{8\alpha^2 q_0 r_0}{k\pi^3} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{(2m+1)\pi}{\alpha}} \frac{\cos \frac{(2m+1)\pi\varphi}{\alpha}}{(2m+1)\left(2m+1-\frac{\alpha\beta}{\pi}\right)^2} \right], \quad \frac{r_0}{r} < 1.$$

$$3.297. 1) \mathbf{q}(r, \alpha) = \mathbf{e}_{\varphi} \frac{2\alpha q_0}{\pi^2} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta-1} \left(\frac{\pi^2}{12} + \frac{\pi^2}{4\alpha^2} \ln^2 \frac{r_0}{r} - \int_0^{\rho} \frac{\ln(1+\xi^2)}{\xi} d\xi \right), \quad \rho = \\ = \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{\pi}{2\alpha}}, \quad r < r_0, \quad \mathbf{q}(r, \alpha) = \mathbf{e}_{\varphi} \frac{2\alpha q_0}{\pi^2} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\beta-1} \int_0^{\rho} \frac{\ln(1+\xi^2)}{\xi} d\xi, \quad \rho = \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi}{2\alpha}}, \\ r > r_0, \quad \mathbf{q}(r_0, \alpha) = \mathbf{e}_{\varphi} \frac{\alpha q_0}{12};$$

$$2) u(r, 0) = \frac{4\alpha^2 q_0 r_0 \rho}{k\pi^3} \left[-\frac{\pi^2}{6} + 2 \ln \rho + \ln^2 \rho + \frac{1+\rho}{\rho} \ln(1+\rho) + \frac{1-\rho}{\ln} (1 - \right. \\ \left. - \rho) - \int_0^{\rho} \frac{\ln(1-\xi^2)}{\xi} d\xi \right], \quad \rho = \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{\pi}{2\alpha}}, \quad r < r_0, \quad u(r, 0) = \frac{4\alpha^2 q_0 r_0}{k\pi^3 \rho} \left((1 + \right. \\ \left. + \rho) \ln(1+\rho) + (1-\rho) \ln(1-\rho) + \int_0^{\rho} \frac{\ln(1-\xi^2)}{\xi} d\xi \right), \quad \rho = \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi}{2\alpha}}, \quad r > r_0, \\ u(r_0, 0) = \frac{4\alpha^2 q_0 r_0}{k\pi^3} \left(2 \ln 2 - \frac{\pi^2}{12} \right).$$

$$3.298. u(r, \varphi) = \frac{8\alpha^2 q_0 r_0}{k\pi^3} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{(2m+1)\pi}{\alpha}} \frac{(-1)^m \sin \frac{(2m+1)\pi\varphi}{\alpha}}{(2m+1)(2m+1+\frac{2\alpha\beta}{\pi})^2}, \quad \frac{r_0}{r} > 1.$$

$$u(r, \varphi) = -\frac{q_0 r_0}{k} \left[\left(\frac{r_0}{r}\right)^{\beta} \frac{1}{\beta \cos^2 \alpha\beta} \left(\ln \frac{r_0}{r} - \frac{1}{\beta} \right) \sin \beta\varphi \cos \alpha\beta + \varphi \cos \beta\varphi \cos \alpha\beta + \right. \\ \left. + \alpha \sin \beta\varphi \sin \alpha\beta + \frac{8\alpha^2 q_0 r_0}{k\pi^3} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{(2m+1)\pi}{\alpha}} \frac{(-1)^m \sin \frac{(2m+1)\pi\varphi}{\alpha}}{(2m+1)\left(2m+1-\frac{2\alpha\beta}{\pi}\right)^2} \right], \quad \frac{r_0}{r} < 1.$$

$$3.299. 1) u(r, \alpha) = \frac{4\alpha^2 q_0 r_0 \rho}{k\pi^3} \left[-\frac{\pi^2}{6} - 2 \ln \rho + \ln^2 \rho + \frac{1+\rho}{\rho} \ln(1+\rho) - \right. \\ \left. - \frac{1-\rho}{\ln} (1-\rho) - \int_0^{\rho} \frac{\ln(1-\xi^2)}{\xi} d\xi \right], \quad \rho = \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\beta}, \quad r > r_0,$$

$$u(r, \alpha) = \frac{4\alpha^2 q_0 r_0}{k\pi^3 \rho} \left[(1+\rho) \ln(1+\rho) - (1-\rho) \ln(1-\rho) + \int_0^{\rho} \frac{\ln(1-\xi^2)}{\xi} d\xi \right],$$

$$\rho = \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta}, \quad r < r_0, \quad u(r_0, \alpha) = \frac{4\alpha^2 q_0 r_0}{k\pi^3} \left(2 \ln 2 - \frac{\pi^2}{12} \right).$$

$$2) \mathbf{q}(r, 0) = -\mathbf{e}_{\varphi} \frac{2\alpha q_0}{\pi^2} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\beta+1} \left(\frac{\pi^2}{12} - \ln^2 \rho - \int_0^{\rho} \frac{\ln(1+\xi^2)}{\xi} d\xi \right), \quad \rho = \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{\pi}{2\alpha}}, \quad r < r_0,$$

$$\mathbf{q}(r, 0) = -\mathbf{e}_{\varphi} \frac{2\alpha q_0}{\pi^2} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\beta+1} \int_0^{\rho} \frac{\ln(1+\xi^2)}{\xi} d\xi, \quad \rho = \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta}, \quad r < r_0, \quad \mathbf{q}(r_0) = -\mathbf{e}_{\varphi} \frac{\alpha q_0}{12}.$$

$$\mathbf{3.300.} \quad u(r, \varphi) = -\frac{2\alpha^2 q_0 r_0}{k\pi^3} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{(2m+1)\pi}{\alpha}} \frac{\cos \frac{(2m+1)\pi\varphi}{\alpha}}{(2m+1)\left(2m+1+\frac{\alpha\beta}{\pi}\right)^2} + C, \quad \frac{r_0}{r} < 1.$$

$$u(r, \varphi) = -\frac{q_0 r_0}{k} \left[\left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta} \frac{1}{\beta \cos^2 \alpha\beta} \left(\left(\ln \frac{r_0}{r} + \frac{1}{\beta}\right) \sin \beta \left(\frac{\alpha}{2} - \varphi\right) \cos \frac{\alpha\beta}{2} - \left(\frac{\alpha}{2} - \varphi\right) \cos \beta \left(\frac{\alpha}{2} - \varphi\right) \cos \frac{\alpha\beta}{2} - \frac{\alpha}{2} \sin \beta \left(\frac{\alpha}{2} - \varphi\right) \sin \frac{\alpha\beta}{2} \right) + \right. \\ \left. + \frac{8\alpha^2 q_0 r_0}{k\pi^3} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{(2m+1)\pi}{\alpha}} \frac{\cos \frac{(2m+1)\pi\varphi}{\alpha}}{(2m+1)\left(2m+1-\frac{2\alpha\beta}{\pi}\right)^2} \right] + C, \quad \frac{r_0}{r} > 1.$$

$$\mathbf{3.301.} \quad u(r, 0) = -u(r, \alpha) = -\frac{\alpha^2 q_0 r_0 \rho}{k\pi^3} \left[-\frac{\pi^2}{6} - \ln \rho + \ln^2 \rho + \frac{1+\rho}{\rho} \ln(1+\rho) - \frac{1-\rho}{\ln} (1-\rho) - \int_0^{\rho} \frac{\ln(1-\xi^2)}{\xi} d\xi \right] + C, \quad \rho = \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\beta}, \quad r > r_0,$$

$$u(r, 0) = -u(r, \alpha) = \frac{\alpha^2 q_0 r_0}{k\pi^3 \rho} \left[(1+\rho) \ln(1+\rho) - (1-\rho) \ln(1-\rho) + \int_0^{\rho} \frac{\ln(1-\xi^2)}{\xi} d\xi \right] + C, \quad \rho = \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta}, \quad r < r_0,$$

$$u(r_0, 0) = -u(r_0, \alpha) = -\frac{\alpha^2 q_0 r_0}{k\pi^3} \left(2 \ln 2 - \frac{\pi^2}{12} \right) + C, \quad \text{где } C \text{ — одна и та же константа.}$$

$$\mathbf{3.302.} \quad u(r, \varphi) = \frac{2\alpha^2 q_0 r_0}{k\pi^3} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{(2m+1)\pi}{\alpha}} \frac{(-1)^m \sin \frac{(2m+1)\pi\varphi}{\alpha}}{(2m+1)\left(2m+1-\frac{\alpha\beta}{\pi}\right)^2} + C, \quad \frac{r_0}{r} > 1;$$

$$u(r, \varphi) = -\frac{q_0 r_0}{k} \left[\left(\frac{r_0}{r}\right)^{\beta} \frac{1}{\beta \cos^2 \alpha\beta} \left(\left(\ln \frac{r_0}{r} - \frac{1}{\beta}\right) \sin \beta \left(\frac{\alpha}{2} - \varphi\right) \cos \frac{\alpha\beta}{2} + \left(\frac{\alpha}{2} - \varphi\right) \cos \beta \left(\frac{\alpha}{2} - \varphi\right) \cos \frac{\alpha\beta}{2} + \frac{\alpha}{2} \sin \beta \left(\frac{\alpha}{2} - \varphi\right) \sin \frac{\alpha\beta}{2} \right) + \right. \\ \left. + \frac{8\alpha^2 q_0 r_0}{k\pi^3} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\frac{(2m+1)\pi}{\alpha}} \frac{(-1)^m \sin \frac{(2m+1)\pi\varphi}{\alpha}}{(2m+1)\left(2m+1-\frac{2\alpha\beta}{\pi}\right)^2} \right] + C, \quad \frac{r_0}{r} < 1.$$

$$\mathbf{3.303.} \quad u(r, 0) = -u(r, \alpha) = \frac{\alpha^2 q_0 r_0 \rho}{k\pi^3} \left[-\frac{\pi^2}{6} - \ln \rho + \ln^2 \rho + \frac{1+\rho}{\rho} \ln(1+\rho) - \frac{1-\rho}{\ln} (1-\rho) - \int_0^{\rho} \frac{\ln(1-\xi^2)}{\xi} d\xi \right] + C, \quad \rho = \left(\frac{r_0}{r}\right)^{\beta}, \quad r > r_0,$$

$$u(r, 0) = -u(r, \alpha) = \frac{\alpha^2 q_0 r_0}{k\pi^3 \rho} \left[(1+\rho) \ln(1+\rho) + (1-\rho) \ln(1-\rho) + \int_0^{\rho} \frac{\ln(1-\xi^2)}{\xi} d\xi \right] + C, \quad \rho = \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\beta}, \quad r < r_0,$$

$$u(r_0, 0) = -u(r_0, \alpha) = \frac{\alpha^2 q_0 r_0}{k\pi^3} \left(2 \ln 2 - \frac{\pi^2}{12} \right) + C, \quad \text{где } C \text{ — одна и та же константа.}$$

3.304. $\mathbf{V} = \nabla u$,

$$u(r, \varphi) = V_0 r_0 \left[\ln \frac{r}{r_0} + 1 - \frac{1}{\pi^2} \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r} \right)^{\frac{\pi m}{\alpha}} \frac{\cos \frac{\pi m \varphi}{\alpha}}{m \left(m + \frac{\alpha}{\pi} \right)} \right] + C, \quad r_0 < r;$$

$$u(r, \varphi) = V_0 r_0 \left[\frac{r \cos(\alpha - \varphi)}{r_0 \sin \alpha} + \frac{\alpha}{\pi^2} \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{\pi m}{\alpha}} \frac{\cos \frac{\pi m \varphi}{\alpha}}{m \left(m - \frac{\alpha}{\pi} \right)} \right] + C, \quad r_0 < r.$$

3.305. $\mathbf{V} = \nabla u$, $u(r, \varphi) = \frac{V_0 r_0}{\pi} \left[\frac{1}{2} \ln \left(1 - \frac{2r_0}{r} + \frac{r_0^2}{r^2} \right) - \right.$
 $\left. - \frac{r}{r_0} \cos \varphi \ln \left(1 - \frac{2r}{r_0} + \frac{r^2}{r_0^2} \right) + \frac{r}{r_0} \sin \varphi \operatorname{arctg} \frac{r - r_0 \cos \varphi}{r_0 \sin \varphi} \right] + C$,

$$\mathbf{V} = V_r \mathbf{e}_r + V_\varphi \mathbf{e}_\varphi, \quad V_r(r, 0) = -\frac{V_0}{\pi} \ln |1 - \frac{r_0}{r}|, \quad V_\varphi(r, 0) = \begin{cases} V_0, & 0 < r < r_0, \\ 0, & r_0 < r. \end{cases}$$

$$V_r(r, \pi) = \frac{V_0}{\pi} \ln \left(1 + \frac{r_0}{r} \right), \quad V_\varphi(r, \pi) = 0.$$

3.306. $\mathbf{j} = -\sigma \nabla u$, $u(r, \varphi) = \frac{J}{4\pi\sigma} \left(\frac{1}{2} \ln \left(1 - \frac{2}{\rho^2} \cos 2\varphi + \frac{1}{\rho^4} \right) + \right.$
 $\left. + \frac{\cos 2\varphi}{2\rho} \ln \frac{1 + 2\rho \cos 2\varphi + \rho^2}{1 - 2\rho \cos 2\varphi + \rho^2} + \frac{\sin 2\varphi}{\rho} \operatorname{arctg} \frac{1 - \rho^2}{2\rho \sin \varphi} \right)$, $\rho = \frac{r_0}{2r}$.

3.307. $\mathbf{j} = -\sigma \nabla u$, $u(r, \varphi) =$

$$= -\frac{J}{2\sigma} \left[\frac{2}{\alpha} \left(\ln \frac{r_0}{r} - 1 \right) + \frac{\alpha}{2\pi^2} \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r} \right)^{\frac{2\pi m}{\alpha}} \frac{\cos \frac{2\pi m \varphi}{\alpha}}{m \left(m + \frac{\alpha}{2\pi} \right)} \right] + C, \quad \frac{r_0}{r} < 1.$$

$$u(r, \varphi) = \frac{J}{2\sigma} \left[\frac{r \cos \left(\frac{\alpha}{2} - \varphi \right)}{r_0 \sin \frac{\alpha}{2}} + \frac{\alpha}{2\pi^2} \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{2\pi m}{\alpha}} \frac{\cos \frac{2\pi m \varphi}{\alpha}}{m \left(m - \frac{\alpha}{2\pi} \right)} \right] + C, \quad \frac{r_0}{r} < 1.$$

3.310. $\mathcal{H}_0[f](\lambda) = e^{-r_0 \lambda}$. У к а з а н и е. См. соответствие из задачи 3.112, п. 1.

3.311. $\mathcal{H}_1[f](\lambda) = e^{-r_0 \lambda}$. У к а з а н и е. См. соответствие из задачи 3.112, п. 3.

3.312.

$$\mathcal{H}_0[f](\lambda) \equiv \int_0^\infty e^{-\alpha r^2} J_0(\lambda r) dr = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{\lambda^2}{8\alpha}} I_0 \left(\frac{\lambda^2}{8\alpha} \right);$$

$$\mathcal{H}_0[f](\lambda) \equiv \int_0^\infty e^{-\alpha r^2} J_0(\lambda r) r dr = \frac{1}{2\alpha} e^{-\frac{\lambda^2}{4\alpha}}.$$
(3.78)

У к а з а н и я. 1) В силу четности подынтегральной функции, интегрирование по λ можно распространить на всю числовую ось $(-\infty, \infty)$, затем представить $J_0(\lambda r)$ в интегральной форме, проинтегрировать по λ и снова применить интегральное представление для $J_0(z)$; 2) Разложить произведение $J_0(\lambda r) r$ в степенной ряд и проинтегрировать почленно.

3.313.

$$\mathcal{H}_1[f](\lambda) \equiv \int_0^\infty e^{-\alpha r^2} J_1(\lambda r) r dr = \frac{1}{8\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \lambda e^{-\frac{\lambda^2}{8\alpha}} \left[I_0 \left(\frac{\lambda^2}{8\alpha} \right) - I_1 \left(\frac{\lambda^2}{8\alpha} \right) \right]. \quad (3.79)$$

У к а з а н и е. Продифференцировать интеграл (3.78) по параметру.

3.314.

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_0[f](\lambda) &\equiv \int_0^\infty \sin \alpha r^2 J_0(\lambda r) r dr = \frac{1}{2\alpha} \cos \frac{\lambda^2}{4\alpha}; \\ \mathcal{H}_0[f](\lambda) &\equiv \int_0^\infty \cos \alpha r^2 J_0(\lambda r) r dr = \frac{1}{2\alpha} \sin \frac{\lambda^2}{4\alpha}.\end{aligned}\quad (3.80)$$

У к а з а н и е. Для вычисления интеграла $\int_0^\infty e^{i\alpha r^2} J_0(\lambda r) r dr$ на комплексной плоскости взять замкнутый контур — границу сектора $\{r, \varphi: 0 \leq r \leq R, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}\}$, затем применить (3.81).

$$\begin{aligned}\mathbf{3.315.} \quad \mathcal{H}_1[f](\lambda) &\equiv \int_0^\infty \sin \alpha r^2 J_1(\lambda r) r dr = \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \frac{\lambda}{8\alpha} \left[\cos \left(\frac{\lambda^2}{8\alpha} - \frac{\pi}{4} \right) J_0 \left(\frac{\lambda^2}{8\alpha} \right) - \sin \left(\frac{\lambda^2}{8\alpha} - \frac{\pi}{4} \right) J_1 \left(\frac{\lambda^2}{8\alpha} \right) \right].\end{aligned}$$

У к а з а н и е то же, что и в ответе к предыдущей задаче.

$$\mathbf{3.316.} \quad f(r) = \frac{1}{2a^2 t} I_0 \left(\frac{r\rho}{2a^2 t} \right) e^{-\frac{r^2 + \rho^2}{4a^2 t}}. \quad \text{У к а з а н и е. Для вычисления интеграла}$$

$$\int_0^\infty J_0(\lambda r) J_0(\lambda \rho) e^{-a^2 \lambda^2} \lambda d\lambda = \frac{1}{a^2 t} I_0 \left(\frac{r\rho}{2a^2 t} \right) e^{-\frac{r^2 + \rho^2}{4a^2 t}} \quad (3.81)$$

применить соответствие из задачи 3.114.

$$\mathbf{3.317.} \quad 1) -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \sin \left(\frac{\lambda^2}{8a} - \frac{\pi}{4} \right) J_0 \left(\frac{\lambda^2}{4a} \right); \quad 2) \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \cos \left(\frac{\lambda^2}{8a} - \frac{\pi}{4} \right) J_0 \left(\frac{\lambda^2}{4a} \right).$$

У к а з а н и е. Применить интеграл $\int_C e^{iaz^2} J_0(\lambda z) dz$, где контур C — граница сектора $\{r, \varphi: 0 \leq r \leq R, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}\}$.

$$\mathbf{3.318.} \quad 1) \frac{1}{2a} \cos \frac{\lambda^2}{4a}; \quad 2) \frac{1}{2a} \sin \frac{\lambda^2}{4a}.$$

У к а з а н и е. Применить интеграл $\int_C e^{iaz^2} J_0(\lambda z) z dz$, где контур C — граница сектора $\{r, \varphi: 0 \leq r \leq R, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}\}$.

$$\mathbf{3.319.} \quad 1) \frac{1}{\lambda} \sin \frac{\lambda^2}{4a}; \quad 2) \frac{2}{\lambda} \sin^2 \frac{\lambda^2}{8a}.$$

У к а з а н и е. Применить интеграл $\int_C e^{iaz^2} J_1(\lambda z) z dz$, где контур C — граница сектора $\{r, \varphi: 0 \leq r \leq R, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}\}$.

$$\begin{aligned}\mathbf{3.320.} \quad 1) &\sqrt{\frac{\pi}{a}} \frac{\lambda}{8a} \left[\cos \left(\frac{\lambda^2}{8a} - \frac{\pi}{4} \right) J_0 \left(\frac{\lambda^2}{8a} \right) - \sin \left(\frac{\lambda^2}{8a} - \frac{\pi}{4} \right) J_1 \left(\frac{\lambda^2}{8a} \right) \right]; \\ 2) &\sqrt{\frac{\pi}{a}} \frac{\lambda}{8a} \left[\cos \left(\frac{\lambda^2}{8a} - \frac{\pi}{4} \right) J_1 \left(\frac{\lambda^2}{8a} \right) - \sin \left(\frac{\lambda^2}{8a} - \frac{\pi}{4} \right) J_0 \left(\frac{\lambda^2}{8a} \right) \right].\end{aligned}$$

У к а з а н и е. Записать изображение из задачи 3.317 в интегральной форме и продифференцировать по параметру.

3.321.

$$1) \int_0^{\infty} J_0(\lambda r) \sin kr \, dr \frac{\eta(k - \lambda)}{\sqrt{k^2 - \lambda^2}}; \quad (3.82)$$

$$2) \int_0^{\infty} J_0(\lambda r) \cos kr \, dr \frac{\eta(\lambda - k)}{\sqrt{\lambda^2 - k^2}}; \quad (3.83)$$

$$3) \int_0^{\infty} J_0(\lambda r) \frac{\sin kr}{r} \, dr = \begin{cases} \arcsin \frac{k}{\lambda}, & k < \lambda, \\ \frac{\pi}{2}, & k > \lambda. \end{cases} \quad (3.84)$$




Рис. 3.11

Решение. Исходной является формула (3.33), в которой $p = +0 + i\mu$. Чтобы находить значения выбранной ветви корня $\sqrt{p^2 + 1} \sqrt{(p+i)(p-i)}$ в различных точках, можно множителям $p+i$ и $p-i$ при $p=1$ приписать, соответственно, аргументы $\pi/4$ и $-\pi/4$ (рис. 3.11). При движении конца вектора p из точки $p=1$ в точку $p=i\mu$, например, вдоль пути L аргументы, меняясь непрерывно, становятся равными $\pi/2$. Следовательно, если $\mu > 1$, то корень $\sqrt{p^2 + 1}|_{p=i\mu} = \sqrt{-\mu^2 + 1}|e^{i\pi} = i\sqrt{\mu^2 - 1}$. Такие же рассуждения показывают, что корень $\sqrt{p^2 - 1}|_{p=-i\mu} = -i\sqrt{\mu^2 - 1}$, где $\mu > 1$. Если же $p = \pm i\mu$ и $0 \leq \mu < 1$, то значения корня $\sqrt{p^2 + 1}|_{p=\pm i\mu} = \sqrt{1 - \mu^2}$. Почленная разность двух выражений, получающихся при подстановке в (3.33) значений $p = \pm i\mu$, дает

$$\int_{\tau}^{\infty} J_0(\sqrt{t^2 - \tau^2}) \sin \mu t \, dt = \frac{\cos \tau \sqrt{\mu^2 - 1}}{\sqrt{\mu^2 - 1}}, \quad 0 \leq \mu, \quad (3.85)$$

что совпадает с (3.85) при $\tau = 0$, $t = \lambda r$, а почленная сумма приводит к соотношению (3.83). Формула (3.84) получается интегрированием тождества (3.83) по k .

$$3.322. 1) f(r) = \frac{1}{2} \left[\frac{\pi}{2} - \sin \left(\frac{r^2}{4\alpha} \right) \right]; 2) f(r) = \frac{1}{2\alpha} \sin \frac{r^2}{4\alpha}.$$

Решение. Один из способов вычисления интеграла $g(\alpha) = \int_0^{\infty} \frac{\sin \alpha \lambda^2}{\lambda} \times J_0(r\lambda) d\lambda$ состоит в предварительном вычислении интеграла

$$g'(\alpha) = \int_0^{\infty} \cos \alpha \lambda^2 J_0(r\lambda) \lambda d\lambda = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \cos \alpha \xi J_0(r\sqrt{\xi}) d\xi.$$

Для правомерности дифференцирования интеграла $g(\alpha)$ по параметру достаточно доказать равномерную сходимость интеграла $g'(\alpha)$ относительно параметра. В данном случае интеграл $g'(\alpha)$ равномерно сходится на промежутке $[0 < \alpha_0 \leq \alpha < \infty]$. Это значит, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists A_0 > 0, \forall A \geq A_0, \forall \alpha \geq \alpha_0: \left| \int_A^{\infty} \cos \alpha \lambda^2 J_0(r\lambda) \lambda d\lambda \right| < \varepsilon.$$

Значение r несущественно (можно сделать замену $r^2\xi = x$), так что в следующем выражении $r = 1$. Равномерную сходимость можно усмотреть, проделав двукратное интегрирование по частям:

$$g'(\alpha) = \frac{1}{2\alpha} \left(\sin \alpha x^2 J_0(x) - \frac{1}{2\alpha x} \cos \alpha x^2 J_1(x) \right) \Big|_A^\infty + \frac{1}{2\alpha^2} \int_A^\infty \cos \alpha x^2 \left(\frac{J_1'(x)}{x} - \frac{J_1(x)}{x^2} \right) dx.$$

Вычисление интеграла $g'(\alpha) = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \int_0^\infty e^{i\alpha\xi} J_0(r\sqrt{\xi}) d\xi = \frac{1}{2} \operatorname{Re} h(\alpha)$ на комплексной плоскости (z) следует проводить по контуру, ограничивающему сектор $\{r, \varphi: 0 \leq r \leq R, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}\}$. При $R \rightarrow \infty$ (с учетом леммы Жордана) вещественная ось интегрирования преобразуется в мнимую ось:

$$h(\alpha) = - \int_{i\infty}^0 e^{i\alpha z} J_0(r\sqrt{z}) dz = i \int_0^\infty e^{-\alpha y} J_0(r\sqrt{y} e^{i\frac{\pi}{2}}) dy, \quad z = iy.$$

Далее применяется выражение для функции Бесселя в виде ряда:

$$\begin{aligned} h(\alpha) &= i \int_0^\infty e^{-\alpha y} \sum_{k=0}^\infty \frac{(-1)^k \left(\frac{ir\sqrt{y}}{2} \right)^{2k}}{k!k!} dy = i \sum_{k=0}^\infty \frac{(-1)^k \left(\frac{ir}{2} \right)^{2k}}{k!k!} \int_0^\infty e^{-\alpha y} y^k dy = \\ &= i \sum_{k=0}^\infty \frac{\left(\frac{-ir^2}{4\alpha} \right)^k k!}{\alpha k!k!} = \frac{i}{\alpha} e^{-\frac{ir^2}{4\alpha}}. \end{aligned}$$

Итак,

$$g'(\alpha) = \frac{1}{2\alpha} \sin \frac{r^2}{4\alpha} \implies g(\alpha) = \frac{1}{2} \int_\alpha^\infty \sin \frac{r^2}{4\xi} \frac{d\xi}{\xi} + C = \frac{1}{2} \int_{\frac{r^2}{4\alpha}}^\infty \frac{\sin \eta d\eta}{\eta} + C, \quad \xi = \frac{r^2}{4\eta}.$$

Изначально $g(0) = 0$, так что $C = \frac{\pi}{4}$. В итоге

$$g(\alpha) = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \sin \left(\frac{r^2}{4\alpha} \right) \right).$$

3.325. $u(r, z) = \frac{u_0 r_0^2 (r_0 + z)}{(r^2 + (r_0 + z)^2)^{\frac{3}{2}}}.$

У к а з а н и е. См. соответствие из задачи 3.310.

3.326. $u(r, \varphi, z) = \frac{u_0 r_0^2 r \cos \varphi}{(r^2 + (r_0 + z)^2)^{\frac{3}{2}}}.$

У к а з а н и е. Использовать соответствие из задачи 3.311.

3.327. $u(r, \varphi, z) = \frac{A}{(r^2 + (r_0 + z)^2)^{\frac{3}{2}}}.$

У к а з а н и е. Применить соответствие из задачи 3.310.

3.328. $u(r, \varphi, z) = \frac{A}{r} \left(1 - \frac{r_0 + z}{\sqrt{r^2 + (z + r_0)^2}} \right) \cos \varphi.$

У к а з а н и е. Применить соответствие из задачи 3.311.

$$3.329. \quad u(\mathbf{r}) = \frac{Q}{(\varepsilon + 1)\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$$

$$3.330. \quad u(r, z) = u_0 \left(1 - r_0 \int_0^\infty J_0(\lambda r) J_1(\lambda r_0) e^{-D\lambda^2 t} d\lambda \right).$$

$$3.331. \quad u(r, z) = \frac{J}{2\pi\sigma} \int_0^\infty \frac{\operatorname{sh} \lambda z}{\operatorname{ch} \lambda l} J_0(\lambda r) d\lambda, \quad \mathbf{j} = -\sigma \nabla u.$$

$$3.332. \quad u(r, z) = u_0 r_0 \int_0^\infty e^{-\lambda z} J_1(\lambda r_0) J_0(\lambda r) d\lambda.$$

$$3.333. \quad u(r, z) = \frac{Q_0}{2\pi k} \int_0^\infty \frac{J_0(\lambda r) e^{-\lambda z} \lambda d\lambda}{\lambda + h}.$$

$$3.334. \quad \text{Плотность тока } \mathbf{j} = -\sigma \nabla u;$$

$$1) \quad u(r, z) = \frac{I}{\pi r_0 \sigma} \int_0^\infty e^{-\lambda z} J_1(\lambda r_0) J_0(\lambda r) \frac{d\lambda}{\lambda};$$

$$2) \quad u(r, z) = \frac{J}{2\pi\sigma} \int_0^\infty e^{-\lambda z} J_0(\lambda r_0) J_0(\lambda r) d\lambda;$$

$$3.335. \quad u(r, l) = \frac{Q_0}{2\pi} \int_0^\infty \frac{J_0(\lambda r) d\lambda}{k_1 \operatorname{sh} \lambda l + k_2 \operatorname{ch} \lambda l}; \quad \text{если } k_1 = k_2, \text{ то } u(r, z) = \frac{Q_0}{2\pi \sqrt{r^2 + z^2}}.$$

$$3.337. \quad u(r, z) = \frac{Q_0}{4\pi k} \int_0^\infty \frac{\operatorname{sh} \lambda \left(l - \left| z - \frac{l}{2} \right| \right) + \operatorname{sh} \lambda \left(z - \frac{l}{2} \right)}{\operatorname{ch} \lambda l} J_0(\lambda r) d\lambda.$$

$$3.338. \quad \sigma = \frac{u_0}{2\pi^2} \frac{1}{\sqrt{r_0^2 - r^2}}. \quad \text{Решение (фрагменты). Потенциал } u(r, z) \text{ электростатического поля диска определяется условиями}$$

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r, \quad 0 < z,$$

$$u(r, 0) = u_0, \quad 0 \leq r < r_0, \quad u_r(r, 0) = 0, \quad r_0 < r,$$

$$|u(0, z)| < \infty, \quad u(r, \infty) = u(\infty, z) = 0.$$

Решение задачи для изображения имеет вид $\mathcal{H}_0[u](\lambda) A(\lambda) e^{-\lambda z}$, где функция $A(\lambda)$ удовлетворяет системе уравнений:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty A(\lambda) J_0(\lambda r) \lambda d\lambda &= u_0, \quad 0 \leq r < r_0, \\ \int_0^\infty A(\lambda) J_0(\lambda r) \lambda^2 d\lambda &= 0, \quad r_0 < r. \end{aligned}$$

Из соотношений (3.84) и (3.82) следует, что решением этой системы является функция $A(\lambda) = \frac{2u_0}{\pi} \frac{\sin \lambda}{\lambda^2}$.

3.339. Потенциал скоростей

$$\psi(r, z, t) = -\frac{Q\sqrt{g}}{2\pi} \int_0^\infty \sin(\sqrt{g\lambda} t) J_0(\lambda r) e^{\lambda z} \sqrt{\lambda} d\lambda.$$

Форма поверхности

$$\zeta(r, t) = -\frac{1}{g} \frac{\partial \psi}{\partial t} \Big|_{z=0} = \frac{Q}{2\pi} \int_0^\infty \cos(\sqrt{g\lambda} t) J_0(\lambda r) \lambda d\lambda.$$

Приближенное решение

$$\zeta(r, t) = \frac{Qgt^2}{4\sqrt{2}\pi r} \cos \frac{gt^2}{4r}.$$

У к а з а н и е. Начальную форму поверхности следует представить с помощью δ -функции. Для построения решения последовательно применить интегральные преобразования Фурье и Ганкеля. При исследовании решения для больших r и t воспользоваться асимптотикой функций Бесселя и асимптотической формулой

$$\int_a^b f(\lambda) e^{-ih(\lambda)t} d\lambda = f(\lambda_0) \sqrt{\frac{2\pi}{t|h''(\lambda_0)|}} e^{-i[h(\lambda_0)t + \frac{\pi}{4} \text{sign } h''(\lambda_0)]}, \quad t \rightarrow \infty,$$

где λ_0 — стационарная точка вида: $h'(\lambda_0) = 0$, $h''(\lambda_0) \neq 0$, $\lambda \in [a, b]$.

3.340. $\zeta(r, t) = -\frac{I}{2\pi\rho g} \int_0^\infty \sin(\sqrt{\lambda g} t) J_0(\lambda r) \lambda \sqrt{\lambda} d\lambda$. Приближенное решение

$$\zeta(r, t) = -\frac{Igt^3}{8\sqrt{2}\pi\rho r^4} \cos \frac{gt^2}{4r}.$$

3.341. $u(r, z, t) = \frac{Q}{16\pi klt} \left(\operatorname{erf} \frac{l+z}{2a\sqrt{t}} + \operatorname{erf} \frac{l-z}{2a\sqrt{t}} \right) e^{-\frac{r^2}{4a^2t}}.$

У к а з а н и е. Применить преобразования Фурье, Ганкеля, Лапласа.

3.342. $u(r, \varphi, z, t) = \frac{Q}{16\pi klt} \left(\operatorname{erf} \frac{l+z}{2a\sqrt{t}} + \operatorname{erf} \frac{l-z}{2a\sqrt{t}} \right) e^{-\frac{r^2}{4a^2t} - \frac{v^2t}{4a^2} + \frac{vr \cos \varphi}{2a^2}}.$

3.343. $u(r, t) = \frac{I\eta(at-r)}{2\pi\rho\sqrt{a^2t^2-r^2}}.$

3.346. $\Phi(r, u_T) = \frac{Q_0\varphi_T}{4\pi r} e^{\frac{\tau_T}{L^2}} \int_{\frac{\tau_T}{L^2}}^\infty e^{-\left(x + \frac{r^2}{4L^2x}\right)} \frac{dx}{x},$ где $\varphi_T = \varphi(u_T)$ (см. (1.149)),

$\tau_T = \tau(u_T)$ (см. (1.66)), u_T — летаргия теплового нейтрона.

У к а з а н и е. Постановка задачи (см. задачу 1.271)

$$\Delta\Phi(r, u) - \frac{1}{L^2}\Phi(r, u) = -\frac{Q_0\varphi(u)e^{-\frac{r^2}{4\tau}}}{4\pi D\tau}, \quad 0 < r, \quad 0 \leq u \leq u_T,$$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \Phi(r, u) = 0.$$

В результате применения преобразования Ганкеля, в котором участвует формула (3.73), решение запишется в виде

$$\Phi(r, u) = \frac{Q_0\varphi(u)}{2\pi D} \int_0^\infty \frac{J_0(\lambda r) e^{-\lambda^2\tau} \lambda d\lambda}{\lambda^2 + \frac{1}{L^2}}.$$

Отсюда и из интегральных соотношений (3.72) и (3.73) вытекает, что функция $\chi = \frac{2\pi D\Phi(r, u)}{Q_0\varphi(u)}$ является решением задачи Коши

$$\chi_\tau - \frac{1}{L^2}\chi = -\frac{e^{-\frac{r^2}{4\tau}}}{2\tau}, \quad 0 < \tau,$$

$$\chi(r, 0) = K_0\left(\frac{r}{L}\right).$$

Следовательно,

$$\chi(r, u) = e^{\frac{\tau}{L^2}} \left[K_0\left(\frac{r}{L}\right) - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\tau}{L^2}} e^{-\left(x + \frac{r^2}{4L^2x}\right)} \frac{dx}{x} \right].$$

Остается применить интегральное представление

$$K_0(r) = \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-\left(x + \frac{r^2}{4L^2x}\right)} \frac{dx}{x},$$

которое получается из интегрального представления

$$K_\nu(z) = \int_0^\infty e^{-z \operatorname{ch} t} \operatorname{ch} \nu t \, dt$$

независимыми заменами $x = e^t$ и $x = e^{-t}$ и объединением двух интегралов в один с пределами 0 и ∞ .

3.347. $u(r, z) = \frac{q_0}{2\pi D} K_0(\beta r)$. У к а з а н и е. Для вычисления обратного преобразования применить (3.72).

3.348. $u(r, z) = \frac{q_0}{2\pi D} K_0\left(\sqrt{\beta^2 + \frac{\alpha}{D}} r\right)$. У к а з а н и е то же, что и в предыдущей задаче.

3.349. $u(r, z) = \frac{q_0}{2\pi D} K_0\left(\sqrt{\frac{\alpha}{D}} r\right)$. У к а з а н и е то же, что и в задаче 3.347.

3.350. $u(r, t) = \frac{q_0}{4\pi k} \int_{\frac{r^2}{4a^2t}}^\infty e^{-\tau} \frac{d\tau}{\tau} = \Gamma\left(0, \frac{r^2}{4a^2t}\right)$.

3.351. $\sigma(r) = -\frac{q_0}{2\pi\sqrt{h^2 + r^2}}$.

3.352. $\mathbf{F} = -2q_0^2 \ln \frac{a+b}{2\sqrt{ab}} \mathbf{e}_z$.

3.353. $u(x, y, z) = \frac{\eta(at-r)}{\sqrt{a^2t^2 - r^2}}$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

3.354. $u(r, t) = \frac{I}{4\pi\sqrt{\rho h D}} \left[\frac{\pi}{2} - \operatorname{si}\left(\frac{r^2}{4at}\right) \right]$. Р е ш е н и е (фрагменты). Поста-

новка задачи $u_{tt} + a^2 \Delta^2 u = \frac{I}{\rho h} \frac{\delta(r)}{2\pi r} \cdot \delta(t)$, $u|_{t=0} = u_t|_{t=0} = 0$. Преобразование Ганкеля $U(\lambda t) = \mathcal{H}_0[u](\lambda) -$ решение задачи

$$U_{tt} + a^2 \lambda^4 U = \frac{i\delta(t)}{2\pi\rho h}, \implies U(\lambda, t) = \frac{I}{2\pi\rho h} \frac{\sin a\lambda^2 t}{a\lambda^2}.$$

$$U|_{t=0} = U_t|_{t=0} = 0,$$

Остается применить соответствие 1) из задачи 3.322.

3.355. $u(r, t) = \frac{F_0 a t}{4\pi D} \left[\frac{\pi}{2} - \operatorname{si}\left(\frac{r^2}{4at}\right) - \sin\left(\frac{r^2}{4at}\right) + \frac{r^2}{4at} \operatorname{ci}\left(\frac{r^2}{4at}\right) \right]$.

3.356. $u(r, t) = \frac{1}{4\pi\sqrt{\rho D}} \int_0^t F(\tau) \left[\frac{\pi}{2} - \operatorname{si}\left(\sqrt{\frac{\rho}{D}} \frac{r^2}{4(t-\tau)}\right) \right] d\tau$.

3.357. $u(r, z) = \frac{2au_0}{r_0} \int_0^\infty \frac{e^{-\lambda z} J_0(\lambda r) \lambda d\lambda}{\lambda^2 + a^2}$,

$u(0, z) = \frac{u_0}{ar_0} \left[1 - az \left(\operatorname{ci}(az) \sin(az) - \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{si}(az) \cos(az) \right) \right) \right],$

$\mathbf{q} = \frac{\pi k u_0}{r_0} [I_0(ar) - \mathbf{L}_0(ar) + ar(I'_0(ar) - \mathbf{L}'_0(ar))] \mathbf{e}_z$, штрих означает дифференцирование по всему аргументу.

$$\mathbf{3.358.} \quad u(r, z) = \frac{u_0}{2a} \int_0^\infty e^{-\lambda z} J_0(\lambda r) \cos \frac{\lambda^2}{4a} \lambda d\lambda;$$

$$u(0, z) = u_0 \left\{ 1 - z\sqrt{2a\pi} \left[\left(\frac{1}{2} - S \left(\sqrt{\frac{2a}{\pi}} z \right) \right) \cos az^2 - \left(\frac{1}{2} - C \left(\sqrt{\frac{2a}{\pi}} z \right) \right) \sin az^2 \right] \right\}.$$

$$\mathbf{3.359.} \quad u(r, z) = \frac{u_0}{2\alpha} \int_0^\infty e^{-\lambda z - \frac{\lambda^2}{4\alpha}} J_0(\lambda r) \lambda d\lambda, \quad u(0, z) = u_0 \left[1 - \sqrt{\pi\alpha} z e^{\alpha z^2} \operatorname{Erf}(z\sqrt{\alpha}) \right],$$

$$\mathbf{q} = u_0 k \sqrt{\pi\alpha} e^{-\frac{\alpha r^2}{2}} \left[(1 - \alpha r^2) I_0\left(\frac{\alpha r^2}{2}\right) + \alpha r^2 I_1\left(\frac{\alpha r^2}{2}\right) \right],$$

$$q(r, 0) = k u_0 \sqrt{\pi\alpha} \left(1 - \frac{3\alpha r^2}{2} + O(r^4) \right), \quad \text{если } r \rightarrow 0;$$

$$q(r, 0) = -\frac{k u_0}{2\alpha r^3} \left(1 + O\left(\frac{1}{r^2}\right) \right), \quad \text{если } r \rightarrow \infty.$$

У к а з а н и е. Применить формулы (3.81), (3.78).

$$\mathbf{3.360.} \quad u(r, \varphi, z) = u_0 r_0 \int_0^\infty e^{-\lambda z} \sin \frac{\lambda^2}{4a} J_1(\lambda r) d\lambda \cos \varphi, \quad u|_{r=0} = 0,$$

$$\mathbf{q} = k u_0 r_0 a \sqrt{\pi a} r \left[\cos \left(\frac{ar^2}{2} - \frac{\pi}{4} \right) J_0\left(\frac{ar^2}{2}\right) - \sin \left(\frac{ar^2}{2} - \frac{\pi}{4} \right) J_1\left(\frac{ar^2}{2}\right) \right] \cos \varphi \mathbf{e}_z.$$

У к а з а н и е. Воспользоваться решениями задач 3.319, п. 1 и 3.320, п. 1.

$$\mathbf{3.361.} \quad u(r, z) = \frac{q_0 a^2}{k} \int_0^\infty e^{-\lambda z} K_0(\lambda a) J_0(\lambda r) d\lambda,$$

$$u(0, z) = \frac{q_0 a}{k} \cdot \begin{cases} \frac{\arccos \frac{z}{a}}{\sqrt{r^2 + a^2}}, & 0 \leq z < a, \\ \frac{1}{\sqrt{z^2 - a^2}} \ln \frac{z + \sqrt{z^2 - a^2}}{a}, & z > a, \end{cases}$$

$$u(r, 0) = \frac{\pi q r_0}{2k} F\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, -\frac{r^2}{r_0^2}\right). \text{ Указание к вычислению последнего интеграла дано в [7], гл. 7, 7.4.}$$

$$\mathbf{3.362.} \quad u(r, z) = \frac{q_0}{2\alpha k} \int_0^\infty e^{-\frac{\lambda^2}{4\alpha} - \lambda z} J_0(\lambda r) d\lambda,$$

$$u(0, z) = \frac{q_0}{2k} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\alpha z} \operatorname{Erf}(z\sqrt{\alpha}), \quad u(r, 0) = \frac{q_0}{4\alpha k} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{r^2}{8\alpha}} I_0\left(\frac{r^2}{8\alpha}\right).$$

У к а з а н и е. Применить формулы (3.78).

Глава 4

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Линейный оператор

$$(\mathcal{K}u)(x) = \int_a^b K(x, y)u(y)dy \quad (4.1)$$

или

$$(\mathcal{K}u)(x) = \int_a^x K(x, y)u(y)dy \quad (4.2)$$

определяет линейное интегральное уравнение

$$u = \mu \mathcal{K}u + f, \quad (4.3)$$

где ядро $K(x, y)$ оператора $\mathcal{K}$ и $f(x)$ — известные функции, μ — комплексный параметр. Уравнение (4.3) называется интегральным уравнением Фредгольма второго рода в случае оператора (4.1) или интегральным уравнением Вольтерра второго рода в случае оператора (4.2). Возможна еще одна конструкция линейного интегрального уравнения: $\mathcal{K}u = f$; оно называется в зависимости от вида оператора интегральным уравнением Фредгольма или Вольтерра первого рода.

Интегральные уравнения встречаются при моделировании задач механики, теплопроводности, электродинамики и в других областях, применяются в исследовании дифракции электромагнитных волн, для решения геофизических задач [23]. Большой класс обратных задач, решение которых не обладает свойством устойчивости, связан с уравнением Фредгольма первого рода. Это уравнение приобретает все большее значение благодаря развитию методов решения некорректных задач.

Использование интегральных уравнений в математической физике обусловлено также возможностью сведения задачи для дифференциального уравнения к эквивалентному интегральному уравнению. Соответствующая процедура основана на применении

потенциалов, функции Грина, характеристик и других средств. Аппарат интегральных уравнений позволяет устанавливать свойства решения исходной дифференциальной задачи, строить точное или приближенное решение, получать различные оценки. Важную роль здесь играет однородное уравнение Фредгольма второго рода

$$u = \mu Ku. \quad (4.4)$$

Значение параметра μ , при котором уравнение имеет нетривиальное решение, называется характеристическим числом ядра (уравнения), а соответствующие нетривиальные решения — собственными функциями ядра. Уравнение (4.4) непосредственно связано с задачей на собственные значения, которая является основной в методе Фурье. Линейные интегральные уравнения используются для построения и обоснования метода обратной задачи рассеяния, посредством которого получаются солитонные решения ряда нелинейных дифференциальных уравнений математической физики.

Данная глава содержит набор упражнений по решению интегральных уравнений и служит основой для их последующих приложений.

Литература к главе 4

1. Васильева А.Б., Тихонов А.Н. Интегральные уравнения. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.
2. Владимиров В.С., Жаринов В.В. Уравнения математической физики. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.
3. Краснов М.Л., Кисилев А.Н., Макаренко Г.И. Интегральные уравнения. — М.: УРСС, 2003.
4. Сборник задач по уравнениям математической физики / под ред. В.С. Владимирова — 4-е изд., стереотип. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.

4.1. Вывод интегральных уравнений

Пример 4.1. Однородная струна ($0 < x < l$) с жестко закрепленными концами находится в равновесии под действием статической нагрузки $F(x)\mathbf{e}_u$. Функция $v(x)$, характеризующая

отклонение струны от положения равновесия, является решением задачи

$$\begin{aligned} v_{xx} &= -\frac{F(x)}{T_0}, \quad 0 < x < l, \\ v(0) &= v(l) = 0. \end{aligned} \quad (4.5)$$

Оказывается, что для определения $v(x)$ достаточно найти отклонение $G(x, \xi)$ струны, вызванное единичной силой, приложенной в точке $x = \xi$:

$$\begin{aligned} G_{xx} &= -\frac{1}{T_0} \delta(x - \xi), \quad 0 < x < l, \\ G(0, \xi) &= G(l, \xi) = 0. \end{aligned} \quad (4.6)$$

Действительно, $F(x)$ может быть представлена суперпозицией сосредоточенных сил, т. е.

$$F(x) = \int_0^l F(\xi) \delta(x - \xi) d\xi,$$

результатирующее отклонение от действия которых

$$v(x) = \int_0^l F(\xi) G(x, \xi) d\xi. \quad (4.7)$$

Утверждение, что $v(x)$ решение задачи (4.5), доказывается непосредственной проверкой. Для построения функции $G(x, \xi)$ задачу (4.6) удобнее поставить в эквивалентной форме (см. 10.15))

$$\begin{aligned} G_{xx} &= 0, \quad 0 < x < \xi, \quad \xi < x < l, \\ G(0, \xi) &= G(l, \xi) = 0, \\ [G]_{\xi} &= 0, \quad [G_x]_{\xi} = -\frac{1}{T_0}. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что $G = Ax$ при $x < \xi$ и $G = B(l - x)$ при $\xi < x$, где A и B удовлетворяют системе уравнений

$$\begin{cases} A\xi - B(l - \xi) = 0, \\ A + B = \frac{1}{T_0}. \end{cases}$$

Таким образом,

$$G(x, \xi) = \frac{1}{T_0 l} \cdot \begin{cases} (l - \xi)x, & 0 \leq x \leq \xi, \\ \xi(l - x), & \xi \leq x \leq l. \end{cases}$$

Пусть в струне возбуждено одно из собственных колебаний с частотой ω . Уравнение колебаний струны $\rho(x)u_{tt} = T_0 u_{xx}$ посредством подстановки $u(x, t) = v(x) \sin(\omega t + \alpha)$ сводится к уравнению

$$v_{xx} = -\frac{\omega^2 \rho(x)}{T_0} v(x), \quad 0 < x < l,$$

которое нужно решать при условиях $v(0) = v(l) = 0$, т. е. функция $v(x)$ — решение задачи (4.5). По формуле (4.7)

$$v(x) = \mu \int_0^l G(x, \xi) \rho(\xi) v(\xi) d\xi, \quad \mu = \omega^2. \quad (4.8)$$

Если ввести новые функции

$$w(x) = \sqrt{\rho(x)} v(x), \quad K(x, \xi) = \sqrt{\rho(x)\rho(\xi)} G(x, \xi),$$

то получится уравнение

$$w(x) = \mu \int_0^l K(x, \xi) w(\xi) d\xi \quad (4.9)$$

с симметричным ядром. Известно, что собственные функции симметричного ядра, соответствующие различным характеристическим числам, ортогональны на промежутке $(0, l)$; характеристические числа вещественны, имеют конечную кратность, образуют не более чем счетное множество без конечных предельных точек [15].

Итак, задача определения амплитуд (с точностью до постоянного множителя) и частот собственных колебаний струны сведена к однородному интегральному уравнению Фредгольма второго рода.

4.1. Пусть $G(x, \xi)$ — статическое отклонение сечения с координатой x упругого стержня, вызванное поперечной единичной силой, приложенной в сечении с координатой ξ . Получить интегральное уравнение для определения собственных частот поперечных колебаний стержня. Плотность стержня $\rho(x)$, площадь поперечного сечения $S(x)$.

4.2. С возрастанием скорости вращения вала возникают поперечные колебания. Вывести интегральное уравнение для определения критической угловой скорости, если поперечная единичная сила, приложенная в сечении $x = \xi$, вызывает статическое

отклонение $G(x, \xi)$ покоящегося вала от горизонтального положения равновесия. Плотность стержня $\rho(x)$, площадь поперечного сечения $S(x)$.

4.3. Существуют физические системы, реакция $v(t)$ которых на внешнее воздействие $u(t)$ зависит не только от значения функции $u(t)$ в данный момент времени t , но и от значений во все предыдущие моменты, то есть система обладает памятью об истории развития процесса. В приложениях применяется следующая форма линейной зависимости между $v(t)$ и $u(t)$:

$$v(t) = k u(t) + \int_{-\infty}^t K(t, \tau) u(\tau) d\tau, \quad (4.10)$$

где первое слагаемое представляет собой мгновенную (линейную) зависимость v от t в момент времени t , а второе — выражает свойство системы помнить о воздействии $u(t)$ в моменты времени, предшествующие моменту t ; наследственное ядро $K(t, \tau)$ определено при $\tau < t$.

В прикладных задачах применяются ядра, удовлетворяющие принципу затухающей памяти [72]:

$$\begin{aligned} K(t, \tau) > 0, \quad K(t, \tau) \text{ — монотонно убывает с ростом } t, \\ \forall \tau \in \mathbb{R}: \lim_{t \rightarrow +\infty} K(t, \tau) = 0 \\ \forall t \in \mathbb{R}: \int_{-\infty}^t K(t, \tau) d\tau < \infty. \end{aligned} \quad (4.11)$$

Второе условие означает, что при $t \rightarrow +\infty$ система полностью забывает о внешнем воздействии. Последнее условие обеспечивает сходимость интеграла в (4.10) для любой ограниченной интегрируемой функции $u(t)$. При условиях (4.11)

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^0 K(t, \tau) u(\tau) d\tau = 0.$$

Доказательство. Для любого $T > 0$

$$\int_{-\infty}^0 K(t, \tau) u(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{-T} K(t, \tau) u(\tau) d\tau + \int_{-T}^0 K(t, \tau) u(\tau) d\tau.$$

Так как несобственный интеграл в правой части равенства сходится, то для любого $\varepsilon > 0$ существуют t_1 и $T_0 > 0$ такие, что

$$\left| \int_{-\infty}^{-T_0} K(t_1, \tau) u(\tau) d\tau \right| \leq M \int_{-\infty}^{-T_0} K(t_1, \tau) d\tau < \frac{\varepsilon}{2}.$$

В силу монотонности ядра по переменной t для любого $t \geq t_1$

$$\left| \int_{-\infty}^{-T_0} K(t, \tau) u(\tau) d\tau \right| \leq M \int_{-\infty}^{-T_0} K(t, \tau) d\tau \leq M \int_{-\infty}^{-T_0} K(t_1, \tau) d\tau < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Для оценки второго интеграла нужно воспользоваться интегральной теоремой о среднем и поведением ядра при $t \rightarrow +\infty$: для любого $\varepsilon > 0$ и для любого положительного T , например, для $T > T_0$, существует t_2 , такое что

$$\left| \int_{-T_0}^0 K(t_2, \tau) u(\tau) d\tau \right| \leq M \int_{-T_0}^0 K(t_2, \tau) d\tau = M K(t_2, \tau^*) T_0 < \frac{\varepsilon}{2},$$

где $\tau^* \in [-T_0; 0]$. Таким образом, для $t_0 = \max\{t_1, t_2\}$ выполняются оба неравенства, так что

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists t_0, \quad \forall t \geq t_0: \quad \left| \int_{-\infty}^0 K(t, \tau) u(\tau) d\tau \right| < \varepsilon,$$

что и требовалось установить. Итак, при $t \geq t_0$

$$\int_{-\infty}^t K(t, \tau) u(\tau) d\tau = \int_0^t K(t, \tau) u(\tau) d\tau, \quad (4.12)$$

то есть к моменту $t = t_0$ система полностью забывает предысторию процесса. Чем быстрее затухает память, тем меньше t_0 . Если $t_0 \leq 0$, то равенство (4.12) выполняется для $t \geq 0$ и соотношение (4.10) принимает вид

$$v = ku + \mathcal{K}u, \quad \text{где} \quad \mathcal{K}u = \int_0^t K(t, \tau) d\tau. \quad (4.13)$$

В данной ситуации можно принять $t = 0$ за начало отсчета, полагая, что внешнее воздействие включается в момент времени $t = 0$, а при $t < 0$ функции $v(t) = u(t) = 0$.

Если свойства системы не изменяются со временем, то память от внешнего воздействия в течение времени $t - \tau$ зависит только от длины $t - \tau$ интервала $(\tau; t)$ и не зависит от его положения на оси t ; в этом случае естественно считать, что наследственное ядро является разностным: $K(t, \tau) = K(t - \tau)$.

Примером системы с памятью служит катушка с индуктивностью L , в которую введен однородный магнитный сердечник. Из-за гистерезиса в сердечнике поток $\Phi(t)$ магнитной индукции в катушке в момент времени t зависит от значений тока во все предыдущие моменты времени. Эта зависимость (в практической системе единиц) имеет вид

$$\Phi(t) = Li(t) + \int_{-\infty}^t M(t - \tau) i(\tau) d\tau,$$

где первое слагаемое представляет собой мгновенную зависимость Φ от t в момент времени t , а второе — выражает свойство системы помнить о предшествующем воздействии.

Конденсатор с емкостью C , сопротивление R и катушка с индуктивностью L , в которую введен магнитный сердечник, образуют цепь квазистационарного тока (рис. 4.1). В момент вре-




Рис. 4.1

мени $t = 0$ разность потенциалов между точками A и B равна u_0 , а токи i , i_1 , i_2 равны нулю. Для сердечника с достаточно быстро затухающей памятью поток $\Phi(t)$ магнитной индукции в катушке в момент времени t определяется формулой:

$$\Phi(t) = Li(t) + \int_0^t M(t - \tau) i(\tau) d\tau,$$

где функция $M(t)$ известна. Показать, что ток через катушку удовлетворяет интегральному уравнению Вольтерра второго рода

$$i(t) = \int_0^t K(t - \tau) i(\tau) d\tau + f(t),$$

где

$$K(t) = -\frac{1}{L} \left[u(t) + R(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \right], \quad f(t) = \frac{u_0 RC}{L} (1 - e^{-\frac{t}{RC}}).$$

4.4. В упругом стержне деформация $\varepsilon(t)$ некоторого элемента при малых деформациях зависит от напряжения $\sigma(t)$ линейно: $\varepsilon(t) = \sigma(t)/E$, где E — модуль Юнга. Если деформации не малы, то ε и σ связаны нелинейной зависимостью $\varepsilon(t) = a(\sigma(t))$. Для однородного стержня, изготовленного из нестареющего (свойства не зависят от времени) наследственно-упругого материала с быстро затухающей памятью применяется следующая форма зависимости между ε и σ (см. предыдущую задачу):

$$\varepsilon(t) = a(\sigma(t)) + \int_0^t K(t - \tau) a(\sigma(\tau)) d\tau.$$

Это соотношение представляет собой интегральное уравнение Вольтерра относительно функции $a(\sigma)$, решение которого можно записать в виде (см. задачу 4.330)

$$\varepsilon = \frac{a(\sigma)}{1 - \mathcal{R}}. \quad (4.14)$$

В случае малой квадратичной нелинейности в книге [54] рассмотрена зависимость ε от σ типа (4.14), т.е.

$$\varepsilon = \frac{A\sigma + \gamma B\sigma^2}{1 - \mathcal{R}}, \quad \gamma \ll 1, \quad (4.15)$$

где $A > 0$, B — константы, $|B| \leq A^2$, $\int_0^\infty R(t) dt < \infty$.

Показать, что: 1) функция $\sigma(x, t)$ является решением нелинейного уравнения с памятью

$$\frac{\partial^2 (A\sigma + \gamma B\sigma^2)}{\partial t^2} - \frac{1}{\rho} (1 - \gamma \mathcal{R}) \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x^2} = 0;$$

2) полученное уравнение может быть асимптотически факторизовано (т. е. представлено в виде произведения нескольких сомножителей):

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} \sqrt{A + 2\gamma B \sigma} \mp \sqrt{\frac{1 - \gamma \mathcal{R}}{\rho}} \frac{\partial}{\partial x} \right) \times \quad (4.16)$$

$$\times \left(\sqrt{A + 2\gamma B \sigma} \frac{\partial}{\partial t} \pm \sqrt{\frac{1 - \gamma \mathcal{R}}{\rho}} \frac{\partial}{\partial x} \right) \sigma = O(\gamma^2) \quad \gamma \rightarrow 0;$$

3) прямой волне соответствует уравнение

$$\sqrt{A\rho} \left(1 + \gamma \frac{B}{A} \sigma \right) \frac{\partial \sigma}{\partial t} + \left(1 - \frac{\gamma}{2} \mathcal{R} \frac{\partial \sigma}{\partial x} \right) = 0. \quad (4.17)$$

4.5. Уравнение (4.17) заменаи $x\sqrt{A\rho} \rightarrow x$, $k = -\frac{B}{A}$ преобразуется к виду

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\sigma - \frac{k\gamma}{2} \right) + \left(1 - \frac{\gamma}{2} \mathcal{R} \right) \frac{\partial \sigma}{\partial x} = 0, \quad (4.18)$$

где выбрано $k > 0$, а ядро R оператора $\mathcal{R}$ удовлетворяет условиям $R(t) \geq 0$, $R'(t) \leq 0$, $\int_0^\infty R(t) dt < \infty$. Пусть $\sigma = f(t - x)$ — волна, распространяющаяся без изменения формы, $f(z) = 0$ при $z < 0$. Показать, что функция $f(t)$ — решение интегрального уравнения (см. [54])

$$k f^2(t) - \int_0^t R(t - \tau) f(\tau) d\tau = 0. \quad (4.19)$$

4.6. В электроразведке для изучения свойств подземных структур измеряют потенциал на поверхности $z = 0$ земли, обусловленный постоянным током, поступающим в землю ($z > 0$) через электроды. Если имеется пласт ($0 < z < l$), то желательно знать потенциал (его измерить невозможно) на границе $z = l$ пласта. Показать, что потенциал $u(x, y, l)$ является решением интегрального уравнения Фредгольма 1-го рода

$$\frac{l}{2\pi} \iint_{-\infty}^{\infty} \frac{z u(\xi, \eta, l) d\xi d\eta}{[(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + z^2]^{\frac{3}{2}}} = u(x, y, 0).$$

4.7. В книге [12] рассмотрена задача восстановления размытого фотоизображения и приведен результат ее решения — восстановленный текст. Вот эта задача. При фотографировании объ-

екта его изображение оказалось не в плоскости α фотопленки, а в некоторой плоскости β , отстоящей от плоскости α на расстоянии h (h мало по сравнению с расстоянием от плоскости α до линзы в плоскости β). Известны величины: R — радиус линзы, b — расстояние от линзы до плоскости β , S — поверхность фотокадра, $v(x, y)$ — освещенность (ее можно измерить) в точке (x, y) плоскости α . Показать, что функция $u(x, y)$ — освещенность изображения в точке (x, y) плоскости β — является решением интегрального уравнения Фредгольма первого рода

$$v(x, y) = \int_S E((\xi - x)^2 + (\eta - y)^2) u(\xi, \eta) d\xi d\eta,$$

где

$$E(\sigma) = \begin{cases} \frac{1}{\pi r^2} & 0 \leq \sigma < r^2, \\ 0 & r^2 < \sigma, \end{cases}$$

r — радиус круга, являющегося изображением точки объекта в плоскости α .

4.8. Частица, масса которой m , колеблется в поле с неизвестной потенциальной энергией $U(x)$, где $U(x)$ четная, монотонно возрастающая при $x > 0$ функция и $U(0) = 0$. Зная зависимость $T(E)$ периода колебаний T от полной энергии E частицы, показать [12], что $U(x)$ — решение задачи

$$\frac{dU}{dx} = \frac{1}{\Phi(x)}, \quad U(0) = 0,$$

где $\Phi(x)$ — решение интегрального уравнения Вольтерра первого рода

$$T(E) = 2\sqrt{2m} \int_0^E \frac{\Phi(U) dU}{\sqrt{E - U}}.$$

4.9. Плоская электромагнитная волна с компонентами электрического поля $E_x = E_y = 0$, $E_z = f(z - ct)$ падает на металлическую полубесконечную иглу, расположенную на положительной части оси z . Пусть результирующее поле $-f(z - ct) + u$, где u — рассеянная волна. Показать, что

$$u(\xi, \eta) = \int_{\eta}^{\infty} \frac{v(s) ds}{s - \xi}, \quad \xi = z - ct, \quad \eta = r - ct, \quad r^2 = x^2 + y^2 + z^2,$$

$v(s)$ — решение интегрального уравнения Вольтерра первого рода

$$\int_{\xi}^{\infty} \frac{v(s) ds}{\xi - s} = f(\xi).$$

4.10. Звуковая волна, потенциал скоростей в которой $f(x - ct)$, падает на параболический цилиндр $y^2 = 2ax + a^2$, $a > 0$. Пусть $f(x - ct) + u$ — потенциал скоростей результирующей волны. Показать, что

$$u(\xi, \eta) = \int_{\eta}^{\infty} \frac{v(s) ds}{\sqrt{s - \xi}},$$

где $v(s)$ — решение интегрального уравнения Вольтерра второго рода

$$v(\xi) = -\frac{\sqrt{a}}{2} \int_{\eta}^{\infty} \frac{v(s) ds}{(s - \eta + a)^{\frac{3}{2}}} - \sqrt{a} f'(\eta - a).$$

4.11. В бесконечной однородной среде без поглощения ($\Sigma_c = 0$) действует источник нейтронов с летаргией $u = 0$; мощность источников в единице объема постоянна и равна Q_0 . При упругом рассеянии на свободных неподвижных ядрах среды (сечение Σ_s) происходит замедление нейтронов. При условии, что упругое рассеяние нейтрона на ядре в системе центра инерции изотропно, получить следующее интегральное уравнение (уравнение замедления) для плотности потока нейтронов $\Phi(u)$:

$$\Phi(u) \Sigma_s(u) = \int_{\max(u - \ln \frac{1}{\varepsilon}, 0)}^u \Phi(u') \Sigma_s(u') \frac{e^{-(u-u')}}{1 - \varepsilon} du' - Q_0 \delta(u), \quad (4.20)$$

где $\varepsilon_0 = \left(\frac{A-1}{A+1} \right)^2$, A — массовое число ядер среды.

4.12. Нейтроны движутся в однородной среде, занимающей ограниченную выпуклую область Ω . При взаимодействии с ядрами происходит либо изотропное (т.е. равномерное по направлениям) рассеяние нейтронов, либо их поглощение ядрами. Макроскопическое сечение (величина, обратная средней длине свободного пробега) рассеяния Σ_s , поглощения Σ_c , $\Sigma = \Sigma_s + \Sigma_c$, плотность источников нейтронов — $F(\mathbf{r}, t)$. Показать, что при

условиях 1)–3) задачи 1.273 плотность потока нейтронов $\Phi(\mathbf{r}, t)$ удовлетворяет интегральному уравнению Пайерлса

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Omega} \left[\Sigma_s \Phi \left(\mathbf{r}', t - \frac{|\mathbf{r}' - \mathbf{r}|}{v} \right) + \right. \\ \left. + F \left(\mathbf{r}', t - \frac{|\mathbf{r}' - \mathbf{r}|}{v} \right) \right] \frac{e^{-\Sigma |\mathbf{r}' - \mathbf{r}|}}{|\mathbf{r}' - \mathbf{r}|^2} d\mathbf{r}'.$$

4.13. Решить предыдущую задачу в случае неоднородной среды с характеристиками $\Sigma_s(\mathbf{r})$ и $\Sigma_c(\mathbf{r})$.

4.14. В однородном слое $(-\infty \leq a < x < b \leq \infty)$ движутся нейтроны; плотность нейтронов и плотность источников зависят только от x . Показать, что стационарное уравнение Пайерлса (см. задачу 4.12) может быть преобразовано к виду

$$\Phi(x) = \frac{1}{2} \int_a^b [\Sigma_s \Phi(\xi) + F(\xi)] E_1(\Sigma |\xi - x|) d\xi,$$

где $E_n(x) = \int_1^\infty \frac{e^{-x\tau}}{\tau^n} d\tau$.

4.15. Показать, что уравнение Пайерлса, описывающее движение нейтронов в неоднородном слое (см. предыдущую задачу), может быть приведено к виду

$$\Phi(x) = \frac{1}{2} \int_a^b [\Sigma_s(\xi) \Phi(\xi) + F(\xi)] E_1(\bar{\Sigma}(x, \xi) |\xi - x|) d\xi,$$

где

$$\bar{\Sigma}_s = \frac{1}{\xi - x} \int_x^\xi \Sigma(\eta) d\eta$$

есть среднее значение сечения на промежутке (x, ξ) ; функция $T_1(x)$ определена в условии предыдущей задачи.

4.16. В однородном слое $(0 < x < H)$ движутся нейтроны, столкновение которых с ядрами сопровождается изотропным (т.е. равномерным по направлениям) рассеянием, и выполнены условия 1)–3) задачи 1.273. Распределение нейтронов не зависит от времени и описывается функцией $\Phi(x, \mu)$ (см. задачу 1.278).

Поток нейтронов, поступающих в слой через поверхность $x = l$, определяет функцию $\Phi(l, \mu) = \chi(\mu)$, а поверхность $x = 0$ граничит с вакуумом. Показать, что плотность нейтронов $n(\xi)$, где $\xi = x\alpha_s$, есть безразмерная переменная, которая удовлетворяет интегральному уравнению Милна

$$n(\xi) = \frac{1}{2} \int_0^{\Delta} K(\xi - \eta) n(\eta) d\eta + f(\xi), \quad (4.21)$$

$$K(s) = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{\mu} e^{-\frac{|s|}{\mu}} d\mu, \quad f(\xi) = \int_{-1}^0 \chi(\mu) e^{\frac{\Delta - \xi}{\mu}} d\mu, \quad \Delta = H\alpha_s.$$

4.17. Решить задачу 4.16 для полупространства ($0 < x$), если на бесконечности задан поток нейтронов постоянной плотности в отрицательном направлении оси Ox .

4.18. Точечный изотропный источник света силы I расположен между двумя параллельными плоскостями $z = 0$ и $z = l$ с коэффициентами отражения α_1 и α_2 (осветительная бомба между земной поверхностью и облаками); расстояние источника от плоскостей l_1 и l_2 , $l_1 + l_2 = l$. Считая, что плоскости отражают свет по закону Ламберта (плотность излучения не зависит от направления), показать, что освещенности E_1 и E_2 плоскостей удовлетворяют системе интегральных уравнений

$$E_1(r) = \frac{\alpha_2 l^2}{\pi} \iint_{-\infty}^{\infty} \frac{E_2(\rho) d\xi d\eta}{[\xi - x)^2 + \eta - y)^2 + l^2]^2} + \frac{Il_1}{(r^2 + l_1^2)^{\frac{3}{2}}},$$

$$E_2(r) = \frac{\alpha_1 l^2}{\pi} \iint_{-\infty}^{\infty} \frac{E_1(\rho) d\xi d\eta}{[\xi - x)^2 + \eta - y)^2 + l^2]^2} + \frac{Il_2}{(r^2 + l_2^2)^{\frac{3}{2}}},$$

где $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\rho = \sqrt{\xi^2 + \eta^2}$.

4.19. Математический маятник (масса m , длина l), подвешенный в поле тяжести, совершает колебания конечной амплитуды под действием силы $F(t) = F_0 \cos \frac{2\pi t}{T}$. Функция $F(t)$ — четная периодическая (с периодом T) и нечетная относительно $t = \frac{T}{4}$. Имеет ли нелинейное уравнение колебаний решение $u(t)$ ($u(t)$ — угловое отклонение маятника от положения равновесия) с такими же свойствами? Если на промежутке $(0, \frac{T}{4})$ существует решение $u(t)$, удовлетворяющее граничным условиям

$u'(0) = u\left(\frac{T}{4}\right) = 0$, то посредством четного продолжения на промежутке $\left(-\frac{T}{4}, \frac{T}{4}\right)$, нечетного — на промежутке $\left(-\frac{T}{4}, \frac{3T}{4}\right)$ и периодического продолжения (с периодом T) на ось t получается решение с требуемыми свойствами. С другой стороны, если решение $u(t)$ обладает указанными свойствами, то оно удовлетворяет граничным условиям. Таким образом, для нелинейного уравнения колебаний ставится краевая задача

$$\begin{aligned} u''(t) + \frac{g}{l} \sin u(t) &= \frac{F_0}{ml} \sin \frac{2\pi t}{T}, \quad 0 < t < \frac{T}{4}, \\ u'(t) &= u\left(\frac{T}{4}\right) = 0. \end{aligned}$$

Показать, что эта задача сводится (с помощью метода из примера 4.1) к нелинейному интегральному уравнению (уравнению Гаммерштейна)

$$v(t) = \int_0^{\frac{T}{4}} G(t, \tau) \sin[v(\tau) - h(\tau)] d\tau,$$

где

$$\begin{aligned} v(t) &= u(t) + h(t), \quad h(t) = \frac{F_0 T^2}{4\pi^2 ml} \cos \frac{2\pi t}{T}, \\ G(t, \tau) &= \begin{cases} \frac{T}{4} - \tau, & 0 \leq t \leq \tau, \\ \frac{T}{4} - t, & \tau \leq t \leq \frac{T}{4}. \end{cases} \end{aligned}$$

4.20. Решить предыдущую задачу, если на маятник действует сила $F_0 \sin \frac{2\pi t}{T}$.

4.21. В однородном полупространстве ($x > 0$) диффундируют частицы двух сортов; коэффициенты диффузии D_1 и D_2 , начальные концентрации $u_1(x, 0) = u_{10}$ и $u_2(x, 0) = u_{20}$ — константы, плотность потока через границу $x = 0$ частиц каждого сорта пропорциональна произведению их концентраций на границе (коэффициенты пропорциональности α_1 и α_2 известны). Показать, что концентрация на границе

$$u_i(0, t) = \frac{u_{i0}}{2\gamma_i} (v(t) - \gamma_1 - \gamma_2), \quad \gamma_i = \frac{u_{i0}\alpha_{3-i}}{2\sqrt{\pi D_{3-i}}}, \quad i = 1, 2,$$

где $v(t)$ — решение нелинейного интегрального уравнения

$$v(t) = \int_0^t \frac{v^2(\tau) d\tau}{\sqrt{t-\tau}} - 2(\gamma_1 - \gamma_2)^2 \sqrt{t} + \gamma_1 + \gamma_2.$$

4.22. Задача о таутохроне. Точечная масса M движется в плоскости (x, y) под действием силы тяжести ($\mathbf{e}_g = -\mathbf{e}_y$) без начальной скорости из точки $A(\xi, \eta)$; $\xi > 0$ до точки $B(\xi_0, 0)$, $\xi_0 > \xi$. Траектория точки M выбрана так, что время t движения из A в B есть заданная функция ординаты η : $t = f(\eta)$.

Показать, что траектория определяется уравнением

$$x = \int_0^y \sqrt{\phi^2(z) + 1} dz,$$

где $\phi(z)$ — решение интегрального уравнения Абеля

$$\int_0^\eta \frac{\phi(\eta) d\eta}{\sqrt{\eta-y}} = -\sqrt{2g} f(y).$$

4.23. Показать, что задача Коши

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = f(x), \quad x < 0, \\ y(0) = y'(0) = \dots = y^{(n-1)}(0) = 0$$

эквивалентна интегральному уравнению

$$u(x) = \int_0^x K(x, \xi)u(\xi) d\xi + f(x),$$

где

$$u(x) = y^{(n)}(x), \quad K(x, \xi) = - \sum_{m=1}^n a_m(x) \frac{(x-\xi)^{m-1}}{(m-1)!}.$$

4.24. Функция $u(x) \in C^n$ ($x \geq 0$). Показать, что производная $u^n(x) = v(x)$ удовлетворяет интегральному уравнению

$$\int_0^x \frac{(x-\xi)^{n-1} v(\xi) d\xi}{(n-1)!} = u(x).$$

4.2. Решение интегральных уравнений

Пример 4.2. В уравнении Вольтерра первого рода

$$\int_a^x K(x, y)u(y)dy = f(x)$$

ядро $K(x, y)$ и правая часть $f(x)$ — заданные достаточно гладкие функции. Из уравнения следует: если

$$K(a, a) = K'_x(a, a) = \dots = K_x^{(n-1)}(a, a) = 0, \quad 0 < K_x^{(n)}(a, a) < \infty,$$

то $f(a) = f'(a) = \dots = f^{(n)}(a) = 0$; если

$$K(a, a) = K'_x(a, a) = \dots = K_x^{(n-1)}(a, a) = 0, \quad K_x^{(n)}(a, a) = \infty,$$

то $f(a) = f'(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$. Если ядро имеет интегрируемую степенную или логарифмическую особенность при $x = y$, то $f(x)$ — непрерывная функция.

Один из методов решения уравнения данного типа — дифференцирование уравнения (точнее, тождества, полученного подстановкой в уравнение решения $u(x)$). Решение уравнения

$$\int_a^x (x^2 y - xy^2)u(y)dy = f(x), \quad f(a) = f'(a) = 0,$$

достигается делением обеих частей на x , т. е.

$$\int_a^x (xy - y^2)u(y)dy = \frac{f(x)}{x},$$

с последующим двукратным дифференцированием:

$$\int_a^x yudy = \frac{d}{dx} \left(\frac{f(x)}{x} \right), \quad xu(x) = \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{f(x)}{x} \right).$$

Решение: $u(x) = \frac{1}{x} \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{f(x)}{x} \right)$.

Решить методом дифференцирования интегральные уравнения 4.25–4.70.

4.25. $\int_0^x (x^2 - y^2)u(y)dy = A \operatorname{erf}(x^2).$

$$4.26. \int_a^x (x^\alpha - y^\alpha) u(y) dy = f(x), \quad f(a) = f'(a) = 0.$$

$$4.27. \int_a^x (x - y)^n u(y) dy = f(x), \quad f(a) = f'(a) = \dots = f^{(n)}(a) = 0.$$

$$4.28. \int_a^x (x^{n+1} y^n - x^n y^{n+1}) u(y) dy = f(x), \quad f(a) = f'(a) = 0, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

$$4.29. \int_a^x (e^{\alpha(x-y)} - 1) u(y) dy = f(x), \quad f(a) = f'(a) = 0.$$

$$4.30. \int_a^x (e^{\alpha x + \beta y} - e^{\alpha y + \beta x}) u(y) dy = f(x), \quad f(a) = f'(a) = 0.$$

$$4.31. \int_a^x (e^{\alpha x} - e^{\alpha y})^n u(y) dy = f(x), \quad f(a) = \dots = f^{(n)}(a) = 0.$$

$$4.32. \int_a^x e^{\alpha(x^\beta - y^\beta)} u(y) dy = f(x), \quad f(a) = 0.$$

$$4.33. \int_a^x (\alpha \sin \beta(x - y) - \beta \sin \alpha(x - y)) u(y) dy = f(x), \\ f(a) = f'(a) = f''(a) = f'''(a) = 0.$$

$$4.34. \int_a^x (\operatorname{ch} \alpha x - \operatorname{ch} \alpha y)^n u(y) dy = f(x), \quad f(a) = \dots = f^{(n)}(a) = 0.$$

$$4.35. \int_a^x (\arccos \alpha x - \arccos \alpha y)^n u(y) dy = f(x), \\ f(a) = \dots = f^{(n)}(a) = 0.$$

$$4.36. \int_a^x (\alpha \operatorname{sh} \beta(x - y) - \beta \operatorname{sh} \alpha(x - y)) u(y) dy = f(x), \\ f(a) = f'(a) = 0.$$

$$4.37. \int_a^x (\operatorname{sh} \alpha(x - y) \operatorname{sh} \alpha(x + y)) u(y) dy = f(x), \\ f(a) = f'(a) = 0.$$

$$4.38. \int_a^x (\operatorname{sh}^\alpha x - \operatorname{sh}^\alpha y) u(y) dy = f(x), \quad f(a) = f'(a) = 0.$$

$$4.39. \int_a^x \left(\ln \frac{x}{y} \right)^n u(y) dy = f(x), \quad f(a) = \dots = f^{(n)}(a) = 0, \quad n \in \mathbb{N}.$$

$$4.40. \int_a^x (\ln^2 x - \ln^2 y)^n u(y) dy = f(x), \quad f(a) = \dots = f^{(n)}(a) = 0, \quad n \in \mathbb{N}.$$

$$4.41. \int_a^x \ln \frac{x+b}{y+b} u(y) dy = f(x), \quad f(a) = 0.$$

$$4.42. \int_a^x (\ln^\alpha kx - \ln^\alpha ky) u(y) dy = A \left(x^{\frac{\alpha}{2}} - a^{\frac{\alpha}{2}} \right)^2.$$

$$4.43. \int_a^x (\operatorname{ctg} \alpha x - \operatorname{ctg} \alpha y)^n u(y) dy = f(x), \\ f(a) = f'(a) = \dots = f^{(n)}(a) = 0, \quad n \in \mathbb{N}.$$

$$4.44. \int_a^x (Y_0(kx) - Y_0(ky)) u(y) dy = A(x-a)^2.$$

$$4.45. \int_a^x (J_\nu(\alpha x) - J_\nu(\alpha y)) u(y) dy = f(x), \quad f(a) = f'(a) = 0.$$

$$4.46. \int_a^x (K_\nu(\alpha x) - K_\nu(\alpha y)) u(y) dy = f(x), \quad f(a) = f'(a) = 0.$$

$$4.47. \int_1^x (x+y-1) u(y) dy = A(x^2-1).$$

$$4.48. \int_a^x (3x^2 + y^2) u(y) dy = A(\sqrt{x} - \sqrt{a}).$$

$$4.49. \int_a^x (x^3 + 2y^3) u(y) dy = A(x^4 - a^4).$$

$$4.50. \int_a^x (2x^2 y + xy^2) u(y) dy = A \ln \frac{x}{a}.$$

$$4.51. \int_a^x (\sqrt{x} + \sqrt{y}) u(y) dy = A(\sqrt{x} - \sqrt{a}).$$

$$4.52. \int_a^x \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{2}{\sqrt{y}} \right) u(y) dy = A \left(\frac{1}{\sqrt[4]{x}} - \frac{1}{\sqrt[4]{a}} \right).$$

$$4.53. \int_a^x \left(\frac{1}{x^2 \sqrt{y}} + \frac{4}{y^2 \sqrt{y}} \right) u(y) dy = A(e^{x^2} - e^{a^2}).$$

$$4.54. \int_a^x (A(x-y) + B) u(y) dy = C(x-a)^2.$$

$$4.55. \int_a^x (Ax^2 + (B - A)xy - By^2)u(y)dy = Cx(x - a)^2.$$

$$4.56. \int_a^x (Ax^3 + By^3)u(y)dy = f(x), f(a) = 0.$$

$$4.57. \int_a^x e^{\alpha(x-y)}u(y)dy = A(x^2 - a^2).$$

$$4.58. \int_a^x e^{\alpha x + \beta y}u(y)dy = A(\sqrt{x} - \sqrt{a}).$$

$$4.59. \int_a^x (e^{3x} + 2e^{2y})u(y)dy = A(x^2 - a^2).$$

$$4.60. \int_a^x (e^{x-y} + e^{2(x-y)})u(y)dy = A(x - a)^2.$$

$$4.61. \int_0^x (x + y)e^{\alpha(x-y)}u(y)dy = Ax.$$

$$4.62. \int_0^x (e^{x-y} + e^{2x-2y} - 2e^{3x-3y})u(y)dy = Ax^2.$$

$$4.63. \int_a^x (e^{2x+3y} - 2e^{3x+2y})u(y)dy = A(e^x - e^a).$$

$$4.64. \int_a^x (Ae^{\alpha x^2} + Be^{\alpha y^2})u(y)dy = C(x^2 - a^2).$$

$$4.65. \int_a^x (Ae^{\alpha x + \beta y} + Be^{\beta x + \alpha y})u(y)dy = f(x), f(a) = 0.$$

$$4.66. \int_a^x (A \ln x + B \ln y)u(y)dy = C \ln \frac{x}{a}.$$

$$4.67. \int_a^x (A \ln^2 \alpha x + B \ln^2 \alpha y)u(y)dy = f(x), f(a) = 0.$$

$$4.68. \int_a^x \cos^2 \alpha(x - y)u(y)dy = f(x), f(a) = 0;$$

рассмотреть случай $f(x) = A(x^2 - a^2)$.

$$4.69. \int_a^x \operatorname{ch}(\alpha x + \beta y)u(y)dy = A(x - a).$$

$$4.70. \int_a^x (AJ_\nu^2(\alpha x) + BJ_\nu^2(\alpha y))u(y)dy = f(x), f(a) = 0.$$

Пример 4.3. Уравнение Вольтерра второго рода

$$u(x) = \mu \int_a^x (x-y)u(y)dy + A \sin kx$$

посредством двукратного дифференцирования сводится к эквивалентной задаче Коши

$$\begin{cases} u'' - \mu u = -Ak^2 \sin kx, \\ u(a) = A \sin ka, \\ u'(a) = Ak \cos ka. \end{cases}$$

Если $\mu = \alpha^2 > 0$ то общее решение неоднородного уравнения

$$u(x) = C_1 \operatorname{ch} \alpha(x-a) + C_2 \operatorname{sh} \alpha(x-a) + M \sin kx.$$

Константа M в частном решении определяется его подстановкой в дифференциальное уравнение, а постоянные C_1 и C_2 удовлетворяют системе алгебраических уравнений, реализующих начальные условия в задаче Коши:

$$M = \frac{Ak^2}{k^2 + \alpha^2}, \quad \begin{cases} C_1 + MC_2 \sin ka = A \sin ka, \\ C_1 \alpha + Mk \cos ka = Ak \cos ka. \end{cases}$$

В результате решение интегрального уравнения

$$u(x) = \frac{A}{k^2 + \alpha^2} [\alpha^2 \sin ka \operatorname{ch} \alpha(x-a) + \alpha k \cos ka \operatorname{sh} \alpha(x-a) + k^2 \sin kx];$$

если $-\mu = \alpha^2 > 0$, $\alpha^2 \neq k^2$, то построение решения проводится аналогично:

$$u(x) = \frac{A}{\alpha^2 - k^2} [\alpha^2 \sin ka \cos \alpha(x-a) + \alpha k \cos ka \sin \alpha(x-a) - k^2 \sin kx];$$

если $-\mu = k^2$, то

$$u(x) = \frac{A}{2} (\sin ka \cos k(x-a) + k(x-a) \cos kx + \sin kx).$$

Решить интегральные уравнения 4.71–4.107 посредством сведения их к эквивалентной задаче Коши.

4.71. $u(x) = \mu \int_a^x u(y)dy + f(x).$

4.72. $u(x) = \mu \int_a^x xu(y)dy + Ax.$

$$4.73. \quad u(x) = \int_0^x xu(y) dy + x^2 \cos x.$$

$$4.74. \quad u(x) = \mu \int_a^x (x-y)^2 u(y) dy + A.$$

$$4.75. \quad u(x) = 4 \int_0^x (x-y)^2 u(y) dy + 5 \sin x.$$

$$4.76. \quad u(x) = \mu \int_a^x x^3 u(y) dy + Ax^3.$$

$$4.77. \quad u(x) = \mu \int_a^x y^3 u(y) dy + Ax^4.$$

$$4.78. \quad u(x) = \int_0^x \left(y - \frac{x^2 + x + 2}{x+1} \right) u(y) dy + 1.$$

$$4.79. \quad u(x) = \int_0^x \left(y - \frac{x^2 + x + 1}{x+1} \right) u(y) dy - 1.$$

$$4.80. \quad u(x) = \mu \int_x^\infty e^{x-y} u(y) dy + Ae^{\beta x}.$$

$$4.81. \quad u(x) = 2 \int_a^x (5e^{x-y} - 9e^{2(x-y)}) u(y) dy + A.$$

$$4.82. \quad u(x) = \mu \int_a^x (1 - e^{\alpha(x-y)}) u(y) dy + A.$$

$$4.83. \quad u(x) = \mu \int_a^x e^{\alpha(x-y)} u(y) dy + A.$$

$$4.84. \quad u(x) = \mu \int_a^x \cos(\alpha y) u(y) dy + A.$$

$$4.85. \quad u(x) = \mu \int_a^x \sin(\alpha y) u(y) dy + A.$$

$$4.86. \quad u(x) = \mu \int_a^x \cos \alpha(x-y) u(y) dy + A.$$

$$4.87. \quad u(x) = \mu \int_a^x \operatorname{ch} \alpha(x-y) u(y) dy + A.$$

$$4.88. \quad u(x) = \mu \int_a^x \frac{\operatorname{sh} \alpha y}{\operatorname{sh} \alpha x} u(y) dy + A.$$

$$4.89. u(x) = \mu \int_0^x \frac{k(x)}{k(y)} u(y) dy + f(x).$$

Рассмотреть случаи: 1) $f(x) = J_1(x)$, $k(x) = e^{-x}$, $\mu = 1$;

2) $f(x) = \sin x$, $k(x) = e^x$;

3) $f(x) = x$, $k(x) = e^{x^2}$.

$$4.90. u(x) = \mu \int_a^x (x^2 - y^2) u(y) dy + A.$$

$$4.91. u(x) = \mu \int_a^x (x^2 - xy) u(y) dy + f(x);$$

рассмотреть частный случай $f(x) = Ax$.

$$4.92. u(x) = \mu \int_a^x (xy - y^2) u(y) dy + A.$$

$$4.93. u(x) = \mu \int_a^x (x - y) y^\alpha u(y) dy + f(x);$$

рассмотреть частный случай $f(x) = Ax$.

$$4.94. u(x) = \mu \int_a^x (x^\alpha - y^\alpha) u(y) dy + f(x);$$

рассмотреть частный случай $f(x) = Ax$.

$$4.95. u(x) = \mu \int_a^x (e^{\alpha x} - e^{\alpha y}) u(y) dy + A.$$

$$4.96. u(x) = \mu \int_a^x (x - y) e^{\alpha y} u(y) dy + f(x);$$

рассмотреть частный случай $f(x) = Ax$.

$$4.97. u(x) = \mu \int_a^x \ln \frac{x}{y} u(y) dy + A.$$

$$4.98. u(x) = \mu \int_a^x e^{\beta(x-y)} (\ln x - \ln y) u(y) dy + f(x).$$

$$4.99. u(x) = \mu \int_a^x \operatorname{sh} \alpha(x - y) y u(y) dy + f(x).$$

$$4.100. u(x) = \mu \int_a^x x \operatorname{sh} \alpha(x - y) u(y) dy + f(x).$$

$$4.101. u(x) = \mu \int_a^x \sin \alpha(x - y) y u(y) dy + f(x).$$

$$4.102. \quad u(x) = \mu \int_a^x x \sin \alpha(x-y) u(y) dy + f(x).$$

$$4.103. \quad u(x) = \mu \int_a^x e^{\beta(x-y)} \sin \alpha(x-y) y u(y) dy + f(x).$$

$$4.104. \quad u(x) = \mu \int_a^x x e^{\beta(x-y)} \sin \alpha(x-y) u(y) dy + f(x).$$

$$4.105. \quad u(x) = \mu \int_a^x (x+y+2) u(y) dy + A.$$

$$4.106. \quad u(x) = \mu \int_a^x (3x^2 - 3y^2 + x + y - 1) u(y) dy + f(x).$$

$$4.107. \quad u(x) = \mu \int_a^x [Ax + B + (Cx + D)(x-y)] u(y) dy + f(x).$$

$$4.108. \quad u(x) = \int_x^\infty e^{x-y} u(y) dy + x e^{-x}.$$

$$4.109. \quad u(x) = \int_0^x \left(y - \frac{x^2 + x + 2}{x+1} \right) u(y) dy + 1.$$

$$4.110. \quad u(x) = \int_0^x \left(y - \frac{x^2 + x + 1}{x+1} \right) u(y) dy - 1.$$

Пример 4.4. Метод дифференцирования применим к некоторому классу уравнений Фредгольма первого рода. Для решения уравнения

$$\int_a^b |x-y| u(y) dy = f(x)$$

следует раскрыть модуль

$$\int_a^x (x-y) u(y) dy + \int_x^b (y-x) u(y) dy = f(x)$$

и выполнить двукратное дифференцирование

$$\int_a^x u(y) dy - \int_x^b u(y) dy = f'(x) \text{ (1-й раз), } 2u(x) = f''(x) \text{ (2-й раз).}$$

Следовательно, $u(x) = \frac{1}{2}f''(x)$ — решение уравнения. Для разрешимости уравнения функция $f(x)$ должна удовлетворять определенным граничным условиям. Действительно, при $x = a$ и $x = b$ из уравнения следуют равенства

$$\int_a^b yu(y)dy - a \int_a^b u(y)dy = f(a), \quad b \int_a^b u(y)dy - \int_a^b yu(y)dy = f(b).$$

Подстановка решения $u(x) = \frac{1}{2}f''(x)$ в эти равенства и интегрирование по частям приводят к соотношениям

$$(b-a)f'(b) = f(a) + f(b), \quad (a-b)f'(a) = f(a) - f(b),$$

откуда

$$f'(a) + f'(b) = 0, \quad f(a) + f(b) = (a-b)f'(a).$$

Правая часть $f(x)$ представима в виде

$$f(x) = F(x) + Ax + B,$$

где

$$A = -\frac{1}{2}(F'(a) + F'(b)), \quad B = \frac{1}{2}[aF'(a) + bF'(b) - F(a) - F(b)],$$

а $F(x)$ — произвольная дважды дифференцируемая функция, ограниченная вместе с первой производной (ограниченность следует из уравнения).

Решить методом дифференцирования интегральные уравнения 4.111–4.147.

$$4.111. \int_0^a |kx - y|u(y) dy = f(x), \quad k > 0.$$

$$4.112. \int_0^a |x - ky|u(y) dy = f(x), \quad k > 0.$$

$$4.113. \int_a^b |x^2 - y^2|u(y) dy = f(x).$$

$$4.114. \int_0^a |x^\alpha - y^\alpha|u(y) dy = f(x).$$

$$4.115. \int_a^b |e^{\alpha x} - e^{\alpha y}|u(y) dy = f(x), \quad \alpha > 0.$$

$$\mathbf{4.116.} \quad \int_a^b e^{\alpha x} |x - y| u(y) dy = f(x).$$

$$\mathbf{4.117.} \quad \int_a^b |e^{\alpha x^2} - e^{\alpha y^2}| u(y) dy = f(x), \quad \alpha > 0.$$

$$\mathbf{4.118.} \quad \int_a^b |\operatorname{sh} \alpha x - \operatorname{sh} \alpha y| u(y) dy = f(x), \quad \alpha > 0.$$

$$\mathbf{4.119.} \quad \int_a^b |\operatorname{ch} \alpha x - \operatorname{ch} \alpha y| u(y) dy = f(x), \quad \alpha > 0.$$

$$\mathbf{4.120.} \quad \int_0^a |\operatorname{th}^\alpha x - \operatorname{th}^\alpha y| u(y) dy = f(x), \quad 0 < \alpha.$$

$$\mathbf{4.121.} \quad \int_a^b |\cos \alpha x - \cos \alpha y| u(y) dy = f(x), \quad \alpha > 0.$$

$$\mathbf{4.122.} \quad \int_a^b |\sin \alpha x - \sin \alpha y| u(y) dy = f(x), \quad \alpha > 0.$$

$$\mathbf{4.123.} \quad \int_0^a |\operatorname{ctg}^\alpha x - \operatorname{cth}^\alpha y| u(y) dy = f(x), \quad 0 < \alpha.$$

$$\mathbf{4.124.} \quad \int_0^a |\sqrt{x} - k\sqrt{y}| u(y) dy = f(x), \quad k > 0.$$

$$\mathbf{4.125.} \quad \int_0^a |\sqrt{x} - y| u(y) dy = f(x), \quad \alpha > 0.$$

$$\mathbf{4.126.} \quad \int_0^a |x - \sqrt{y}| u(y) dy = f(x), \quad \alpha > 0.$$

$$\mathbf{4.127.} \quad \int_0^a |ke^{\alpha x} - k - y| u(y) dy = f(x), \quad \alpha > 0, \quad k > 0.$$

$$\mathbf{4.128.} \quad \int_a^b \left| \ln \frac{x}{y} \right| u(y) dy = f(x).$$

$$\mathbf{4.129.} \quad \int_a^b \left| \ln \frac{1 + kx}{1 + ky} \right| u(y) dy = f(x).$$

$$\mathbf{4.130.} \quad \int_0^a |x - k \sin \alpha y| u(y) dy = f(x), \quad k > 0, \quad \alpha > 0.$$

$$4.131. \int_0^a |x - k \operatorname{tg} \alpha y| u(y) dy = f(x), \quad k > 0, \alpha > 0.$$

$$4.132. \int_0^a |x - k \operatorname{sh} \alpha y| u(y) dy = f(x), \quad k > 0, \alpha > 0.$$

$$4.133. \int_0^a |x - k \ln(1 + \alpha y)| u(y) dy = f(x), \quad k > 0, \alpha > 0, a > 0.$$

$$4.134. \int_0^a |k \operatorname{sh} \alpha x - y| u(y) dy = f(x), \quad \alpha > 0, k > 0, a > 0.$$

$$4.135. \int_0^a |k \operatorname{tg} \alpha x - y| u(y) dy = f(x), \quad \alpha > 0, k > 0, a > 0.$$

$$4.136. \int_0^a |k \ln(1 + \alpha x) - y| u(y) dy = f(x), \quad \alpha > 0, k > 0, a > 0.$$

$$4.137. \int_0^a |k \arcsin \alpha x - y| u(y) dy = f(x), \quad \alpha > 0, k > 0, \alpha a < 1.$$

$$4.138. \int_a^b |I_0(kx) - I_0(ky)| u(y) dy = f(x).$$

$$4.139. \int_a^b |K_0(kx) - K_0(ky)| u(y) dy = f(x), \quad k > 0.$$

$$4.140. \int_0^a |\operatorname{sh} \alpha x - \operatorname{sh} \alpha y| u(y) dy = f(x), \quad \alpha > 0, a > 0.$$

$$4.141. \int_0^a |e^{\alpha x} - e^{\alpha y}| u(y) dy = f(x), \quad \alpha > 0.$$

$$4.142. \int_0^a |kx^2 - y| u(y) dy = f(x), \quad k > 0.$$

$$4.143. \int_0^1 u(xy) dy = f(x).$$

$$4.144. \int_0^1 y^\alpha u(xy) dy = f(x).$$

$$4.145. u(x) = \int_0^1 |x - y| u(y) dy + Ax.$$

$$4.146. \quad u(x) + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin |x-y| u(y) dy = A \sin x.$$

$$4.147. \quad u(x) = \int_0^a e^{|x-y|} u(y) dy + A e^x.$$

Пример 4.5. Метод дифференцирования применим к некоторым нелинейным интегральным уравнениям. Результатом дифференцирования уравнения

$$u(x) = k \int_a^x e^{\alpha y} u^2(y) dy + A e^{\alpha x} + B$$

является дифференциальное уравнение

$$u'(x) = k e^{\alpha x} u^2(x) + A \alpha e^{\alpha x}, \quad a < x,$$

где $u(a) = e^{\alpha a} + B$ (задача Коши). Отсюда

$$\int_{u(a)}^{u(x)} \frac{du}{u^2 + \frac{\alpha A}{k}} = \frac{k}{\alpha} (e^{\alpha x} - e^{\alpha a}).$$

Если $\frac{\alpha A}{k} = p^2 > 0$, то

$$\frac{1}{p} \operatorname{arctg} \frac{u}{p} \Big|_{u(a)}^{u(x)} = \frac{k}{\alpha} (e^{\alpha x} - e^{\alpha a}),$$

следовательно,

$$u(x) = p \operatorname{tg} \left[\frac{pa}{\alpha} (e^{\alpha x} - e^{\alpha a}) + \operatorname{arctg} \frac{u(a)}{p} \right];$$

если $-\frac{\alpha A}{k} = p^2 > 0$, то

$$\ln \left| \frac{u-p}{u+p} \right| \Big|_{u(a)}^{u(x)} = \frac{2pk}{\alpha} (e^{\alpha x} - e^{\alpha a}),$$

откуда

$$u(x) = p \frac{u(a) - p \operatorname{th} \varphi}{p - u(a) \operatorname{th} \varphi}, \quad \varphi = \frac{pk}{\alpha} (e^{\alpha x} - e^{\alpha a}),$$

или

$$u(x) = p \frac{p(a) - u(a) \operatorname{th} \varphi}{u(a) - p \operatorname{th} \varphi};$$

если $A = 0$, то

$$u(x) = \frac{\alpha u(a)}{\alpha - ku(a)(e^{\alpha x} - e^{\alpha a})};$$

если $\alpha = 0$, то

$$u(x) = \frac{A + B}{1 - k(A + B)(x - a)}.$$

Применяя метод дифференцирования, решить интегральные уравнения 4.148–4.181.

$$4.148. \quad u(x) = \int_a^x K(y)u(x)u(y) dy + f(x).$$

$$4.149. \quad u(x) = \int_a^x f(x)g(y)u^\alpha(y) dy.$$

$$4.150. \quad u(x) + \int_a^x f(y)u^\alpha(y) dy = A, \quad 0 < \alpha < 1.$$

$$4.151. \quad u(x) + k \int_a^x e^{\alpha u(y)} dy = Ax + B.$$

$$4.152. \quad u(x) = \int_a^x f(y) \operatorname{ch}(\alpha u(y)) dy + A.$$

$$4.153. \quad u(x) = k \int_a^x \operatorname{ctg} \alpha y \cdot e^{\beta u(y)} dy + A \ln |\sin \alpha x| + B.$$

$$4.154. \quad u(x) = k \int_a^x \operatorname{sh} \alpha y \operatorname{sh}(\beta u(y)) dy + A.$$

$$4.155. \quad u(x) = k \int_a^x \sin(\alpha u(y)) dy + A.$$

$$4.156. \quad u(x) = k \int_a^x \sin \alpha y \cos(\beta u(y)) dy + A.$$

$$4.157. \quad u(x) = k \int_a^x \sin \alpha y u^2(y) dy + A \cos \alpha x + B.$$

$$4.158. \quad u(x) = k \int_a^x \operatorname{ch} \alpha y u^2(y) dy + A \operatorname{sh} \alpha x.$$

$$4.159. \quad u(x) = k \int_a^x e^{\alpha(x-y)} u^2(y) dy + A.$$

$$4.160. u(x) = k \int_a^x e^{\alpha(x-y)} u^2(y) dy + Ae^{\alpha x} + B.$$

$$4.161. u(x) = k \int_a^x \operatorname{sh} \alpha y \operatorname{ch}(\beta u(y)) dy + A.$$

$$4.162. u(x) = k \int_a^x \ln(\alpha u(y)) dy + A.$$

$$4.163. u(x) = k \int_a^x y^\alpha u^\beta(y) dy + Ax^{\alpha+1} + B.$$

$$4.164. u^2(x) + A \int_a^x u(y) dy = Bx + C.$$

$$4.165. u(x) = k \int_a^x y^\alpha e^{\beta u(y)} dy + Bx^{\alpha+1} + C.$$

$$4.166. u(x) = k \int_a^x e^{\alpha y + \beta u(y)} dy + Ae^{\alpha x} + B.$$

$$4.167. u(x) = \int_a^x y^3 u^3 dy + 2x^4.$$

$$4.168. u(x) = k \int_a^x \operatorname{th}(\beta u(y)) dy + Ax + B.$$

$$4.169. u(x) = k \int_a^x \cos \alpha(x-y) \operatorname{tg}(\beta u(y)) dy + A \sin \alpha x.$$

$$4.170. u(x) = k \int_a^x \operatorname{th}(\beta u(y)) dy + Ax + B.$$

$$4.171. u(x) = k \int_a^x \cos \alpha(x-y) \operatorname{tg}(\beta u(y)) dy + A \sin \alpha x.$$

$$4.172. u(x) = k \int_a^x (x-y) e^{\alpha u(y)} dy + Ax^2 + Bx + C.$$

$$4.173. u(x) = k \int_a^x (x-y) \ln u(y) dy + Ax^2 + Bx + C.$$

$$4.174. u(x) = k \int_a^x (x-y) u^2(y) dy + Ax^2 + Bx + C.$$

$$4.175. u(x) = k \int_a^x \operatorname{sh} \alpha(x-y) u^2(y) dy + Ae^{\alpha x} + Be^{-\alpha x} + C.$$

$$4.176. \quad u(x) = k \int_a^x \sin \alpha(x-y) u^2(y) dy + A \sin \alpha x + B \cos \alpha x + C.$$

$$4.177. \quad u(x) = k \int_a^x |x-y| u^2(y) dy + Ax + B.$$

$$4.178. \quad u(x) = k \int_a^x |x-y| \ln \alpha u(y) dy + Ax + B.$$

$$4.179. \quad u(x) = k \int_a^x e^{\alpha|x-y|} u^2(y) dy + Ae^{\alpha x}.$$

$$4.180. \quad u(x) = k \int_0^\pi \sin |x-y| e^{\alpha u(y)} dy + A \sin x.$$

$$4.181. \quad u(x) = k \int_0^\pi \operatorname{sh} \alpha |x-y| \operatorname{ch}(\beta u(y)) dy + A \operatorname{sh} \alpha x.$$

Пример 4.6. Какое-либо решение (их может быть несколько) интегрального уравнения называется точным. Иногда вид возможного решения определяется конструкцией самого уравнения.

Решить уравнение

$$\int_0^x \frac{u(y) dy}{x+y} = f(x)$$

где функция $f(x)$ равна: 1) Ax^n , $n \in \mathbb{N}_0$; 2) $A \ln^n x$, $n \in \mathbb{N}$.

Решение 1). Посредством замены $y = \xi x$ получается уравнение

$$\int_0^1 \frac{u(\xi x) d\xi}{1+\xi} = Ax^n,$$

структура которого подсказывает форму решения $u(x) = Bx^n$. Постоянный множитель B можно определить методом неопределенных коэффициентов: подстановка решения в уравнение превращает его в тождество

$$\int_0^1 \frac{B\xi^n x^n d\xi}{1+\xi} = Ax^n, \quad \text{откуда} \quad \frac{A}{B} = \int_0^1 \frac{\xi^n d\xi}{1+\xi}$$

На основании формулы суммы членов геометрической прогрессии

$$\sum_{k=0}^{n-1} (-x)^k = \frac{1 - (-x)^n}{1 - (-x)}, \quad n \geq 1,$$

подынтегральная функция преобразуется к виду

$$\begin{aligned} \frac{\xi^n}{1 + \xi} &= \frac{(-1)^{n+1} (xi)^n}{1 - (-\xi)} = (-1)^{n+1} \frac{1 - (-\xi)^n - 1}{1 - (-\xi)} = \\ &= (-1)^{n+1} \left[\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \xi^k - \frac{1}{1 + \xi} \right]. \end{aligned}$$

Следовательно, интеграл

$$\begin{aligned} I(n) &= \int_0^1 \frac{\xi^n d\xi}{1 + \xi} = \\ &= (-1)^{n+1} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{k+1} - \ln 2 \right) = (-1)^n \left(\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k} + \ln 2 \right). \end{aligned}$$

Итак, решение: $u(x) = \frac{A}{I(n)} x^n$.

Решение 2). Пусть линейные операторы $\mathcal{M}$ и $\mathcal{L}$ коммутируют, причем $\mathcal{L}$ действует только на переменную x функции $f(x, \lambda)$, а $\mathcal{M}$ — только на переменную λ этой функции. Если применить оператор $\mathcal{M}$ к обеим частям уравнения $\mathcal{L}v = h(x, \lambda)$, то оно преобразуется в $\mathcal{L}\mathcal{M}v = \mathcal{M}h$, или $\mathcal{L}u = f$, где $u = \mathcal{M}v$, $f = \mathcal{M}h$. Таким образом, если $v(x)$ — решение уравнения $\mathcal{L}v = h$, то $u = \mathcal{M}v$ — решение уравнения $\mathcal{L}u = f$ с тем же оператором $\mathcal{L}$, но с другой правой частью.

Для решения 2) следует исходить из уравнения

$$\int_0^x \frac{v(y) dy}{x + y} = ax^\lambda.$$

После замены $y = \xi x$ получается уравнение

$$\int_0^1 \frac{v(\xi x) d\xi}{1 + \xi} = Ax^\lambda,$$

решение которого имеет вид $v(x) = Bx^\lambda$. Как и в предыдущем случае,

$$v(x) = \frac{A}{I(\lambda)} x^\lambda, \quad I(\lambda) = \int_0^1 \frac{\xi^\lambda d\xi}{1+\xi}.$$

Результат достигается применением оператора $\mathcal{M} = \frac{d^n}{d\lambda^n}$:

$$u(x) = A \frac{d^n}{d\lambda^n} \left(\frac{x^\lambda}{I(\lambda)} \right) \Big|_{\lambda=0}.$$

Найти точные решения уравнений 4.182–4.224.

4.182. $\int_0^x \frac{u(y)dy}{x+y} = f(x)$, где функция $f(x)$ равна:

1) $Ax^{n+\lambda}$, $n \in \mathbb{N}_0$, $\lambda = \frac{1}{2}$ (а), $\lambda = \frac{1}{3}$ (б), $\lambda = \frac{1}{4}$ (в); 2) $Ax^n \ln x$, $n \in \mathbb{N}$; 3) $A \cos(\ln x)$.

4.183. $\int_0^x \frac{u(y)dy}{\sqrt{x^2-y^2}} = f(x)$, где функция $f(x)$ равна:

1) Ax^α , $\alpha > -1$; 2) $A \ln x$.

4.184. $\int_0^x \frac{u(y)dy}{\sqrt{x^2+y^2}} = f(x)$, где функция $f(x)$ равна:

1) Ax^α , $\alpha > -1$; 2) $A \ln^n x$, $n \in \mathbb{N}$.

4.185. $\int_{-x}^x \sqrt{\frac{x-y}{x+y}} u(y)dy = Ax^n$, $n \in \mathbb{N}$.

4.186. $\int_0^x \frac{u(y)dy}{x^2+y^2} = Ax^n$, $n \in \mathbb{N}$.

4.187. $\int_0^x \frac{u(y)dy}{ax^m + by^m} = f(x)$, $m \in \mathbb{N}$, $a > 0$, $a+b > 0$, где функция $f(x)$ равна: 1) Ax^α , $\alpha > -1$; 2) $Ax^\alpha \ln x$, $\alpha > -1$.

4.188. $\int_0^x \frac{u(y)dy}{(ax^\alpha + by^\alpha)^\beta} = f(x)$, $\alpha\beta > 1$, $a > 0$, $a+b > 0$, где функция $f(x)$ равна: 1) Ax^γ , $\gamma \geq 0$; 2) $Ax^\gamma \ln x$, $\gamma \geq 0$; 3) $A \ln^n x$, $n \in \mathbb{N}$.

4.189. $u(x) = k \int_0^x K\left(\frac{y}{x}\right) u(y) dy = f(x)$, где $f(x)$ равна: 1) Ax^α ; 2) $Ax^\alpha \ln x$.

4.190. $u(x) = k \int_0^x K(x-y)u(y) dy = f(x)$, где функция $f(x)$ равна: 1) Ax^n , $n = 0, 1, 2$; 2) $Ae^{\lambda x}$; 3) Ax^n , $n = 2, 3, \dots$.

4.191. $k \int_{-\infty}^x e^{-\alpha(x-y)}u(y) dy = f(x)$, $\alpha > 0$, где функция $f(x)$ равна: 1) $Ae^{\beta x}$; 2) $A \sin \beta x$; 3) $A \operatorname{ch} \beta x$; 4) $Ae^{\beta x} \cos \gamma x$; 5) $Ax^n Ae^{\beta x}$, $n \in \mathbb{N}$; 6) $Ax^n \sin \beta x$, $n \in \mathbb{N}$; 7) $Ax^n \operatorname{ch} \beta x$, $n \in \mathbb{N}$.

4.192. $k \int_x^\infty e^{-\alpha(y-x)}u(y) dy = f(x)$, $\alpha > 0$, где функция $f(x)$ равна: 1) $Ae^{\beta x}$; 2) $A \cos \beta x$; 3) $A \operatorname{sh} \beta x$; 4) Ax^n ; 5) $Ae^{\beta x} \sin \gamma x$; 6) $Ax^n \cos \beta x$; 7) $Ax^n \operatorname{sh} \beta x$; $n \in \mathbb{N}$.

4.193. $u(x) = \mu \int_x^\infty \frac{\ln(y-x)}{\sqrt{y-x}} u(y) dy + Ae^{-\alpha x}$, $\alpha > 0$.

4.194. $u(x) + \lambda \int_x^\infty (y-x)^n \ln(y-x) u(y) dy = Ae^{-\alpha x}$, $\alpha > 0$.

4.195. $u(x) + \lambda \int_x^\infty \ln^2(y-x) u(y) dy = Ae^{-\alpha x}$, $\alpha > 0$.

4.196. $k \int_{-\infty}^\infty e^{-\alpha|x-y|} u(y) dy = f(x)$, $\alpha > 0$, где функция $f(x)$ равна: 1) $Ae^{\beta x}$; 2) $A \sin \beta x$; 3) Ax^n ; 4) $Ae^{\beta x} \cos \gamma x$; 5) $A \operatorname{ch} \beta x$; 6) $Ax^n \cos \beta x$; 7) $Ax^n \operatorname{sh} \beta x$; $n \in \mathbb{N}$.

4.197. $u(x) = \mu \int_0^x \frac{u(y) dy}{x+y} + f(x)$, где: 1) $f(x) = 0$; 2) $f(x) = Ax^n$, $n = 0, 1, 2, \dots$; 3) $f(x) = Ax^n \ln x$, $n \in \mathbb{N}$.

4.198. $u(x) = \mu \int_0^x \frac{u(y) dy}{x^\alpha (x-y)^{1-\alpha}} + f(x)$, где: 1) $f(x) = 0$; 2) $f(x) = Ax^n$; 3) $f(x) = Ax^n \ln x$; $n \in \mathbb{N}_0$.

4.199. $u(x) + \lambda \int_0^x \frac{1}{x} e^{-\alpha \frac{y}{x}} u(y) dy = Ax^n$, $\lambda > 0$, $n \in \mathbb{N}_0$.

4.200. $\int_0^\pi \sin y u(xy) dy = f(x)$, где: 1) $f(x) = Ax + B$; 2) $f(x) = Ax^n$, $n \in \mathbb{N}_0$.

4.201. $\int_0^1 (1-y)^\alpha u(xy) dy = Ax^\beta$, $\alpha > -1$, $\beta > -1$.

$$\mathbf{4.202.} \int_0^1 y^\alpha u(xy) dy = f(x), \alpha > -1, \text{ где: 1) } f(x) = Ax^\beta; \text{ 2) } f(x) = A \ln x + B; \text{ 3) } f(x) = A \ln^n x, n \in \mathbb{N}.$$

$$\mathbf{4.203.} \int_0^a J_0(y) u(xy) dy = Ax, J_1(a) \neq 0.$$

$$\mathbf{4.204.} \int_0^a K_1(y) u(xy) dy = Ax^2.$$

$$\mathbf{4.205.} \int_1^e \ln y u(xy) dy = f(x), \text{ где: 1) } f(x) = Ax + B; \text{ 2) } f(x) = Ae^{\lambda x}; \text{ 3) } f(x) = A \ln^n x, n \in \mathbb{N}_0.$$

$$\mathbf{4.206.} \int_0^1 y^\alpha u(x-y) dy = Ax, \alpha > -1.$$

$$\mathbf{4.207.} \int_0^1 e^{\alpha y} u(x-y) dy = f(x), \text{ где: 1) } f(x) = Ax; \text{ 2) } f(x) = Ae^{\lambda x}; \text{ 3) } f(x) = Ax^n, n \in \mathbb{N}.$$

$$\mathbf{4.208.} \int_0^1 y^\alpha u(xe^{\beta y}) dy = f(x), \text{ где: 1) } f(x) = Ax^\gamma; \text{ 2) } f(x) = A \ln^n x, n \in \mathbb{N}.$$

$$\mathbf{4.209.} \int_0^1 u(y\varphi(x)) dy = f(x), \varphi(0) = 0, \varphi(1) = 1, \varphi'(x) \geq 0.$$

$$\mathbf{4.210.} \int_0^1 y^\alpha u(y\varphi(x)) dy = f(x), \varphi(0) = 0, \varphi(1) = 1, \varphi'(x) \geq 0.$$

$$\mathbf{4.211.} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin y u(x \cos \alpha y) dy = f(x), \text{ где: 1) } f(x) = A \ln x; \text{ 2) } f(x) = Ax^\beta, \beta \geq 0; \text{ 3) } f(x) = A \ln^n x, n \in \mathbb{N}.$$

$$\mathbf{4.212.} \int_0^1 u(x - \alpha y^2) dy = f(x), \text{ где: 1) } f(x) = Ax; \text{ 2) } f(x) = Ae^{\lambda x}; \text{ 3) } f(x) = Ax^n, n \in \mathbb{N}.$$

$$\mathbf{4.213.} \int_0^1 P_{2n-1}(y) u(xy) dy = A.$$

$$\mathbf{4.214.} \int_0^1 P_{2n}(y) u(xy) dy = Ax.$$

$$4.215. \int_{-1}^1 \frac{u(y)dy}{\sqrt{1-2xy+x^2}} = Ax^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$4.216. \int_{-1}^1 P_n(y)u(ax^\alpha - y)dy = A, \quad \alpha > 0.$$

$$4.217. \int_{-1}^1 P_n(y)u(x-y)dy = Ax.$$

$$4.218. \int_0^\infty L_n(y)u(ax-y)e^{-y}dy = A.$$

$$4.219. \int_0^\infty L_n(y)u(x+y)dy = Ae^{-x}.$$

$$4.220. \int_0^\infty L_n^1(y)u(xy)e^{-y}dy = Ax^{n+1}.$$

$$4.221. \int_0^\infty L_n(y)u(x-y)dy = Axe^x.$$

$$4.222. \int_0^\infty L_n(y)u(x+ky)dy = Ae^{-\alpha x}, \quad k\alpha > 0.$$

$$4.223. \int_{-\infty}^\infty e^{-y^2} H_n(y)u(x-y)dy = Ax.$$

$$4.224. \int_{-\infty}^\infty e^{-y^2} H_n(y)yu(x+y)dy = Ax.$$

$$4.225. \int_0^a F(\alpha+1, \beta+1, \gamma+1, y)u(xy)dy = A.$$

$$4.226. \int_0^a \Phi(\alpha+2, \gamma+2, y)u(xy)dy = Ax.$$

Пример 4.7. Метод построения точных решений, рассмотренный в предыдущем примере, распространяется на некоторые нелинейные уравнения. Решение уравнения

$$u(x) = k \int_0^\infty e^{-\alpha y} u(x)u(y)dy = A \ln x + B, \quad \alpha > 0,$$

можно отыскивать в виде $u(x) = p \ln x + q$. Подстановка в уравнение

$$p \ln x + q = k(p \ln x + q) \int_0^{\infty} (p \ln y + q) e^{-\alpha y} dy + A \ln x + q$$

и интегрирование

$$p \ln x + q = \frac{k}{\alpha} (p \ln x + q) (p\varphi + q) + A \ln x + q, \quad \varphi = \psi(1) - \ln \alpha$$

приводят в результате сравнения коэффициентов при $\ln x$ и x к системе уравнений

$$\begin{cases} p = \frac{kp}{\alpha} (p\varphi + q) + B, \\ q = \frac{Aq}{\alpha} (p\varphi + q) + C. \end{cases}$$

Отсюда $Bq = Cp$, так что q — корень квадратного уравнения

$$\frac{A}{\alpha} \left(\frac{B\varphi}{C} + 1 \right) q^2 - q + C = 0.$$

В зависимости от количества корней этого уравнения интегральное уравнение имеет либо два, либо одно, либо ни одного решения вида $u(x) = p \ln x + q$.

Найти точные решения нелинейных интегральных уравнений 4.227–4.263.

$$4.227. \int_0^1 u(x)u(y)dy = Ax.$$

$$4.228. \int_0^1 e^{\alpha y} u(x)u(y)dy = Ae^{\beta x}.$$

$$4.229. \int_0^1 g(y)u(x)u(y)dy = f(x).$$

$$4.230. \int_0^1 u(y)u(f(x)y)dy = A.$$

$$4.231. u(x) + k \int_a^b e^{\alpha x} u(x)u(y)dy = Ae^{\beta x}.$$

$$4.232. u(x) + k \int_a^b g(x)u(x)u^\alpha(y)dy = f(x).$$

$$4.233. u(x) + k \int_0^{\infty} y^{\alpha} e^{-\frac{\beta y}{x}} u^{\gamma} dy = 0, \alpha > -1, \beta > 0.$$

$$4.234. u(x) + \int_0^1 f(y) u(y) u\left(\frac{x}{y}\right) dy = Ax^{\alpha}, \alpha \geq 0.$$

$$4.235. u(x) = k \int_0^{\infty} e^{-\alpha y} u(y) u\left(\frac{x}{y}\right) dy + Ax^{\beta}.$$

$$4.236. \int_0^{\pi} u(y) u(x-y) dy = A^2 \sin x.$$

$$4.237. \int_0^{\pi} \sin y u(y) u(x-y) dy = A.$$

$$4.238. \int_0^{\pi} \sin y u(y) u(x-y) dy = Ax.$$

$$4.239. \int_0^x y^k u(y) u(x-y) dy = Ax^{\alpha} e^{\beta x}, \alpha > -1, k \geq 0.$$

$$4.240. \int_0^1 u(y) u(x+3y) dy = Ax.$$

$$4.241. \int_0^1 u(y) u(x+6y) dy = Ax e^{-\alpha x}, \alpha > 0.$$

$$4.242. \int_0^x u(y) u(ax-y) dy = Ax^{\alpha} e^{\beta x}, \alpha > -1.$$

$$4.243. \int_0^x \frac{u(y) u(x-y) dy}{ax+by} = Ax^{\alpha} e^{\beta x}, a > 0, a+b > 0, \alpha > -1.$$

$$4.244. \int_0^x \frac{u(y) u(x-y) dy}{\sqrt{ax^2+by^2}} = Ax^{\alpha} e^{\beta x}, a > 0, a+b > 0, \alpha > -1.$$

$$4.245. u(x) = k \int_0^x x^{-\alpha-1} u(y) u(x-y) dy + Ax^{\alpha}, \alpha > 0.$$

$$4.246. u(x) = k \int_0^x e^{\alpha \frac{y}{x}} u(y) u(x-y) dy + Ax^{\alpha} e^{\beta x}, \alpha > 0.$$

$$4.247. u(x) + k \int_0^{\infty} u(x-\alpha y) u(y) dy = 0.$$

$$4.248. \quad u(x) + k \int_0^1 u(x(1-y)^\alpha) u(y) dy = 0.$$

$$4.249. \quad u(x) + A \int_0^1 u(xy) u(y) dy = B \ln x.$$

$$4.250. \quad u(x) + A \int_0^1 u(xy) u(y) dy = Bx \ln x.$$

$$4.251. \quad u(x) = A \int_0^1 x^\alpha e^{-\beta y} u^2(y) dy, \quad \alpha > -1, \beta > 0.$$

$$4.252. \quad u(x) = A \int_0^1 e^{-\beta x} y^\alpha u^2(y) dy, \quad \alpha > -1, \beta > 0.$$

$$4.253. \quad u(x) = k \int_0^x x^{\alpha-1} u^2(y) dy + Ax^\alpha, \quad \alpha > -1.$$

$$4.254. \quad u(x) = k \int_0^x \frac{u^2(y) dy}{x^2 + y^2} + Ax.$$

$$4.255. \quad u(x) = k \int_{-\infty}^1 e^{\alpha x + \beta y} (x-y)^m u^n(y) dy, \quad n \neq 1.$$

$$4.256. \quad u(x) + k \int_a^b e^{\beta u(y)} dy = g(x).$$

$$4.257. \quad u(x) + Ak \int_a^b e^{\alpha(x-y) + \beta u(y)} dy = f(x).$$

$$4.258. \quad u(x) = k \int_0^x \frac{e^{\alpha u(y)} dy}{ax + by} + A, \quad a > 0, a + b > 0.$$

$$4.259. \quad u(x) = k \int_0^x \frac{e^{\alpha u(y)} dy}{\sqrt{ax^2 + by^2}}, \quad a > 0, a + b > 0.$$

$$4.260. \quad u(x) + \int_a^b g(x) \operatorname{ch}(\beta u(y)) dy = f(x).$$

$$4.261. \quad u(x) = \int_0^x \frac{\operatorname{ch}(\alpha u(y)) dy}{ax + by} + A, \quad a > 0, a + b > 0.$$

$$4.262. \quad u(x) = \int_0^x \frac{\operatorname{th}(\alpha u(y)) dy}{\sqrt{ax^2 + by^2}} + A, \quad a > 0, a + b > 0.$$

$$\mathbf{4.263.} \quad u(x) + A \int_a^b u(xy) tg(\alpha u(y)) dy = 0.$$

Пример 4.8. Решение уравнения Вольтерра первого рода

$$\int_a^x \frac{u(y)dy}{\sqrt{g(x) - g(y)}} = f(x), \quad f(a) = 0, \quad g'(x) > 0,$$

получается заменой x на s и интегрированием от a до x с множителем $g'(s)(g(x) - g(s))^{-\frac{1}{2}}$:

$$\int_a^x \frac{g'(s)ds}{\sqrt{g(x) - g(s)}} \int_a^s \frac{u(y)dy}{\sqrt{g(s) - g(y)}} = \int_a^x \frac{f(s)g'(s)ds}{\sqrt{g(x) - g(s)}}.$$

Изменение порядка интегрирования с последующей заменой переменной $g(s) = g(y) + t(g(x) - g(y))$ преобразуют интеграл слева к виду

$$\begin{aligned} \int_a^x u(y)dy \int_y^x \frac{g'(s)ds}{\sqrt{(g(x) - g(s))(g(s) - g(y))}} = \\ = \int_a^x u(y)dy \int_0^1 \frac{dz}{\sqrt{z(1-z)}} = B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \int_a^x u(y)dy, \end{aligned}$$

откуда

$$\int_a^x u(y)dy = \frac{1}{\pi} \int_a^x \frac{f(s)g'(s)ds}{\sqrt{g(x) - g(s)}}$$

и, следовательно,

$$u(x) = \frac{1}{\pi} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{f(y)g'(y)dy}{\sqrt{g(x) - g(y)}}.$$

Решить уравнения Вольтерра первого рода 4.264–4.299 методом, изложенным в примере 4.8.

$$\mathbf{4.264.} \quad \int_a^x \frac{u(y)dy}{\sqrt{x^2 - y^2}} = f(x).$$

$$\mathbf{4.265.} \quad \int_a^x \frac{u(y)dy}{\sqrt{x - y}} = f(x).$$

$$4.266. \int_a^x \frac{e^{\alpha(x-y)} u(y) dy}{\sqrt{x-y}} = f(x), \alpha > 0.$$

$$4.267. \int_a^x \frac{u(y) dy}{\sqrt{e^{\alpha x} - e^{\alpha y}}} = f(x), \alpha > 0.$$

$$4.268. \int_a^x \frac{u(y) dy}{\sqrt{\operatorname{ch} x - \operatorname{ch} y}} = f(x).$$

$$4.269. \int_a^x \frac{u(y) dy}{\sqrt{\ln \frac{x}{y}}} = f(x).$$

$$4.270. \int_a^x \frac{u(y) dy}{\sqrt{I_0(x) - I_0(y)}} = f(x).$$

$$4.271. \int_a^x \frac{u(y) dy}{(g(x) - g(y))^\alpha} = f(x), 0 < \alpha < 1, g'(x) > 0.$$

$$4.272. \int_a^x \frac{u(y) dy}{(x-y)^\alpha} = f(x), 0 < \alpha < 1.$$

$$4.273. \int_a^x \frac{e^{\beta(x^2-y^2)} u(y) dy}{(\sqrt{x} - \sqrt{y})^\alpha} = f(x), 0 < \alpha < 1.$$

$$4.274. \int_a^x \frac{y^\gamma u(y) dy}{(x^\beta - y^\beta)^\alpha} = f(x), \gamma > -1, \beta > 0, 0 < \alpha < 1.$$

$$4.275. \int_a^x \frac{u(y) dy}{(e^{\beta x} - e^{\beta y})^\alpha} = f(x), 0 < \alpha < 1, \beta > 0.$$

$$4.276. \int_a^x \frac{u(y) dy}{(\operatorname{sh} x - \operatorname{sh} y)^\alpha} = f(x), 0 < \alpha < 1.$$

$$4.277. \int_a^x \frac{u(y) dy}{(\operatorname{th} kx - \operatorname{th} ky)^\alpha} = f(x), k > 0, 0 < \alpha < 1.$$

$$4.278. \int_a^x \frac{u(y) dy}{\left(\ln \frac{x}{y}\right)^\alpha} = f(x), 0 < \alpha < 1.$$

$$4.279. \int_a^x \frac{u(y) dy}{(\cos y - \cos x)^\alpha} = f(x), 0 < \alpha < 1.$$

$$4.280. \int_a^x \frac{e^{\beta(x-y)} u(y) dy}{(\operatorname{ch} x - \operatorname{ch} y)^\alpha} = f(x), 0 < \alpha < 1.$$

$$4.281. \int_a^x \frac{u(y)dy}{(\operatorname{arctg} ky - \operatorname{arctg} kx)^\alpha} = f(x), \quad k > 0, \quad 0 < \alpha < 1.$$

$$4.282. \int_a^x \frac{u(y)dy}{\sqrt{\operatorname{cth} kx - \operatorname{cth} ky}} = f(x), \quad k > 0.$$

$$4.283. \int_a^x \frac{u(y)dy}{\sqrt{K_\nu(y) - K_\nu(x)}} = f(x).$$

$$4.284. \int_a^x \frac{u(y)dy}{(K_0(y) - K_0(x))^\alpha} = f(x).$$

$$4.285. \int_a^x (g(x) - g(y))^\alpha u(y)dy = f(x), \quad f(a) = 0, \quad g'(x) > 0, \quad 0 < \alpha < 1.$$

$$4.286. \int_a^x \sqrt{x-y} u(y)dy = f(x), \quad f(a) = 0.$$

$$4.287. \int_a^x e^{\beta(x^2-y^2)} \sqrt{x-y} u(y)dy = f(x), \quad f(a) = 0.$$

$$4.288. \int_a^x \sqrt{x^3y^2 - x^2y^3} u(y)dy = f(x), \quad f(a) = 0.$$

$$4.289. \int_a^x (\sqrt{x} - \sqrt{y})^\alpha u(y)dy = f(x), \quad f(a) = 0, \quad 0 < \alpha < 1.$$

$$4.290. \int_a^x (\operatorname{ch} x - \operatorname{ch} y)^\alpha u(y)dy = f(x), \quad f(a) = 0, \quad 0 < \alpha < 1.$$

$$4.291. \int_a^x (\sin x - \sin y)^\alpha u(y)dy = f(x), \quad f(a) = 0, \quad 0 < \alpha < 1.$$

$$4.292. \int_a^x e^{\beta(x-y)} (\cos x - \cos y)^\alpha u(y)dy = f(x), \quad f(a) = 0, \quad 0 < \alpha < 1.$$

$$4.293. \int_a^x (\operatorname{arcsin} kx - \operatorname{arcsin} ky)^\alpha u(y)dy = f(x), \quad f(a) = 0, \quad 0 < \alpha < 1.$$

$$4.294. \int_a^x (\operatorname{th} x - \operatorname{th} y)^\alpha u(y)dy = f(x), \quad f(a) = 0, \quad 0 < \alpha < 1.$$

$$4.295. \int_a^x \left(\ln \frac{x}{y} \right)^\alpha u(y)dy = f(x), \quad f(a) = 0, \quad 0 < \alpha < 1.$$

$$4.296. \int_a^x (e^{\beta x} - e^{\beta y})^\alpha u(y)dy = f(x), \quad f(a) = 0, \quad 0 < \alpha < 1.$$

$$4.297. \int_a^x (\operatorname{arctg} x - \operatorname{arctg} y)^\alpha u(y) dy = f(x), \quad f(a) = 0, \quad 0 < \alpha < 1.$$

$$4.298. \int_a^x e^{\beta(x-y)} (\arccos ky - \arccos kx)^\alpha u(y) dy = f(x), \\ f(a) = 0, \quad 0 < \alpha < 1.$$

$$4.299. \int_a^x (I_0(x) - I_0(y))^\alpha u(y) dy = f(x), \quad 0 < \alpha < 1.$$

4.300. Решить уравнение

$$\int_0^a \frac{f(y)}{x+y} K\left(\frac{2\sqrt{xy}}{x+y}\right) dy = g(x), \quad 0 \leq x \leq a,$$

которое встречается в задачах определения плотности заряда на проводниках методом потенциалов.

Пример 4.9. Метод последовательных приближений. Произведением $\mathcal{K}_1 \mathcal{K}_2$ операторов называется оператор $\mathcal{K}u = \mathcal{K}_1(\mathcal{K}_2 u)$. Так как произведение ассоциативно, то определена целая степень оператора $\mathcal{K}^n$. Метод последовательных приближений решения уравнения

$$u(x) = \int_a^b K(x, y) u(y) dy + f(x),$$

в котором $f(x) \in C(\overline{\Delta})$, $K(x, y) \in C(\overline{Q})$, $Q = \{x, y: x \in \Delta, y \in \Delta\}$, $\Delta = (a; b)$, состоит в построении последовательности

$$u_0 = u_0(x), \quad u_n = \mu \mathcal{K} u_{n-1} + u_0, \quad n \in \mathbb{N},$$

где $u_0(x)$ — произвольная непрерывная функция на $\overline{\Delta}$. Если $u_0 = f$, то

$$u_n = \sum_{m=0}^n \mu^m \mathcal{K}^m f, \quad \mathcal{K}^0 f = f.$$

При достаточно малых значениях $|\mu|$ последовательность сходится к решению, которое является единственным и выражается рядом Неймана, т. е.

$$u(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \mu^m (\mathcal{K}^m f)(x). \quad (4.22)$$

Члены ряда Неймана, соответствующие уравнению

$$u(x) = \mu \int_0^1 \frac{xu(y) dy}{1+y^2} + 1,$$

имеют вид

$$\mu^0(\mathcal{K}^0 1)(x) = 1, \quad \mu^m(\mathcal{K}^m 1)(x) = \frac{\pi x}{4} \left(\frac{\mu \ln 2}{2} \right)^{m-1}, \quad m \geq 1.$$

Следовательно,

$$u(x) = 1 + \frac{\pi x}{4} \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{\mu \ln 2}{2} \right)^{m-1}.$$

Ряд сходится в круге $|\mu| < \frac{2}{\ln 2}$, сумма ряда

$$u(x) = 1 + \frac{\mu \pi x}{2(2 - \mu \ln 2)}. \quad (4.23)$$

Полученное решение можно аналитически продолжить на всю комплексную плоскость (μ). Таким образом, при $\mu \neq \frac{2}{\ln 2}$ уравнение имеет единственное решение (4.23); если $\mu = \frac{2}{\ln 2}$, то решения нет.

Методом последовательных приближений решить интегральные уравнения 4.301–4.314.

4.301. $u(x) = \mu \int_{-1}^1 \frac{u(y) dy}{1+y^2} - 1.$

4.302. $u(x) = 3 \int_0^1 \frac{x u(y) dy}{1+y^2} + x.$

4.303. $u(x) = \mu \int_{-1}^1 \frac{(1+xy)u(y) dy}{\sqrt{1-y^2}} + ax^2.$

4.304. $u(x) = \mu \int_0^1 e^{x-y} u(y) dy + f(x).$

4.305. $u(x) = 7 \int_0^1 x^3 \sqrt[3]{y^2} u(y) dy + x^3.$

4.306. $u(x) = \mu \int_0^1 xy^3 u(y) dy + 4.$

$$4.307. \quad u(x) = \mu \int_0^1 (\sqrt{x} - \sqrt{y}) u(y) dy + 1.$$

$$4.308. \quad u(x) = \int_0^x e^{x-y} u(y) dy + 1.$$

$$4.309. \quad u(x) = \mu \int_0^x \sqrt{\frac{x}{y}} u(y) dy + \sqrt{x}.$$

$$4.310. \quad u(x) = \mu \int_0^x x^2 u(y) dy + x^2.$$

$$4.311. \quad u(x) = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{xy u^3(y) dy}{1+y^2} + \sin^2 x.$$

$$4.312. \quad u(x) = \mu \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|x| u(y) dy}{1+x^2 y^2} + 1.$$

$$4.313. \quad u(x) = \mu \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2 u(y) dy}{1+x^2 y^2} + x.$$

$$4.314. \quad \begin{cases} \int_0^{\infty} \frac{xu(y) dy}{x^2+y^2} + \pi v(x) = V_1, \\ \int_0^{\infty} \frac{xv(y) dy}{x^2+y^2} + \pi u(x) = V_2. \end{cases}$$

4.315. Пусть $K_1(x, y)$ и $K_2(x, y)$ — ядра операторов $\mathcal{K}_1$ и $\mathcal{K}_2$ соответственно; показать, что ядро оператора $\mathcal{K} = \mathcal{K}_1 \mathcal{K}_2$ имеет вид

$$K(x, y) = \int_a^b K_1(x, t) K_2(t, y) dt,$$

если операторы действуют по правилу (4.1), или

$$K(x, y) = \int_y^x K_1(x, t) K_2(t, y) dt, \quad (4.24)$$

если операторы определены формулой (4.2).

Пример 4.10. Ряду Неймана (4.22) можно придать форму

$$u = \mu \sum_{m=0}^{\infty} \mu^m \mathcal{K}^{m+1} f + f$$

и преобразовать решение интегрального уравнения (4.3) к виду

$$u = \mu \mathcal{R}f + f, \quad (4.25)$$

где $\mathcal{R}$ — линейный оператор с ядром

$$R(x, y, \mu) = \sum_{m=0}^{\infty} \mu^m K_{m+1}(x, y), \quad (4.26)$$

K_{m+1} — ядро оператора $\mathcal{K}^{m+1}$. Функция $R(x, y, \mu)$ называется резольвентой ядра $K(x, y)$.

Уравнение

$$u(x) = \int_0^x \frac{1+e^x}{1+e^y} u(y) dy + e^{2x}$$

порождено ядром $K(x, y) = (1+e^x)/(1+e^y)$. Согласно формуле (4.24) $K_2(x, y) = (x-y)K(x, y), \dots, K_{m+1}(x, y) \frac{(x-y)^m}{m!} K(x, y)$. Резольвента (4.26) имеет вид

$$R(x, y, \mu) = K(x, y) \sum_{m=0}^{\infty} \mu^m \frac{(x-y)^m}{m!} = K(x, y) e^{\mu(x-y)},$$

а решение дается формулой (4.25):

$$\begin{aligned} u(x) &= \int_0^x R(x, y, 1) e^{2y} dy + e^{2x} = \\ &= \int_0^x \frac{1+e^x}{1+e^y} e^{x-y} e^{2y} dy + e^{2x} + e^x (1+e^x) \ln \frac{1+e^x}{2} + e^{2x}. \end{aligned}$$

Определив резольвенту, решить интегральные уравнения 4.316–4.324.

$$4.316. \quad u(x) = -3 \int_0^1 \sqrt[4]{xy^3} u(y) dy + x \sqrt[4]{x}.$$

$$4.317. \quad u(x) = 4 \int_0^1 y \sqrt{xy} u(y) dy - x \sqrt{x}.$$

$$4.318. \quad u(x) = \mu \int_0^1 e^{x-y} u(y) dy + e^x.$$

$$4.319. \quad u(x) = -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos^5 y u(y) dy + \sin^2 x.$$

$$4.320. \quad u(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x-y) u(y) dy + 1.$$

$$4.321. \quad u(x) = \mu \int_0^x e^{x^2-y^2} u(y) dy + 1.$$

$$4.322. \quad u(x) = \int_0^x \frac{5-3\cos x}{5-3\cos y} u(y) dy + e^x.$$

$$4.323. \quad u(x) = \int_0^x (x-y) u(y) dy + 2e^x.$$

$$4.324. \quad u(x) = \mu \int_0^{\infty} x e^{-\frac{y^2}{2}} u(y) dy + J_0(2x).$$

4.325. Решить интегральное уравнение

$$u(x) = \frac{1}{1-\varepsilon_0} \int_{x+\ln \varepsilon_0}^x e^{-(x-y)} u(y) dy,$$

встречающееся в теории замедления нейтронов (см. (1.57)).

4.326. Внешнее воздействие $u(t)$ на систему с памятью является периодической функцией и связано с реакцией системы линейной зависимостью (4.10). Какому условию должно удовлетворять ядро $K(t, \tau)$, чтобы реакция $v(t)$ была также периодической функцией? ¹⁾

4.327. Оператор Вольтерра с разностным ядром $K(t-\tau)$ действует по правилу

$$\mathcal{K}u = \int_0^t K(t-\tau) u(\tau) d\tau. \quad (4.27)$$

Показать, что: 1) ядро $K(t, \tau)$ произведения $\mathcal{K}_1 \mathcal{K}_2$ операторов Вольтерра выражается формулой

$$K(t, \tau) = \int_{\tau}^t K_1(t-s) K_2(s-\tau) ds; \quad (4.28)$$

¹⁾ Источник задач 4.326–4.328 и 4.330 — монография [72].

2) ядро $K(t, \tau)$ является разностным; 3) произведение операторов коммутативно: $\mathcal{K}_1 \mathcal{K}_2 = \mathcal{K}_2 \mathcal{K}_1$.

4.328. *Определение 1.* Операторный ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \mathcal{K}^n$$

называется сходящимся на отрезке $[-r; r]$, если ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n K_n(t - \tau)$$

регулярно (то есть абсолютно и равномерно) сходится при условии $|t - \tau| \leq r$.

Определение 2. Пусть $f(z)$ — аналитическая функция в точке $z = 0$, ряд Тейлора которой

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n \quad (4.29)$$

сходится в круге $|z| < r$, где $r > 0$. Функцией $f(\mathcal{K})$ от оператора $\mathcal{K}$ называется ряд

$$f(\mathcal{K}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \mathcal{K}^n. \quad (4.30)$$

Доказать теорему Вольтерра: если степенной ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

сходится в круге $|z| < r$, где $r > 0$, то для любого $R > 0$ операторный ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \mathcal{K}^n,$$

где $\mathcal{K}$ — разностный оператор с непрерывным ядром, сходится для $|t - \tau| \leq R$.

4.329. Для функций $u(x)$, непрерывных на отрезке $\bar{h} = [a; b]$, вводится понятие нормы

$$\|u\| = \max_{\bar{h}} |u(x)|$$

и сходящейся последовательности

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x) = u(x) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n(x) - u(x)\| = 0.$$

Оператор $\mathcal{K}$, определенный на множестве $\mathcal{M}_{\mathcal{K}} = C(\bar{h})$, называется ограниченным, если

$$\exists A > 0, \quad \forall u \in \mathcal{M}_{\mathcal{K}}: \quad |\mathcal{K}u| \leq A \|u\|.$$

Так как существует множество α подобных констант (например, kA , где $k > 1$), то вводится понятие нормы оператора

$$\|\mathcal{K}\| = \inf \alpha.$$

Оператор $\mathcal{K}$ называется фредгольмовым, если он линеен, отображает $C(\bar{h})$ в $C(\bar{h})$ и ограничен. Оператор $\mathcal{K}$ называется непрерывным на функции $u \in \mathcal{M}_{\mathcal{K}}$, если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = u \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{K}u_n = \mathcal{K}u.$$

Пусть t_0 — любое число; доказать, что оператор (4.27) с непрерывным ядром, определенный на множестве $C[0; t_0]$: 1) фредгольмов; 2) удовлетворяет неравенству

$$\|\mathcal{K}u\| \leq \|\mathcal{K}\| \|u\|; \quad (4.31)$$

3) непрерывен на $C[0; t_0]$.

4.330. Пусть t_0 — любое положительное число, $\bar{h} = [0; t_0]$, функции $v(t)$ и $K(t)$ непрерывны на $\bar{h}$. Доказать, что: 1) при любом $\mu \in \mathbb{C}$ интегральное уравнение Вольтерра

$$v(t) = u(t) + \mu \int_0^t K(t - \tau) u(\tau) d\tau$$

имеет единственное решение $u(t) \in C(\bar{h})$, непрерывно зависящее от функции $v(t)$; 2) это решение

$$u(t) = \frac{v(t)}{1 - \mu \mathcal{K}};$$

3) резольвентный оператор $\mathcal{R}$ (см. пример 4.10) связан с оператором $\mathcal{K}$ соотношением

$$1 + \mu \mathcal{R} = \frac{1}{1 - \mu \mathcal{K}}.$$

Пример 4.11. Ядро вида

$$K(x, y) = \sum_{j=1}^n \varphi_j(x) \psi_j(y),$$

где системы функций $\{\varphi_j\}$, $\{\psi_j\}$ линейно независимы, называется вырожденным. Интегральное уравнение Фредгольма 2-го рода с вырожденным ядром сводится к системе линейных алгебраических уравнений. Действительно, уравнение

$$u(x) = \mu \int_{-1}^1 (x \operatorname{ch} y + y \operatorname{sh} x) u(y) dy + 3x + a \operatorname{sh} x$$

можно представить в виде

$$u(x) = \mu C_1 x + \mu C_2 \operatorname{sh} x + 3x + a \operatorname{sh} x, \quad (4.32)$$

где

$$C_1 = \int_{-1}^1 \operatorname{ch} y u(y) dy, \quad C_2 = \int_{-1}^1 y u(y) dy$$

есть неизвестные константы. Умножение равенства (4.32) сначала на $\operatorname{ch} x$, затем на x и интегрирование каждый раз в пределах от -1 до 1 приводит к системе

$$\begin{cases} C_1 = 0, \\ C_2 \left(1 - \frac{2\mu}{e}\right) = 2 \left(1 + \frac{a}{e}\right). \end{cases}$$

Отсюда

$$\begin{cases} u(x) = \frac{a + 2\mu}{e - 2\mu} e \operatorname{sh} x + 3x, & \text{если } \mu \neq \frac{e}{2}, \\ u(x) = C \operatorname{sh} x + 3x, & \text{если } \mu = \frac{e}{2}, \quad a = -e, \\ \text{нет решений,} & \text{если } \mu = \frac{e}{2}, \quad a \neq -e. \end{cases}$$

Решить уравнения 4.331–4.357 с вырожденным ядром.

4.331. $u(x) = 1 + 3x^2 - 4 \int_0^1 x \operatorname{arctg} x u(y) dy.$

4.332. $u(x) = \int_0^\infty e^{-x-y} u(y) dy + \sin x.$

$$4.333. \quad u(x) = \frac{2}{\pi^2} \int_0^{\pi} (y + x \cos y) u(y) dy + 1 - x.$$

$$4.334. \quad u(x) = \mu \int_{-\pi}^{\pi} \sin^4 x y^3 u(y) dy + \cos 5x.$$

$$4.335. \quad u(x) = \mu \int_0^1 u(y) dy + f(x).$$

$$4.336. \quad u(x) = \int_0^1 \operatorname{arctg} x y u(y) dy + x^2 + a.$$

$$4.337. \quad u(x) = \mu \int_{-1}^1 \arcsin x u(y) dy + ax + 1.$$

$$4.338. \quad u(x) = \mu \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x u(y) dy + 4x + a.$$

$$4.339. \quad u(x) = \mu \int_0^{\pi} \cos^2 x u(y) dy + x + a.$$

$$4.340. \quad u(x) = \mu \int_{-1}^1 e^{-x^2} u(y) dy + x^5.$$

$$4.341. \quad u(x) = \mu \int_{-\pi}^{\pi} |y| \cos x u(y) dy + \sin x.$$

$$4.342. \quad u(x) = \mu \int_0^1 \frac{(1-y)u(y)dy}{1+x+y+xy} + ax.$$

$$4.343. \quad u(x) = \mu \int_{-1}^1 (1 + xy - 5x^2 y^2) u(y) dy + 1 - \frac{5}{2} x^2.$$

$$4.344. \quad u(x) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (x - y)^3 u(y) dy + 1 - x - x^3.$$

$$4.345. \quad u(x) = 9 \int_0^1 (y^2 \ln x + 5x^2 \ln y) u(y) dy + 50x.$$

$$4.346. \quad u(x) = \int_0^1 \left(x^2 \ln y - \frac{10}{11} y \ln^2 x \right) u(y) dy - 4x + a.$$

$$4.347. \quad u(x) = \int_0^1 \ln^2(xy) u(y) dy + x.$$

$$\mathbf{4.348.} \quad u(x) = \mu \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x \sin y + \sin 3x \sin 3y) u(y) dy + \\ + 1 - \frac{4}{\pi} \sin x - \frac{4}{3\pi} \sin 3x.$$

$$\mathbf{4.349.} \quad u(x) = \mu \int_0^{\pi} \left(x \cos y - \frac{y}{\pi} \sin x \right) u(y) dy + \sin x.$$

$$\mathbf{4.350.} \quad u(x) = \mu \int_{-1}^1 (1 + 2xy) u^2(y) dy.$$

$$\mathbf{4.351.} \quad u(x) = 2 \int_0^1 \ln y u^2(y) dy + 3x.$$

$$\mathbf{4.352.} \quad u(x) = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin y u^3(y) dy + \frac{3}{5} \cos x.$$

$$\mathbf{4.353.} \quad u(x) = \mu \int_0^{\infty} \operatorname{Erf} y u(y) dy + \sqrt{\pi}.$$

$$\mathbf{4.354.} \quad u(x) = \mu \int_{-1}^1 \frac{(1 + xy)u(y)dy}{1 + y^2} + kx.$$

$$\mathbf{4.355.} \quad u(x) = \mu \int_{-1}^1 \frac{u(y)dy}{1 + x^2 + y^2 + x^2y^2} + kx.$$

$$\mathbf{4.356.} \quad u(x) = \mu \int_0^{\infty} (\sqrt{\pi} - \sin x) \operatorname{Erf} y u(y) dy + 4x.$$

$$\mathbf{4.357.} \quad u(x) = \mu \int_0^{\infty} \cos x \operatorname{Erf} y u(y) dy + Ax^2.$$

4.358. Пусть при любом $a \in \mathbb{R}$ линейно независимые комплекснозначные функции $g_1(x), g_2(x), \dots, g_n(x)$ — элементы пространства $L_2(a, \infty)$, ядро $K(x, y) = \sum_{j=1}^n g_j(x) g_j(y)$. Решить уравнения:

$$1) u(x, y) + K(x, y) + \int_x^{\infty} K(y, s) u(x, s) ds = 0; \quad (4.33)$$

$$2) u(x, y) - \overline{K(x, y)} + \\ + \int_x^{\infty} \int_x^{\infty} K(s, t) \overline{K(t, y)} u(x, s) ds dt = 0; \quad (4.34)$$

$$\begin{aligned}
 3) \quad u(x, y) + \int_x^\infty K(x, s) \overline{K(s, y)} ds + \\
 + \int_x^\infty \int_x^\infty K(s, t) \overline{K(t, y)} u(x, s) ds dt = 0. \quad (4.35)
 \end{aligned}$$

Доказать единственность решения и вычислить $u(x, x)$.

4.359. Пусть S — окружность, радиус которой r_0 ; M и P — точки на S ; $f(P) \in C(S)$ — заданная функция, φ_{PM} — угол между внешней нормалью к S в точке P и $\mathbf{r}_{PM} = \overrightarrow{PM}$. Решить уравнения:

$$\begin{aligned}
 1) \quad f(M) &= \int_S \frac{\nu(P) \cos \varphi_{PM}}{r_{MP}} ds_P - \pi \nu(M); \\
 2) \quad f(M) &= \int_S \frac{\nu(P) \cos \varphi_{PM}}{r_{MP}} ds_P + \pi \nu(M)
 \end{aligned}$$

при условии $\int_S f(P) ds_P = 0$.

Пример 4.12. Найти характеристические числа и собственные функции уравнения

$$u(x) = \mu \int_0^1 (3x + y) u(y) dy.$$

Решение. Так же как и в предыдущем примере, из равенства

$$u(x) = 3\mu x C_1 + \mu C_2, \quad C_1 = \int_0^1 u(y) dy, \quad C_2 = \int_0^1 u(y) y dy$$

после умножения на 1 и x и интегрирования получается однородная система линейных алгебраических уравнений

$$\begin{cases} \left(1 - \frac{3\mu}{2}\right) - \mu C_2 = 0, \\ \mu C_1 - \left(1 - \frac{\mu}{2}\right) C_2 = 0. \end{cases}$$

Нужно найти такие значения μ , при которых система имеет нетривиальные решения. Для этого необходимо и достаточно, чтобы определитель системы был равен нулю:

$$-\left(1 - \frac{3\mu}{2}\right)\left(1 - \frac{\mu}{2}\right) + \mu^2 = 0.$$

Отсюда $\mu_{1,2} = -4 \pm \sqrt{5}$. При подстановке $\mu = \mu_1$ в первое уравнение системы (оба уравнения равносильны) определяется соотношение между C_1 и C_2 :

$$C_2 = C_1 \frac{7 - 3\sqrt{5}}{2\sqrt{5} - 4} \Rightarrow C_2 = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} C_1.$$

Следовательно, $u_1(x) = 3\mu_1 C_1 x + \mu_1 \frac{\sqrt{5} - 1}{2} C_1$. Аналогично, при $\mu = \mu_2$ собственная функция $u_2(x) = 3\mu_2 C_1 x - \mu_2 \frac{\sqrt{5} - 1}{2} C_1$. Собственные функции определены с точностью до постоянного множителя; при соответствующем выборе постоянных характеристические числа и собственные функции равны:

$$\begin{aligned} \mu_1 &= -4 + \sqrt{5}, & u(x) &= 6x + \sqrt{5} - 1, \\ \mu_2 &= -4 - \sqrt{5}, & u(x) &= 6x - \sqrt{5} + 1. \end{aligned}$$

В задачах 4.360–4.373 найти собственные функции и характеристические числа уравнений.

4.360. $u(x) = \mu \int_0^{2\pi} \sin(x+y) u(y) dy.$

4.361. $u(x) = \mu \int_0^1 (2xy - x^2) u(y) dy.$

4.362. $u(x) = \mu \int_0^{\pi} \left(\frac{x}{\pi} \sin y + y \cos x \right) u(y) dy.$

4.363. $u(x) = \mu \int_0^1 \left(\frac{9}{5} x^2 \ln y + 2y \ln x \right) u(y) dy.$

4.364. $u(x) = \mu \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x \cos y + \cos 3x \cos 3y) u(y) dy.$

4.365. $u(x) = \mu \int_{-1}^1 (x-y)^2 u(y) dy.$

$$4.366. u(x) = \mu \int_{-1}^1 (2x^2 - xy + 5y^2) u(y) dy.$$

$$4.367. u(x) = \mu \int_0^{\pi} \cos^2(x + y) u(y) dy.$$

$$4.368. u(x) = \mu \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[1 + \frac{2}{\pi} \cos^2(2x + y) \right] u(y) dy.$$

$$4.369. u(x) = \mu \int_{-1}^1 (\operatorname{sh} x \operatorname{ch} y + 2xy + 3) u(y) dy.$$

$$4.370. u(x) = \mu \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{u(y) dy}{1 + \cos 2y}.$$

$$4.371. u(x) = \mu \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{3}{\pi^2} y + \frac{2}{3\pi} x \cos y + \cos x \sin y \right) u(y) dy.$$

$$4.372. u(x) = \mu \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + 2 \sin x \sin y + 2 \cos 2x \cos 2y) u(y) dy.$$

$$4.373. u(x) = \mu \int_0^{\pi} (9 \sin x \cos y - 18 \sin 2x \cos 3y + \\ + 8 \sin 3x \cos 3y) u(y) dy.$$

$$4.374. u(x) = \mu \int_0^1 \left(5 \sqrt[3]{\frac{x}{y}} + 2 \sqrt[3]{\frac{y}{x}} \right) u(y) dy.$$

$$4.375. u(x) = \mu \int_0^1 (2x\sqrt{y} - 3\sqrt{x}y) u(y) dy.$$

$$4.376. u(x) = \mu \int_0^1 \frac{(2\sqrt{2} + x - y)u(y)dy}{1 + x + y + xy}.$$

$$4.377. u(x) = \mu \int_{-1}^1 \frac{(2 + x - y)u(y)dy}{1 + x^2 + y^2 + x^2y^2}.$$

Пример 4.13. Характеристические числа и собственные функции ядра

$$K(x, y) = \begin{cases} \cos x \sin y, & 0 \leq x \leq y, \\ \sin x \cos y, & y \leq x \leq \pi, \end{cases} \quad (4.36)$$

можно определить, решая задачу Штурма–Лиувилля. Из уравнения

$$u(x) = \mu \sin x \int_0^x \cos y u(y) dy + \mu \cos x \int_x^\pi \sin y u(y) dy$$

и результатов дифференцирования

$$u'(x) = \mu \cos x \int_0^x \cos y u(y) dy - \mu \sin x \int_x^\pi \sin y u(y) dy,$$

$$u''(x) = -\mu \sin x \int_0^x \cos y u(y) dy - \mu \cos x \int_x^\pi \sin y u(y) dy + \\ + \mu \cos^2 x u(x) + \mu \sin^2 x u(x)$$

следует, что

$$u'' + (1 - \mu)u = 0, \quad 0 < x < \pi, \\ u'(0) = u(\pi) = 0.$$

Общее решение $u(x) = A \sin \sqrt{1 - \mu} x + B \cos \sqrt{1 - \mu} x$ дифференциального уравнения удовлетворяет граничным условиям, если

$$1 - \mu A = 0, \quad B \sqrt{1 - \mu} \sin \sqrt{1 - \mu} \pi = 0,$$

откуда

$$\mu_n = 1 - \left(n + \frac{1}{2}\right)^2, \quad u_n(x) = \cos\left(n + \frac{1}{2}\right)x, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

В задачах 4.378–4.382 найти характеристические числа и собственные функции ядра $K(x, y)$.

$$4.378. \quad K(x, y) = \begin{cases} \operatorname{sh} x \operatorname{ch}(y - 1), & 0 \leq x \leq y, \\ \operatorname{ch}(x - 1) \operatorname{sh} y, & y \leq x \leq 1. \end{cases}$$

$$4.379. \quad K(x, y) = \begin{cases} \cos x \cos(y - 1), & 0 \leq x \leq y, \\ \cos(x - 1) \cos y, & y \leq x \leq 1. \end{cases}$$

$$4.380. \quad K(x, y) = \begin{cases} e^{-y} \operatorname{ch} x, & 0 \leq x \leq y, \\ e^{-x} \operatorname{ch} y & y \leq x \leq 1. \end{cases}$$

$$4.381. \quad K(x, y) = \begin{cases} (\pi + x)(\pi - y), & -\pi \leq x \leq y, \\ (\pi - x)(\pi + y), & y \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

$$4.382. K(x, y) = \begin{cases} (\pi + x)y, & 0 \leq x \leq y, \\ x(\pi + y), & y \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

$$4.383. K(x, y) = \begin{cases} \sin x(\sin y + \cos y), & 0 \leq x \leq y, \\ \sin y(\sin x + \cos x), & x \leq y \leq \pi. \end{cases}$$

4.384. Найти характеристические числа и собственные функции уравнения

$$u(\mathbf{s}) = \mu \int_{S_1} \frac{u(\mathbf{s}') ds'}{\sqrt{1 + \alpha^2 - 2\alpha \cos \gamma}}, \quad 0 \leq |\alpha| \leq 1,$$

$\mathbf{s} = (1, \theta, \varphi)$, $\mathbf{s}' = (1, \theta', \varphi')$, $\cos \gamma = (\mathbf{s}, \mathbf{s}')$, $u(\mathbf{s}) \in C(S_1)$, S_1 — единичная сфера.

4.385. Найти характеристические числа и собственные функции уравнения

$$u(\mathbf{s}) = \mu \int_{S_1} \frac{u(\mathbf{s}') ds'}{\sqrt{1 - \cos \gamma}};$$

обозначения те же, что и в предыдущей задаче.

Пример 4.14. Если характеристические числа $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots$ и собственные функции $u_1(x), u_2(x), u_3(x), \dots$ симметричного ядра $K(x, y)$ известны, то из теоремы Гильберта-Шмидта вытекает, что решение интегрального уравнения Фредгольма

$$u(x) = \mu \int_a^b K(x, y) u(y) dy + f(x)$$

может быть представлено посредством ряда

$$u(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n u_n(x) + f(x), \quad (4.37)$$

коэффициенты которого определяются из уравнения

$$a_n = \frac{\mu}{\mu_n} (a_n + f_n), \quad f_n = (f, u_n).$$

Интегральное уравнение

$$u(x) = \int_0^{\pi} K(x, y) u(y) dy + 1$$

с ядром (4.36) имеет решение вида (4.37)

$$u(x) = 1 + \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) x.$$

Так как $f_n = (-1)^n \frac{4}{\pi(2n+1)}$, то $a_n = \frac{f_n}{\mu_n - 1} = \frac{(-1)^n 16}{\pi(2n+1)}$. Следовательно,

$$u(x) = 1 + \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) x}{\left(n + \frac{1}{2} \right)^3}.$$

В задачах 4.386 – 4.390 решить уравнение

$$u(x) = \mu \int_a^b K(x, y) u(y) dy + f(x).$$

4.386. $K(x, y) = \begin{cases} (\pi + x)(\pi - y), & -\pi \leq x \leq y, \\ (\pi - x)(\pi + y), & y \leq x \leq \pi, \end{cases} \quad -a = b = \pi, \quad f(x) = \sin x.$

4.387. $K(x, y) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq y, \\ y, & y \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \end{cases} \quad a = 0, \quad b = \frac{\pi}{2}, \quad f(x) = \sin 3x.$

4.388. $K(x, y) = \begin{cases} (\pi + x)y, & 0 \leq x \leq y, \\ x(\pi + y), & y \leq x \leq \pi, \end{cases} \quad a = 0, \quad b = \pi, \quad f(x) = \sin x + \pi \cos x.$

4.389. $K(x, y) = \begin{cases} \sin x \cos y, & 0 \leq x \leq y, \\ \sin y \cos x, & y \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \end{cases} \quad a = 0, \quad b = \frac{\pi}{2}, \quad \mu = -1, \quad f(x) = x.$

4.390. $K(x, y) = \begin{cases} -y \ln y, & 0 \leq x \leq y, \\ -y \ln x, & y \leq x \leq 1, \end{cases} \quad a = 0, \quad b = 1, \quad \mu = -1, \quad f(x) = 1.$

4.391. Доказать, что при любой $f(x) \in C(S_1)$ интегральное уравнение

$$u(s) = \frac{1 - 2a}{4\sqrt{2}\pi} \int_{S_1} \frac{u(s') ds'}{\sqrt{1 - \cos \gamma}} + f(s),$$

где $a \neq 0, -1, -2, \dots$, разрешимо и решить его; обозначения те же, что и в задаче 4.384.

4.392. Решить уравнение (в обозначениях из задачи 4.384)

$$u(s) = \frac{\alpha}{\sqrt{1+t^2-2t\cos\theta}} - \frac{1}{4\sqrt{2}\pi} \int_{S_1} \frac{u(s') ds'}{\sqrt{1-\cos\gamma}}, \quad |t| < 1.$$

4.393. Решить уравнение

$$u(s) = u_0 Y_n^m(s) - \frac{1}{4\sqrt{2}\pi} \int_{S_1} \frac{u(s') ds'}{\sqrt{1-\cos\gamma}};$$

обозначения те же, что и в задаче 4.384.

4.394. Решить уравнение

$$u(s) = u_0 \sin^2 2\theta \sin 2\varphi - \frac{1}{4\sqrt{2}\pi} \int_{S_1} \frac{u(s') ds'}{\sqrt{1-\cos\gamma}};$$

обозначения те же, что и в задаче 4.384.

4.395. Указать условие разрешимости интегрального уравнения

$$u(s) = \frac{1}{4\sqrt{2}\pi} \int_{S_1} \frac{u(s') ds'}{\sqrt{1-\cos\gamma}} + f(s), \quad f(s) \in C(S_1)$$

и решить его; обозначения те же, что и в задаче 4.384.

4.396. Решить уравнение (в обозначениях из задачи 4.384)

$$\int_{S_1} \frac{u(s') ds'}{\sqrt{1-\cos\gamma}} = f(s), \quad f(s) \in C(S_1).$$

4.397. Решить уравнение

$$\int_{S_1} \frac{u(s') ds'}{\sqrt{1-\cos\gamma}} = \frac{\alpha}{\sqrt{1+t^2-2t\cos\theta}}, \quad |t| < 1;$$

обозначения те же, что и в задаче 4.384.

Пример 4.15. Если действие интегрального оператора (4.2) представляет собой свертку

$$\int_0^x K(x-y) u(y) dy,$$

то соответствующее интегральное уравнение целесообразно решать с помощью интегрального преобразования Лапласа. Уравнению

$$u(x) = \sqrt{x} e^{-x} + \int_0^x e^{-(x-y)} u(y) dy$$

соответствует изображение

$$U(p) = \frac{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{(p+1)^{\frac{3}{2}}} + \frac{U(p)}{p+1},$$

откуда

$$U(p) = \frac{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{p\sqrt{p+1}}.$$

Так как $\frac{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{\sqrt{p+1}} \Leftrightarrow \frac{e^{-x}}{2\sqrt{x}}$, то

$$u(x) = \frac{1}{2} \int_0^x \frac{e^{-x} dx}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}(\sqrt{x}).$$

Решить уравнения 4.398–4.443 и систему уравнений 4.444 методом Лапласа.

4.398. $u(x) = \sqrt{x} + \int_0^x \sin(x-y) u(y) dy.$

4.399. $u(x) = x \sin x + 2 \int_0^x \cos(x-y) u(y) dy.$

4.400. $u(x) = \sqrt{x} + \int_0^x e^{-(x-y)} u(y) dy.$

4.401. $u(x) = e^{-x} + \int_0^x \cos(x-y) u(y) dy.$

4.402. $u(x) = \sqrt{x} e^{-x} - 2 \int_0^x e^{x-y} u(y) dy.$

4.403. $\int_0^x \frac{u(y) dy}{(x-y)^{\frac{1}{3}}} = 1 - 2x.$

4.404. $\int_0^x (x-y)^{\frac{1}{4}} u(y) dy = \frac{x}{2} + x^{\frac{5}{4}}.$

$$\mathbf{4.405.} \quad u(x) = x J_0(x) + \int_0^x J_1(x-y) u(y) dy.$$

$$\mathbf{4.406.} \quad u(x) = \sqrt{x} + \int_0^x u(y) dy.$$

$$\mathbf{4.407.} \quad u(x) = \sqrt{x} e^{-x} + 2 \int_0^x e^{-(x-y)} u(y) dy.$$

$$\mathbf{4.408.} \quad u(x) = \sqrt{x} e^{-x} + \int_0^x e^{-(x-y)} u(y) dy.$$

$$\mathbf{4.409.} \quad u(x) = \sqrt{x} + 2 \int_0^x e^{-(x-y)} u(y) dy.$$

$$\mathbf{4.410.} \quad u(x) = e^{-x^2} - \operatorname{erf} x + \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x u(y) dy.$$

$$\mathbf{4.411.} \quad \int_0^x \operatorname{erf}(\sqrt{x-y}) u(y) dy = x^2.$$

$$\mathbf{4.412.} \quad u(x) = \int_0^x x u(y) dy + x^2 \cos x.$$

$$\mathbf{4.413.} \quad u(x) = -2 \int_0^x x u(y) dy + 4x.$$

$$\mathbf{4.414.} \quad u(x) = \int_0^x J_0(x-y) u(y) dy + \frac{1}{2}(\sin x + x \cos x).$$

$$\mathbf{4.415.} \quad u(x) = \int_0^x J_1(x-y) u(y) dy + \cos x - \frac{1}{2}x \sin x.$$

$$\mathbf{4.416.} \quad \int_0^x y I_0(y) u(x-y) dy = x^2 I_2(x).$$

$$\mathbf{4.417.} \quad \int_0^x Y_0(x-y) u(y) dy = \cos x + x Y_1(x).$$

$$\mathbf{4.418.} \quad \int_0^x K_0(x-y) u(y) dy = \operatorname{sh} x + x K_0(x).$$

$$\begin{aligned} \mathbf{4.419.} \quad u(x) &= \\ &= \frac{1}{2} \int_0^x \left[5 \left(1 + \frac{xy}{4} \right) + \frac{x}{2} \left(1 - \frac{5}{4}x \right) - \frac{y}{2} \left(1 + \frac{5}{4}y \right) \right] u(y) dy + 9e^x. \end{aligned}$$

$$4.420. \quad u(x) = \frac{1}{4} \int_0^x u(y) u(x-y) dy - 2 - x.$$

$$4.421. \quad u(x) = 2x + \frac{x^3}{3} - \frac{1}{2} \int_0^x u(y) u(x-y) dy.$$

$$4.422. \quad u(x) = (1-x)e^x + \int_0^x u(y) u(x-y) dy.$$

$$4.423. \quad u(x) = x \cos x + 2 \int_0^x u(y) u(x-y) dy.$$

$$4.424. \quad u(x) = \cos x - \frac{1}{2}(\sin x + x \cos x) + \int_0^x u(y) u(x-y) dy.$$

$$4.425. \quad u(x) = x \operatorname{ch} x - 2 \int_0^x u(y) u(x-y) dy.$$

$$4.426. \quad u(x) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2} \int_0^x u(y) u(x-y) dy.$$

$$4.427. \quad u(x) = \frac{1}{2} \int_0^x u(y) u(x-y) dy - \frac{1}{2} \operatorname{sh} x.$$

$$4.428. \quad 2 \int_0^x y u(y) u(x-y) dy = x^2 \sqrt{x} e^x.$$

$$4.429. \quad \int_0^x x u(y) u(x-y) dy = I_1(x).$$

$$4.430. \quad u(x) = 1 + 3 \int_0^x (1 - u(y)) u(x-y) dy.$$

$$4.431. \quad u(x) = \left(1 + \frac{x^3}{6}\right) e^x - 1 + \int_0^x (1 - u(y)) u(x-y) dy.$$

$$4.432. \quad u(x) = x + \int_0^x (u(y) - y) u(x-y) dy.$$

$$4.433. \quad \int_0^x (2 - u(y)) u(x-y) dy = 1 - e^{-x}.$$

$$4.434. \quad u(x) = e^{-2x} - \int_0^x u'(y) u(x-y) dy.$$

$$4.435. \quad u(x) = 4 + \mu \int_0^x u'(y) u(x-y) dy.$$

$$4.436. \quad u(x) = 1 + x + x^2 + 2 \int_0^x u'(y) u(x-y) dy.$$

$$4.437. \quad u(x) = x e^x - \int_0^x u'(y) u(x-y) dy.$$

$$4.438. \quad u(x) = J_0(x) - x \sin x + 2 \int_0^x y u(y) u'(x-y) dy.$$

$$4.439. \quad \int_0^x J_0(2\sqrt{y(x-y)}) u(y) dy = x.$$

$$4.440. \quad \int_0^x J_0(\sqrt{x^2 - y^2}) u(y) dy = \sin x.$$

$$4.441. \quad u(x) = \int_0^x J_0(\sqrt{x^2 - y^2}) u(y) dy + x^2 + x \cos x - \sin x.$$

$$4.442. \quad u(x) = \int_0^x I_0(\sqrt{x^2 - y^2}) u(y) dy + x - \operatorname{sh} x.$$

$$4.443. \quad u(x) = \int_0^x I_0(\sqrt{x^2 - y^2}) u(y) dy + x^2 + x \sin x - \frac{x^3}{3}.$$

$$4.444. \quad \begin{cases} u(x) = \int_0^x J_0(\sqrt{x^2 - y^2}) v(y) dy + 1 + x, \\ v(x) = \int_0^x I_0(\sqrt{x^2 - y^2}) u(y) dy - e^{-x}. \end{cases}$$

Решить уравнения 4.445–4.449 при условии $u(0) = 0$.

$$4.445. \quad \int_0^x (2y - x) u(y) dy = x \sqrt{x} I_3(2\sqrt{x}).$$

$$4.446. \quad \int_0^x (4xy - x^2 - 3y^2) u(y) dy = 2x^2 J_4(2\sqrt{x}).$$

$$4.447. \quad \int_0^x \frac{2y - x}{\sqrt{x - y}} u(y) dy = x J_2(2\sqrt{x}).$$

$$4.448. \int_0^x (x-4y)\sqrt{x-y} u(y) dy = x^2 I_4(2\sqrt{x}).$$

$$4.449. \int_0^x (x-6y) \sqrt[3]{(x-y)^2} u(y) dy = x\sqrt{x} J_3(2\sqrt{x}).$$

Пример 4.16. Интегральное уравнение, содержащее несобственный интеграл, называется *сингулярным*. Некоторые уравнения этого типа могут быть решены с помощью интегральных преобразований. Сингулярное уравнение

$$u(x) = 2 + \frac{1}{\sqrt{\pi x}} - 2 \int_0^{\infty} \frac{\sin 2\sqrt{xy}}{\sqrt{\pi y}} u(y) dy$$

посредством преобразования Лапласа трансформируется в функциональное уравнение (см. пример 3.9)

$$U(p) = \frac{2}{p} + \frac{1}{\sqrt{p}} - \frac{2}{p\sqrt{p}} U\left(\frac{1}{p}\right). \quad (4.38)$$

Замена $p \rightarrow 1/p$ преобразует это уравнение в

$$U\left(\frac{1}{p}\right) = 2p + \sqrt{p} - 2p\sqrt{p} U(p). \quad (4.39)$$

Из (4.38) и (4.39) следует, что

$$U(p) = \frac{1}{\sqrt{p}} \Leftrightarrow u(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi x}}.$$

Решить уравнения 4.450–4.462, применяя интегральное преобразование Лапласа.

$$4.450. \int_x^{\infty} \frac{u(y) dy}{\sqrt{y-x}} = f(x).$$

$$4.451. \int_x^{\infty} \frac{u(y) dy}{\sqrt{y^2-x^2}} = f(x).$$

$$4.452. \int_{-\infty}^{\infty} u(\sqrt{y^2+x^2}) dy = f(x).$$

$$4.453. u(x) = \frac{1}{2}e^x + \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\infty} \frac{\sin 2\sqrt{xy}}{\sqrt{\pi y}} u(y) dy.$$

$$4.454. u(x) = \operatorname{arctg} \sqrt{x} - \sqrt{2} \int_0^{\infty} \frac{\sin 2\sqrt{xy}}{\sqrt{\pi y}} u(y) dy.$$

$$4.455. u(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{x^3}} + \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{\cos 2\sqrt{xy}}{\sqrt{\pi x}} u(y) dy.$$

$$4.456. u(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - 2 \int_0^\infty J_0(2\sqrt{xy}) u(y) dy.$$

$$4.457. u(x) = e^{-x} + \frac{1}{2} \int_0^\infty J_0(2\sqrt{xy}) u(y) dy.$$

$$4.458. u(x) = \cos^2 \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \int_0^\infty \sqrt{\frac{x}{y}} J_1(2\sqrt{xy}) u(y) dy.$$

$$4.459. u(x) = 1 - 2x + 2 \int_0^\infty \frac{x}{y} J_2(2\sqrt{xy}) u(y) dy.$$

$$4.460. u(x) = J_0(x) + \mu \int_0^\infty J_0(2\sqrt{xy}) u(y) dy, \quad |\mu| \neq 1.$$

$$4.461. \int_0^\infty \frac{e^{-\frac{y^2}{4x}}}{\sqrt{\pi x}} u(y) dy = (\sqrt{x} + 1)^2.$$

$$4.462. \int_0^\infty \frac{e^{-\frac{y^2}{4x}}}{\sqrt{\pi x}} u(y) dy = \operatorname{Erf} \left(\frac{\alpha}{2\sqrt{x}} \right), \quad \alpha > 0.$$

Решить уравнения 4.463–4.475, применяя интегральное преобразование Меллина.

$$4.463. \int_0^\infty \ln \left| \frac{x}{y} - 1 \right| u(y) \frac{dy}{\sqrt{y}} = \eta(x - a) \ln \frac{a}{x}, \quad a > 0, \quad x > 0.$$

$$4.464. \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{x(\ln x - \ln y)}{y(x + y)} u(y) dy = \ln(x + 1).$$

$$4.465. \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{\ln \sqrt{y} + \sqrt{x}}{|\sqrt{y} - \sqrt{x}|} u(y) dy = \eta(1 - x) \ln x.$$

$$4.466. u(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{xu(y) dy}{x^2 + y^2} + \ln \frac{|x - 1|}{x + 1}.$$

$$4.467. u(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \ln |x^2 - 1| - \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{u(y) dy}{x + y}.$$

$$4.468. u(x) = \int_x^\infty \ln \frac{y}{x} u(y) \frac{dy}{y} + \left(1 - \frac{1}{6} \ln^2 x \right) \ln x \eta(1 - x).$$

$$4.469. u(x) = \frac{1}{2} \int_x^\infty \sqrt{\frac{y}{x}} u(y) \frac{dy}{y} + \frac{x}{x + 1}.$$

$$4.470. \int_0^{\infty} x e^{-xy} u(y) dy = e^{-x}.$$

$$4.471. \int_0^{\infty} \ln |xy - 1| u(y) dy = \ln(x + 1).$$

$$4.472. \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \cos xy u(y) dy = e^{-x}.$$

$$4.473. \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \sin \sqrt{xy} u(y) \frac{dy}{y} = e^{-\sqrt{x}}.$$

$$4.474. u(x) = e^{-x} + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \cos xy u(y) dy.$$

$$4.475. u(x) = \frac{x}{1+x^2} + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \sin xy u(y) dy.$$

4.476. Решить интегральное уравнение

$$\int_0^{\infty} \ln |y - x| u(y) dy = A \ln(a + x), \quad a > 0, \quad x > 0,$$

при условии $\int_0^{\infty} u(x) dx < \infty$.

4.477. Показать, что при условиях задачи 4.18 освещенность плоскости $z = 0$ равна

$$E_1(r) = \frac{I}{l^2} \int_0^{\infty} \frac{e^{-\frac{l}{t}t} + \alpha_2 t K_1(t) e^{-\frac{l_2}{t}t}}{1 - \alpha_1 \alpha_2 t^2 K_1^2(t)} J_0\left(\frac{rt}{l}\right) t dt.$$

4.478. В нелинейных упругих средах с памятью может распространяться волна $f(t - x)$ с постоянным профилем; функция $f(t)$ удовлетворяет нелинейному интегральному уравнению с нулевым начальным условием (задача 4.5)

$$k f^2(t) - \int_0^t R(t - \tau) f(\tau) d\tau = 0, \quad f(0) = 0.$$

Найти нетривиальное решение уравнения:

1) в форме степенной функции для степенного ядра $R(t) = C t^{\alpha-1}$, $0 < t$, $0 < \alpha \leq 1$, $C > 0$;

- 2) для экспоненциального ядра $R(t) = Ce^{-\alpha t}$, $t \geq 0$, $\alpha > 0$, $C > 0$;
 3) для осциллирующего ядра $R(t) = C \sin \omega t$, $t \geq 0$, $\omega > 0$, $C > 0$.

4.479. Применяя операторы дробного интегрирования и дифференцирования (см. задачу 10.239), решить уравнение Абеля

$$\int_0^x \frac{u(\xi) d\xi}{(x-\xi)^\alpha} = h(x), \quad h(0) = 0, \quad h \in C^1(x \geq 0).$$

4.480. Применяя операторы дробного интегрирования и дифференцирования (см. задачу 10.240), решить обобщенное уравнение Абеля

$$\int_a^x \frac{u(\xi) d\xi}{(x-\xi)^\alpha} = h(x), \quad h(a) = 0, \quad h \in C^1(a \leq x).$$

4.3. Ответы

4.1. $v(x) = \mu \int_0^l K(x, \xi) v(\xi) d\xi$, $\mu = \omega^2$, $K(x, \xi) = \sqrt{\rho(x)S(x)\rho(\xi)S(\xi)} G(x, \xi)$.

4.2. $\omega = \sqrt{\mu_1}$, где μ_1 — наименьшее характеристическое число симметричного ядра $K(x, \xi) = \sqrt{\rho(x)\rho(\xi)S(x)S(\xi)} G(x, \xi)$.

4.3. Р е ш е н и е. Разность потенциалов между точками A и B (рис. 4.1)

$$u(t) = \Phi'(t) = i_L(t)R = \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau,$$

следовательно, $i_1 = \frac{u}{R}$, $i_2 = Cu'$. Так как $i + i_1 + i_2 = 0$, то функция $u(t)$ является решением задачи Коши

$$u' + \frac{1}{CR}u = -\frac{1}{C}i, \quad u(0) = u_0.$$

Исходя из решения $\text{const} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$ однородного уравнения $u' + \frac{1}{CR}u = 0$. Решение неоднородного уравнения можно отыскивать в виде (метод вариации постоянной)

$$u(t) = A(t) e^{\frac{t}{RC}}, \quad A(0) = u_0.$$

В результате

$$u(t) = u_0 e^{-\frac{t}{RC}} - \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) e^{-\frac{t-\tau}{RC}} d\tau.$$

Таким образом, поток магнитной индукции

$$\begin{aligned} \Phi(t) &= \int_0^t u(s) ds = e^{-\frac{s}{RC}} ds - \frac{1}{C} \int_0^t ds \int_0^s i(\tau) e^{-\frac{s-\tau}{RC}} d\tau = \\ &= u_0 RC (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) - \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau \int_\tau^t e^{-\frac{s-\tau}{RC}} ds. \end{aligned}$$

Равенство двух выражений для $\Phi(t)$ представляет собой интегральное уравнение для $i(t)$.

4.4. У к а з а н и е к п. 1. Из системы (1.9) следует уравнение

$$\frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial t^2} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x^2} = 0,$$

в которое нужно подставить ε в форме (4.15). Р е ш е н и е п. 2. Пусть

$$\Phi(x, t) = \sqrt{A + 2\gamma B\sigma} = \sqrt{A} \left(1 + \gamma \frac{B}{A} \sigma\right) + O(\gamma^2),$$

$$\Psi(t) = \frac{\sqrt{1 - \gamma \mathcal{R}}}{\rho} = \frac{1}{\rho} \left(1 - \frac{\gamma \mathcal{R}}{2}\right) + O(\gamma^2),$$

при $r \rightarrow \infty$.

Левая часть равенства (4.16) представляет собой сумму двух слагаемых:

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} \Phi \mp \Psi \frac{\partial}{\partial x}\right) \left(\Phi \frac{\partial}{\partial t} \pm \Psi \frac{\partial}{\partial x}\right) \sigma = \frac{\partial}{\partial t} \left(\Phi \Psi \frac{\partial \sigma}{\partial t}\right) - \Psi \Phi \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x^2} \mp \left(\Psi \frac{\partial}{\partial x} \Phi \frac{\partial \sigma}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial t} \Phi \Psi \frac{\partial \sigma}{\partial x}\right).$$

Второе слагаемое можно преобразовать с помощью тождества

$$\frac{\partial}{\partial t} f(\sigma) \frac{\partial \sigma}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} f(\sigma) \frac{\partial \sigma}{\partial t},$$

и это слагаемое принимает вид

$$\frac{\partial}{\partial x} \Psi \Phi \frac{\partial \sigma}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial t} \Phi \Psi \frac{\partial \sigma}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial t} (\Psi \Phi - \Phi \Psi) \frac{\partial \sigma}{\partial x} = -\frac{B\gamma^2}{2\sqrt{A\rho}} (\mathcal{R}\sigma - \sigma\mathcal{R}) \frac{\partial \sigma}{\partial x} = O(\gamma^2).$$

4.5. Р е ш е н и е. Если $f(t - x)$ удовлетворяет уравнению (4.18), то

$$\left(f - \frac{k\gamma}{2} f^2\right)' - f' = \frac{\gamma}{2} \mathcal{R} f' = 0$$

или

$$(k\gamma f^2)' - \gamma \mathcal{R} f' = 0,$$

откуда

$$rf^2(t - x) - \int_0^t R(t - \tau) f(t - \tau) d\tau = C.$$

Если заменить $t - x \rightarrow t$ и учесть, что из условия $f(0) = 0$ следует $C = 0$, то получится уравнение (4.19).

4.6. У к а з а н и е. См. задачу 3.45.

4.7. На рис. 4.2 показано построение изображения C' точки C объекта, F — положение фокуса линзы L . В приближении геометрической оптики




Рис. 4.2

изображение точки C в плоскости α представляет собой (из-за размытости) круг, диаметр которого $MN = 2r$, а световой пучок, сходящийся в точку на плоскости β , равномерно распределен по площади σ этого круга. Так как $\triangle ABC' \sim \triangle MNC'$, то

$$\frac{2r}{h} = \frac{2R}{b} \implies r = \frac{Rh}{b}.$$

Освещенности изображений в точке (x, y) плоскости β и в точке (x, y) плоскости α соответственно равны: от единичного потока из точки C объекта — $\delta(x - \xi)\delta(y - \eta)$, (где (ξ, η) — координаты точки C') и $E(\sigma)$, от полного потока из точки C объекта — $u(\xi, \eta)\delta(x - \xi)\delta(y - \eta)$; $u(\xi, \eta)E(\sigma)$ — от потока из всех точек C объекта — $\int_S \delta(x - \xi)\delta(y - \eta)u(\xi, \eta)d\xi d\eta = u(x, y)$ и

$$v(x, y) = \int_S E \left((x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 \right) u(\xi, \eta) d\xi d\eta.$$

4.8. У к а з а н и е. Из закона сохранения энергии $\frac{m\dot{x}^2}{2} + U(x) = E$ получить уравнение

$$T(E) = 2\sqrt{2m} \int_0^{x_0(E)} \frac{dx}{\sqrt{E - U(x)}},$$

где $x_0(E)$ — корень уравнения $U(x) - E = 0$, и перейти к переменной интегрирования U .

4.9. Р е ш е н и е. Функция $u(x, y, z, t)$ удовлетворяет уравнению $u_{tt} = c^2 \Delta u$, граничному условию $u(0, 0, z, t)|_{z>0} = -f(z - ct)$ и (при любом t) условиям излучения (1.83). В переменных $\xi = z - ct$, $\eta = r - ct$ (они выбраны с учетом расходящейся волны) задача примет вид

$$\frac{\partial}{\partial \xi}(\xi - \eta) \frac{\partial u}{\partial \eta} = 0, \quad \eta > \xi, \quad (4.40)$$

$$u|_{\xi=\eta} = -f(\xi), \quad u|_{\eta=\infty} = 0. \quad (4.41)$$

Решение уравнения (4.40)

$$u(\xi, \eta) = \int_{\eta}^{\infty} \frac{v(s) ds}{s - \xi} + w(\xi)$$

удовлетворяет условиям (4.41), если

$$w(\xi) = 0, \quad f(\xi) = \int_{\xi}^{\infty} \frac{v(s) ds}{s - \xi}.$$

4.12. У к а з а н и е. В момент времени t в элементе объема $d\mathbf{r}$ с координатой $\mathbf{r}$ содержится $n(\mathbf{r}, t) d\mathbf{r} = \int_1 n(\mathbf{r}, \mathbf{l}, t) d\mathbf{l} d\mathbf{r}$ нейтронов, где $n(\mathbf{r}, t)$ — их плотность, $n(\mathbf{r}, \mathbf{l}, t)$ — функция распределения (см. пример 1.13). Полагая $d\mathbf{r} = ds v dt$, можно сказать, что $n(\mathbf{r}, \mathbf{l}, t) d\mathbf{r} d\mathbf{l} = dN$ — число нейтронов со скоростями в интервале от v до $v + vd\mathbf{l}$, которые пересекают элемент площади $d\mathbf{S} = dS \mathbf{l}$ за время от t до $t + dt$ и поступают из конуса с вершиной в точке $\mathbf{r}$, осью $-\mathbf{l}$, раствором $d\mathbf{l}$. Нейтроны, выходящие из элемента $d\mathbf{r}_1 = r_1^2 dr_1 d\mathbf{l}$ конуса, где $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}' - \mathbf{r}$, $\mathbf{r}'$ — координата элемента, могут достичь площадки dS в момент t , если они испытали рассеяние или были испущены источниками в момент $t - \frac{r_1}{v}$. Если dN_1 — их число, то

$$dN = \int_0^{R(r, -\mathbf{l})} dN_1 \frac{dS}{4\pi r_1^2} e^{-\Sigma r_1},$$

где интегрирование осуществляется по переменной r_1 , точка $R(r, -\mathbf{l}) \in \Omega$.

$$4.13. \quad \Phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Omega} \left[\Sigma_s \Phi\left(\mathbf{r}', t - \frac{|\mathbf{r}' - \mathbf{r}|}{v}\right) + F\left(\mathbf{r}', t - \frac{|\mathbf{r}' - \mathbf{r}|}{v}\right) \right] \exp\left[-\int_0^{|\mathbf{r}' - \mathbf{r}|} \Sigma\left(\mathbf{r}' - \eta \frac{\mathbf{r}' - \mathbf{r}}{|\mathbf{r}' - \mathbf{r}|}\right) d\eta\right] \frac{dr'}{|\mathbf{r}' - \mathbf{r}|^2}.$$

4.14. У к а з а н и е. В уравнении Пайерлса

$$\Phi(x) = \frac{1}{4\pi} \int_a^b [\Sigma_s \Phi(\xi) + F(\xi)] d\xi = \int_{-\infty}^{\infty} \int \frac{\exp(-\Sigma \sqrt{(\xi-x)^2 + (\eta-y)^2 + (\zeta-z)^2})}{(\xi-x)^2 + (\eta-y)^2 + (\zeta-z)^2} d\eta d\zeta$$

перейти к полярным координатам $\eta - x = \rho \cos \varphi$, $\zeta - z = \rho \sin \varphi$ и ввести новую переменную

$$\chi^2 = \frac{(\xi-x)^2 + \rho^2}{(\xi-x)^2}.$$

4.15. У к а з а н и е. Пролодав те же выкладки, что и в указании к предыдущей задаче, получить уравнение

$$\Phi(x) = \frac{1}{2} \int_a^b [\Sigma_s(\xi) \Phi(\xi) + F(\xi)] d\xi \int_1^{\infty} \frac{1}{\chi} \exp\left[-\int_0^{\chi|\xi-x|} \Sigma\left(\xi - \frac{\tau(\xi-x)}{\chi|\xi-x|}\right) d\tau\right] d\chi,$$

в котором сделать замену $\varkappa = \xi - \frac{\tau(\xi-x)}{\chi|\xi-x|}$.

4.16. У к а з а н и е. Функция $\Phi(\xi, \mu)$ удовлетворяет условиям

$$\begin{aligned} \mu \Phi_{\xi} + \Phi &= \frac{1}{2} v n, \quad 0 < \xi < \Delta, \\ \Phi(0, \mu) &= 0, \quad \mu > 0, \\ \Phi(\delta, \mu) &= v \chi(\mu), \quad \mu < 0. \end{aligned}$$

Решение уравнения относительно Φ :

$$\Phi(\xi, \mu) = \frac{v}{2\mu} \cdot \begin{cases} \int_0^{\xi} n(\eta) e^{\frac{\eta-\xi}{\mu}} d\eta, & \mu > 0, \\ \int_{\Delta}^{\xi} n(\eta) e^{\frac{\eta-\xi}{\mu}} d\eta + \chi(\mu) e^{\frac{\Delta-\xi}{\mu}}, & \mu < 0, \end{cases}$$

проинтегрировать по μ .

4.17. $n(\xi) = \int_0^{\infty} K(\xi - \eta) n(\eta) d\eta$, где $K(s)$ имеет вид (4.21). У к а з а н и е.

Функция распределения — решение задачи

$$\begin{aligned} \mu \psi_{\xi} + \psi &= \frac{1}{2} u, \quad 0 < \xi, \\ \psi(0, \mu) &= 0, \quad \mu > 0, \\ \psi(\infty, \mu) &= 0, \quad -1 < \mu < 0. \end{aligned}$$

4.19. У к а з а н и е. Задача

$$\begin{aligned} u''(t) &= -H(u(t), t), \quad 0 < t < \frac{T}{4}, \\ u'(0) &= u\left(\frac{T}{2}\right) = 0 \end{aligned}$$

сводится к уравнению

$$u(t) = \int_0^{\frac{T}{4}} G(t, \tau) H(u(\tau), \tau) d\tau,$$

где функция $G(t, \tau)$ удовлетворяет условиям

$$\begin{aligned} G_{tt} &= -\delta(t - \tau), \quad 0 < t < \frac{T}{4}, \\ G_t|_{t=0} &= G_t|_{t=\frac{T}{4}} = 0. \end{aligned}$$

4.20. $v(t) = \frac{g}{l} \int_0^{\frac{T}{2}} G(t, \tau) \sin[v(\tau) - h(\tau)] d\tau$, где $v(t) = u(t) + h(t)$, $h(t) = \frac{F_0 T^2}{4\pi^2 ml} \sin \frac{2\pi t}{T}$, $G(t\tau) = \begin{cases} \frac{T-2\tau}{T}t, & 0 \leq t \leq \tau, \\ \frac{T-2\tau}{T}\tau, & \tau \leq t \leq \frac{T}{2}. \end{cases}$

У к а з а н и е. Решать краевую задачу

$$\begin{aligned} u''(t) + \frac{G}{l} \sin u(t) &= \frac{F_0}{ml} \sin \frac{2\pi t}{T}, \quad 0 < t < \frac{T}{2}, \\ u(0) &= u\left(\frac{T}{2}\right) = 0. \end{aligned}$$

4.22.




Рис. 4.3

4.25. $u(x) = \frac{16x^2}{\sqrt{\pi}} (4x^4 - 5) e^{-x^4}.$

4.26. $u(x) = \frac{1}{\alpha} \frac{d}{dx} (x^{1-\alpha} f'(x)).$

4.27. $u(x) = \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(x).$

4.28. $u(x) = \frac{1}{x^n} \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{f(x)}{x^n} \right).$

4.29. $u(x) = \frac{1}{\alpha} f''(x) - f'(x).$

$$4.30. u(x) = \frac{f''(x) - (\alpha + \beta)f'(x) + \alpha\beta f(x)}{\alpha - \beta} e^{-(\alpha + \beta)x}.$$

$$4.31. u(x) = \frac{e^{\alpha x}}{n! \alpha^n} \left(e^{-\alpha x} \frac{d}{dx} \right)^{n+1} f(x).$$

$$4.32. u(x) = f'(x) - \alpha\beta x^{\beta-1} f(x).$$

$$4.33. u(x) = \frac{f^{iv}(x) + (\alpha^2 + \beta^2)f''(x) + \alpha^2\beta^2 f(x)}{\alpha\beta(\alpha^2 - \beta^2)}.$$

$$4.34. u(x) = \frac{\operatorname{sh} \alpha x}{n! \alpha^n} \left(\frac{1}{\operatorname{sh} \alpha x} \frac{d}{dx} \right)^{n+1} f(x).$$

$$4.35. u(x) = \frac{(-1)^n}{n! \alpha^n \sqrt{1 - \alpha^2 x^2}} \left(\sqrt{1 - \alpha^2 x^2} \frac{d}{dx} \right)^{n+1} f(x).$$

$$4.36. u(x) = \frac{f^{iv}(x) - (\alpha^2 + \beta^2)f''(x) + \alpha^2\beta^2 f(x)}{\alpha\beta(\alpha^2 - \beta^2)}.$$

$$4.37. u(x) = \frac{1}{\alpha} \frac{d}{dx} \left(\frac{f'(x)}{\operatorname{sh} 2\alpha x} \right).$$

$$4.38. u(x) = \frac{1}{\alpha} \frac{d}{dx} \left(\frac{f'(x)}{\operatorname{ch} x \operatorname{sh}^{\alpha-1} x} \right).$$

$$4.39. u(x) = \frac{1}{n! x} \left(x \frac{d}{dx} \right)^{n+1} f(x).$$

$$4.40. u(x) = \frac{\ln x}{2^n n! x} \left(\frac{x}{\ln x} \frac{d}{dx} \right)^{n+1} f(x).$$

$$4.41. u(x) = (x + b)f''(x) + f'(x).$$

$$4.42. u(x) = \frac{Ax^{\frac{\alpha}{2}-1}}{\ln^{\alpha} kx} \left[\alpha \left(x^{\frac{\alpha}{2}} - \frac{1}{2} a^{\frac{\alpha}{2}} \right) \ln kx - (1 - \alpha) \left(x^{\frac{\alpha}{2}} - a^{\frac{\alpha}{2}} \right) \right].$$

$$4.43. u(x) = \frac{(-1)^n}{n! \alpha^n \sin^2 \alpha x} \left(\sin^2 \alpha x \frac{d}{dx} \right)^{n+1} f(x).$$

$$4.44. u(x) = 2A \frac{kx(x-a)Y_0(kx) - (2x-a)Y_1(kx)}{kxY_1^2(rx)}.$$

$$4.45. u(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{xf'(x)}{\nu J_{\nu}(\alpha x) - \alpha x J_{\nu+1}(\alpha x)} \right).$$

$$4.46. u(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{xf'(x)}{\nu K_{\nu}(\alpha x) - \alpha x K_{\nu+1}(\alpha x)} \right).$$

$$4.47. u(x) = \frac{2A}{3} \left(1 + \frac{2}{(2x-1)^{\frac{3}{2}}} \right).$$

У к а з а н и е. Посредством дифференцирования интегральное уравнение сводится к задаче Коши

$$(2x-1)v' + v = 2Ax, \quad 1 < x, \quad v(1) = 0, \quad \text{где } v(x) = \int_1^x u(y)dy.$$

$$4.48. u(x) = \frac{A}{8x^2\sqrt{x}} \left(1 - \frac{3}{2} \ln \frac{x}{a} \right).$$

$$4.49. u(x) = \frac{2}{3} \left(1 + \frac{a^2}{x^2} \right).$$

$$4.50. u(x) = \frac{A}{4x^4} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{6} \left(\frac{x}{a} \right)^{\frac{4}{3}} - 2 \ln \frac{x}{a} \right).$$

$$4.51. u(x) = \frac{A}{4x} \sqrt[4]{\frac{a}{x}}.$$

$$4.52. u(x) = \frac{A}{2\sqrt[4]{x^3}} \left(\frac{1}{3} \sqrt[12]{\frac{a}{x}} - \frac{1}{2} \right).$$

$$4.53. u(x) = \frac{A}{10\sqrt{x}} \left[(4x^4 + x^2 - 1)e^{x^2} - (a^2 - 1)e^{a^2} \right].$$

$$4.54. u(x) = \frac{2C}{3A} \left[1 + \frac{(Aa - B)\sqrt{2aA + B}}{(2ax + B)^{\frac{3}{2}}} \right].$$

$$4.55. u(x) = 2C \left[\frac{3(A+B)x}{2A+B} - \frac{2(A+B)a}{3A+B} + \frac{(B-A)(7A+3B)a}{2(2A+B)(3A+B)} \left(\frac{a}{x} \right)^{\frac{3A+B}{A+B}} \right].$$

$$4.56. u(x) = \frac{1}{A+B} \frac{d}{dx} \left(x^{-\frac{3A}{A+B}} \int_a^x y^{-\frac{3B}{A+B}} f'(y) dy \right).$$

$$4.57. u(x) = A(\alpha a^2 + 2x - \alpha x^2).$$

$$4.58. u(x) = \frac{A}{2\sqrt{x}} e^{-(\alpha+\beta)x} (1 - 2a\alpha\sqrt{x}(\sqrt{x} - \sqrt{a})).$$

$$4.59. u(x) = \frac{Ae^{-x}}{3} \left[\left(3x + \frac{1}{2} \right) e^{-2x} - \left(a + \frac{1}{2} \right) e^{-2a} \right].$$

$$4.60. u(x) = \frac{4A}{3} \left[\frac{5}{3} (x-a) - (x-a)^2 + \frac{1}{9} - \frac{1}{9} e^{-\frac{3}{2}(a-x)} \right].$$

$$4.61. u(x) = \frac{A}{2} \left[-\alpha - \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \frac{\operatorname{erf} \sqrt{\alpha x}}{x\sqrt{x}} e^{\alpha x} + \frac{1}{2x} \right].$$

$$4.62. u(x) = \frac{2A}{15} \left(\frac{138}{25} + \frac{73x}{5} - 3x^2 - \frac{8}{25} e^{\frac{5}{3}x} \right). \quad \text{У к а з а н и е. Последовательным дифференцированием и исключением интегральных слагаемых уравнение сводится к задаче Коши:}$$

$$3v' + 4v = -2A(x^2 + x - 1)e^{-3x}, \quad 0 < x, \quad v(0) = 0, \quad u(x) = e^{3x}v'(x).$$

$$4.63. u(x) = Ae^{-4x} (2a + 5 - 2x - 6e^{a-x}).$$

$$4.64. u(x) = \frac{2C}{A+B} x e^{-\frac{B\alpha x^2}{A+B}} \left(2e^{-\frac{B\alpha x^2}{A+B}} - e^{\frac{B\alpha a^2}{A+B}} \right).$$

$$4.65. u(x) = \frac{e^{-\alpha x}}{A+B} \frac{d}{dx} \left[e^{\frac{B(\alpha-\beta)x}{A+B}} \int_a^x e^{\frac{A(\alpha-\beta)y}{A+B}} \left(f(y)e^{-\alpha y} \right)' dy \right].$$

$$4.66. u(x) = \frac{C}{A+B} \left| \frac{\ln a}{\ln x} \right| \frac{\frac{A}{A+B}}{x \ln x}.$$

$$4.67. u(x) = \frac{1}{A+B} \frac{d}{dx} \left[|\ln \alpha x|^{-\frac{2A}{A+B}} \int_a^x \ln \alpha y |^{-\frac{2B}{A+B}} f'(y) dy \right].$$

$$4.68. u(x) = f'(x) + \alpha \int_a^x f'(y) \sin(x-y) dy,$$

$$u(x) = 4Aa - 2A(a \cos k(x-a) - \frac{1}{k} \sin k(x-a)), \quad k^2 = 2\alpha^2.$$

У к а з а н и е. После трехкратного дифференцирования и исключения интегрального слагаемого для решения $u(x)$ получается задача Коши

$$\begin{cases} u'' + 2\alpha^2 u = f''' + 4\alpha^2 f', \\ u(a) = f'(a), \quad u'(a) = f'(a). \end{cases}$$

$$4.69. u(x) = \frac{A}{\operatorname{ch}^3 x} \left[\operatorname{ch}^2 x - (x-a) \operatorname{sh} 2x - (x-a)^2 \right].$$

$$4.70. u(x) = \frac{1}{A+B} \frac{d}{dx} \left[|J_\nu(\alpha x)|^{-\frac{2A}{A+B}} \int_a^x |J_\nu(\alpha y)|^{-\frac{2B}{A+B}} f'(y) dy \right].$$

$$4.71. u(x) = f(x) + \mu \int_a^x f(y) e^{\mu(x-y)} dy.$$

$$4.72. u(x) = A x e^{\frac{\mu}{2}(x^2-a^2)}.$$

$$4.73. u(x) = x \sin x.$$

$$4.74. u(x) = \frac{A}{3} e^{-2k(x-a)} + \frac{2A}{3} e^{-k(x-a)} \cos k\sqrt{3}(x-a), \quad k = \sqrt[3]{\frac{\mu}{4}}.$$

У к а з а н и е. Интегральное уравнение последовательным дифференцированием сводится к эквивалентной задаче Коши

$$\begin{cases} u'' - 2\mu = 0, \\ u(a) = A, \quad u'(a) = u''(a) = 0. \end{cases}$$

$$4.75. u(x) = \frac{1}{13} \left(\sin x + 8 \cos x + \frac{4\sqrt{3}}{3} e^{-x} \sin \sqrt{3}x - 8e^x \cos \sqrt{3}x \right).$$

$$4.76. u(x) = A x^3 e^{\frac{\mu}{4}(x^4-a^4)}.$$

$$4.77. u(x) = \frac{A}{\mu} \left[(\mu a^4 + 4) e^{\frac{\mu}{4}(x^4-a^4)} - 4 \right].$$

$$4.109. u(x) = \frac{(x^2-3) \sin x + (x^2+4x+1) \cos x}{(x+1)^3}.$$

$$4.110. u(x) = \frac{\pi}{2} [Y_1(1) J_1'(x+1) - J_1(1) Y_1'(x+1)].$$

$$4.108. \text{ Если } \beta - \alpha - \mu \neq 0, \text{ то } u(x) = \frac{A e^{\beta x}}{\beta - \alpha - \mu} \left(\beta - \alpha - \mu e^{(\beta - \alpha - \mu)(a-x)} \right);$$

если $\beta - \alpha - \mu = 0$, то $u(x) = A e^{\beta x} (1 + \mu(x-a))$.

4.81. $u(x) = \frac{A}{2} (5e^{4(a-x)} - 4e^{a-x} + 1)$. У к а з а н и е. В результате двукратного дифференцирования и исключения каждый раз интегрального слагаемого для решения $u(x)$ получается задача Коши

$$\begin{cases} u'' + 5u' + 10u = 2A, \\ u(a) = A, \quad u'(a) = -8A. \end{cases}$$

4.82. Если $D = \alpha(\alpha - 4\mu) > 0$, то

$$u(x) = A e^{\frac{\alpha(x-a)}{2}} \left[\operatorname{ch} \frac{\sqrt{D}(x-a)}{2} - \frac{\alpha}{\sqrt{D}} \operatorname{sh} \frac{\sqrt{D}(x-a)}{2} \right], \text{ если } D < 0, \text{ то}$$

$$u(x) = A e^{\frac{\alpha(x-a)}{2}} \left[\cos \frac{\sqrt{|D|}(x-a)}{2} - \frac{\alpha}{\sqrt{|D|}} \sin \frac{\sqrt{|D|}(x-a)}{2} \right], \text{ если } D = 0, \text{ то}$$

$$u(x) = A e^{\frac{\alpha(x-a)}{2}} \left(1 - \frac{\alpha}{2}(x-a) \right).$$

4.83. Если $\mu < 0$, то

$$u(x) = \frac{A k e^{\alpha(x-a)}}{\alpha^2 + k^2} (k \cos k(x-a) - \alpha \sin k(x-a) + \frac{A \alpha^2}{\alpha^2 + k^2}, \text{ где } k = \sqrt{|\mu|}, \text{ если}$$

$$\mu > 0, \mu \neq \alpha^2, \text{ то } u(x) = \frac{A k e^{\alpha(x-a)}}{\alpha^2 - k^2} (\alpha \operatorname{sh} k(x-a) - k \operatorname{ch} k(x-a)) + \frac{A \alpha^2}{\alpha^2 - k^2},$$

$$\text{где } k = \sqrt{\mu}; \text{ если } \mu = \alpha^2, \text{ то } u(x) = \frac{3A}{4} + \frac{A}{4} e^{2\alpha(x-a)} - \frac{\alpha A}{2}(x-a).$$

$$4.84. u(x) = A e^{\frac{\mu}{\alpha}(\sin \alpha x - \sin \alpha a)}.$$

$$4.85. u(x) = A e^{\frac{\mu}{\alpha}(\cos \alpha a - \cos \alpha x)}.$$

$$4.86. \text{ Если } \mu^2 > 4\alpha^2, \text{ то } u(x) = A \left(1 + \frac{\mu}{k} e^{\frac{\mu}{2}(x-a)} \sin k(x-a) \right), \text{ где}$$

$$k = \frac{\sqrt{\mu^2 - 4\alpha^2}}{2}; \text{ если } \mu^2 < 4\alpha^2, \text{ то } u(x) = A \left(1 + \frac{\mu}{k} e^{\frac{\mu}{2}(x-a)} \operatorname{sh} k(x-a) \right), \text{ где}$$

$$k = \frac{\sqrt{4\alpha^2 - \mu^2}}{2}; \text{ если } \mu^2 = 4\alpha^2, \text{ то } u(x) = A \left[(1 + \mu(x-a)) e^{\frac{\mu}{2}(x-a)} \right].$$

$$4.87. u(x) = \frac{2\mu A}{\sqrt{\mu^2 + 4\alpha^2}} e^{\frac{\mu}{2}(x-a)} \operatorname{sh} \frac{\sqrt{\mu^2 + 4\alpha^2}}{2} (x-a).$$

$$4.88. \text{ Если } \mu^2 \neq \alpha^2, \text{ то } u(x) = \frac{A}{(\mu^2 - \alpha^2) \operatorname{sh} \alpha x} \left[e^{\mu(x-a)} \mu (\mu \operatorname{sh} \alpha a + \alpha \operatorname{ch} \alpha a) - \right. \\ \left. - \alpha (\mu \operatorname{ch} \alpha x + \alpha \operatorname{sh} \alpha x) \right];$$

$$\text{если } \mu = \alpha, \text{ то } u(x) = \frac{A}{\operatorname{sh} \mu x} \left[e^{\mu(x-a)} \operatorname{sh} \mu a + \frac{\mu}{2} e^{\mu x} \left(x - a - \frac{e^{-2\mu x} - e^{2\mu a}}{2\mu} \right) \right];$$

$$\text{если } \mu = -\alpha, \text{ то } u(x) = \frac{A}{\operatorname{sh} \mu x} \left[e^{\mu(x-a)} \operatorname{sh} \mu a + \frac{\mu}{2} e^{\mu x} \left(x - a + \frac{e^{2\mu x} - e^{2\mu a}}{2\mu} \right) \right].$$

$$4.89. u = \mu \int_0^x \frac{k(x)}{k(y)} f(y) e^{\mu(x-y)} dy + f.$$

$$1) u(x) = 1 - J_0(x) + J_1(x); \quad 2) u(x) = \frac{(\mu + 2) \sin x - \mu \cos x + \mu e^{(\mu+1)x}}{(\mu + 1)^2 + 1};$$

$$3) u(x) = x + \frac{\mu}{2} \left(e^{x^2+x} - 1 \right) - \frac{\mu \sqrt{\pi}}{4} e^{(x+\frac{\mu}{2})^2} \left[\operatorname{erf} \left(x + \frac{\mu}{2} \right) - \operatorname{erf} \frac{\mu}{2} \right].$$

$$4.90. \text{ Если } \mu < 0, \text{ то}$$

$$u(x) = -\frac{A\pi k\sqrt{a}}{2} x \left(Y_{\frac{1}{3}}(ka\sqrt{a}) J_{-\frac{2}{3}}(kx\sqrt{x}) - J_{\frac{1}{3}}(ka\sqrt{a}) Y_{-\frac{2}{3}}(kx\sqrt{x}) \right),$$

$$k = \frac{2}{3} \sqrt{-2\mu}, \text{ если } \mu > 0, \text{ то}$$

$$u(x) = Ak\sqrt{a} x \left(K_{\frac{1}{3}}(ka\sqrt{a}) I_{-\frac{2}{3}}(kx\sqrt{x}) + I_{\frac{1}{3}}(ka\sqrt{a}) K_{-\frac{2}{3}}(kx\sqrt{x}) \right), \quad k = \frac{2}{3} \sqrt{2\mu}.$$

У к а з а н и е. В результате дифференцирования интегральное уравнение сводится к задаче Коши

$$v'' - 2\mu x v = 0, \quad v(0) = 0, \quad v'(0) = A, \quad \text{где } v' = u.$$

Если $\mu < 0$, то замена $\xi = \frac{2}{3} \sqrt{-2\mu}$, $w = x^{-\frac{1}{2}} v$ преобразует уравнение для v в уравнение Бесселя (см. решение задачи 2.14)

$$w'' + \frac{1}{\xi} w' + \left(1 - \frac{1}{9\xi^2} \right) w = 0.$$

Таким образом, функции

$$v_1(x) = \sqrt{x} J_{\frac{1}{3}}(kx\sqrt{x}), \quad v_2(x) = \sqrt{x} Y_{\frac{1}{3}}(kx\sqrt{x}), \quad k = \frac{2}{3} \sqrt{-2\mu},$$

представляют собой фундаментальную систему решений уравнения для v . Вычисление производных этих решений проще всего проделать с помощью рекуррентных формул для цилиндрических функций, в результате

$$v'_1(x) = \frac{3kx}{2} J_{-\frac{2}{3}}(kx\sqrt{x}), \quad v'_2(x) = \frac{3kx}{2} Y_{-\frac{2}{3}}(kx\sqrt{x}),$$

так что определитель Вронского $W(v_1, v_2) = 3/\pi$. Константы C_1 и C_2 определяются начальными условиями. Ситуация при $\mu > 0$ аналогична.

4.91. $u(x) = f(x) - \frac{\mu x}{W} \int_a^x (u_1(x)u_2(y) - u_2(x)u_1(y))f(y)dy$; если $\mu < 0$, то $u_1(x) = \sqrt{x} J_{\frac{1}{3}}(kx\sqrt{x})$, $u_2(x) = \sqrt{x} Y_{\frac{1}{3}}(kx\sqrt{x})$, $k = \frac{2}{3}\sqrt{-\mu}$, $W = \frac{3}{\pi}$; если $\mu > 0$ то $u_1(x) = \sqrt{x} I_{\frac{1}{3}}(kx\sqrt{x})$, $u_2(x) = \sqrt{x} K_{\frac{1}{3}}(kx\sqrt{x})$, $k = \frac{2}{3}\sqrt{\mu}$, $W = -\frac{3}{2}$.
 Частный случай. Если $\mu < 0$, то $u(x) = \frac{Aka\pi x\sqrt{x}}{2} \left(Y_{-\frac{2}{3}}(ka\sqrt{a})J_{\frac{1}{3}}(kx\sqrt{x}) - J_{-\frac{2}{3}}(ka\sqrt{a})Y_{\frac{1}{3}}(kx\sqrt{x}) \right)$, $k = \frac{2}{3}\sqrt{-\mu}$; если $\mu > 0$, то $u(x) = Aka x\sqrt{x} \left(K_{-\frac{2}{3}}(ka\sqrt{a})I_{\frac{1}{3}}(kx\sqrt{x}) + I_{-\frac{2}{3}}(ka\sqrt{a})K_{\frac{1}{3}}(kx\sqrt{x}) \right)$, $k = \frac{2}{3}\sqrt{\mu}$.

У к а з а н и е. Интегральное уравнение сводится к задаче Коши

$$\begin{cases} v'' - \mu x v = f, \\ v(a) = v'(a) = 0, \end{cases}$$

где $v(x) = \int_a^x (x-y)u(y)dy$.

4.92. Если $\mu < 0$, то $u(x) = \frac{A\pi a k \sqrt{x}}{2} \left[Y_{-\frac{2}{3}}(ka\sqrt{a})J_{\frac{1}{3}}(kx\sqrt{x}) - J_{-\frac{2}{3}}(ka\sqrt{a})Y_{\frac{1}{3}}(kx\sqrt{x}) \right]$, где $k = \frac{2}{3}\sqrt{-\mu}$,
 если $\mu > 0$, то

$u(x) = Aka x\sqrt{x} \left[K_{-\frac{2}{3}}(ka\sqrt{a})I_{\frac{1}{3}}(kx\sqrt{x}) + I_{-\frac{2}{3}}(ka\sqrt{a})K_{\frac{1}{3}}(kx\sqrt{x}) \right]$, где $k = \frac{2}{3}\sqrt{\mu}$.

4.93. $u(x) = f(x) - \frac{\mu}{W} \int_a^x (u_1(x)u_2(y) - u_2(x)u_1(y))y^\alpha f(y)dy$; если $\mu < 0$, то $u_1(x) = \sqrt{x} J_{\frac{1}{2\beta}}\left(\frac{k}{\beta}x^\beta\right)$, $u_2(x) = \sqrt{x} Y_{\frac{1}{2\beta}}\left(\frac{k}{\beta}x^\beta\right)$, $k = \sqrt{-\mu}$, $\beta = \frac{\alpha+2}{2}$, $W = \frac{2\beta}{\pi}$; если $\mu > 0$, то $u_1(x) = \sqrt{x} I_{\frac{1}{2\beta}}\left(\frac{k}{\beta}x^\beta\right)$, $u_2(x) = \sqrt{x} K_{\frac{1}{2\beta}}\left(\frac{k}{\beta}x^\beta\right)$, $k = \sqrt{\mu}$, $\beta = \frac{\alpha+2}{2}$, $W = -\beta$.

Частный случай. Если $\mu < 0$, то $u(x) = \frac{A\pi k a^{\beta-\frac{1}{2}}\sqrt{x}}{2\beta} \times$
 $\times \left[Y_{\frac{1}{2\beta}-1}\left(\frac{\sqrt{-\mu}}{\beta}a^\beta\right)J_{\frac{1}{2\beta}}\left(\frac{\sqrt{-\mu}}{\beta}x^\beta\right) - J_{\frac{1}{2\beta}-1}\left(\frac{\sqrt{-\mu}}{\beta}a^\beta\right)Y_{\frac{1}{2\beta}}\left(\frac{\sqrt{-\mu}}{\beta}x^\beta\right) \right]$,
 если $\mu > 0$, то

$u(x) = \frac{k a^{\beta-\frac{1}{2}}\sqrt{x}}{\beta} \left[Y_{\frac{1}{2\beta}-1}\left(\frac{\sqrt{\mu}}{\beta}a^\beta\right)J_{\frac{1}{2\beta}}\left(\frac{\sqrt{\mu}}{\beta}x^\beta\right) - J_{\frac{1}{2\beta}-1}\left(\frac{\sqrt{\mu}}{\beta}a^\beta\right)Y_{\frac{1}{2\beta}}\left(\frac{\sqrt{\mu}}{\beta}x^\beta\right) \right]$.

У к а з а н и е. В результате дифференцирования интегральное уравнение сводится к задаче Коши $u'' - \mu x^\alpha u = f''$, $u(a) = f(a)$, $u'(a) = f'(a)$, решение которой, построенное методом вариации постоянных, содержит интегралы $\int_a^x u_i(y)f''(y)dy$, $i = 1, 2$. После двукратного интегрирования по частям производные $u_i''(y)$ следует заменить на $\mu x^\alpha u_i$ исходя из дифференциального уравнения, которому они удовлетворяют.

4.94. $u(x) = f(x) + \frac{1}{W} \int_a^x (u_1'(x)u_2'(y) - u_2'(x)u_1'(y))y^\alpha f(y)dy$; если $\alpha\mu < 0$, то $u_1(x) = \sqrt{x} J_{\frac{1}{2\beta}}\left(\frac{k}{\beta}x^\beta\right)$, $u_2(x) = \sqrt{x} Y_{\frac{1}{2\beta}}\left(\frac{k}{\beta}x^\beta\right)$, $k = \sqrt{-\mu\alpha}$, $\beta = \frac{\alpha+1}{2}$, $W = \frac{2\beta}{\pi}$, если $\alpha\mu > 0$, то $u_1(x) = \sqrt{x} I_{\frac{1}{2\beta}}\left(\frac{k}{\beta}x^\beta\right)$, $u_2(x) = \sqrt{x} K_{\frac{1}{2\beta}}\left(\frac{k}{\beta}x^\beta\right)$, $k = \sqrt{\mu\alpha}$, $\beta = \frac{\alpha+1}{2}$, $W = -\beta$.

Частный случай. Если $\alpha\mu < 0$, то

$$u(x) = -\frac{A\pi k\sqrt{\alpha}x^{\beta-\frac{1}{2}}}{2\beta} \left[J_{\frac{1}{2\beta}}\left(\frac{k}{\beta}a^\beta\right) Y_{\frac{1}{2\beta}-1}\left(\frac{k}{\beta}x^\beta\right) - Y_{\frac{1}{2\beta}}\left(\frac{k}{\beta}x^\beta\right) J_{\frac{1}{2\beta}-1}\left(\frac{k}{\beta}x^\beta\right) \right],$$

если $\alpha\mu > 0$, то

$$u(x) = \frac{Ak\sqrt{\alpha}x^{\beta-\frac{1}{2}}}{\beta} \left[K_{\frac{1}{2\beta}}\left(\frac{k}{\beta}a^\beta\right) I_{\frac{1}{2\beta}-1}\left(\frac{k}{\beta}x^\beta\right) + I_{\frac{1}{2\beta}}\left(\frac{k}{\beta}x^\beta\right) K_{\frac{1}{2\beta}-1}\left(\frac{k}{\beta}x^\beta\right) \right].$$

У к а з а н и е. В результате дифференцирования интегральное уравнение сводится к задаче Коши

$$\begin{cases} v'' - \mu\alpha x^{\alpha-1}v = f', \\ v(a) = 0, v'(a) = f(a), \end{cases}$$

где $v(x) = \int_a^x u(y)dy$. Если $\alpha\mu < 0$, то замена $\xi = \frac{\sqrt{-\mu\alpha}}{\alpha+1}x^{\frac{\alpha+1}{2}}$, $w = \frac{1}{\sqrt{x}}v$ приводит к уравнению Бесселя, так что функции

$$v_1(x) = \sqrt{x} J_{\frac{1}{2\beta}}\left(\frac{k}{\beta}x^\beta\right), \quad v_2(x) = \sqrt{x} Y_{\frac{1}{2\beta}}\left(\frac{k}{\beta}x^\beta\right), \quad \beta = \frac{\alpha+1}{2}, \quad k = \sqrt{-\alpha\mu},$$

представляют собой фундаментальную систему решений однородного уравнения для $v(x)$. Вычисление производных $v_1'(x)$, $v_2'(x)$ проводится с помощью рекуррентных формул для цилиндрических функций. Пусть $t = \frac{k}{\beta}x^\beta$, тогда

$$v_1'(x) = \frac{d}{dt}\left(\frac{\beta}{k}\right)^{\frac{1}{2\beta}} \cdot \frac{d}{dt}t^{\frac{1}{2\beta}} J_{\frac{1}{2\beta}}(t) = \left(\frac{\beta}{k}\right)^{1-\frac{1}{2\beta}} t^{1-\frac{1}{2\beta}} J_{\frac{1}{2\beta}-1}(t)k.$$

Аналогично, $v_2'(x) = k\left(\frac{\beta}{k}\right)^{1-\frac{1}{2\beta}} Y_{\frac{1}{2\beta}-1}(t)$. Отсюда на основании соотношения

$$J_\nu(x)Y_{\nu-1}(x) - Y_\nu(x)J_{\nu-1}(x) = \frac{2}{\pi x}$$

следует, что определитель Вронского фундаментальной системы решений $W = W(v_1, v_2) = \frac{2\beta}{\pi x}$. Решение задачи Коши получается методом вариации постоянных: $u(x) = C_1'(x)v_1(x) + C_2'(x)v_2(x)$, где $C_1'(x)$ и $C_2'(x)$ определяются системой уравнений

$$\begin{cases} C_1'v_1 + C_2'v_2 = 0, \\ C_1'v_1' + C_2'v_2' = f'(x). \end{cases}$$

Решение этой системы

$$C_1(x) = -\frac{1}{W} \int_a^x v_2(y)f'(y)dy + C_{10}, \quad C_2(x) = \frac{1}{W} \int_a^x v_1(y)f'(y)dy + C_{20};$$

для определения констант C_{10} и C_{20} нужно применить начальные условия. Решение интегрального уравнения $u(x) = v'(x)$ содержит интегральное слагаемое; окончательный вид решения получается после преобразования интеграла интегрированием по частям.

4.95. Если $\frac{\mu}{\alpha} < 0$, то

$$u(x) = A\pi k e^{\frac{\alpha x}{2}} \left[Y_0\left(2ke^{\frac{\alpha x}{2}}\right) J_1\left(2ke^{\frac{\alpha x}{2}}\right) - J_0\left(2ke^{\frac{\alpha x}{2}}\right) Y_1\left(2ke^{\frac{\alpha x}{2}}\right) \right], \quad k = \sqrt{-\frac{\mu}{\alpha}},$$

если $\frac{\mu}{\alpha} > 0$, то

$$u(x) = 2kAe^{\frac{\alpha x}{2}} \left[K_0\left(2ke^{\frac{\alpha x}{2}}\right) I_1\left(2ke^{\frac{\alpha x}{2}}\right) - I_0\left(2ke^{\frac{\alpha x}{2}}\right) K_1\left(2ke^{\frac{\alpha x}{2}}\right) \right], \quad k = \sqrt{\frac{\mu}{\alpha}}.$$

4.96. $u(x) = f(x) - \frac{\mu}{W} \int_a^x (u_1(x)u_2(y) - u_2(x)u_1(y))e^{\alpha y} f(y) dy$; если $\mu < 0$, то

$$u_1(x) = J_0(ke^{\frac{\alpha x}{2}}), \quad u_2(x) = Y_0(ke^{\frac{\alpha x}{2}}), \quad k = \frac{2\sqrt{-\mu}}{\alpha}, \quad W = \frac{\alpha}{\pi};$$

если $\mu > 0$, то $u_1(x) = I_0(ke^{\frac{\alpha x}{2}})$, $u_2(x) = K_0(ke^{\frac{\alpha x}{2}})$, $k = \frac{2\sqrt{\mu}}{\alpha}$, $W = -\frac{\alpha}{2}$,

Частный случай. Если $\mu < 0$, то

$$u(x) = -A\pi k e^{\frac{\alpha x}{2}} \left[J_1(ke^{\frac{\alpha x}{2}}) Y_0(ke^{\frac{\alpha x}{2}}) - Y_1(ke^{\frac{\alpha x}{2}}) J_0(ke^{\frac{\alpha x}{2}}) \right], \quad k = \frac{2\sqrt{-\mu}}{\alpha};$$

если $\mu > 0$, то $u(x) = 2Ake^{\frac{\alpha x}{2}} \left[K_1(ke^{\frac{\alpha x}{2}}) I_0(ke^{\frac{\alpha x}{2}}) + I_1(ke^{\frac{\alpha x}{2}}) K_0(ke^{\frac{\alpha x}{2}}) \right]$, где $k = \frac{2\sqrt{\mu}}{\alpha}$.

У к а з а н и е. В результате двукратного дифференцирования получается задача Коши

$$\begin{cases} u'' - e^{\alpha x} u = f'', \\ u(a) = f(a), \quad u'(a) = f'(a). \end{cases}$$

Замена $\xi = e^{\beta}$ при подходящем значении β приводит к уравнению Бесселя.

4.97. Если $\mu < 0$, то $u(x) = -A\pi k \sqrt{a} \left[Y_1(2k\sqrt{a}) J_0(2k\sqrt{x}) - J_1(2k\sqrt{a}) Y_1(2k\sqrt{x}) \right]$, где $k = \sqrt{-\mu}$; если $\mu > 0$, то

$$u(x) = 2Ak\sqrt{a} \left[K_1(2k\sqrt{a}) I_0(2k\sqrt{x}) + I_1(2k\sqrt{a}) K_0(2k\sqrt{x}) \right], \quad \text{где } k = \sqrt{\mu}.$$

4.98. $u(x) = f(x) + \frac{1}{W} \int_a^x e^{\beta(x-y)} (u'_1(x)u'_2(y) - u'_2(x)u'_1(y)) f(y) dy$,

u_1, u_2, W те же, что в ответе к задаче 4.97. У к а з а н и е. Замена

$$u(x)e^{-\beta x} = v(x), \quad f(x)e^{-\beta x} = g(x)$$

преобразует данное интегральное уравнение в уравнение задачи 4.97.

4.99. $u(x) = f(x) - \frac{\mu\alpha}{W} \int_a^x (u_1(x)u_2(y) - u_2(x)u_1(y)) y f(y) dy$; если $\alpha\mu < 0$,

то $u_1(x) = \sqrt{\xi} J_{\frac{1}{3}}(k\xi\sqrt{\xi})$, $u_2(x) = \sqrt{\xi} Y_{\frac{1}{3}}(k\xi\sqrt{\xi})$, $k = \frac{2}{3}\sqrt{-\mu\alpha}$, $\xi = x + \frac{\alpha}{\mu}$,

$W = \frac{3}{\pi}$; если $\alpha\mu > 0$, то $u_1(x) = \sqrt{\xi} I_{\frac{1}{3}}(k\xi\sqrt{\xi})$, $u_2(x) = \sqrt{\xi} K_{\frac{1}{3}}(k\xi\sqrt{\xi})$,

$k = \frac{2}{3}\sqrt{\mu\alpha}$, $\xi = x + \frac{\alpha}{\mu}$, $W = -\frac{2}{3}$.

У к а з а н и е. Дифференцирование и исключение интегрального слагаемого приводят к эквивалентной задаче Коши

$$\begin{cases} u'' - \alpha\mu\left(x + \frac{\alpha}{\mu}\right)u = f'' - \alpha^2 f, \\ u(a) = f(a), \quad u'(a) = f'(a). \end{cases}$$

Замена $\xi = x + \frac{\alpha}{\mu}$ преобразует дифференциальное уравнение в уравнение той же структуры, что и в ответе к задаче 4.90.

$$4.100. u(x) = f(x) - \frac{\mu\alpha x}{W} \int_a^x (u_1(x)u_2(y) - u_2(x)u_1(y))f(y)dy,$$

где u_1 и u_2 те же, что в ответе к предыдущей задаче.

$$4.101. u(x) = f(x) - \frac{\mu\alpha}{W} \int_a^x (u_1(x)u_2(y) - u_2(x)u_1(y))yf(y)dy; \text{ если } \alpha\mu < 0,$$

то $u_1(x) = \sqrt{\xi} J_{\frac{1}{3}}(k\xi\sqrt{\xi})$, $u_2(x) = \sqrt{\xi} Y_{\frac{1}{3}}(k\xi\sqrt{\xi})$, $k = \frac{2}{3}\sqrt{-\mu\alpha}$, $\xi = x - \frac{\alpha}{\mu}$, $W = \frac{3}{\pi}$, если $\alpha\mu > 0$, то $u_1(x) = \sqrt{\xi} I_{\frac{1}{3}}(k\xi\sqrt{\xi})$, $u_2(x) = \sqrt{\xi} K_{\frac{1}{3}}(k\xi\sqrt{\xi})$, $k = \frac{2}{3}\sqrt{\mu\alpha}$, $\xi = x - \frac{\alpha}{\mu}$, $W = -\frac{3}{2}$.

$$4.102. u(x) = f(x) - \frac{\mu\alpha x}{W} \int_a^x (u_1(x)u_2(y) - u_2(x)u_1(y))f(y)dy,$$

где u_1 и u_2 те же, что в ответе к предыдущей задаче.

$$4.103. u(x) = f(x) - \frac{\mu\alpha}{W} \int_a^x e^{\beta(x-y)}(u_1(x)u_2(y) - u_2(x)u_1(y))yf(y)dy; \text{ где } u_1$$

и u_2 приведены в ответе к задаче 4.101.

$$4.104. u(x) = f(x) - \frac{\mu\alpha x}{W} \int_a^x e^{\beta(x-y)}(u_1(x)u_2(y) - u_2(x)u_1(y))f(y)dy;$$

где u_1 и u_2 приведены в ответе к задаче 4.101.

$$4.105. u(x) = Ae^{-(\alpha+1)^2}(v_2'(x)v_1(a) - v_1'(x)v_2(a)), \quad v_1(x) = \Phi\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, (x+1)^2\right),$$

$$v_2(x) = (x+1)\Phi\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{2}, (x+1)^2\right); \quad \Phi'(\alpha, \gamma, x) = \frac{\alpha}{\gamma}\Phi(\alpha+1, \gamma+1, x).$$

У к а з а н и е. Интегральное уравнение эквивалентно задаче Коши

$$v'' - 2(x+1)v' - \alpha v = 0, \quad v(a) = 0, \quad v'(a) = A, \quad v(x) = \int_a^x u(y)dy.$$

В результате замены $\xi = (x+1)^2$ получается уравнение Куммера, фундаментальная система решений которого

$$v_1 = \Phi(\alpha, \gamma, \xi), \quad v_2 = \xi^{1-\gamma}\Phi(\alpha + \gamma - 1, 2 - \gamma, \xi).$$

Для вычисления определителя Вронского $W(v_1, v_2)$ следует представить уравнение Куммера в самосопряженной форме

$$\frac{d}{d\xi}\xi^\gamma e^{-\xi}\frac{dv}{d\xi} - \alpha\xi^{\gamma-1}e^{-\xi}v = 0,$$

откуда $W = C\xi^{-\gamma}e^\xi$. Из асимптотики при $\xi \rightarrow 0$ (она определяется явным выражением вырожденных гипергеометрических функций в виде степенных рядов) вытекает: $C = \lim_{\xi \rightarrow 0} W\xi^\gamma e^{-\xi} = 1 - \gamma$, т.е. определитель Вронского

$W(v_1, v_2) = (1 - \gamma)\xi^{-\gamma}e^\xi$. В данном случае $W(v_1(x), v_2(x)) = e^{(1+x)^2}$. Решение задачи Коши $v(x) = C_1v_1(x) + C_2v_2(x)$, C_1 и C_2 определяются начальными условиями.

$$4.106. u(x) = f(x) + \int_a^x \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{u_1'(x)u_2(y) - u_2'(x)u_1(y)}{W(y)} \right) f(y)dy,$$

$$u_1(x) = e^{-3x}\Phi\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \left(x + \frac{3}{2}\right)^2\right), \quad u_2(x) = e^{-3x}\left(x + \frac{3}{2}\right)\Phi\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{2}, \left(x + \frac{3}{2}\right)^2\right),$$

$$W = e^{\left(x - \frac{3}{2}\right)^2}.$$

У к а з а н и е. Дифференциальное уравнение задачи Коши для функции $v(x) = \int_a^x u(y)dy$ заменой $w = ve^{kx}$ (при подходящем k) преобразуется в уравнение той же структуры, что и соответствующее уравнение предыдущей задачи.

$$\begin{aligned} \mathbf{4.107.} \quad u(x) &= f(x) + \int_a^x (w_2''(x)w_1(y) - w_1''(x)w_2(y)) \frac{f(y)}{W(y)} dy, \text{ функция } w_1(x) = \\ &= e^{-kx} \Phi\left(\alpha, \frac{1}{2}, \frac{A}{2}\xi^2\right), \quad w_2(x) = e^{-kx} x \Phi\left(\alpha + \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{A}{2}\xi^2\right), \quad W = e^{\frac{Ax^2}{2} - 2kx}, \quad k = \frac{C}{A}, \\ \alpha &= \frac{A^2 D - ABC - C^2}{2A^3}, \quad \xi = x + \frac{AB + 2C}{A^2}. \end{aligned}$$

У к а з а н и е. Функция $w(x) = \int_a^x (x-y)u(y)dy$ — решение задачи Коши

$$\begin{cases} w'' - (Ax + B)w' - (Cx + D)w = f(x), \\ w(a) = w'(a) = 0. \end{cases}$$

$$\mathbf{4.108.} \quad u(x) = (2x + 1)e^{-x}.$$

$$\mathbf{4.109.} \quad u(x) = \frac{(x^2 - 3) \sin x + (x^2 + 4x + 1) \cos x}{(x + 1)^3}.$$

$$\mathbf{4.110.} \quad u(x) = \frac{\pi}{2} [Y_1(1)J_1'(x+1) - J_1(1)Y_1'(x+1)].$$

$$\mathbf{4.111.} \quad u(x) = \frac{1}{2k^2} f''(t), \quad t = \frac{x}{k}, \quad f(x) = F(x) + Ax + B, \quad \text{где коэффициенты} \\ A = -\frac{1}{2} \left[F'\left(\frac{a}{k}\right) - F'(0) \right], \quad B = \frac{1}{2} \left[F'\left(\frac{a}{k}\right) - F\left(\frac{a}{k}\right) - F(0) \right].$$

$$\mathbf{4.112.} \quad u(x) = \frac{k}{2} f''(t), \quad t = kx, \quad f(x) = F(x) + Ax + B, \quad \text{где коэффициенты} \\ A = -\frac{1}{2} [F'(ak) - F'(0)], \quad B = \frac{1}{2} [akF'(ak) - F(ak) - F(0)].$$

$$\mathbf{4.113.} \quad u(x) = \frac{1}{4} \frac{d}{dx} \left(\frac{f'(x)}{x} \right), \quad f(x) = F(x) + Ax + B, \quad \text{где коэффициенты} \\ A = -\frac{1}{a+b} (aF'(b) + bF'(a)), \quad B = \frac{1}{4} [(a+b)(F'(a) + F'(b)) - 2(F(a) + F(b))].$$

$$\mathbf{4.114.} \quad u(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x^{1-\alpha} f'(x)}{2\alpha} \right), \quad f(x) = F(x) + Ax + B, \quad \text{где коэффициенты} \\ A = F'(a), \quad B = \frac{1}{2} (aF'(a) - F(a) - F(b)), \quad \lim_{x \rightarrow 0} (x^{1-\alpha} F'(x)) = 0.$$

У к а з а н и е. Из уравнения при $x = 0$ и $x = a$ следуют равенства

$$\int_0^a y^\alpha u(y) dy = f(0), \quad \int_0^a (a^\alpha - y^\alpha) u(y) dy = f(a),$$

или

$$\int_0^a y^\alpha u(y) dy = f(0), \quad a^\alpha \int_0^a u(y) dy = f(0) + f(a).$$

Результатом подстановки найденного решения в полученные соотношения и интегрирования по частям являются соотношения

$$af'(a) = \alpha f(a) + \alpha f(0), \quad af'(a) = 2\alpha f(a) + 2\alpha f(0),$$

из которых следуют условия для функции $f(x)$

$$f(0) + f(a) = 0, \quad f'(a) = 0.$$

- 4.115.** $u(x) = \frac{1}{2\alpha} \frac{d}{dx} (e^{\alpha x} f'(x)),$
 $f(x) = F(x) + Ax + B, A = -\frac{e^{-\alpha b} F'(b) + e^{-\alpha a} F'(a)}{e^{-\alpha a} + e^{-\alpha b}},$
 $B = \frac{(F'(b) - F'(a))(e^{-\alpha a} - e^{-\alpha b}) + \alpha(a+b)(e^{-\alpha b} F'(b) + e^{-\alpha a} F'(a))}{2\alpha(e^{-\alpha a} + e^{-\alpha b})} - \frac{F(a) + F(b)}{2}.$
- 4.116.** $u(x) = \frac{1}{2\alpha} (f''(x) - \alpha^2 f(x)), f(x) = F(x) + Ax + B,$
 $A = \frac{1}{\alpha(b-a)-2} (F'(a) + F'(b) + \alpha F(a) - \alpha F(b)), B = -\frac{1}{\alpha} (F'(a) + \alpha F(a) +$
 $+ \alpha a A + A).$ Если $\alpha = \frac{2}{b-a}$, то $f(x) = F(x) + A + B e^{\alpha x}, A = \frac{1}{\alpha} F'(b) - F(b),$
 $B = \frac{1}{2} e^{-\alpha a} \left(F(b) - F(a) - \frac{F'(b) + F'(a)}{\alpha} \right).$
- 4.117.** $u(x) = \frac{1}{4\alpha} \frac{d}{dx} \left(\frac{f'(x) e^{-\alpha x^2}}{x} \right),$
 $f(x) = F(x) + Ax + B, A = -\frac{a e^{\alpha a^2} F'(b) + b e^{\alpha b^2} F'(a)}{a e^{\alpha a^2} + b e^{\alpha b^2}},$
 $B = -\frac{A}{2} (a+b) - \frac{1}{2} (F(a) + F(b)) + \frac{1 - e^{\alpha(b^2 - a^2)}}{4\alpha a} (A + F'(a)).$
- 4.118.** $u(x) = \frac{1}{2\alpha} \frac{d}{dx} \frac{f'(x)}{\operatorname{ch} \alpha x}, f(x) = F(x) + Ax + B, A = -\frac{\operatorname{ch} \alpha a F'(b) + \operatorname{ch} \alpha b F'(a)}{\operatorname{ch} \alpha a + \operatorname{ch} \alpha b},$
 $B = \frac{1}{2\alpha(\operatorname{ch} \alpha a + \operatorname{ch} \alpha b)} [(\operatorname{sh} \alpha b - \operatorname{sh} \alpha a)(F'(b) - F'(a)) + \alpha(a+b)(\operatorname{ch} \alpha a F'(b) +$
 $+ \operatorname{ch} \alpha b F'(a))] - \frac{F(a) + F(b)}{2}.$
- 4.119.** $u(x) = \frac{1}{2\alpha} \frac{d}{dx} \frac{f'(x)}{\operatorname{sh} \alpha x}, f(x) = F(x) + Ax + B, A = -\frac{\operatorname{sh} \alpha a F'(b) + \operatorname{sh} \alpha b F'(a)}{\operatorname{sh} \alpha a + \operatorname{sh} \alpha b},$
 $B = \frac{1}{2\alpha(\operatorname{sh} \alpha a + \operatorname{sh} \alpha b)} [(\operatorname{ch} \alpha b - \operatorname{ch} \alpha a)(F'(b) - F'(a)) + \alpha(a+b)(\operatorname{sh} \alpha a F'(b) +$
 $+ \operatorname{sh} \alpha b F'(a))] - \frac{F(a) + F(b)}{2}.$
- 4.120.** $u(x) = \frac{1}{2\alpha} \frac{d}{dx} (\operatorname{ch}^2 x \operatorname{cth}^{\alpha-1} x f'(x)), f(x) = F(x) + Ax + B,$ где коэффици-
 циенты $A = -F'(a), B = \frac{1}{2} (a F'(a) - F(a) - F(0)).$
- 4.121.** $u(x) = -\frac{1}{2\alpha} \frac{d}{dx} (\operatorname{cosecans} x f'(x)), f(x) = F(x) + Ax + B,$
 $A = -\frac{\sin \alpha a F'(b) + \sin \alpha b F'(a)}{\sin \alpha a + \sin \alpha b}, B = -\frac{A}{2} (a+b) - \frac{1}{2} (F(a) + F(b)) +$
 $+ \frac{\cos \alpha b - \cos \alpha a}{2\alpha \sin \alpha} (A + F'(a)).$
- 4.122.** $u(x) = -\frac{1}{2\alpha} \frac{d}{dx} (\operatorname{secans} x f'(x)), f(x) = F(x) + Ax + B,$
 $A = \frac{\cos \alpha a F'(b) - \cos \alpha b F'(a)}{\cos \alpha a + \cos \alpha b}, B = -\frac{A}{2} (a+b) - \frac{1}{2} (F(a) + F(b)) -$
 $- \frac{\sin \alpha b - \sin \alpha a}{2\alpha \cos \alpha} (A + F'(a)).$
- 4.123.** $u(x) = \frac{1}{2\alpha} \frac{d}{dx} (\sin^2 x \operatorname{ctg}^{1-\alpha} x f'(x)), f(x) = F(x) + Ax + B, A = -F'(a),$
 $B = \frac{1}{2} (a F'(a) - F(a) - F(b)).$

$$\mathbf{4.124.} \quad u(x) = k^2 \frac{d}{dx}(\sqrt{z} f'(z)), \quad z = k^2 x, \quad f(x) = F(x) + Ax + B, \quad A = -F'(k^2 a), \\ B = \frac{1}{2}(k^a F'(k^2 a) - F(k^2 a) - F(0)), \quad \lim_{x \rightarrow 0}(\sqrt{x} f'(x)) = 0.$$

$$\mathbf{4.125.} \quad u(x) = 2\sqrt{z} \frac{d}{dz}(\sqrt{z} f'(z)), \quad z = x^2, \quad f(x) = F(x) + Ax + B, \quad A = -F'(a), \\ B = \frac{1}{2}(\sqrt{a} F'(\sqrt{a}) - F(\sqrt{a}) - F(0)).$$

$$\mathbf{4.126.} \quad u(x) = \frac{1}{4z} f''(z), \quad z = \sqrt{x}, \quad f(x) = F(x) + Ax + B, \\ A = -\frac{1}{2}(F'(0) + F'(\sqrt{a})), \quad B = \frac{1}{2}(\sqrt{a} F'(0) - F(\sqrt{a}) - F(0)).$$

$$\mathbf{4.127.} \quad u(x) = \frac{1}{2k^2 \alpha^2} e^{-\alpha z} \frac{d}{dz}(e^{-\alpha z} f'(z)), \quad z = \frac{1}{\alpha} \ln\left(1 + \frac{x}{k}\right), \quad f(x) = F(x) + \\ + Ax + B, \quad A = -\frac{1}{2}(F'(0) + (F'(b))), \quad B = \frac{1}{2}(bF'(0) - F(b) - F(0)), \\ b = \frac{1}{\alpha} \ln(1 + \frac{a}{k}), \quad \lim_{x \rightarrow 0}[(e^{\alpha x} - 1)f'(x)] = 0.$$

$$\mathbf{4.128.} \quad u(x) = \frac{1}{2} \frac{d}{dx}(x f'(x)), \quad f(x) = F(x) + Ax + B, \quad A = -\frac{aF'(a) + bF'(b)}{a + b}, \\ B = \frac{1}{2} \left[\frac{ab}{a + b} \ln \frac{b}{a} (F'(b) - F'(a)) \right] + \frac{1}{2} (aF'(a) + bF'(b) - F(a) - F(b)).$$

$$\mathbf{4.129.} \quad u(x) = \frac{1}{2k} \frac{d}{dx}((1 + kx)f'(x)), \quad f(x) = F(x) + Ax + B, \\ A = -\frac{(1 + ka)F'(a) + (1 + kb)F'(b)}{2 + k(a + b)}, \quad B = \frac{1}{2(2 + k(a + b))} \left[\frac{1 + ka}{k} ((F'(b) - \right. \\ \left. - F'(a)) \ln \frac{1 + kb}{1 + ka} + (a + b)((1 + ka)F'(a) + (1 + kb)F'(b)) \right] - \frac{1}{2}(F(a) + F(b)).$$

$$\mathbf{4.130.} \quad u(x) = 2\alpha k \cos z f''(z), \quad z = k \sin \alpha x, \quad f(x) = F(x) + Ax + B, \\ A = -\frac{1}{2}(F'(0) + F'(x_a)), \quad B = \frac{1}{2}[x_a F'(0) - F(x_a) - F(0)], \quad x_a = k \sin \alpha a.$$

$$\mathbf{4.131.} \quad u(x) = \frac{k\alpha}{2 \cos^2 \alpha z} f''(z), \quad z = k \operatorname{tg} \alpha x, \quad f(x) = F(x) + Ax + B, \quad \text{выражения} \\ \text{для } A \text{ и } B \text{ такие же, как в ответе предыдущей задачи, } x_a = k \operatorname{tg} \alpha a.$$

$$\mathbf{4.132.} \quad u(x) = \frac{1}{2} k\alpha \cos \alpha z f''(z), \quad z = k \operatorname{sh} \alpha x, \quad f(x) = F(x) + Ax + B, \quad \text{выражения} \\ \text{для } A \text{ и } B \text{ такие же, как в ответе к задаче 4.130, } x_a = k \operatorname{sh} \alpha a.$$

$$\mathbf{4.133.} \quad u(x) = \frac{k\alpha f''(z)}{2(1 + \alpha z)}, \quad z = k \ln(1 + \alpha x), \quad f(x) = F(x) + Ax + B, \quad \text{выражения} \\ \text{для } A \text{ и } B \text{ такие же, как в ответе к задаче 4.130, } x_a = \ln(1 + \alpha x).$$

$$\mathbf{4.134.} \quad u(x) = \frac{1}{2k^2 \alpha^2} \frac{d}{dz} \frac{f'(z)}{\operatorname{ch} \alpha z}, \quad z = \frac{1}{\alpha} \operatorname{arcsch} \frac{a}{k}, \quad f(x) = F(x) + Ax + B, \\ \text{выражения для } A \text{ и } B \text{ такие же, как в ответе к задаче 4.130, } x_a = \frac{1}{\alpha} \operatorname{arcsch} \frac{a}{k}.$$

$$\mathbf{4.135.} \quad u(x) = \frac{\cos^2 \alpha z}{2k^2 \alpha^2} \frac{d}{dz}(\cos^2 \alpha z f'(z)), \quad z = \frac{1}{\alpha} \operatorname{arctg} \frac{x}{k}, \quad f(x) = F(x) + Ax + B, \\ A = -F'(x_a), \quad B = \frac{1}{2} [x_a F'(x_a) - F(x_a) - F(0)], \quad x_a = \frac{1}{\alpha} \operatorname{arctg} \frac{a}{k}, \\ \lim_{x \rightarrow 0}(\operatorname{tg} \alpha x F'(x)) = 0.$$

4.136. $u(x) = \frac{1 + \alpha z}{2k^2 \alpha^2} \frac{d}{dz} [(1 + \alpha z)f'(z)], \quad z = \frac{1}{\alpha} \left(e^{\frac{x}{k}} - 1 \right),$ выражения для A и B такие же, как в ответе предыдущей задачи, $x_a = \frac{1}{\alpha} (e^{\frac{a}{k}} - 1),$ $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1 + \alpha x) F'(x) = 0.$

4.137. $u(x) = \frac{\sqrt{1 - \alpha^2 z^2}}{2k^2 \alpha^2} \frac{d}{dz} (\sqrt{1 - \alpha^2 z^2} f'(z)), \quad z = \frac{1}{\alpha} \sin \frac{x}{k}, \quad f(x) = F(x) + Ax + B,$ выражения для A и B такие же, как в ответе к задаче 4.134, $x_a \frac{1}{\alpha} \sin \frac{a}{k}.$

4.138. $u(x) = \frac{1}{2k} \frac{d}{dx} \left(\frac{f'(x)}{I_1(kx)} \right), \quad f(x) = F(x) + Ax + B, \quad A = -\frac{I_1(ka)F'(b) + I_1(kb)F'(a)}{I_1(ka) + I_1(kb)},$
 $B = \frac{1}{2(I_1(ka) + I_1(kb))} [I_0(kb) - I_0(ka)](F'(b) - F'(a)) + (a + b)(I_1(ka)F'(b) + I_1(kb)F'(a)) - \frac{1}{2}(F(a) + F(b)).$

4.139. $u(x) = -\frac{1}{2k} \frac{d}{dx} \left(\frac{f'(x)}{K_1(kx)} \right), \quad f(x) = F(x) + Ax + B,$
 $A = -\frac{K_1(ka)F'(b) + K_1(kb)F'(a)}{K_1(ka) + K_1(kb)}, \quad B = -\frac{1}{2(K_1(ka) + K_1(kb))} [(K_0(kb) - K_0(ka)) \times$
 $\times (F'(b) - F'(a)) + (a + b)(K_1(ka)F'(b) + K_1(kb)F'(a))] - \frac{1}{2}(F(a) + F(b)).$

4.140. $u(x) = \frac{1}{2} \frac{d}{dx} \left(\frac{f'(x)}{\operatorname{ch} \alpha x} \right), \quad f(x) = F(x) + Ax + B, \quad A = -F'(a),$
 $B = \frac{1}{2} [aF'(a) - F(a) - F(0)].$

4.141. $u(x) = \frac{1}{2\alpha} \frac{d}{dx} \left(e^{-\alpha x} f'(x) \right), \quad f(x) = F(x) + Ax + B,$
 $A = -\frac{e^{\alpha a} F'(0) + F'(a)}{1 + e^{\alpha a}}, \quad B = \frac{1}{2\alpha(1 + e^{\alpha a})} [(1 + e^a(\alpha a - 1))F'(0) + (e^{\alpha a} + \alpha a - 1)F'(a) - \alpha(e^{\alpha a} + 1)(F(0) + F(a))].$

4.142. $u(x) = \frac{1}{8k^2} \frac{1}{y} \frac{d}{dy} \left(\frac{f'(y)}{y} \right), \quad x = ky^2, \quad f(x) = F(x) + Ax + B,$
 $A = -F'(0), \quad B = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{a}{k}} \left[F'(0) + F' \left(\sqrt{\frac{a}{k}} \right) - \frac{1}{2} (F(0) + F \left(\sqrt{\frac{a}{k}} \right)) \right].$

4.143. $u(x) = x f'(x) + f(x).$

4.144. $u(x) = x f'(x) + (1 + \alpha) f(x).$

4.145. $u(x) = B \operatorname{ch} \sqrt{2} x + C \operatorname{sh} \sqrt{2} x, \quad B = A \frac{\sqrt{2} \operatorname{ch} \sqrt{2} - \operatorname{sh} \sqrt{2}}{\sqrt{2} + \sqrt{2} \operatorname{ch} \sqrt{2} - \operatorname{sh} \sqrt{2}},$

$C = A \frac{1 + \operatorname{ch} \sqrt{2} - \sqrt{2} \operatorname{sh} \sqrt{2}}{\sqrt{2} + \sqrt{2} \operatorname{ch} \sqrt{2} - \operatorname{sh} \sqrt{2}}.$ У к а з а н и е. Если записать уравнение в виде

$$u(x) = \int_0^x (x - y) u(y) dy + \int_x^1 (y - x) u(y) dy + Ax$$

и продифференцировать

$$u(x) = \int_0^x u(y) dy - \int_x^1 u(y) dy + Ax = 0,$$

то из этих двух уравнений при $x = 0$ получаются граничные условия:

$$u(a) = \int_0^1 y u(y) dy, \quad u'(0) = -\int_0^1 u(y) dy + A.$$

Дифференцирование второго уравнения и исключение интегрального слагаемого с помощью первого уравнения приводит к дифференциальному уравнению $u'' - 2u = 0$. В граничных условиях можно освободиться от интегралов, проведя замену $u(x) = \frac{1}{2}u''(x)$ и интегрирование по частям. В результате получится эквивалентная краевая задача для $u(x)$

$$\begin{cases} u'' - 2u = 0, & 0 < x < 1, \\ u(0) + u(1) = u'(1), & u'(0) + u'(1) = 2A. \end{cases}$$

4.146. $u(x) = B \cos \sqrt{3}x + C \sin \sqrt{3}x$,

$$B = A\sqrt{3} \operatorname{ctg} \alpha, \quad C = A \frac{\sqrt{3} \sin \alpha - 1}{\sin \alpha}, \quad \alpha = \frac{\pi\sqrt{3}}{2}.$$

У к а з а н и е. Интегральное уравнение сводится к краевой задаче

$$\begin{cases} u'' + 3u = 0, & 0 < x < \frac{\pi}{2}, \\ u(0) + u'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, & u'(0) + u\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2A. \end{cases}$$

4.147. $u(x) = B \cos \sqrt{3}x + C \sin \sqrt{3}x$, $B = A \frac{\sqrt{3} - \operatorname{th} a\sqrt{3}}{\sqrt{3} - 2 \operatorname{th} a\sqrt{3}}$,

$$C = A \frac{1 - \sqrt{3} \operatorname{th} a\sqrt{3}}{\sqrt{3} - 2 \operatorname{th} a\sqrt{3}}.$$

У к а з а н и е. Интегральное уравнение сводится к краевой задаче:

$$\begin{cases} u'' - 3u = 0, & 0 < x < a, \\ u(0) + u'(0) = 2A, & u(a) - u'(a) = 0. \end{cases}$$

4.148. $u(x) = \pm f(x) \left(2 \int_a^x K(y) f(y) dy \right)^{-\frac{1}{2}}.$

У к а з а н и е. Сделать замену $v(x) = \int_a^x K(y) u(y) dy$.

4.149. $u(x) = f(x) \left[(1 - \alpha) \int_a^x f^\alpha(y) g(y) dy \right]^{-\frac{1}{1-\alpha}}, \quad u(x) = 0.$

У к а з а н и е. Посредством дифференцирования и исключения интегрального слагаемого интегральное уравнение сводится к задаче Коши:

$$u' - \frac{f'}{f} u = f g u^k, \quad a < x, \quad u(a) = 0.$$

4.150. $u(x) = \left[A^{1-\alpha} + (\alpha - 1) \int_a^x f(y) dy \right]^{\frac{1}{1-\alpha}}.$

4.151. $u(x) = -\frac{1}{\alpha} \ln \left[\frac{k}{A} + \left(e^{-\alpha u(a)} - \frac{k}{A} \right) e^{\alpha A(a-x)} \right], \quad u(a) = Aa + B.$

4.152. $u(x) = \frac{1}{\alpha} \ln \operatorname{tg} \left(\operatorname{arctg} e^{\alpha a} + \frac{\alpha}{2} \int_a^x f(\xi) d\xi \right).$

4.153. $u(x) = \frac{1}{\beta} \ln \frac{e^{\beta u(a)} h(x)}{1 + \frac{k}{\alpha A} e^{\beta u(a)} (1 - h(x))}, \quad h(x) = \left| \frac{\sin \alpha x}{\sin \alpha a} \right|^{\beta A},$

$$u(a) = A \ln |\sin \alpha a| + B.$$

4.154. $u(x) = \frac{1}{\beta} \ln \frac{e^{\beta A} - \operatorname{th} \varphi}{1 - e^{\beta A} \operatorname{th} \varphi}, \quad \varphi = \frac{\beta k}{2\alpha} (\operatorname{ch} \alpha x - \operatorname{ch} \alpha a).$

$$4.155. u(x) = \frac{2}{\alpha} \operatorname{arctg} \left(e^{\alpha k(x-a)} \operatorname{tg} \frac{\alpha A}{2} \right).$$

$$4.156. u(x) = \frac{\pi}{2\beta} + \frac{2}{\beta} \operatorname{arctg} \left[\operatorname{tg} \left(\frac{\beta A}{2} - \frac{\pi}{4} \right) e^{\frac{\beta k}{\alpha} (\cos \alpha x - \cos \alpha a)} \right].$$

$$4.157. \text{ Если } \frac{A\alpha}{k} = p^2 > 0, \text{ то } u(x) = p \frac{u(a) - p \operatorname{tg} \varphi}{p - u(a) \operatorname{tg} \varphi}, \quad \varphi = \frac{\beta k}{\alpha} (\cos \alpha a - \cos \alpha x);$$

если $-\frac{A\alpha}{k} = p^2 > 0$, то $u(x) = \operatorname{tg} \left[\frac{\beta k}{a} (\cos \alpha a - \cos \alpha x) + \operatorname{arctg} \frac{u(a)}{p} \right]$,

$$u(a) = A \cos \alpha a + B; \text{ если } A = 0, \text{ то } u(x) = \frac{\alpha B}{\alpha - kB(\cos \alpha a - \cos \alpha x)}.$$

$$4.158. \text{ Если } \frac{A\alpha}{k} = p^2 > 0, \text{ то } u(x) = p \operatorname{tg} \left(\frac{\beta k}{\alpha} \operatorname{sh} \alpha x \right); \text{ если } -\frac{A\alpha}{k} = p^2 > 0, \text{ то}$$

$$u(x) = -p \operatorname{th} \left(\frac{\beta k}{\alpha} \operatorname{sh} \alpha x \right); \text{ если } \alpha A = 0, \text{ то } u(x) = 0.$$

$$4.159. \text{ Если } \frac{A\alpha}{k} + \frac{\alpha^2}{4k^2} = p^2 > 0, \text{ то } u(x) = p \frac{A + \frac{\alpha}{2k} - p \operatorname{th} \varphi}{p - \left(A + \frac{\alpha}{2k} \right) \operatorname{th} \varphi} - \frac{\alpha}{2k},$$

$$\varphi = pk(x-a); \text{ если } -\left(\frac{A\alpha}{k} + \frac{\alpha^2}{4k^2} \right) = p^2 > 0, \text{ то } u(x) = p \operatorname{tg} \left[pk(x-a) + \operatorname{arctg} \left(\frac{A}{p} + \frac{\alpha}{2kp} \right) \right] - \frac{\alpha}{2k};$$

если $\frac{A\alpha}{k} + \frac{\alpha^2}{4k^2} = 0$ то $u(x) = \frac{A + \frac{\alpha}{2} \left(A + \frac{\alpha}{2k} \right) (x-a)}{1 - \left(kA + \frac{\alpha}{2} \right) (x-a)}.$

$$4.160. \text{ Если } \frac{B\alpha}{k} + \frac{\alpha^2}{4k^2} = p^2 > 0, \text{ то } u(x) = p \frac{u(a) + \frac{\alpha}{2k} - p \operatorname{th} \varphi}{p - \left(u(a) + \frac{\alpha}{2k} \right) \operatorname{th} \varphi} - \frac{\alpha}{2k},$$

$$\varphi = k(x-a); \text{ если } -\left(\frac{B\alpha}{k} + \frac{\alpha^2}{4k^2} \right) = p^2 > 0, \text{ то}$$

$$u(x) = p \operatorname{tg} \left[pk(x-a) + \operatorname{arctg} \frac{u(a) + \frac{\alpha}{2k}}{p} \right] - \frac{\alpha}{2k};$$

если $\frac{B\alpha}{k} + \frac{\alpha^2}{4k^2} = 0$ то $u(x) = \frac{u(a) + \left(ku(a) + \frac{\alpha}{2} \right) (x-a)}{1 - \left(ku(a) + \frac{\alpha}{2} \right) (x-a)}, \quad u(a) = Ae^{\alpha a} + B.$

$$4.161. \text{ Если } 1 - \frac{\alpha^2 A^2}{k^2} = p^2 > 0, \text{ то}$$

$$u(x) = \frac{1}{\beta} \ln \left[p, \operatorname{tg} \left(\frac{pk\beta}{2} (\operatorname{ch} \alpha x - \operatorname{ch} \alpha a) + \operatorname{arctg} \frac{e^{\beta u(a)} + \frac{\alpha a}{k}}{p} \right) - \frac{\alpha A}{k} \right],$$

если $-(1 - \frac{\alpha^2 A^2}{k^2}) = p^2 > 0$, то $u(x) = \frac{1}{p} \ln \frac{e^{\beta u(a)} \left(p + \frac{\alpha A}{k} \operatorname{th} \varphi \right) + \operatorname{th} \varphi}{p - \left(e^{\beta u(a)} + \frac{\alpha A}{k} \right) \operatorname{th} \varphi},$

$\varphi = \frac{\beta pk}{2\alpha} (\operatorname{ch} \alpha x - \operatorname{ch} \alpha a)$, если $1 - \frac{\alpha^2 A^2}{k^2} = 0$, то

$$u(x) = \frac{1 + \left[p + \frac{\beta A}{\alpha} (\operatorname{ch} \alpha x - \operatorname{ch} \alpha a) \right] e^{\beta u(a)}}{1 - \frac{k\beta}{2\alpha} \left(\frac{\alpha A}{k} + e^{\beta u(a)} \right) (\operatorname{ch} \alpha x - \operatorname{ch} \alpha a)}, \quad u(a) = A \operatorname{ch} \alpha a + B.$$

4.162. Решение в неявном виде: $\int_A^{u(x)} \frac{du}{\ln u} = k(x - a).$

4.163. Решение в неявном виде: $(\alpha + 1) \int_{u(a)}^{u(x)} \frac{du}{ku^\beta + A(\alpha + 1)} + x^{\alpha+1} - a^{\alpha+1} = 0,$
 $u(a) = Aa^{\alpha+1} + B.$

4.164. Решение в неявном виде:

$$\frac{2B}{A^2} \ln \left| \frac{B - Au(x)}{B - Au(a)} \right| - \frac{2}{A} (u(x) - u(a)) = x - a, \quad u^2(a) = Ba + C.$$

4.165. Решение в неявном виде:

$$u(x) - u(a) - \frac{1}{\beta} \ln \left| \frac{ke^{\beta u(x)} + A(\alpha + 1)}{ke^{\beta u(a)} + A(\alpha + 1)} \right| = a^{\alpha+1} - x^{\alpha+1}, \quad u(a) = Ba^{\alpha+1} + C.$$

4.166. Решение в неявном виде:

$$u(x) - u(a) - \frac{1}{\beta} \ln \left| \frac{ke^{\beta u(x)} + \alpha A}{ke^{\beta u(a)} + \alpha A} \right| = \frac{k}{\alpha} (e^{\alpha x} - e^{\alpha a}), \quad u(a) = Ae^{\alpha a} + B.$$

4.167. Решение в неявном виде:

$$\ln \left| \frac{u(x) + 2}{u(a) + 2} \right| - \frac{1}{2} \ln \frac{u^2(x) - 2u(x) + 4}{u^2(a) - 2u(a) + 4} + \sqrt{3} \left(\operatorname{arctg} \frac{u(x) - 1}{\sqrt{3}} - \operatorname{arctg} \frac{u(a) - 1}{\sqrt{3}} \right) =$$

$$= 3(x^4 - a^4), \quad u(a) = 2a^4.$$

4.170. Решение в неявном виде:

$$\frac{k}{2(A+k)} \ln \left| \frac{\operatorname{th} \beta u(x) - 1}{\operatorname{th} \beta u(a) - 1} \right| + \frac{k}{2(A-k)} \ln \left| \frac{\operatorname{th} \beta u(x) + 1}{\operatorname{th} \beta u(a) + 1} \right| +$$

$$+ \frac{k^2}{A^2 - k^2} \ln \left| \frac{k \operatorname{th} \beta u(x) + A}{k \operatorname{th} \beta u(a) + A} \right| = \beta k(a - x), \quad u(a) = Aa + B.$$

4.171. Решение в неявном виде: $\int_0^{u(x)} \frac{dv}{\sqrt{A^2 \alpha^2 - \alpha^2 v^2 + 2k \operatorname{tg} \beta v}} = \pm x.$

У к а з а н и е. Эквивалентная задача Коши

$$\begin{cases} u'' + \alpha^2 u - \frac{k\beta}{\cos^2 \beta u} = 0, & 0 < x, \\ u(0) = 0, \quad u'(0) = \alpha A. \end{cases}$$

4.172. Решение в неявном виде: $\int_{u(a)}^{u(x)} \frac{dv}{\left[\frac{2k}{\alpha} (e^{\alpha v} - e^{\alpha u(a)}) + 4Av + B^2 - 4AC \right]^{\frac{1}{2}}} =$
 $= \pm (x - a), \quad u(a) = Aa^2 + Ba + C.$

У к а з а н и е. Эквивалентная задача Коши:

$$\begin{cases} u'' - ke^{\alpha u} = 2A, & 0 < x, \\ u(a) = Aa^2 + Ba + C, \quad u'(a) = 2Aa + B. \end{cases}$$

4.173. Решение в неявном виде:

$$\int_{u(a)}^{u(x)} (4Au + 2k(F(u) - F(u(a))) + B^2 - 4AC)^{-\frac{1}{2}} du = \pm (x - a),$$

$$u(a) = Aa^2 + Ba + C, \quad F(u) = u \ln \alpha u - u.$$

У к а з а н и е. Эквивалентная задача Коши

$$\begin{cases} u'' - k \ln \alpha u = 2A, & 0 < x, \\ u(a) = Aa^2 + Ba + C, & u'(a) = 2Aa + B. \end{cases}$$

4.174. Решение в неявном виде:

$$\int_{u(a)}^{u(x)} \left(\frac{2k}{3} (u^3 - u^3(a)) + 4Au + B^2 - 4AC \right)^{-\frac{1}{2}} du = \pm(x - a),$$

$$u(a) = Aa^2 + Ba + C.$$

У к а з а н и е. Эквивалентная задача Коши

$$\begin{cases} u'' - ku^2 = 2A, & 0 < x, \\ u(a) = Aa^2 + Ba + C, & u'(a) = 2Aa + B. \end{cases}$$

4.175. Решение в неявном виде:

$$\int_{u(a)}^{u(x)} \left(\alpha^2 u^2 - \alpha^2 Cu - \frac{2k\alpha}{3} (u^3 - u^3(a)) \right) + \alpha^2 (C - 4AB)^{-\frac{1}{2}} du = \pm(x - a),$$

$$u(a) = Ae^{\alpha a} + Be^{-\alpha a} + C.$$

У к а з а н и е. Эквивалентная задача Коши

$$\begin{cases} u'' - k\alpha u^2 - \alpha^2 u = -\alpha^2 C, & 0 < x, \\ u(a) = Ae^{\alpha a} + Be^{-\alpha a} + C, \\ u'(a) = \alpha Ae^{\alpha a} - \alpha Be^{-\alpha a}. \end{cases}$$

4.176. Решение в неявном виде:

$$\int_{u(a)}^{u(x)} \left[\alpha^2 (A^2 + B^2 - C^2) + \frac{2k\alpha}{3} (u^3 - u^3(a)) - \alpha^2 u^2 + 2\alpha^2 Cu \right]^{-\frac{1}{2}} du = \pm(x - a),$$

$$u(a) = A \sin \alpha a + B \cos \alpha a + C.$$

Эквивалентная задача Коши

$$\begin{cases} u'' + \alpha^2 u - k\alpha u^2 = \alpha^2 C, & 0 < x, \\ u(a) = A \sin \alpha a + B \cos \alpha a + C, \\ u'(a) = \alpha A \cos \alpha a - \alpha B \sin \alpha a. \end{cases}$$

4.177. Решение в неявном виде:

$$\int_{u(0)}^{u(x)} \left[\frac{4A}{3} (v^3 - u^3(0)) + u'^2(0) \right]^{-\frac{1}{2}} dv = \pm x,$$

где $u(0), u'(0), u(a), u'(a)$ удовлетворяют условиям

$$u(0) + u(a) = aA + 2B, \quad u'(0) + u'(a) = 2A,$$

$$u'^2(a) - u'^2(0) - \frac{4k}{3} (u^3(a) - u^3(0)) = 0,$$

$$\int_{u(0)}^{u(a)} \left[\frac{4A}{3} (u^3 - u^3(0)) + u'^2(0) \right]^{-\frac{1}{2}} du = \pm a.$$

У к а з а н и е. Интегральное уравнение записать в виде

$$u(x) = k \int_0^x (x-y)u^2(y)dy = k \int_x^a (y-x)u^2(y)dy + Ax + B$$

и продифференцировать:

$$u'(x) = \int_0^x u^2(y) dy - k \int_x^a u^2(y) dy + A.$$

Еще одно дифференцирование приводит к уравнению

$$u'' - 2ku^2 = 0, \quad 0 < x < a,$$

которое нужно решать при условиях

$$\begin{cases} u(0) + u(a) = Aa + 2B, \\ u'(0) + u'(a) = 2A. \end{cases}$$

Граничные условия, связывающие величины $u(0), u(a), u'(0), u'(a)$, следуют из первых двух уравнений при $x = 0$ и $x = a$, в которых можно освободиться от интегралов, заменив $u^2 = \frac{u''}{2k}$ и проинтегрировав по частям. Еще два соотношения для указанных величин вытекают из найденного решения при $x = a$. В результате получается линейная система четырех алгебраических уравнений, ранг которой равен двум.

4.178. Решение в неявном виде:

$$\int_{u(0)}^{u(x)} [4k(F(u) - F(u(0))) + u'^2(0)]^{-\frac{1}{2}} du = \pm x;$$

где $F(u) = u \ln \alpha u - u$, а величины $u(0), u'(0), u(a), u'(a)$ удовлетворяют условиям

$$u(0) + u(a) = aA + 2B, \quad u'(0) + u'(a) = 2A,$$

$$u'^2(a) - u'^2(0) = 4k(F(u(a)) - F(u(0))),$$

$$\int_{u(0)}^{u(a)} [4k(F(u) - F(u(0))) + u'^2(0)]^{-\frac{1}{2}} du = \pm a.$$

4.179. Решение в неявном виде:

$$\int_{u(0)}^{u(x)} [\alpha(F(u) - F(u(0))) + u'^2(0)]^{-\frac{1}{2}} du = \pm x;$$

где $F(u) = \frac{4ku^3}{3} + \alpha u^2$, а величины $u(0), u'(0), u(a), u'(a)$ — решение системы уравнений

$$\alpha u(0) - u'(0) = 2\alpha A, \quad \alpha u(a) - u'(a) = 0,$$

$$u'^2(a) - u'^2(0) + \alpha(F(u(a)) - F(u(0))) = 0,$$

$$\int_{u(0)}^{u(a)} [\alpha(F(u) - F(u(0))) + u'^2(0)]^{-\frac{1}{2}} du = \pm a.$$

4.180. Решение в неявном виде:

$$\int_{u(0)}^{u(x)} \left[\frac{4k}{\alpha} (e^{\alpha v} - e^{\alpha u(0)}) - v^2 + u^2(0) + u'^2(0) \right]^{-\frac{1}{2}} dv = \pm x,$$

где величины $u(0), u'(0), u(\pi), u'(\pi)$ — решение системы уравнений

$$u(0) - u(\pi) = 0, \quad u'(0) - u'(\pi) = 2A,$$

$$u'^2(\pi) - u'^2(0) - u^2(0) + u^2(\pi) = \frac{4k}{\alpha} (e^{\alpha u(\pi)} - e^{\alpha u(0)}),$$

$$\int_{u(0)}^{u(\pi)} \left[\frac{4k}{\alpha} (e^{\alpha v} - e^{\alpha u(0)}) - v^2 + u^2(0) + u'^2(0) \right]^{-\frac{1}{2}} 2dv = \pm \pi.$$

4.181. Решение в неявном виде

$$\int_{u(0)}^{u(x)} F(v) dv = \pm x,$$

где $F(v) = [\frac{4k\alpha}{\beta}(\text{sh } \beta v - \text{sh } \beta u(0)) + \alpha^2(v^2 - u^2(0)) + u'^2(0)]^{-\frac{1}{2}}$, а величины $u(0), u'(0), u(a), u'(a)$ — решение системы уравнений

$$\begin{cases} u(0) + \text{ch } \alpha u(a) = \frac{\text{sh } \alpha a}{\alpha} u'(a), \\ \text{ch } \alpha a u(0) + u(a) = -\frac{1}{\alpha} \text{sh } \alpha a u'(a) + 2A \text{sh } \alpha a, \\ u'^2(a) - u'^2(0) - \alpha^2(u^2(a) - u^2(0)) = \frac{4k\alpha}{\beta}(\text{sh } \beta u(a) - \text{sh } \beta u(0)), \\ \int_{u(0)}^{u(a)} F(v) dv = \pm a. \end{cases}$$

4.182. 1, а. $u(x) = \frac{A}{I(n + \frac{1}{2})} x^{n+\frac{1}{2}}$, $I(n + \frac{1}{2}) = (-1)^n \left(\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k + 1/2} + 2 - \frac{\pi}{2} \right)$,

1, б. $u(x) = \frac{A}{I(n + \frac{1}{3})} x^{n+\frac{1}{3}}$, $I(n + \frac{1}{3}) = (-1)^n \left(\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k + 1/3} + 3 - \ln 2 - \frac{\pi}{\sqrt{3}} \right)$,

1, с. $u(x) = \frac{A}{I(n + \frac{1}{4})} x^{n+\frac{1}{4}}$, $I(n + \frac{1}{4}) = (-1)^n \left(\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k + 1/4} + 4 - \sqrt{2} \ln(1 + \right.$

$\left. + \sqrt{2}) - \frac{\pi}{\sqrt{2}} \right)$; 2) $u(x) = \frac{A}{I(n)} x^n \left(\ln x + \frac{K(n)}{I(n)} \right)$, $I(n) = (-1)^n \left(\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k} + \right.$

$\left. + \ln 2 \right)$, $K(n) = (-1)^n \left[\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k^2} + \frac{\pi^2}{12} \right]$; 3) $u(x) = \frac{A}{P^2 + Q^2} (P \cos \ln x +$

$+ Q \sin \ln x)$, $P = \int_0^1 \frac{\cos \ln \xi d\xi}{1 + \xi}$, $Q = \int_0^1 \frac{\sin \ln \xi d\xi}{1 + \xi}$.

4.183. 1) $u(x) = \frac{2A\Gamma(\frac{\alpha+2}{2})x^\alpha}{\sqrt{\pi}\Gamma(\frac{\alpha+1}{2})}$, 2) $u(x) = \frac{2A}{\pi} \ln \frac{x}{2}$.

4.184. 1) $u(x) = \frac{Ax^\alpha}{I(\alpha)}$, $I(\alpha) = \int_0^1 \frac{\xi^\alpha d\xi}{\sqrt{1 + \xi^2}}$, $I(0) = \ln(\sqrt{2} + 1)$, $I(1) = \sqrt{2} - 1$,

$I(2) = \frac{1 + \ln(\sqrt{2} + 1)}{2}$, $I(3) = \frac{2 - \sqrt{2}}{3}$, $I(4) = \frac{2 \ln(\sqrt{2} + 1) - \text{sqrt} 2}{8}$, $I(5) =$

$= \frac{7\sqrt{2} - 8}{15}$; 2) $u(x) = A \frac{d^n}{d\alpha^n} \left(\frac{x^\alpha}{I(\alpha)} \right) \Big|_{\alpha=0}$.

У к а з а н и е. Вывести рекуррентную формулу: $I(\alpha) = \frac{\sqrt{2}}{\alpha} - \frac{\alpha-1}{\alpha} I(\alpha-2)$.

4.185. $u(x) = \frac{A(-1)^{n-1}n!!}{\pi(n-1)!!} x^n$.

4.186. $u(x) = \frac{Ax^{n+1}}{I(n)}$, $I(2m-1) = \frac{(-1)^m}{2} \left[\sum_{k=1}^m \frac{(-1)^k}{k} + \ln 2 \right]$,

$I(2m) = (-1)^m \left[\sum_{k=1}^m \frac{(-1)^k}{2k-1} + \frac{\pi}{4} \right]$.

$$\mathbf{4.187.} \quad 1) u(x) = \frac{A}{I} x^{m+\alpha-1}; \quad 2) u(x) = \frac{A}{I} x^\alpha (\ln x - \frac{K}{I}), \quad I = \int_0^1 \frac{\xi^{n+\alpha-1} d\xi}{a + b\xi^n}, \quad K = \int_0^1 \frac{\xi^{n+\alpha-1} \ln \xi d\xi}{a + b\xi^n}.$$

$$\mathbf{4.188.} \quad 1) u(x) = \frac{A}{I(\gamma)} x^{\gamma+\alpha\beta-1}; \quad 2) u(x) = \frac{A}{I(\gamma)} x^{\gamma+\alpha\beta-1} (\ln x - \frac{K(\gamma)}{I(\gamma)}); \quad 3) u(x) = A \frac{d^n}{d\gamma^n} \left(\frac{x^\gamma}{I(\gamma)} \right) \Big|_{\gamma=0}, \quad I(\gamma) = \int_0^1 \frac{\xi^{\gamma+\alpha\beta-1} d\xi}{(a + b\xi^\alpha)^\beta}, \quad K = \int_0^1 \frac{\xi^{\gamma+\alpha\beta-1} \ln \xi d\xi}{(a + b\xi^\alpha)^\beta}.$$

$$\mathbf{4.189.} \quad 1) u(x) = \frac{A}{S(\alpha)} x^{\alpha-1}; \quad 2) u(x) = \frac{A}{S(\alpha)} x^{\alpha-1} (\ln x - \frac{T(\alpha)}{S(\alpha)}), \quad \text{где } S(\alpha) = \int_0^1 K(\xi) \xi^\alpha d\xi, \quad T(\alpha) = \int_0^1 K(\xi) \xi^\alpha \ln \xi d\xi.$$

4.190. Обозначения:

$$S(\alpha) = \int_0^\infty x^\alpha K(x) dx, \quad T(\alpha) = \int_0^\infty K(x) x e^{-\alpha x} dx.$$

$$\begin{aligned} 1) \text{ Если } n=0, \text{ то } u(x) &= \frac{A}{S(0)}, \text{ если } n=1 \text{ то } u(x) = \frac{Ax}{S(0)} + \frac{AS(1)}{S^2(0)}, \\ \text{если } n=2, \text{ то } u(x) &= \frac{Ax^2}{S(0)} + \frac{2AS(1)x}{S^2(0)} + \frac{2AS^2(1)}{S^3(0)} - \frac{AS(2)}{S^2(0)}; \quad 2) u(x) = \frac{Ae^{\lambda x}}{T(\lambda)}; \\ 3) u(x) &= A \frac{d^n}{d\lambda^n} \left(\frac{e^{\lambda x}}{T(\lambda)} \right) \Big|_{\lambda=0}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{4.191.} \quad 1) u(x) &= A(\alpha + \beta)e^{\beta x}; \quad 2) u(x) = A(\alpha \sin \beta x + \beta \cos \beta x); \\ 3) u(x) &= A(\alpha \operatorname{ch} \beta x + \beta \operatorname{sh} \beta x); \\ 4) u(x) &= A((\alpha + \beta) \cos \gamma x - \gamma \sin \gamma x) e^{\beta x}; \\ 5) u(x) &= Ax^{n-1}((\alpha + \beta)x + n)e^{\beta x}; \\ 6) u(x) &= Ax^{n-1}((\alpha x + n) \sin \beta x + \beta x \cos \beta x); \\ 7) u(x) &= Ax^{n-1}((\alpha x + n) \operatorname{ch} \beta x + \beta x \operatorname{sh} \beta x). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{4.192.} \quad 1) u(x) &= A(\alpha - \beta)e^{\beta x}, \quad 2) u(x) = A(\alpha \cos \beta x + \beta \sin \beta x), \\ 3) u(x) &= A(\alpha \operatorname{sh} \beta x - \beta \operatorname{ch} \beta x), \quad 4) u(x) = Ax^{n-1}(\alpha x - n), \\ 5) u(x) &= A((\alpha - \beta) \sin \gamma x - \gamma \cos \gamma x) e^{\beta x}, \\ 6) u(x) &= Ax^{n-1}((\alpha x - n) \cos \beta x + \beta x \sin \beta x), \\ 7) u(x) &= Ax^{n-1}((\alpha x - n) \operatorname{sh} \beta x - \beta x \operatorname{ch} \beta x). \end{aligned}$$

$$\text{Указание к п. 7. } u(x) = A \operatorname{Re} \left\{ \frac{1}{i^n} \frac{d^n}{d\beta^n} \left[(\alpha - i\beta) e^{i\beta x} \right] \Big|_{\beta=0} \right\}.$$

$$\mathbf{4.193.} \quad u(x) = \frac{A}{I(\alpha)} e^{-\alpha x}, \quad I(\alpha) = 1 + \mu \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} (\ln 4\alpha - \psi(1)).$$

$$\mathbf{4.194.} \quad u(x) = \frac{A}{I(\alpha)} e^{-\alpha x}, \quad I(\alpha) = 1 + \frac{\lambda n!}{\alpha^{n+1}} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln \alpha + \psi(1) \right).$$

$$\mathbf{4.195.} \quad u(x) = \frac{A}{I(\alpha)} e^{-\alpha x}, \quad I(\alpha) = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{\pi^2}{6} + \ln \alpha - \psi(1) \right).$$

- 4.196.** 1) $u(x) = A \frac{\alpha^2 - \beta^2}{2\alpha} e^{\beta x}$; 2) $u(x) = A \frac{\alpha^2 + \beta^2}{2\alpha} \sin \beta x$;
 3) $u(x) = \frac{Ax^{n-2}}{2\alpha} (\alpha^2 x^2 - n(n-1))$;
 4) $u(x) = \frac{A}{2\alpha} [(\alpha^2 - \beta^2 + \gamma^2) \cos \gamma x + 2\beta\gamma \sin \gamma x] e^{\beta x}$;
 5) $u(x) = A \frac{\alpha^2 - \beta^2}{2\alpha} \operatorname{ch} \gamma x$;
 6) $u(x) = \frac{Ax^{n-2}}{2\alpha} [((\alpha^2 + \beta^2)x^2 - n(n-1)) \cos \beta x + 2n\beta x \sin \gamma x]$;
 7) $u(x) = \frac{Ax^{n-2}}{2\alpha} [((\alpha^2 - \beta^2)x^2 - n(n-1)) \operatorname{sh} \beta - 2n\beta x \operatorname{ch} \beta x]$.

4.197. Обозначения: $I(\alpha) = \int_0^1 \frac{\xi^\alpha d\xi}{1+\xi}$, $K(\alpha) = \int_0^1 \frac{\xi^\alpha \ln x \xi}{1+\xi}$, $\alpha > -1$.

1) $u(x) = Cx^\alpha$, C — произвольная постоянная, α — корень уравнения $\mu I(\alpha) = 1$; 2) если $\mu I(0) < 1$, где $I(0) = \ln 2$, то $u(x) = \frac{Ax^n}{1 - \mu I(n)}$,

если $\mu I(0) > 1$, $\mu I(n) \neq 1$, то $u(x) = \frac{Ax^n}{1 - \mu I(n)} + Cx^\alpha$, если $\mu I(n) = 1$,

то $u(x) = -\frac{A}{K(n)} x^n \ln x + Cx^n$; 3) если $0 < \mu I(\alpha) < 1$, то

$u(x) = \frac{\mu AK(n)}{1 - \mu I(n)} x^n \left(\ln x + \frac{1}{1 - \mu I(n)} \right)$, если $\mu I(0) > 1$, $\mu I(n) \neq 1$, то

$u(x) = \frac{\mu AK(n)}{1 - \mu I(n)} x^n \left(\ln x + \frac{1}{1 - \mu I(n)} \right) + Cx^\alpha$; результат вычисления интегралов: $I(n) = (-1)^n \left(\ln 2 + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k} \right)$, $K(n) = (-1)^{n+1} \left(\frac{\pi^2}{12} + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k^2} \right)$.

4.198. 1) $u(x) = Cx^\beta$, C — произвольная постоянная, β — корень уравнения $\mu B(\beta + 1, \alpha) = 1$, $\beta > -1$, $\mu > 0$; 2) если $\mu < \alpha$, то $u(x) = \frac{Ax^n}{1 - \mu B(n+1, \alpha)}$,

если $\mu > \alpha$, $\mu B(n+1, \alpha) \neq 1$, то $u(x) = \frac{Ax^n}{1 - \mu B(n+1, \alpha)} + Cx^\beta$, если

$\mu B(n+1, \alpha) = 1$, то $u(x) = -\frac{Ax^n \ln x}{\mu K(n)} + Cx^n$, где $K(n) = \int_0^1 \frac{\xi^n \ln \xi d\xi}{(1-\xi)^{\alpha-1}}$;

3) если $\mu < \alpha$, то $u(x) = \frac{Ax^n}{1 - \mu B(n+1, \alpha)} \left(\ln x + \frac{\mu K(n)}{1 - \mu B(n+1, \alpha)} \right)$, если $\alpha < \mu$,

$\mu B(n+1, \alpha) \neq 1$, то $u(x) = \frac{Ax^n}{1 - \mu B(n+1, \alpha)} \left(\ln x + \frac{\mu K(n)}{1 - \mu B(n+1, \alpha)} \right) + Cx^\beta$.

У к а з а н и е. Из неравенства $B(n+1, \alpha) = \int_0^1 t^n (1-t)^{\alpha-1} dt \leq \int_0^1 (1-t)^{\alpha-1} dt = \frac{1}{\alpha}$ следует, что при $\mu < \alpha$ уравнение $\mu B(\beta + 1, \alpha) = 1$, не имеет решения.

4.199. $u(x) = \frac{Ax^n}{1 + \lambda I(n)}$, $I(n) = \frac{n!}{\alpha^{n+1}} - e^{-\alpha} \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!} \frac{1}{\alpha^{n-k+1}}$.

4.200. 1) $u(x) = \frac{Ax}{\pi} + \frac{B}{2}$; 2) $\frac{A}{P(n)} x^n$, где $P(2k) = (-1)^k \frac{d^{2k}}{dx^{2k}} \frac{1 - \cos \pi \lambda}{\lambda} \Big|_{\lambda=1}$,

$P(2k+1) = (-1)^{k+1} \frac{d^{2k+1}}{dx^{2k+1}} \frac{\sin \pi \lambda}{\lambda} \Big|_{\lambda=1}$.

4.201. $u(x) = A \frac{\Gamma(\alpha + \beta + 2)}{\Gamma(\alpha + 1)\Gamma(\alpha + 2)}$.

4.202. 1) $u(x) = A(\alpha + \beta + 1)x^\beta$; 2) $u(x) = A(1 + (\alpha + 1)\ln x) + B \cdot (\alpha + 1)$;
3) $u(x) = A \ln^{n-1} x((\alpha + 1)\ln x + 1)$.

4.203. $u(x) = \frac{Ax}{aJ_1(a)}$.

4.204. $u(x) = -\frac{Ax^2}{a^2 K_2(a)}$.

4.205. 1) $u(x) = \frac{4Ax}{e^2 + 1} + B$; 2) $u(x) = A \frac{(\lambda + 1)^2 x^\lambda}{1 + \lambda e^{\lambda+1}}$;

3) $u(x) = A \frac{d^n}{d\lambda^n} \left(\frac{(\lambda + 1)^2 x^\lambda}{1 + \lambda e^{\lambda+1}} \right) \Big|_{\lambda=0}$.

4.206. $u(x) = A(1 + \alpha) \left(x + \frac{\alpha + 1}{\alpha + 2} \right)$.

4.207. 1) $u(x) = \frac{A}{e^\alpha - 1}(\alpha x - 1) + \frac{\alpha e^\alpha}{e^\alpha - 1}$;

2) если $\lambda \neq \alpha$, то $u(x) = A \frac{\alpha - \lambda}{e^{\alpha-\lambda} - 1} e^{\lambda x}$, если $\lambda = \alpha$, то $u(x) = A e^{\alpha x}$;

3) $u(x) = A \frac{d^n}{d\lambda^n} \left(\frac{(\alpha - \lambda) e^{\lambda x}}{e^{\alpha-\lambda} - 1} \right) \Big|_{\lambda=0}$.

4.208. 1) Если $\alpha - \beta\gamma \neq 0$, то $u(x) = A \frac{\alpha + \beta\gamma}{e^{\alpha+\beta\gamma} - 1} x^\gamma$, если $\alpha + \beta\gamma = 0$, то $u(x) = A x^\gamma$; 2) $u(x) = A \frac{d^n}{d\gamma^n} \left(\frac{(\alpha + \beta\gamma) x^\gamma}{e^{\alpha+\beta\gamma} - 1} \right) \Big|_{\gamma=0}$.

4.209. $u(x) = f(\xi) + \frac{\varphi(\xi)}{\varphi'(\xi)} f'(\xi)$, $x = \varphi(\xi)$.

Частный случай: $u(x) = \frac{A \cos 2\xi}{\cos \xi}$, $x = \sin \xi$. У к а з а н и е. Сделать замену переменной $\xi = \varphi(x)$, продифференцировать по ξ , под интегралом перейти к производной по y и проинтегрировать по частям.

4.210. $u(x) = (\alpha + 1)f(\xi) + \frac{\varphi(\xi)}{\varphi'(\xi)} f'(\xi)$, $x = \varphi(\xi)$.

4.211. 1) $u(x) = A(\ln x + \alpha)$; 2) $A(1 + \alpha\beta)x^\beta$; 3) $u(x) = A \ln^{n-1} x(\ln x + \alpha)$.

4.212. 1) $u(x) = A(x + \frac{\alpha}{3})$; 2) $u(x) = 2A \sqrt{\frac{\alpha\lambda}{\pi}} \frac{e^{\lambda x}}{\operatorname{erf}(\sqrt{\alpha\lambda})}$;

3) $u(x) = 2A \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \frac{d^n}{d\lambda^n} \frac{\sqrt{\lambda} e^{\lambda x}}{\operatorname{erf}(\alpha\sqrt{x})} \Big|_{\lambda=0}$.

4.213. $u(x) = -\frac{A(2n-1)}{P_{2n}(0)}$.

4.214. $u(x) = -\frac{2A(n+1)(2n-1)}{P_{2n}(0)} x$.

4.215. $u(x) = \frac{A(2n+1)}{2} P_n(x)$.

4.216. $u(x) = \frac{(-1)^n A(2n+1)(2n)!}{2^{n+1}(n!)^2} x^n$.

4.217. $u(x) = \frac{(-1)^n A(2n+1)(2n)!}{2^{n+1}n!(n+1)!} x^{n+1}$.

4.218. $u(x) = \frac{Ax^n}{n!}$.

$$4.219. u(x) = \frac{(-1)^n A}{n!} x^n e^{-x}.$$

$$4.220. u(x) = \frac{(-1)^n A}{(n+1)!} x^{n+1}.$$

$$4.221. u(x) = \frac{A}{(n+1)!} (x + (n+1)^2) x^n e^x.$$

$$4.222. \text{ Если } n = 1, 2, 3, \dots, \text{ то при } k\alpha \neq 1, u(x) = \frac{A}{I} e^{-\alpha x}, I = \frac{1}{k\alpha} \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right)^n;$$

если $k\alpha = 1$, то нет решений; если $n = 0$, то $u(x) = k\alpha A e^{-\alpha x}$.

$$4.223. u(x) = \frac{(-1)^n A}{(n+1)! \sqrt{\pi}} x^{n+1}.$$

$$4.224. \text{ Если } n > 0, \text{ то } u(x) = \frac{Ax^n}{nn! \sqrt{\pi}}; \text{ если } n = 0, \text{ то } u(x) = \frac{Ax^2}{\sqrt{\pi}}.$$

$$4.225. u(x) = \frac{\gamma}{\alpha\beta} \frac{A}{F(\alpha, \beta, \gamma, a) - 1}.$$

$$4.227. u(x) = \frac{A}{I} x, I = \frac{\gamma+1}{\alpha+1} \Phi(\alpha+1, \gamma+1, 1) - \frac{\gamma(\gamma+1)}{\alpha(\alpha+1)} (\Phi(\alpha, \gamma, 1) - 1).$$

$$4.227. u(x) = \frac{f(x)}{I}, I^2 = \int_0^1 f(x) dx.$$

$$4.228. u(x) = \pm \sqrt{\frac{A(\alpha-\beta)}{e^{\alpha+\beta}-1}} e^{\beta x}.$$

$$4.229. u(x) = \frac{f(x)}{I}, I^2 = \int_0^1 g(x) f(x) dx.$$

$$4.230. u(x) = \pm \sqrt{A}, u(x) = \pm \sqrt{A} (3\xi - 2), u(x) = \pm \sqrt{A} (10\xi^2 - 12\xi + 3), \xi = f(x).$$

$$4.231. u(x) = \frac{Ae^{\beta x}}{1 + kCe^{\alpha x}}, C - \text{ корень уравнения } C = A \int_a^b \frac{e^{\alpha x} dx}{1 + kCe^{\alpha x}}.$$

$$4.232. u(x) = \frac{f(x)}{1 + Cg(x)}, C - \text{ корень уравнения } C = \int_a^b \frac{f^{\alpha} dx}{(1 + Cg(x))^{\alpha+1}}.$$

$$4.233. u(x) = Ax^{\frac{1+\alpha}{1-\gamma}}, A^{\gamma-1} = \frac{\beta^{\frac{1+\alpha}{1-\gamma}}}{k\Gamma\left(\frac{1+\alpha}{1-\gamma}\right)}.$$

У к а з а н и е. Сделать замену $y = \xi x$.

$$4.234. u(x) = Bx^{\alpha}, B - \text{ корень уравнения } B^2 \int_0^1 f(y) dy + B - A = 0.$$

$$4.235. u(x) = Bx^{\beta}, B - \text{ корень уравнения } kB^2 - \alpha B - \alpha A = 0.$$

$$4.236. u(x) = \pm \frac{A}{\sqrt{\pi}} (\sin x + \cos x).$$

$$4.237. u(x) = \pm \sqrt{\frac{A}{2}}, u(x) = \pm \sqrt{\frac{2A}{\pi^2 - 8}} (x - \pi),$$

$$u(x) = \pm \frac{1}{2} \sqrt{\frac{-A}{\pi^2 - 9}} (x^2 - \pi x - 2).$$

$$4.238. u(x) = \pm \sqrt{\frac{A}{\pi + \sqrt{2\pi^2 - 8}}} \left(x \pm \sqrt{\frac{\pi^2 - 4}{2}} \right),$$

$$u(x) = \pm \sqrt{\frac{A}{\pi - \sqrt{2\pi^2 - 8}}} \left(x \pm \sqrt{\frac{\pi^2 - 4}{2}} \right) \text{ при любом сочетании знаков.}$$

$$4.239. u(x) = \pm \sqrt{\frac{A\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma\left(\frac{\alpha+k+1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{\alpha-k+1}{2}\right)}} x^{\frac{\alpha-k-1}{2}} e^{\beta x}.$$

$$4.240. u(x) = \pm \sqrt{-2A} (x-1).$$

$$4.241. u(x) = \pm \sqrt{-\frac{A}{3}} (7\alpha x - 3) e^{-\alpha x}, u(x) = \pm \sqrt{-\frac{A}{2}} (7\alpha x - 4) e^{-\alpha x}.$$

$$4.242. u(x) = \pm \sqrt{\frac{A}{B}} x^{\frac{\alpha-1}{2}} e^{\frac{\beta x}{a}}, B = \int_0^1 \xi^{\frac{\alpha-1}{2}} (a-\xi)^{\frac{\alpha-1}{2}} d\xi.$$

У к а з а н и е. Сделать замену $y = \xi x$ и отыскивать решение вида $Bx^\gamma e^{\beta x}$, где β и γ — константы.

$$4.243. u(x) = \pm \sqrt{\frac{A}{I}} x^{\frac{\alpha}{2}} e^{\beta x}, I = \int_0^1 \frac{\xi^{\frac{\alpha}{2}} (1-\xi)^{\frac{\alpha}{2}} d\xi}{a+b\xi}.$$

$$4.244. u(x) = \pm \sqrt{\frac{A}{I}} x^{\frac{\alpha}{2}} e^{\beta x}, I = \int_0^1 \frac{\xi^{\frac{\alpha}{2}} (1-\xi)^{\frac{\alpha}{2}} d\xi}{\sqrt{a+b\xi^2}}.$$

$$4.245. u(x) = Bx^\alpha, B — корень уравнения $\frac{k\Gamma^2(\alpha+1)}{\Gamma(2\alpha+2)} B^2 - B + A = 0.$$$

$$4.246. u(x) = Ix^{\frac{\alpha-1}{2}} e^{\beta x}, I — корень уравнения $kBI^2 - I + A = 0,$
 $B = \int_0^1 e^{\alpha\xi} (\xi - \xi^2)^{\frac{\alpha-1}{2}} d\xi.$$$

$$4.247. u(x) = -\frac{e^{\beta x}}{k\beta(\alpha-1)}, \alpha > -1, \beta > 0.$$

$$4.248. u(x) = -\frac{\Gamma(\beta(\alpha+1)+2)}{k\Gamma(\beta+1)\Gamma(\alpha\beta+1)} x^\beta.$$

4.249. $u(x) = p \ln x + q$, где (p, q) — решение системы: $2p + q + q^2 = 2B$, $p - Ap(p-q) = B$. Для q получается уравнение четвертой степени. В частном случае $A = 3$, $B = 8$ имеется решение $u(x) = 2 \ln x + 3$.

4.250. $u(x) = px \ln x + qx$, где (p, q) — решение системы: $2p + q + \frac{Aq^2}{3} = 2B$, $p - \frac{Ap}{9}(p-3q) = B$. Для q получается уравнение четвертой степени. В частном случае $A = -3$, $B = 3$ интегральное уравнение имеет решение $u(x) = x(3 \ln x + 1)$.

$$4.251. u(x) = \frac{\beta^{2\alpha+1} x^\alpha}{A\gamma(2\alpha+1, \beta)}, \text{ где } \gamma(x, y) — \text{неполная гамма-функция.}$$

$$4.252. u(x) = \frac{(2\beta)^{2\alpha+1} e^{-\beta x}}{\gamma(2\alpha+1, \beta)}, \text{ где } \gamma(x, y) — \text{неполная гамма-функция.}$$

$$4.253. u(x) = Bx^\alpha, B — корень уравнения $kB^2 - (2\alpha+1)B = (2\alpha+1)A.$$$

$$4.254. u(x) = Bx, B — корень уравнения $k\left(1 - \frac{\pi}{4}\right)B^2 - B + A = 0.$$$

$$4.255. u(x) = Be^{\frac{\alpha+\beta}{1-n}x}, B^{n-1} = \left(\frac{\beta+\alpha n}{1-n}\right)^{m+1} \frac{1}{x\Gamma(k+1)}.$$

$$4.256. u(x) = g(x) - kC, C — корень уравнения $Ce^{\beta kC} = \int_a^b e^{\beta g(y)} dy.$$$

$$4.257. u(x) = Be^{\alpha x} + f(x),$$

B — корень уравнения $B + \int_a^b \varphi(y) e^{\beta \text{Exp}(\alpha y)} dy, \varphi(y) = Ae^{-\alpha y + \beta f(y)}$.

$$4.258. u(x) = B, B — корень уравнения $B - \frac{1}{b} e^{\alpha B} \ln(1 + \frac{b}{a}) = A$.$$

$$4.259. u(x) = B, B — корень уравнения $B - kIe^{\alpha B} = A$,$$

где $I = \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \frac{\sqrt{b} + \sqrt{a+b}}{\sqrt{a}}$, если $a > 0, b > 0$, либо $I = \frac{1}{\sqrt{-b}} \arcsin \sqrt{\frac{-a}{b}}$, если $a > 0, b < 0$.

$$4.260. u(x) = f(x) - Cg(x), C — корень уравнения$$

$$C = \int_a^b \text{ch}[\beta(f(y) - Cg(y))] dy.$$

$$4.261. u(x) = B, B — корень уравнения $B - \frac{1}{b} \text{ch } \alpha B \cdot \ln(1 + \frac{b}{a}) = A$.$$

$$4.262. u(x) = B, B — корень уравнения $B - I \cdot \text{th}(\alpha B) = A$,$$

где значение I определено в ответе к задаче 4.259.

$$4.263. u(x) = Bx^k, B — корень уравнения $1 + A \int_a^b y^k \text{tg}(\beta B y^k) dy = 0, k \in \mathbb{R}$.$$

$$4.264. u(x) = \frac{2}{\pi} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{yf(y)dy}{\sqrt{x^2 - y^2}}.$$

$$4.265. u(x) = \frac{1}{\pi} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{f(y)dy}{\sqrt{x-y}} = \frac{f(a)}{\pi\sqrt{x-y}} + \frac{1}{\pi} \int_a^x \frac{f'(y)dy}{\sqrt{x-y}}. \text{ Вторая форма ответа получается интегрированием по частям при условии дифференцируемости функции } f(x).$$

$$4.266. u(x) = \frac{1}{\pi} e^{\alpha x} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{e^{-\alpha y} f(y)dy}{\sqrt{x-y}}.$$

$$4.267. u(x) = \frac{\alpha}{\pi} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{e^{\alpha y} f(y)dy}{\sqrt{e^{\alpha x} - e^{\alpha y}}}.$$

$$4.268. u(x) = \frac{1}{\pi} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{\text{sh } y f(y)dy}{\sqrt{\text{ch } x - \text{ch } y}}.$$

$$4.269. u(x) = \frac{1}{\pi} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{f(y)dy}{y \sqrt{\ln \frac{x}{y}}}.$$

$$4.270. u(x) = \frac{1}{\pi} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{I_1(y) f(y)dy}{\sqrt{I_0(x) - I_0(y)}}.$$

$$4.271. u(x) = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{f(y) g'(y) dy}{(g(x) - g(y))^{1-\alpha}}. \text{ У к а з а н и е. Решение данного}$$

уравнения в частном случае $(\alpha = \frac{1}{2})$ построено в примере 4.8. Аналогичная процедура построения применима и здесь: замена x на s , интегрирование от a до x с множителем $g'(s)(g(x) - g(s))^{1-\alpha}$ и т.д.

$$4.272. u(x) = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{f(y) dy}{(x-y)^{1-\alpha}} = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi} \left[\frac{f(a)}{(x-a)^{1-\alpha}} + \int_a^x \frac{f'(y) dy}{(x-y)^{1-\alpha}} \right].$$

$$4.273. u(x) = \frac{\sin \pi \alpha}{2\pi} e^{\beta x^2} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{e^{-\beta y^2} f(y) dy}{(\sqrt{x} - \sqrt{y})^{1-\alpha}}.$$

$$4.274. u(x) = \frac{\beta \sin \pi \alpha}{\pi x^\gamma} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{y^{\beta-1} f(y) dy}{(x^\beta - y^\beta)^{1-\alpha}}.$$

$$4.275. u(x) = \frac{\beta \sin \pi \alpha}{\pi} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{e^{\beta y} f(y) dy}{(e^{\beta x} - e^{\beta y})^{1-\alpha}}.$$

$$4.276. u(x) = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{\operatorname{ch} y f(y) dy}{(\operatorname{sh} x - \operatorname{sh} y)^{1-\alpha}}.$$

$$4.277. u(x) = \frac{k \sin \pi \alpha}{\pi} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{f(y) dy}{\operatorname{ch}^2 kx (\operatorname{th} kx - \operatorname{th} ky)^{1-\alpha}}.$$

$$4.278. u(x) = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{u(y) dy}{y (\ln \frac{x}{y})^{1-\alpha}}.$$

$$4.279. u(x) = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{\sin y f(y) dy}{(\cos y - \cos x)^{1-\alpha}}.$$

$$4.280. u(x) = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{e^{-\beta y} u(y) dy}{(\operatorname{ch} x - \operatorname{ch} y)^{1-\alpha}}.$$

$$4.281. u(x) = \frac{k \sin \pi \alpha}{\pi} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{(1 + k^2 y^2)^{-1} u(y) dy}{(\operatorname{arctg} ky - \operatorname{arctg} kx)^{1-\alpha}}.$$

$$4.282. u(x) = \frac{k}{\pi} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{f(y) dy}{\operatorname{sh}^2 ky \sqrt{\operatorname{cth} ky - \operatorname{cth} kx}}.$$

$$4.283. u(x) = -\frac{2}{\pi} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{K'_\nu(y) f(y) dy}{\sqrt{K_\nu(y) - K_\nu(x)}}.$$

$$4.284. u(x) = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{K_1(y) f(y) dy}{K_0(y) - K_0(x)^{1-\alpha}}.$$

$$4.285. u(x) = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi \alpha} g'(x) \left(\frac{1}{g'(x)} \frac{d}{dx} \right)^2 \int_a^x \frac{f(y) g'(y) dy}{g(x) - g(y)^\alpha}.$$

Решение. Уравнение

$$\int_a^x (g(x) - g(y))^\alpha u(y) dy = f(x)$$

посредством дифференцирования сводится к уравнению задачи 4.271,

$$\int_a^x \frac{u(y) dy}{(g(x) - g(y))^{1-\alpha}} = \frac{f'(x)}{\alpha g'(x)}.$$

Следовательно,

$$u(x) = \frac{\sin \pi(1-\alpha)}{\pi \alpha} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{f'(y) dy}{(g(x) - g(y))^{1-\alpha}}.$$

Так как в данном случае дифференцируемость функции не является обязательной, то следует преобразовать интеграл:

$$\begin{aligned} \int_a^x \frac{f'(y)dy}{(g(x) - g(y))^\alpha} &= \frac{1}{(1 - \alpha)g'(x)} \int_a^x f'(y) \frac{d}{dx}(g(x) - g(y))^{1-\alpha} dy = \\ &= \frac{1}{(1 - \alpha)g'(x)} \frac{d}{dx} \int_a^x f'(y)(g(x) - g(y))^{1-\alpha} dy = \frac{1}{(1 - \alpha)g'(x)} \frac{d}{dx} \left[f(y)(g(x) - \right. \\ &\quad \left. - g(y))^{1-\alpha} \right]_a^x + (1 - \alpha) \int_a^x \frac{f(y)g'(y)dy}{(g(x) - g(y))^\alpha} = \frac{1}{g'(x)} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{f(y)g'(y)dy}{(g(x) - g(y))^\alpha}. \end{aligned}$$

$$4.286. u(x) = \frac{2}{\pi} \frac{d^2}{dx^2} \int_a^x \frac{f(y)dy}{\sqrt{x-y}}.$$

$$4.287. u(x) = \frac{2}{\pi} e^{\beta x^2} \frac{d^2}{dx^2} \int_a^x \frac{e^{-\beta y^2} f(y)dy}{\sqrt{x-y}}.$$

$$4.288. u(x) = \frac{2}{\pi x} \frac{d^2}{dx^2} \int_a^x \frac{f(y)dy}{y\sqrt{x-y}}.$$

$$4.289. u(x) = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi \alpha \sqrt{x}} \left(\sqrt{x} \frac{d}{dx} \right)^2 \int_a^x \frac{f(y)dy}{\sqrt{y}(\sqrt{x} - \sqrt{y})^\alpha}.$$

$$4.290. u(x) = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi \alpha} \operatorname{sh} x \left(\frac{1}{\operatorname{sh} x} \frac{d}{dx} \right)^2 \int_a^x \frac{\operatorname{sh} y f(y)dy}{(\operatorname{ch} x - \operatorname{ch} y)^\alpha}.$$

$$4.291. u(x) = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi \alpha} \cos x \left(\frac{1}{\cos x} \frac{d}{dx} \right)^2 \int_a^x \frac{\cos y f(y)dy}{(\sin x - \sin y)^\alpha}.$$

$$4.292. u(x) = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi \alpha} e^{\beta x} \sin x \left(\frac{1}{\sin x} \frac{d}{dx} \right)^2 \int_a^x \frac{e^{-\beta y} \sin y f(y)dy}{\cos y - \cos x}^\alpha.$$

$$4.293. u(x) = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi \alpha} \varphi(x) \left(\frac{1}{\varphi(x)} \frac{d}{dx} \right)^2 \int_a^x \frac{\varphi(y) f(y)dy}{(\arcsin kx - \arcsin ky)^\alpha}, \text{ где функция } \varphi(x) = (1 - k^2 x^2)^{-\frac{1}{2}}.$$

$$4.294. u(x) = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi \alpha \operatorname{ch}^2 x} \left(\operatorname{ch}^2 x \frac{d}{dx} \right)^2 \int_a^x \frac{f(y)dy}{\operatorname{ch}^2 y (\operatorname{th} x - \operatorname{th} y)^\alpha}.$$

$$4.295. u(x) = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi \alpha} \left(x \frac{d}{dx} \right)^2 \int_a^x \frac{f(y)dy}{y (\ln \frac{x}{y})^\alpha}.$$

$$4.296. u(x) = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi \alpha} e^{\beta x} \left(e^{-\beta x} \frac{d}{dx} \right)^2 \int_a^x \frac{e^{\beta y} f(y)dy}{(e^{\beta x} - e^{\beta y})^\alpha}.$$

$$4.297. u(x) = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi \alpha} \varphi(x) \left(\frac{1}{\varphi(x)} \frac{d}{dx} \right)^2 \int_a^x \frac{\varphi(y) f(y)dy}{(\operatorname{arctg} x - \operatorname{arctg} y)^\alpha}, \varphi(x) = \frac{1}{1 + x^2}.$$

$$4.298. u(x) = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi \alpha} \varphi(x) e^{\beta x} \left(\frac{1}{\varphi(x)} \frac{d}{dx} \right)^2 \int_a^x \frac{\varphi(y) e^{-\beta y} f(y)dy}{(\arccos ky - \arccos kx)^\alpha},$$

$$\varphi(x) = \frac{k}{\sqrt{1 - k^2 x^2}}.$$

$$4.299. u(x) = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi \alpha} I_1(x) \left(\frac{1}{I_1(x)} \frac{d}{dx} \right)^2 \int_a^x \frac{I_1(y) f(y)dy}{(I_0(x) - I_0(y))^\alpha}.$$

4.300. $f(x) = -\frac{4}{\pi^2} \frac{d}{dx} \int_x^a \frac{sds}{\sqrt{s^2 - x^2}} \cdot \frac{d}{ds} \int_0^s \frac{g(t)tdt}{\sqrt{s^2 - t^2}}$. Решение. Чтобы выразить функцию f через функцию g применяется формула Гаусса для эллиптических интегралов, вывод которой исходит из интеграла

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{a^2 \cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi}}, \quad 0 < b < a.$$

Если ввести новую переменную посредством соотношения

$$\sin \varphi = p(\theta), \quad \text{где} \quad p(\theta) = \frac{2a \sin \theta}{a + b + (a - b) \sin^2 \theta},$$

то

$$d\varphi = d \arcsin p(\theta) = 2a \frac{a + b - (a - b) \sin^2 \theta}{a + b + (a - b) \sin^2 \theta} \cdot \frac{d\theta}{\sqrt{(a + b)^2 - (a - b)^2 \sin^2 \theta}},$$

а сумма под корнем в подынтегральной функции будет равна

$$a^2 \cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi = a^2 + (b^2 - a^2) \sin^2 \varphi = a \cdot \frac{a + b - (a - b) \sin^2 \theta}{a + b + (a - b) \sin^2 \theta}.$$

При изменении φ от 0 до $\frac{\pi}{2}$ переменная θ изменяется в тех же пределах. Итак, результатом преобразований является соотношение

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{a^2 \cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \cos^2 \theta + ab \sin^2 \theta}},$$

называемое формулой Гаусса. Если $\frac{a+b}{2} = 1$, $ab = 1 - k^2$, то правая часть представляет собой полный эллиптический интеграл $K(k)$. Решением системы

$$\begin{cases} a + b = 2, \\ ab = 1 - k^2, \end{cases} \quad \text{будет пара чисел} \quad \begin{cases} a = 1 + k, \\ b = 1 - k, \end{cases}$$

так что в этом случае подкоренное выражение в интеграле слева приводится к виду

$$a^2 \cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi = a^2 - (a^2 - b^2) \sin^2 \varphi = (1 + k)^2 - 4k \sin^2 \varphi,$$

а сам интеграл равен

$$\frac{1}{1+k} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \frac{4k}{(1+k)^2} \sin^2 \varphi}} = \frac{1}{1+k} K\left(\frac{2\sqrt{k}}{1+k}\right).$$

Отсюда следует соотношение

$$\frac{1}{1+k} K\left(\frac{2\sqrt{k}}{1+k}\right) = K(k),$$

называемое преобразованием Ландена.

Интегральное уравнение, записанное в виде

$$\int_0^x \frac{f(y)}{x} \frac{1}{1 + \frac{y}{x}} K\left(\frac{2\sqrt{\frac{y}{x}}}{1 + \frac{y}{x}}\right) dy + \int_x^a \frac{f(y)}{y} \frac{1}{1 + \frac{x}{y}} K\left(\frac{2\sqrt{\frac{x}{y}}}{1 + \frac{x}{y}}\right) dy = g(x),$$

после применения преобразования Ландена принимает форму

$$\int_0^x \frac{f(y)}{x} K\left(\frac{y}{x}\right) dy + \int_x^a \frac{f(y)}{y} K\left(\frac{x}{y}\right) dy = g(x).$$

Каждое слагаемое в левой части уравнения можно преобразовать:

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} K\left(\frac{y}{x}\right) &= \frac{1}{x} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \frac{y^2}{x^2} \sin^2 \varphi}} \xrightarrow{s=y \sin \varphi} \int_0^y \frac{ds}{\sqrt{x^2 - s^2} \sqrt{y^2 - s^2}}, \\ \frac{1}{y} K\left(\frac{x}{y}\right) &= \int_0^x \frac{ds}{\sqrt{y^2 - s^2} \sqrt{x^2 - s^2}}. \end{aligned}$$

Теперь левая часть уравнения

$$\int_0^x f(y) dy \int_0^y \frac{ds}{\sqrt{y^2 - s^2} \sqrt{x^2 - s^2}} + \int_x^a f(y) dy \int_0^x \frac{ds}{\sqrt{x^2 - s^2} \sqrt{y^2 - s^2}}$$

сводится к двойному интегралу по области, которая представляет собой трапецию; при этом областью интегрирования в первом слагаемом служит треугольник, во втором — прямоугольник. После изменения порядка интегрирования получается уравнение

$$\int_0^x \frac{ds}{\sqrt{x^2 - s^2}} \int_s^a \frac{f(y) dy}{\sqrt{y^2 - s^2}} = g(x).$$




Рис. 4.4

Внутренний интеграл представляет собой известную функцию

$$h(s) = \int_s^a \frac{f(y) dy}{\sqrt{y^2 - s^2}}, \quad 0 \leq s \leq a,$$

которая удовлетворяет интегральному уравнению Вольтерра первого рода

$$\int_0^x \frac{h(s) ds}{\sqrt{x^2 - s^2}} = g(x), \quad 0 \leq x \leq a.$$

Функция f выражается через h , а h через g посредством формул (см. задачу 4.264)

$$f(x) = -\frac{2}{\pi} \frac{d}{dx} \int_x^a \frac{h(s) ds}{\sqrt{s^2 - x^2}}, \quad h(s) = \frac{2}{\pi} \frac{d}{ds} \int_0^s \frac{g(t) dt}{\sqrt{s^2 - t^2}},$$

откуда следует ответ.

4.301. $u(x) = \frac{2}{\pi\mu - 2}.$

4.302. $u(x) = \frac{2x}{2 - 3 \ln 2}.$

4.303. $u(x) = \frac{\mu\pi a}{2 - \mu\pi} + ax^2.$

4.304. $u(x) = \frac{\mu e^x}{1 - \mu} \int_0^1 f(y) e^{-y} dy + f(x).$

$$4.305. u(x) = -2x^3.$$

$$4.306. u(x) = 4 + \frac{5\mu x}{5 - \mu}.$$

$$4.307. u(x) = \left(1 - \frac{2}{3}\mu + \mu\sqrt{x}\right) \left(1 + \frac{\mu^2}{18}\right)^{-1}.$$

$$4.308. u(x) = \frac{1}{2} (1 + e^{2x}).$$

$$4.309. u(x) = \sqrt{x} e^{\mu x}.$$

$$4.310. u(x) = x^2 e^{\frac{\mu x^3}{3}}.$$

$$4.311. u(x) = \sin^2 x.$$

$$4.312. u(x) = \frac{1}{1 - \mu}.$$

$$4.313. u(x) = x + \frac{\mu}{1 - \mu^2} (1 + \mu|x|).$$

$$4.314. u(x) = \frac{2}{\pi} \frac{2V_2 - V_1}{3}, \quad v(x) = \frac{2}{\pi} \frac{2V_1 - V_2}{3}.$$

$$4.316. R(x, y, \mu) = \frac{\sqrt[4]{xy^3}}{1 - \frac{\mu}{2}}; \quad u(x) = \sqrt[4]{x} (x - \frac{2}{5}).$$

$$4.317. R(x, y, \mu) = \frac{y\sqrt{y}}{1 - \frac{\mu}{3}}; \quad u(x) = (3 - x)\sqrt{x}.$$

$$4.318. R(x, y, \mu) = \frac{e^{x-y}}{1 - \mu}; \quad u(x) = \frac{e^x}{1 - \mu}.$$

$$4.319. R(x, y, \mu) = \frac{\sin x \cos^5 y}{1 - \frac{\mu}{6}}; \quad u(x) = \sin^2 x - \frac{4}{35} \sin x.$$

$$4.320. R(x, y, \mu) = \frac{\sin(x - y) - \frac{\mu\pi}{2} \cos(x - y)}{1 + \left(\frac{\mu\pi}{2}\right)^2}; \quad u(x) = 1 - \frac{1}{\pi} \sin x + \cos x.$$

$$4.321. R(x, y, \mu) = e^{x^2 - y^2 + \mu(x - y)}; \quad u(x) = 1 + \sqrt{\frac{\pi}{2}} \mu e^{(x + \frac{\mu}{2})^2} \left[\operatorname{erf}\left(x + \frac{\mu}{2}\right) - \operatorname{erf}\left(\frac{\mu}{2}\right) \right].$$

$$4.322. R(x, y, \mu) = \frac{5 - 3 \cos x}{5 - 3 \cos y} e^{\mu(x - y)}; \quad u(x) = e^x \left[\frac{1}{2} (5 - 3 \cos x) \operatorname{arctg}\left(2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}\right) + 1 \right].$$

$$4.323. R(x, y, \mu) = \frac{\operatorname{sh} \sqrt{\mu} (x - y)}{\sqrt{\mu}}; \quad u(x) = (x + 2)e^x - \operatorname{sh} x.$$

$$4.324. R(x, y, \mu) = \frac{x e^{-\frac{y^2}{2}}}{1 - \mu}; \quad u(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\mu I_0(1)}{e(1 - \mu)} x + J_0(2x). \quad \text{У к а з а н и е. Воспользоваться формулой (3.78).}$$

4.325. $u = C$. У к а з а н и е. Продифференцировать уравнение (точнее, тождество) по ε .

4.326. Ядро должно быть разностным: $K(t, \tau) = K(t - \tau)$. Р е ш е н и е. Если T — основной период (т.е. наименьший положительный период) функ-

ции $u(t)$, то функция $v(t)$ должна быть периодической с тем же периодом (это следует из 4.10). В этом случае справедливо тождество

$$v(t+T) = k v(t+T) + \int_{-\infty}^{t+T} K(t+T) ds,$$

которое заменой $s = \tau + t$ преобразуется к виду

$$v(t+\tau) = k u(t+\tau) + \int_{-\infty}^t K(t+T, \tau+T) u(\tau+T) ds.$$

Так как $v(t+\tau) = v(t)$, $u(t+\tau) = u(t)$, то

$$\forall t \in \mathbb{R}: \int_{-\infty}^t [K(t+T, \tau+T) - K(t, \tau)] u(\tau) d\tau = 0.$$

Отсюда $K(t+T, \tau+T) - K(t, \tau) = 0$ и далее

$$\frac{\partial}{\partial T} [K(t+T, \tau+T) - K(t, \tau)] \Big|_{T=0} = 0 \implies \frac{\partial K}{\partial t} + \frac{\partial K}{\partial \tau} = 0.$$

Общее решение полученного уравнения (см. главу 9) $K(t, \tau) = K(t - \tau)$.

4.327. У к а з а н и я п.1. Произведение операторов

$$(\mathcal{K}_1 \mathcal{K}_2 u)(t) = \int_0^t K_1(t-s) (\mathcal{K}_2 u)(s) ds = \int_0^t K_1(t-s) ds \int_0^s K_2(s-\tau) u(\tau) d\tau;$$

в последнем интеграле изменить порядок интегрирования; п.1 и п.2. сделать замену переменной $s - \tau = \xi$ и $s = t + \tau - \xi$ соответственно.

4.328. Р е ш е н и е. Для $0 < t - \tau < R$ (см. (4.28))

$$|K_1(t - \tau)| = |K(t - \tau)| \leq M,$$

$$|K_2(t - \tau)| \leq \int_{\tau}^t M^2 d\tau = M^2(t - \tau),$$

$$|K_3(t - \tau)| \leq \int_{\tau}^t M^3(t - \tau) d\tau = M^3 \frac{(t - \tau)^2}{2}$$

и т.д. Для ядра $K_n(t - \tau)$ получается оценка (устанавливается методом математической индукции)

$$|K_n(t - \tau)| \leq M^n \frac{(t - \tau)^{n-1}}{(n-1)!}. \quad (4.42)$$

Пусть $0 < r_1 < r$, R — любое положительное число, $t - \tau \leq R$. В соответствии с определением 2 нужно найти радиус сходимости ряда из функций $K_n(t - \tau)$. В силу оценки (4.27),

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n K_n(t - \tau) \right| \leq M \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \frac{(M(t - \tau))^{n-1}}{(n-1)!} \leq \frac{M}{r_1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n| r_1^n}{(n-1)!} \left(\frac{MR}{r_1} \right)^{n-1}.$$

Так как ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{MR}{r_1} \right)^{n-1} \frac{1}{(n-1)!} = e^{\frac{MR}{r_1}}$$

сходится при любом R , то общий член ряда стремится к нулю, следовательно, существует n_0 такое, что для $n > n_0$

$$\left(\frac{MR}{r_1} \right)^{n-1} \frac{1}{(n-1)!} < 1.$$

Таким образом, исходный ряд мажорируется сходящимся числовым рядом

$$\frac{M}{r_1} \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| r_1^n,$$

что доказывает его равномерную сходимость для $t - \tau \leq R$.

4.329. У к а з а н и е к п. 3. Непрерывность следует из оценки

$$\| \mathcal{K}u_n - \mathcal{K}u \| = \| \mathcal{K}(u_n - u) \| \leq \| \mathcal{K} \| \| u_n - u \|.$$

4.330. Р е ш е н и е. Доказательство проводится методом последовательных приближений, основанном на построении последовательности $v_0 = u$, $u_n = u + \mu \mathcal{K}v_{n-1}$, $n = 1, 2, 3, \dots$ которая является отрезком ряда Неймана

$$\sum_{m=0}^{\infty} \mu^m \mathcal{K}^m u.$$

Поскольку $K \in C(\bar{h})$, то $|K| \leq M$ и

$$\| \mathcal{K}^m u \| \leq \frac{M^m t^m}{(m-1)!} \| u \|, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

(доказательство проводится методом математической индукции). С помощью этого неравенства получается оценка

$$\left| \sum_{m=1}^{\infty} \mu^m \mathcal{K}^m u \right| \leq M \sum_{m=1}^{\infty} \frac{|\mu|^m M^m t^m}{(m-1)!} \| u \| \leq M \sum_{m=1}^{\infty} \frac{|\mu|^m M^m t_0^m}{(m-1)!} \| u \| = e^{|\mu| M t_0},$$

т.е. ряд Неймана мажорируется сходящимися числовым рядом, поэтому при любом $\mu \in \mathbb{C}$ ряд сходится равномерно (и абсолютно) на отрезке $[0; t_0]$. Так как члены ряда — непрерывные функции на $\bar{h}$, то его сумма $v \in \bar{h}$. Итак,

$$v = \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \sum_{m=0}^{\infty} \mu^m \mathcal{K}^m u, \\ \| v \| \leq M e^{|\mu| M t_0} \| u \| . \quad (4.43)$$

Существование решения. Если в последовательности u_n перейти к пределу при $n \rightarrow \infty$, то получится соотношение $v = u + \mu \mathcal{K}v$, т.е. v — решение интегрального уравнения. Единственность. Пусть есть два решения v_1 и v_2 , тогда функция $v = v_1 - v_2$ — решение уравнения $v = \mu \mathcal{K}v$, откуда

$$v = \mu \mathcal{K}v = \mu^2 \mathcal{K}^2 v = \dots = \mu^m \mathcal{K}^m v.$$

Так как ряд Неймана сходится на $\bar{h}$, то его общий член стремится к нулю с ростом n , поэтому

$$\| v \| \leq |\mu|^m \| \mathcal{K}^m v \| \rightarrow 0,$$

откуда $\| v \| = 0$, или $v = 0$. Непрерывная зависимость v от u следует из соотношения (4.43). По определению (4.42)

$$v = \left(\sum_{m=0}^{\infty} \mu^m \mathcal{K}^m \right) u = \frac{u}{1 - \mu \mathcal{K}}.$$

Резольвентным называется такой оператор $\mathcal{R}$, что $v = u + \mu \mathcal{R}u$, следовательно, $1 + \mu \mathcal{R} = \frac{u}{1 + \mu \mathcal{K}}$.

4.331. $u(x) = 1 - 2x + 3x^2$.

4.332. $u(x) = e^{-x} + \sin x$.

4.333. Нет решения.

4.334. $u(x) = \cos 5x$.

- 4.335. $u(x) = \begin{cases} \frac{\mu}{1-\mu} q \int_0^x f(x) dx + f(x), & \mu \neq 1, \\ C + f(x), & \mu = 1, \int_0^1 f(x) dx = 0, \\ \text{нет решений}, & \mu = 1, \int_0^1 f(x) dx \neq 0. \end{cases}$
- 4.336. $u(x) = \begin{cases} \frac{\mu(1+2a)}{4+\mu(2-\pi)} \operatorname{arctg} x + x^2 + a, & \mu \neq \frac{4}{\pi-2}, \\ x^2 - \frac{1}{2} + C \operatorname{arctg} x, & \mu = \frac{4}{\pi-2}, a = -\frac{1}{2}, \\ \text{нет решений}, & \mu = \frac{4}{\pi-2}, a \neq -\frac{1}{2}. \end{cases}$
- 4.337. $u(x) = \begin{cases} \frac{\mu(a+2)}{2+\mu(2-\pi)} \arcsin x + ax + 1, & \mu \neq \frac{2}{\pi-2}, \\ C \arcsin x - 2x + 1, & \mu = \frac{2}{\pi-2}, a = -2, \\ \text{нет решений}, & \mu = \frac{2}{\pi-2}, a \neq -2. \end{cases}$
- 4.338. $u(x) = \begin{cases} \frac{\mu\pi(2+a)}{2(1-\mu)} \sin x + 4x + a, & \mu \neq 1, \\ C \sin x + 4x - \pi, & \mu = 1, a = -\pi, \\ \text{нет решений}, & \mu = 1, a \neq -\pi. \end{cases}$
- 4.339. $u(x) = \begin{cases} \frac{\mu\pi(\pi+2a)}{2-\mu\pi} \cos^2 x + x + a, & \mu \neq \frac{2}{\pi}, \\ C \cos^2 x + x - \frac{\pi}{2}, & \mu = \frac{2}{\pi}, a = -\frac{\pi}{2}, \\ \text{нет решений}, & \mu = \frac{2}{\pi}, a \neq -\frac{\pi}{2}. \end{cases}$
- 4.340. $u(x) = \begin{cases} x^5, & \mu \neq \frac{1}{\sqrt{\pi} \operatorname{erf} 1}, \\ C e^{-x^2} + x^5, & \mu = \frac{1}{\sqrt{\pi} \operatorname{erf} 1}. \end{cases}$
- 4.341. $u(x) = \begin{cases} \sin x, & \mu \neq -\frac{1}{2}, \\ \sin x + C \cos x, & \mu = -\frac{1}{2}. \end{cases}$
- 4.342. $u(x) = \begin{cases} \frac{\mu a(3-4 \ln 2)}{2(1-\mu(1-\ln 2))(1+x)} + ax, & \mu \neq \frac{1}{1-\ln 2}, \\ \frac{C}{1+x}, & \mu = \frac{1}{1-\ln 2}, a = 0, \\ \text{нет решения}, & \mu = \frac{1}{1-\ln 2}, a \neq 0. \end{cases}$
- 4.343. $u(x) = \begin{cases} \frac{5\mu+3-\frac{5}{2}x^2(6\mu+3)}{4\mu+3}, & \mu \neq \frac{2}{3}, \pm \frac{3}{4}, \\ \frac{19}{17} + Cx - \frac{105}{34}x^2, & \mu = \frac{2}{3}, \\ C + \frac{1}{5} - (C + \frac{1}{5})x^2, & \mu = \frac{3}{4}, \\ \text{нет решений}, & \mu = -\frac{3}{4}. \end{cases}$

$$4.344. u(x) = 1.$$

$$4.345. u(x) = \frac{9}{4} \ln x - 60x^2 + 50x.$$

$$4.346. u(x) = \begin{cases} Cx^2 - \frac{5}{9} \left(\frac{C}{3} + \frac{10}{11} \right) \ln^2 x - 4x + \frac{133}{33}, & a = \frac{133}{33}, \\ \text{нет решений}, & a \neq \frac{133}{33}. \end{cases}$$

$$4.347. u(x) = \frac{1}{12} \ln^2 x + \frac{1}{3} \ln x + x - \frac{1}{4}.$$

$$4.348. u(x) = \begin{cases} 1 - \frac{4}{\pi} \sin x - \frac{4}{3\pi} \sin 3x, & \mu \neq \frac{4}{\pi}, \\ 1 + C_1 \sin x + C_2 \sin 3x, & \mu = \frac{4}{\pi}. \end{cases}$$

$$4.349. u(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{\mu + 1}, & \mu \neq -\frac{1}{2}, -1 \\ Cx + \left(2 + \frac{\pi^2 C}{3} \right) \sin x, & \mu = -\frac{1}{2}, \\ \text{нет решений}, & \mu = -1. \end{cases}$$

$$4.350. u_1(x) = 0, u_2(x) = \frac{1}{2\mu}, u_{3,4} = \frac{3}{8\mu}(1 \pm x).$$

$$4.351. u(x) = 3x - 1.$$

$$4.352. u_1(x) = \frac{3}{5} \cos x, u_{2,3}(x) = \frac{1}{5}(3 \cos x \pm 4).$$

$$4.353. u(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{\sqrt{\pi} - \mu}, & \mu \neq \sqrt{\pi}, \\ \text{нет решений}, & \mu = \sqrt{\pi}. \end{cases}$$

$$4.354. u(x) = \begin{cases} \frac{2kx}{1 - \mu(4 - \pi)}, & \mu \neq \frac{2}{\pi}, \mu \neq \frac{2}{4 - \pi}, \\ \frac{\pi kx}{2(\pi - 2)}, & \mu = \frac{2}{\pi}, \\ \text{нет решений}, & \mu = \frac{2}{4 - \pi}. \end{cases}$$

$$4.355. u(x) = \begin{cases} \frac{C}{1 + x^2} + kx, & \mu = \frac{4}{\pi + 2}, \\ kx, & \mu \neq \frac{4}{\pi + 2}. \end{cases}$$

$$4.356. u(x) = \begin{cases} \frac{\mu \sqrt[4]{e} (\sqrt{\pi} - \sin x)}{\sqrt[4]{e} - \mu} + 4x, & \mu \neq \sqrt[4]{e}, \\ \text{нет решений}, & \mu = \sqrt[4]{e}. \end{cases}$$

$$4.357. u(x) = \begin{cases} \frac{3\mu A \cos x}{\sqrt{\pi}(1 - \mu k)} + Ax^2, & \mu k \neq 1, \\ \text{нет решений}, & \mu k = 1, \end{cases}$$

$$k = \frac{2}{\sqrt{\pi} \sqrt[4]{e}} \int_0^{\frac{1}{2}} e^{x^2} dx = \frac{1}{i \sqrt[4]{e}} \operatorname{erf} \frac{i}{2}.$$

$$4.358. 1) u(x, y) = -g^\tau(y) A^{-1}(x) g(x), \quad A = I + H, \quad I - \text{единичная матрица}, \\ H - \text{матрица с элементами } h_{ij} = \int_x^\infty g_i(s) g_j(s) ds, \quad g - \text{вектор-столбец с ком-} \\ \text{понентами } g_i; \text{ если } y = x, \text{ то } u(x, x) = \frac{1}{\Delta} \frac{d\Delta}{dx}, \quad \Delta = \det A;$$

2) $u(x, y) = \bar{g}^T(y) A^{-1}(x) \bar{g}(y)$, $A = I + H\bar{H}$, H — матрица с элементами $h_{ij} = \int_x^\infty g_i(s) \bar{g}_j(s) ds$, $u(x, x) = \bar{g}^T(x) A^{-1}(x) \bar{g}(x)$;

3) $u(x, y) = -\bar{g}^T(y) A^{-1}(x) \bar{H}(x) g(x)$, $u(x, x) = \frac{1}{2\Delta} \frac{d\Delta}{dx}$, A и H те же, что и в предыдущем пункте.

Решение п. 1. Структура уравнения (4.33)

$$u(x, y) = - \sum_{j=1}^n g_j(y) \left(g_j(x) + \int_x^\infty u(x, s) g_j(s) ds \right)$$

подсказывает вид решения

$$u(x, y) = \sum_{j=1}^n v_j(x) g_j(y). \quad (4.44)$$

Если $u(x, y)$ в форме (4.44) подставить в (4.33), то требование равенства нулю коэффициентов при $g_j(y)$ порождает систему линейных алгебраических уравнений

$$v_i(x) + g_i(x) + \sum_{j=1}^n v_j(x) \int_x^\infty g_i(s) g_j(s) ds = 0, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n,$$

или в матричной форме

$$A v = -g. \quad (4.45)$$

Таким образом, если функция $u(x, y)$, определенная выражением (4.44), удовлетворяет уравнению (4.33), то $v(x)$ — решение уравнения (4.45). Непосредственной подстановкой проверяется справедливость обратного утверждения. Следовательно, уравнения (4.45) и (4.33) эквивалентны. Матрица H — положительно определенная, так как для любого вектора $p(x)$

$$\begin{aligned} p^T(x) H(x) p(x) &= \sum_{i,j=1}^n p_i(x) h_{i,j} p_j(x) = \\ &= \int_x^\infty \sum_{i,j=1}^n p_i(x) g_i(s) p_j(x) g_j(s) ds = \int_x^\infty \left(\sum_{i=1}^n p_i(x) g_i(s) \right)^2 ds \geq 0. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что $\det A = \Delta \neq 0$. Иначе, уравнение $(I + H)p = 0$, или, что то же самое, $Hp = -p$, имело бы нетривиальное решение $p \neq 0$, соответствующее отрицательному собственному значению -1 . Таким образом, уравнение (4.45) имеет единственное решение $v(x) = -A^{-1}(x)g(x)$, которое определяет единственное решение $v(x) = -g^T(y)A^{-1}(x)g(x)$ уравнения (4.33). При $y = x$

$$\begin{aligned} u(x, x) &= -g^T(x) A^{-1}(x) g(x) = - \sum_{i,j=1}^n g_i(A^{-1})_{ij} g_j = \\ &= \sum_{i,j=1}^n \frac{dh_{ij}}{dx} (A^{-1})_{ij} = \sum_{i,j=1}^n \frac{h'_{ij} A_{ij}}{\Delta} \frac{1}{\Delta} \frac{d\Delta}{dx}. \end{aligned}$$

Указание к п. 3.

$$\begin{aligned} u(x, x) &= -\bar{g}^T(x) A^{-1}(x) \bar{H}(x) g(x) = - \sum_{i,k,l=1}^n \bar{g}_i(A^{-1})_{ik} \bar{h}_{kl} g_l = \\ &= \sum_{i,k,l=1}^n (A^{-1})_{ik} \bar{h}_{kl} h'_{li} \operatorname{tr}(A^{-1} \bar{H} H') = \frac{1}{2} \operatorname{tr}[(\bar{H} H)' A^{-1}] = \frac{1}{2} \operatorname{tr}(A' A^{-1}). \end{aligned}$$

$$\mathbf{4.359.} \quad 1) \nu(M) = \frac{1}{4\pi^2 r_0} \int_S f(M) ds - \frac{1}{\pi} f(M); \quad 2) \nu(M) = C + \frac{1}{\pi} f(M).$$

Указание. Если $P, Q \in S$, то $r_{PQ} = -2r_0 \cos \varphi_{PQ}$.

$$\mathbf{4.360.} \quad \mu_1 = \frac{1}{\pi}, \quad u_1(x) = \sin x + \cos x, \\ \mu_2 = -\frac{1}{\pi}, \quad u_2(x) = \sin x - \cos x.$$

$$4.361. \mu = 6, \quad u(x) = x^2 - x.$$

$$4.362. \mu_1 = 1, \quad u_1(x) = x + \frac{\pi^3}{9} \cos x, \\ \mu_2 = -\frac{1}{2}, \quad u_2(x) = \cos x.$$

$$4.363. \mu_1 = 1, \quad u_1(x) = 3x^2 + \ln x, \\ \mu_2 = -\frac{10}{17}, \quad u_2(x) = 12x^2 - 5 \ln x.$$

$$4.364. \mu_{1,2} = \frac{4}{\pi}, \quad u_1(x) = \cos x, \quad u_2(x) = \cos 3x.$$

$$4.365. \mu_1 = -\frac{3}{4}, \quad u_1(x) = x, \\ \mu_{2,3} = \frac{3\sqrt{5}}{8}(-\sqrt{5} \pm 3), \quad u_{2,3}(x) = \sqrt{5}x^2 \pm 1.$$

$$4.366. \mu_1 = \frac{3}{16}, \quad u_1(x) = x^2 + 1, \\ \mu_{2,3} = -\frac{3}{2}, \quad u_2(x) = x, \quad u_3(x) = 2x^2 - 1.$$

$$4.367. \mu_1 = \frac{2}{\pi}, \quad u_1(x) = 1, \\ \mu_2 = \frac{4}{\pi}, \quad u_2(x) = \cos 2x, \\ \mu_3 = -\frac{4}{\pi}, \quad u_3(x) = \sin 2x.$$

$$4.368. \mu_1 = \frac{2}{\pi+1}, \quad u_1(x) = 1, \\ \mu_{2,3} = \pm \frac{3\pi}{\sqrt{2}}, \quad u_{2,3}(x) = \sin 4x \pm \sqrt{2} \cos 4x.$$

$$4.369. \mu_1 = \frac{1}{6}, \quad u_1(x) = \operatorname{sh} 1 \operatorname{sh} x + \frac{6 \operatorname{sh} 1}{7e} x + 3, \\ \mu_2 = \frac{3}{4}, \quad u_2(x) = x.$$

$$4.370. \mu = 2, \quad u(x) = 1.$$

$$4.371. \mu_{1,2} = \pm 1, \quad u_{1,2}(x) = \pi \pm 4x + 8 \cos x.$$

$$4.372. \mu_1 = \frac{2}{\pi}, \quad u_1(x) = 1 + 3 \cos 2x, \\ \mu_{2,3} = \frac{6}{3\pi \pm 2\sqrt{22}}, \quad u_{2,3}(x) = 3 \pm \sqrt{22} \sin x - 2 \cos 2x.$$

$$4.373. \mu_{1,2} = \pm \frac{5}{84}, \quad u_{1,2}(x) = 15 \sin x \pm 21 \sin 2x - 8 \sin 3x.$$

$$4.374. \mu_1 = -1, \quad u_1(x) = x^{\frac{1}{3}} - 2x^{-\frac{1}{3}}, \\ \mu_2 = \frac{1}{8}, \quad u_2(x) = 5x^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{1}{3}}.$$

$$4.375. \mu = -5, \quad u(x) = x - \sqrt{x}.$$

$$4.376. \mu_1 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} \ln 2 - 1}, \quad u_1(x) = \frac{x + \sqrt{2} + 1}{x + 1}, \\ \mu_2 = \frac{-\sqrt{2}}{\sqrt{2} \ln 2 - 1}, \quad u_2(x) = \frac{x + \sqrt{2} + 1 - 4 \ln 2}{x + 1}.$$

$$4.377. \mu_1 = \frac{1}{\sqrt{\alpha}(\sqrt{\alpha}-1)}, \quad u_1(x) = \frac{(x+1)\sqrt{\alpha}-1}{x^2+1}, \quad \alpha = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2};$$

$$\mu_2 = \frac{1}{\sqrt{\alpha}(\sqrt{\alpha}+1)}, \quad u_2(x) = \frac{(x+1)\sqrt{\alpha}+1}{x^2+1}.$$

$$4.378. \mu_n = \frac{4+\pi^2(2n+1)^2}{4ch1}, \quad u_n(x) = \sin \pi(n+\frac{1}{2})x, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

$$4.379. \mu_n = \frac{1-\pi^2 n^2}{\sin 1}, \quad u_n(x) = \cos \pi n x, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

$$4.380. \mu_n = 1 + \alpha_n^2, \quad u_n(x) = \cos \alpha_n x, \quad \alpha_n > 0 - \text{корень уравнения } \operatorname{ctg} \alpha = \alpha.$$

$$4.381. \mu_n = \frac{n^2}{8\pi}, \quad u_n(x) = \sin \frac{\pi n}{2} \left(1 + \frac{x}{\pi}\right), \quad n \in \mathbb{N}.$$

$$4.382. \mu_0 = \frac{1}{\pi^3}, \quad u_0(x) = e^{\frac{x}{\pi}}, \quad \mu_n = -\frac{n^2}{\pi}, \quad u_n(x) = \sin nx + \pi n \cos nx, \quad n \in \mathbb{N}.$$

$$4.383. \mu_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)^2 - 1, \quad u_n(x) = e^{-x} \sin \left(n + \frac{1}{2}\right)x, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

$$4.384. \mu_n = \frac{2n+1}{4\pi\alpha_n^2}, \quad u_n(s) = Y_n^m(s), \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

У к а з а н и е. Применить производящую функцию и теорему сложения.

$$4.385. \mu_n = \frac{2n+1}{4\sqrt{2}\pi}, \quad u_n(s) = Y_n^m(s), \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

$$4.386. \begin{cases} \mu \neq \frac{n^2}{8\pi}, & u(x) = \frac{\sin x}{1-2\pi\mu}, \quad n \in \mathbb{N}, \\ \mu = \frac{n^2}{8\pi}, & u(x) = \frac{4\sin x}{4-n^2} + C \sin \frac{n}{2}(x+\pi), \quad n \in \mathbb{N}, n \neq 2, \\ \mu = \frac{1}{2\pi}, & \text{нет решений.} \end{cases}$$

$$4.387. \begin{cases} \mu \neq (2n+1)^2, & u(x) = \frac{9\sin 3x}{9-\mu}, \quad n \in \mathbb{N}_0, \\ \mu = (2n+1)^2, & u(x) = \frac{9\sin 3x}{9-(2n+1)^2} + C \sin(2n+1)x, \quad n \in \mathbb{N}_0, n \neq 1, \\ \mu = 9, & \text{нет решений.} \end{cases}$$

$$4.388. \begin{cases} \mu \neq \frac{1}{\pi^3}, \mu \neq -\frac{n^2}{\pi}, & u(x) = \frac{\sin x + \pi \cos x}{1+\pi\mu}, \quad n \in \mathbb{N}, \\ \mu = \frac{1}{\pi^3}, & u(x) = Ce^{\frac{x}{\pi}} + \frac{\pi^2}{\pi^2+1}(\sin x + \pi \cos x), \\ \mu = -\frac{n^2}{\pi}, n \geq 2, & u(x) = C(\sin nx + \pi n \cos nx) + \frac{1}{1-n^2}(\sin x + \pi \cos x), \\ \mu = -\frac{1}{\pi}, & \text{нет решений.} \end{cases}$$

$$4.389. u(x) = x + \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin 2nx}{n^3}.$$

$$4.390. U(x) = 1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\mu_{0n}x)}{\mu_{0n}(1+\mu_{0n}^2)J_1(\mu_{0n})}.$$

$$4.391. u(s) = f(s) + \left(\frac{1}{2} - a\right) \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=-n}^n \frac{f_{nm} Y_n^m(s)}{n+\alpha}.$$

У к а з а н и е. См. задачу 4.385.

- 4.392.** $u(\theta) = \frac{\alpha}{\sqrt{1+t^2-2t\cos\theta}} + \frac{\alpha}{t} \ln \frac{t - \cos\theta + \sqrt{1+t^2-2t\cos\theta}}{1 - \cos\theta}.$
- 4.393.** $u(s) = \frac{u_0(2n+1)Y_n^m(s)}{2(n+1)}.$
- 4.394.** $u(s) = \frac{u_0}{28} \left(\frac{5}{6} Y_2^2(s) + \frac{3}{25} Y_n^m(s) \right).$
- 4.395.** $u(s) = f(s) + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=-n}^n \frac{1}{n} f_{nm} Y_n^m(s) + C$ при условии $\int_{S_1} f ds = 0.$
- 4.396.** $u(s) = \frac{1}{4\sqrt{2}\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=-n}^n (2n+1) f_{nm} Y_n^m(s).$
- 4.397.** $u(\theta) = \frac{\alpha(1-t^2)}{4\sqrt{2}\pi(1+t^2-2t\cos\theta)^{\frac{3}{2}}}.$
- 4.398.** $u(x) = (1 + \frac{4}{15}x^2)\sqrt{x}.$
- 4.399.** $u(x) = xe^x - \sin x.$
- 4.400.** $u(x) = (1 + \frac{2}{3}x)\sqrt{x}.$
- 4.401.** $u(x) = \frac{1}{\sqrt{3}} (\sin \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{\sqrt{3}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x) e^{\frac{t}{2}} + \frac{2}{3}e^{-t}.$
- 4.402.** $u(x) = (1 - \frac{4}{3}x)\sqrt{x}e^{-x}.$
- 4.403.** $u(x) = \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \left(x^{-\frac{2}{3}} - 6x^{\frac{1}{3}} \right).$
- 4.404.** $u(x) = \frac{5}{4} + \frac{\sqrt{2}}{\pi} x^{-\frac{1}{4}}.$
- 4.405.** $u(x) = \sin x.$
- 4.406.** $u(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^x \operatorname{erf}(\sqrt{x}).$
- 4.407.** $u(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}} e^x \operatorname{erf}(\sqrt{2x}).$
- 4.408.** $u(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}(\sqrt{x}).$
- 4.409.** $u(x) = \sqrt{\pi} e^x \operatorname{erf}(\sqrt{x}) - \sqrt{x}.$
- 4.410.** $u(x) = e^{-x^2}.$
- 4.411.** $u(x) = 2\sqrt{\frac{x}{\pi}} e^{-x} + (2x+1) \operatorname{erf} \sqrt{x}.$
- 4.412.** $u(x) = x \sin x.$
- 4.413.** $u(x) = 4xe^{-x^2}.$
- 4.414.** $u(x) = xJ_1(x) + \sin x.$
- 4.415.** $u(x) = J_0(x) - xJ_1(x).$
- 4.416.** $u(x) = 3(\operatorname{ch} x - 1).$
- 4.417.** $u(x) = \sin x.$
- 4.418.** $u(x) = \cos x.$

$$4.419. u(x) = \frac{125}{8}e^{\frac{5}{2}x} - 8e^x + \frac{9}{8}e^{\frac{x}{2}} + \frac{1}{4}e^{-\frac{x}{2}}.$$

$$4.420. u(x) = -2.$$

$$4.421. u(x) = 2x.$$

$$4.422. u(x) = e^x.$$

$$4.423. u(x) = \sin x.$$

$$4.424. u(x) = \cos x.$$

$$4.425. u(x) = sh x.$$

$$4.426. u(x) = J_1(x).$$

$$4.427. u(x) = I_1(x).$$

$$4.428. u(x) = \pm \frac{2\sqrt{3}}{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)} \sqrt[4]{\pi x}.$$

$$4.429. u(x) = \pm \frac{\operatorname{sh} x}{x\sqrt{2\pi x}}.$$

$$4.430. u(x) = 1.$$

$$4.431. u(x) = x e^x.$$

$$4.432. u(x) = x.$$

$$4.433. u(x) = \mathcal{E}rf(\pm\sqrt{x}).$$

$$4.434. u(x) = 4.$$

$$4.435. u(x) = I_0(x) e^x.$$

$$4.436. u(x) = 1 - x.$$

$$4.437. u(x) = e^x - 1.$$

$$4.438. u(x) = J_0(x) e^x.$$

$$4.439. u(x) = ch x. \text{ У к а з а н и е. Применить (3.41).}$$

$$4.440. u(x) = 1. \text{ У к а з а н и е. Применить (3.42).}$$

$$4.441. u(x) = x^2. \text{ У к а з а н и е. Применить (3.42).}$$

$$4.442. u(x) = x. \text{ У к а з а н и е. Применить (3.42).}$$

$$4.443. u(x) = x x. \text{ У к а з а н и е. Употребить соответствие (3.43).}$$

$$4.444. u(x) = 1, \quad v(x) = -ch x. \text{ У к а з а н и е. Использовать соотношения (3.42) и (3.43).}$$

$$4.445. u(x) = I_0(2\sqrt{x}) - 1.$$

$$4.446. u(x) = 1 - J_0(2\sqrt{x}).$$

$$4.447. u(x) = \frac{1 - \cos 2\sqrt{x}}{\pi\sqrt{x}}.$$

$$4.448. u(x) = \frac{2}{3\pi} \left(\frac{\operatorname{ch} 2\sqrt{x}}{\sqrt{x}} - \operatorname{sh} 2\sqrt{x} \right).$$

$$4.449. u(x) = \frac{3\sqrt{3}}{20\pi} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \sqrt[3]{x} J_{-\frac{2}{3}}(2\sqrt{x}) - 1}{\sqrt[3]{x^2}}.$$

$$4.450. u(x) = -\frac{1}{\pi} \int_x^\infty \frac{f'(y) dy}{\sqrt{y-x}}. \text{ У к а з а н и е. Сделать замену } y = 1/\xi.$$

4.451. $u(x) = -\frac{2x}{\pi} \int_x^\infty \frac{f'(y) dy}{\sqrt{y^2 - x^2}}$. У к а з а н и е. Замена $y = \sqrt{\xi}$ приводит данное уравнение к предыдущему.

4.452. $u(x) = -\frac{1}{\pi} \int_x^\infty \frac{f'(y) dy}{\sqrt{y^2 - x^2}}$. У к а з а н и е. Уравнение $2 \int_0^\infty u(\sqrt{x^2 + y^2}) dy = f(x)$ сводится к предыдущему заменой $\sqrt{x^2 + y^2} = \xi$.

4.453. $u(x) = e^x \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{erf} \sqrt{x}\right)$.

4.454. $u(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} e^{-2\sqrt{x}} - \operatorname{arctg} \sqrt{x}$.

4.455. $u(x) = 2x^{-\frac{3}{4}}$.

4.456. $u(x) = \frac{1}{3\sqrt{x}}$.

4.457. $u(x) = 2e^{-x}$.

4.458. $u(x) = \cos x$.

4.459. $u(x) = 1$.

4.460. $u(x) = \frac{J_0(x)}{1 - \mu}$.

4.461. $u(x) = \frac{x^2}{2} + \sqrt{\pi} x + 1$.

4.462. $u(x) = \eta(x - \alpha)$.

4.463. $u(x) = \frac{1}{\pi^2 \sqrt{x}} \ln \frac{\sqrt{x} + \sqrt{a}}{|\sqrt{x} - \sqrt{a}|}$. У к а з а н и е. Для преобразования интеграла ввести функцию $v(x) = xu(x)$ и применить теорему умножения (3.59).

4.464. $u(x) = \frac{1}{\pi} \ln \frac{\sqrt{x} + 1}{|\sqrt{x} - 1|}$.

4.465. $u(x) = -\frac{\ln|x-1|}{\pi x}$.

4.466. $u(x) = \ln|x^4 - 1|$.

4.467. $u(x) = \frac{\ln|x-1|}{\sqrt{x}}$. У к а з а н и е. Записать уравнение в виде

$$v(x) = \ln|x^2 - 1| - \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sqrt{\frac{x}{y}} v(y) dy}{1 + \frac{x}{y}}, \quad v(x) = \sqrt{x} u(x).$$

4.468. $u(x) = \eta(1-x) \ln x$. У к а з а н и е. Записать интеграл в виде $-\int_0^\infty \eta\left(1 - \frac{x}{y}\right) \ln \frac{x}{y} u(y) \frac{dy}{y}$.

4.469. $u(x) = \frac{x}{x+1} - \frac{1}{2} \ln(x+1)$. См. У к а з а н и е к предыдущей задаче.

4.470. $u(x) = \eta(x-1)$. У к а з а н и е. См. задачу 3.233, п. 1.

4.471. $u(x) = -\frac{\sqrt{x}}{\pi(x+1)}$.

4.472. $u(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

$$4.473. u(x) = \frac{1}{1+x}.$$

$$4.474. u(x) = 2e^{-x} + \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{1+x^2}.$$

$$4.475. u(x) = \frac{2x}{1+x^2} + \sqrt{\pi} e^{-x}.$$

$$4.476. u(x) = \frac{A}{\pi} \sqrt{\frac{a}{a+x}} \frac{1}{a+x}. \text{ У к а з а н и е. Из уравнения вычесть это же уравнение при } x=0.$$

4.477. У к а з а н и е. Для построения решения нужно осуществить следующие действия: 1) проинтегрировать уравнения системы по y :

$$f_i(x) = \int_{-\infty}^{\infty} E_i(y) dy, \quad i = 1, 2;$$

2) применить преобразование Фурье:

$$F_i(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f_i(x) e^{-i\lambda x} dx, \quad i = 1, 2;$$

3) решить линейную систему алгебраических уравнений относительно $F_1(\lambda)$ и $F_2(\lambda)$; 4) определить $f_1(x)$ и $f_2(x)$ посредством обратного преобразования Фурье; 5) выразить $E_1(r)$ через $f_1(x)$ (см. задачу 4.452).

$$4.478. \quad 1) f(t) = C \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\alpha+1)}{k\Gamma(2\alpha+1)}; \quad 2) f(t) = \frac{C}{\alpha} \left(1 - e^{-\frac{\alpha t}{2}}\right);$$

$$3) f(t) = \frac{2C_1}{3\omega} \left(1 - \cos \frac{\omega t}{2}\right).$$

У к а з а н и я. 1) Применить интегральное преобразование Лапласа; 2), 3) Дифференцированием свести интегральное уравнение к дифференциальному.

$$4.479. u(x) = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi} \int_0^x \frac{h'(\xi) d\xi}{(x-\xi)^{1-\alpha}}. \text{ Р е ш е н и е. С помощью первой формулы в задаче 10.239 уравнению можно придать форму}$$

$$\eta(x) \int_0^x \frac{h'(\xi) d\xi}{(x-\xi)^{1-\alpha}} = \eta(x) h(x) \implies \Gamma(1-\alpha) f_{1-\alpha} \eta(x) u(x) = \eta(x) h(x).$$

Применение оператора $f_{\alpha-1}*$ преобразует левую часть, с учетом ассоциативности свертки (см. задачу 10.190), к виду

$$\Gamma(1-\alpha) f_{\alpha-1} * (f_{1-\alpha} \eta(x) u) = \Gamma(1-\alpha) (f_{\alpha-1} * f_{1-\alpha} \eta(x) u) = \\ = \Gamma(1-\alpha) \delta * \eta u = \eta(x) u(x),$$

а правая часть превращается в

$$\frac{d}{dx} \frac{\eta(x)}{\Gamma(\alpha)} \int_0^x \frac{h(\xi) d\xi}{(x-\xi)^{1-\alpha}}.$$

Отсюда следует ответ.

$$4.480. u(x) = \frac{\sin \pi \alpha}{\pi} \left[\frac{h(a)}{(x-a)^{1-\alpha}} + \int_0^x \frac{h'(\xi) d\xi}{(x-\xi)^{1-\alpha}} \right].$$

Основные формулы

Формулы векторного анализа:

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(\varphi \mathbf{a}) &= \varphi \operatorname{div} \mathbf{a} + (\mathbf{a} \nabla \varphi), \\ \operatorname{rot}(\varphi \mathbf{a}) &= \varphi \operatorname{rot} \mathbf{a} + [\nabla \varphi, \mathbf{a}], \\ \nabla(\mathbf{a}, \mathbf{b}) &= (\mathbf{a} \nabla) \mathbf{b} + (\mathbf{b} \nabla) \mathbf{a} + [\mathbf{a} \operatorname{rot} \mathbf{b}] + [\mathbf{b} \operatorname{rot} \mathbf{a}], \\ \operatorname{div}[\mathbf{a} \mathbf{b}] &= (\mathbf{b} \operatorname{rot} \mathbf{a}) - (\mathbf{a} \operatorname{rot} \mathbf{b}), \\ \operatorname{rot}[\mathbf{a} \mathbf{b}] &= \mathbf{a} \operatorname{div} \mathbf{b} - \mathbf{b} \operatorname{div} \mathbf{a} + (\mathbf{b} \nabla) \mathbf{a} - (\mathbf{a} \nabla) \mathbf{b}, \\ \operatorname{rot} \operatorname{rot} \mathbf{a} &= \nabla \operatorname{div} \mathbf{a} - \Delta \mathbf{a}.\end{aligned}$$

Дифференциальные операции в ортогональных криволинейных координатах. Декартовы координаты (x_1, x_2, x_3) некоторой точки $x \in \mathbb{R}^3$ и ее криволинейные координаты (q_1, q_2, q_3) связаны известными соотношениями $x_i = x_i(q_1, q_2, q_3)$, $i = 1, 2, 3$. Пусть A_1, A_2, A_3 — компоненты вектора $\mathbf{A}$ в криволинейной системе, u — скалярная функция, dl — элемент длины, h_1, h_2, h_3 — коэффициенты Ламе, тогда

$$\begin{aligned}dl^2 &= dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2 = dq_1^2 + dq_2^2 + dq_3^2, \\ h_i &= \sqrt{\left(\frac{\partial x_1}{\partial q_i}\right)^2 + \left(\frac{\partial x_2}{\partial q_i}\right)^2 + \left(\frac{\partial x_3}{\partial q_i}\right)^2}, \quad i = 1, 2, 3, \\ (\nabla u)_i &= \frac{1}{h_i} \frac{\partial u}{\partial q_i}, \quad i = 1, 2, 3, \\ \operatorname{div} \mathbf{A} &= \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial q_2} (h_3 h_1 A_2) + \frac{\partial}{\partial q_3} (h_1 h_2 A_3) \right], \\ (\operatorname{rot} \mathbf{A})_1 &= \frac{1}{h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_2} (h_3 A_3) - \frac{\partial}{\partial q_3} (h_2 A_2) \right], \\ (\operatorname{rot} \mathbf{A})_2 &= \frac{1}{h_3 h_1} \left[\frac{\partial}{\partial q_3} (h_1 A_1) - \frac{\partial}{\partial q_1} (h_3 A_3) \right], \\ (\operatorname{rot} \mathbf{A})_3 &= \frac{1}{h_1 h_2} \left[\frac{\partial}{\partial q_1} (h_2 A_2) - \frac{\partial}{\partial q_2} (h_1 A_1) \right], \\ \Delta u &= \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_1} \left(\frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial u}{\partial q_1} \right) + \frac{\partial}{\partial q_2} \left(\frac{h_3 h_1}{h_2} \frac{\partial u}{\partial q_2} \right) + \frac{\partial}{\partial q_3} \left(\frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial u}{\partial q_3} \right) \right].\end{aligned}$$

Цилиндрические координаты:

$$\begin{aligned}x_1 &= x, \quad x_2 = y, \quad x_3 = z, \quad q_1 = r, \quad q_2 = \varphi, \quad q_3 = z, \quad x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi, \quad z = z; \\ dl^2 &= dr^2 + r^2 d\varphi^2 + dz^2, \quad h_r = 1, \quad h_\varphi = r, \quad h_z = 1; \\ (\nabla u)_r &= \frac{\partial u}{\partial r}, \quad (\nabla u)_\varphi = \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \varphi}, \quad (\nabla u)_z = \frac{\partial u}{\partial z}; \\ \operatorname{div} \mathbf{A} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z};\end{aligned}$$

$$(\operatorname{rot} \mathbf{A})_r = \frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z}, \quad (\operatorname{rot} \mathbf{A})_\varphi = \frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}, \quad (\operatorname{rot} \mathbf{A})_z = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(r A_\varphi) - \frac{1}{r} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi},$$

$$\Delta u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

Сферические координаты:

$$x_1 = x, \quad x_2 = y, \quad x_3 = z, \quad q_1 = r, \quad q_2 = \theta, \quad q_3 = \varphi,$$

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta,$$

$$dl^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2, \quad h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_\varphi = r \sin \theta;$$

$$(\nabla u)_r = \frac{\partial u}{\partial r}, \quad (\nabla u)_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}, \quad (\nabla u)_\varphi = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial u}{\partial \varphi};$$

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r}(r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}.$$

$$(\operatorname{rot} \mathbf{A})_r = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta A_\varphi) - \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\theta}{\partial \varphi},$$

$$(\operatorname{rot} \mathbf{A})_\theta = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(r A_\varphi),$$

$$(\operatorname{rot} \mathbf{A})_\varphi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(r A_\theta) - \frac{1}{r} \frac{\partial A_r}{\partial \theta},$$

$$\Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

Гамма-функция $\Gamma(z)$ и бета-функция $B(z, \zeta)$. $\Gamma(z)$ — аналитическая функция, особые точки которой $z = 0, -1, -2, \dots$ (простые полюсы) и $z = \infty$ (точка сгущения полюсов),

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt, \quad \operatorname{Re} z > 0, \quad \Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+n+1)}{z(z+1)\dots(z+n)}, \quad \operatorname{Re} z > -n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Гамма-функция не имеет нулей. Основные соотношения: рекуррентная формула $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$, формула удвоения $\sqrt{\pi}\Gamma(2z) = 2^{2z-1}\Gamma(z)\Gamma(z+1/2)$, формула дополнения $\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$. Частные значения:

$$\Gamma(n+1) = n!, \quad \Gamma(n+1/2) = \frac{\sqrt{\pi}(2n)!}{2^{2n}n!}, \quad \Gamma(1/2-n) = \frac{(-1)^n \sqrt{\pi} 2^{2n}n!}{(2n)!}.$$

$$B(z, \zeta) = \int_0^1 t^{z-1} (1-t)^{\zeta-1} dt, \quad \operatorname{Re} z > 0, \quad \operatorname{Re} \zeta > 0, \quad B(z, \zeta) = \frac{\Gamma(z)\Gamma(\zeta)}{\Gamma(z+\zeta)}.$$

Формула Лежандра: $2^{2z-1}B(z, z) = B(z, 1/2)$.

Логарифмическая производная Γ -функции $\psi(z) = \frac{d}{dz} \ln \Gamma(z) = \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}$ — мероморфная функция с простыми полюсами $z = -0, -1, -2, \dots$.

Основные соотношения для $\psi(z)$:

$$\psi(z+1) = \frac{1}{z} + \psi(z), \quad \psi(z+1/2) + \psi(z) + 2 \ln 2 = 2\psi(2z),$$

$$\psi(1-z) - \psi(z) = \pi \operatorname{ctg} \pi z.$$

$-\psi(1) = -\Gamma'(1) = \gamma \approx 0,577$ — постоянная Эйлера.

Неполная гамма-функция $\gamma(z, a) = \int_0^a t^{z-1} e^{-t} dt$, $\operatorname{Re} z > 0$.

Числа Бернулли. Ряд Лорана

$$\frac{z}{e^z - 1} = 1 - \frac{z}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\beta_n}{n!} z^n$$

сходится в кольце $0 < |z| < 2\pi$. Числа β_n удовлетворяют рекуррентному соотношению $(1 + \beta)^{n+1} - \beta^{n+1} = 0$, $n \in \mathbb{N}$, в котором после возведения в степень нужно заменить β^k на β_k . Все числа β_n рациональны, $\beta_{2m+1} = 0$, $m \in \mathbb{N}$, множество их значений ограничено. Числа $B_n = (-1)^n \beta_{2n}$ — положительные и называются числами Бернулли. Несколько первых чисел Бернулли: $B_1 = \frac{1}{6}$, $B_2 = \frac{1}{30}$, $B_3 = \frac{1}{40}$, $B_4 = \frac{1}{30}$, $B_5 = \frac{1}{66}$, $B_6 = \frac{691}{2730}$, $B_7 = \frac{7}{6}$.

Дзета-функция Римана. По определению

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}, \quad x > 1.$$

Интегральное представление: $\zeta(x) = \frac{1}{\Gamma(x)} \int_0^{\infty} \frac{t^{x-1} dt}{e^t - 1}$.

При $x = 2m$, $m \in \mathbb{N}$,

$$B_m = \frac{2(2m)!}{(2\pi)^{2m}} \zeta(2m).$$

Эллиптические интегралы. Эллиптические интегралы 1-го и 2-го рода

$$F(\varphi, k) = \int_0^{\varphi} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}}, \quad E(\varphi, k) = \int_0^{\varphi} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} d\varphi.$$

Полные эллиптические интегралы первого и второго рода

$$K(k) = F(\pi/2, k), \quad E(k) = E(\pi/2, k).$$

Интегралы Френеля:

$$C(z) = \int_0^z \cos \frac{\pi t^2}{2} dt, \quad S(z) = \int_0^z \sin \frac{\pi t^2}{2} dt.$$

Интегралы вероятности:

$$\operatorname{erf} x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt, \quad \operatorname{erf}(-x) = -\operatorname{erf} x, \quad \operatorname{erf} \infty = 1;$$

$$\operatorname{erf} x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^{\infty} e^{-t^2} dt, \quad \operatorname{erf} x + \operatorname{Erf} x = 1.$$

Асимптотическое разложение: $\sqrt{\pi} x e^{x^2} \operatorname{erf} x = 1 + \frac{1}{8x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)$, $x \rightarrow +\infty$.

Цилиндрические функции. Функция Бесселя первого рода порядка ν

$$J_{\nu}(z) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \left(\frac{z}{2}\right)^{2m+\nu}}{m! \Gamma(m+\nu+1)}$$

удовлетворяет уравнению Бесселя

$$u'' + \frac{1}{z}u' + \left(1 - \frac{\nu^2}{z^2}\right)u = 0;$$

$J_\nu(z)$ — аналитическая функция переменной z с особыми точками $z = 0$ (при нецелом ν) и $z = \infty$, целая функция переменной ν ;

$$J_{-n}(z) = (-1)^n J_n(z), \quad n \in \mathbb{N}_0,$$

$$J_n(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(z \sin \varphi - n\varphi)} d\varphi = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin(z \sin \varphi - n\varphi) d\varphi, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

Асимптотические формулы:

$$J_\nu(z) = \frac{z^\nu}{2^\nu \Gamma(\nu+1)} \left(1 + O(z^2)\right); \quad \nu \in \mathbb{Z}, \quad z \rightarrow 0;$$

$$J_n(z) = \frac{z^n}{2^n n!} \left(1 + O(z^2)\right), \quad n \in \mathbb{N}_0, \quad z \rightarrow 0,$$

$$J_\nu(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left[\cos\left(x - \frac{\pi\nu}{2} - \frac{\pi}{4}\right) + O\left(\frac{1}{x}\right) \right], \quad x \rightarrow +\infty.$$

Функция Бесселя второго рода порядка ν :

$$Y_\nu(z) = \frac{\cos \pi\nu J_\nu(z) - J_{-\nu}(z)}{\sin \pi\nu}, \quad \nu \in \mathbb{Z},$$

$$Y_n(z) = \lim_{\nu \rightarrow n} Y_\nu(z), \quad n \in \mathbb{Z},$$

является решением уравнения Бесселя. $Y_\nu(z)$ — аналитическая функция переменной z с особыми точками $z = 0$ и $z = \infty$ и целая функция переменной ν .
 $Y_{-n}(z) = (-1)^n Y_n(z)$.

Асимптотические формулы:

$$Y_\nu(z) = -\frac{2^\nu \Gamma(\nu)}{\pi z^\nu} \left(1 + O(z^2)\right), \quad \operatorname{Re} \nu > 0, \quad \nu \in \mathbb{Z}, \quad z \rightarrow 0;$$

$$Y_0(z) = \frac{2}{\pi} \ln z + O(1), \quad z \rightarrow 0;$$

$$Y_\nu(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left[\sin\left(x - \frac{\pi\nu}{2} - \frac{\pi}{4}\right) + O\left(\frac{1}{x}\right) \right], \quad x \rightarrow +\infty.$$

Функции Ганкеля:

$$H_\nu^{(1)}(z) = J_\nu(z) + i Y_\nu(z), \quad H_\nu^{(2)}(z) = J_\nu(z) - i Y_\nu(z).$$

Асимптотика при $z = x \rightarrow +\infty$: $H_\nu^{(1,2)}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left(e^{\pm i(x - \frac{\pi\nu}{2} - \frac{\pi}{4})} + O\left(\frac{1}{x}\right) \right)$.

Рекуррентные соотношения для цилиндрических функций

$$Z_\nu(z) = C_1 J_\nu(z) + C_2 Y_\nu(z),$$

где C_1 и C_2 не зависят ни от z , ни от ν :

$$\frac{d}{dz}(z^\nu Z_\nu(z)) = z^\nu Z_{\nu-1}(z), \quad \frac{d}{dz}(z^{-\nu} Z_\nu(z)) = -z^{-\nu} Z_{\nu+1}(z),$$

$$zZ'_\nu(z) + \nu Z_\nu(z) = zZ_{\nu-1}(z), \quad Z_{\nu-1}(z) + Z_{\nu+1}(z) = \frac{2\nu}{z} Z_\nu(z),$$

$$zZ'_\nu(z) - \nu Z_\nu(z) = -zZ_{\nu+1}(z), \quad Z_{\nu-1}(z) - Z_{\nu+1}(z) = 2Z'_\nu(z).$$

Функции Бесселя полуцелого порядка:

$$J_{n-1/2}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} z^n \left(-\frac{d}{zdz}\right)^n \cos z, \quad Y_{n-1/2}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} z^n \left(-\frac{d}{zdz}\right)^n \sin z,$$

$$H_{n-1/2}^{(1),(2)}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} z^n \left(-\frac{d}{zdz}\right)^n e^{\pm iz},$$

$$J_{1/2}(z) = Y_{-1/2}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \sin z, \quad Y_{1/2}(z) = J_{-1/2}(z) = -\sqrt{\frac{2}{\pi z}} \cos z,$$

$$H_{1/2}^{(1)}(z) = -iH_{-1/2}^{(1)}(z) = -i\sqrt{\frac{2}{\pi z}} e^{iz}, \quad H_{1/2}^{(2)}(z) = iH_{-1/2}^{(2)}(z) = i\sqrt{\frac{2}{\pi z}} e^{-iz}.$$

Вронскианы и некоторые формулы:

$$W[J_\nu, J_{-\nu}] = -\frac{2 \sin \pi \nu}{\pi z}, \quad W[J_\nu, Y_\nu] = \frac{2}{\pi z},$$

$$W[J_\nu, H_\nu^{(1),(2)}] = \pm \frac{2i}{\pi z}, \quad W[H_\nu^{(1)}, H_\nu^{(2)}] = -\frac{4i}{\pi z},$$

$$J_\nu(z)J_{-\nu+1}(z) + J_{-\nu}(z)J_{\nu-1}(z) = \frac{2 \sin \pi \nu}{\pi z}, \quad J_\nu(z)Y_{\nu-1}(z) - Y_\nu(z)J_{\nu-1}(z) = \frac{2}{\pi z}.$$

Модифицированные функции Бесселя $I_\nu(z)$ и $K_\nu(z)$ являются решениями модифицированного уравнения Бесселя

$$u'' + \frac{1}{z}u' - \left(1 + \frac{\nu^2}{z^2}\right)u = 0.$$

$$I_\nu(z) = e^{-\frac{i\pi\nu}{2}} J_\nu(iz) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{z}{2}\right)^{2m+\nu}}{m! \Gamma(m+\nu+1)},$$

$$K_\nu(z) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \frac{I_{-\nu}(z) - I_\nu(z)}{\sin \pi \nu}, & \nu \notin \mathbb{Z}, \\ \lim_{\nu \rightarrow n} K_\nu(z), & n \in \mathbb{Z}, \end{cases}$$

$$K_\nu(z) = \frac{i\pi}{2} e^{\frac{i\pi\nu}{2}} H_\nu^{(1)}(iz) = -\frac{i\pi}{2} e^{-\frac{i\pi\nu}{2}} H_\nu^{(2)}(-iz),$$

$$I_{-n}(z) = I_n(z), \quad n \in \mathbb{N}_0, \quad K_{-\nu}(z) = K_\nu(z).$$

$$I_n(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{z \cos \varphi - in\varphi} d\varphi = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi e^{z \cos \varphi} \cos(n\varphi) d\varphi, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

$$K_\nu(z) = \frac{2^\nu \Gamma(\nu + 1/2) z^\nu}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{\cos t \, dt}{(z^2 + t^2)^{\nu+1/2}}.$$

Асимптотические формулы:

$$K_\nu(z) = -\frac{2^{\nu-1} \Gamma(-\nu)}{z^\nu} \left(1 + \mathcal{O}(z^2)\right), \quad \nu > 0, \quad z \rightarrow 0;$$

$$K_0(z) = \ln \frac{1}{z} + \mathcal{O}(1), \quad z \rightarrow 0;$$

$$I_\nu(x) = \frac{e^x}{\sqrt{2\pi x}} \left[1 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{x}\right)\right], \quad x \rightarrow +\infty;$$

$$K_\nu(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} e^{-x} \left[1 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{x}\right)\right], \quad x \rightarrow +\infty.$$

Рекуррентные соотношения:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz}(z^\nu I_\nu(z)) &= z^\nu I_{\nu-1}(z), & \frac{d}{dz}(z^{-\nu} I_\nu(z)) &= z^{-\nu} I_{\nu+1}(z), \\ zI'_\nu(z) + \nu I_\nu(z) &= zI_{\nu-1}(z), & I_{\nu-1}(z) - I_{\nu+1}(z) &= \frac{2\nu}{z} I_\nu(z), \\ zI'_\nu(z) - \nu I_\nu(z) &= zI_{\nu+1}(z), & I_{\nu-1}(z) + I_{\nu+1}(z) &= 2I'_\nu(z). \\ \frac{d}{dz}(z^\nu K_\nu(z)) &= -z^\nu K_{\nu-1}(z), & \frac{d}{dz}(z^{-\nu} K_\nu(z)) &= -z^{-\nu} K_{\nu+1}(z), \\ zK'_\nu(z) + \nu K_\nu(z) &= -zK_{\nu-1}(z), & K_{\nu-1}(z) - K_{\nu+1}(z) &= -\frac{2\nu}{z} K_\nu(z), \\ zK'_\nu(z) - \nu K_\nu(z) &= -zK_{\nu+1}(z), & K_{\nu-1}(z) + K_{\nu+1}(z) &= -2K'_\nu(z). \end{aligned}$$

Модифицированные функции Бесселя полуцелого порядка:

$$\begin{aligned} I_{n-1/2}(z) &= \sqrt{\frac{2}{\pi z}} z^n \left(\frac{d}{zdz}\right)^n \operatorname{ch} z, & K_{n-1/2}(z) &= \sqrt{\frac{\pi}{2z}} z^n \left(-\frac{d}{zdz}\right)^n e^{-z}, \\ I_{-1/2}(z) &= \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \operatorname{ch} z, & I_{1/2}(z) &= \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \operatorname{sh} z, & K_{1/2}(z) &= \sqrt{\frac{\pi}{2z}} e^{-z}. \end{aligned}$$

Вронскианы и некоторые формулы:

$$\begin{aligned} W[I_\nu, I_{-\nu}] &= -\frac{2\sin \pi\nu}{\pi z}, & W[I_\nu, K_\nu] &= -\frac{1}{z}, \\ I_\nu(z)I_{-\nu+1}(z) - I_{-\nu}(z)I_{\nu-1}(z) &= -\frac{2\sin \pi\nu}{\pi z}, \\ I_\nu(z)K_{\nu+1}(z) + K_\nu(z)I_{\nu+1}(z) &= \frac{1}{z}. \end{aligned}$$

Функции Кельвина:

$$J_\nu(ze^{\pm \frac{3i\pi}{4}}) = \operatorname{ber}_\nu z \pm i \operatorname{bei}_\nu z, \quad e^{\mp \frac{i\pi\nu}{2}} K_\nu(ze^{\pm \frac{i\pi}{4}}) = \operatorname{ker}_\nu z \pm i \operatorname{kei}_\nu z.$$

Модифицированная функция Струве:

$$\begin{aligned} \mathbf{L}_\nu(z)\Gamma(\nu + \frac{1}{2}) &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{z}{2}\right)^\nu \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sh}(z \cos \varphi) (\sin \varphi)^{2\nu} d\varphi, \quad \operatorname{Re} \nu > -\frac{1}{2}, \\ \mathbf{L}_\nu(z) &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{z}{2}\right)^{\nu+2m+1}}{\Gamma(m + \frac{3}{2})\Gamma(\nu + m + \frac{3}{2})}. \end{aligned}$$

Классические ортогональные полиномы. Полиномы Якоби

$$P_n^{(\alpha, \beta)}(x) = \frac{(-1)^n}{2^n n!} (1-x)^{-\alpha} (1+x)^{-\beta} \frac{d^n}{dx^n} [(1-x)^{n+\alpha} (1+x)^{n+\beta}],$$

где $\alpha > -1$, $\beta > -1$, ортогональны с весом $\rho(x) = (1-x)^\alpha (1+x)^\beta$ на промежутке $(-1, 1)$ и удовлетворяют уравнению

$$(1-x^2)u'' + [\beta - \alpha - (\alpha + \beta + 2)x]u' + n(n + \alpha + \beta + 1)u = 0.$$

Квадрат нормы: $\|P_n^{(\alpha, \beta)}\|^2 = \frac{2^{\alpha+\beta+1} \Gamma(n+\alpha+1) \Gamma(n+\beta+1)}{n! (2n+\alpha+\beta+1) \Gamma(n+\alpha+\beta+1)}$.

Полиномы Лежандра

$$P_n(x) = P_n^{(0,0)} = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$$

ортогональны на промежутке $(-1, 1)$ с весом $\rho(x) = 1$ и удовлетворяют уравнению Лежандра

$$(1 - x^2)u'' - 2xu' + n(n+1)u = 0.$$

Свойство четности: $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$. Квадрат нормы: $\|P_n\|^2 = \frac{2}{2n+1}$.

Рекуррентные соотношения:

$$xP_n(x) = \frac{n+1}{2n+1} P_{n+1}(x) + \frac{n}{2n+1} P_{n-1}(x), \quad P_n(x) = \frac{P'_{n+1}(x) - P'_{n-1}(x)}{2n+1}, \quad n \geq 1.$$

Производящая функция:

$$\frac{1}{\sqrt{1-2tx+x^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^n, \quad |t| < 1.$$

Несколько первых полиномов:

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1, & P_1(x) &= x, & P_2(x) &= \frac{3x^2 - 1}{2}, \\ P_3(x) &= \frac{5x^3 - 3x}{2}, & P_4(x) &= \frac{35x^4 - 30x^2 + 3}{8}. \end{aligned}$$

Частные значения:

$$P_n(1) = 1, \quad P_n(-1) = (-1)^n, \quad P_{2n+1}(0) = 0, \quad P_{2n}(0) = \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n} (n!)^2}.$$

Второе решение уравнения Лежандра — функции Лежандра второго рода:

$$Q_0(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad Q_1(x) = \frac{x}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad Q_3(x) = \frac{1}{4} (3x^2 - 1) \ln \frac{1+x}{1-x} - \frac{3}{2}x, \dots;$$

функции $Q_n(x)$ удовлетворяют тому же рекуррентному соотношению, что и полиномы Лежандра

$$xQ_n(x) = \frac{n+1}{2n+1} Q_{n+1}(x) + \frac{n+1}{2n+1} Q_{n-1}(x).$$

Полиномы Чебышева–Лагерра

$$L_n^\alpha(x) = \frac{1}{n!} x^{-\alpha} e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^{n+\alpha} e^{-x}), \quad \alpha > -1,$$

ортогональны с весом $\rho(x) = x^\alpha e^{-x}$ на полуоси $(0, \infty)$ и удовлетворяют уравнению

$$xu'' + (1 + \alpha - x)u' + nu = 0.$$

Квадрат нормы: $\|L_n^\alpha\|^2 = \frac{\Gamma(n+\alpha+1)}{n!}$.

Рекуррентные соотношения:

$$xL_n^\alpha(x) = -(n+1)L_{n+1}^\alpha(x) + (2n+\alpha+1)L_{n-1}^\alpha(x) - (n+\alpha)L_n^\alpha(x),$$

$$\frac{d}{dx}L_n^\alpha(x) = -L_{n-1}^{\alpha+1}(x), \quad n \geq 1.$$

Производящая функция:

$$\frac{e^{-\frac{xt}{1-t}}}{(1-t)^{\alpha+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} L_n^\alpha(x)t^n, \quad |t| < 1;$$

$$L_0^\alpha(x) = 1, \quad L_1^\alpha(x) = 1 + \alpha - x, \quad L_2^\alpha(x) = (\alpha+2)(\alpha+1) - 2(\alpha+2)x + x^2.$$

Полиномы Чебышева-Эрмита

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$$

ортогональны с весом $\rho(x) = e^{-x^2}$ на оси $(-\infty, \infty)$ и удовлетворяют уравнению

$$u'' - 2xu' + 2nu = 0.$$

Свойство четности: $H_n(-x) = (-1)^n H_n(x)$.

Квадрат нормы: $\|H_n\|^2 = 2^n n! \sqrt{\pi}$. Рекуррентные соотношения:

$$xH_n(x) = \frac{1}{2}H_{n+1}(x) - nH_{n-1}(x), \quad H'_n(x) = 2nH_{n-1}(x), \quad n \geq 1.$$

Производящая функция:

$$e^{2xt-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} t^n;$$

$$H_0(x) = 1, \quad H_1(x) = 2x, \quad H_2(x) = 4x^2 - 2, \quad H_3(x) = 8x^3 - 12x.$$

Присоединенные функции Лежандра

$$P_n^m(x) = (1-x^2)^{\frac{m}{2}} P_n^{(m)}(x), \quad m, n \in \mathbb{N},$$

ортогональны на промежутке $(-1, 1)$ с весом $\rho(x) = 1$ и удовлетворяют уравнению

$$(1-x^2)u'' - 2xu' + \left[n(n+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] u = 0.$$

Квадрат нормы: $\|P_n^m\|^2 = \frac{(n+m)!}{(n-m)!} \frac{2}{2n+1}$. Если $x = \cos \theta$, то:

$$\begin{aligned} P_0^0(\cos \theta) &= 1, & P_1^0(\cos \theta) &= \cos \theta, & P_1^1(\cos \theta) &= \sin \theta, \\ P_2^0(\cos \theta) &= \frac{1}{2}(3 \cos^2 \theta - 1), & P_2^1(\cos \theta) &= 3 \sin \theta \cos \theta, & P_2^2(\cos \theta) &= 3 \sin^2 \theta, \\ P_3^0(\cos \theta) &= \frac{1}{2}(5 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta), & P_3^1(\cos \theta) &= \frac{15 \cos^2 \theta - 3}{2} \sin \theta, \\ P_3^2(\cos \theta) &= 15 \sin^2 \theta \cos \theta, & P_3^3(\cos \theta) &= 15 \sin^3 \theta, \\ P_4^0(\cos \theta) &= \frac{1}{8}(35 \cos^4 \theta - 30 \cos^2 \theta + 3), & P_4^1(\cos \theta) &= \frac{5}{2} \sin \theta \cos \theta (7 \cos^2 \theta - 3), \\ P_4^2(\cos \theta) &= \frac{15}{2} \sin^2 \theta (7 \cos^2 \theta - 1), & P_4^3(\cos \theta) &= 105 \sin^3 \theta \cos \theta, \\ P_4^4(\cos \theta) &= 105 \sin^4 \theta, & P_4^4(\cos \theta) &= \frac{(2n)!}{2^n n!} \sin^n \theta. \end{aligned}$$

Сферические функции. Сферическими функциями $Y_n(\theta, \varphi)$ порядка n называются однородные гармонические многочлены $u_n(\mathbf{r})$ степени n , рассматриваемые на единичной сфере: $r^n Y_n(\theta, \varphi) = u_n(\mathbf{r})$, т. е. между сферическими функциями и однородными гармоническими многочленами имеется взаимно однозначное соответствие (см. [15]). Функции $Y_n(\theta, \varphi)$ выражаются через фундаментальные сферические функции:

$$Y_n(\theta, \varphi) = \sum_{m=-n}^{m=n} Y_n^m(\theta, \varphi).$$

Фундаментальные сферические функции

$$Y_n^m(\theta, \varphi) = P_n^{|m|}(\cos \theta) \cdot \begin{cases} \sin m\varphi, & m = 1, 2, \dots, n, \\ \cos m\varphi, & m = 0, -1, \dots, -n, \end{cases}$$

ортогональны (с весом $\rho = 1$) на единичной сфере,

$$\int_{S_1} Y_n^m(\mathbf{s}) Y_n^{m'}(\mathbf{s}) d\mathbf{s} = 0, \quad (m, n) \neq (m', n'),$$

и удовлетворяют дифференциальному уравнению

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + n(n+1)u = 0, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Квадрат нормы: $\|Y_n^m\|^2 = \frac{(n+|m|)!}{(n-|m|)!} \frac{2\pi(1+\delta_{nm})}{2n+1}$.

Несколько первых фундаментальных сферических функций:

$$\begin{aligned} Y_1^1(\theta, \varphi) &= \sin \theta \sin \varphi, & Y_2^1(\theta, \varphi) &= 3 \sin \theta \cos \theta \sin \varphi, \\ Y_2^2(\theta, \varphi) &= 3 \sin^2 \theta \sin 2\varphi, & Y_3^1(\theta, \varphi) &= \frac{1}{2}(15 \cos^2 \theta - 3) \sin \theta \sin \varphi, \\ Y_3^2(\theta, \varphi) &= 15 \sin^2 \theta \cos \theta \sin 2\varphi, & Y_3^3(\theta, \varphi) &= 15 \sin^3 \theta \sin 3\varphi, \\ Y_4^1(\theta, \varphi) &= \frac{5}{4} \sin 2\theta (7 \cos^2 \theta - 3) \sin \varphi, & Y_4^2(\theta, \varphi) &= \frac{15}{2} \sin^2 \theta (7 \cos^2 \theta - 1) \sin 2\varphi, \\ Y_4^3(\theta, \varphi) &= 105 \sin^3 \theta \cos \theta \sin 3\varphi, & Y_4^4(\theta, \varphi) &= 105 \sin^4 \theta \sin 4\varphi. \end{aligned}$$

Теорема сложения для полиномов Лежандра:

$$P_n((\mathbf{s}, \mathbf{s}')) = \sum_{m=-n}^{m=n} \frac{2}{1+\delta_{0m}} \frac{(n-|m|)!}{(n+|m|)!} Y_n^m(\mathbf{s}) Y_n^m(\mathbf{s}'),$$

$\mathbf{s}, \mathbf{s}'$ — единичные векторы.

Гипергеометрические функции. По определению

$$\forall \lambda \in \mathbb{C}: (\lambda)_n = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ \lambda(\lambda+1)(\lambda+2) \cdot \dots \cdot (\lambda+n-1), & n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Гипергеометрический ряд

$$F(\alpha, \beta, \gamma, z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\alpha)_n (\beta)_n}{(\gamma)_n n!} z^n, \quad \gamma \neq -1, -2, -3, \dots$$

сходится в круге $|z| < 1$ и определяет аналитическую (относительно аргумента z) функцию $F(\alpha, \beta, \gamma, z)$, называемую гипергеометрической функцией. Функция $F(\alpha, \beta, \gamma, z)$ симметрична относительно первых двух аргументов: $F(\alpha, \beta, \gamma, z) = F(\beta, \alpha, \gamma, z)$; при $\alpha = -n$, $n \in \mathbb{N}_0$, гипергеометрическая функция $F(-n, \beta, \gamma, z) = p_n(z)$, где $p_n(z)$ — многочлен степени n . Решения гипергеометрического уравнения (уравнения Гаусса)

$$z(1-z)u'' + [\gamma - (\alpha + \beta + 1)z]u' - \alpha\beta u = 0$$

в окрестностях особых точек $z = 0$, $z = 1$, $z = \infty$ выражаются через гипергеометрические ряды:

в окрестности $|z| < 1$ точки $z = 0$

$$u_1(z) = F(\alpha, \beta, \gamma, z), \quad u_2(z) = z^{1-\gamma} F(\alpha - \gamma + 1, \beta - \gamma + 1, 2 - \gamma, z);$$

в окрестности $|z - 1| < 1$ точки $z = 1$

$$u_3(z) = F(\alpha, \beta, \alpha + \beta - \gamma + 1, 1 - z),$$

$$u_4(z) = (1 - z)^{\gamma - \alpha - \beta} F(\gamma - \beta, \gamma - \alpha, \gamma - \alpha - \beta + 1, 1 - z);$$

в окрестности $|z| > 1$ точки $z = \infty$

$$u_5(z) = z^{-\alpha} F\left(\alpha, \alpha - \gamma + 1, \alpha - \beta + 1, \frac{1}{z}\right),$$

$$u_6(z) = z^{-\beta} F\left(\beta, \beta - \gamma + 1, \beta - \alpha + 1, \frac{1}{z}\right).$$

Аналитическое продолжение гипергеометрического ряда, определенного в круге $|z| < 1$, на всю комплексную плоскость определяет многозначную аналитическую функцию с особыми точками $z = 0$, $z = 1$, $z = \infty$. Гипергеометрические функции от аргументов z , $1 - z$, $1 - 1/z$ связаны следующими соотношениями (они являются средством аналитического продолжения гипергеометрической функции):

$$F(\alpha, \beta, \gamma, z) = \frac{\Gamma(\gamma)\Gamma(\gamma - \alpha - \beta)}{\Gamma(\gamma - \alpha)\Gamma(\gamma - \beta)} F(\alpha, \beta, \alpha + \beta - \gamma + 1, 1 - z) +$$

$$+ \frac{\Gamma(\gamma)\Gamma(\alpha + \beta - \gamma)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} (1 - z)^{\gamma - \alpha - \beta} F(\gamma - \alpha, \gamma - \beta, \gamma - \alpha - \beta + 1, 1 - z),$$

$$|\arg(1 - z)| < \pi,$$

$$F(\alpha, \beta, \gamma, z) = \frac{\Gamma(\gamma)\Gamma(\beta - \alpha)}{\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma - \alpha)} (-z)^{-\alpha} F(\alpha, \alpha - \gamma + 1, \alpha - \beta + 1, z^{-1}) +$$

$$+ \frac{\Gamma(\gamma)\Gamma(\alpha - \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\gamma - \beta)} (-z)^{-\beta} F(\beta, \beta - \gamma + 1, \beta - \alpha + 1, z^{-1}), \quad |\arg(-z)| < \pi,$$

$$F(\alpha, \beta, \gamma, z) = \frac{\Gamma(\gamma)\Gamma(\beta - \alpha)}{\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma - \alpha)} (1 - z)^{-\alpha} F(\alpha, \gamma - \beta, \alpha - \beta + 1, (1 - z)^{-1}) +$$

$$+ \frac{\Gamma(\gamma)\Gamma(\alpha - \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\gamma - \beta)} (-z)^{-\beta} F(\beta, \gamma - \alpha, \beta - \alpha + 1, (1 - z)^{-1}), \quad |\arg(1 - z)| < \pi.$$

Формула дифференцирования:

$$\frac{d^n F(\alpha, \beta, \gamma, z)}{dz^n} = \frac{(\alpha)_n (\beta)_n}{(\gamma)_n} F(\alpha + n, \beta + n, \gamma + n, z).$$

Интегральное представление:

$$F(\alpha, \beta, \gamma, z) = \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma-\beta)} \int_0^1 t^{\beta-1} (1-t)^{\gamma-\beta-1} (1-tz)^{-\alpha} dt, \quad |\arg(1-z)| < \pi,$$

при условиях $\operatorname{Re} \gamma > \operatorname{Re} \beta > 0$.

Асимптотика при $z \rightarrow \infty$:

$$F(\alpha, \beta, \gamma, z) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\gamma)\Gamma(\beta-\alpha)}{\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma-\alpha)} (-z)^{-\alpha} + O(z^{-\alpha}), & \operatorname{Re} \alpha < \operatorname{Re} \beta, \\ \frac{\Gamma(\gamma)\Gamma(\alpha-\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\gamma-\beta)} (-z)^{-\beta} + O(z^{-\beta}), & \operatorname{Re} \alpha > \operatorname{Re} \beta. \end{cases}$$

Вырожденная гипергеометрическая функция определяется рядом

$$\Phi(\alpha, \gamma, z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\alpha)_n z^n}{(\gamma)_n n!}, \quad \gamma \neq 0, -1, -2, \dots,$$

радиус сходимости которого $R = \infty$, и является решением дифференциального уравнения Куммера

$$zu'' + (\gamma - z)u' - \alpha u = 0.$$

Выражения некоторых функций через гипергеометрические:

$$(1-z)^{-\mu} = F(\mu, (1, 1, z), \quad (1-z)^n = F(-n, (1, 1, z), \quad n \in \mathbb{N}, \\ z^n = F(-n, 1, 1, z); \quad \ln(1-z) = -zF(1, 1, 2, z), \quad |\arg(1-z)| < \pi;$$

полиномы Лежандра $P_n = F(-n, n+1, 1, \frac{1-z}{2})$; $e^z = \Phi(1, 1, z)$; полиномы

Чебышева-Лагерра: $L_n^\alpha(z) = \frac{(1+\alpha)_n}{n!} \Phi(-n, 1+\alpha, z)$.

Некоторые ряды и интегралы:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{\pi n x}{a}}{n} = \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{x}{a}\right), \quad 0 < x \leq a; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sin \frac{\pi n x}{a}}{n} = \frac{\pi x}{2a}, \quad 0 \leq x < a;$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi x}{2a}}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8} \left(1 - \frac{x}{a}\right), \quad 0 \leq x \leq a;$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2n+1)\pi x}{2a}}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2 x}{8a}, \quad 0 \leq x \leq a;$$

$$\sum_1^{\infty} \frac{t^n \cos nx}{n} = \ln \frac{1}{\sqrt{1+t^2-2tx}}, \quad |t| < 1; \quad e^{\frac{z}{2}\left(t-\frac{1}{t}\right)} = \sum_{-\infty}^{\infty} J_n(z) t^n, \quad 0 < |t| < \infty;$$

$$e^{\frac{z}{2}\left(t+\frac{1}{t}\right)} = \sum_{-\infty}^{\infty} I_n(z) t^n, \quad 0 < |t| < \infty.$$

Разложение плоской волны по косинусам:

$$e^{ikr \cos \varphi} = J_0(kr) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} i^n J_n(kr) \cos n\varphi;$$

разложение плоской волны по полиномам Лежандра:

$$e^{ikr \cos \theta} = \sqrt{\frac{\pi}{2kr}} \sum_{n=0}^{\infty} i^n (2n+1) J_{n+\frac{1}{2}}(kr) P_n(\cos \theta);$$

$$\int_0^{\infty} e^{-a^2 x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2a}, \quad a > 0; \quad \int_0^{\infty} e^{-a^2 x^2 \cos bx} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2a} e^{-\frac{b^2}{4a^2}}, \quad a > 0;$$

$$\int_0^{\infty} e^{-a^2 x^2 - \frac{b^2}{x^2}} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2a} e^{-2ab}, \quad a > 0, \quad b > 0;$$

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin \pi \alpha}, \quad 0 < \operatorname{Re} \alpha < 1; \quad \int_0^{\infty} \frac{\sin ax}{x} dx = \frac{\pi}{2} \operatorname{sign} a;$$

$$\int_0^l \frac{e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2}}}{2a\sqrt{\pi t}} d\xi = \frac{1}{2} \left(\operatorname{erf} \frac{l-x}{2a\sqrt{t}} + \operatorname{erf} \frac{x}{2a\sqrt{t}} \right);$$

$$\int_0^l \frac{e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2} - \alpha \xi}}{2a\sqrt{\pi t}} d\xi = \frac{1}{2} \left[\operatorname{erf} \left(\frac{l-x}{2a\sqrt{t}} + \alpha a \sqrt{t} \right) + \operatorname{erf} \left(\frac{x}{2a\sqrt{t}} - \alpha a \sqrt{t} \right) \right];$$

$$\int_0^l \frac{e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2} - \alpha \xi^2}}{2a\sqrt{\pi t}} d\xi = \frac{e^{-\frac{4\alpha a^2 t x^2}{1+4\alpha a^2 t}}}{2\sqrt{1+4\alpha a^2 t}} \left[\operatorname{erf} \left(\frac{l(1+4\alpha a^2 t) - x}{2a\sqrt{t(1+4\alpha a^2 t)}} \right) + \operatorname{erf} \left(\frac{x}{2a\sqrt{t(1+4\alpha a^2 t)}} \right) \right];$$

$$\int_y^{\infty} e^{-\alpha^2 \xi^2 - \frac{\beta^2}{\xi^2}} d\xi = \frac{1}{2\alpha} \left[e^{2\alpha\beta} \operatorname{Erf} \left(\alpha y + \frac{\beta}{y} \right) + e^{-2\alpha\beta} \operatorname{erf} \left(\alpha y - \frac{\beta}{y} \right) \right], \quad \alpha > 0, \quad \beta \geq 0;$$

$$\int_0^{\infty} e^{-a^2 \lambda^2 t} J_0(\lambda r) J_0(\lambda r') d\lambda = \frac{1}{2a^2 t} I_0 \left(\frac{r+r'}{2a^2 t} \right) e^{-\frac{r^2+r'^2}{4a^2 t}}.$$

Необходимые условия экстремума функционалов:

$$\Phi(y) = \int_{x_0}^x F(x, y, y') dx \implies F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} = 0;$$

$$\begin{aligned} \Phi(y_1, y_2, \dots, y_n) &= \int_{x_0}^x F(x, y_1, y_2, \dots, y_n, y'_1, y'_2, \dots, y'_n) dx \implies \\ &\implies F_{y_i} - \frac{d}{dx} F_{y'_i} = 0, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Phi(y) &= \int_{x_0}^x F(x, y', y'', \dots, y^n) dx \implies \\ &\implies F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} + \frac{d^2}{dx^2} F_{y''} - \dots (-1)^n \frac{d^n}{dx^n} F_{y^n} = 0, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Phi((z(x, y))) &= \int_{\Omega} F(x, y, z, z_x, z_y) dx dy = 0 \implies \\ &\implies F_z - \frac{\partial}{\partial x} [F_p] - \frac{\partial}{\partial y} [F_q] = 0; \quad \frac{\partial}{\partial x} [F_p] = F_{px} + F_{pz} \frac{\partial z}{\partial x} + F_{pp} \frac{\partial p}{\partial x} + F_{pq} \frac{\partial q}{\partial x}, \\ \frac{\partial}{\partial y} [F_q] &= F_{qy} + F_{qz} \frac{\partial z}{\partial y} + F_{qp} \frac{\partial p}{\partial y} + F_{qq} \frac{\partial q}{\partial y}, \quad p = z_x, \quad q = z_y. \end{aligned}$$

Интегральное преобразование Лапласа

Формулы для функций Бесселя J_ν и I_ν применимы при $\operatorname{Re} \nu > -1$.

оригинал	изображение	оригинал	изображение
$t^a, a > -1$	$\frac{\Gamma(a+1)}{p^{a+1}}$	$e^{-p_0 t}$	$\frac{1}{p - p_0}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$	$\cos \omega t$	$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$
$e^{-\lambda t} \sin \omega t$	$\frac{\omega^2}{(p + \lambda)^2 + \omega^2}$	$e^{-\lambda t} \cos \omega t$	$\frac{p + \lambda}{(p + \lambda)^2 + \omega^2}$
$t \sin \omega t$	$\frac{2p\omega}{(p^2 + \omega^2)^2}$	$t \cos \omega t$	$\frac{p^2 - \omega^2}{(p^2 + \omega^2)^2}$
$\frac{\sin at}{t}$	$\operatorname{arctg} \frac{a}{p}$	$\frac{ab \sin at * \sin bt}{b^2 - a^2}$	$\frac{1}{p^2 + a^2} - \frac{1}{p^2 + b^2}$
$\operatorname{sh} at$	$\frac{a}{p^2 - a^2}$	$\operatorname{ch} at$	$\frac{p}{p^2 - a^2}$
$J_\nu(at)$	$\frac{(\sqrt{p^2 + a^2} - p)^\nu}{a^\nu \sqrt{p^2 + a^2}}$	$I_\nu(at)$	$\frac{(p - \sqrt{p^2 - a^2})^\nu}{a^\nu \sqrt{p^2 - a^2}}$
$\left(\frac{t}{a}\right)^{\frac{\nu}{2}} J_\nu(2a\sqrt{t})$	$\frac{1}{p^{\nu+1}} e^{-\frac{a}{p}}, a \geq 0$	$\left(\frac{t}{a}\right)^{\frac{\nu}{2}} I_\nu(2a\sqrt{t})$	$\frac{1}{p^{\nu+1}} e^{\frac{a}{p}}, a \geq 0$
$\frac{J_1(at)}{at}$	$\frac{1}{p + \sqrt{p^2 + a^2}}$	$e^{-at} I_0(bt)$	$\frac{1}{\sqrt{(p+a)^2 - b^2}}$
$L_n(t)$	$\frac{1}{p} \left(1 - \frac{1}{p}\right)^n$	$\frac{1}{\sqrt{1+t}}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{p} e^p \operatorname{erf} \sqrt{p}$
$\frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{a}{t}} \frac{1}{t+a}, a \geq 0$	$e^{ap} \operatorname{erf} \sqrt{ap}$	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-2a\sqrt{t}}$	$\frac{1}{\sqrt{p}} e^{\frac{a^2}{p}} \operatorname{erf} \frac{a}{\sqrt{p}}$
$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{2\sqrt{t}}$	$\frac{1}{\sqrt{p}} e^{\frac{1}{p}} \operatorname{erf} \frac{1}{\sqrt{p}}$	$\operatorname{erf}\left(\frac{t}{2}\right)$	$\frac{1}{p} e^{p^2} \operatorname{erf} \frac{1}{\sqrt{p}}$
$\operatorname{erf}\left(\frac{1}{2}\right) \sqrt{\frac{a}{t}}, a \geq 0$	$\frac{e^{\sqrt{ap}} - 1}{p}$	$e^{-a^2 t^2}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{2 a } e^{\frac{p^2}{4a^2}} \operatorname{erf} \frac{p}{2 a }$
$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{a^2}{4t}}, \alpha \geq 0$	$\frac{\sqrt{p}}{2} e^{\frac{p^2}{4a^2}} \operatorname{erf} \frac{p}{2a}$	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-2at}, a \geq 0$	$\frac{\sqrt{\pi}}{p} e^p \operatorname{erf} \sqrt{p}$
$1 - 2e^{a^2 t} \operatorname{erf}(a\sqrt{t})$	$\frac{1}{p} \frac{a - \sqrt{p}}{a + \sqrt{p}}, a \geq 0$	$\operatorname{erf}(\sqrt{at}), a \geq 0$	$\frac{\sqrt{a}}{p\sqrt{p+a}}$
$\frac{e^{-\sqrt{at}}}{\sqrt{at}} + \sqrt{a} \operatorname{erf}(\sqrt{at})$	$\frac{\sqrt{p+a}}{p}, a \geq 0$	$e^{a^2 t} \operatorname{erf}(a\sqrt{t})$	$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{p(p-a^2)}}$

оригинал	изображение	оригинал	изображение
$1 - e^{a^2 t} \operatorname{erf}(a\sqrt{t})$	$\frac{a}{p(\sqrt{p} + a)}, a \geq 0$	$e^{a^2 t} \operatorname{erf}(a\sqrt{t})$	$\frac{1}{\sqrt{p}(\sqrt{p} + a)}$
$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} - a e^{a^2 t} \operatorname{erf}(a\sqrt{t})$	$\frac{1}{\sqrt{p} + a}$	$\operatorname{erf} \frac{a}{2\sqrt{t}}, a \geq 0$	$\frac{1}{p} e^{-ap}$
$\frac{\sin 2\sqrt{t}}{\pi t}$	$\operatorname{erf} \frac{1}{\sqrt{p}}$	$\frac{\sin 2\sqrt{t}}{\sqrt{\pi t}}$	$\frac{1}{i\sqrt{p}} e^{-\frac{1}{p}} \operatorname{erf} \frac{i}{\sqrt{p}}$
$\frac{\cos 2\sqrt{at}}{\sqrt{\pi t}}$	$\frac{1}{\sqrt{p}} e^{-\frac{a}{\sqrt{p}}}$	$\sqrt{\frac{2}{\pi t}} \sin at$	$\sqrt{\frac{\sqrt{p^2 + a^2} - p}{p^2 + a^2}}$
$\operatorname{ber}_0(2\sqrt{t})$	$\frac{1}{p} \cos \frac{1}{p}$	$\operatorname{bei}_0(2\sqrt{t})$	$\frac{1}{p} \sin \frac{1}{p}$

Конформные отображения. D_z — область комплексной плоскости (z), D_w — область комплексной плоскости (w), $w = w(z)$ — функция, конформно отображающая D_z на D_w возможно при дополнительных условиях. Ниже используются обозначения: D^+ — верхняя полуплоскость, $\Pi(0, H)$ — полоса, стороны которой параллельны вещественной оси и отстоят от нее на расстояниях, равных нулю, и $H > 0$, $B(z, r)$ — круг с центром в точке z , радиус которого r , $B(r) = B(0, r)$; $A, B, C, \dots$ — комплексные числа, $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ — вещественные числа, $a, b, c, \dots$ — неотрицательные числа, $z = x + iy = re^{i\varphi}$, $w = u + iv = \rho e^{i\theta}$.

1. D_z — внешность отрезка, концы которого z_1 и z_2 (плоскость с разрезом по отрезку (z_1, z_2)), $D_w = \{w: 0 < u < \infty, v = 0\}: w = -\lambda^2 \frac{z - z_1}{z - z_2}$; знак выбран так, что при обходе разреза в положительном направлении (область остается слева) точка $w(z)$ движется также в положительном направлении.

2. $D_z = \{z: 0 < r < \infty, 0 < \varphi < \alpha < 2\pi\}$ — угол α , $D_w = D_w^+$: $w = \lambda^2 z^{\frac{\pi}{\alpha}} + \lambda_1$.

3. $D_z = \{z: 0 < r < \infty, 0 < \varphi < \alpha < 2\pi\}$, $D_w = D_w^+$, $L_z = \{z: 0 < r < r_0, \varphi = 0\} \rightarrow L_w = \{0 < u < \infty, v = 0\}: w = \lambda^2 \frac{z^{\frac{\pi}{\alpha}}}{r_0^{\frac{\pi}{\alpha}} - z^{\frac{\pi}{\alpha}}}$.

4. $D_z = \Pi_z(0, H)$, $D_w = D_w^+$, $L_z = \{z: -\infty < x < \infty, y = 0\} \rightarrow L_w = \{w: 0 < u < \infty, v = 0\}: w = e^{\frac{\pi z}{H}}$.

5. $D_z = \{z: 0 < r < \infty, 0 < \varphi < \alpha < 2\pi\}$, $D_w = \Pi_w(0, H)$, $L_z = \{z: 0 < r < \infty, \varphi = 0\} \rightarrow L_w = \{w: -\infty < u < \infty, v = 0\}: w = \frac{H}{\alpha} \ln z + \lambda$.

6. $D_z = D_z^+$, $D_w = B_w(1)$, $z_0 \in D_z \rightarrow w = 0: w = e^{i\alpha} \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0}$.

7. $D_z = B_z(r_0)$, $D_w = B_w(1)$, $z_0 \in D_z \rightarrow w = 0: w = r_0 e^{i\alpha} \frac{z - z_0}{z_0 z - r_0^2}$.

8. $D_z = \{z: 0 < r < r_0, 0 < \varphi < \pi\}$ полукруг, $D_w = D_w^+$, $L_z = \{z: -r_0 < x < r_0, y = 0\} \rightarrow L_w = \{w: 0 < u < \infty, v = 0\}: w = \lambda^2 \left(\frac{z + r_0}{z - r_0} \right)^2$.

9. $D_z = D_z^+ \setminus \{z: x = 0, 0 \leq y \leq h\}$ — верхняя полуплоскость с разрезом по отрезку, $D_w = D_w^+$, $z_0 = \infty \longrightarrow w_0 = \infty: w = \sqrt{z^2 + h^2} + \lambda$, $\sqrt{1} = 1$.

10. $D_z = \Pi_z / \{z: -\infty < x < \infty, y = \frac{H}{2}\}$ — полоса с разрезом по лучу, $D_w = \Pi_w(0, 1)$, $L_z = \{z: -\infty < x < 0, y = \frac{H}{2}\} \longrightarrow \{w: -\infty < u < \infty, v = 0\}: w = \frac{2}{\pi} \operatorname{arth} \sqrt{e^{\frac{2\pi z}{H}} + 1} + \lambda$.

11. $D_z = \Pi_z(0, H) / \{z: x = 0, 0 \leq y \leq h < H\}$ — полоса с разрезом по отрезку, $D_w = \Pi_w(0, 1)$, $z_0 = \pm\infty \longrightarrow w_0 = \pm\infty$ ($z = \infty$ — двойная точка (см. [44])); $w = \frac{2}{\pi} \operatorname{arth} \left(\cos \frac{\pi h}{2H} \sqrt{\operatorname{th}^2 \frac{\pi z}{2H} + \operatorname{tg}^2 \frac{\pi h}{2H}} \right) + \lambda$, $\sqrt{1} = 1$.

12. $D_z = D_z^+ / \overline{B}_z(r_0)$ — полуплоскость без полукруга, $D_w = \Pi_w(0, H)$, $L_z = \{z: r = r_0, 0 < \varphi < \pi\} \longrightarrow L_w = \{w: -\infty < u < \infty, v = 0\}$ $w = iH - \frac{2H}{\pi} \ln \frac{z - r_0}{z + r_0} + \lambda$.

13. D_z — плоскость без круга $\overline{B}_z(r_0)$ и отрезка $\{z: r_0 \leq x \leq h, y = 0\}$, $D_w = B_w(1): w = \zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1}$, $\zeta = \frac{2h(z + r_0)^2}{z(h + r_0)^2}$, $\sqrt{1} = 1$.

14. Даны два круга $B_{1z}(r_1)$, $B_{2z}(d, r_2)$: 1) $r_2 - r_2 > d$, D_z — область, ограниченная окружностями $\partial B_{1z}(r_1)$, и $\partial B_{2z}(d, r_2)$ — (эксцентрическое кольцо); 2) $r_1 + r_2 < d$, D_z — внешность данных кругов. В обоих случаях D_w — концентрическое кольцо с центром $w = 0$: $w = B \frac{z - x_1}{z - x_2}$, где

$x_{1,2} = -\frac{r_1^2 - r_2^2 + d^2}{d} \mp \sqrt{\left(\frac{r_1^2 - r_2^2 + d^2}{d}\right)^2 - 4r_2^2}$ — точки, симметричные относительно обеих окружностей.

15. $D_z = D_z^+ \setminus \overline{B}_z(ih, r_0)$, полуплоскость без полукруга, D_w — концентрическое кольцо с центром $w = 0$: $w = B \frac{z - i\sqrt{h^2 - r_0^2}}{z + i\sqrt{h^2 - r_0^2}}$.

16. Дуги L_{1z} и L_{2z} двух окружностей пересекаются в точках $x_{1,2} = \pm a$ и пересекают мнимую ось в точках ih_1 (дуга L_{1z}) и ih_2 (дуга L_{2z}), где $0 < h_1 < h_2$, $D_w = \Pi(0, H)$, $L_{1z} \longrightarrow \{w: -\infty < u < \infty, v = 0\}: w = \frac{h}{\alpha_2 - \alpha_1} \left(\ln \frac{a+z}{a-z} - i\alpha_1 \right) + \lambda$, $\alpha_{1,2} = 2 \operatorname{arctg} \frac{h_{1,2}}{a}$.

17. D_z — плоскость с разрезами по лучам $L_{1z} = \{z: -\infty < x < -a, y = 0\}$, $L_{2z} = \{z: a < x < \infty, y = 0\}$, $D_w = \Pi(0, H)$, $l_{1z} \longrightarrow \{w: -\infty < u < \infty, v = 0\}: w = \frac{H}{\pi} \operatorname{arch} \frac{x}{a} + iH + \lambda$.

18. D_z — внешность отрезка $\{z: -a \leq x \leq a, y = 0\}$, $D_w = \overline{B}_w(1)$, $z_0 = \infty \longrightarrow w_0 = \infty: w = e^{i\alpha} \frac{z + \sqrt{z^2 - a^2}}{a}$.

19. D_z — плоскость с разрезами по отрезкам $\{z: -a \leq x \leq a, y = 0\}$, $\{z: x = 0, -a \leq y \leq a\}$ (внешность креста), D_w — внешность круга $\overline{B}_w(1)$, $z_0 = \infty \longrightarrow w_0 = \infty: w = \frac{e^{i\alpha}}{a\sqrt{2}} (\sqrt{z^2 + a^2} + \sqrt{z^2 + a^2})$.

20. D_z — внешность параболы $y^2 = 2p \left(1 + \frac{p}{2} \right)$ ($z = 0 \notin D_z$), $D_w = D_w^+$: $w = \sqrt{z} - i\sqrt{\frac{p}{2}}$, $\sqrt{1} = 1$.

21. D_z — область, ограниченная параболой $y^2 = 2p\left(1 + \frac{p}{2}\right)$ ($z = 0 \in D_z$),
 $D_w = D_w^+$: $w = i\sqrt{2} \operatorname{ch} \pi \sqrt{\frac{z}{2p}}$, $\sqrt{1} = 1$.

22. D_z — область, ограниченная ветвями гиперболы $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($z = 0 \in$
 $\in D_z$), $D_w = D_w^+$: $w = \left(\frac{z + \sqrt{z^2 - c^2}}{ce^{i\theta}}\right)^{\frac{\pi}{\pi - 2\theta}}$, $\theta = \arcsin \frac{a}{c}$, $c = \sqrt{a^2 + b^2}$.

23. D_z — область, ограниченная правой ветвью гиперболы $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
 $(z = 0 \notin D_z)$, $D_w = D_w^+$: $w = i\sqrt{2} \operatorname{ch} \left(\frac{\pi}{2\theta} \operatorname{arch} \frac{z}{c}\right)$, $\theta = \arcsin \frac{a}{c}$, $c = \sqrt{a^2 + b^2}$.

24. D_z — внешность эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, D_w — внешность круга
 $\overline{B}_w(1)$, $z_0 = \infty \longrightarrow w_0 = \infty$: $w = e^{i\alpha} \frac{z + \sqrt{z^2 - c^2}}{a + b}$, $c = \sqrt{a^2 - b^2}$.

Литература

1. *Абловиц М., Сигур Х.* Солитоны и метод обратной задачи. — М.: Мир, 1987.
2. *Адамс М.* Введение в теорию оптических волноводов. — М.: Мир, 1984.
3. *Арсенин В. Я.* Методы математической физики и специальные функции. — М.: Наука, 1986.
4. *Артышев С. Г., Горюнов А. Ф.* Методы решения нелинейных задач математической физики. Учебное пособие. — М.: МИФИ, 1992.
5. *Баренблатт Г. И.* Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа. — М.: Недра, 1972.
6. *Бескин В. С.* Осесимметричные стационарные течения в астрофизике. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.
7. *Бейтмен Г., Зрдейи А.* Высшие трансцендентные функции, т. 1, 2. — М.: Наука, 1973, 1974.
8. *Бейтмен Г., Зрдейи А.* Таблицы интегральных преобразований, т. 1, 2. — М.: Наука, 1969, 1970.
9. *Бицадзе А. В., Калиниченко Д. Ф.* Сборник задач по уравнениям математической физике. — М.: Наука. ФИЗМАТЛИТ, 1999.
10. *Брычков Ю. А., Прудников А. П.* Интегральные преобразования обобщенных функций — М.: Наука, 1977.
11. *Будак Б. Н., Самарский А. А., Тихонов А. Н.* Сборник задач по математической физике. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.
12. *Василева А. Б., Тихонов А. Н.* Интегральные уравнения. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.
13. *Виноградова М. Б., Руденко О. В., Сухоруков Ф. П.* Теория волн. — М.: Наука, 1990.
14. *Владимиров В. С.* Обобщенные функции и их приложение. — М.: Знание, Математика, кибернетика. № 1, 1990.
15. *Владимиров В. С., Жаринов В. В.* Уравнения математической физики. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.
16. *Волковвыский Л. И., Луц Г. Л., Араманович И. Г.* Сборник задач по теории функций комплексного переменного — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.
17. *Габов С. А.* Введение в теорию нелинейных волн. — М.: Издательство МГУ, 1988.
18. *Галанин А. Д.* Введение в теорию ядерных реакторов на тепловых нейтронах. — М.: Энергоатомиздат, 1990.
19. *Галицкий И. М., Карнаков Б. М., Коган В. И.* Задачи по квантовой механике. — М.: Наука, 1992.
20. *Галицын А. С., Жуковский А. Н.* Интегральные преобразования и специальные функции в задачах теплопроводности. — М, Едиториал УРСС, 2001.

21. Годунов С. К. Уравнения математической физики. — М.: Наука, 1974.
22. Гюнтер И. М., Кузьмин Р. С. Сборник задач по высшей математике, т. 2. — М.: Физматгиз, 1959.
23. Дмитриев В. И., Захаров Е. В. Интегральные уравнения в краевых задачах электродинамики. — М.: Издательство МГУ, 1987.
24. Додд Р., Эйлбек Дж., Гиббон Дж., Моррис Х. Солитоны и нелинейные волновые уравнения. — М.: Мир, 1988.
25. Евграфов М. А. Сборник задач по теории аналитических функций. — М.: Наука, 1972.
26. Зайцев В. Ф., Полянин А. Д. Справочник по дифференциальным уравнениям с частными производными. Точные решения. — М.: Международная программа образования, 1996.
27. Зайцев В. Ф., Полянин А. Д. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001.
28. Захаров В. Е., Манахов С. В., Питаевский Л. П. Теория солитонов: метод обратной задачи. — М.: Наука, 1980.
29. Зельдович Я. Б., Новиков И. Д. Теория тяготения и эволюция звезд. — М.: Наука, 1971.
30. Инфельд Э. Нелинейные волны, солитоны и хаос. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.
31. Карташев А. П., Рождественский Б. Л. Обыкновенные дифференциальные уравнения и основы вариационного исчисления. — М.: Наука, 1980.
32. Кириллов А. А., Гвишиани А. Д. Теоремы и задачи функционального анализа. — М.: Наука, 1979.
33. Колмогоров А. Н., Фомин С. В. Элементы теории функций и функционального анализа. — М.: Наука, 1989.
34. Котляр Я. М. Методы математической физики и задачи гидродинамики. — М.: Высшая школа, 1991.
35. Кочин Н. Е., Кибель И. А., Розе Н. В. Теоретическая гидродинамика. — М.: Гостехиздат, 1947.
36. Кочина-Полубаринова П. Я. Гидродинамика и теория фильтрации. — М.: Наука, 1991.
37. Кошляков Н. С., Глиннер Э. Б., Смирнов М. М. Уравнения в частных производных математической физики. — М.: Высшая школа, 1970.
38. Краснов М. Л., Кисилев А. Н., Макаренко Г. И. Интегральные уравнения. — М.: УРСС, 2003.
39. Кудрявцев Л. Д. Курс математического анализа т. 1, 2. — М.: Дрофа, 2006.
40. Кудряшов Н. А. Автомодельные задачи движения газа в пористой среде. — М.: МИФИ, 1984.
41. Кудряшов Н. А. Аналитические методы в теории нелинейных уравнений в частных производных. — М.: МИФИ, 1993.
42. Кудряшов Н. А. Аналитическая теория нелинейных дифференциальных уравнений. — М.: МИФИ, 2008.
43. Курант Р., Гильберт Д. Методы математической физики, т. 1, 2. — М.: Гостехиздат, 1961.
44. Лаврентьев М. А., Шабат Б. В. Методы теории функций комплексного переменного. — М.: Дань, 2002.

45. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. т. VI. — М.: Физматгиз, 2003.
46. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. т. III. — М.: Физматгиз, 2001.
47. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Гидродинамика. т. VI. — М.: Наука, 2001.
48. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. т. 7. Теория упругости. — М.: Наука, 1987.
49. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. т. 8. Электродинамика сплошных сред. — М.: Наука, 2001.
50. Ламб Г. Гидродинамика. — М.: Гостехиздат, 1947.
51. Лебедев Н. Н., Скальская И. П., Уфлянд Я. С. Сборник задач по математической физике. — М.: Гостехиздат, 1955.
52. Лейбензон Л. С. Движение природных жидкостей и газов в пористой среде. М–Л.: ОГИЗ, 1947.
53. Лизоркин П. И. Курс дифференциальных и интегральных уравнений с дополнительными главами анализа. — М.: Наука, 1981.
54. Локшин А. А., Сагомонян Е. А. Нелинейные волны в механике твердого тела. — МГУ, 1989.
55. Лэм Дж. Л. Введение в теорию солитонов. — М.: Меркурий-Пресс, 1983.
56. Лыков А. В. Теория теплопроводности. — М.: Высшая школа, 1967.
57. Марчук Г. М., Лебедев В. М. Численные методы в теории переноса нейтронов. — М.: Атомиздат, 1981.
58. Мегреблиан Р., Холмс Д. Теория реакторов. — М.: Гостехиздат, 1962.
59. Михлин С. Г. Курс математической физики. — М.: Наука. ФИЗМАТЛИТ, 1968.
60. Муратов Р. З. Потенциалы эллипсоида. — М.: Атомиздат, 1976.
61. Натансон И. П. Теория функций вещественной переменной. СПб.: Лань, 1999.
62. Найфэ А. Введение в методы возмущений. — М.: Мир, 1984.
63. Никифоров А. Ф., Уваров В. Б. Специальные функции математической физики. — Долгопрудный: Интеллект, 2007.
64. Ньюэлл А. Солитоны в математике и физике. — М.: Мир, 1989.
65. Петровский И. Г. Лекции об уравнениях с частными производными. — М.: МГУ, 1984.
66. Петровский И. Г. Лекции по теории интегральных уравнений. — М.: Наука, 1961.
67. Полянин А. Д. Справочник по линейным уравнениям математической физики. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001.
68. Полянин А. Д., Вязьмин А. В., Жуков А. И., Казенин Д. А. Справочник по точным решениям уравнений по тепло- и масспереносу. — М.: Факториал, 1998.
69. Полянин А. Д., Зайцев В. Ф. Справочник по нелинейным уравнениям математической физики. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.
70. Полянин А. Д., Зайцев В. Ф., Жуков А. И. Методы решения нелинейных уравнений математической физики и механики. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.
71. Полянин А. Д., Манжиров А. Ф. Справочник по интегральным уравнениям. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.

72. *Работнов Ю.Н.* Элементы наследственной механики твердых тел. — М.: Наука, 1977.
73. *Рождественский Б.Л., Яненко И.Н.* Системы квазилинейных уравнений и их приложения к газовой динамике. — М.: Наука, 1978.
74. Сборник задач по уравнениям математической физики. Под ред. В. С. Владимирова — 4-е изд., стереотип. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.
75. *Свешников А.Г., Тихонов А.Н.* Теория функций комплексной переменной. — М.: Наука, 1999.
76. *Седов Л.И.* Плоские задачи гидродинамики и аэродинамики. — М.: Наука, 1966.
77. *Сидоров Ю.В., Федорюк М.В., Шабунин М.В.* Теория функций комплексного переменного. — М.: Лаборатория базовых знаний, 2002.
78. *Смелов В.В.* Лекции по теории переноса нейтронов. — М.: Атомиздат, 1978.
79. *Смирнов В.И.* Курс высшей математики, т. 2, 4. — М.: Физматгиз, 1967, 1958.
80. *Смирнов М.М.* Задачи по уравнениям математической физики. — М.: Наука, 1975
81. *Соболев В.В.* Точечный источник света между параллельными плоскостями // ДАН СССР, т. 42, № 4, 1944.
82. *Соболев С.Л.* Уравнения математической физики. — М.: Наука, 1992.
83. *Соболев С.Л.* Применения функционального анализа в математической физике. — М.: Наука, 1988.
84. Солитоны. Под редакцией Р. Буллаф, Ф. Кодри — М.: Мир, 1983.
85. *Стернин Л.Е.* Основы газовой динамики. — М.: МАИ, 1995.
86. *Тамм И.Е.* Основы теории электричества. — М.: Наука, 1989.
87. *Тихонов А.Н., Самарский А.А.* Уравнения математической физики. — М.: МГУ, Наука, 2004.
88. *Трикоми Ф.Д.* Интегральные уравнения. — М.: ИЛ, 1960.
89. *Уизем Дж.* Линейные и нелинейные волны. — М.: Мир, 1977.
90. *Фарлоу С.* Уравнения с частными производными для научных работников и инженеров. — М.: Мир, 1985.
91. *Флюгге З.* Задачи по квантовой механике. т. 2. — Череповец.: Меркурий-Пресс, 2000.
92. *Эльсгольц Л.Э.* Обыкновенные дифференциальные уравнения. — СПб.: Лань, 2002.
93. *Шапиро А., Тьюколски С.* Черные дыры, белые карлики и нейтронные звезды. т. 1, 2. — М.: Мир, 1985.
94. *Шелковников Ф.А., Такайшвили К.Г.* Сборник упражнений по операционному исчислению. Изд. 4-ое, стереотип. — М.: 2006.
95. *Шилов Г.Е.* Математический анализ. Второй специальный курс. — М.: Наука, 1965.

Учебное издание

ГОРЮНОВ Анатолий Федорович

**МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
В ПРИМЕРАХ И ЗАДАЧАХ**

Том I

Редактор *Е.И. Ворошилова*
Оригинал-макет: *Д.П. Вакуленко*
Оформление переплета: *А.В. Андросов*

Подписано в печать 01.07.2015. Формат 60×90/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 54,5.
Уч.-изд. л. 65,4. Тираж 400 экз. Заказ №

Издательская фирма «Физико-математическая литература»
МАИК «Наука/Интерпериодика»
117342, Москва, ул. Бултерова, 17 Б
E-mail: fizmat@maik.ru, fmlsale@maik.ru;
<http://www.fml.ru>

Отпечатано с электронных носителей издательства
в АО «ИПК «Чувашия»,
428019, г. Чебоксары, пр-т И. Яковлева, 13

ISBN 978-5-9221-1641-1



9 785922 116411